



ئۇشبۇ كىتاب ئېلېكترونلۇق تورى تەرىپىدىن تارقىتىلدى

ئەزىز ئوقۇرمەن، ئۇشبۇ كىتاب ئېلېكترونلۇق تورى ئوقۇرمەنلىرى
تەرىپىدىن سىكانىرلىنىپ تارقىتىلدى.

3
2013

پىزاپان - تېخنىكىسى



قىشقار ۋىلايىتىنىڭ مائارىپ ئىنستىتۇتىنىڭ
مۇتەخەسسىسى، مېھرىبان ئائىلەنىڭ تۇرغۇچىسى

农村科技

ھاجى ئاتىك مۇرۇمىت

ھەلىقە تۇرغۇن ئوتتۇرىسى



قەدىمىي دىيار قەشقەردىكى قەلەمكەش خانىم - قىزلاردىن ، رايونىمىزدىكى
 ھەرقايسى سەپلىرىدە دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلىۋاتقان قەبرىنىڭلارغا
 103- قەبرىلىك «8-مارت» خەلقئارا ئاياللار بايرىمىنىڭ سالام!



مەلىكە تۇرسۇن خەۋەرى ۋە فوتوسى

ش ئۇ ئار يېزا خىزمىتى ئىشخانىسى، ش ئۇ ئار نامراتلارنى يۆلەش، ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى، ش ئۇ ئار پەن - تېخنىكا جەمئىيىتى، ش ئۇ ئار يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى ۋە شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ باشچىلىقىدا نەشر قىلىندى.

بۇ ساندا

تېرىش پەرۋاش

- (1) كۈزگى بۇغداينىڭ ئەتىيازلىق پەرۋاشى.....ئەنۋەر تۇرسۇن
- (3) كۆممىقوناقنىڭ مايسا مەزگىلىدىكى پەرۋاشى.....قەمگۈل تۇرسۇن قاتارلىقلار
- (4) يۇقىرى زىچلىقتا كېۋەز ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم نۇقتىلار.....رابىيە ياسىن
- (6) بۇغداينىڭ دان ئېغىرلىقىنى ئاشۇرۇش تەدبىرلىرى.....ئابلەت مەخمۇت قاتارلىقلار
- (7) زىغىر ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى.....تۇرسۇنكۈل يۈنۈس
- (9) زەنجىۋىل ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى.....ماھىرە يېزىم
- (10) بەرەڭگە ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى.....ئابدۇۋاھىت ئىبراھىم
- (12) زىيانسىز كۆكتات ئۆستۈرۈشتە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار.....روزىگۈل تۇداخۇن

ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى

- (14) پارنىكتا شوخلا ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى.....نۇسرەت خوجەھمەت
- (17) پارنىكتا كۈدە ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم نۇقتىلار.....ھەزىمگۈل مەمەت قاتارلىقلار

ئوغۇت تۇپراق

- مېۋىلىك دەرەخلەرنى قوشۇمچە ئوغۇتلاشتىكى تېخنىكىلىق تەدبىرلەر.....
- (18)چىمەنگۈل ساقاجىيوف قاتارلىقلار
 - (20) خىمىيەۋى ئوغۇتلارنى پەرقلەندۈرۈشنىڭ ئاددىي ئۇسۇللىرى ... ياقۇپ ئىمىر قاتارلىقلار
 - كېۋەزنى يىلتىز سىرتىدىن قوشۇمچە ئوغۇتلاشتا دىققەت قىلىدىغان مۇھىم نۇقتىلار.....
 - (22) روشەنگۈل ياسىن قاتارلىقلار
 - زىرائەتلەردىكى ئېلېمېنت يېتىشمەسلىك ئالامەتلىرى ۋە تولۇقلاش ئۇسۇللىرى....دىلخۇمار تاشمەمەت (24)

ئورمانچىلىق

- (26) سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ تېرەك كۆچىتى يېتىشتۈرۈش ئۇسۇلى....ئانقىز روزى قاتارلىقلار

ئۆسۈملۈك ئاسراش

- كېۋەز كۆك پىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش ئۇسۇللىرىنۇرگۈل سەلەي (28)
پارنىك كۆكتاتلىرىدىكى كېسەللىك، ھاشارلارنىڭ زىيىنىنى يېنىكلىتىش ئۇسۇلى
(30)تۇرسۇنغۈل تۇردى
پارنىك ئاق توزان پىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش ئۇسۇلىئابلىكىم ئەمەت (31)
كۆكتات ئېتىزىدىكى ئوت - چۆپلەرنىڭ ئۈنۈپرسال ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش ئۇسۇلى
(34)ئەركىن نىياز
سانائەتتە ئىشلىتىلىدىغان شوخلىدىكى كېسەللىك، زىيانداش ھاشارلار ۋە ئوت - چۆپلەر -
نىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش مەختۇمخان بارات (35)
يىلتىز سىستېمىسىدىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش تەدبىرلىرى
(37)ھەمراگۈل نېسىپەر
چىلان دەرىخىدە كۆرۈلىدىغان كېسەللىك ۋە زىيانداش ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش
ئۇسۇلى روشەنگۈل تۇردى (38)

سۇچىلىق

- پۇركۇپ سۇغىرىش سېستېمىسىنى لايىھەلەشتىكى مۇھىم نۇقتىلار.....تاجىگۈل سەمەت (40)
ئەتىيازلىق سۇ باشلاشنىڭ تەييارلىق خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك ئەنۋەر تۇرغۇن (42)
توما - تاقاق، چىغىرىق ئۆسكۈنىلىرىنى بىخەتەر ئىشلىتىشتىكى مۇھىم نۇقتىلارمۆمىن ياسىن (43)

چارۋىچىلىق، مالدوختۇرلۇق

- تۆللەردىكى ۋىتامىن A يېتىشمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش قەلىنۇر ئابدۇرېھىم (45)
چارۋىلاردىكى تۇخۇمدان خالتىلىق ئىششىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشچىمەنگۈل زۇنۇن قانارلىقلار (47)
توخۇ چىچەك كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشنېزامىدىن ئابدۇرېھىم (49)
موزاي چوڭ ئۇچەي تاياقچە باكتېرىيە كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش - داۋالاش روزىگۈل ئەخمەتنىياز (51)

يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى

- يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى داۋانغا چىققاندا ۋە چۈشكەندە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار زۆھرەگۈل ھەسەن (54)

قانۇن ئۆگەنەيلى

- جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاياللارنىڭ ھوقۇق - مەنپەئىتىنى كاپالەتلەندۈرۈش قانۇنى ... (57)

بىلىۋېلىڭ

- خانم - قىزلارغا خىتاب ھەلىمە تۇرسۇن (59)

باش مۇھەررىر:

مەسئۇل مۇھەررىر:

مۇھەررىر:

ھەلىمە تۇرسۇن

نۇر مۇھەممەت

ئابلەت ھەمبۇللا

新疆维吾尔自治区党委农办、自治区扶贫办、自治区科协、新疆维吾尔自治区农业科学院和新疆农业大学联合主办、面向新疆农牧区、国内外公开发行的综合性省级科普月刊。

栽培管理

- 冬小麦春季栽培管理 艾尼瓦尔·吐尔逊(1)
- 玉米苗期栽培管理 凯米古丽·图尔逊等(3)
- 棉花高密度栽培要点 热比艳·亚森(4)
- 增加小麦粒重措施 阿布来提·麦合木提等(6)
- 胡麻栽培方法 吐尔逊古丽·玉努斯(7)
- 生姜栽培方法 玛依热木·赫则木(9)
- 马铃薯栽培方法 阿不都瓦依提·依不拉英(10)
- 无公害蔬菜栽培注意事项 肉孜比·吐达洪(12)

设施农业

- 温室番茄栽培方法 努苏拉提·加合买提(14)
- 温室韭菜栽培要点 艾孜木古丽·买买提等(17)

土壤肥料

- 果树施肥技术措施 曲曼姑丽·沙卡吉优甫等(18)
- 鉴别化肥方法 亚库甫·依米尔等(20)
- 棉花根外追肥注意事项 茹先古丽·牙森等(22)
- 农作物缺乏微量元素症状与补施方法 地丽胡马尔·塔什买买提(24)

林业技术

- 覆膜育树苗方法 阿尼克孜·肉孜(26)

植物保护

- 棉蚜防治方法 努尔古丽·萨来(28)
- 预防温室蔬菜病虫害措施 吐尔逊古丽·吐尔地(30)
- 温室白虱防治方法 阿卜力克木·艾麦提(31)
- 菜地除草综合方法 艾尔肯·尼亚孜(34)

加工番茄病虫害防治方法	买合吐木汗·巴拉提(35)
根系病害防治措施	艾米拉古丽·尼斯尔(37)
红枣树病虫害防治方法	茹鲜古丽·吐尔地(38)

农田水利

喷灌系统设计要点	塔吉古·塞买提(40)
水渠引水准备工作	艾尼瓦尔·托尔洪(42)
输水期闸门、启闭机设备安全使用方法	木明·亚生(43)

畜牧兽医

羔羊缺乏维生素 A 防治方法	凯丽比努尔·阿布都热依木(45)
母畜卵泡囊肿防治方法	曲曼古丽·祖农等(47)
春季鸡痘病防治措施	尼扎米敦·阿布都热衣木(49)
犏牛大肠杆菌病防治方法	肉孜古丽·艾合买提尼亚孜(51)

农业机械

农用车辆上、下坡注意事项	早熟古丽·艾山(54)
--------------------	-------------

法律常识

中华人民共和国妇女权益保障法	(57)
----------------------	------

百科知识

致妇女的宣言	艾力曼·吐尔逊(59)
--------------	-------------

主管主办：新疆维吾尔自治区农业科学院

编辑出版：新疆维吾尔自治区农业科学院《农村科技》杂志社

主 编：艾力曼·吐尔逊 电话（传真）0991-4505075

责任编辑：艾尼瓦尔·买买提 编辑：阿布来提·艾比布拉

地 址：乌鲁木齐市南昌路 403 号 邮编：830091

印 刷：新疆新华印刷厂 定价：2.00 元

发 行：乌鲁木齐市邮政局

订 阅：全国各地邮局，各县扶贫办、科技局、农经局和本刊编辑部

国际标准刊号：ISSN 1004 - 1095

国内统一刊号：CN65 - 1046 / S - W

邮 政 代 码：58 - 123 广告许可证号：0016

收款单位：新疆农业科学院农业经济与科技信息研究所

开户银行：乌鲁木齐市农行南昌路支行

行 号：103881000461 账号：004601040000839

كۈزگى بۇغداينىڭ ئەتىيازلىق پىرۋىسى

ئەنۋەر تۇرسۇن

(باي ناھىيەلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىدىن)
1. تىرنىلاش: باش ئەتىيازدا يەنى 3 - ئاينىڭ باشلىرى، بۇغداي ئې - تىزلىرى 2 - 3 سانتىمېتىر ئېرىشكە باشلىغان مەزگىلدە، 2 - 3 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا بىر قېتىم تەكشى تىرنىلىغاندا بۇغداي مايسىنىڭ قايتا كۆكرىشى تېزلىشىپ، تىمەن ئۆسۈدۈ ھەمدە بۇغداي مايسىلىرىنى ئەتىياز پەسىللىك شور، زەي ئاپىتىدىن ساقلاپ قالغىلى بولىدۇ. بۇ تەدبىر 2 - ئاينىڭ 25 - كۈنىدىن، 3 - ئاينىڭ 5 - كۈنىگىچە ئېلىپ بېرىلسا بولىدۇ. تىرنىلاش يۆنىلىشى توغرىسىغا ياكى قىيپاش تىرنىلانسا مۇۋاپىق بولىدۇ.

2. قايتا كۆكلەش مەزگىلىدىكى قوشۇمچە ئوغۇتلاش: بۇغداي تۈپچىلىرىنىڭ ئۈنۈمسىز باشقا ئايلىنىش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىپ، يېتەر - لىك مىقداردىكى ئۈنۈملۈك باشقانى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن، قايتا كۆك - لەش مەزگىلىدىكى قوشۇمچە ئوغۇتنى، دەل ۋاقتىدا بېرىش لازىم. ئادەتتە ھەر مو بۇغداي ئۈچۈن 20 كىلوگرام ئورپاغا 8 - 10 كىلوگرام ئاممو - نى دى ھىدرو فوسفاتنى ئارىلاشتۇرۇپ، تۇپراق قەۋىتىگە سىيالكى بىلەن بېرىش ھەم ئارقىدىن شاخ سۆرمە قىلىپ، ئوغۇتنىڭ تولۇق كۆمۈلۈ - شىگە تولۇق كاپالەتلىك قىلىش لازىم. قوشۇمچە ئوغۇتنى 3 - ئاينىڭ 1 - كۈنىدىن 15 - كۈنىگىچە، 3 - 5 سانتىمېتىر چوڭقۇر - لۇقتا بەرسە بولىدۇ.

3. ئەتىيازلىق سۈيىنى ۋاقتىدا قويۇش: بۇغداينىڭ غول تارتىش مەزگىلىدىكى سۇغا بولغان ئېھتىياجىنى تولۇق قاندۇرۇش ۋە قايتا كۆك - لەش مەزگىلىدە بېرىلگەن قوشۇمچە ئوغۇتنىڭ ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش

ئۈچۈن، بۇغداينىڭ ئاخىرى غول تارتىشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئەندە - يازلىق سۈيىنى 4 - ئاينىڭ 5 - كۈنىدىن 15 - كۈنگىچە قويۇش لازىم.

4. بۇغداي ئېتىزىدىكى ئوت - چۆپلەرنى خىمىيەلىك ئۇسۇلدا يوقىتىش: بۇغداينىڭ ئەتىيازلىق سۈيىنى قويغاندىن كېيىن، بۇغداي ئېتىزلىرىدىكى سىركەش، تاش پۇرچاق، لويلا، ئاق چېچەك، قامچا ئوت قاتارلىق قوش پەللىلىك ياۋا ئوتلار 3 - 4 يوپۇرماق بولغاندا، بۇغداي مايسا ئېتىزلىرىغا %13 لىك خېدونالنىڭ 200 - 250 گرام سۇ - يۇقلۇقىغا 30 كىلوگرام سۇ ئارىلاشتۇرۇپ تەكشى چېچىش ياكى 1 - 1.5 گرام دۇباڭ جۇشنىڭ دورىسىغا 30 كىلوگرام سۇ ئارىلاشتۇرۇپ چېچىش ئارقىلىق يوقىتىشقا بولىدۇ. دورىنىڭ ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، دورىنى ھاۋا ئوچۇق كۈنلىرى چېچىش، ھاۋانىڭ تېمپېراتۇرىسى 20°C تىن تۆۋەن بولغاندا چاماسلىق لازىم. ئادەتتە 4 - ئاينىڭ 10 - كۈنىدىن 20 - كۈنگىچە چېچىلسا مۇۋاپىق بولىدۇ.

5. يوپۇرماق سىرتىدىن قوشۇمچە ئوغۇتلاش: بۇغداي غول تار - تىشنىڭ ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى مەزگىلىدە (يوقاق بولۇشتىن ئىلگىرى) ھەر مو بۇغداي مايسىلىرىغا 200 گرام كالىي دى ھىدرو فوسفات، 80 گرام تىرىئا كوتنانول (سەنشۈەنچۈن) دورىسىغا 30 كىلوگرام سۇ ئارىلاشتۇرۇپ، يوپۇرماق يۈزىگە تەكشى چېچىش ئارقىلىق، بۇغداي - نىڭ بايراق يوپۇرمىقىنىڭ فۇنكسىيەلىك ۋاقتىنى ئۇزارتىپ، دان ئې - غىرلىقىنى ئاشۇرۇش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. (03)

كۆممىقوناقنىڭ مایسا مەزگىلىدىكى بىرۋىشى

قەمگۈل نۇرسۇن ئەخمەتجان سادىر

(يوپۇرغا ناھىيە باياۋات يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)

كۆممىقوناقنىڭ مایسا مەزگىلى — مایسا ئۈنۈپ چىققاندىن تارتىپ يۇمران باشاق كۆرۈنگىچە بولغان مەزگىلنى كۆرسىتىدۇ. بۇ مەزگىل جاغدا سوتلارغا 60 - 65 كۈن، ئارا جاغدا سوتلارغا 40 - 45 كۈن، چىلگە سوتلارغا 20 - 25 كۈن ئەتراپىدا كېتىدۇ.

1. مایسا مەزگىلىدىكى ئۆسۈپ يېتىلىش ئالاھىدىلىكى: (1) جاغدا كۆم - مىقوناق سوتلىرىنىڭ مایسا مەزگىلى ئۇزۇن بولۇپ، بۇ ۋاقىتتىكى ئۆ - سۈشى ئاساسەن يەر ئاستى قىسمىنىڭ ئۆسۈشىنى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ. نىسپىي تەملىك 60% - 65% بولسا نورمال ئۆسىدۇ؛ (2) يىلتىزنىڭ ئۆسۈشىنى ئاساس قىلىپ، ئوزۇقلۇق ئەزالىرى شەكىللىنىدۇ؛ (3) مایسا مەزگىلىدە تېمپېراتۇرىغا بولغان سەزگۈرلۈكى يۇقىرى بولىدۇ.

2. مایسا مەزگىلىدىكى پەرۋاش نىشانى: كولىتۋاتسىيە قىلىپ، ئوت - چۆپ يوقىتىش، تۇپراقنىڭ ھاۋا ئۆتكۈزۈش ئىقتىدارىنى ياخشىلاپ، يەر ئاستى قىسمى بىلەن يەر ئۈستى قىسمىنىڭ مۇناسىۋىتىنى تەڭشەپ، تىمەن مایسا يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت.

3. مایسا مەزگىلىدىكى پەرۋاش تەدبىرلىرى: (1) مایسىنىڭ تولۇق ئۈنۈپ چىقىشىغا كاپالەتلىك قىلىش لازىم؛ (2) مایسا كەم بار ئورۇنلارغا دەرھال تولۇقلاپ تېرىش لازىم؛ (3) مایسلارنى تەكشۈرۈپ، ۋاقىتدا مایسا بەلگىلەش لازىم. مایسا بەلگىلەشنى ئۈچ تال يوپۇرماق چىقارغان مەزگىلدە باشلاپ بەش تال يوپۇرماق چىقارغان مەزگىلدە ئاخىرلاشتۇرۇش كېرەك. مایسا بەلگە - لەشتە تۆتنى قالدۇرۇش تۆتنى قالدۇرماسلىق لازىم؛ ① تىمەن مایسلارنى قالدۇرۇپ، ئاجىز مایسلارنى شاللىۋېتىش كېرەك؛ ② ۋەكىل خاراكتېرىگە ئىگە مایسلارنى قالدۇرۇپ، يات مایسلارنى شاللىۋېتىش كېرەك؛ ③ ئىم - چىكە، ئورۇق، بوغۇم ئارىلىقى ئۇزۇن مایسلارنى شاللىۋېتىپ، غولى توم، بوغۇم ئارىلىقى قىسقا مایسلارنى قالدۇرۇش لازىم. كۆپ كولىتۋاتسىيە قىلىش ئارقىلىق مایسلارنىڭ بالدۇر يېتىلىشىنى قولغا كەلتۈرۈش لازىم. بىرىنچى قېتىم كولىتۋاتسىيە قىلىش چوڭقۇرلۇقى 3 - 5 سانتىمېتىر،

يۇقىرى زىچلىقتا كېۋەز ئۆستۈرۈشنىكى مۇھىم نۇقتىلار

رابىيە ياسىن

(بۈگۈر ناھىيە بۈگۈر بازارلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)

1. زىچلىقنى ئاشۇرۇش بىلەن سېلىنمىنى كۆپەيتىشنى ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىش لازىم. كېۋەز ئۆستۈرۈشتە مايسىسى تولۇق، ئۆستۈرۈش زىچلىقىنى مۇۋاپىق قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىپ، ھەرمو يەردىكى تۈپ سانى ۋە غوزا سانىنى ئاشۇرۇش كېرەك، لېكىن زىچلىقنى ئاشۇرۇشقا ئەھمىيەت يەت بېرىپ، يەرگە بولغان سېلىنمىنىڭ يېتەرلىك بولۇشىغا ئەھمىيەت بەرمىسە، كېۋەز مايسىلىرىغا ئوزۇقلۇق يېتىشمەي ئاجىز ئۆسۈپ، كېسەللىك ۋە ھاساراتنىڭ زىيىنىغا ئاسان ئۇچرايدۇ. بۇنىڭ بىلەن تېمەن مايسا يېتىشتۈرۈش مەقسىتىگە يەتكىلى بولمايدۇ. نەزەرىيەۋى جەھەتتىن قارىغاندا ھەر مو يەردە 18 مىڭ تۈپ مايسا ئۆستۈرۈش ئۈچۈن، بىر مو يەرگە ئۈچ مىڭ كىلوگرام چىرىگەن مەھەللىۋى ئوغۇت، 20 كىلوگرام فوسفورلۇق ئوغۇتنى ئاساسىي ئوغۇت قىلىپ بېرىش، ئىككىنچى سۈيىگە بىرلەشتۈرۈپ 10 كىلوگرام ئازوتلۇق ئوغۇت بىلەن قوشۇمچە ئوغۇتلاش، ئۇنىڭدىن باشقا ئوزۇقلۇق ئۆسۈش مەزگىلىدە يوپۇرماق ئوغۇتى بىلەن ئوغۇتلاش لازىم.

2. خىمىيەۋى ئۆسۈلدا ئۆسۈشنى تەڭشەشنى چىڭ تۇتۇش كېرەك. ئۆسۈش تۈرۈش زىچلىقىنى ئاشۇرۇش ئاساسىدا، ئوخشىمىغان ئۈنۈمدارلىق شارائىتىدا

ئىككىنچى قېتىم 12 - 18 سانتىمېتىر بولۇش لازىم؛ ④ مايسا مەزگىلىدە بىرىنچى سۈيىنى كېچىكتۈرۈپ قويۇش لازىم؛ ⑤ ياۋا ئوت - چۆپ، كېسەللىك، زىيانداش ھاساراتلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش لازىم. ئاساسلىق ئوت - چۆپلەردىن جوغدىن، يۆگمەچ، لويلا، قامچا ئوت بار. بۇلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىشتا: 72% لىك دوئىل (都尔) دىن ھەر موغا 200 - 250 مىللىگرامنى ياكى كۈيىمېيلىك (快美灵) دىن 2 - 4 گىرامنى ياكى 30 - 35 مىللىگرام 48% لىك تىرىفلورالين (氟乐灵) نى 45 كىلوگرام سۇغا ئارىلاشتۇرۇپ، كۆممىقوناق 3 - 6 تال يوپۇرماق چىقارغان مەزگىلدە پۈركۈسمۇ ئوت - چۆپ يوقىتىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. (03)

تىدىكى كېۋەز ئېتىزلىرىغا قارىتا، بوغۇم قىسقارتىش دورىسى (缩节胺) نىڭ ئىشلىتىش قېتىم سانى ۋە ئىشلىتىش مىقدارىنى بەلگىلەپ، ئۆسۈش-نى تەڭشەش كېرەك. ئۇنداق بولمايدىكەن كېۋەزنىڭ ھاۋا ۋە يورۇقلۇق شارائىتى تەسىرگە ئۇچرايدۇ، نەتىجىدە بالدۇر ئېچىلدۇرۇش، سۈپەتلىك بولۇش مەقسىتىگە يەتكىلى بولمايدۇ. ئادەتتە تۇپراق ئۈنۈمدارلىقى ياخشى بولغان يۇقىرى زىچلىقتىكى كېۋەز ئېتىزلىرىغا قارىتا، پۈتكۈل ئۆسۈپ يېتىلىش باسقۇچىدا ھەر مو يەرگە بوغۇم قىسقارتىش دورىسىدىن 10 گرام، ئوتتۇرا، تۆۋەن ھوسۇللۇق كېۋەز ئېتىزلىرىغا قارىتا 7 - 8 گرام ئەتراپىدا ئىشلەتسە مۇۋاپىق بولىدۇ.

3. كېۋەزنى بالدۇر ئېچىلدۈرۈشنى چىڭ تۇتۇش كېرەك. كېۋەزنى بال-دۇر ئېچىلدۈرۈش يۇقىرى مەھسۇلات ئېلىشنىڭ ئاساسى. كېۋەز ئۆستۈ-رۈشتە بىر تېرىپلا مايسىنىڭ تولۇق بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئاساسىدا، بالدۇر كۈلتىۋاتىسىيە قىلىپ، بالدۇر مايسا بەلگىلەپ، مايسىنى تە-مەن، بالدۇر يېتىلدۈرۈش، بالدۇر ئوغۇتلاپ، مۇۋاپىق ۋاقىتتا سۇغىرىپ، ئۆز جايىنىڭ ئىسسىقلىق، يورۇقلۇق مەنبەسىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، غو-زىلاش مەزگىلى بىلەن يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق مەزگىلىنىڭ ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىلىشىغا ئەھمىيەت بېرىپ، تۆمۈزدىن بۇرۇنقى غوزا بىلەن تو-مۇز غوزىسىنى ئاشۇرۇپ، بالدۇر ئاجىزلاپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە كېۋەزنىڭ بالدۇر ئېچىلىشىنى قوغلىشىپ، ئېتىزنى بالدۇر قۇرغاقلاشتۇرۇپ، ئېچىلىشىنى ئىلگىرى سۈرگۈچى دو-رىلارنى بەك بالدۇر ئىشلەتمەسلىك كېرەك. شۇنداق قىلغاندا كېۋەزنىڭ بالدۇر ئېچىلىشىنى قولغا كەلتۈرۈپ، پاختا مەھسۇلاتى ۋە سۈپىتىگە كاپا-لەتلىك قىلغىلى بولىدۇ.

4. ئۆسۈشنىڭ كېيىنكى مەزگىلىدە ياۋا ئوت - چۆپلەرنى يوقىتىشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم. ياۋا ئوت - چۆپلەرنى يوقىتىش ئارقىلىق، كېۋەز-نىڭ يورۇقلۇق ۋە ھاۋا شارائىتىنى ياخشىلاپ، سۇ ۋە ئۆزۈقلۈك ئىسراپ بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. (03)

بۇغداينىڭ دان ئېغىرلىقىنى ئاشۇرۇش تەدبىرلىرى

ئابىلەت مەخمۇت ئارزۇگۈل ئابدۇل

(توقسۇ ناھىيەلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش مەركىزىدىن)

بۇغداي ئۆسۈپ يېتىلىشنىڭ كېيىنكى مەزگىلىدە (بۇغداي باشاق چىقدى-رىپ پىششىق بولغان مەزگىلنى كۆرسىتىدۇ) بۇغداي يىلتىز سىستېمىسىنىڭ ئۇزۇقلۇقلارنى سۈمۈرۈش كۈچى ئاجىزلايدىغان بولغاچقا، بۇغداي تۈپلىرىگە قوشۇمچە ئوغۇت بەرگەندە ئوغۇتنىڭ ئۈنۈمى ياخشى بولمايدۇ. ئەمما بۇ مەزگىلدە بۇغداي تۈپلىرىنىڭ ئۈستۈنكى قىسمىدىكى يوپۇرماقلار فوتوسىنتېز ئىقتىدارىغا ئىگە بولىدۇ. شۇڭا بۇ مەزگىلدە بۇغداي تۈپلىرىدە گە سۇيۇقلاندۇرۇلغان يوپۇرماق ئوغۇتى بەرگەندە بۇغداي دانلىرىنىڭ ئېغىرلىقى ئېشىپ، دېنى چوڭ، رەڭگى پارىقراق، سۈزۈك بولۇپ، مىڭدان ئېغىرلىقى ئېشىپ، مەھسۇلاتى %15 - %25 ئاشىدۇ ھەمدە بۇغداي يوپۇرماقلىرىنىڭ سۇغا بولغان ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ. يوپۇرماق ئوغۇتىنى چېچىشنىڭ ئۇسۇللىرى تۆۋەندىكىچە:

1. 98% لىك كالىي دېھىدرو فوسفات (磷酸二氢钾) تىن 150 - 200 گرام، %46 لىك ئوريا (尿素) دىن 500 گرامغا 30 كىلوگرام سۇغا رىلاشتۇرۇپ، بۇغداي باشاقلىرىغا تەكشى پۈركۈش كېرەك.
2. ئالتە ئايدىن ئاشقان پاتقاق گازى چىرىندى سۇيۇقلۇقىنى 3:1 نىسبەت بويىچە (بىر كىلوگرام پاتقاق گازى چىرىندى سۇيۇقلۇقىغا ئۈچ كىلوگرام سۇ قوشۇپ) سۇيۇلدۇرۇپ، بۇغداي باشىقىغا تەكشى پۈركۈش كېرەك.
3. پۈركۈش قېتىم سانىنى ئادەم كۈچى، تۇپراق ئۈنۈمدارلىقى ۋە بۇغداي مايسىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەش لازىم. بۇغداي باشاق چىقىرىپ چېچەكلەپ بولغاندىن كېيىن، سۈتلىنىش، موملىنىش مەزگىلىدە، بۇغداي باشىقىغا يوپۇرماق ئوغۇتىنى تەكشى پۈركۈش كېرەك.
4. چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچى ۋاقتى بەشتىن كېيىن پۈركۈش، كۈچلۈك كۈن نۇرىدا، قاتتىق ئىسسىقتا پۈركۈمەسلىك لازىم. يوپۇرماق ئوغۇتى پۈركۈلۈپ بولغاندىن كېيىن ئالتە سائەت ئىچىدە يامغۇر يېغىپ قالسا قايتا پۈركۈش لازىم. (03)

زىغىر ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى

تۇرسۇنگۈل يۇنۇس

(ئاراتۈرۈك ناھىيەلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىدىن)
زىغىر — زىغىر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئىشلىتىلىش ئورنىغا قاراپ، تالالىق زىغىر ۋە مايلىق زىغىر دەپ ئىككى خىلغا ئايرىلىدۇ. ئادەتتە تالا ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان زىغىر تالالىق زىغىر، مايغا ئىشلىتىدىغان زىغىر مايلىق زىغىر (خۇما) دەپ ئاتىلىدۇ. مايلىق زىغىر ئاساسلىق مايلىق زىرائەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ، مېيى پۇراق-لىق، سۈپىتى ياخشى، تەركىبىدە تويۇنغان كىسلاتا، ئەلا سۈپەتلىك يود قا-تارلىقلار مول، يېيىشلىك بولۇپلا قالماستىن، سانائەتتە سۇ ئۆتكۈزمەيدىغان رەخت ياساش، باقمىچىلىقتا ئىشلىتىدىغان رەڭ، بوياق، خۇرۇم، سۈيۈن ياساش سانائىتىدىمۇ كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلىدۇ.

1. تېرىشتىن بۇرۇنقى تەييارلىق: (1) يەر تاللاش: تېرىلغۇ تۇپراق قاتلىمى قېلىن، يۇمشاق، سۇ، ئوغۇت ساقلاش ئىقتىدارى ياخشى، سۇ چى-قىرىۋېتىشكە قۇلايلىق بولغان ئاجىز كىسلاتالىق تۇپراقنى تاللاش كېرەك. ئالدىنقى يىلى قوناق، بۇغداي، پۇرچاق، قىزىلچا تېرىلغان يەرلەر بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ. 3 - 4 يىل باشقا زىرائەتلەر بىلەن ئۆۋەتلىشتۈرۈپ تې-رىپ، تەكرار تېرىشتىن قەتئىي ساقلىنىش لازىم؛ (2) ئاساسىي ئوغۇتنى يېتەرلىك بېرىش: ئورگانىك ئوغۇتنى ئاساس قىلىپ، ھەر مو يەرگە 2000 - 2500 كىلوگرام سۈپەتلىك قىغ، 10 - 15 كىلوگرام كالتسىي سۇ-پېر فوسفات (过磷酸钙) ۋە 4 - 6 كىلوگرام كالىي سۇلفات (硫酸钾) نى يەرنى ئاغدۇرۇشتىن بۇرۇن بىر قېتىمدىلا يەرگە چېچىپ بېرىش كې-رەك؛ (3) ئۇرۇقنى بىر تەرەپ قىلىش: ئۇرۇقنى ئىنچىكىلىك بىلەن تال-لىۋالغاندىن كېيىن، ئاپتاپقا سېلىپ، بىخلىنىش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆ-تۈرۈش كېرەك. ئۇرۇق مىقدارىنىڭ 0.3% چىلىك ترام (福美双) بىلەن ئۇرۇقنى دورىلاش ئارقىلىق مايسا مەزگىلىدىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

2. مۇۋاپىق ۋاقىتتا تېرىش: (1) تېرىش ۋاقتى زىغىر ئۇرۇقىنىڭ

1°C - 3°C ئەتراپىدىكى تېمپېراتۇرىدا بىخلىنىش ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، ھاۋا تېمپېراتۇرىسى 7°C - 8°C قا مۇقىملاشقان ۋاقىتتا تېرىش كېرەك. ئەگەر تۇپراق تېمپېراتۇرىسى تۆۋەن ۋاقىتتا تېرىسا بىخلىنىش نىسبىتىگە تەسىر يېتىدۇ. ھەتتا ئۇرۇق سېسىپ كېتىش ئەھۋالى كۆرۈلدۇ. بەك كېچىكتۈرۈپ تېرىسمۇ مەھسۇلاتقا تەسىر يېتىدۇ؛ (2) تېرىش مىقدارى: ماشىنا بىلەن قۇرلاپ تېرىلىدۇ. ھەر مو يەرگە 6~8 كىلوگرام ئۇرۇق سېلىنىدۇ. ھەر مو يەردىكى مايسا سانى 30 - 45 مىڭ تۈپ بولسا مۇۋاپىق؛ (3) تېرىش چوڭقۇرلۇقى: تېرىش چوڭقۇرلۇقى ئۈچ سانتىمېتىر ئەتراپىدا بولۇشى، ئەڭ چوڭقۇر بولغاندىمۇ 3.5 سانتىمېتىردىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك.

3. پەرۋىشى: (1) ئوت - چۆپ يوقىتىش: يۇمران زىغىرنىڭ ئۆسۈشى بىرقەدەر ئاستا، ياۋا ئوت - چۆپلەرنىڭ ئۆسۈشى تېز بولىدۇ. ئەگەر ۋاقىتدا ئوت - چۆپ يوقىتىلمىسا مەھسۇلاتقا بىۋاسىتە تەسىر يەتكۈزىدۇ؛ (2) قوشۇمچە ئوغۇتلاش: قوشۇمچە ئوغۇتلاشتا ئازوتلۇق ئوغۇتنى ئاساس قىلىپ، تۇنجى سۈيىنى سۇغىرىشقا بىرلەشتۈرۈپ، ھەر مو يەرنى بەش كىلوگرام ئوريا (尿素) بىلەن ئوغۇتلاش كېرەك. (3) سۇغىرىش: ئادەتتە مايسا 6 - 10 سانتىمېتىر ئۆسكەندە تۇنجى سۈيىنى قويۇش كېرەك. تۈز-جى سۈيىنى ئاز سۇ بىلەن قاندۇرۇپ سۇغىرىش كېرەك. غۇنچىلاش مەزگىلىدە 2 - قېتىملىق سۈيىنى قويۇش كېرەك. كېيىنكى سۇلىرىنى ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق ۋاقىتتا قويۇش، كۆپ سۇغىرىپ تۈپلەرنىڭ يېتىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

4. مۇۋاپىق ۋاقىتتا يىغىۋېلىش: يىغىۋېلىش ۋاقتى مەھسۇلاتقا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. غولنىڭ ئاستى قىسمىدىكى يوپۇرماقلار سارغىغان، بىر قىسىم يوپۇرماقلار تۆكۈلگەن، 50% - 60% سارغايغان، ئايرىملىرى قوڭۇر رەڭگە ئۆزگەرگەن ۋاقىتتا يىغىۋېلىش ئەڭ مۇۋاپىق ھېسابلىنىدۇ. (03)

زەنجىۋىل ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى

ماھىرە يېزىم

(غۇلجا شەھەرلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىدىن)
1. زەنجىۋىلنىڭ فىزىيولوگىيەلىك ئالاھىدىلىكى: زەنجىۋىل -
 نىڭ، يىلتىز سانى ئاز ھەم قىسقا بولۇپ، تۇپراقتا 30 سانتىمېتىر چوڭ -
 قۇرلۇقتا ھەم توغرىسىغىمۇ 30 سانتىمېتىر كېڭىيىپ ئۆسەلەيدۇ. زەنجى -
 ۋىل غولى يەر ئۈستى غول ۋە يەر ئاستى غول دەپ ئىككى تۈرگە بۆ -
 لىنىدۇ. يەر ئۈستى غولى تىك، يېشىل بولۇپ، يوپۇرمىقى غولىنى
 ئوراپ تۇرىدۇ، ئېگىزلىكى 60 - 100 سانتىمېتىر ئۆسەلەيدۇ، باشقا -
 سىمان گۈل رېتى بولىدۇ، سېرىق ياكى قىزغۇچ سېرىق چېچەكلەيدۇ.

2. ئۆسۈش ئالاھىدىلىكى: زەنجىۋىل ناھايىتى ئاستا بىخلىنىدۇ. ئا -
 دەتتىكى شارائىتتا بىخلانغاندىن تارتىپ تۇنجى يوپۇرماق چىقارغىچە 50
 كۈن ئەتراپىدا ۋاقىت كېتىدۇ. تۇنجى يوپۇرماق چىقارغاندىن تارتىپ ئىككى
 تال يان شاخ چىققۇچە 70 كۈن ئەتراپىدا ۋاقىت كېتىدۇ. ئۆسۈش سۈرئىتى
 ئاستا، ئۆسۈش مىقدارىمۇ ئاز بولىدۇ. ئىككى تال شاخ چىقارغاندىن تارتىپ
 مەھسۇلاتنى يىغىۋېلىشقىچە 70 - 80 كۈن ئەتراپىدا ۋاقىت كېتىدۇ،
 مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا زەنجىۋىلنى تېرىشتىن تارتىپ يىغىۋېلىشقىچە
 200 كۈن ئەتراپىدا ۋاقىت كېتىدۇ.

3. تېرىش: زەنجىۋىل ئىسسىق خالايدىغان بولۇپ، ھاۋا ئىسسىق، قى -
 روۋسىز پەسىللەردە تېرىسا بولىدۇ. ئەگەر سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ ئۆستۈر -
 سە پىشش ۋاقتىنى بىر ئايچە ئالدىغا سۈرگىلى بولىدۇ. ئادەتتە زەنجىۋىل
 بىخلىندۈرۈپ تېرىلىدۇ، بىخلىندۈرۈشتا چۆنەك تاختا ئۈستىدە بىخلىندۈرسا
 بولىدۇ، بىخلىندۈرۈش جەريانىدا تېمپېراتۇرىنى 22°C - 25°C تا كونترول
 قىلىش كېرەك. زەنجىۋىلنى تېرىشتىن بۇرۇن 50 - 70 گرام چوڭلۇقتا
 پارچىلاش ھەم ھەربىر زەنجىۋىل پارچىسىدا بىردىن ساغلام بىخ قالدۇرۇش
 كېرەك. زەنجىۋىلنى تېرىشتا ئالدى بىلەن قاندىرۇپ سۇغىرىش، ئاندىن

بەرەڭگە ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى

ئابدۇۋاھىت ئىبراھىم

(ئاراتۈرۈك ناھىيە توخۇلۇ يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)

1. سورت تاللاش: سۈپەتلىك سورتلارنى تاللاش بەرەڭگىدىن مول ھوسۇل ئېلىش-تىكى مۇھىم ھالقىلارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ.

2. يەر تاللاش: بەرەڭگە تەكرار تېرىشقا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. شۇڭا يەر تاللاش-غاندا چوقۇم ئۈچ يىل ئىچىدە بەرەڭگە ۋە يېدىگەن ئائىلىسىدىكى باشقا زىرائەتلەر تېرىلمىغان يەرلەرنى تاللاش كېرەك. بەرەڭگە تەكرار تېرىشقا ئىنتايىن سەزگۈر بولۇپ، ئادەتتە تەكرار تېرىشتىن ساقلانمىغاندا كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى ئېغىر بولۇپلا قالماستىن، تۇپراقنىڭ ئوزۇقلۇق تەڭپۇڭسىزلىقىنى، بولۇپمۇ تۇپراقتىكى مىكرو-ئېلېمېنتلارنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، بەرەڭگىنىڭ سۈپىتى ناچار، مەھسۇلاتى تۆۋەن بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەرەڭگىنى قوناق، بۇغداي، ئارپا قاتارلىق ئاشلىق زىرائەتلىرى بىلەن ئۆۋەتلەشتۈرۈپ تېرىش ئارقىلىق مەھسۇلاتنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. بەرەڭگە تېرىدىغان يەرنى تاللىغاندا تۈز، سۇغىرىشقا ئەپلىك، سۇ يىغىلىپ قالمايدىغان، تېرىلغۇ تۈپرىقى قېلىن، بوش، قۇمساڭ ئەت تۇپراقلىق يەرلەرنى تاللاش كېرەك.

ئېرىقچە تارتىپ، ئېرىقچە ئىچىگە زەنجىۋىل پارچىسىنى سېلىپ، 4 - 5 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا توپا بىلەن كۆمۈش كېرەك. مايسا ئۈنۈپ چىققاندىن كېيىن سۇغىرىشقا بىرلەشتۈرۈپ توپىسىنى يۇمشىتىپ، ئوت - چۆپلەرنى ۋاقتىدا ئوتاش ھەم قوشۇمچە ئوغۇتلاش كېرەك.

4. كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش: زەنجىۋىلدە ئاساسلىق چىرىش كېسىلى ۋە داغ كېسىلى كۆپ كۆرىلىدۇ. ئالدىنى ئېلىشتا، ئۆۋەتلەشتۈرۈپ تېرىش ۋە زەنجىۋىلنى مىكروپسىز لاندۇرۇپ تېرىش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىش لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا مېتىل توپسىن (甲基托布津) قاتارلىق دورىلارنى يىلتىزغا قويۇش ياكى يوپۇرماققا پۈركۈش ئارقىلىق يۇقىرىقى كېسەللىكلەرنى يوقاتقىلى بولىدۇ. (02)

3. ئاساسىي ئوغۇتنى يېتەرلىك بېرىش: بەرەڭگە يۇقىرى مەھسۇلاتلىق زىرائەت بولغاچقا، ئوزۇقلۇققا بولغان ئېھتىياجى يۇقىرى بولىدۇ. بەرەڭگە پۈتۈن ئۆسۈپ يېتىپ-لىش جەريانىدا كېرەكلىك بولغان ئوزۇقلۇقنىڭ $2/3$ قىسمى ئاساسىي ئوغۇت ئارقىلىق يەتكۈزۈلىدۇ. ئاساسىي ئوغۇتقا ئادەتتە مەھەللىۋى ئوغۇت، گەندە، سۈيۈك ئا-رىلاشمىسى قاتارلىقلارنى ئىشلەتسە ياخشى بولىدۇ. ھەر مو يەرگە 1000 - 1500 كىلوگىرام ئورگانىك ئوغۇت، 15 - 25 كىلوگىرام كالتسىي سۈپەر فوسفات (过磷酸钙)، 100 - 150 كىلوگىرام ئۆسۈملۈك كۈلى بېرىلىدۇ. ئاساسىي ئوغۇت چۆنەك ئېچىشقا بىرلەشتۈرۈپ 10 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا چۆنەك ئىچىگە كۆمۈپ بېرىلىدۇ. ھەر مو يەرگە 5 - 8 كىلوگىرام ئازوتلۇق ئوغۇت بېرىش ئارقىلىق مايسىنىڭ تولۇق ۋە تېمەن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىنىدۇ.

4. ئۇرۇقنى بىر تەرەپ قىلىش: (1) سۈپەتلىك سورتلارنى تاللاپ تېرىش ئاساسىدا شەكلى كۆركەم، پارىراق، رەڭگى سۈزۈك بەرەڭگىلەرنى تاللاش لازىم. يېرىلغان، شەكلى غەلىتە، ئۇچى ئۇچلۇق، بىخ كۆزى بولمىغان، كېسەل تەگكەن بەرەڭگىلەرنى قەتئىي ئۇرۇق قىلىشقا بولمايدۇ؛ (2) بەرەڭگىنى كېسىپ تېرىش: بەرەڭگىنى كېسىپ تېرىغاندا ھاۋا ئالمىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تىنچلىنىش ھالىتىنى بۇزۇپ تاشلاپ، بىخلىنىشى ۋە مايسا چىقىرىشنى تېزلىتىش بولىدۇ. بىراق كەسكەن ۋاقىتتا بەزى كېسەللىكلەر ئاسانلا پىچاق ئارقىلىق تارقىلىپ، كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، سورتلارنىڭ چېكىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا بەرەڭگىنى كېسىپ تېرىغاندا، پىچاقنى قەرەللىك دېزىنفېكسىيە قىلىش كېرەك؛ (3) پۈتۈن تېرىش. كىچىك بەرەڭگىنى كەسمەي پۈتۈن يېتى تېرىغاندا كېسەللىكنىڭ پىچاق ئارقىلىق تارقىلىشىدىن ساقلىنىش بولىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن پۈتۈن بەرەڭگىنى ھاياتى كۈچى ۋە قۇرغاقچىلىققا بەرداشلىق بېرىش كۈچى كۈچلۈك بولىدۇ. 25 گىرام ئەتراپىدىكى بەرەڭگىنى ئۇرۇقلۇق قىلغاندا، كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى تۆۋەن بولۇپ، مەھسۇلات ئاشۇرۇش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

5. بەرەڭگىنى بىخلىندۈرۈش: بەرەڭگىنى بىخلىندۈرۈپ تېرىغاندا پىششىق تېزلىتىپ، مەھسۇلاتنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. شۇنداقلا بىخلىندۈرۈش جەريانىدا سېسىغان بەرەڭگىلەرنى شاللىۋېتىپ، مايسىلارنىڭ تولۇق ئۆسۈشىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. بىخلىندۈرۈش ئۇسۇلى مۇنداق: نەم قۇمنى يەرگە يېيىتىپ ئۈستىگە بەرەڭگىنى يېيىتىش ھەم مۇشۇ ئۇسۇلدا 3 - 4 قەۋەت يېيىتىپ، تېمپېراتۇرىنى 20°C ئەتراپىدا ساقلىسا 8 - 10 كۈن ئەتراپىدا بەرەڭگە بىخلىنىدۇ. (03)

زىيانسىز كۆكتات ئۆستۈرۈش ۋە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار

روزىگۈل تۇداخۇن

(غۇلجا شەھىرى پەنجىم يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)

1. ئوغۇتلاش: (1) مەھەللىۋى ئوغۇتلارنى يېتەرلىك مىقداردا ھەم ياخشى چىرىتىپ بەرگەندە، كۆكتاتلارنىڭ بۇلغىنىشىنى ئازايتقىلى ۋە تۇپراق ئۈنۈمدارلىقىنى ياخشىلاپ، مەھسۇلات قىممىتىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ؛ (2) ئازوتلۇق ئوغۇتنى ئاز ئىشلىتىش لازىم، بولمىسا كۆكتاتلاردا ئاسانلا نىترات تۈزلىرىنىڭ جۇغلنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەگەر ئازوتلۇق ئوغۇتلارنى ئىشلىتىشكە توغرا كەلسە مایسا مەزگىلىدە ئىشلىتىش كېرەك. ئۇ كۆكتاتلارنىڭ بالدۇر يېتىلىشىگە ۋە تېز ئۆسۈشىگە پايدىلىق؛ (3) كۆكتات تۈرىگە قاراپ ئوغۇتلاش: ئادەتتە ئوخشاش بولمىغان كۆكتات تۈرلىرىدە نىترات تۈزلىرىنىڭ جۇغلنىش دەرىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ. مەسىلەن: سەۋزە، بەرەڭگە قاتارلىق تۈگۈنەك غوللۇق كۆكتاتلار بىلەن يوپۇر-مىقى ئىستېمال قىلىنىدىغان كۆكتاتلارغا نىترات ھالەتتىكى ئازوتلۇق ئوغۇت ئىشلەتمەسلىك كېرەك. پىدىگەن تۈرىدىكى كۆكتاتلار ۋە پىلەكلىك كۆكتاتلاردا نىترات تۈزلىرىنىڭ جۇغلنىشى بىرقەدەر يېنىك بولىدۇ، شۇڭا ئازوتلۇق ئوغۇتنى ئاز مىقداردا ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. ئەمما سېتىپ چىقىدىغان 30 كۈن بۇرۇن ئازوتلۇق ئوغۇت ئىشلىتىشنى چوقۇم توختىتىش كېرەك؛ (4) پەسىلگە قاراپ ئوغۇتلاش: ياز ۋە كۈز پەسىللىرىدە تېمپېراتۇرا يۇقىرى، كۆكتات تەركىبىدىكى نىترات كىسلاتا تۈزلىرىنىڭ پارچىلىنىشى تېز بولغاچقا، ئازوتلۇق ئوغۇتنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلەتسە بولىدۇ. قىش ۋە ئەتىياز مەزگىلىدە تېمپېراتۇرا تۆۋەن، كۈن نۇرى ئاجىز بولغاچقا، كۆكتاتلاردا نىترات تۈزلىرى ئاسان جۇغلنىپ قالىدۇ. شۇڭا ئازوتلۇق ئوغۇتنى ئاز مىقداردا ئىشلەتسە بولىدۇ.

غۇتنى بەرمەسلىك لازىم؛ (5) يوپۇرماق يۈزىدىن ئوغۇتلاش: تۈگۈنەك غۇل - لۇق كۆكتاتلار، پىلەكلىك كۆكتاتلار ۋە پىدىگەن تۈرىدىكى كۆكتاتلارنى يو - پۇرماق يۈزىدىن مىكرو ئېلېمېنتلىق ئوغۇت بىلەن ئوغۇتلىغاندا، مىقداردى - نى مۇۋاپىق تىزگىنلەش كېرەك. يوپۇرمىقى ئىستېمال قىلىنىدىغان كۆك - تاتلارنى يوپۇرماق يۈزىدىن ئوغۇتلاشقا قەتئىي بولمايدۇ؛ (6) ھورمۇن ئىش - لىتىشىنى چەكلەش لازىم، ئېتفون قاتارلىق ھورمۇنلار كۆكتات سۈپىتىنى تۆۋەنلىتىپلا قالماستىن، كىشىلەرنىڭ ساغلاملىقىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ، شۇڭا قەتئىي ئىشلەتمەسلىك لازىم.

2. كېسەللىك، زىيانداش ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يو - قىتىش: دېھقانچىلىق تەدبىرلىرى ۋە بىيولوگىيەلىك ئالدىنى ئېلىش تەد - بىرلىرىنى قوللىنىش لازىم. دېھقانچىلىق تەدبىرلىرى ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىشتا، نۆۋەتلەشتۈرۈپ تېرىش، يەرنى چوڭقۇر ئاغدۇرۇش، مۇۋاپىق ۋاقىتتا تېرىش، مۇۋاپىق ۋاقىتتا يىغىش، توشۇش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىش كېرەك.

فىزىكىلىق ئۇسۇلدا ئالدىنى ئېلىشتا، رەڭلىك تاختا ئېسىش، ھاشارلار جەلپ قىلىش چىرىغى ئورنىتىش، ھاشارلار توسۇش تورى ئورنىتىش قا - تارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىش لازىم. بىيولوگىيەلىك دورىلار ئارقىلىق كېسەللىك، زىيانداش ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا دوشامپىسۇ (多杀霉素)، ئابامىكتىن (阿维菌素)، BT ھاشارلار يوقىتىش دورىسى قا - تارلىقلارنى ئىشلىتىپ زىيانداش ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئالغىلى، دېھقانچى - لىقتا ئىشلىتىلىدىغان سىتېرىپتومىتسىن (农用链霉素) ئىشلىتىش ئار - قىلىق كۆكتاتلاردىكى چىرىش كېسىلى، قىرۋىسىمان پاختىلىشىش كى - سىلىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. (02)

پارنىكتا شوخلا ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى

نۇسرەت خوجەھمەت

(تارباغاتاي ۋىلايەتلىك كەسپىي تېخنىكا مەكتىپىدىن)

1. سورت تاللاش: پارنىكتا ئەتىيازلىق ئېڭىزدا ئۆستۈرۈشكە «زاۋۇڭ»، «زاۋكۇي» قاتارلىق چىلگە سورتلارنى تاللىسا بولىدۇ.

2. مايسا يېتىشتۈرۈش: ئەتىيازلىق ئېڭىزدا ئۆستۈرۈلىدىغان شوخلا مايسىسى سىرتقى مۇھىت تېمپېراتۇرىسى تۆۋەن ۋاقىتتا يېتىشتۈرۈلىدۇ. مايسا يېتىشتۈرۈش ۋاقتىدا ھاۋا تېمپېراتۇرىسى كۈندۈزى $18^{\circ}\text{C} - 22^{\circ}\text{C}$ تا، كېچىسى $10^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$ تا، ھاۋانىڭ نىسپىي نەملىكى 80% تە كونترول قىلىنىدۇ. مايسا 3 - 4 تال يوپۇرماق چىقارغاندا مايسىزارلىقنىڭ نەملىك ۋە تېمپېراتۇرىسىنى قاتتىق كونترول قىلىپ، مايسىنىڭ بويىغا زورلاپ ئۆسۈپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئەگەر مايسا بويىغا زورلاپ ئۆسكەن بولسا پاكارىلىتىپ تىمەنلىتىش دورىسى (矮壮素) دىن 300 - 400 مىللىلىتىرغا بىر كىلوگرام سۇ ئارىلاشتۇرۇپ، ھەر بىر تۈپ تۈۋىگە 30 - 40 مىللىلىتىردىن قويۇش كېرەك. مايسا كۆچۈرۈپ تىكىش - تىن 7 - 10 كۈن بۇرۇن ھاۋا ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مايسىنى سىرت - قى مۇھىتقا ماسلىشالايدىغان دەرىجىگە يەتكۈزۈش لازىم.

3. يەرگە ئىشلەش: ھەر مو پارنىك يېرىنى 5000 - 8000 كىلو - گرام تولۇق چىرىگەن ئېغىل قىغى بىلەن ئوغۇتلاپ، چوڭقۇر ئاغدۇرۇپ تەكشۈرۈش لازىم. ئاندىن كېيىن قىر ئارىلىقىنى 80 سانتىمېتىر، قىر ئېگىزلىكىنى 30 سانتىمېتىر، قىر كەڭلىكىنى 30 سانتىمېتىر ئەتراپىدا قىلىپ قىر ئېلىش كېرەك. مايسا كۆچۈرۈپ تىكىشتىن ئىلگىرى ھەرمو پارنىك يېرىنى 300 - 500 گرام گۈڭگۈرت پاراشوكى بىلەن ئىسلاپ دې - زىنپېكسىيە قىلىش لازىم.

4. مايسا كۆچۈرۈپ تىكىش: ① ئەتىيازلىق ئېڭىزغا 2 - ئاينىڭ ئاخىرىدىن 3 - ئاينىڭ باشلىرىغىچە، مايسا يېشى 60 - 70 كۈنلۈك بولسا -

لۇپ، دەسلەپكى غۇنچىسى كۆرۈنگەندە كۆچۈرۈپ تىكىلىدۇ. تۈپ ئارىلىقى 25 - 30 سانتىمېتىر، قۇر ئارىلىقى 50 - 60 سانتىمېتىر قىلىنىدۇ؛ ② قىشلىق ئېڭىزغا 8 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن ئاخىرلىرىغىچە مايسا يېشى 45 كۈنلۈك بولغاندا كۆچۈرۈپ تىكىلىدۇ. تۈپ ئارىلىقى 30 - 35 سانتىمېتىر، قۇر ئارىلىقى 50 - 60 سانتىمېتىر قىلىنىدۇ. مايسا كۆچۈرۈپ تىككەندىن كېيىن دەرھال سۇغىرىلىدۇ.

5. پەرۋىشى: مايسا كۆچۈرۈپ تىككەندىن كېيىن، تولۇقلاپ تىكىلىدۇ. غاڭلىرىنى ۋاقتىدا تىكش لازىم. پارنىك تېمپېراتۇرىسىنى يۇقىرىلىتىپ كۈندۈزى 22°C - 24°C ، كېچىسى 20°C - 22°C تا كونترول قىلىپ، مايسىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى تېزلىتىش لازىم. مايسا كۆچۈرۈپ تىكىپ 15 - 20 كۈنگىچە ئامال بار سۇغارماي، تۇپرىقنى چاڭلاپ يۇمشىتىپ، يىلتىز تارتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن 1 - سۈيىنى بېرىشكە بىرلەشتۈرۈپ، ھەر مو يەرنى 200 كىلوگرام كۈنجۈرە ياكى 30 كىلوگرام بىرىكمە ئوغۇت (复合肥) ياكى يېتەرلىك مىقداردا گەندە - سۈيۈك ئارىلاشمىسى بىلەن ئوغۇتلاش كېرەك. دەسلەپكى مېۋىسى يوغىدا - ئاشقا باشلىغان مەزگىلدە پارنىك تېمپېراتۇرىسىنى 20°C تىن يۇقىرىلىدۇ. تىۋەتمەسلىك لازىم. ئادەتتە قىشلىق ئېڭىزدا ئۆستۈرۈلگەن شوخلا دەسلەپكى مېۋىسى يوغىدا ئاتقاندا ۋە ئۈزۈۋالغاندىن كېيىن بىر قېتىمدىن سۇ - غىرىلىدۇ. ئارىلىقتا تۇپراق نەملىكى قۇرغاق بولسا بىر قېتىم سۇغىرىلىدۇ. ئەتىيازلىق ئېڭىزدا ئۆستۈرۈلگەن شوخلا دەسلەپكى مېۋىسى يوغىدا - قا باشلىغاندا بىر قېتىم، دەسلەپكى مېۋىسىنى ئۈزۈۋالغاندا بىر قېتىم، 2 - ساپاق مېۋىسى ئاقىرىشقا باشلىغاندا بىر قېتىم سۇغۇرۇلىدۇ. 1 - سۇ - يى ئاز، 2 - سۈيى ئوتتۇراھال، 3 - سۈيى كۆپرەك بېرىلىدۇ. پۇتاشتاشالاڭراق تىكىلگەنلىرى قوش غوللۇق پۈتلىدۇ، يەنى دەسلەپكى گۈل رېتى ئاستىدىكى بىر تال يان شېخى قالدۇرۇلۇپ، قالغان شاخلىرى پۈتۈنلەي ئۈ -

زۈۋىتىلىدۇ. زىچراق تىكىلگەنلىرى تاق غوللۇق پۈتىلىدۇ. يان شاخلىرى پۈتۈنلەي ئۈزۈۋېتىلىپ بىر تال غوللا مېۋىلىتىلىدۇ ياكى دەسلەپكى گۈل رېتى ئاستىدىكى شاخنى قالدۇرۇپ، قالغان يان شاخلىرىنى ئۈزۈۋېتىپ، قالدۇرۇلغان يان شاخ مېۋىلىگەندىن كېيىن ئۈچى ئۈزۈۋېتىلىدۇ.

6. **چېچەك، مېۋە تۆكۈلۈشىنى ئازايتىش:** ئەتىيازدا ئۆستۈرۈلگەن شوخلىنىڭ دەسلەپكى گۈل رېتىنىڭ مېۋىلىشىنى باھار بايرىمىدىن كېيىن يورۇقلۇق كۈچىيىشىگە باشلىغان مەزگىلگە توغرىلاش كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا چېچەك، مېۋىلىرىنىڭ تۆكۈلۈشىنى ئازايتىش ئۈچۈن، 15 - 20 مىللىگىرام 24-D (滴) 24-غا بىر كىلوگىرام سۇ ئارىلاشتۇرۇپ، قاچىغا قويۇۋېلىپ، ئېچىلغان ياكى يېرىم ئېچىلغان گۈلنى 2 - 3 كۈندە بىر قېتىم چىلاش كېرەك. ئۇنداق قىلماي 20 - 40 مىللىگىرام توماتوتون (番茄灵) غا بىر مىللىگىرام سۇ ئارىلاشتۇرۇپ پۈركۈسمۇ بولىدۇ.

7. **كېسەللىك، ھاسىرات زىيانداشلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش:** ① ھالقىسىمان داغ كېسىلى (ئالترنارىبوز كېسىلى) ئاساسەن يوپۇرماققا زىيان سالىدۇ. دەسلەپكى مەزگىلدە يوپۇرماقتا قوڭۇر داغ پەيدا بولىدۇ، ئاخىرقى مەزگىلدە داغ ھالقىسىمان داغقا ئايلىنىپ، يۈزىنى بىر قەد ۋەت قارا پاختىلاشقان قەۋەت قاپلاپ كېتىدۇ. ئالدىنى ئېلىشتا ھاۋا ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىش ۋە فوسفورلۇق ئوغۇتلار بىلەن كۆپرەك ئوغۇتلاش كېرەك. كېسەللىك پەيدا بولۇشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە 70% لىك زىنىپ (代森锌) نى 500 ھەسسە سۈيۈلدۈرۈپ چېچىش لازىم؛ ② كۆك پىتىنى يوقىتىشتا بىر ئۈلۈش ئازوت، بىر ئۈلۈش سۈيۈن پاراشوكى، 100 ئۈلۈش سۈنى ئارىلاشتۇرۇپ چېچىش لازىم. كۆك پىت بەك كۆپ پەيدا بولغان بولسا دېۋىلەن روگور (乐果) نى ئارىلاشتۇرۇپ، 1500 ھەسسە سۈيۈلدۈرۈپ پۈركۈش كېرەك.

8. **يىغىۋېلىش:** تولۇق يوغىناپ ئاقارغان مېۋىلەرنى ئۈزۈۋېلىپ، 4000PPm-2000PPm لىق ئېتېفون (乙烯利) ئېرىتمىسىگە چىلاپ، 22℃ لۇق شارائىتتا قويسا، تەبئىي قىزارغانغا قارىغاندا 5 - 7 كۈن بالا-دۇر قىزىرىدۇ. (03)

پارنىكتا كۈدە ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

ھەزمىگۈل مەمەت ھەمراگۈل ئابدۇرېھىم

(توقسۇن ناھىيە غولبويى يېزا دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)

1. سورت تاللاش: پارنىكتا ئۆستۈرۈشكە جىۋباۋ (菲宝)، دوكاڭفۇ - 6 (多抗富 6 号)، قىزىل بىلەك كۈدە (报红韭菜)، تەكشى كۈدە - 4 (平韭 4 号) يەرلىك كۈدە قاتارلىق سورتلار مۇۋاپىق كېلىدۇ. بۇ سورتلار - دىن بەزىلىرى قىشلىق تىنچلىنىش مەزگىلىنى بېشىدىن كەچۈرىدۇ. بەزى - لىرىنىڭ تىنچلىنىش مەزگىلى يوق بولۇپ، مەسىلەن، دوكاڭفۇ - 6 قاتار - لىقلار قىشتا پارنىكتا ئۆستۈرۈشكە ماس كېلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە دوكاڭفۇ - 6 پارنىققا سولياۋ يوپۇقنى بالدۇر يېيىشنى تەلەپ قىلىدۇ. يەرلىك كۈ - دىنىڭ تىنچلىنىش مەزگىلى بولغاچقا، پارنىققا سولياۋ يوپۇقنى كېچىكىپ ياپسا بولىدۇ. شۇڭا پارنىكتا ئۆستۈرۈشتە ھەرقايسى سورتلارنىڭ ئالاھىدە - لىكىگە قارىتا ئىش كۆرۈش كېرەك. قىشلىق ئۆستۈرۈش ئۈچۈن، تەي - يارلانغان كۈدە ئەڭ كېچىككەندىمۇ چوقۇم شۇ يىلى ئەتىيازدا بىۋاسىتە تې - رىغان ياكى يازنىڭ ئاخىرى (8 - ئايدا) كۆچۈرۈپ تىكلەنگەن بولۇشى كې - رەك. كۈزدە تېرىلغان كۈدىنى شۇ يىلى قىشتا ئىشلەپچىقىرىشقا بولمايدۇ.

2. ئوغۇتلاش: كۈدىنى پارنىكتا قىشلىق ئۆستۈرۈشتە يازلىق ئۆستۈ - رۈلگەن كۈدىنى يەر يۈزىگىچە ئورۇغاندىن كېيىن، تولۇق چىرىگەن قوتان قىغىنى كۈدە ئۈستىگە تەكشى يېيىتىپ، دۆڭ قۇمنى قىغ ئۈستىگە تەكشى چېچىپ سۇغارغاندا، قىغنىڭ سۇدا لەيلەپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كې - رەك. بۇلارغا بىرلەشتۈرۈپ، ھەرمۇغا ئىككى ئاممونىيلىق فوسفات (磷酸二铵) تىن 50 كىلوگرام ياكى بىرىكمە ئوغۇت (复合肥) تىن 40 كىلوگرام بې - رىپ سۇغىرىش كېرەك. قوشۇمچە ئوغۇتلاشتا كۈدىنىڭ 2 - سۈيىگە بىرلەش - تۈرۈپ ئورپا (尿素) بەش كىلوگرام ئەتراپىدا بېرىش لازىم.

3. سۇغارغاندىن كېيىنكى پەرۋىشى: پارنىكتا كۈدە ئۆستۈرۈشتە سۇغا بولغان تەلپى ئاز بولىدۇ. بىر ئورۇم ئۈچۈن ئىككى قېتىم سۇغار - سىلا بولىدۇ. ئادەتتە كۈدىنىڭ تۇنجى سۈيىنى بېرىپ 30 كۈن ئەتراپىدا ئورۇپ بازارغا سالسا بولىدۇ. يازلىق كۈدىنى ئورۇپ تاشلىۋەتكەندىن كې -

مېۋىلىك دەرەخلەرنى قوشۇمچە ئوغۇتلاشتىكى تېخنىكىلىق تەدبىرلەر

چىمەنگۈل ساقاجىيوف

(قەشقەر شەھەرلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش مەركىزىدىن)

ماھىرە ئابلىز

(قەشقەر يېزا ئىگىلىك تېخنىكومىدىن)

ئابدۇرېھىمان مۇتەللىپ

(قەشقەر شەھىرى بەشكېرەم يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)

1. ئورپا، كالىي دېھدرو فوسفات، كالىسىي سوپىر فوسفات، كالىي سۇلفات، مىكرو مىقدارلىق ئوغۇتلاردىن بورىكس، سىنك سۇلفات، مانگان سۇلفات قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش لازىم.

2. ھەر خىل مېۋىلىك دەرەخلەرگە يوپۇرماق ئوغۇتى پۈركۈگەندە ئورپا - نى $0.3\% - 0.5\%$ ، كالىي دى ھىدرو فوسفاتنى $0.2\% - 0.5\%$ ، كالىسىي سوپىر فوسفاتنى $0.5\% \sim 1\%$ ، ئاممونىي فوسفاتنى $0.3\% \sim 0.5\%$ ، كالىي سۇلفاتنى $0.2\% \sim 0.4\%$ ، سىنك سۇلفاتنى $0.1\% \sim 0.4\%$ ، تۆمۈر II سۇلفاتنى $0.1\% \sim 0.4\%$ ، مانگان سۇلفاتنى $0.05\% \sim 0.1\%$ قويۇقلۇقتا تەڭشەپ ئىشلىتىش لازىم.

3. لاپاسنى ياپقان ۋاقىتتا چۈشتىن بۇرۇن سائەت 10 دىن بۇرۇن، چۈش -

يىن، دەرھال قىغ قاتارلىقلارنى تۆكۈپ سۇغىرىش كېرەك. تۇپراق يۈزىنى دەسسەگۈدەك بولغاندا (كۈدە يەر يۈزىگە كۆتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن) تىرنا ياكى پازا بىلەن تۇپراق يۈزىنى تىرىلاپ، ئۈستىدىكى شاخ - شۇمبا، لاۋا - لۈت - قىلارنى تازىلاپ، تۇپراقنى يۇمشىتىپ، كۈدىنىڭ ئاستىغا قاراپ ئۆسۈش - نىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ھەر قېتىم ئورۇپ بولغاندىن كېيىن، يېتەر - لىك ئوغۇتلاپ سۇغىرىش لازىم.

4. ھاۋا ئالماشتۇرۇش: پارنىكتا كۈدە ئۆستۈرۈشتە، 1 - ئاينىڭ 1 - خىرىدىن 2 - ئاينىڭ بېشىغىچە ھاۋانىڭ ئىللىشىغا ئەگىشىپ، ھاۋا ئال - ماشتۇرۇشنى تەدرىجىي كۈچەيتىش كېرەك. ئادەتتە پارنىك يوتقىنىنى ھاۋا ئوچۇق كۈنلىرى ئەتكەن ئېچىپ، كەچ يېپىش، بوران چىققان كۈنلىرى يوتقانىنى يېرىم يېپىپ بوراندىن مۇداپىئەلىنىش كېرەك. (03)

تىن كېيىن سائەت تۆت كىچە پۈركۈش، لاپاس يېپىلمايدىغان ۋاقىتتا ئە -
تىگەن سائەت سەككىزدىن چۈشتىن كېيىن ئالتىگىچە پۈركۈش لازىم.

4. چېچەكلەشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلى، گۈل تۆكۈلۈش مەزگىلى، مېۋە -
لەش مەزگىلىدە پۈركۈلۈشى، ھەر قېتىملىق پۈركۈش ئارىلىقى 10 كۈن
ئەتراپىدا بولۇشى لازىم. مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ چېچەكلەش مەزگىلىدە
بورغا ئېھتىياجى يۇقىرى بولغاچقا، چېچەكلەش مەزگىلىدە بور پۈركۈلسە
ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ. مولىدىن ئوغۇتى چېچەكلەشتىن بۇرۇن، سىنىڭ
ئوغۇتى چېچەكلەشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە پۈركۈلۈشى لازىم. مېۋىسى
يوغىناش مەزگىلىدە 0.2% لىك كالىي ھىدرو فوسفات ئېرىتمىسى پۈر -
كۈلگەندە رەڭلىنىشىنى تېزلىتىدۇ، كۈزدە مېۋىسىنى يىغىۋالغاندىن كې -
يىن 3% - 5% لىك ئوريا ئېرىتمىسىنى پۈركۈش كېرەك. ئۆسۈپ يېتىد -
لىشىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە پۈركۈش قويۇقلۇقى مۇۋاپىق، تۆۋەن، ئوت -
تۇرا، كېيىنكى مەزگىلىدە يۇقىرىراق بولسا ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ.

5. ھاۋا تېمپېراتۇرىسى 18°C - 20°C بولغاندا يوپۇرماقتىكى ھاۋا
تۆشۈكچىلىرى تولۇق ئېچىلىدىغان بولۇپ، بۇ ۋاقىتتا ئوغۇت پۈركۈگەندە
ئېلىمېنتلارنىڭ سۈمۈرۈلۈشى ۋە توشۇلۇشقا پايدىلىق بولىدۇ.

6. ھاۋانىڭ نىسپىي نەملىكى 50% - 80% بولغاندا ئوغۇت پۈركۈسە
ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ.

7. ئادەتتە مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ يوپۇرمىقى سارغىيىپ ئۆسۈشى ئاجىز
بولغاندا، ئازوتلۇق ئوغۇتنى ئاساس قىلىپ، فوسفور، كالىيلىق ئوغۇتنى
ماسلاشتۇرۇپ بېرىش لازىم. ئەگەر يوپۇرمىقى چوڭ، بوغۇم ئارىلىقلىرى
زىيادە ئۇزۇن بولغاندا ئازوت يېتەرلىك بولۇپ، فوسفور، كالىيلىق ئوغۇت -
نى ئاساس قىلىپ پۈركۈش كېرەك.

8. مېۋىلىك دەرەخلەرگە ئوغۇت پۈركۈگەندە تولۇق، تەكشى پۈركۈش،
بولۇپمۇ يوپۇرماقنىڭ كەينىگە تەكشى پۈركۈش لازىم. يوپۇرماق ئوغۇتىنىڭ
قويۇقلۇقى نىسبەتەن تۆۋەن، ئىشلىتىش مىقدارى ئاز بولغاچقا، ئارقىمۇ ئارقا
2~3 قېتىم، ھەر 10~15 كۈندە بىر قېتىم پۈركۈش لازىم. ئازوت، كالىي -

خىمىيەۋى ئوغۇتلارنى پەرقلىقلىرىنىڭ ئاددىي ئۇسۇللىرى

ياقۇپ ئىمىر ئامىنە ئۆمەر

(باي ناھىيەلىك يېزا ئېنېرگىيە مۇھىت كۆزىتىش پونكىتىدىن)

1. ئوريا (尿素) نى پەرقلىقلىرىنى ئۇسۇلى: (1) دانچىلارنىڭ شەكلىگە قاراش. ئوريا دانچىسىمان بولۇپ، چوڭ دانچىلىق ۋە كىچىك دانچىلىق دەپ ئىككى خىلغا ئايرىلىدۇ؛ (2) رەڭگىنى كۆزىتىش. ئوريا دانچىلىرى ئادەتتە رەڭسىز، سۈزۈك ھالەتتە بولۇپ، تەركىبىدە ئارىلاشما بارلىرى سۇس سېرىق رەڭدە بولىدۇ؛ (3) پۇراپ بېقىش. ئوريانىڭ ئۆزىدە ھېچقانداق پۇراق بولمايدۇ؛ (4) ئېرىش ئەھۋالىنى كۆزىتىش. ئوريا سۇدا ناھايىتى ئاسان ئېرىيدۇ، ئېرىگەندە سىرتتىن ئىسسىقلىق سۈمۈرىدۇ. ئېرىتمە قاچىلانغان ئەينەك ئىستاكىن ياكى چىنىگە قولىنى تەگكۈزسە سوغۇق ياكى سالقىن تۇيۇلىدۇ، سۇدىكى ئېرىتمىسىدە نېتراللىق كۆرۈلىدۇ؛ (5) نەملىكتىن يىمىرىلىش ئەھۋالىنى كۆزىتىش. ئوريا ناھايىتى ئاسانلا نەم.

نىڭ يۆتكىلىشچانلىقى كۈچلۈك بولۇپ بىر قېتىم، فوسفور ئوغۇتى ئىككى قېتىم، سىنك، مىس، بور، كالتسىي قاتارلىقلارنىڭ يۆتكىلىشى ئىنتايىن تۆۋەن بولۇپ ئارقا - ئارقىدىن 2~3 قېتىم پۈركۈش لازىم.

9. تەڭشەلگەن 60~70 كىلوگرام ئوغۇت ئېرىتمىسىگە 30~40 گرام نېترال خۇسۇسىيەتلىك سوپۇن پاراشوكى قوشۇپ پۈركۈسە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ.

10. ئوريا بىلەن كالىي دېھىدرو فوسفاتنى ۋە باشقا ئارىلاشتۇرۇشقا بولىدىغان دېھقانچىلىق دورىلىرىنى قوشۇپ پۈركۈگەندە تەننەرخى ۋە ۋاقتىنى تېجىگىلى بولىدۇ.

11. يۇمران يوپۇرماقلارغا تۆۋەنرەك قويۇقلۇقتا، يېتىلگەن يوپۇرماقلارغا يۇقىرىراق قويۇقلۇقتا، ھۆل - يېغىن مىقدارى كۆپ رايونلاردا يۇقىرىراق، ئەكسىچە بولغاندا تۆۋەنرەك قويۇقلۇقتا تەڭشەپ ئىشلىتىش لازىم. (05)

لىك سۈمۈرىدۇ، سىرتتا 12 سائەتتىن ئارتۇق قويسا ئوريا دانچىلىرى سۇغا ئايلىنىپ كېتىدۇ؛ (6) ياپىلاق تۆمۈردە كۆيدۈرۈش. تۆمۈر پارچىسىنى قىزدۇرغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۈستىگە ئازراق ئوريا دانچىلىرىنى قويسا، ئوغۇت ئېرىگەچ ئاق ئىس چىقىرىدۇ ھەم بۇرۇننى ئېچىشتۈرىدىغان ئاممىدە ياكى پۇرىقى چىقىدۇ، ئېرىپ بولغاندىن كېيىن تۆمۈر ئۈستىدە ھېچنەمە قالمىدۇ.

2. كالىي سۇلفات (硫酸钾) نى پەرقلىقلىتىدۇرۇش ئۇسۇلى: (1) كا-لىي سۇلفات كىرىستال ھالەتتە بولىدۇ؛ (2) كالىي سۇلفات ئادەتتە ئاق رەڭلىك بولىدۇ، سارغۇچ كۈل رەڭ، تۇتۇق يېشىل ياكى سۇس قوڭۇر رەڭ-لىكلىرىمۇ بار؛ (3) كالىي سۇلفات ئاساسىي جەھەتتىن نەملىك سۈمۈرمەيدۇ. ھاۋانىڭ نەملىك دەرىجىسى %70 تىن يۇقىرى بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇ يەنىلا ئەسلىي ھالىتىنى ساقلاپ تۇرىدۇ. (بۇ كالىي سۇلفاتنى كالىي خى-لورىدىن پەرقلىقلىتىدۇرۇشنىڭ ئۇسۇلىدۇر)؛ (4) كالىي سۇلفاتنىڭ سۇدا ئې-رىشچانلىقى كۆزىتىلىدۇ. كالىي سۇلفات سۇدا ئېرىيدۇ، بىراق ئېرىش سۈرئىتى كالىي خىلورىدىن ئاستا، ئېرىش مىقدارىمۇ كالىي خىلورىدىن ئاز (بۇمۇ كالىي خىلورى بىلەن كالىي سۇلفاتنى پەرقلىقلىتىدۇرۇشنىڭ ئۇسۇللىرى-دىن بىرى) بولىدۇ؛ (5) قىزدۇرۇلغان تۆمۈر پارچىسىغا ئازراق كالىي سۇل-فاتنى قويۇپ كۆيدۈرگەندە كالىي ئىيونىدا بولىدىغان بىنەپشە رەڭلىك يال-قۇن چىقىدۇ؛ (6) pH قىممىتىنى ئۆلچەش. pH سىناق قەغىزىنى كالىي سۇلفات ئېرىتمىسىگە سالغاندا ئەلا سۈپەتلىكى بىلەن 1 - دەرىجىلىكى كىسلاتالىق خۇسۇسىيەتتە بولۇپ، سىناق قەغىزى قىزىل رەڭگە ئۆزگىرىدۇ؛ لايىقەتلىكى ئىشقارلىق خۇسۇسىيەتتە بولۇپ، pH سىناق قەغىزى كۆك رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. (05)

كېۋەزنى يىلتىز سىرتىدىن قوشۇمچە ئوغۇتلاشتا دىققەت قىلىدىغان مۇھىم نۇقتىلار

روشنەنگۈل ياسىن زەينۇرە ئىسمائىل
(كورلا شەھىرى قارايۇلغۇن يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)
كېۋەزنى يىلتىز سىرتىدىن قوشۇمچە ئوغۇتلاپ، ئوغۇتنىڭ مەھسۇلات
ئاشۇرۇش رولىدىن تولۇق پايدىلانغاندا، مول ھوسۇلنى قولغا كەلتۈرگىلى
بولىدۇ. كېۋەزنى يىلتىز سىرتىدىن قوشۇمچە ئوغۇتلاشتا تۆۋەندىكى نۇق-
تىلارغا دىققەت قىلىش لازىم.

1. ئوغۇتنىڭ ئىشلىتىلىش ۋاقتىنى توغرا ئىگىلەش لازىم. كېۋەز ئادەت-
تە مايسا مەزگىلى، غۇنچىلاش مەزگىلى ۋە غوزىلاش مەزگىللىرىدە قوشۇم-
چە ئوغۇتلىنىدۇ. تەۋەيىمىزدە كېۋەزنى مايسا مەزگىلىدە قوشۇمچە ئو-
غۇتلاشتا، كېۋەز ئۈچ تال ھەقىقىي يوپۇرماق چىقىرىشتىن باشلاپ غۇن-
چىلاش مەزگىلىگىچە، يەنى 5 - ئاينىڭ 10 - كۈنىدىن 6 - ئاينىڭ 10 -
كۈنىگىچە 1 - 2 قېتىم قوشۇمچە ئوغۇتلىنىدۇ. غۇنچىلاش مەزگىلىدە قو-
شۇمچە ئوغۇتلاشتا كېۋەز غۇنچىلىغاندىن تارتىپ چېچەكلىگىچە، يەنى 6 -
ئاينىڭ بېشىدىن 6 - ئاينىڭ 20 - كۈنلىرىگىچە ئوغۇتلاش كېرەك. غو-
زىلاش مەزگىلىدە قوشۇمچە ئوغۇتلاشتا كېۋەز 1 - 2 دانە غوزىلىغاندىن
باشلاپ، يەنى 7 - ئاينىڭ 10 - كۈنىدىن 8 - ئاينىڭ 15 - كۈنىگىچە
ئىككى قېتىم قوشۇمچە ئوغۇتلاش كېرەك. بۇلاردىن باشقا قوشۇمچە ئو-
غۇتلاشتا يامغۇر، تېمپېراتۇرا، شامال ۋە ھاۋا نەملىكى قاتارلىقلارغىمۇ
دىققەت قىلىش لازىم. كېۋەز يىلتىز سىرتىدىن قوشۇمچە ئوغۇتلىنىپ
4 - 5 سائەت ئىچىدە ئوغۇت ئېرىتمىسىنى ئۆزىگە تولۇق قوبۇل قىد-

لىدۇ، ئەگەر مۇشۇ ۋاقىت ئىچىدە يامغۇر يېغىپ قالسا، يامغۇر توختىد. خاندېن كېيىن يەنە بىر قېتىم ئوغۇتلاش لازىم. تېمپېراتۇرا بەك يۇقىرى ۋاقىتتا يىلتىز سىرتىدىن قوشۇمچە ئوغۇتلىماسلىق كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا كېۋەزنىڭ ھاۋا تۆشۈكچىلىرى ئېتىلىپ قېلىپ، ئوغۇتنى تولۇق سۈمۈرەلمەيدۇ، شۇنداقلا پارلىنىش كۆپ بولىدۇ. كۈچلۈك شامال چىققان ۋاقىتتىمۇ قوشۇمچە ئوغۇتلاشقا بولمايدۇ.

ھاۋانىڭ نەملىكى يۇقىرى، يوپۇرماقلاردا سۇ تامچىلىرى بولغان ياكى شەبنەم قۇرۇمىغان ۋاقىتتىمۇ قوشۇمچە ئوغۇتلىماسلىق لازىم، ئۇنداق بولمىغاندا ئوغۇتلار يوپۇرماقتىن سىرغىپ چۈشۈپ كېتىپ ئۈنۈمى بولمايدۇ.

2. ئوغۇتنىڭ ئىشلىتىلىش مىقدارى ۋە ئىشلىتىلىش قويۇقلۇقىنى توغرا ئىگىلەش كېرەك. ئوغۇتنىڭ ئىشلىتىلىش مىقدارىنى كېۋەز تۈپىنىڭ چوڭ-يېشىغا ئەگىشىپ ئاشۇرۇش لازىم، مەسىلەن: كېۋەز مايسا مەزگىلىدە 100 - 150 گرام كالىي دېھىدرو فوسفات (磷酸二氢钾)، 200 گرام ئورپا (尿素) 35 - 40 كىلوگرام سۇغا ئارىلاشتۇرۇپ پۈركۈلىدۇ. غۇنچىلاش مەزگىلىدە بولسا 150 - 200 گرام كالىي دېھىدرو فوسفات، 300 - 400 گرام ئورپا 40 - 45 كىلوگرام سۇغا ئارىلاشتۇرۇپ پۈركۈلىدۇ. غوزىلاش مەزگىلىدە قوشۇمچە ئوغۇتلاشتا كېۋەزنىڭ ئۈچى ئۈزۈلۈپ بىر ھەپتىدىن كېيىن، ھەر مو يەرگە كالىي دېھىدرو فوسفاتتىن 200 - 250 گرام، ئورپا - 400 - 450 گرام، بوغۇم قىسقارتىش دورىسى (缩节胺) دىن 4 - 5 گرامنى 45 - 50 كىلوگرام سۇغا ئارىلاشتۇرۇپ تەكشى پۈركۈش لازىم، ئورپانىڭ قويۇقلۇقى 1% دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. (05)

زىرائەتلەردىكى ئېلېمېنت يېتىشمەسلىك ئالامەتلىرى ۋە تولۇقلاش ئۇسۇللىرى

دىلخۇمار تاشمەمەت

(غۇلجا شەھىرى باغۋەنچىلىك پونكىتىدىن)

1. ئازوت كەملىك: زىرائەتتە ئازوت كەم بولسا، تۈپى تەرەققىي قىلالايدۇ، يوپۇرماق ئاچ يېشىل ھەم سېرىققا ئۆزگىرىدۇ، باشقى قىسقا، كىچىك، دان سانى ئاز ھەم پۈچەك بولۇپ قالىدۇ. كېيىنكى مەزگىلدە زىرائەتنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى يوپۇرماقلار سارغىيىپ كېتىدۇ، ئاندىن ئاستا-ئاستا ئۈستىدىكى يوپۇرماقلارغا كېڭىيىدۇ. بۇ چاغدا يىلتىزدىن ھەم يوپۇرماق سىرتىدىن ئورپا (尿素) ۋە ئىككى ئاممونىيلىق فوسفات (磷酸二铵) بىلەن ئوغۇتلىسا بولىدۇ.

2. فوسفور كەملىك: زىرائەت تېنىدە فوسفور كەم بولسا، زىرائەتنىڭ ئۆسۈشى ئاستىلايدۇ، تۈپى پاكار، شاخلىنىشى ئاجىز بولىدۇ. فوسفور كەم بولغان دەسلەپكى مەزگىلدە يوپۇرماق سۇس يېشىلغا ئۆزگىرىدۇ، كېيىنكى سەللىككە چىداملىقى ئاجىزلىشىدۇ. بۇ چاغدا كالىي دېھىدرو فوسفات (磷酸二氢钾) نى يىلتىز سىرتىدىن قوشۇمچە ئوغۇت قىلىپ بەرسە بولىدۇ. يوپۇرماق سىرتىدىن پۈركۈپ ئوغۇتلىسىمۇ بولىدۇ.

3. كالىي كەملىك: زىرائەتتە كالىي يېتىشمەس زىرائەتنىڭ ئۆسۈشى ئاستىلايدۇ، پاكارلايدۇ، ئادەتتە كالىي كەملىك ئىپادىسى ئادەتتە زىرائەتنىڭ كېيىنكى مەزگىلدە ئىپادىلىنىدۇ. كالىي يېتىشمىگەندە زىرائەتنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى يوپۇرماقلار يېشىللىقىنى يوقىتىپ قۇرۇيدۇ، باشقا يوپۇرماقلار پارقراقلىقىنى يوقىتىپ، ئاچ يېشىل رەڭگە كىرىدۇ. قوش پەللىلىك ئۆسۈملۈكلەرنىڭ يوپۇرماق تومۇرى ئارىسىدا يېشىللىق يوقىلىدۇ، يوپۇرماق قىزىنى بويلاپ سارغىيىدۇ. قارامتۇل داغ ھەم سىزىقلار پەيدا بولىدۇ، بارغانسېرى يوپۇرماق تومۇرى ئارىسىغا كېڭىيىدۇ. تاق پەللىلىك ئۆسۈملۈكلەردە يوپۇرماق ئۇچى ئاۋۋال سارغىيىدۇ. ئاندىن بارا-بارا يوپۇرماق تۆكۈ-

لىدۇ. بۇ چاغدا كالىي سۇلفات (硫酸钾) نى يىلتىز سىرتىدىن چۈنەكلەپ ياكى ئۇۋىلاپ بەرسە ياكى يوپۇرماقتىن پۈركۈپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

4. كالتىسى كەملىك: زىرائەتكە كالتىسى يېتىشمەسە ئالدى بىلەن يۇمران ئەزالار تەسىرگە ئۇچرايدۇ، ئۆسۈش نۇقتىسى بۇزىلىدۇ، يوپۇرماق مەركىزىدىن تارتىپ قۇرۇشقا باشلايدۇ. بەزى زىرائەتلەردە كالتىسى كەم بولسا يېڭى يوپۇرماقلار تەرەققىي قىلالمايدۇ، قېرى يوپۇرماقلاردا ئېقىش كۈل رەڭ داغ پەيدا بولىدۇ، يوپۇرماق تومۇرىنىڭ رەڭگى قارامتۇللىشىپ، يوپۇرماق سايىقى بوشاپ تۆۋەنگە ساڭگىلايدۇ، بەزى زىرائەتلەردە كالتىسى كەم بولسا يوپۇرماق مەركىزى كۆيگەندەك بولۇپ قالىدۇ. تولۇقلاش ئۈچۈن كالتىسى سۇپىر فوسفات (过磷酸钙) ئوغۇتى بىلەن يىلتىز سىرتىدىن ئوغۇتلاش كېرەك.

5. ماگنىي كەملىك: ماگنىي كەم بولسا بەزى ئۆسۈملۈكنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى يوپۇرماقلارنىڭ تومۇرلىرى ئارىسىدا سۇس سېرىق سىزىق-چىلار پەيدا بولىدۇ، كېيىن ئاق سىزىقچىلارغا ئايلىنىدۇ. زىرائەت تې-نىدە ماگنىي ئېغىر دەرىجىدە يېتىشمەسە يوپۇرماق تومۇرلىرى ئارىسى-دىكى توقۇلمىلار قۇرۇپ ئۆلىدۇ. بىنەپشە قىزىل يوپۇرماق داغلىرى پەيدا بولىدۇ. شۇنداقلا يېڭى يوپۇرماقلارنىڭ رەڭگى سۇسلىشىدۇ. بۇ چاغدا ماگنىي سۇلفات (硫酸镁) ئوغۇتىنى يوپۇرماق سىرتىدىن پۈركۈش كېرەك.

6. تۆمۈر كەملىك: بەزى ئۆسۈملۈكلەر تۆمۈر ئېلېمېنتىغا بەك سەز-گۈر كېلىدۇ. تۆمۈر كەم بولغاندا ئوخشاشلا يوپۇرماق تومۇرلىرى يېشىل-قىنى يوقىتىدۇ، يوپۇرماقتا سىزىقچىلار پەيدا بولىدۇ، ئېغىر بولغاندا يېڭى يوپۇرماق ئۆسەلمەيدۇ، زىرائەتنىڭ ئۆسۈشى ناچارلىشىدۇ، كېچىكىپ پە-شىدۇ. تولۇقلاش ئۈچۈن $0.1\% - 0.2\%$ لىك تۆمۈر سۇلفات (硫酸铁) ئې-رىتمىسىنى يوپۇرماق ئوغۇتى قىلىپ پۈركۈش لازىم. (05)

سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ تېرەك كۆچىتى يېتىشتۈرۈش ئۇسۇلى

ئانقىز روزى بۆھجەر ئىسلام

(قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيەلىك ئورمانچىلىق ئىدارىسىدىن)

سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ تېرەك نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت يېتىد - شۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللانسا، قەلەمچىنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولىدۇ، بولۇپمۇ ئەتىيازدا ھاۋاسى ئۆزگىرىشچان، قۇرغاقچىلىق بىر قەدەر ئېغىر، شامال كۆپ چىقىدىغان، سۇنىڭ پارلىنىشى كۆپ بولغان رايونلاردا سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ تېرەك نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت يېتىشتۈرسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. كۆچەت يېتىشتۈرگەندە، شۇ يەرنىڭ ئەمەلىيىتىگە ماس ھالدا پەرۋىشنى كۈچەيتىشتىن سىرت، يەنە سۇلياۋ يوپۇق يېپىش تېخنىكىسىنى قوللانغاندا، بەلگىلىك ئىقتىسادىي ئۈنۈم ياراتقىلى بولىدۇ.

1. ئەھمىيىتى: (1) سۇلياۋ يوپۇق تۇپراق تېمپېراتۇرىسىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. 4 - ئاينىڭ باشلىرىدا تېمپېراتۇرا ئاساسەن تۇراقلىشىدۇ، بۇ ۋاقىت قەلەمچىنىڭ يىلتىز تارتىشىغا پايدىلىق بولۇپ، قەلەمچە ئەتىيازدا - كى قۇرغاقچىلىقنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمايدۇ. سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ قەلەمچە قىلىش ۋاقتى 10 - 15 كۈنگىچە بالدۇر، يىلتىز تارتىشى ئوچۇقچىلىق يەردىكىگە قارىغاندا 25 كۈن بۇرۇن، ئۆسۈشى تېز بولىدۇ. سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ قەلەمچە قىلغاندا ئۆسۈشنىڭ يۇقىرى پەللىسى بىر يىلدا ئىككى قېتىم بولىدۇ، ئوچۇقچىلىق يەردىكىنىڭ بىر قېتىم بولىدۇ ھەمدە ئۆ - سۈشنىڭ يۇقىرى پەللىسى ئالدىغا سۈرىلىدۇ؛ (2) تۇپراق نەملىكىنى ساقلايدۇ. سۇلياۋ يوپۇق ياپقاندا تۇپراقنىڭ سىرتقى يۈزىنىڭ نەملىكىنى ئۇزاققىچە ساقلىغىنى بولىدۇ. (3) ياۋا ئوت - چۆپلەرنىڭ ئۆسۈشىنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ. سۇلياۋ يوپۇق ياپقاندىن كېيىن يەر يۈزى تېم - پېراتۇرىسى يۇقىرى، ھاۋا ئۆتۈشۈشمىگە ئىلگىرى، ئوت - چۆپلەر ئۆسەل -

مەيدۇ، ئوت ئوتاش ئاۋارچىلىقىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ. (4) سولياۋ يوپۇق ياپسا قەلەمچىنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتى، لايقەتلىك كۆچەت (ئېگىزلىكى 2.5 مېتىر، يىلتىز بوغۇزىنىڭ دىيامېتىرى 1.5 سانتىمېتىرغا يېتىدىغان كۆچەت - نى كۆرسىتىدۇ) ئۇچۇقچىلىق يەردىكىگە قارىغاندا 50% يۇقىرى بولىدۇ؛ (5) كۆچەت تېز يېتىلىدۇ. سولياۋ يوپۇق يېپىپ قىلغان قەلەمچىنىڭ يوپۇرماق - لىرىنىڭ بوشلۇقتا ئىگىلىگەن كۆلىمى چوڭ، نۇر بىرىكتۈرۈش (فوتوسىنتېز) رولى كۈچلۈك، ئۆسۈش مەزگىلى ئۇزۇن، يىلتىزى تەرەققىي قىلغان، كۆچەت تېنىنىڭ ياغاچلىشىشى يۇقىرى بولىدۇ، كۆچەت ئېگىزلىكى ئادەتتە - كى كۆچەتلەردىن 30% كىچە ئېگىز، دىيامېتىرى 20% كىچە توم بولىدۇ.

2. ئۇسۇلى: قەلەمچە قىلىپ كۆچەت يېتىشتۈرىدىغان يەرنى مەھەللىۋى ئوغۇت بىلەن يېتەرلىك ئوغۇتلاپ، چوڭقۇر ئاغدۇرۇپ تۈزلەپ بولغاندىن كېيىن، 10 - 15 مېتىر ئۇزۇنلۇقتا، تۆت مېتىر كەڭلىكتە كاندۇك تەييارلاپ، بىر تەرەپتىن سولياۋ يوپۇقنى پۈرلەشتۈرمىگەن ئاساستا چىڭ تارتىپ يەر يۈزىگە چاپلاشتۇرۇپ يېپىپ، يەنە بىر تەرەپتىن قەلەمچىنى تىكىش كېرەك. قەلەمچىنىڭ يەرگە سانچىلىدىغان تەرىپىنى قىيپاش، ئۈستىنى تۈز قىلىپ 20 - 22 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا كېسىپ تەييارلاش ھەم تۈپ ئارىلىقىنى 15 سانتىمېتىر، قۇر ئارىلىقىنى 80 سانتىمېتىر قىلىش كېرەك. بىر مو يەرگە 5500 تال قەلەمچە تىكىلسە مۇۋاپىق بولىدۇ. قەلەمچە - نى تىكىشتىن بۇرۇن، ئىنچىكە - توملۇقى قەلەمچە بىلەن ئوخشاش ئۇزۇنلۇقتا بىر تال تاياقنى ياسىۋېلىپ، سانچىپ تۆشۈك ئېچىپ، ئاندىن قەلەمچىنى تىكىش كېرەك، چۈنكى قەلەمچىنى بىۋاسىتە سانچىغاندا سولياۋ پارچىسى قەلەمچىنىڭ ئۇچىغا يېپىشىۋېلىپ يىلتىز تارتىشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. قەلەمچىنى سانچىپ بولغاندىن كېيىن سۇغىرىش كېرەك، قەلەمچە بىخ سۈرۈشكە باشلىغاندا سولياۋدىن بىخلىرىنى چىقىرىپ، ئېچىلغان تۆشۈكنى توپا بىلەن ھىم ئېتىپ، ئوت - چۆپ ئۆسۈۋېلىشنىڭ، تۇپراق تېمپېراتۇرىسىنىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. تۇپرىقى

كېۋەز كۆك بېتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش ئۇسۇللىرى

نۇرگۈل سەلەي

(ئاتۇش شەھىرى كاتتايلاق يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)
 زىيان سېلىش ئالامىتى: كۆك پىت كېۋەز يوپۇرمىقىنىڭ كەينىگە يا-
 كى يۇمران ئۇچىغا قادىلىپ شىرنىسىنى سۈمۈرۈپ زىيان سالىدۇ، مایسا
 مەزگىلىدە زىيان سالىسا، كېۋەزنىڭ يوپۇرمىقى قۇرۇلىدۇ، ئۆسۈشى ئاس-
 تىلاپ، چېچەكلەپ غوزلىشى كېچىكىدۇ. تۈپ بولۇپ شەكىللىنىش مەزگى-
 لىدە زىيانغا ئۇچرىسا ئۈستىدىكى يوپۇرماقلار قۇرۇپ، ئوتتۇرىسىدىكى يو-
 پۇرماقلار مايلىشىپ، يوپۇرماق يۈزىنى بۇلغاپ، نۇر بىرىكتۈرۈش رولىنى
 ئاجىزلاشتۇرىدۇ، ئاستىدىكى يوپۇرماقلار سارغىيىپ قۇرۇلۇپ تۆكۈلىدۇ،
 چېچەكلەپ غوزلاش مەزگىلىدە زىيانغا ئۇچرىسا غۇنچە ۋە غوزلار تۆكۈلىد-
 ۇ. غوزا ئېچىلىش مەزگىلىدە زىيانغا ئۇچرىسا كېۋەز كۆك پىتى ئاجرىتىپ
 چىقارغان شىلىمشىق ماددىلار پاختا تالاسىنى بۇلغاپ، پاختا تالاسىنىڭ
 سۈپىتىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ.

ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش: (1) قىش ۋە ئەتىياز پەسىللىرىدە ئې-
 تىزدىكى ئوت - چۆپلەرنى تازىلاپ، پارازىت غوجا ئۆسۈملۈكىگە ئوك-
 سىدلانغان روگور (氧化乐果) نى پۈركۈش لازىم؛ (2) پارنىك - سۇلياۋ
 قۇرغاق بولسا 15 كۈن ئەتراپىدا بىر قېتىم سۇغىرىش لازىم، 6 - ئاينىڭ
 ئوتتۇرىدا سۇلياۋ يوپۇقنى پۈتۈنلەي ئېچىۋېتىش كېرەك. سۇلياۋ يوپۇقنى
 ئېچىۋەتكەندىن كېيىن بىر قېتىم ھەر مو يەرنى 15 كىلوگرام ئورپا بى-
 لەن ئوغۇتلاش لازىم. 7 - ئاينىڭ ئوتتۇرىدىن 8 - ئاينىڭ بېشىغىچە يەنە
 بىر قېتىم ئوغۇتلاپ سۇغىرىش كېرەك. كۆچەتنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىغا قاراپ
 يەنە ئوت - چۆپلەرنى ئوتاش، كولىتۋاتسىيە قىلىش، كېسەللىك، زىيانداش
 ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يوقىتىش كېرەك. (05)

لاپاس ۋە ئۆي ئىچىدىكى قىشتىن ئۆتىدىغان كېۋەز كۆك پىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ يوقىتىپ، كېلەر يىلى پەيدا بولىدىغان كېۋەز كۆك پىتىنىڭ مىقدارىنى ئۈنۈملۈك ئازايتىش ئۈچۈن، ھەر مو يەرگە 10 تال سېرىق تاخ - تاي ئېسىش كېرەك؛ (3) زىرائەتلەرنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇپ تېرىپ، ئىمكانقەدەر كېۋەز بىلەن بۇغداينى كىرىشتۈرۈپ ياكى نۆۋەتلەشتۈرۈپ، تېرىش، كېۋەز ئېتىزىنىڭ ئىككى تەرىپىگە قىچا، زاراڭزا، چىلگە قوناق ۋە بىدە قاتارلىق زىرائەتلەرنى تېرىپ، يەتتە داغلىق خاتقىز، يوللۇق داغلىق خاتقىز، ئالتۇن كۆز، سېرىق ھەرە، چوڭ پۈتلۈق ھەرە، كۆك پىت يەيدىغان چىۋىن، كىچىك قارا ئۆمۈچۈك، ئۈچ توپچىلىق ئۆمۈچۈك، سەككىز داغلىق شاراسىمان قورساقلىق ئۆمۈچۈك، قىزىل كۆز ھەرە، كۆك پىت غوزەك ھە - رىسى قاتارلىق كۈشەندە ھاشارلارنى جەلپ قىلىپ ۋە كۆپەيتىپ، كېۋەز كۆك پىتى يامراپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم؛ (4) 6 - ئايدا يەنى كېۋەزنىڭ تۇنجى سۈيىدىن بۇرۇن، ھەر مو ئېتىزغا 3% لىك تېمىك (铁灭威) دانچە دورىسىدىن 350 گرام ئېلىپ، كېۋەز تۈپىدىن 10~15 سانتىمېتىر يىراقلىقتا، 10~15 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا چۆنەكلەپ كۆمۈش كېرەك؛ (5) 8 - ئايدا كېۋەزنى كولىتۇتاسىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ھەر مو ئېتىزغا 100~150 گرام 80% لىك «د د ۋ» غا 30~40 كىلوگرام يىرىك توپا ياكى ھەرە كېپىكى ئارىلاشتۇرۇپ، زەرەرلىك توپا تەييارلاپ، كەچقۇرۇن كېۋەزنىڭ تۈپ، قۇر ئارىلىقلىرىغا سېپىپ، كېۋەز كۆك پىتىنى دىمىقتۇرۇپ ئۆلتۈرۈش لازىم. (03)

پارنىك كۆكتاتلىرىدىكى كېسەللىك، ھاشراتلارنىڭ زىيىنى يېنىكلىتىش ئۇسۇلى

تۇرسۇنغۈل تۇردى

- (قەشقەر شەھىرى دۆلەتباغ يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)
1. سورت تاللاشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىپ، كېسەلگە چىداملىق، مەھسۇلاتى يۇقىرى، ماسلىشىشچانلىققا كۈچلۈك سورتلارنى تاللاپ تېرىش لازىم.
2. ئۇرۇقنى تېرىشتىن بۇرۇن قىزىق سۇغا چىلاپ دېزىنېفىكسىيە قىلىش ياكى شارائىتى يار بەرسە دورا ئارقىلىق دېزىنېفىكسىيە قىلىش لازىم.
3. كۆكتاتلارنى تېرىش ۋە مايسا كۆچۈرۈشتىن بۇرۇن تۇپراق ۋە پارنىك ئىچىنى دېزىنېفىكسىيەلەش لازىم.
4. ئورگانىك ئوغۇنلارنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن چوقۇم تولۇق چىرىدەپ، مىكروپىسىز لاندۇرۇپ ئاندىن ئىشلىتىش لازىم.
5. يەرنى چوڭقۇر ئاغدۇرۇپ توڭ يانقۇزۇش ئارقىلىق زىيانداش ھاشراتلارنىڭ ئۇۋىسىنى بۇزۇپ، قورچاق، تۇخۇملارنى يوقىتىش لازىم.
6. نۆۋەتلەشتۈرۈپ تېرىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. يۇقىرى نەملىك، يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ھاۋا ئالماشتۇرۇشقا، مۇۋاپىق سۇغىرىشقا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك.
7. ئەگەر باشقا ئورۇنلاردىن مايسا يۆتكەپ كېلىشكە توغرا كەلسە، مايسىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ئەھۋالى، كېسەللىك، ھاشرات بار - يوقلۇقى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ ئاندىن كىرگۈزۈش لازىم.
8. مۇھىت تازىلىقىغا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش لازىم. يەنى پارنىك ئىچىدىكى كۆكتاتلارنىڭ قېرى يوپۇرماقلىرىنى ۋاقىتىدا ئېلىۋېتىش ھەمدە كۆكتات قالدۇقىنى پاكىز تازىلاپ سىرتقا ئېلىپ چىقىپ كۆيدۈرۈۋېتىش لازىم. شۇنداقلا پارنىك ئىچى - سىرتىدىكى ياۋا ئوت - چۆپلەرنى پات - پات يۇلۇپ پارنىكنى پاكىز تۇتۇشقا كاپالەتلىك قىلىش لازىم.
9. مايسا كۆچۈرگەندە تۈپ ئارىلىقىنىڭ زىچ بولۇپ قالماسلىقىغا دىققەت قىلىش لازىم.
10. پارنىك ئىچىنىڭ نەملىكى 85% دىن يۇقىرى بولغاندا، كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى ناھايىتى تېز بولۇپ، زەمبۇرۇغ تىپتىكى كېسەللىك كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا مىكروب ئۆلتۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. مىكروب ئۆلتۈرگۈچى دورىلارنى يەنە بەزى كۆكتاتلارغا كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىشلەتسىمۇ ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ. (03)

پارنىك ئاق توزان پىتىنىڭ ئىشلىتىش - پىرىنسىپى

ئابلېكىم ئەمەت

(ئۇچتۇرپان ناھىيە ئاچتاغ يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)
پارنىك ئاق توزان پىتىنىڭ يېتىلگەن ھاشارات ۋە لىچىنكىسى كۆكتات مایىسىنىڭ يوپۇرماق ئارقىسىغا زىچ تويلىشىپ، شىرنە سۇيۇقلۇقىنى سۈمۈرۈش، يوپۇرماقنىڭ سولشىپ قېلىش، يېشىللىقىنى يۇقىتىش، سارغىيىپ قېلىش ھەتتا قۇرۇپ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش بىلەن بىللە، شىلىمشىق سۇيۇقلۇق ئاجرىتىپ، يوپۇرماق ۋە مېۋىنى بۇلغاپ، كۆكتاتنىڭ فوتوسىنتېز رولىغا ئېغىر تەسىر كۆرسىتىپ، ۋىرۇس كېسىلىنى پەيدا قىلىپ، 10%-30% گىچە مەھسۇلات كېمىيىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا. شۇڭا ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىشنى كۈچەيتىش كېرەك.

1. ياشاش ئادىتى: پارنىك ئاق توزان پىتى بىر يىلدا 10 ئەۋلاد قالدۇرالايدۇ، قىش پەسلى پارنىكتا قىشتىن ئۆتۈپ كۆكتاتلارغا داۋاملىق زىيان سالىدۇ. يېتىلگەن ھاشارىتى قورچاق قېپىدىن چىقىپ 1 - 3 كۈنگىچە جۈپلىشىپ تۇخۇم تۇغىدۇ، چىشى ھاشارات تەخمىنەن 142~324 دانە تۇخۇم تۇغىدۇ، ئۇرۇقسىزمۇ كۆپىيەلەيدۇ. يېتىلگەن ھاشارات يۇمران يوپۇرماققا ئىنتىلىشچانلىققا ئىگە بولۇپ، كۆكتاتنىڭ ئۆسۈشىگە ئەگىشىپ ئۈستىدىكى يۇمران يوپۇرماققا تۇخۇم تۇغىدۇ. شۇڭا ئاق توزان پىت كۆك-تاتلاردا مایسا ئۈچىدىن ئاستىغا قارىتا تارقىلىش ھالىتى بولسا: يېشىل رەڭلىك يېڭى تۇخۇم، قارىدىغان تۇخۇم، تۆۋەن ياشلىق ئارا لىچىنكا، چوڭ ياشلىق ئارا لىچىنكا، يالغان قورچاق، قورچاق قېپىدىن يېڭى چىققان يې-تىلگەن قۇرتتىن ئىبارەت. مۇقىم 24°C لۇق شارائىتىدا ئاق توزان پىتىنىڭ ھەر خىل ھالىتىدىكى يېتىلىش ۋاقتى مۇنداق: تۇخۇم ھالىتىدىكى ۋاقتى يەتتە كۈن، بىر ياشلىق ئارا لىچىنكا ۋاقتى بەش كۈن، ئىككى ياشلىق ئارا لىچىنكا ۋاقتى ئىككى كۈن، ئۈچ ياشلىق ئارا لىچىنكا ۋاقتى ئۈچ كۈن، يالغان قورچاق ۋاقتى سەككىز كۈن ئەتراپىدا بولىدۇ. ئاق توزان پىتىنىڭ كۆپىيىشىگە 18°C - 21°C گىچە ھاۋا تېمپېراتۇرىسى ئەڭ پايدىلىق بولۇپ، پارنىك ئىچىدە تەخمىنەن بىر ئايدا بىر قېتىملىق ئەۋلاد قالدۇرۇلىدۇ.

دۇرۇشنى تاماملايدۇ. كۈزدە سانى ئەڭ يۇقىرى چەككە يېتىپ، كاۋا، پىدد-
گەن، پۇرچاق تۈرىدىكى كۆكتاتلارغا مەركەزلىك زىيان يەتكۈزىدۇ. قىش
پەسلى پارنىك ئىچى كۆكتاتلاردىكى ئاق توزان پىتى ۋە ھەر خىل ھالەتتە-
كى لىچىنىكىلىرى بولسا ئەتىياز پەسلىلىك كۆكتاتلاردىكى ئاق توزان
پىتىنىڭ پەيدا بولۇش مەنبەسى. بۇنىڭدىن باشقا كۆكتات مايسىسىنى
پارنىكقا تىكش بىلەن بىللە مۇنداق ئۈچ خىل يول ئارقىلىق تارقىلىدۇ:
(1) مايسا يېتىشتۈرۈش مەزگىلىدە ئاق توزان پىتى مايسىغا تۇخۇم تۇغۇپ
زىيان سېلىپ، مايسىنى يۆتكەپ تىكش ئارقىلىق تارقىلىدۇ؛ (2) پارنىك
ئىچىگە ئارىلاش تىكىلگەن كۆكتاتلار ۋە ياۋا ئوت-چۆپتە پارازىت ياشاش
ئارقىلىق تارقىلىدۇ؛ (3) يېتىلگەن ئاق توزان پىت سىرتتىن پارنىك ھاۋا
تۆشۈكى ۋە ئىشكىتىن ئۇچۇپ كىرىپ تارقىلىدۇ. شۇڭا ھاشارات مەنبەسى-
نى يوقىتىپ، لىچىنىكىسىز مايسا يېتىشتۈرۈش ئىنتايىن مۇھىم ئالدىنى
ئېلىش تەدبىرىدۇر.

2. ئاساسلىق پارازىت كۆكتات تۈرلىرى: ئاق توزان پىتى ئۇزۇقلۇ-
نىشقا ئامراق ۋە ئاسان زىيان سالىدىغان كۆكتاتلاردىن تەرخەمەك، قورۇما
كاۋىسى، پەمىدۇر، پېدىگەن، يېسى پۇرچاق، بۆلجۈرگەن، قوغۇن - تاۋۇز
قاتارلىقلار بار. پارازىت زىيىنى يېنىك كۆكتاتلاردىن تۇرۇپ، كۆك مۇچ،
جاڭدۇ، كەرەپشە قاتارلىقلار بار. تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا چىداملىق يوپۇرماق
تۈرىدىكى كۆكتاتلار پارازىت زىيانغا ئۇچرىمايدۇ.

3. ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش ئۇسۇللىرى: ئاق توزان پىتىنىڭ
ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىشتا، دېھقانچىلىق تېخنىكىسى ئارقىلىق ئالدىنى
ئېلىش - يوقىتىشنى ئاساس قىلىپ، كۆكتات پەرۋىشىنى كۈچەيتىپ، ھا-
شارات زىيىنىغا ئۇچرىمىغان مايسا يېتىشتۈرۈش كېرەك. قوشۇمچە مۇۋا-
پىق دورا ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش، شۇنداقلا بيولوگىيەلىك
ۋە فىزىكىلىق ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىشنى تەڭ ئېلىپ بېرىش كېرەك.
(1) دېھقانچىلىق تېخنىكىسى ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىش: ① كې-
سەللىك ئېغىر پارنىكلارغا كەرەپشە، كۈدە قاتارلىق ئاق توزان پىتى زىيان
سالمايدىغان كۆكتاتلارنى تېرىش، تەرخەمەك، شوخلىنى ئاز تېرىش لازىم: ②
مايسا يېتىشتۈرۈش ئۆيى ئايرىم بولۇش، دورا بىلەن ئىسلاش، قالدۇق

قۇرت، لىچىنكىلارنى ۋە ئوت - چۆپلەرنى پاكىز تازىلاش، شامالدىتىش تۈ-
شۈكى ۋە ئىشكىكە تور تارتىش كېرەك؛ ③ تەرخەمەك، شوخلا، سەيپۇرچاق-
نى ئارىلاش تېرىماسلىق كېرەك؛ ④ پارنىك ئەتراپىغا ئىمكانقەدەر ئاق
توزان پىتى ئامراق پىدىگەن تۈرىدىكى كۆكتاتلارنى تېرىماسلىق، كىرىست
گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆكتاتلارنى تېرىپ ھاشارات مەنبەسىنى ئازايد-
تىش لازىم. (2) دورا ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىپ يوقىتىش: ئاق توزان پىتى
بىر خىل كۆكتاتتا ھەر خىل لىچىنكا ھالەتتە تەڭ مەۋجۇت بولغاچقا، بىرلا
ۋاقىتتا تەلتۈكۈس يوقاتقىلى بولمايدۇ، شۇڭا دورىنى ئودا بىرنەچچە قېتىم
چېچىش كېرەك. ① 20% لىك يىبىڭۋېي يەنجى (异丙威烟剂) ئارقىلىق
ئىسلاش لازىم؛ ② ئالىكا سۈتسىمان دورىسى (阿立卡) نى ھەرمو يەرگە
5 - 10 مىللىلېتىر، فۇگې (福戈) نەملىنىشچان پاراشوك دورىسىدىن
ھەرمو يەرگە 6 - 8 گىرامنى 30 لىتىر سۇدا ئېرىتىپ پۈركۈش كې-
رەك؛ ③ 10% لىك بىچوڭلىن نەملىنىشچان پاراشوك دورىسى
(吡虫啉可湿性粉剂) نىڭ 1000 ھەسسىلىك ئېرىتمىسىنى پۈركۈش كې-
رەك. (3) بىيولوگىيەلىك ئالدىنى ئېلىپ يوقىتىش: ئاق توزان پىتىنىڭ
كۈشەندىسى ئېنكارسىيا (丽蚜小峰) نى سۈنئىي ئۇسۇلدا كۆپەيتىپ، ھەر-
تۈپ مايسىدا بەش تال يېتىلگەن ئاق توزان پىتى پەيدا بولۇشتىن ئىلگىرى،
ھەرمو پارنىققا 2000 تالدىن ئارتۇق ئېنكارسىيانى 10 نۇقتىغا بۆلۈپ قو-
يۇپ بېرىش، پارنىك ئىچىدە كۈشەندە توپى ھاسىل قىلىپ، ئاق توزان پى-
تىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىش كېرەك. (4) فىزىكىلىق ئالدىنى ئېلىش
- يوقىتىش: ئاق توزان پىتى سېرىق رەڭگە كۈچلۈك ئىنتىلىشچانلىققا
ئىگە، شۇڭا پارنىك ئىچىگە سېرىق تاختا ئېسىش ئارقىلىق، يېتىلگەن
قۇرتنى ئالداپ يوقىتىش، يەنى ھەرمو پارنىققا 23 - 34 گىچە سېرىق
تاختىنى مايسا ئېگىزلىكى بىلەن ئوخشاش ئېگىزلىكتە ئېسىش كېرەك.
سېرىق تاختا بىلەن ئېنكارسىيانى تەڭ ئىشلىتىش ھەمدە ساغلام مايسا
كۆچۈرۈش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا ئاق توزان پىتى تېز سۈرەتتە كۆپىيىپ
تارقالغاچقا، بىر رايوندا بىرلا ۋاقىتتا بىرلىكتە ئالدىنى ئېلىش - يوقى-
تىشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم. (03)

كۆكتات قىزىرىشنى ئۆت - چىراشنىڭ ئۆزىنىڭ ئۆزى ئۆت - چىراشنىڭ ئۆزى

ئەركىن نىياز

- (چەرچەن ناھىيە قوراملىق يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)
1. يەرگە تۈجۈپلەپ ئىشلەپ، كۆكتات ئۇرۇقىنىڭ ئۈنۈشى ئۈچۈن ياخشى شارائىت، ئوت - چۆپ ئۇرۇقىنىڭ ئۈنۈشىگە ناچار شارائىت ھازىرلاش لازىم.
 2. تولۇق چىرىگەن، ئوت - چۆپ ئۇرۇقى يوق ئورگانىك ئوغۇتلارنى ئىشلىتىش لازىم.
 3. ئەتىيازلىق، يازلىق كۆكتاتلارنى قارا سۇلياۋ يوپۇق بېيىپ تېرسا، ئوت - چۆپلەرنى يوقىتىپ، تۇپراق تېمپېراتۇرىسىنى يۇقىرىلاتقىلى بولىدۇ.
 4. خىمىيەلىك ئۇسۇلدا ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش كېرەك. كۆكتاتلار - نىڭ تۈرى ۋە سۈرتى كۆپ، ئۆسۈپ يېتىلىش ئالاھىدىلىكى ئوخشاش بولمىغاچقا، ئوت - چۆپ يوقىتىدىغان دورىلارغا بولغان ئىنكاسىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ، لېكىن پىدىگەن ئائىلىسىدىكى، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى كۆكتاتلارنى تېرىشتىن بۇرۇن ياكى كۆچۈرۈشتىن بۇرۇن تىرىفلورالين (氟乐灵)، پىندىمېتالين (除草通)، دۇئال (都尔)، قاتارلىقلارنى ئۆلچەم بويىچە سۇ - يۇلدۇرۇپ تۇپراققا چېچىپ تېرسا ياكى كۆچۈرسە ئوت - چۆپ ئۈنۈپ چىقمايدۇ.

پۇرچاق ئائىلىسىدىكى يىسى پۇرچاق، كۆك پۇرچاق، تۈكلۈك پۇرچاق قاتارلىقلارغا؛ گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۈدە، پىياز، سامساق ئۈنۈپ چىقىشتىن بۇرۇن ئوت - چۆپ يوقىتىش دورىسىنى تۇپراققا چېچىپ تىرىنلاپ تۇپراققا ئارىلاشتۇرۇۋېتىپ مايسىنى كۆچۈرسە، ئوت - چۆپ ئۈنۈپ چىقمايدۇ. كۆكتاتلار مايسا مەزگىلىدە باشاقلار ئائىلىسىدىكى ئوت - چۆپ - لەر بېسىپ كەتسە يۇقىرى ئۈنۈملۈك گالانت (高效盖草能)، نابو (拿捕)

ساقىيەم ئىسسىقلىق ھەرخىلىدىكى كېسەللىك زىيانلىق ھاشارلار ۋە ئوت - چۆپلەرنىڭ ئالىمى ئېلىش - يىغىش

مەختۇمخان بارات

(خېجىڭ ناھىيەلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىدىن)

1. مايسا مەزگىلىدە ئاساسلىقى تىك قۇرۇش كېسىلى كۆپرەك كۆرۈلدى. بۇ كېسەل پەيدا بولغان ھامان ھەر مو يەرگە %64 لىك ساندۇفان دو- رىسىنى 500 - 600 ھەسسە سۈيۈلدۈرۈپ چېچىش ياكى يىلتىزغا قويۇش ئارقىلىق بۇ كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. مايسا مەزگىلدە ھا- شارلاردىن ئاساسلىقى يەر يولۇسى كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. بۇ ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئوت ئوتاشقا بىرلەشتۈرۈپ ھاشارلارنىڭ كېلىش مەنبەسى- نى يوقىتىش ھەمدە 5 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى جۈ جى (菊酯) تۈرىدىكى دورىلارنى چېچىش ياكى يىلتىزغا قويۇش ئارقىلىق بۇ ھاشارلارنىڭ ئال- دىنى ئېلىش كېرەك.

2. ئۆسۈش مەزگىلىدە ۋىرۇس كېسىلى، ۋابا كېسىلى قاتارلىقلار كۆپ-

قاتارلىق مەخسۇس باشاقلىقلار ئائىلىسىدىكى ئوت - چۆپلەرنى يوقىتىدۇ- غان دورىلارنى ئوت - چۆپلەرنىڭ شاخ، يوپۇرماقلىرىغا چاچسا ئۈچ كۈندىن كېيىن ئۈنۈمى كۆرۈلىدۇ. پىدىگەن، مۇچ قاتارلىقلارنىڭ مايسىسىنى چوڭ ئېتىزغا كۆچۈرۈشتىن بۇرۇن %33 لىك پىندىمېتالىندىن 150 - 200 مىللىلىتىر ياكى %48 لىك ئالاخۇر (拉素) دىن 150 - 250 مىللىلىتىر تىر ئېلىپ سۇغا ئارىلاشتۇرۇپ تۇپراققا چېچىپ، ئاندىن مايسىنى كۆچۈرسە ئوت - چۆپ بىر مەزگىل ئۈنۈپ چىقمايدۇ. لېكىن ئوت - چۆپ يوقىتىش دورىسىنى تۇنجى قېتىم ئىشلەتكەندە كىچىك كۆلەمدە تەجرىبە قىلىپ، ئۈنۈمى كۆرۈلسە ئاندىن كەڭ كۆلەمدە كېڭەيتىش كې- رەك. (03)

رەك كۆرۈلىدىغان بولۇپ، بۇلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا: (1) ئۇرۇقنى 52°C لۇق ئۇرۇقنى ئىلماق سۇغا يېرىم سائەت چىلاپ ئاندىن تېرىش لازىم؛ (2) دورا بىلەن ئالدىنى ئېلىش: 75% لىك تېرىمىل (百菌清) دورىسىنى 600 ھەسسە، 70% لىك زىنېب (代森锰锌) دورىسىنى 500 ھەسسە سۇيۇلدۇرۇپ، ھەر 7 - 10 كۈندە بىر قېتىمدىن 2 - 3 قېتىم چېچىش ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

بۇ مەزگىلدە زىيانداش ھاشارلاردىن كېۋەز غوزا قۇرتى، كۆك پىتقا - تارلىقلار كۆپرەك كۆرۈلىدۇ، ئالدىنى ئېلىپ يوقىتىشتا: ① دېھقانچىلىق تېخنىكىسى ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىشتا، كۈزدە يەر ئاغدۇرۇپ توك ياتقۇ - زۇش ئارقىلىق قىشلىغان ھاشارنى يوقىتىش لازىم؛ ② كۆممىقوناق بەلبېغى ئارقىلىق يوقىتىش، يەنى 6 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى ھەر 100 تۈپتىكى تۇخۇم سانى 20 تالغا يەتكەندە جۈجى تۈرىدىكى دورىلارنى چېچىش ياكى 2.5% لىك گۇڭ فۇ (功夫) دورىسىنى 2000 - 3000 ھەسسە سۇيۇلدۇرۇپ چېچىش ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش كېرەك؛ ③ كۆك پىتقا غوزا قۇرتى بىلەن بىرگە پەيدا بولسا 2.5% لىك گۇڭ فۇ دورىسىنى 2000 - 3000 ھەسسە سۇيۇلدۇرۇپ چېچىش ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

3. ياۋا ئوت - چۆپلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش: بىر نەچچە يىلدىن بۇيان شۈمبۈيىنىڭ زىيىنى بىرقەدەر ئېغىر بولماقتا. بۇ بىر خىل پارازىت ئۆسۈملۈك بولۇپ، زىرائەتنىڭ يىلتىزىدىكى سۇ ۋە ئوزۇقلۇقنى سۈمۈرۈپ زىرائەتلەرنىڭ مەھسۇلاتى ۋە سۈپىتىگە ئېغىر تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئالدىنى ئېلىش يوقىتىشتا: (1) ئادەم كۈچى ئارقىلىق يۇلۇپ يوقىتىش؛ (2) شۈمبۈيىنى كېسىۋېتىپ 10% لىك ساۋگەن لىن (草甘磷) دورىسىنى 10 - 20 ھەسسە سۇيۇلدۇرۇپ كېسىلگەن غولغا سۈرۈپ ئالدىنى ئېلىپ يوقىتىش كېرەك. (05)

پاڭسۇن ئاھىيە ئىلانىق يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن

ھەمراگۈل نېسىر

ئاھىيە ئىلانىق يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن (توقسۇن ناھىيە ئىلانىق يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن) ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ ھەر خىل كۆكتات، قوغۇن - تاۋۇزلارنىڭ يىلتىز سىستېمىسىدا كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش كۆلىمى كېڭىيىپ، ئىشلەپچىقىرىشقا تەسەر يەتكۈزۈۋاتىدۇ. شۇڭا بۇ خىل كېسەللىكلەرگە دىققەت قىلىپ، تېخنىكىلىق تەدبىرلەرنى ۋاقىتىدا قوللىنىش لازىم.

1. ئالدىنقى ئېگىزنى پاكىزە يىغىشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، پارنىك ئىچىنى ھاشارات ۋە باكتېرىيە ئۆلتۈرگۈچى ئىسلاش دورىلىرى بىلەن 1 - 2 قېتىم ئىسلاش لازىم. قىر سېلىشقا بىرلەشتۈرۈپ باۋىستىن (多菌灵)، دىكسون (敌克松) قاتارلىق باكتېرىيە ئۆلتۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىپ، تۇپراقنى دېزىنېفېكسىيە قىلىش كېرەك.
2. ئاساسىي ئوغۇت بېرىشتە تولۇق چىرىتىلگەن ئورگانىك ئوغۇتنى يې - تەرلىك بېرىش، كالىي، فوسفورلۇق ئوغۇتلارنىمۇ ماسلاشتۇرۇپ بېرىش كېرەك.
3. ھەر يىلى مۇۋاپىق نۆۋەتلەشتۈرۈپ تېرىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.
4. تېخنىكا تەلەپ بويىچە قىر سېلىپ، قىر ئۈستىگە سۇلياۋ يوپۇق يې - پىش كېرەك.
5. كېسەلگە چىداملىق سورتلارنى تاللاپ تېرىش، تېرىشتىن بۇرۇن ئۇ - رۇقنى دېزىنېفېكسىيە قىلىش، تىمەن مايىسلارنى تاللاپ تىكش، مايىسىنى ئۇلاشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم.
6. مۇۋاپىق سۇغىرىش، مۇمكىن بولسا تېمىتىپ سۇغىرىش كېرەك.
7. شاخنى ۋاقىتىدا پۇتاش ۋە يىلتىز بوغۇمى ئۈستىدە يوپۇرماق قالدۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.
8. پارنىك تېمپېراتۇرىسى ۋە نەملىكىنى مۇۋاپىق تەكشۈش كېرەك.
9. كېسەللىك پەيدا بولۇشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئاشۇ تۈپنى يۇلۇ - ۋېتىپ، شۇ ئورۇنغا ھاك چېچىپ ئۆرەكنى دېزىنېفېكسىيە قىلىش ياكى دورا ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. (03)

چىلان دەرىخىدە كۆرۈلىدىغان كېسەللىك ۋە زىيانداش ھاشاراتلارنىڭ

ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش ئۇسۇلى

روشنەنگۈل تۇردى

(ئونسۇ ناھىيە گۈلئاۋات يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن)

1. ئاساسلىق كېسەللىكلەر ۋە ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىش:

چىلان دەرىخىدە ئاساسلىق كېسەللىكلەردىن چىلاننىڭ غۇژمەك شاخلىنىش كېسىلى، چىلان دات كېسىلى، چىلان قوڭۇرداغ كېسىلى ۋە چىلان كۆي-دۈرگە كېسىلى قاتارلىقلار كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. بۇ كېسەللىكلەر ئاساسلىقى ئۇلاش جەريانىدا ۋە يوپۇرماق تومۇزغىسى ئارقىلىق تارقىلىدۇ. يەر قۇر-غاق، ئۈنۈمسىز، ئوغۇتلاپ سۇغىرىش شارائىتى، باشقۇرۇشى ناچار، كۆچەت ئاجىز بولۇش قاتارلىق سەۋەبلەردىن بۇ خىل كېسەللىك يامرايدۇ. كېسەل-لىك كۆرۈلگەندىن كېيىن چىلان دەرىخىنىڭ نورمال ئۆسۈشى بۇزۇلۇپ، ئىچكى ھورمۇن تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىپ، يوپۇرمىقى سارغىيىپ، كىچىك شاخلار بىراقلا كۆپ ئۆسۈپ، قىشتا يوپۇرماق سولۇشۇپ چۈشمەي، غەي-رىي مېۋىلەش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. ئەگەر كېسەللىك يىلتىز قىس-مىدا كۆرۈلسە، يىلتىزدىن تۈپلىنىش كۈچىيىپ كېتىدۇ. ئادەتتە چىلان دات كېسىلى كۆپرەك كۆرۈلىدۇ، بۇ خىل كېسەللىك پەقەت يوپۇرماق-قىلا زىيان سېلىپ، كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە يوپۇرماق ئارقا-يۈزىدە سۇس يېشىل كىچىك داغلار پەيدا بولۇپ، تەدرىجىي ھالدا سۇس قوڭۇرغا ئۆزگىرىدۇ.

ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىشتا: (1) كېسەللىك ئېغىر رايونلاردا 7 -

ۋە 8 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا دىنكونازول (烯唑醇) نىڭ 1500 ھەسسە-لىك ئېرىتمىسىنى تۇمانلىتىپ پۈركۈش كېرەك. كېسەللىك يېنىك كۆ-رۈلگەن رايونلاردا 8 - ئاينىڭ ئوتتۇرىسىدا پەقەت بىر قېتىملا پۈركۈسە بولىدۇ. (2) كېسەللىك كۆرۈلگەن دەسلەپكى مەزگىلدە ئاچ ئازولون (三唑酮) ياكى 12.5% لىك دىنكونازولنى پۈركۈش لازىم.

2. ھاشارات زىيانداشلىقى ۋە ئالدىنى ئېلىپ يوقىتىش: چىلان

دەرىخىدىكى كېسەللىك كۆپىنچە ھاشارات زەخمىلەندۈرگەن ئېغىزلاردىن كېسەللىك مىكروپى كىرىش ئارقىلىق تارقىلىدۇ، شۇڭا ھاشارات زد-يانداسلىقى پەيدا بولۇشنىڭ ئىلگىرى - كېيىنلىكى ۋە دەرىجىسى - كېسەللىك زىيانداسلىقىنىڭ ئېغىر - يېنىكلىكىنى بەلگىلەيدۇ. چىلانغا ئا-دەتتە تۆۋەندىكى بىرقانچە خىل ھاشارات كۆپرەك زىيان سالىدۇ. (1) چىلان ماڭدامچى قۇرتى: بۇ ئوزۇقلۇق تاللىمايدىغان زىيانداس ھاشارات بولۇپ، لىچىنكىسى يۇمران بىخنى يەيدۇ، يوپۇرماق چىققاندىن كېيىن يوپۇرماقنى يەيدۇ، ئېغىر بولغاندا پۈتكۈل دەرەخنىڭ يوپۇرمىقىنى يەپ، مەھسۇلاتنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىش ئۇسۇلى: ① چىلان بىخى ئۈچ سانتىمېتىر بولغاندا، %2.5 لىك فاستاك (高效氯氰菊酯) نىڭ 2000 - 3000 ھەسسىلىك ئېرىتمىسىنى پۈركۈش ئارقىلىق، چىلان ماڭدامچى قۇرتى لىچىنكىسىنى يوقىتىش لازىم. ② دىساس (敌杀死) نىڭ 600 - 800 ھەسسىلىك ئېرىتمىسىنى پۈركۈپ ئالدىنى ئې-لىپ يوقىتىش كېرەك؛ (2) كىچىك نەشپۈت مېغىز قۇرتى: بۇ مەھسۇلات سۈ-پىتىگە تەسىر يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق زىيانداس ھاشارات بولۇپ، مېۋە ئۈ-رۇقچىسىنى بويلاپ ئوزۇقلىنىدۇ، ھاشارات پوقى مېۋە ئىچىدە قېلىپ مېۋە-نىڭ بالدۇر تۆكۈلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىشتا: ① 5 - ئاينىڭ ئاخىرىدىكى لىچىنكا تۇخۇمىدىن چىقىدىغان پايدىلىق مەزگىلنى چىڭ تۇتۇپ يوقىتىش كېرەك؛ ② 7 - ئاينىڭ ئوتتۇ-رىلىرىدىن 8 - ئاينىڭ باشلىرىغىچە تۆكۈلۈپ كەتكەن مېۋىلەرنى يىغىپ كۆيدۈرۈش لازىم؛ (3) چىلان يېپىشقاق قۇرتى: لىچىنكىسى ئاۋۋال نوتا، يۇمران يوپۇرماقنى يەپ، كېيىن يىپەكچە قۇسۇپ يوپۇرماقنى ئورۇۋالىدۇ. ئاندىن يوشۇرۇن زىيان سالىدۇ. ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىشتا: ① ئۆچەك-تىن چىقىشتىن بۇرۇن دەرەخ قوۋزىقىنى سويۇپ، قىشتىن ئۆتكەن قور-چاقلىرىنى يوقىتىش كېرەك؛ ② يېتىلگەن قۇرت قورچاقتىن چىقىش باسقۇچىدا، چىراغ نۇرى قاتارلىقلاردىن پايدىلىنىپ جەلپ قىلىپ يوقىد-

پۈركۈپ سۇغىرىش سېستىمىسىنى لايىھەلەشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

تاجىگۈل سەمەت

(ئانوش شەھىرى ئاغۇ يېزىلىق سۇ باشقۇرۇش پونكىتىدىن)
شىنجاڭنىڭ ھۆل - يېغىن مىقدارى ئىنتايىن ئاز، سۇنىڭ پارغا ئايلىنىشى كۈچلۈك بولۇپ، يېزا ئىگىلىكىدە پۈتۈنلەي سۇغىرىشقا تايىنىدۇ. سۇ بايلىق مەنبەسى رايونىمىزنىڭ يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىنى چەكلەپ تۇرىدىغان مۇھىم ئامىل بولۇپ، تېجەشلىك سۇغىرىش تېخنىكىسىنى قوللىنىش مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

1. ئالدى بىلەن ئۆلچەپ تەكشۈرۈش ماتېرىياللىرىنى توپلاش، يەر تۈزۈلەش، ھاۋا رايى، تۇپراق قاتارلىق تەبىئىي جۇغراپىيەلىك ئەھۋاللارنى، تىش لازىم؛ ③ دېسىمىنىڭ 600 - 800 ھەسسەلىك ئېرىتمىسىنى پۈركۈپ مۇداپىئەلىنىش كېرەك. (4) مېۋىلىك دەرەخ پارازىت قۇرتى ۋە چىلان پىتى: بۇلارنىڭ لىچىنكىسى ياكى يېتىلگەن قۇرتى چىلان دەرەخىنىڭ يوپۇرمىقى ياكى 1-2 يىللىق شېخىغا چاپلىشىپ، شاخ، يوپۇرماق، مېۋىدىكى شىرنىنى شوراپ، چىلان دەرەخىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، مېۋىسىنى تۈكۈۋېتىدۇ. ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىشتا: ① قىشتا چاتاشقا بىرلەشتۈرۈپ، كېسەللەنگەن شاخلارنى چاتاپ يىغىپ كۆيدۈرۈش كېرەك. ② كۈشەندىلەرنى قوغداش لازىم. (5) چىلان تىكەنلىك كېپىنكى، سېرىق تىكەنلىك كېپىنەك ۋە يېشىل تىكەنلىك كېپىنەك قاتارلىقلارمۇ چىلانغا زىيان سالىدۇ. بۇلارنىڭ لىچىنكىسى چىلان يوپۇرمىقىغا بەكرەك زىيان سالىدۇ. ئالدىنى ئېلىپ - يوقىتىشتا: ① كۈزدە دەرەخ تۈپى ئەتراپىدىكى تۇپراقنى ئاغدۇرۇپ، يېتىلمىگەن ھاشارلارنى مەركەزلەشتۈرۈپ يوقىتىش كېرەك؛ ② كۈشەندىلەرنى قوغداپ ئۇلاردىن پايدىلىنىش لازىم؛ ③ قىشلىق چاتاشقا بىرلەشتۈرۈپ يوقىتىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. (02)

جۈملىدىن زىرائەت تېرىش، ئېنېرگىيە مەنبەسى ۋە ئۈسكۈنە يەتكۈزۈپ بېرىش، مەمۇرىي رايونلارغا ئايرىش، ئەمگەك كۈچى، قاتناش ۋە تېخنىكا سەۋىيەسى قاتارلىق ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ئەھۋاللارنى ئاند-لىز قىلىش لازىم.

2. پۈركۈپ سۇغىرىشنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ زۆرۈرلىكى ۋە تېخنىكا ئىقتىدارى قاتارلىق جەھەتلەردىكى مۇمكىنچىلىكنى تولۇق مۆلچەرلەپ، سۇ ئىنشائات ئومۇمىي پىلانىنى بىر تۇتاش ئورۇنلاشتۇرۇپ، پۈركۈپ سۇ-غىرىش كۆلىمىنى بېكىتىش لازىم.

3. سۇغىرىش رايونىغا ماس كېلىدىغان سۇ مەنبەسى بىلەن تەمىنلەش-نىڭ ئىشەنچلىك دەرىجىسىنى ئانالىز قىلىپ، سۇ مەنبەسى قۇرۇلۇشى، سۇ ناسوسى، ھەر دەرىجىلىك سۇ يەتكۈزۈش تۈرۈپلىرىنىڭ ئورنى، پۈركۈش ئېغىزىنى ئورۇنلاشتۇرۇش شەكلى قاتارلىقلارنى ئالدىن بې-كىتىش لازىم.

4. ئۆز جايىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا ماس كېلىدىغان پۈركۈپ سۇغىرىش سىستېمىسىنى تاللاپ قوللىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەك.

5. سۇ يەتكۈزۈش تۈرۈپا يولىنىڭ سۇ ئېنېرگىيەسىنى ھېسابلاپ چى-قىپ، گۈرۈپپىلارغا بۆلۈپ نۆۋەت بىلەن سۇغىرىش شەكلىگە ئاساسەن، تىپىك قۇرۇلۇش ئەھۋالىنى بېكىتىش ھەمدە تۈرۈپا يولىدىكى سۇنىڭ پەسىيىش زىيىنى ھېسابلاپ، تۈرۈپا ماتېرىيالىنى تاللاش لازىم. سۇ ناسوسى ۋە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ موتور تىپىنى مۇۋاپىق تاللاش كېرەك.

6. قۇرۇلۇشنىڭ ئومۇمىي خامچوتىنى ئەستايىدىل ھېسابلاپ، يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن مەزمۇنلار بويىچە لايىھەنىڭ ئومۇمىي چۈشەندۈرۈلۈش ماتې-رىيالىنى يېزىپ چىقىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. (05)

ئەتىيازلىق سۇ باشلاشنىڭ تەييارلىق خىزمىتى ياخشى ئىشلەش كېرەك

ئەنۋەر تۇرغۇن

(ئاتۇش شەھىرى ئاغۇ يېزىلىق سۇ باشقۇرۇش پونكىتىدىن)

1. ئەتىياز كىرىشى بىلەن دېھقانچىلىق رايونلىرىدا ئېرىق - ئۆس - تەڭلەرگە سۇ باشلاپ، دېھقانچىلىق ئىشلىرىدا سۇغىرىش باشلىنىدۇ. شۇڭا سۇ باشقۇرۇش ئورۇنلىرى سۇ بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ھەر دەرىجىلىك سۇ يەتكۈزۈش ئېرىق - ئۆستەڭلەرنى ۋە سۇغىرىش رايونلىرىنىڭ سۇغىرىش كۆلىمى ۋە زىرائەت تورلىرىگە ئاساسەن، سۇ ھەققى يىغىش پىلانىنى تۈزۈپ چىقىپ، سۇ ئىشلەتكۈچى ئورۇنلارغا يوللاش، پىلان بويىچە سۇ بىلەن سۇ ھەققى يىغىش پىرىنسىپىنى ھەقىقىي ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك.

2. سۇغىرىشنى باشقۇرۇش ئورۇنلىرى سۇ ئىشلەتكۈچى ئورۇن بىلەن سۇ باشلاشتىن بۇرۇن ھەر دەرىجىلىك سۇ يەتكۈزۈش ئۆستەڭلىرىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىنى ۋە ئېرىق - ئۆستەڭ ئەسلىھەلىرىنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش كېرەك.

3. سۇ ئىنشائات قۇرۇلمىلىرىنى تەكشۈرۈش، مەنپەئەتلىگۈچى ئورۇنلاردىن ئەمگەك كۈچى نەشكىل قىلىپ، سۇ يەتكۈزۈش ئۆستەڭلىرىنى بىر قېتىم تازىلاپ، بۇزۇلغان ئورۇنلىرىنى رېمونت قىلىپ ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، سۇنىڭ راۋان ئېقىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.

4. سۇغىرىشنى باشقۇرۇش ئورۇنلىرى، ھەرقايسى سۇغىرىش رايونلىرىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالى ۋە ھاۋا كىلىماتىغا ئاساسەن، سۇ ئىشلەتكۈچى ئورۇنلارغا سۇ بىلەن تەمىنلەش ۋاقتىنى بەلگىلەپ ۋە ئۇلارغا ئۆتۈرۈش قىلىپ، سۇ ئىشلەتكۈچى ئورۇنلارنىڭ سۇ باشلاشقا تەييارلىق كۆرۈش خىزمىتىنى پۇختا ئىشلىشىگە يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك.

5. سۇ بىلەن تەمىنلەشتە، سۇغىرىشنى باشقۇرۇش ئورۇنلىرى ھەر - قايسى سۇغىرىش رايونلىرىدا سۇ يەتكۈزۈش، سۇ تەقسىملەش، قاپقاق، توما قاتارلىق ئەسلىھەلەرنى باشقۇرۇش قاتارلىقلارغا مەخسۇس خادىم بەلگىلەپ، ئۇلارنىڭ ۋەزىپىسىنى، مەسئۇلىيىتىنى ئېنىق ئايرىپ، ئىش ئورنى مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى تۇرغۇزۇپ، مەسئۇلىيەتنامە ئىمزا لاش لازىم.

6. تەقسىماتقا ۋە سۇ يەتكۈزۈپ بېرىشكە مەسئۇل خادىملار پىلان بويىچە سۇ تەقسىملەش ۋە سۇ يەتكۈزۈپ بېرىش ئىشلىرىنى توغرا، ئادىل ئىشلەپ، كۈندىلىك خاتىرە قالدۇرۇپ، سۇ تەمىنلەشنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىنى ئىشلەتكۈچى ئورۇنلارغا ۋاقىتدا خەۋەردار قىلىپ تۇرۇش لازىم.

شىنجاڭ رايۇنىمىزنىڭ تۆت پەسىل ئېنىق ئايرىلغان بولۇپ، ھاۋا تەم - پىرائۇرسى تۆۋەنلىگەندە دەريا، ئېرىق - ئۆستەڭلەرنىڭ توما - تاقاق، چىمىرىق ئۆسكىنىلىرى توڭلاپ، نورمال سۇ تەڭشەش ئىشلىرىغا زور تەسىر - لەرنى كۆرسىتىدۇ. سوغۇقنىڭ تەسىرىدە توما - تاقاقلار، چىمىرىق ئۆسكىنىلىرىنىڭ سىلىقلاش مايللىرى توڭلاپ قېلىپ، توما - تاقاقلارنىڭ ئوقۇ - رىدا مۇز تۇتۇپ، سۇ ئۆستىدىكى مۇزلارنىڭ توما - تاقاقلارغا سوقىلىشى ھەمدە تاقاق ئالدى - كەينىدىكى مۇزلارنىڭ تاقاق بىلەن بىر گەۋدە بولۇپ، چىمىرىقلارنى ئايلاندۇرۇش، تاقاقلارنى كۆتىرىپ بېسىشتا ئەسلى لاھىيەدە - كى ئېغىرلىق كۆتىرىش كۈچىدىن زور دەرىجىدە ئېشىپ كېتىپ، تاقاقلار - نى كۆتىرەلمەسلىك، مەجبۇرى كۆتۈرگەندە توك يوللىرى ۋە توك ئۆسكۈنى - لىرىنى كۆيدۈرۈۋېتىش، چىمىرىق بىلەن تاقاقنى ئۇلاپ تۇرغۇچى ئۆسكۈ - نىلەرنى بۇزۇش، ئېگىۋېتىش، قاتارلىق ھادىسىلەر كېلىپ چىقىدۇ. يۇقىرىدا ئېيتىلغان نورمالسىز كاشىلىلار تۈپەيلىدىن ئېرىق - ئۆستەڭلەرنى ئىش -

9. سۇغىرىشنى باشقۇرۇش ئورۇنلىرى ئۆۋەنگە قارىتا پىلانلىق سۇ ئىشلىتىش، سۇنى تېجەپ ئىشلىتىش، بىخەتەر ئىشلىتىش، سۇدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، ئۆز ۋاقتىدا سۇ ھەققى تاپشۇرۇش، سۇ قانۇنىنى تەشۋىق قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە تەشۋىقاتنى كۈچەيتىپ، كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ پىلانلىق سۇ ئىشلىتىش، سۇنى تېجەپ ئىشلىتىش ئىگىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش لازىم. (05)

لىتىنىگە ئېغىر تەسىر كۆرسىتىدۇ، شۇڭا مۇنۇ خىزمەتلەرنى ياخشى ئىش-
لەش كېرەك.

1. سۇ ئۆتكۈزۈشتىن بۇرۇن توم - تاقاق، چىغىرىق ئۈسكىنىلەرنىڭ
مېخانىك قىسمى، توك يوللىرىنى، سۇ ئىنشائات قۇرۇلمىلىرىنى ئومۇم-
يۈزلۈك تەكشۈرۈپ، مەسىلە كۆرۈلسە رېمونت قىلىپ، توما - تاقاق ئۈس-
كىنىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.

2. چىغىرىقلارنى توڭلاشقا چىداملىق سىلىقلاش مېيى بىلەن سىلىقلاش لازىم.
3. يەر ئاستى سۈيىنىڭ تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى بولۇش ئەۋزەللىكىدىن
پايدىلىنىپ، شارائىتى بار ئورۇنلار يەر ئاستى سۈيى ئارقىلىق توما - تا-
قالتىكى قېلىن مۇزلارنى ئەمەلىي ئەھۋالغا ئاساسەن قەرەللىك ئېرىتىپ،
تاقاق بىلەن ئوقۇرنىڭ توڭلاپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

4. قايناقسۇغا تۈز قوشۇپ (%20 لىك تۈز سۈيى تەييارلاپ)، توما -
تاقاقلارنىڭ توڭلىغان قىسمىغا تۈز سۈيىنى قۇيۇش ياكى تېمىتىپ بې-
رىش كېرەك، بۇنىڭ تاقاق ئەتراپىدىكى مۇزلارنى ئېرىتىشتە بەلگىلىك
ئۈنۈمى بار.

5. مەشغۇلات ئېلىپ بارغاندا ھاۋا تېمپېراتۇرىسىنىڭ يۇقىرى ياكى تۆ-
ۋەنلىكىگە ئاساسەن، قەرەللىك ھالدا چىغىرىق ۋە تاقاقلارنى ھەرىكەتلەندۈ-
رۈپ تۇرغاندا، بەلگىلىك مۇددەت ئىچىدە نورمال مەشغۇلات قىلىشقا كاپا-
لەتلىك قىلغىلى بولىدۇ.

6. توما، چىغىرىقلار قويۇلغان جايىنى ئىسسىق ساقلاشقا ئەھمىيەت بې-
رىپ، شۇ جايدىكى چىغىرىقنىڭ ھەرىكەتچان قىسمىنىڭ توڭلاپ قېلىشىنىڭ
ئالدىنى ئېلىش لازىم.

7. ئەگەر بەك سوغاق كۈنلەردە يۇقىرىقى ئۇسۇللارنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈل-
مىگەندە، ئادەم كۈچى بىلەن توما - تاقاقلارنى قول بىلەن ھەرىكەتلەندۈ-
رۈپ، تاقاقنى مەلۇم ئېگىزلىكىچە كۆتۈرگەندىن كېيىن ئاندىن توك بىلەن
ھەرىكەتلەندۈرۈش لازىم.

8. توما تاقاقلارنىڭ توڭلاش قىسمىغا سولىدۇل مېيىنى سۈرۈش ئارقى-
لىق، مايغا سۇ يۇقماسلىق خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىپ توڭلاشنىڭ ئالدى-
نى ئېلىش كېرەك. (05)

تەللىرىنىڭ ئىشى A تەللىرىنىڭ ئىشى ۋە تەللىرىنىڭ ئىشى

قەلبىنۇر ئابدۇرېھىم

(يەكەن ناھىيە مىشا يېزىلىق چارۋىچىلىق، مالدوختۇرلۇق پونكىتىدىن)

ۋىتامىن A تۆللەرنىڭ كۆرۈش سېزىمىنى ساقلاش، ئۆسۈپ يېتىلىشنى تېزلىتىش، كۆپىيىش ۋە نېرۋا سىستېمىسىنىڭ فۇنكسىيەسىنى ساقلاش، ھەزىم قىلىش، نەپەسلىنىش، سۈيدۈك ئاجرىتىش، كۆپىيىش يوللىرىدىكى شىللىق پەردە ھەم مۇڭگۈزلۈك پەردىلەرنىڭ ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىلىرىنىڭ نورماللىقىنى ساقلاش ۋە ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە كەم بولسا بولمايدۇ.

1. كېسەللىك سەۋەبى: بۇ كېسەللىك ئاساسەن چىشى ماللارنى قىش ۋە ئەتىيازدا ئۇزاق مۇددەت سامان غوللۇق، يىرىك قۇرۇق ئوت - چۆپ بىلەن بېقىش ياكى چىگىت كۈنجۈرىسى، كونا شاخ - شۇمبا قاتارلىق تەركىبىدە ۋىتامىن A كەمچىل بولغان ئۇزۇق بىلەن بېقىشتىن، تۆللەر ئۆزىگە كېرەكلىك بولغان ۋىتامىنلارنى ئانىلىق مال تېنىدىن قوبۇل قىلالماي، شۇنداقلا چىشى ماللارنىڭ بوغازلىق ۋە سۈت ئېمىتىش مەزگىلىدە جىگەر - دە زاپاس ۋىتامىن A نىڭ زىيادە خورىشىدىن تۆللەردە ۋىتامىن A يېتىش - مەسلىك كېلىپ چىقىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تۆللەردە قېرىن ۋە ئۈچەي كېسەللىكلىرى كۆرۈلگەندە، ۋىتامىن A نىڭ سۈمۈرۈلۈشى تەسىرگە ئۇچراش سەۋەبىدىن ۋىتامىن A يېتىشمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ.

2. كېسەللىك ئالامىتى: تۆللەردە ۋىتامىن A يېتىشمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ. ئىلىيە قەۋەت مۇڭگۈزلىشىش، نامازشام قارىغۇسى، ئۆسۈپ يېتىلىشى ئاس - تىلاش، ھەزىم ناچارلىشىش، دائىم ئىچى سۈرۈش، تېزىكىگە شىلىمىش سۈيۈقلۈقلەر ئارىلىشىپ كېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا دائىم كاناي يالغۇسى بولۇپ يۆتىلىش، نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىش، تەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەش، يۈرەك ھەرىكىتى تېزلىشىش، بۇرىندىن شىلىمىش ياكى يىرىڭلىق ئاجرىمىلار ئېقىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كېسەللىكلىرى كۆرۈلگەندە، ۋىتامىن A نىڭ سۈمۈرۈلۈشى تەسىرگە ئۇچراش سەۋەبىدىن ۋىتامىن A يېتىشمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ.

سەللەنگەن تۆل ئورۇقلايدۇ، يۇڭلىرى پاخىيىپ پارقراقلىقنى يوقىتىدۇ. كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجزلايدۇ، تېرىسى قۇرغاق ھەم يىرىكىلىشىدۇ، ماڭا-خاندەلدەڭشىپ ماڭىدۇ، كېسەللىك ئېغىرلاشقاندا ئۆلىدۇ.

3. دىياگنوز قويۇش: كۆزنىڭ كېسەللىك ئۆزگىرىشى (نامازشام قا-رىغۇسى ۋە مۇڭگۈزلۈك پەردىنىڭ يۇمشىشى) بىلەن مەركىزىي نېرۋىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى ۋە يۈز نېرۋىسىنىڭ پالەچلىنىشى ھەم كۈندىلىك بېرىلىدىغان ئوزۇقلۇق راتسىيونىنى تەھلىل قىلىش ۋە كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرىگە ئاساسەن دىياگنوز قويۇلىدۇ.

4. ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش: (1) بوغاز ماللارنى بوغازلىقنىڭ ئوتە-تۇرا ۋە ئاخىرقى مەزگىلىدە تەركىبىدە ۋىتامىن A مول بولغان يەم - خەشەكلەر، مەسىلەن: كۆممىقوناق، بېدە، سەۋزە، كاۋا قاتارلىقلار بىلەن بې-قىشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك؛ (2) تۆللەر تۇغۇلۇپ 1 - 3 ئايلىق بول-غىچە يەم - خەشەككە مۇۋاپىق مىقداردا بېلىق مېيى قوشۇپ بېرىش، چى-شى مال ۋە تۆللەرگە شىرنىلىك يەم - خەشەك ۋە سىلوسلانغان يەم - خە-شەكلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا بېرىش كېرەك؛ (3) تۆللەرنى بېقىپ باشقۇ-رۇشنى ياخشىلاش بىلەن بىرگە ۋىتامىن AD ئوكۇلى قۇلۇن، موزايلارغا 2 - 3 مىللىلىتىردىن، قوزا - ئوغلاقلارغا 0.5 - 1 مىللىلىتىردىن كۈندە بىر قېتىمدىن ساقايغىچە ئوكۇل قىلىندۇ. (4) بېلىق مېيىدىن قۇ-لۇن، موزايلارغا 5 - 10 مىللىلىتىردىن، قوزا - ئوغلاقلارغا 2 - 3 مىللى-لىتىردىن كۈنىگە بىر قېتىمدىن ساقايغىچە ئىچكۈزۈش لازىم؛ (5) كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئالدى بىلەن كۆزنى 0.9% لىك فىزىيولوگىيەلىك تۇز سۈيىدە پاكىزە يۇيۇپ، ئاندىن كورتىزون ئاتسېتات مەلھىمى (可的松醋酸软膏) نى كۈندە ئىككى قېتىمدىن ئۇدا بىرقانچە كۈن سۈرۈش كېرەك؛ (6) يۈرەك ھەرىكىتىنى نورماللاشتۇرۇپ، ئىچى سۈ-رۈشنى توختىتىش ئۈچۈن كوففىئىن ناترىي بىنزوات (安纳咖) ئوكۇل-دىن قۇلۇن، موزايلارغا 2 - 3 مىللىلىتىردىن، قوزا، ئوغلاقلارغا 0.5 - 1

چارۋىلارنى تۇرۇشلۇق ئىشلىرىنىڭ ئىشلىرى ۋە مەلۇماتى

جىمەنگۈل زۇنۇن مەككەرەم مەمەت

(قەشقەر شەھىرى دۆلەتباغ يېزىلىق چارۋىچىلىق، مالدوختۇرلۇق پونكىتىدىن)
تۇخۇمدان خالتىلىق ئىشلىرىنى چارۋىلاردا كۆپرەك ئۇچرايدىغان كېسەل-
لىكلەرنىڭ بىرى ھېساپلىنىدۇ. كېسەللەنگەن چىشى چارۋىلاردا داۋاملىق
كۈيلەش، رېتىمىز كۈيلەش ياكى پەقەت كۈيلىمەسلىكتەك ئەھۋاللار كۆ-
رۈلىدۇ. تۇخۇمدان خالتىلىق ئىشلىرىنى فولىكوللا خالتىلىق ئىشلىرىنى ۋە
سېرىق تەنچە خالتىلىق ئىشلىرىنى دەپ ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدىغان بولۇپ،
بۇنىڭ ئىچىدە فولىكوللا خالتىلىق ئىشلىرىنى كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.

1. كېسەللىك سەۋەبى: بېقىپ باشقۇرۇش ياخشى بولماسلىق، مەلۇم
كېسەللىك سەۋەبىدىن مېڭە ھىپوفىز ئالدى ياپراقچىسى ئاجرىتىپ چىقار-
غان مېتاكېنترىن (促黄体素) ھورمۇنى يېتىشمەسلىك ياكى فوللىترو-
پىن (促卵泡激素) نىڭ كۆپلەپ ئاجرىتىپ چىقىرىلىشى سەۋەبىدىن فول-
كوللا ھەددىدىن زىيادە چوڭىيىپ، نورمال تۇخۇم ئاجرىتىپ چىقىرىلماي،
فولىكوللا خالتىلىق ئىشلىرىنى پەيدا بولىدۇ. تۇخۇم ئاجرىتىپ چىقارغاندىن
كېيىن سېرىق تەنچە ئىچىدە كاۋاكچە ھەم سۇ پەيدا بولۇش سەۋەبىدىن سې-
رىق تەنچە ئىشلىرىنى پەيدا بولىدۇ.

مىللەتلەردىن كۈنىگە بىر قېتىمدىن ئۇدا بىرقانچە كۈن ئوكۇل قىلىش
لازىم. ئىچى سۈرۈشنى توختىتىشتا يەنە گىنتامىتسىن (庆大霉素) دىن
قۇلۇن، موزايىلارنىڭ ھەر كىلوگرام تىرىك ئىغىرلىقى ئۈچۈن 15 - 20
تۈمەن خەلقئارا بىرلىك، قوزا، ئوغلاقلارغا 5 - 10 تۈمەن خەلقئارا بىرلىك-
نى مۇسكۇلدىن كۈندە ئىككى قېتىم ئوكۇل قىلىشمۇ ياكى ئىچكۈزۈشمۇ
بولىدۇ ياكى سامساق تىنىكتۇرسى (大蒜酞) دىن قۇلۇن، موزايىلارغا 30 -
50 گىرام، قوزا، ئوغلاقلارغا 5 - 10 گىرامنى 1 - 2 قېتىم ئىچكۈزۈسە
ھەزىم قىلىشى ياخشىلىنىپ، ئىچ سۈرۈشى توختايدۇ. (02)

2. كېسەللىك ئالامىتى: (1) فوللىكولا خالتىلىق ئىششىقى: بۇنىڭدا ئاساسلىقى ئۇدا ياكى ئارقا - ئارقىدىن كۈيلىيدۇ، ھەۋسى كۈچىيدۇ، قۇيرۇقىنى ئېگىز كۆتۈرۈۋالىدۇ، جىنسىي لەۋ ئىششىيدۇ ھەم سۇيۇقلۇق ئېقىپ تۇرىدۇ، ئىشتىھاسى تۈتۈلۈپ ئورۇقلايدۇ. توغرا ئۈچەيدىن قول سېلىپ تەكشۈرگەندە تۇخۇمداننىڭ چوڭىيىپ قالغانلىقى، ئۈستىدە 1 - 2 خالتىلىق ئىششىقنىڭ بارلىقى ياكى نۇرغۇنلىغان كىچىك فوللىكولا بارلىقى بىلىنىدۇ، لېكىن تۇخۇم ئاجرىتىپ چىقىرالمىدۇ. (2) سېرىق تەنچە خالتىلىق ئىششىقى: بۇ خىل ئەھۋالدا كۈيلىمەيدۇ، توغرا ئۈچەيدىن تەكشۈرگەندە سېرىق تەنچە ھەجىمىنىڭ چوڭايغانلىقى بىلىنىدۇ.

3. داۋالاش: (1) گونادوتروپىنى قويغۇزۇۋەتكۈچى ھورمۇن (促性腺释放激素) دىن 400 - 600 گرام ئىنەككە مۇسكۇلدىن ھەر كۈنى بىر قېتىم ئۇدا 1 - 4 كۈن ئۆكۈل قىلىنىدۇ. لېكىن ئومۇمىي مىقدارى ئۈچ كىلوگرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. ئادەتتە دورا ئىشلىتىپ 25 - 30 كۈنگىچە خالتىلىق ئىششىق ئاستا - ئاستا يوقاپ، تۇخۇم ئاجرىتىپ چىقىرىشى ئەسلىگە كېلىپ، نورمال كۈيلىيدۇ؛ (2) خورئونىك گونادوتروپىن (绒毛膜促性激素) سېرىق تەنچىنىڭ شەكىللىنىشىنى تېزلىتىش رو - لىغا ئىگە بولۇپ، كالا، ئاتلارغا 2500 - 3000 تۈمەن بىرلىك ۋېنادىن ئۆكۈل قىلىنىدۇ ياكى قورساق دىۋارىدىن ياكى جىنسىي يول گۇمبىزىدىن خالتىلىق ئىششىق ئىچىگە كىرگۈزۈش بولىدۇ؛ (3) مېتاكېنتىرىن (促黄体素) نى كالىلارغا بىر قېتىمدا 100 - 200 تۈمەن بىرلىك، ئاتلارغا 200 - 400 تۈمەن بىرلىكنى مۇسكۇلدىن ئۆكۈل قىلسا بولىدۇ. ئادەتتە 3 - 6 كۈندە خالتىلىق ئىششىق كىچىكلەپ، 15 - 30 كۈندە ئەسلىگە كېلىدۇ.

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان دورىلار فوللىكولا خالتىلىق ئىششىقى ۋە سېرىق تەنچە خالتىلىق ئىششىقىنى داۋالاشقا ئۇچۇشلا ماس كېلىدۇ. فوللىكولا خالتىلىق ئىششىقىنى داۋالاشقا پروگىستېرون (黄体酮) دىن 50 - 100 مىللىگرامنى مۇسكۇلدىن ئۇدا 14 كۈن ئۆكۈل قىلىش مۇۋاپىق ياخشى بولىدۇ. (02)

تۇرۇپ چىچەك كېسەللىك ئالامىتى ئىلىك ئىشى ۋە دىۋاللىق

نەزەمىدىن ئابدۇرېھىم

(يەكەن ناھىيە ياقىرىق يېزىلىق چارۋىچىلىق، مالدوختۇرلۇق پونكىتىدىن)
1. كېسەللىك سەۋەبچىسى: بۇ كېسەل ئەتىياز پەسلى كۆپ كۆرۈلدى. دۇ. ئاساسلىقى بېقىپ - باشقۇرۇشنىڭ ياخشى بولماسلىقى، يەم - خەشەك - تىكى ھەر خىل ئېھتىياجلىق ئوزۇقلۇق تەركىبلىرىنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقى، توخۇخانا ئەملىكىنىڭ ئۆۋەن، ھاۋا ئالمىشىشنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقى، تازىلىق ناچار بولۇش، توخۇلارنىڭ ئۆزئارا بىر - بىرىنى چوقۇشى ۋە قان شورۇغۇچى پارازىتلار (توخۇ پىتى) بىلەن يۇقۇملىنىپ، كېسەللىك قوزغاتقۇچى چىچەك ۋىروسىنىڭ توخۇنىڭ تېرە ۋە شىللىق پەردىلىرىدىكى جاراھەت ئېغىزى ئارقىلىق يۇقۇملاندۇرۇشىدىن پەيدا بولىدۇ.

2. كېسەللىك ئالامىتى: بۇ كېسەلنىڭ يوشۇرۇن دەۋرى 3 - 7 كۈن ئەتراپىدا بولۇپ، تېرە تىپلىق ۋە شىللىق پەردە تىپلىق دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. (1) تېرە تىپلىق چىچەك كېسەلگە گىرىپتار بولغان توخۇنىڭ تال - جىسى، گۆش ساقىلى، كۆز، قاپاقلىرى، پۇتى ۋە تېنىنىڭ پەي يوق جايلىرىدا سۇر، ساغۇچ سۇر ياكى بېغىررەڭ چىچەك قاپارتقۇچىسى پەيدا بولىدۇ. كېيىنچە بۇ قاپارتقۇچىلار ئېغىز ئېلىپ قاقچىلىنىپ چۈشۈپ كېتىدۇ، جايلىق ئورۇن ئېقىش تارتۇق بولۇپ قالىدۇ. كېسەللىك ئېغىر بولغاندا ئىشتىھاسى تۇتۇلۇپ روھسىزلىنىدۇ، تەن تېمپېراتۇرىسى ئازراق ئۆرلەيدۇ. مىكسانلاردا تۇخۇم تۇغۇشى ئازلايدۇ ياكى 3 - 4 ھەپتىگىچە تۇخۇم تۇغۇشتىن توختاپ، كېيىنچە ئۆزلىكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ؛ (2) شىللىق پەردە تىپلىق چىچەك كېسەللىكى كۆپىنچە كىچىك ۋە ئارا چۈچىلەرگە كۆپرەك يۇقىدۇ. يۇقۇملانغان چۈچىنىڭ ئېغىزى، بۇرۇن بوشلۇقى ۋە كېكىرتەك شىللىق پەردىسىدە رەڭگى ئاق نۇرغۇن توچكىلار پەيدا بولىدۇ. كېيىنچە بۇ ئاق توچكىلار يوغىناپ، بىر - بىرى بىلەن قوشۇلۇپ، سېرىق ئېرىمچىك -

سىمان نىكرۇزلۇق ماددىلارغا ئايلىنىپ، ساختا پەردىگە ئوخشاپ قالىدۇ. ئەگەر بۇ چاغدا كېسەللىك ئەھۋالى تېخىمۇ ئېغىرلاشسا، نەپەس ۋە يۇتۇش قىيىنلىشىپ، يەم يېمەي ئورۇقلاپ، ئاخىردا ئۆلۈپ قالىدۇ.

3. داۋالاش: ئادەتتە تېرە تىپلىق توخۇ چېچىكىنىڭ كەلتۈرىدىغان خەۋپى تۆۋەن بولغاچقا داۋالاش بىھاجەت. شىللىق پەردە تىپلىق توخۇ چېچىكىنى داۋالاش ئاساس قىلىنىدۇ. داۋالاشتا: (1) كېسەللەنگەن توخۇلارنى ۋاقىتدا ئايرىپ سولاپ، ئېغىز بوشلۇقى شىللىق پەردىسىدىكى قاپارتقۇچ ۋە قاقچىلارنى قىسقۇچ بىلەن سويۇپ ئېلىۋېتىپ، %0.9 لىك فىزىيولوگىيەلىك تۇز سۈيىدە ياكى %1 لىك مارگانىسوپ ئېرىتمىسى بىلەن يۇيۇپ تاللاپ، ئاندىن %2 لىك يود تىنىكتۇرىسى (碘酊) ياكى %2 لىك كاربونات كىسلاتا مەلھىمى (碳酸软膏) نى كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 3 - 5 كۈن سۈرۈش كېرەك؛ (2) كۆز قىسمى ئىششىغان ھەم كۆز قارىچۇقى زەخمىگە ئۇچرىمىغان توخۇلارنىڭ كۆز قىسمىدىكى يىرنىڭ ۋە ئېرىمچىككە ئوخشاش سىرغىتمىلارنى %2 لىك بورات كىسلاتا سۇيۇقلۇقى (硼酸液) بىلەن تاللاپ، ئاندىن %5 لىك دەنبەيىن ئېرىتمىسى (蛋白银溶液) نى كۆزىگە كۈندە 1 - 2 قېتىمدىن ئۇدا 3 - 5 كۈن تېمىتىش لازىم؛ (3) كېسەللىك ئېغىر توخۇلارغا قارىتا ئىچىدىغان سۈيىگە كۈندە بىر قېتىمدىن موروگىد (病毒灵) پاراشوكى قوشۇپ بەرسىمۇ ياكى مۇسكۇلغا كۈنىگە بىر قېتىمدىن ئۇدا 3 - 5 كۈن ئوكۇل قىلىسمۇ بولىدۇ.

4. ئالدىنى ئېلىش: بېقىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، توقۇلۇق ماددىلارغا بولغان ئېھتىياجىنى قامداش، قەرەللىك دېزىنڧېكسىيە قىلىپ، كېسەللىك تارقىلىشتىن بۇرۇن توخۇ چېچەك كېسىلىنىڭ ئاجىز توكسىنلىق ۋاكسىنىسىنى ياكى ئاقسىل قوشۇلغان ئاجىز توكسىنلىق ۋاكسىنىنى ئۇرۇش ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش كېرەك. (02)

موزاي چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېرىيە كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش - داۋالاش

روزىگۈل ئەخمەتنىياز

(خوتەن شەھىرى توساللا يېزىلىق چارۋىچىلىق، مالدوختۇرلۇق پونكىتىدىن)

1. كېسەللىك سەۋەبچىسى: موزاي چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېرىيە كېسەللىكى (كولباتسىلۇز) موزاي ئاقچىشقا كېسەللىكى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ كېسەللىك چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېرىيەسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بىر خىل ئۆتكۈر خاراكتېرلىك يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، قان چىرىش، ئۆتكۈر ئىچى سۈرۈش ۋە سۇسىزلىنىش بىلەن ئالاھىدىلىنىدۇ. ئاساسلىقى ھەزىم قىلىش يولى ئارقىلىق يۇقىدۇ، بالىياتقۇ ۋە كىندىكىنىڭ يۇقۇملىق نىشى ئارقىلىقمۇ يۇقىدۇ، بىر ھەپتىلىك ئىچىدىكى يېڭى تۇغۇلغان موزايىلاردا ئەڭ كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇ كېسەللىك قىش ۋە ئەتىياز پەسىللىرىدە يۇقىرى پەللىگە يېتىدۇ. بۇ كېسەللىكنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى موزاي تۇغۇلۇپ ۋاقىتدا ئوغۇز سۈتى ئىمەلمەسلىك ياكى ئەمگەن ئوغۇز سۈتى ئاز بولۇش، موزاينىڭ كېسەللىككە قارشى تۇرۇش كۈچىنىڭ تۆۋەن بولۇشى، ھەزىم قىلىش فۇنكسىيەسىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. ئۇندىن باشقا قوتان نەملىكىنىڭ يۇقىرى بولۇشى، كۈن نۇرى يېتەرلىك چۈشمەسلىك، كىندىك كەسكەندە ياخشى دېزىنېفېكسىيە قىلماسلىق قاتارلىقلار بۇ كېسەللىكنى قوزغىتىدۇ.

2. كېسەللىك ئالامىتى: ئۆتكۈر خاراكتېرلىك موزاي چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېرىيە كېسەللىكىنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئۈچ تىپى بولىدۇ. (1) قان چىرىش تىپى: بۇ خىل تىپى ئاساسلىقى تۇغۇلۇپ ئۈچ كۈنلۈك ئىچىدىكى موزايىلاردا كۆرۈلۈپ، كېسەللىك ئۆتكۈر، كېسەللىك جەريانى قىسقا بولىدۇ. كېسەللەنگەن موزاينىڭ تەن تېمپېراتۇرىسى 41°C - 41.5°C قا چىقىدۇ ياكى تۆۋەنلەپ 30°C قا چۈشۈپ قالىدۇ، ئاياغلىرى ماغدۇرسىزلىنىپ دائىم دېگۈدەك يېتىۋالىدۇ، ئورنىدىن تۇرالمايدۇ، سۈت ئەمەيدۇ، كۆپىنچە موزايىلارنىڭ سۈدەك ئىچى سۈرىدۇ. تېزىكى ئاقۇش سېرىق ياكى ساغۇچ يېرىدۇ.

شىل كېلىدۇ. ئىچى سۈرگەن موزايلارنىڭ تېزىكى لىمون رەڭدە بولۇپ، قۇرغاق ۋە قان ئارىلاشقان بولىدۇ. بۇ خىل تىپ ئوغۇز سۈت ئىمەلمىگەن موزايلاردا بولىدۇ. چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېرىيەسى ئۈچەيدىن بىۋاسىتە قانغا ئۆتۈپ قاننى چىرىتىدۇ، كېسەللەنگەن موزايلار بىر كۈن ئىچىدە ئۆلۈپ قالىدۇ؛ (2) ئۈچەي تىپى: بۇ خىل تىپى ئاساسلىقى ئىچى سۈرۈش بىلەن ئالاھىدىلىنىدۇ. كېسەللەنگەن موزاي خامۇشلىنىدۇ، تەن تېمپېراتۇرىسى ئازراق ئۆرلەيدۇ. كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە تېزىكى ئاچ سېرىق كېلىدۇ. كېيىنرەك ئاچ كۈل رەڭگە ئۆزگىرىپ سۈدەك ئىچى سۈرىدۇ. سۈت ئۇيۇندىلىرى، قان يىپىچىلىرى ۋە گازلىق كۆپۈكچىلەر ئارىلىشىپ كېلىدۇ. كېسەللىك ئالامىتى ئېغىر بولغان موزايلار سۇسىزلىنىپ ياكى ئۆپكە ياللىغىغا ئاسارەتلىنىپ ئۆلۈپ قالىدۇ؛ (3) زەھەرلىنىش تىپى: بۇ خىل تىپ بىلەن كېسەللەنگەن موزايلاردا تىپىك كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمەيلا تۇيۇقسىز ئۆلۈپ قالىدۇ. كېسەللىك جەريانى سەل ئۇزۇنراق بولغان موزايلاردا تىنچسىزلىنىش، بويىنى تارتىشىپ قېلىش، ھوشىدىن كېتىش قاتارلىق زەھەرلىنىش خاراكتېرلىك نېرۋا ئالامەتلىرى كۆرۈلۈپ ئۆلۈپ قالىدۇ.

3. ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى: (1) بوغاز ئىنەكلەرنى بېقىش - باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، تۇغقاندىن كېيىن يېتەرلىك ئوغۇز سۈت ئاجرىد. تىپ چىقىرىشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك؛ (2) موزاي تۇغۇلۇپ 30 كۈن ئىچىدە يېتەرلىك ئوغۇز سۈت ئىمىشىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك؛ (3) تۇغۇتخانىنىڭ قۇرۇق، پاكىز، ئازادە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، تۆل ئېلىشتىن بۇرۇن تۇغۇتخانىلارنى ئۈزۈل - كېسىل دېزىنېكسىيە قىلىش، ئىنەكنىڭ يېلىن تازىلىقىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك؛ (4) موزايلارنىڭ كىندىكىنى كەسكەندە دېزىنېكسىيەلەشنى ياخشى ئىشلەپ، كىندىكنىڭ يۇقۇملىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

4. داۋالاش: بۇ كېسەللىكنى داۋالاش پىرىنسىپى ئانتىبىيوتىكىلىق

دورلارنى ئىشلىتىپ كېسەللىكنى تىزگىنلەپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش، ئاش-قازان - ئۈچەي فۇنكسىيەسىنى تەڭشەش ئارقىلىق ساغلاملىقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت. داۋالاشتا خىلرومتىسىن (氯霉素)، تېررامىتسىن (土霉素)، سترېتومىتسىن (链霉素) ياكى نېئومىتسىن (新霉素) قاتارلىق ئانتىبىيوتىكلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. ئېغىزدىن ئىچكۈزگەندە دەسلەپتە ھەر كىلوگرام تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 30 - 50 مىللىگرام، 12 سائەتتىن كېيىن يېرىمى ئازايتىلىپ ئۇدا 3 - 5 كۈن ئىچۈرۈلىدۇ. مۇسكۇلىدىن ئوكۇل قىلغاندا ھەر كىلوگرام تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 10 - 30 مىللىگرامدىن ھېسابلاپ، كېسەللىك ئالامىتى يېنىكلىگەنگە قەدەر ئوكۇل قىلىنىدۇ.

سۇيۇقلۇق تولۇقلاشتا 5% لىك گىلۇكوزىلىق فىزىيولوگىيەلىك تۇز سۈيى (葡萄糖生理盐水) ياكى مۇرەككەپ ناترىي خىلور (复方氯化钠) دىن 1000 - 1500 مىللىلىتىر ۋېنادىن ئوكۇل قىلىنىدۇ. زەھەرلىنىش ئالامىتى كۆرۈلگەندە 5% لىك ناترىي كاربونات سۇيۇقلۇقى (碳酸氢钠液) دىن 80 - 100 مىللىلىتىر ۋىنادىن ئوكۇل قىلىنىدۇ.

ئاشقازان - ئۈچەي فۇنكسىيەسىنى تەڭشەشتە، سۈت كىسلاتاسى (乳酸) دىن ئىككى گىرام، ئىختىيول (鱼石脂) دىن 20 گىرام ئېلىپ، ئۇنىڭغا 90 مىللىلىتىر سۇ قوشۇپ تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، ھەر قېتىمدا بەش مىللىلىتىردىن كۈنگە 2 - 3 قېتىم ئىچۈرۈلىدۇ. ئاشقازان - ئۈچەي شىللىق پەردىسىنى مۇھاپىزەت قىلىپ، زەھەرنىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى ئازايتىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى دورىلارنىڭ بىرسى تاللاپ ئىچۈرۈلىدۇ. بىسمۇت سوبىنترات (次硝酸铋) دىن 5 - 10 گىرام، ئاكتىپلاشتۇرۇلغان كۆمۈر (活性炭) 10 - 20 گىرام، چىنە توپىسى (白陶土) دىن 50 - 100 گىرام ئىشلىتىلىدۇ. ئاشقازان - ئۈچەي مىكرو ئورگانىزىملىرىنىڭ تەڭ-پۇڭسىزلىقىنى ساقلاش ئۈچۈن لاکتازىن (乳酶生) دىن ھەر قېتىمدا 5 - 10 تابلەتكا، كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچۈرۈلىدۇ. (02)

يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى داۋانغا چىققاندا ۋە چۈشكەندە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار

زۆھرە گۈل ھەسەن

(ئۆچتۈرپان ناھىيە ياكۇۋۇرۇك يېزىلىق يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى پونكىتىدىن)
يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى داۋانغا چىققاندا ياكى چۈشكەندە داۋاننىڭ يانتۇلۇق دەرىجىسى، ماشىنىنىڭ يۈكلىنىش ئەھۋالى، ماشىنىنىڭ ھەرقايسى قىسىملىرىنىڭ ئىشلەش ھالىتى، پىرىتسىپ چاتقان - چاتمىغانلىقى قاتارلىق ئەھۋاللارغا قاراپ مۇناسىپ تەدبىرلەرنى قوللىنىش كېرەك.

1. يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى تولۇق يۈكتە تىك داۋانغا چىق - قاندا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم نۇقتىلار: (1) يۇقىرى خوتتا مايىنى كۈچەپ دەسسەپ، مەجبۇرىي يۇقىرىغا ئۆرلەشتىن ساقلىنىش لازىم. شوپۇرلار داۋانغا چىققاندا يۇقىرى خوتتا تېز سۈرئەتتە چىقىپ بو - لۇشنى مەقسەت قىلىپ كۈچلۈك ماي دەسسەگەندە، سىلىندىرغا كىرىدىغان ئارىلاشما گاز ئېقىمى ئازلاپ، كۆيگەن يالقۇننىڭ تارقىلىش سۈرئىتى ئاس - تىلاپ، ئاسانلا پارتلاپ كۆيۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن موتور - نىڭ يۈكى ئېشىپ كېتىپ، ئاسانلا كاھىش كۆيۈش ياكى ئەگرى ئوق ئۈزۈ - لۈش قاتارلىق ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا، تولۇق يۈكتە داۋانغا چىققاندا چوقۇم ۋاقىتدا خوت ئورنىنى تۆۋەنلىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، مايىنى مۇۋاپىق ئازايتقاندا موتور قۇۋۋىتى ئېشىپ، ماشىنا ئوڭۇش - لۇق ھالدا داۋانغا چىقالايدۇ؛ (2) داۋانغا چىققاندا ئەگرى سىزىقلىق يۈرۈش - تىن ساقلىنىش كېرەك. يېزا ئىگىلىكىدە ئىشلىتىلىدىغان ماشىنىلار تو - لۇق يۈكتە داۋانغا چىققاندا كۈچەپ كەتكەندەك ھېس قىلسا، بەزى شوپۇرلار داۋانغا چىقىش جەريانىدا ئەگرى سىزىقلىق يۈرۈش تەدبىرىنى قوللىنىدۇ. بۇنداق قىلىش خاتا قاراش بولۇپلا قالماستىن بەلكى زىيانلىق؛ (3) مۇفتە - دىن پايدىلىنىپ سۈرئەتنى تۆۋەنلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ماشىنا

ھەيدەپ داۋانغا چىقىش جەريانىدا بىرەر ئەھۋال كۆرۈلسە، بەزى شوپۇرلار مۇقتىنى دەسسەش ئارقىلىق سۈرئەتنى تۆۋەنلىتىدۇ. بۇ مۇۋاپىق بولمىغان ماشىنا ھەيدەش ئادىتى بولۇپ، ماشىنا داۋانغا چىققاندا يۈكى ئارتىپ كېتىدۇ، بۇ ۋاقىتتا مۇشۇنداق مەشغۇلات قىلىنسا مۇقتىنىڭ بالدۇر بۇزۇلۇشىنى ھەتتا ماشىنىنىڭ تېيىلىپ كېتىشى ياكى موتور ئوتىنىڭ ئۆچۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تېخىمۇ چوڭ ھادىسە پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا، داۋانغا چىقىش جەريانىدا پايدىسىز ئەھۋالغا يولۇققاندا دەرھال خوت ئورنىنى تۆۋەنلىتىپ توسالغۇدىن ئۆتۈۋېلىش، ئىمكان قەدەر داۋانغا چىقىش جەريانىدا موتورنىڭ ئوتى ئۆچۈپ قېلىشتىن ۋە داۋاندا قوزغىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

2. داۋاندىن چۈشكەندە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار: يېزا ئىگىلىكىدە ئىشلىتىلىدىغان ماشىنىلار داۋاندىن چۈشكەندە ئاساسلىقى سۈرئەتنى تۆۋەنلىتىش ۋە يۆلىنىشنى كونترول قىلىش كېرەك. بولۇپمۇ پىرىتسىپلىق يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى تىك داۋاندىن چۈشكەندە، يۈكلۈك پىرىتسىپنىڭ ئاساسىي ماشىنا گەۋدىسىنى ئىتتىرىپ، ماشىنا ئاغدۇرۇلۇپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، چوقۇم داۋاندىن چۈشۈش سۈرئىتىنى مۇۋاپىق ئاشۇرۇش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا داۋاندىن چۈشكەندە خوتتىن چىقىرىۋېتىپ يۈرۈشكە قەتئىي بولمايدۇ. بەزى شوپۇرلار داۋاندىن چۈشكەندە خوتتىن چىقىرىۋېتىپ يۈرسە ماي تېجەيدۇ دەپ قارايدۇ، ئەمما قاتناش نىزامىدا موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىلىرى داۋاندىن چۈشكەندە خوتتىن چىقىرىۋېتىپ يۈرۈشكە قەتئىي بولمايدۇ، دەپ بەلگىلەنگەن. بۇنىڭ سەۋەبى تۆۋەندىكىچە: (1) ماشىنا سۈرئەت كونتروللۇقىنى يوقىتىش مۇمكىن. ماشىنىنى خوتتىن چىقىرىۋېتىپ داۋاندىن چۈشكەندە، موتور ئايلىنىش قارشىلىق كۈچىنى يوقاتقاچقا، داۋاندىن چۈشۈش سۈرئىتى بارغانچە ئېشىپ

بارىدۇ، مۇشۇنداق ئەھۋالدا، ئۇدا ئەگرى يولغا ياكى تاسادىپىي ئەھۋالغا يولۇقسا، ماشىنا كونتروللۇقىنى يوقىتىپ، ئۆرۈلۈپ كېتىشى مۇمكىن؛ (2) تورمۇزلاش ۋە يۆلىنىش ئۆزگەرتىش سىستېمىلىرىنىڭ ئىشلىمەي قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. موتور ئايلىنىشتىن توختىغاچقا، ھاۋا كومپىرىسسورى ئىشتىن توختايدۇ، ماشىنىنى داۋاملىق تورمۇزلاش زۆرۈر بولغاچقا، ساقلىغان گاز بېسىمى تەدرىجىي تۆۋەنلەيدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە تورمۇزلىغۇچ ياردەمچىسى بىلەن يۆلىنىش ئۆزگەرتكۈچ ياردەمچىسى ئىشلەيمەيدۇ. شۇڭا داۋاندىن خوتتىن چىقىرىۋېتىپ چۈشۈش ماشىنىنىڭ تورمۇزلاش ۋە يۆلىنىش ئۆزگەرتىش سىستېمىلىرىنىڭ ئىشلىمەي قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن؛ (3) مۇفتىنى ئاسانلا كاردىن چىقىرىدۇ. ئەگەر داۋاندىن چۈشكەندە موتورنىڭ ئوتىنى ئۆچۈرۈپ مۇفتا تەپكىسىنى دەسسەپ سىيرىلىپ چۈشكەندە، داۋاندىن چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن ئۈش-تۈمتۈ مۇفتىنى قوشۇپ موتورنى ئوت ئالدۇرغاندا، يۇقىرى سۈرئەتتە ئايلىنىۋاتقان مۇفتا ئەگەشكۈچى دېسكىسى بىلەن تىنچ ھالەتتىكى ئۇچقۇرچاق ۋە ئەگرى ئوق ئۈستۈمتۈ قوشۇلۇپ، مۇفتا غايەت زور ئىمپىلۇسلۇق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ، مۇفتىنىڭ سۈركىلىش پىلاستىنكىسى قاتارلىق زاپچاسلارنىڭ بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؛ (4) سۈرئەت ئۆزگەرتكۈچنى ئاسانلا بۇزۇپ قويدۇ. خوتتىن چىقىرىۋېتىپ داۋاندىن چۈشكەندە، گەرچە ئىككىنچى ئوق ئايلىنغان بولسىمۇ، دائىم گىرەلىشىدىغان چىشلىق چاق ئايلىنمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ھەرقايسى ساقلىق قازانلار تولۇق مايلىنالمى تېز ئۇپرايدۇ. ئومۇمەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى بوش خوتتا سىيرىلىپ داۋاندىن چۈشكەندە، پەقەت بىخەتەرلىككە زىيان يېتىپلا قالماستىن، بەلكى زاپچاسلارنىڭ ئىشلەش ئۆمرىمۇ قىسقىرايدۇ. (02)

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاياللارنىڭ ھوقۇق - مەنپەئىتىنى كاپالەتلەندۈرۈش قانۇنى

17 - ماددا مەكتەپلەر قىزلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراپ، مائارىپ، باشقۇرۇش، ئەسلىھە قاتارلىق جەھەتلەردە تەدبىر قوللىنىپ، ئۇلارنىڭ ساغلام يېتىلىشىنى كاپالەتلەندۈرۈشى كېرەك.

18 - ماددا ئاتا - ئانىلار ياكى باشقا ۋەسىيلەر ئوقۇش يېشىدىكى قىزلارنىڭ مەجبۇرىيەت مائارىپىنى قوبۇل قىلىشىنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى شەرت. كېسەل ياكى باشقا ئالاھىدە ئەھۋال تۈپەيلىدىن، شۇ جايدىكى خەلق ھۆكۈمىتى تەستىقلىغانلىرىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئوقۇش يېشىدىكى قىزلارنى مەكتەپكە بەرمىگەن ئاتا - ئانىلار ياكى باشقا ۋەسىيلەرگە شۇ جايدىكى خەلق ھۆكۈمىتى تەنقىد، تەربىيە بېرىدۇ ھەمدە ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ، ئوقۇش يېشىدىكى قىزلارنى مەكتەپكە بېرىشكە بۇيرۇيدۇ. ھۆكۈمەت، جەمئىيەت ۋە مەكتەپلەر ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ، ئوقۇش يېشىدىكى قىزلارنىڭ ئوقۇشتىكى ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشى ھەمدە شارائىت يارىتىپ، نامرات، مېيىپ ۋە كۆچمە ئاھالە ئىچىدىكى ئوقۇش يېشىدىكى قىزلارنىڭ مەجبۇرىيەت مائارىپىنى تاماملىشىغا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك.

19 - ماددا ھەر دەرىجىلىك خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئاياللار ئارىسىدا ساۋاتسىزلىق ۋە چالا ساۋاتلىقنى تۈگىتىش خىزمىتىنى ساۋاتسىزلىقنى تۈگىتىش ۋە ساۋاتسىزلىق تۈگىتىلگەندىن كېيىنكى داۋاملىق تەربىيە بېرىش پىلانىغا بەلگىلىمە بويىچە كىرگۈزۈپ، ئاياللارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان تەشكىلىي شەكىل ۋە خىزمەت ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئالاقىدار تارماقلارنىڭ كونكرېت يولغا قويۇشىغا تەشكىلاتچىلىق، نازارەت - چىلىك قىلىشى كېرەك.

20 - ماددا ھەر دەرىجىلىك خەلق ھۆكۈمەتلىرى ۋە ئالاقىدار تار-ماقلار تەدبىر قوللىنىپ، شەھەر، بازارلار ۋە يېزىلاردىكى ئاياللارنىڭ ئېھتىياجىغا قاراپ، ئاياللارنى كەسپىي تەربىيە ۋە ئەمەلىي تېخنىكا تەربىيىسى ئېلىشقا تەشكىللىشى كېرەك.

21 - ماددا دۆلەت ئورگانلىرى، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ۋە كارخانا، كەسپىي ئورۇنلار دۆلەتنىڭ ئالاقىدار بەلگىلىمىلىرىنى ئىجرا قىلىپ، ئاياللارنىڭ ئىلىم - پەن، تېخنىكا، ئەدەبىيات - سەنئەت ۋە باشقا مەدەنىيەت پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇللىنىشى، ئەرلەر بىلەن باراۋەر ھوقۇققا ئىگە بولۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشى كېرەك.

22 - ماددا دۆلەت ئاياللارنىڭ ئەرلەر بىلەن باراۋەر ئەمگەك ھوقۇقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ھوقۇقىغا ئىگە بولۇشىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ.

23 - ماددا ئورۇنلار ئىشچى - خىزمەتچى قوبۇل قىلىشتا، ئاياللارغا باب كەلمەيدىغان ئىش تۈرى ياكى ئىش ئورنىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، جىنسنى باھانە قىلىپ، ئاياللارنى قوبۇل قىلماسلىققا ياكى ئاياللارنى قوبۇل قىلىش ئۆلچىمىنى ئۆستۈرۈۋېلىشقا بولمايدۇ. ئورۇنلار ئايال ئىشچى - خىزمەتچى قوبۇل قىلىشتا، ئۇلار بىلەن قانۇن بويىچە ئەمگەك (تەكلىپلىك ئىشلىتىش) توختامى ياكى مۇلازىمەت كېلىشىمى تۈزۈشى، ئەمگەك (تەكلىپلىك ئىشلىتىش) توختامى ياكى مۇلازىمەت كېلىشىمىدە ئايال ئىشچى - خىزمەتچىلەرنىڭ توي قىلىشى، پەرزەنت كۆرۈشىنى چەكلەيدىغان مەز-مۇنلارنى بەلگىلىمەسلىكى كېرەك. 16 ياشقا توشمىغان قىزلارنى ئىشقا قوبۇل قىلىش مەنئى قىلىنىدۇ، دۆلەتنىڭ ئايرىم بەلگىلىمىسى بولغانلىرى بۇنىڭ سىرتىدا.

24 - ماددا ئەر - ئاياللارنىڭ ئوخشاش ئىشىغا ئوخشاش ھەق بېرىد-لىدۇ. ئاياللار پاراۋانلىق تەمىناتىدىن بەھرىمەن بولۇشتا ئەرلەر بىلەن باراۋەر ھوقۇققا ئىگە. (05) (داۋامى كېيىنكى ساندا)

خانم - قىزلارغا خىتاب

ھەلىمە نۇرسۇن

«يېزا پەن - تېخنىكىسى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمىدىن

1. ئەي سۆيۈملۈك ئايال — ئۆزىڭىزنى مەڭگۈ قەدىرلەپ، سۆيۈپ ياشاشقا ئادەتلىنىڭ. ھاياتلىق سەپىرىدە ئۆزىنى چىن قەدىرلەپ، ئىزچىل سۆيگەنلەرلا ھەرقانداق ئادەمنىڭ ھۆرمىتىگە ۋە قەدىرلىشىگە، شۇنداقلا مەڭگۈ سۆيۈشىگە ئېرىشەلەيدۇ.

2. ئەي گۈزەل ئايال — ئىلىم - بىلىم ئۆگىنىشنى مۇقەددەس بىلىڭ. ئىلىم - بىلىمنى ھەقىقىي دوست قىلالىسىڭىز ئەخلاقلىق، ھاياتلىق، تەقۋادار، كەڭ قورساق، تىرىشچان، ئەمگەكچان، شۈكرى - قانائەتچان ۋە تەدبىرلىك بولالايسىز، ھاياتى ھەقىقىي قەدىرلەشكە يۈزلىنەلەيسىز. ئۆزىڭىز ۋە باشقىلارنىڭ بىلىمگە ئاشق قەلبىگە نۇرلۇق چىراق يېقىپ، ھىدايەت تاپالايسىز.

3. ئەي زىرەك ئايال — ئۆزىڭىزگە مەڭگۈ ئىشىنىڭ، شۇندىلا سىز ھەممىگە يارايىسىز. ھەرۋاقىت ئۆمىد مەشئىلىڭىزنى ئېگىز كۆتۈرۈپ مەغرۇر ۋە ئۈمىدۋار ياشاشقا ئادەتلىنىڭ. دىلىڭىز، تېنىڭىز، مۇھەببىتىڭىزنىڭ پاكلىنىشىغا تىنمىسىز تىرىشكڭىز. چۈنكى ھەممە ئادەم ئۆز تەقدىرىنىڭ خوجايىنى. «تەدبىرنىڭ قانداق بولسا، تەقدىرنىڭ شۇنداق بولىدۇ» دېگەن ئەمەسمۇ دانالار!

4. ئەي ئاقكۆڭۈل ئايال — ئەتراپىڭىزدىكى بارلىق نەرسىلەرگە چىن مۇھەببەت بىلەن بېقىڭ. ئىنسانىيەتنىڭ پەرۋىشكارى بولمىش ئاياللىق، ئائىلىق سۈپىتىڭىزنى ھەرگىز ئۇنتۇماڭ. مېھىر - مۇھەببىتىڭىز بىلەن ھاياتلىقنى قانغۇچە سۆيۈڭ. ھەقىقىي ئائىلىق پەزىلىتىڭىز بىلەن زېمىننى پەرۋىش قىلىشقا يۈزلىنىڭ.

5. ئەي مېھرى ئوتلۇق ئايال — ئاتەش كەبى مېھىر - مۇھەببىتىڭىز بىلەن ئۆزىڭىزنى تاۋلاڭ، تەمكىن ياشاڭ. سىزگە نىسب بولغان ھەرقانداق

نەرسىنى قەدىرلەپ، ئۇنىڭدىن قانغۇچە ھوزۇرلىنىڭ، گېزى كەلسە قاققلاپ كۈلۈڭ. دۇنيانىڭ ئۆزىڭىزگە باش ئېگىدىغانلىقىغا چەكسىز ئىشىنىڭ.

6. ئەي ئەمگەكچان ئايال — بۇ گۈزەل ھاياتلىق دۇنياسىنى چىن مۇھەببىتىڭىز بىلەن گۈل-چىچەككە تولدۇرۇڭ. ئىشىنىمەنكى سىزنىڭ ھەر بىر قەدىمىڭىزدىن مېڭەك ئاچىلۇر.

7. ئەي مېھنەتكەش ئايال — بۇ دۇنياغا كەلگەن ئىكەنسىز مېھنەت قىلىڭ. مېھنەتتىڭىزدىن ئۆزىڭىز ھەم باشقىلار بەھىرلەنسۇن. ھاياتلىق سەپىرى سىزنىڭ ئەمگىكىڭىز، چىن مېھنەتتىڭىز بىلەن ھەقىقىي گۈزەللىكىنى تاپىدۇ، چىن مەناسى بىلەن گۈللىنىدۇ!

8. ئەي ئالەمنىڭ زىننەتلىگۈچىسى ئايال — شۇ پەرىشتە سۈپەتتىڭىز بىلەن دۇنيانى بىزەڭ، زىننەتلەڭ. ھەر ۋاقىت سەمىڭىزدە بولسۇنكى، پەقەت سىزلا بۇ دۇنيانى ھەقىقىي ئېتىقاد، ئەمگەك بىلەن تىنماي بېزىگۈچى. بارلىق جانلىقلارنىڭ جېنىغا جان قوشۇپ ھاياتىغا ئۈمىد بېغىشلىغۇچى.

9. ئەي چىۋەر ئايال — ھايا گۈللىرى بىلەن ئۆزىڭىزنى زىننەتلەڭ. ھەر ۋاقىت ھاياتلىق لىباسىنى ئۆزىڭىزگە ھەمراھ قىلىشىڭىز پەرزەنتىڭىزنى ئەدەپ — ئەخلاقلىق تەربىيەلەيسىز، ھەمراھىڭىزنى (يولدىشىڭىزنى) ئەيمەندۈرەلەيسىز. ئەتراپىڭىزدىكىلەرگە ئەخلاق نۇرى تارقىتالايسىز.

10. ئەي مېھرى ئاتەش ئايال — ئاتەش مېھرىڭىز بىلەن ئالەمنى نۇرلاندۇرۇڭ. چۈنكى ئەتراپىڭىزدىكى ئېتىقادلىق ئىنسانلار ئاتەش تەپتىڭىزدە تاۋلىنىپ، ھاياتلىق سەپىرىنى مەردانلىق بىلەن تاۋلاپ، ھاياتىنى قەدىرلەشكە يۈزلىنىدۇ. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ھاياتلىق سىز بىلەن مەڭگۈ داۋاملىشىدۇ، ئۆز مەناسىنى تېپىپ گۈزەللىككە تولىدۇ. چۈنكى سىز بالىنىڭ، مىللەتنىڭ، زېمىننىڭ، دۇنيانىڭ ئانىسى. پۈتكۈل مەۋجۇداتنىڭ، ھاياتلىقنىڭ ھامىيىسى!

ئەي ئۇلۇغ ئايال قۇلاق سېلىڭ، پۈتۈن مەۋجۇداتلىق، جىمىكى ئالەم سىزگە مىڭلارچە ئاپىرىن، بارىكالا ئېيتماقتا! (05)

1971 — 1904

نمشېت



جاھان و نالري شجره بامعدله بگرځول ياريون،
 بامعدين توڼگه توتقان ياريولو نوگا هدا بار، يون.
 كېرې كه ښه نه ښه كنات بامعدين توڼگه ياريو تساك،
 بېلگه جوته سه بېر كونه، نو خا غدا ته كه بې خاريون.
 قولاي سالساك موهه بيه ته هاساك به ياد و نه غا،
 يو توبه و داب بېر اقس د اد دمه كتن با نسقه حه زاريون.
 يار اغه ت ندره سه له نه سال بامعدين توڼگه ياريو تسما،
 سېسك قه د ښې ساقا لاسا بامعدين يا خشي همه مكار يون.

تور بامحان وې شېلې ياريون

نورۇز گۈلى ئېچىلىپ، يۇرتلار بولسۇن گۈلىستان!



ھەلىم تۇرسۇن فوتوسى

كاتتا ئۆمىر شىشى

农村科技

(月刊)

يېزا پەن — تېخنىكىسى

(ئايلىق ژۇرنال)

باشقۇرۇپ چىقارغۇچى ئورۇن: شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى
تۈزۈپ نەشر قىلغۇچى: «يېزا پەن - تېخنىكىسى» ژۇرنىلى رېداكسىيەسى
باش مۇھەررىر: ھەلىمە تۇرسۇن تېلېفون ۋە فاكس نومۇرى: 4505075 — 0991
مەسئۇل مۇھەررىر: ئەنۋەر مۇھەممەت مۇھەررىر: ئابىلەت ھەبىبۇللا
ئادرېسى: ئۈرۈمچى شەھىرى نەنچاڭ يولى 403 - قورۇ پوچتا نومۇرى: 830091
باسقۇچى ئورۇن: شىنجاڭ شىنخۇا باسما زاۋۇتى باھاسى: 2.00 يۈەن
تارقاقچى ئورۇن: ئۈرۈمچى شەھەرلىك پوچتا ئىدارىسى
مۇستەرى قوبۇل قىلغۇچى: جايلاردىكى پوچتخانىلار، نامراتلارنى يۆلەش ئىشخانىسى، پەن-تېخنىكا
ئىدارىسى، ئىگىلىك باشقۇرۇش ئىدارىسى ۋە تەھرىر بۆلۈمىمىز مۇستەرى قوبۇل قىلىدۇ.

خەلقئارالىق ئۆلچەملىك نومۇرى: ISSN 1004-1095

مەملىكەتلىك بىر تۇتاش نومۇرى: CN 65-1046/S-W

پوچتا ۋاكالىت نومۇرى: 123 - 58 ئېلان كىنىشكا نومۇرى: 0016