

هاشرجان سىدىق

ئانكىسالى ئۇيغۇر تىبابىتىدە دىۋالائىتى
ئەمەلىي تەجرىبىلەر

قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى

مۇقاۋىسى لايىھىلىگۈچى : مەخمۇتجان تۇردى

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 50 يىللىقىغا سۈنۈش

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسى
喀什维吾尔医院



ISBN 7-5373-1302-4

(民文) 定价: 16.50元

ISBN 7-5373-1302-4



9 787537 313025 >

نەشرىياتتىن

هاشرجان سىدىق 1958 - يىل 4 - ئايدا قەشقەر شەھىرىدە ئوقۇتقۇچى ئائىلىسىدە تۇغۇلغان. 1975 - يىلى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتكۈزۈپ، قوغان يېزىسىدا «قايتا تەربىيە» ئېلىش جەريانىدا ئوقۇتقۇچىلىق ۋە يېزا دوختۇرلۇقى بىلەن شۇغۇللانغان. 1978 - يىلىدىن 1982 - يىل 8 - ئايغىچە ئاپتونوم رايون قەشقەر تېببىي تېخنىكومىدا ئاچقان تۇنجى قارارلىق ئۇيغۇر تېبابىتى داۋالاش كەسپىدە ئوقۇپ قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسىغا خىزمەتكە تەقسىم قىلىنغان؛ 1998 - يىلى شىنجاڭ كەسپىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ كلىنىكىلىق داۋالاش كەسپىدە ئىشتىن ئايرىلىپ ئوقۇپ ئالىي تېخنىكوم دىپلومى ئالغان.

هاشرجان سىدىق ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسىغا خىزمەتكە ئورۇنلىشىپلا دەسلەپتە شىپاخانىنىڭ دورا - ياسالما بۆلۈمىدە ئىشلىگەن. بۇ جەرياندا ئۇيغۇر تېبابەت پىششىق دورىلىرىنى ئىشلەش - ياساش ئاساسلىرىنى پۇختا ئىگىلىگەندىن سىرت، يېزا - قىشلاق، تاغ - ئېدىرلارنى ئايلىنىپ، دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى تونۇش - يىغىشقا كۆپ ئەجىر سىڭدۈرۈپ، ئۇيغۇر تېبابەتىنىڭ جان تومۇرى بولغان خام دورىگەرلىكتىمۇ پۇختا ئاساس يارىتىپ ۋە مول تەجرىبە توپلاپ، كېيىنكى خىزمەتلىرىدە ئۇتۇق قازىنىش ئۈچۈن ياخشى شەرت - شارائىت ھازىرلىغان. ئۇ، 1983 - يىلىدىن باشلاپ تېرە كېسەللىكلىرى بۆلۈمىدە ئىشلىدى.

گەن 20 يىلدىن ئارتۇق جەريان ئىچىدە بىر تەرەپتىن پېشقەدەم
 تېۋىپلاردىن ئۆگەنسە، يەنە بىر تەرەپتىن ئەمەلىيەتكە چوڭقۇر
 چۆكۈپ ۋە ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىپ، داۋالاش قىيىن بولغان
 تېرە كېسەللىكلىرى، بولۇپمۇ ئاقكېسەلنى ئۇيغۇر تېبابىتى ئار-
 قىلىق داۋالاشتا ئىنتايىن مول تەجرىبىلەرنى توپلاپ، ئاقكېسەل-
 نى داۋالاپ ساقايتىشتىن ئىبارەت بۇ قىيىن ئۆتكەلنى بۆسۈپ
 ئۆتۈشتە ھارماي - تالماي كۈرەش قىلىپ، كۆرۈنەرلىك تۆھپە
 يارىتىپ، كەسپىي خىزمەت نەتىجىلىرىنىڭ يەكۈنى سۈپىتىدە
 يازغان 41 پارچە ئىلمىي ماقالىسى خەلقئارالىق، مەملىكەتلىك
 ۋە ئاپتونوم رايونىمىزدا چاقىرىلغان مىللىي تېبابەتچىلىك -
 دورىگەرلىك ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرىدا ئوقۇلۇپ، مۇتەخەس-
 سىلەرنىڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈشىگە ئېرىشكەن ھەمدە ھەر دەرد-
 جىلىك تېببىي ژۇرناللاردا ئېلان قىلىنىپ، ئاقكېسەلنى داۋا-
 لاش جەھەتتىكى قاراشلىرى ۋە تەجرىبىلىرى بىرقەدەر مۇكەممەل
 بولغان ئىلمىي قىممىتىنى نامايان قىلغان. بۇلار ئىچىدە «32
 نەپەر ئاقكېسەل بىمارىنى كلىنىكىلىق داۋالاش ئۈستىدە تەھ-
 لىل» ناملىق ماقالە 2001 - يىل 10 - ئايدا ئاۋسترالىيىنىڭ
 سىدنىي شەھىرىدە ئېچىلغان 8 - نۆۋەتلىك خەلقئارا تېببىي
 ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا «مۇنەۋۋەر ماقالە» شەرەپ گۇۋاھنا-
 مىسىغا؛ «2032 نەپەر ئاقكېسەل بىمارىنى كلىنىكىلىق داۋالا-
 شتىن خۇلاسە» ناملىق ماقالە 2002 - يىل 7 - ئايدا گېرمانىيە-
 نىڭ بېرلىن شەھىرىدە ئېچىلغان يەر شارى 2 - قېتىملىق
 تېبابەت ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا «مۇنەۋۋەر ماقالە» قوش
 گۇۋاھنامىسىغا ۋە قەشقەر ۋىلايەتلىك پەن - تېخنىكا جەمئىيىتى
 تەرىپىدىن تېببىي پەن 1 - دەرىجىلىك مۇكاپاتىغا؛ «3076 نەپەر
 ئاقكېسەل بىمارىنى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئۇسۇلىدا كلىنىكىلىق
 داۋالاش تەجرىبىلىرى» ناملىق ماقالە 2003 - يىل 8 - ئايدا

ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان خەلقئارا ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەر-
لىك ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا ئوقۇلۇپ، ئۈچ خىل تىلدا
تونۇشتۇرۇلۇش بىلەن باھالاش ھەيئىتى تەرىپىدىن 1 - دەرىجى-
لىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن. قولىڭىزدىكى كىتاب ئۇنىڭ ئىلمىي
ئەمگەكلىرىنىڭ تۇنجى سەمەرىسىدۇر.

ھاشىرجان سىدىق ھازىر كاندىدات مۇدىر ۋىراج، تېرەك-
سەللىكلىرى بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى، مەملىكەتلىك مىللىي تېبابەت-
چىلىك - دورىگەرلىك ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ ئەزاسى، شىنجاڭ
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مىللىي تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك
ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ دائىمىي ھەيئەت ئەزاسى، قەشقەر ۋىلا-
يەتلىك سەھىيە ئىدارىسى داۋالاش ھادىسىلىرىنى بىر تەرەپ
قىلىش مۇتەخەسسسلەر گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، قەشقەر ۋىلايەت-
لىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ
مۇئاۋىن باشلىقى.

ئاپتوردىن

ئۇيغۇر تېبابىتى جۇڭخۇا تېبابەتچىلىك ئىلمىنىڭ مۇھىم بىر تەركىبىي قىسمى بولۇپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئاغرىق - سىلاقلارغا قارشى ئېلىپ بارغان ئۇزاق مۇددەتلىك كۈرەشلىرىنىڭ ئىلمىي يەكۈنى ۋە داۋالاش جەھەتتىكى ئەقىل - پاراسىتىنىڭ جەۋھىرىدۇر. ئۇ ئەجدادلىرىمىز ئىجاد قىلىپ قولغا كەلتۈرگەن پارلاق نەتىجىلەر ئاساسىدا قېرىنداش مىللەتلەر ۋە قوشنا ئەللەر تېبابىتىنىڭ ئىلغار تەجرىبىلىرىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ مەزمۇنىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتتى ۋە مۇكەممەللەشتۈردى، شۇنداقلا ئەمەلىي داۋالاش جەريانىدا ھاسىل قىلغان مول تەجرىبىلىرى، ئىلمىي نەزەرىيە سىستېمىسى، دىئاگنوز قويۇش ئۇسۇلىنىڭ ئۆزگىچىلىكى، داۋالاش تېخنىكىسىنىڭ كۆپ خىللىقى ۋە ئىلغارلىقى، دورا مەنبەلىرىنىڭ كەڭلىكى، ئەمما ئەكس تەسىرىنىڭ يوقلۇقى قاتارلىق ئەۋزەللىكى بىلەن، ئىنسانىيەت ساغلاملىق ئىلمىگە ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشتى. ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ بۇنىڭدىن 1500 يىللار ئىلگىرى مەخسۇسلىشىشقا قاراپ يۈزلەنگەنلىكىگە دائىر پاكىتلار بار. تاڭ سۇلالىسىنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدىكى ئاتاقلىق تېۋىپ سۈن سىماۋنىڭ «بىباھا غەيرىي رېتسېپلار» دېگەن ئەسىرىدە، تېبابىتىمىزنىڭ ئاقكېسەل (بەرەس) نى داۋالاشتا ئىشلىتىدىغان سىناقىتىن ئۆتكەن رېتسېپلىرى تونۇشتۇرۇلغان. تەخمىنەن مىلادىيە IV ئەسىردە يېزىلغان قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىكى مەلۇم بىر كىتابتا (بۇ كىتاب تۇرپاندىن تېپىلغانلىقى

قى ئۈچۈن «تۇرپان تېكىستلىرى» دەپ ئاتىلىپ، ئۇنىڭ بىر قىسمىنى گېرمانىيىلىك ئۇيغۇرشۇناس ئالىم گابائىن خانىم تەر-جىمە قىلغان) ئاقكېسەل ۋە باشقا بىر قىسىم تېرە كېسەللىكلەر-رنى داۋالايدىغان دورىلارنىڭ ناملىرى، شۇنداقلا داۋالاش ئۇ-سۇللىرى تونۇشتۇرۇلغان.

يۇقىرىقىدەك تارىخىي خاتىرىلەرگە ئاساسلىنىپ شۇنى مۇ-ئەييەنلەشتۈرۈش مۇمكىنكى، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاش تارىخى ھەقىقەتەن ئۇزاق، ھاسىل قىلغان تەجرىبىلىرى نىسبەتەن مول، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولۇپ، دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا ئالاھىدە تەسىرگە ئىگە.

مەن بۇ كىتابىمدا، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئىلمىنىڭ ئاسا-سىي نەزەرىيە سىستېمىسىدىكى تۈپكى بىلىملەرنى يېتەكچى قى-لىپ، داۋالاش ئەمەلىيىتىدە توپلىغان بىر يۈرۈش تەجرىبىلىر-رىمنى ئەجدادلاردىن ئۆگەنگەنلىرىمگە بىرلەشتۈرۈپ، ئاقكېسەل-نىڭ كېسەللىك سەۋەبچىسى، مىزاج - خىلىت ۋە رەئىس ئەزالار (مېڭە، يۈرەك، جىگەر) بىلەن كېسەللىك پەيدا بولۇشنىڭ مۇناسىۋىتى، ئاقكېسەلنىڭ كلىنىكىلىق جەھەتتىن تىپلارغا ئاي-رىلىشى، داۋالاش پرىنسىپلىرى - ئۇسۇللىرى، ئەمەلىي داۋالاش جەريانىدا ئېرىشكەن كلىنىكىلىق نەتىجىلەر، سىناق-تىن ئۆتكەن بىر قىسىم دورا نۇسخىلىرى ھەمدە داۋالاش ئەمەل-يىتىدە ئىشلەتكەن دورا نۇسخىلىرى، شۇنىڭدەك ئاقكېسەلدىن ساقلىنىش چارىلىرى، بۇ خىل كېسەللىكنىڭ تارقىلىش ئەھۋال-لى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىمە مەسىلىلەرنى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئىلمىنىڭ نەزەرىيە ئاساسلىرىغا ئۇيغۇنلاشقان ھالدا ئوتتۇرىغا قويىدۇم. بۇنىڭدىن باشقا يەنە قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسىنىڭ ئاقكېسەلنى كلىنىكىلىق داۋالاشتا ئېرىشكەن 46 يىللىق نەتىجىلىرى ستاتىستىكىلىق سانلىق مەلۇماتلار ئار-قىلىق قىسقىچە خۇلاسەلىنىپ، بۇ جەھەتتىكى ئۇزاق يىللىق

تەجرىبە - ساۋاقلارنى تونۇشتۇرۇلدى. ھايات ئىزلىرىمغا نەزەر تاشلىسام، 20 نەچچە يىل كىلىنىكىدا ئىزچىل ئاڭكەسەلنى داۋالاش، مەخسۇس كىلىنىكىلىق تەتقىقات ئېلىپ بېرىش بىلەن شۇ-غۇللىنىپتىمەن. بۇ جەرياندا ھاسىل قىلغان ئەمەلىي تەجرىبە-ساۋاق، نەتىجە (شۇنداق دېيىشكە توغرا كەلسە) ۋە بىر قىسىم داۋالاش ئۇسۇل - چارىلىرى، دورا نۇسخىلىرىنى يىغىنچاق تو-نۇشتۇرۇپ، كەسىپداشلار بىلەن ئورتاقلىشىشنى لايىق تاپتىم. كىتابتا تونۇشتۇرۇلغان دورا نۇسخىلىرى ئاددىي، ئەمما ئۈنۈم-لۈك بولۇپ، مەخسۇس تېببىي خادىملار تەرىپىدىن ياكى زامانە-ۋى دورا زاۋۇتلىرىدىلا ئەمەس، بەلكى بىمارلارنىڭ ئۆزلىرى ئائىلىلىرىدە تەييارلاپ ئىشلىتىشكە مۇ باب كېلىدۇ.

بۇ كىتابنى يېزىشىمغا يېقىندىن ياردەمدە بولغان ھەمدە قوللىغان دوكتور خالىمۇرات غوپۇر، مۇدىر ۋىراج ئېىزىكەنجى ھاجىم، مۇدىر دورىگەر رۇقىيەم سادىق، شىپاخانا باشلىقى شاۋكەت ئابدۇللا قاتارلىق ئۇستازلارغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن.

سەۋدىيەمنىڭ چەكلىكلىكى تۈپەيلىدىن كىتابتا بەزى نۇقسان - سەۋەنلىكلەرگە يول قويغان بولۇشۇم مۇمكىن. كە-سىپداشلارنىڭ تۈزىتىپ پايدىلىنىشىنى، قىممەتلىك تەنقىدىي پىكىر - تەكلىپلەرنى بېرىشىنى سەمىمىي ئۈمىد قىلىمەن.

مۇندەرىجە

- 1 ئاقكېسەل ھەققىدە چۈشەنچە
- ئاقكېسەلنىڭ ھەرقايسى دۆلەت، رايون، ئىرق - مىللەتلەر
- 5 ۋە ھەر خىل ياشتىكىلەردە تارقىلىشى
- تېرىنىڭ ئاناتومىيىلىك تۈزۈلۈشى ۋە فىزىئولوگىيىلىك
- 12 رولى
- 12 1. تېرىنىڭ تۈزۈلۈشى
- 22 2. تېرىنىڭ رولى
- 26 ئاقكېسەلنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرى
- 27 1. رەئىس ئەزالار خىزمىتى قالايمىقانلىشىش
- 27 2. مېجەز بىلەن خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش ...
3. ئومۇمىي بەدەن ياكى يەرلىك ئورۇندا كەم قانلىق
- 32 يۈز بېرىش
- 33 4. ئۇدۇم (ئىرسىيەت) ئامىللىرى
- 34 5. يېمەك - ئىچمەك بەدەنگە خىل كەلمەسلىك
- 36 6. ھەزىم قىلىش سىستېمىسى خىزمىتى ياخشى بولماسلىق
- 36 7. نېرۋا فۇنكسىيىسى ئاجىزلىشىش
- 37 8. ھەر خىل ئامىللاردىن زەخمىلىنىش
- 38 9. بەدەن تەبىئىتى سۇسلىشىش
- 39 ئاقكېسەلگە دىئاگنوز قويۇش ئۇسۇلى
- 42 ئاقكېسەلنىڭ سېلىشتۇرما دىئاگنوزى
- 42 1. گۈللۈك تەمرەتكە
- 43 2. شىلىق پەردە ئاق دېغى

3. قان ئازلىق ئاق دېغى 44
4. نېرىپ بويلاپ تارالغان ئاق داغ 45
5. ياشانغانلار ئاق دېغى 45
6. تېرە زەخمىلىنىشتىن كېيىنكى ئاق داغ 46
7. توپانسىمان ئاق داغ 47
8. سىغىلىق ئاق داغ 48
- ئاقكېسەلنىڭ بەدەندە ئىگىلىگەن كۆلىمىنى بېكىتىش ئۇسۇلى 49
1. پۈتۈن بەدەندە تارقالغان ئەزاۋە بۆلەكلەرنى بىرلىك قىلىپ بېكىتىش ئۇسۇلى 50
2. بىر قولىنىڭ ئالدىقىنى ئۆلچەم قىلىپ بېكىتىش ئۇسۇلى 51
- ئاقكېسەلنى خىلىت تىپى بويىچە تۈرلەرگە ئايرىش 53
- ئاقكېسەلنىڭ خىلىتلار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى 54
- ئاقكېسەلنىڭ قان تىپى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى 57
- ئاقكېسەلنىڭ رەئىس ئەزالار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى 61
1. مېڭە 61
2. يۈرەك 62
3. جىگەر 62
- ئاقكېسەلنىڭ باسقۇچلارغا بۆلۈنۈشى 64
- ئاقكېسەلنىڭ كلىنىكىلىق تۈرلەرگە ئايرىلىشى 67
1. چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ تۈرگە ئايرىش 67
2. تارقىلىش شەكلىگە قاراپ تۈرگە ئايرىش 69
3. تارقىلىش دائىرىسىگە قاراپ تۈرگە ئايرىش 70
4. كېسەللىك تەرەققىياتى (ئۆزگىرىشى) غا قاراپ تۈرگە ئايرىش 71
5. ئىرسىيەتلىك ئاقكېسەل 72
6. تۇغما ئاقكېسەل 73
7. نېرۋا شاخچىلىرىنى بويلاپ تاسسىمىمان پەيدا

- 73 بولىدىغان ئاقكېسەل 081
- 74 8. مەڭ خاراكتېرلىك ئاقكېسەل 081
- 75 ئاقكېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى تەدبىرلەر 081
1. ھەزىم قىلىش سىستېمىسى خىزمىتىنى كۈچەيتىش 081
- 75 2. رەئىس ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىغا ئەھمىيەت بېرىش 081
- 76 3. تېرىنى غىدىقلىغۇچى نەرسىلەرنى ئىشلىتىشتىن ئېھتىيات قىلىش 081
- 76 4. مەجەز تەڭپۇڭلۇقىغا دىققەت قىلىش 081
- 77 5. يېمەك - ئىچمەك تۈرلىرىگە ئەھمىيەت بېرىش 081
- 78 6. ئۆگىنىش، خىزمەت بىلەن دەم ئېلىش مۇۋاپىق بولۇش 101
- 78 7. ياخشى روھىي كەيپىيات تۇرغۇزۇش 081
- 79 80 ئاقكېسەلنى قايسى ۋاقىتتا داۋالاش كېرەك 081
- 80 ئاقكېسەلنى داۋالاشتىكى ئاساسلىق پرىنسىپ - ئۇسۇللار 081
- 84 1. روھىي جەھەتتىن داۋالاش 081
- 85 2. يېمەك - ئىچمەك ۋە پەرھىز ئارقىلىق داۋالاش 081
- 88 3. دورا بىلەن مەجەز ۋە خىلىتلارنى تەڭشەش ئارقىلىق داۋالاش 081
- 93 4. خاس دورىلار بىلەن قۇۋۋەت دورىلىرىنى بىرلىكتە ئىشلىتىپ داۋالاش 081
- 110 5. دورا ئىچۈرۈش بىلەن كۈن نۇرىغا قاقلاشنى بىرلەشتۈرۈپ داۋالاش 081
- 118 6. ئاپتاپقا قاقلاش بىلەن دورا سۈركەشنى بىرلەشتۈرۈپ داۋالاش 081
- 125 7. كېسەللىك ئورنىغا بىۋاسىتە دورا كىرگۈزۈپ

- 130 داۋالاش
- 133 ئاقكېسەلنى داۋالاشتىكى قوشۇمچە ئۇسۇللار
- 133 1. يىغىنىدە چېكىپ داۋالاش
- 135 2. بانكا قويۇپ داۋالاش
- 136 3. كېسەللەنگەن ئورۇننى ئىسسىق ساقلاش
- 137 4. قۇمغا كۆمۈپ داۋالاش
- ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈستىدىكى
- 142 ئىزدىنىشلىرى
- ئاقكېسەلنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈم بېرىش مۇددىتى ۋە بۇنى
- 149 باھالاش ئۆلچىمى
- 152 ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈنۈمىنى سېلىشتۇرۇش
- 154 ئاقكېسەل دورىسى يوق كېسەللىك ئەمەس
- ئاقكېسەلنى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدىغان دورا ياسال-
- 161 مىلىرى
- 161 1. مەجۇن دورىلار
- 195 2. كۈمىلاچ دورىلار
- 203 3. تالقان دورىلار
- 206 4. سۇيۇق دورىلار
- 214 5. ئاددىي زىمادى (تاغما) بەرەس نۇسخىلىرى
- 221 6. مۇرەككەپ زىمادى بەرەس نۇسخىلىرى
- 233 7. ياغ (رەۋەن) تەركىبلىك دورىلار
- 237 8. مەلھەم دورىلار
- 245 9. شەربەت دورىلار
- 257 10. مۇنزىچ (ماددىنى پىشۇرغۇچى) دورىلار
- 268 11. مۇسھىل (ماددىنى سۈرگۈچى) دورىلار
- 271 12. چايلىق دورىلار
- 276 13. سۈپۈپ تىپىدىكى ئاددىي دورىلار

ئاقكېسەل ھەققىدە چۈشەنچە

ئاقكېسەل («بەرەس» دەپمۇ ئاتىلىدۇ) تېرىنىڭ مەلۇم قىسمى ياكى خېلى بىر قىسمى ھەتتا پۈتۈن بەدەن تېرىسىنىڭ كۆپ قىسمى دېگۈدەك ئاقىرىپ، كىشىلەرنىڭ قىياپەت گۈزەللىكىگە نۇقسان يەتكۈزىدىغان، لېكىن يۇقىمايدىغان ۋە ئاغرىش ئالاھىدىلىرى بولمايدىغان بىر خىل سوزۇلما خاراكتېرلىك تېرە كېسەللىكى بولۇپ، قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىدا «ئاقۇنا»، «ئاۋلاق» ياكى «ئالا ئەت» دېيىلگەن. ھازىرقى زامان تىلىمىزدا «ئاقكېسەل» دېيىلىدۇ. ئەرەب تىلىدا «بەرەس»، پارىس تىلىدا «پىپىسە»، لاتىن تىلىدا «Vitiligo»، خەنزۇ تىلىدا «بەيدىيەن» ۋە «白癜» دەپ ئاتىلىدۇ.

ئاقكېسەل ئومۇمەن مەجەز ۋە خىلىتلارنىڭ ئۆزگىرىشى، رەئىس ئەزالار (مېڭە، يۈرەك، جىگەر) خىزمىتىنىڭ قالايمىقانلىشىشى، قىسمەن ئادەملەردە بولسا ئىرسىيەت ئامىلىلىرى، يېمەك - ئىچمەك، مۇھىت ياكى ھەر خىل سىرتقى زەخمىلىنىش قاتارلىق مۇرەككەپ سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدۇ. ئومۇمىي ساغلاملىققا تەسىر يەتكۈزمىسىمۇ، بىراق ئاغرىغۇچىلارنى روھىي جەھەتتىن چۈشكۈنلەشتۈرىدۇ، بولۇپمۇ بەدىنىنىڭ كۆرۈنىدىغان ئورۇنلىرىدا ئاقكېسەل بار كىشىلەردە روھىي ئالزابلاننىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش بىلەن، خىزمەت، تۇرمۇش ۋە ئائىلىۋى ئىناقلىققا ئوخشىمىغان دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ. خان، تونۇش (پەرق ئېتىش) ئاسان، ئەمما داۋالاش نىسبەتەن

قىيىن بولغان بىر خىل تېرە رەڭسىزلىنىش خاراكتېرىدىكى جاھىل تېرە كېسەللىكىدۇر.

ئۇيغۇر تېبابەت ئىلمىنىڭ ئۇزاق يىللىق كلىنىكىلىق كۆزىتىش ئەمەلىيىتى ۋە ھازىرقى زامان تېببىي ئىلمىنىڭ كۆپ تەرەپلىملىك ئىلمىي تەتقىقاتى ئاقكېسەلنىڭ يۇقمايدىغانلىقى، شۇنداقلا ھاياتلىق بىلەن سالامەتلىككە، جۈملىدىن ئۆگىنىش، خىزمەت، ئەمگەك قاتارلىق پائالىيەتلەرگە چوڭ تەسىر كۆرسەتمەيدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈردى؛ ئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن جەمئىيەتتىكى ھەر ساھە، ھەر مىللەت كىشىلىرى ئارىسىدا ئاقكېسەلگە گىرىپتار بولغانلاردىن يىرگىنىدىغان، ئۆزىنى قاقچۇرىدىغان، ئۇلار يېمەكلىك بەرمە يېمەيدىغان، بىر سورۇندا ئولتۇرمايدىغان، تۇرمۇش لازىمەتلىكلىرىنى ئىشلەتمەيدىغان، ھەتتا ئامراق ئەر - خوتۇنلارمۇ قايسىبىرىنىڭ بولمىسۇن كۆرۈنىدىغان ئورۇنلىرىغا ئاقكېسەل تارىغاندىن كېيىن ئاجرىشىدىغان ياكى مۇھەببەت باغلىغان ئوغۇل - قىزلار ئۆز ئۆيىپىكىتىنىڭ ئاقكېسىدىلى بارلىقىنى بىلگەن ھامان ئايرىلىپ ئۆز يولىغا ماڭىدىغان نورمالسىز ئەھۋاللار ھېلىھەم جەمئىيىتىمىزدە ئازدۇر - كۆپتۇر مەۋجۇت؟ مېنىڭ قارىشىمچە، بۇنداق ناتوغرا ھادىسىلەرنىڭ سەۋەبىنى كىشىلەرنىڭ بىلىش جەريانىدىن ئىزدەش كېرەك، ھەممىمىزگە مەلۇم، ئىنسانلار تەبىئەتتىكى بارلىق ھادىسىلەرنى، جۈملىدىن كېسەللىك بىلەن ساقلىقنىڭ، ھاياتلىق بىلەن ماماتلىقنىڭ سىرىنى ھەدبەگەندىلا بىلىپ كېتەلمىگەن ئەمەس، لېكىن بىلىشكە بەكمۇ قىزىققان. ئىنسانلار تەبىئەت ھادىسىلىرى، جۈملىدىن ئۆز بەدىنىدىكى كېسەللىكنىڭ سىرىنى ھەقىقىي بىلگەنگە قەدەر بولغان تۈمەن مىڭ يىللار مابەينىدە ئەينى زاماندىكى تەپەككۈر ئىقتىدارىنىڭ چەكلىمىسى، تەكشۈرۈپ دەلىللەش «ئۈسكۈنە - سايمان» لىرىنىڭ يوقلۇقى... قاتارلىق سە-

ۋەبلەر تۈپەيلى، بەزى قەدىمكى كىتابلاردا خاتىرىلەنگەندەك،
 ماخاۋ كېسەللىكىنىڭ ئاق داغ تىپى (Vitiligoleprasa) نى ئاق-
 كېسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇۋېتىپ، ئاقكېسەلنىمۇ يۇقۇملۇق دەپ
 قارىغان. چۈنكى، ماخاۋ كېسەللىكى ھەقىقەتەن يۇقۇملۇق بو-
 لۇپ، ئاخىرقى باسقۇچىدا بىمارنىڭ چىرايى دېۋىگە ئوخشاش
 كۆرۈمىسىز (سەت) لىشىدۇ. ئۆتمۈشتە ماخاۋ كېسەللىكىنى دا-
 ۋالاشنىڭ ئامالى بولمىغاچقا، بۇ خىل كېسەللىككە دۇچار بول-
 غانلار چالما - كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرۈۋېتىلگەن. ئۇزاق زامان
 داۋاملاشقان كېسەللىكلەرنى توغرا ئايرىيالماسلىقتەك خاتا كۆز-
 قاراشلار كىشىلەر ئارىسىدا ئاقكېسەلگە يولۇققان بىمارلاردىن
 يىرگىنىش، ئۆزىنى قاقچۇرۇش، بىمارلارمۇ خۇدۇكىسىرەپ ئۆزى-
 نى قاقچۇرۇش قاتارلىق خاھىشلار باش كۆتۈرۈپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد
 ساقلىنىپ كەلگەن، بۈگۈنكى كۈندە ئىنسانلارنىڭ تەبىئەت ھادى-
 سىلىرى، جۈملىدىن كېسەللىكنىڭ سىرىنى بىلىشتىن ئىبارەت
 قىزغىنلىقى ئاساسىي ئېقىمغا ئايلىنىپ، ھەر تەرەپلىمە ئىزدە-
 نىش، ئىنچىكە كۆزىتىش - تەتقىقات ئېلىپ بېرىش نەتىجىسىدە
 تەبىئەتنىڭ تۈرلۈك - تۈمەن سىرلىرى بىلەن كېسەللىكنىڭ
 سەۋەبلىرى ئارقا - ئارقىدىن ئېچىلىپ، پەن - تېخنىكىنىڭ
 ئىنسانىيەتنىڭ بەختى ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئىستىكى رېئال-
 لىققا ئايلانماقتا. ئىلگىرى ئادەم بەدىنىدە يۈز بېرىدىغان ھەر
 خىل كېسەللىكلەرنىڭ سەۋەبى ئېنىقلانمىغانغا ئوخشاش، ئاقكې-
 سەلنىڭمۇ كېسەللىك سەۋەبچىسى بىلەن داۋالاش چارىسى تېپىل-
 مىغان ئىدى. ھازىر ئاقكېسەلنى داۋالاشنىڭ مۇكەممەل بىر
 يۈرۈش چارىلىرى مەيدانغا كەلگەندىن باشقا، ئاقكېسەل بىلەن
 ماخاۋ كېسەللىكىنىڭ بىر - بىرىگە تۈپتىن ئوخشىمايدىغان ئىككى
 خىل كېسەللىك ئىكەنلىكى، يەنى ئاقكېسەلنىڭ ھەرگىز يۇقماي-
 دىغانلىقى ۋە ھاياتلىق، سالامەتلىككە چوڭ تەسىر كۆرسەتمەيدى-

خانلىقى، ئۆگىنىش، خىزمەت (ئەمگەك) ئىقتىدارىغا زىيان يەتكۈزمەيدىغانلىقى، پەقەت تاشقى گۈزەللىككەلا ئۇقسان يەتكۈ- زىدىغانلىقى ھەمدە ئالدىنى ئالغىلى ۋە ئۇنى داۋالىغىلى بولىدۇ- خانلىقى ئىسپاتلاندى. مەسىلەن، ھازىر دۆلىتىمىز ۋە چەت ئەللەردە ئاقكېسەلنى داۋالىغاندىن كېيىن ئۈنۈم بېرىشى %90 كە، تولۇق ساقىيىش نىسبىتى 10 ~ %30 ئەتراپىغىچە يەتتى. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى 1955 - يىل ئاپتونوم رايونىمىز بويىچە ئەڭ بالدۇر قۇرۇلغان ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى بولۇش بىلەن بىر چاغدا، ئاپتونوم رايون ۋە مەملىكەت ئىچىدە ئاقكېسەلنى داۋالاشنى ئەڭ بالدۇر (1958 - يىلىدىن باشلاپ) كلىنىكىدا يولغا قويۇش بىلەن بۇ تۈر ئۈستىدە ئۈزلۈكسىز ئىزدىنىپ، كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى يارىتىش ئار- قىلىق ئالاھىدە تونۇلدى. كونكرېت ئېيتقاندا، ھازىرغىچە بول- غان 46 يىل مابەينىدە 6737 نەپەر ئاقكېسەل بىمارىنى كلىنى- كىلىق داۋالاپ، داۋالاش ئۈنۈمىنى %95 كە يەتكۈزۈشتەك ياخ- شى نەتىجىنى قولغا كەلتۈردى. بۇ 46 يىللىق كلىنىكىلىق داۋالاش ئەمەلىيىتىدە ئۇزاق ۋاقىت ئىنچىكە كۆزىتىش، تەكشۈ- رۇپ - تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ئاقكېسەلنىڭ باشقىلارغا يۇقماي- دىغانلىقى ئىسپاتلاندى.

ئاقكېسەلنىڭ ھەرقايسى دۆلەت، رايون، ئىرق، مىللەتلەر ۋە ھەر خىل ياشتىكىلەردە تارقىلىشى

ماتېرىياللاردا تونۇشتۇرۇلۇشىچە، پۈتۈن دۇنيادا تەخمىنەن 40 — 50 مىليونچە ئادەم ئاقكېسەلگە گىرىپتار بولغان بولۇپ، دۇنيا ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ 1% ~ 2% نى ئىگىلىگەن. شۇنى مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇكى، بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش دەرىجىسى ھەرقايسى دۆلەت، رايون، ئىرق، مىللەت ۋە كىشىلەرنىڭ تېرە رەڭگىگە ئاساسەن ئوخشىمايدۇ. ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا، قارا تەنلىكلەردە ئۇنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى يۇقىرى، ئاق ۋە سېرىق تەنلىكلەردە بولسا نىسبەتەن تۆۋەن بولغان. ستاتىستىكىلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، ئامېرىكىدا ئاقكېسەلگە گىرىپتار بولغانلار تەخمىنەن 2 — 4 مىليونچە بولۇپ، پۈتۈن ئامېرىكا نوپۇسىنىڭ 1% — 2% نى ئىگىلىگەن؛ ياپونلاردا تەخمىنەن 2% كە، ھىندىستاننىڭ جەنۇبىدا بولسا تەخمىنەن 4% كە يەتكەن.

دۆلىتىمىزنى ئالساق، نوپۇس كۆپ، ھەرقايسى رايونلارنىڭ ئۆز تەۋەلىكىدىكى كىشىلەر ئىچىدە بۇ كېسەللىككە گىرىپتار بولغانلار نىسبىتىنى دۆكلات قىلىشى ئوخشاش ئەمەس. مەسىلەن، شاڭخەي شەھىرىدە 110 مىڭ ئادەمنى تەكشۈرگەندە بۇ كېسەللىككە گىرىپتار بولغانلارنىڭ نىسبىتى 0.54%؛ شەن-

دۇڭنىڭ جىنەن شەھىرىدە 460 مىڭ ئادەمنى تەكشۈرگەندە 2.7%؛ خۇبىيىنىڭ مەلۇم بىر ناھىيىسىدىكى 35 مىڭ ئادەمنى تەكشۈرگەندە 0.5 — 1% بولغان. ئىنچىكىلەپ تەكشۈرۈشكە ئاساسلانغاندا، 95% بىمار 40 ياشتىن بۇرۇن بۇ كېسەللىككە گىرىپتار بولغان. بۇلارنىڭ ئىچىدە 11 — 30 ياشقىچە بولغانلاردا بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى ئومۇمىي نىسبەتنىڭ 60% تىن يۇقىرىسىنى ئىگىلىگەن.

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى 3356 نەپەر ئاقكېسەلنىڭ كېسەللىكى داۋالاپ ئاخىرقى نەتىجىنى ياش پەرقى بويىچە ستاتىستىكا قىلىپ، ئۈنۈم بېرىش نىسبىتى ۋە ئومۇمىي ئۈنۈم دەرىجىسى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەندەك بولغان. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى 1958 - يىلىدىن 2003 - يىلىغىچە كېسەلخانىدا جەمئىي 6737 نەپەر ئادەم قېتىم ئاقكېسەل بىمارىنى ياتقۇزۇپ داۋالغان بولۇپ، ئاغرىقلارنىڭ كلىنىكىلىق ماتېرىياللىرىنى ئانالىز قىلغاندا، جىنس پەرقى جەھەتتە ئاقكېسەلنىڭ يۈز بېرىش نىسبىتى ئەرلەردە ئاياللارغا قارىغاندا تۆۋەنرەك بولغان، كېسەللىك ۋاقتى ئەڭ قىسقىلىرى ئىككى ئاي، ئۇزۇنلىرى 45 يىل، ياش جەھەتتە ئەڭ كىچىكلىرى 60 كۈنلۈك بوۋاق، ئەڭ چوڭلىرى 71 ياشلىق كىشىلەردۇر.

ئاق داغنىڭ كىچىكلىرى ئۆرۈك مېغىزچىلىك، چوڭلىرى بولسا پۈتۈن بەدەن تېرىسىنىڭ 90% ىدىن كۆپرەكىنى ئىگىلىگەن.

بۇ 1988 - يىلىدىن 2003 - يىلىغىچە بولغان 16 يىللىق كلىنىكىلىق داۋالاشتىكى ياش پەرقى خۇلاسە جەدۋىلى

كېسەللىك ئومۇمىي ئۆلچۈم نىسبىتى	ئۆلچۈم بولمىغانلار		ئۆلچۈم بولغانلار		ئۆلچۈم ئادەتتىكىچە بولغانى		ئۆلچۈم كۆرۈنەرلىك بولغانى		تولۇق سا. قايتىنى		ئىگىلىگەن نىسبىتى (%)	ئومۇمىي سانى	ياش پەرقى ئايرىمىسى
	%	سانى	%	سانى	%	سانى	%	سانى	%	سانى			
98.1	838	1.8	16	24.5	209	49.2	420	24.5	209	25.4	854	10 — 1 ياشقىچە	
97.5	982	2.5	25	22.7	229	48.3	486	26.5	267	30	1007	20 — 11 ياشقىچە	
96.1	567	3.9	23	28.3	167	43.8	259	23.9	141	17.6	590	30 — 21 ياشقىچە	
93.8	459	6.1	30	26.8	131	45.2	221	21.9	107	14.6	489	40 — 31 ياشقىچە	
90.5	219	9.5	23	42.1	102	30.6	74	17.7	43	7.2	242	50 — 41 ياشقىچە	
86.2	150	13.8	24	38.5	67	37.9	66	9.8	17	5.2	174	70 — 51 ياشقىچە	
95.8	3215	4.2	141	26.9	905	45.5	1526	23.4	784	100	3356	ئومۇمىي سانى	

بىمارلار مىللەت ئايرىمىسى جەھەتتە ئۇيغۇر، خەنزۇ، خۇيزۇ، قازاق، رۇس، قىرغىز، تاجىك، ئۆزبېك، جۇاڭزۇ، مانجۇ، چاۋشيەنزۇ، موڭغۇل، زاڭزۇ، ياپون قاتارلىق 10 نەچچە مىللەتتىن تەركىب تاپقان بولۇپ، مەملىكىتىمىزدىكى 27 ئۆلكە ئاپتونوم رايونىدىن كەلگەن. ئۇلار ئىچىدە ئۇيغۇرلاردىن قالسىلا خەنزۇ بىمارلار كۆپرەك نىسبەتنى ئىگىلەيدۇ. ئىگىلىشىمىزچە، 25 ياشتىن تۆۋەن بولغان ئاقكېسەل بىمارلىرى ئومۇمىي ئاقكېسەل بىمارلىرى سانىنىڭ %51 نى ئىگىلىگەن.

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى تەشكىللىگەن خادىملارنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭدىكى يېزا ئىگىلىك 3 - دېۋىزىيىسىنىڭ 41 - تۈەنى، يېڭىشەھەر ناھىيىسىنىڭ ھاراپ يېزىسى، قەشقەر شەھىرىنىڭ يانبۇلاق سۈپەتلىك ئۇرۇقچىلىق مەيدانى، تاشقورغان تاجىك ئاپتونوم ناھىيىسىنىڭ شىمالىدىكى مازار يېزىسى ۋە قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئاقچى ناھىيىسى قاتارلىق جايلاردىكى تۆت مىللەتتىن تەركىب تاپقان 7049 نەپەر ئاھالە ئارىسىدا ئاقكېسەلنىڭ تارقىلىش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشىدىن مەلۇم بولۇشىچە، بىمارلارنىڭ ئەڭ كىچىكى 2 ئايلىق بوۋاق، ئەڭ چوڭى 98 ياشلىق بوۋايلار ئىكەن. تەكشۈرۈلگەن ئۇيغۇرلار 3081 كىشى، خەنزۇلار 1331 كىشى، تاجىكلار 1214 كىشى، قىرغىزلار 1423 كىشى. بۇلاردىن رەسمىي ئاقكېسەل دەپ بېكىتىلگەن 76 كىشى بولۇپ، ئومۇمىي ئادەم سانىنىڭ %1.08 نى ئىگىلىگەن.

بۇنىڭ ئىچىدە تەكشۈرۈلگەن ئەرلەر 3657 نەپەر بولۇپ، رەسمىي ئاقكېسەل 50 كىشى، كېسەللىك يۈز بېرىش نىسبىتى %1.37، ئاياللار 3392 نەپەر بولۇپ، ئاقكېسەل دەپ بېكىتىلگەن 26 كىشى، كېسەللىك يۈز بېرىش نىسبىتى %0.77.

بولۇپ، ئەرلەردىكى ئاياللاردىن بىر ھەسسىدەك يۇقىرى بولغان. ئاڭكەشلىك ئوخشىمىغان مىللەتلەردىكى يۈز بېرىش ئەھۋالى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەندەك بولغان.

مىللەت ئايرىمىسى	ئۇيغۇر	خەنزۇ	تاجىك	قىرغىز	جەمئىي
تەكشۈرۈلگەن ئادەم سانى	3081	1331	1214	1423	7049
كېسەل ئادەم سانى	41	27	1	7	76
كېسەللىك يۈز بېرىش نىسبىتى (%)	1.33%	2.03%	0.08%	0.49%	1.08%

يۇقىرىقى جەدۋەلدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، خەنزۇلاردا كېسەللىك يۈز بېرىش نىسبىتى ھەممىدىن يۇقىرى، ئۇنىڭدىن قالسا ئۇيغۇرلار تۇرىدۇ. خەنزۇلار بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئولتۇراقلىشىش، ياشاش مۇھىتى ئاساسەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئاڭكەشلىك ھەرقايسى ياشتىكىلەردە يۈز بېرىش ئەھۋالى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەندەك بولغان.

ياش ئايرىمىسى	10 ياشتىن تۆۋەنلەر	11 — 20	21 — 30	31 — 40	41 — 50	51 — 60	60 ياشتىن يۇقىرىلار	جەمئىي
تەكشۈرۈلگەن ئادەم سانى	2088	2303	853	805	478	326	196	7049
كېسەل ئادەم سانى	20	19	19	8	3	4	4	76
كېسەللىك يۈز بېرىش نىسبىتى (%)	0.96	0.83	2.28	0.99	0.63	1.23	2.04	1.08

بۇ جەدۋەلدىن 21 — 30 ياشقىچە ۋە 51 — 60 ياشقىچە،
 ئاندىن 60 ياشتىن يۇقىرىلاردا كېسەللىك يۈز بېرىش نىسبىتىدە
 نىڭ يۇقىرىلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
 تەكشۈرۈلگەن تۆت مىللەت كىشىلىرى ئارىسىدا ئاقكېسەل-
 نىڭ يۈز بېرىش ئەھۋالى ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ تۇرمۇش شا-
 رائىتىنىڭ ئوخشىماسلىقى بىلەن كېسەللىك يۈز بېرىشنىڭ
 مۇناسىۋىتىنى مۇھاكىمە قىلىش زۆرۈرلۈكىنى ئۆتتۈرىدۇ.
 جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بۇ تۆت مىللەت ئاھالىسىنىڭ ئاسا-
 سىي ئوزۇقلۇقى ئومۇمەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ، يەنى بۇغداي
 ئۇنى بىلەن گۈرۈچنى ئاساسىي يېمەكلىك قىلىدۇ. پەقەت تا-
 جىكلارنىڭ بۇغداي ئۇنىغا %5 پۇرچاق ئۇنى قوشۇپ ئىستېمال
 قىلىشلا پەرقلەندۈرۈلگەن. ئۇيغۇر، قىرغىز، تاجىكلار ئىسلام دىنى-
 غا ئىتىقاد قىلغاچقا، گۆش ئىستېمالى ئوخشاش، قىرغىز،
 تاجىكلار سۈت ۋە سۈت ياسالغۇچىلىرىنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىد-
 ۇ، بېلىق گۆشى يېمەيدۇ. خەنزۇلارنى ئالسا، باشقا گۆش
 تۈرلىرىدىن باشقا چوشقا گۆشى يەيدۇ. شۇنىڭدەك ئىستېمال
 قىلىدىغان سەي - كۆكتاتلىرىنىڭ تۈرى ۋە مىقدارىمۇ باشقىلار-
 نىڭكىدىن ئالاھىدە كۆپ. ئۇيغۇرلار سەي - كۆكتاتنى نورمال
 ئىستېمال قىلىش، تۈرى ئانچە جىق ئەمەس. قىرغىز ۋە
 تاجىكلارنىڭ بولسا سەي - كۆكتات ئىستېمالى يوق ھېسابتا
 بولۇپ، ئالاھىدە تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغان بىر يېرى، تاجىكلار
 تاغ زىرىسىنىڭ ئورۇقى بىلەن يىلتىزنى يېيىشكە ئادەتلەنگەن،
 بۇ ئۆسۈملۈك ئورۇقىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاشتا ئۈنۈمى بارلىقى
 ئىسپاتلانغان.
 يۇقىرىقى تەكشۈرۈش ماتېرىياللىرى ۋە كىلىنىكىلىق دا-

تېرىنىڭ ئاناتومىيىلىك تۈزۈلۈشى ۋە فىزىئولوگىيىلىك رولى

1. تېرىنىڭ تۈزۈلۈشى

تېرە بەدەن سىرتىنى ئوراپ تۇرىدىغان ئالدىنقى قورغاندىن ئىبارەت. تېرىنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقى ۋە ئىگىلىگەن كۆلىمى جەھەتتىن ئالغاندا، بەدەندىكى ئەڭ چوڭ ئەزا ھېسابلىنىدۇ، يەنى ئومۇمىي ئېغىرلىقى پۈتۈن بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %16 گە توغرا كېلىدۇ. كۆلىمى بولسا چوڭلارنىڭ 1.5 ~ 2 كۋادرات مېتىر؛ يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ 0.21 كۋادرات مېتىر كېلىدۇ. جايلاشقان ئورنىغا قاراپ قېلىنلىقىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بەدەننىڭ ھەرقايسى قىسىملىرىدىكى تېرىلەرنىڭ قېلىن-ئېپىزلىكىدە پەرق بولىدۇ. ئادەتتە تېرە ئاستىدىكى ماي قاتلىمىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، قېلىنلىقى 0.5 ~ 4 مىللىمېتىر ئەتراپىدا كېلىدۇ. بالىلارنىڭ تېرىسى چوڭلارغا نىسبەتەن ئېپىز بولىدۇ. قول - پۇتلارنىڭ ئىگىلىدىغان قىسىملىرىنىڭ تېرىسى تۈز جايلىرىنىڭكىدىن ئېپىز كېلىدۇ. باشنىڭ ئارقىسى، بويۇن، كاسا ۋە قول - پۇت ئالتىقلىرىنىڭ تېرىسى ھەممىدىن قېلىن؛ كۆز جىيىكى، قاپاق، سىرتقى جىنسىي ئەزا، ئەمچەك قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ تېرىسى ھەممىدىن ئېپىز بولىدۇ.

تېرىنىڭ يۈزىدە نۇرغۇن ئورچەك تۆشۈكچىلەر بولۇپ، تەر

تۆشۈكچىلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. تەر تۆشۈكچىلىرىنىڭ يوللىرى تېرە ئاستىدىكى تەر بەزىلىرىگە تۇتاشقان بولىدۇ. تېرە يۈزىدىكى ھەر خىل قورۇق، سىزىقچىلار بولسا توقۇلما تۈزۈلۈشى ۋە تارتىشىش نەتىجىسىدە شەكىللەنگەن بولۇپ، چوڭقۇر - تېپىزلىككى ئوخشاش بولمايدۇ. يۈز، قول ئالىقىنى، تاش خالتىسى ۋە ھەرىكەت قىلىدىغان ئورۇنلارنىڭ «بوغۇملار» سىزىقچىلىرى باشقا ئورۇن سىزىقچىلىرىغا نىسبەتەن چوڭقۇر بولىدۇ.

1. تېرە رەڭگى

كىشىلەرنىڭ تېرە رەڭگى ئوخشىمايدۇ. تېرە رەڭگىنىڭ قانداق بولۇشى ئادەملەرنىڭ ئىرقى، مىللىتى، ئۇرۇقداشلىقى، يېشى، جىنسى ۋە ياشاش مۇھىتى، جۇغراپىيىلىك شارائىت قاتارلىق كۆپ تەرەپلىمە ئامىللار بىلەن زىچ باغلىنىشلىق بولىدۇ، ھەتتا مەلۇم بىر ئادەمگە نىسبەتەن ئېيتقاندىمۇ بەدىنىنىڭ ئوخشىمىغان ئورۇنلىرىدىكى تېرە رەڭگىنىڭ قېنىق - سۇسلىقىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ.

2. تېرە قەۋىتى

تېرە ئۈستۈنكى تېرە (مۈڭگۈز قەۋەت - سۈزۈك قەۋەت، دانچە قەۋەت، تىكەنلىك قەۋەت، ئاساسىي قەۋەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)، ھەقىقىي تېرە، تېرە ئاستى توقۇلمىسى، تېرىگە تەۋە قوشۇمچە ئەزا ۋە قان تومۇر، نېرۋا، مۈسكۈل قاتارلىقلاردىن تەشكىل تاپقان. ئۈستۈنكى تېرە دېگىنىمىز، تېرىنىڭ كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان قىسمى بولۇپ، ئۆزىگە خاس رەڭگە ئىگە بولىدۇ، تېرە رەڭگى ماددىسى مۇشۇ قەۋەتتە ئىشلىنىپ چىقىدۇ. ئۈستۈنكى تېرە يەنە ئۆز ئىچىدىن بەش قەۋەتكە بۆلۈنىدۇ.

بۇنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكىسى مۇڭگۇز ماددا قەۋىتىدۇر. مۇڭگۇز ماددا قەۋىتى سىرتقى مۇھىت بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىپ تۇرىدۇ. ئۇ يادروسى يوقالغان بىرنەچچە قەۋەت ياپىلاق مۇڭگۇز لەشكەن ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن بولۇپ، تەركىبىدىكى مۇڭگۇز ئاقسىلى سۈركىلىشكە قارشى تۇرۇش رولىغا ئىگە. تەن سۇيۇقلۇقىنىڭ سىرتقا سىزىپ چىقىپ كېتىشى ۋە خىمىيىلىك ماددىلارنىڭ سىڭىپ كىرىشىنى توسايدۇ. مۇڭگۇز ئاقسىلىنىڭ سۈنى سۈمۈرۈشى نىسبەتەن كۈچلۈك بولۇپ، ئادەتتە تەركىبىدىكى سۇ مىقدارى %10 تىن تۆۋەن بولمايدۇ. بۇ تېرىنىڭ يۇمشاق - ئېلاستىكىلىقىنى ساقلايدۇ. ئەگەر ساقلىنىدىغان سۇ بۇنىڭدىن تۆۋەن بولسا، تېرە قۇرغاقلىشىپ كېپەكلىشىدۇ ياكى يېرىلىپ كېتىدۇ. مۇڭگۇز ماددا قەۋىتىدىن كېيىنكىسى سۈزۈك قەۋەت بولۇپ، ئۇ يادروسى يوقالغان 2 ~ 3 قەۋەت ياپىلاق، سۈزۈك ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن. تەركىبىدە ئىپتىدائىي مۇڭگۇز ئاقسىلى بولۇپ، سۇ، ئېلېكتىرولتار ۋە خىمىيىلىك ماددىلارنىڭ ئۆتۈپ كېتىشىنى توسايدۇ. شۇڭا، توساق بەلۋېغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ قەۋەت قول - پۇت ئالقانىلىرىدا ئەڭ روشەن ئىپادىلىنىدۇ.

سۈزۈك قەۋەتتىن كېيىنكىسى دانچە قەۋەتتۇر. ئۇ تىكەنلىك قەۋەتنىڭ ئۈستىگە جايلاشقان بولۇپ، 2 ~ 4 قەۋەتكىچە ياپىلاق موكا شەكىللىك ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن. تەركىبىدە زور مىقداردا ئىشقارخۇمار سۈزۈك مۇڭگۇز ماددا دانچىلىرى بولىدۇ. دانچە قەۋەتتىكى ھۈجەيرىلەر نورمال رەۋىشتە 2 ~ 4 قەۋەتتىن كۆپىيىپ كۆپ قەۋەتكە ئايلانغاندا، دانچە قەۋەت قېلىپلاپ زىيادە مۇڭگۇزلىشىش بارلىققا كېلىدۇ. دانچە قەۋەتنىڭ يوقىلىشى كۆپىنچە مۇڭگۇزلىشىش تولۇق بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نورمال شىللىق پەردىلەردە دانچە قەۋەت بولماي-

دۇ (قاتتىق تاڭلاي بىلەن تىل دۈمبىسى بۇنىڭ سىرتىدا).
 دانچە قەۋەتتىن كېيىنكىسى تىكەنلىك قەۋەت دەپ ئاتىلىدۇ.
 ئۇ ئاساسىي قەۋەتنىڭ ئۈستىگە جايلاشقان بولۇپ، 4 ~ 8 قەۋەتتىن كۆپ تىكەنلىك ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن. تۆۋەندىن يۇقىرىغا قاراپ تەدرىجىي ياپىلاقلىشىپ، ھۈجەيرە ئارىلىقىدىكى كۆۋرۈك دانچىلار ئارقىلىق ئۆزئارا تۇتىشىپ، ئاتالمىش ھۈجەيرە ئارىلىق كۆۋرۈكىنى ھاسىل قىلىدۇ. ئەگەر كۆۋرۈك دانچىلار پارچىلىنىپ كەتسە، ھۈجەيرىلەر ئوتتۇرىسىدىكى بىرىكىش كۈچى ئاجىزلاپ، ئۆزئارا ئاجراپ كېتىدۇ. بۇ، تىكەنلىك قەۋەتنىڭ بوشاپ كېتىشى دەپ ئاتىلىدۇ. ھۈجەيرىلەر ئوتتۇرىسىدا مەلۇم ئارىلىق بولۇپ، ئىچىدىكى توقۇلما سۈيۈقلۈكى سىرتقى تېرىنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش خىزمىتىگە قاتنىشىدۇ. ئەگەر سىرتقى تېرە ھۈجەيرىلىرى ئارىسىدا سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولسا، ئوتتۇرىسىدىكى بوشلۇق كېڭىيىپ، ھۈجەيرە ئارىلىق كۆۋرۈكى ئېنىق كۆرۈنۈپ بۇلۇتسىمان ھالەت شەكىللىنىدۇ. ئەگەر ھۈجەيرە ئىچىدە سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولسا قۇرۇق پۈۋەكچە كۆرۈنۈپ كاۋاكسىمان ھالەت شەكىللىنىدۇ. مۇبادا تىكەنلىك ھۈجەيرىلەر قەۋىتى قېلىنلىسا تىكەنلىك قەۋەتنىڭ قېلىنلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئاساسىي قەۋەت دېگەنمىز، ئۈستۈنكى تېرىنىڭ ئەڭ ئاستىدىكى قەۋىتى بولۇپ، بىر قەۋەت رىشاتكىسىمان تىزىلغان تۈۋرۈك شەكىللىك ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن، ناھايىتى كۈچلۈك بۆلۈنۈپ كۆپىيىش ئىقتىدارىغا ئىگە. بۇ قەۋەتتىكى ھۈجەيرىلەر ئۆزلۈكسىز بۆلۈنۈپ (3 ~ 5% كىچە ھۈجەيرىلەر داۋاملىق بۆلۈنۈپ تۇرىدۇ)، تەدرىجىي يۇقىرىغا قاراپ يۆتكىلىپ ۋە مۇڭگۈزلىشىپ سۈپەت ئۆزگىرىشى ياساپ، سىرتقى تېرىنىڭ باشقا ھەرقايسى قەۋەتلىرىنى شەكىللەندۈرۈش بىلەن، ئەڭ ئاخىر

رىدا مۇڭگۈزلىشىپ تۆكۈلىدۇ. ئادەتتە نېگىز ھۈجەيرىلەر بۆلۈنگەندىن تارتىپ تۆكۈلۈپ تۈگىگۈچە 28 كۈن كېتىدۇ، يەنى نېگىز ھۈجەيرىلەر بۆلۈنۈپ دانچە قەۋەتنىڭ ئەڭ يۇقىرىسىغا يەتكۈچە 14 كۈن، مۇڭگۈز قەۋەتتىن ئۆتۈپ، ئاخىرىدا تۆكۈلۈپ تۈگىگۈچە 14 كۈن كېتىدۇ. نېگىز ھۈجەيرىلەرنىڭ ئارىلىقىدا «قىستۇرۇلغان» نېرۋا قىرلىرىدىن كەلگەن بىر خىل قارا پىگمېنت ھۈجەيرىلىرى بولۇپ، «شاخسىمان ھۈجەيرە، يورۇق ھۈجەيرە» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ پۈتكۈل نېگىز ھۈجەيرىلىرىدىن نىڭ 4% ~ 10% نى تەشكىل قىلىدۇ. بۇ خىل ھۈجەيرىلەر قارا پىگمېنت (تېرە رەڭ خالىلىرى) نى پەيدا قىلىپ، تېرىنىڭ رەڭگىنى بەلگىلەيدۇ. ئەگەر بۇ خىل ھۈجەيرىلەر مەلۇم سەۋەبلەر بىلەن زىيانغا ئۇچرىسا ياكى ئۆز ئىقتىدارىنى تولۇق جارى قىلالمىسا، تېرە رەڭ ماددىسى شەكىللىنىش (تېرە رەڭ خالىلىرى ھاسىل بولۇش) توسقۇنلۇققا ئۇچراش تۈپەيلى تېرە كېسەللىكلىرى (مەسىلەن، چەكلىك ياكى كەڭ دائىرىلىك ئاقكېسەل ۋە ئاق داغ قاتارلىقلار) نىڭ پەيدا بولۇشىغا ئاساسلىق سەۋەب بولۇپ قالىدۇ.

3. ھەقىقىي تېرە

ھەقىقىي تېرە ئۈستۈنكى تېرە بىلەن تېرە ئاستى توقۇلمىلىرى ئارىسىغا جايلاشقان بولۇپ، زىچ بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىدىن تۈزۈلگەن. ھۈجەيرە ئارىلىق ماددىسىدا مول ئىپتىدائىي يېلىم تالاسى، تورسىمان تالا، ئېلاستىكىلىق تالا ھەم ھەر خىل بىرىكتۈرگۈچى توقۇلما ھۈجەيرىلەردىن باشقا، قان تومۇر، نېرۋا، تەر ۋە ماي بەزىلىرى، تۈك يىلتىزى، تۈك خالتىسى سۈيۈك-لۇقى بولىدۇ. ھەقىقىي تېرىنىڭ قېلىنلىقى 1 ~ 2 مىللىمېتىر كېلىدۇ.

ھەقىقىي تېرە يەنە شورىغۇچى قەۋەت ۋە تورسىمان قەۋەتكە بۆلۈنگەن بولۇپ، بۇ ئىككى قەۋەت ئۆزئارا كىرىشىپ كەتكەنلىكتىن چېگرىسى ئېنىق بولمايدۇ. شورىغۇچى قەۋەت ئۈستۈنكى تېرىنىڭ چوڭقۇر قەۋىتىدە بولۇپ، ئاساسلىقى گىرەلىشىپ تور ھاسىل قىلغان يېلىم تالا. سى ھەم كۆپلىگەن قان تومۇرلاردىن تۈزۈلگەن، يۈزەكى تېرىنى ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلەيدۇ ۋە قالدۇق ماددىلارنى ئېلىپ كېتىدۇ. بەزى شورىغۇچىلاردا سەزگۈر كىچىك تەنچە بولۇپ، نېرۋا شورىغۇچى دېيىلىدۇ. ئۇ تېگىشىشنى سېزىش رولىغا ئىگە.

تورسىمان قەۋەت شورىغۇچ قەۋەتنىڭ چوڭقۇر قىسمىدا بولۇپ، ئىپتىدائىي يېلىم تالاسى بىلەن مول ئېلاستىكىلىق تالا، قان تومۇرلار، لىمفا كانالىلىرى، تەر ۋە ماي بەزلىرى، تۈك خالتىسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تالالار توغرىسىغا ھەم بويىغا گىرەلىشىپ تور ھاسىل قىلىپ، تېرىنى پۇختىلىق ۋە ئېلاستىكىلىققا ئىگە قىلىدۇ. تورسىمان قەۋەتتە كۆپلىگەن نېرۋا ئۇچلىرى بولۇپ، بېسىم ۋە سىلكىنىشنى سېزىش رولىغا ئىگە.

4. تېرە ئاستى توقۇلمىسى (تېرە ياغ قەۋىتى)
تېرە ئاستى توقۇلمىسى ھەقىقىي تېرىنىڭ ئاستىغا جايلاشقان بولۇپ، بوش، شالاڭ قوشقۇچى توقۇلمىلار بىلەن ئۇششاق ماي ياپراقچىلىرىدىن تۈزۈلگەن، ئۇنىڭ ئاستى تەرىپى مۇسكۇل پەردىسىگە ناھايىتى يېقىن كېلىدۇ. ماي قاتلىمىنىڭ قېلىن - نېپىز بولۇشى ئادەمنىڭ جىنسى، يېشى ۋە ئوزۇقلىنىش ئادىتى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. تېرە ئاستى توقۇلمىلىرىنىڭ تەركىبىدە نىسبەتەن چوڭراق بولغان قان تومۇرلار ۋە لىمفا

كاناللىرى، نېرۋا، تۈك خالتىلىرى، تەر بەزلىرى قاتارلىقلار بولىدۇ. ئاقكېسەل شەكىللەنگەن ئورۇندىكى تۈكلەرنىڭ ئاقىرىد- شى كېسەللىكنىڭ تېرە ئاستى توقۇلمىسىغا قەدەر تەسىر كۆر- سەتكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.

تېرە ئاستى توقۇلمىسى بەدەن ئىسسىقلىقىنى ۋە ياغ زاپى- سىنى ساقلاش، سىرتقى زەخمىلىنىشلەردىن مۇداپىئەلىنىش قا- تارلىق روللارنى ئوينايدۇ.

5. تېرىگە تەۋە قوشۇمچە ئەزالار

تېرىگە تەۋە قوشۇمچە ئەزالار تەركىبىگە تېرىدىن ئوزۇقلد- نىپ تېرە ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان، باشقىچە ئېيتقاندا، تېر- نى مۇھاپىزەتلەيدىغان ئەزالار كىرىدۇ. ئۇلار تۈك (چاچ)، تىرناق، تېرە ماي بەزلىرى، تېرە تەر بەزلىرى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

1) تۈك (چاچ) ئادەتتە بىر خىل مۇڭگۈز ماددىدىن تۈزۈل- گەن بولۇپ، تېرىدىن ئۆسۈپ چىقىپ سىرتقا كۆرۈنۈپ تۇرغان قىسمى تۈك غولى، تېرىنىڭ ئىچىدىكى قىسمى تۈك يىلتىزى دېيىلىدۇ. تۈك يىلتىزىنىڭ ئەڭ ئاستى قىسمى يۇمىلاق پىيازغا ئوخشاپ كەتكەنلىكتىن، تۈك خالتىسى ياكى تۈك پىيازچە قىس- مى دېيىلىدۇ. تۈكلەر تېرىنىڭ ھەممە يېرىگە دېگۈدەك تارقا- لغان بولۇپ، پەقەت قول - پۇت ئالىقىنى، تىرناق، بارماقلارنىڭ ئىگىلىدىغان تەرىپى، قول - پۇت بارماق ئۇچلىرىنىڭ تۈزلىنىد- ىغان تەرىپى، كالىپۇكنىڭ قىزىل قىسمى، ئېغىز، كۆز - قاپاقنىڭ ئىچكى تەرىپى، زەكەر ئۇچى (پۆپۈك ياكى خەتنىلىك) نىڭ ئىچكى تەرىپى، چوڭ - كىچىك لەۋلىرىنىڭ ئىچكى تەر- پى، دىلچىق قاتارلىق ئورۇنلاردا بولمايدۇ. تۈكلەر ئادەتتە يىرىك تۈك ۋە يۇمشاق تۈك (سېرىق تۈك) دەپ ئىككىگە بۆلۈند-

6. تېرە قان تومۇرلىرى ۋە نېرۋا
ئۈستۈنكى تېرىدە قان تومۇرلار بولمايدۇ. ھەقىقىي تېرە
ۋە تېرە ئاستى توقۇلمىسىغا قىزىل قان تومۇر (شەردان) ۋە
كۆك قان تومۇر (ۋەرئىد) كۆپ مىقداردا ئورۇنلاشقان بولىدۇ.
قىزىل قان تومۇرلار تېرىنىڭ چوڭقۇر قەۋىتىدىكى توقۇلمىلار.
دىن تېرە ئاستىدىكى توقۇلمىلارغا كىرىپ شاخچىلارغا بۆلۈنۈپ
شۇ ئورۇندىكى توقۇلمىلار (تەر ۋە ماي بەزلىرى، تۈك خالىتى-
سى، نېرۋا ھەم مۇسكۇللار) نى ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەيدۇ،
شۇنداقلا يەنە داۋاملىق يۇقىرىغا ئۆرلەپ ھەقىقىي تېرىگە كىرىپ
شاخلىنىپ، كۆك قان تومۇرلارغا ياندىشىپ ھەقىقىي تېرىنىڭ
قان تومۇرلىرىنى شەكىللەندۈرىدۇ. تېرە قان تومۇرلىرى: بى-
رىنچىدىن، بەدەن ھارارىتىنى تەڭشەش رولىنى ئوينايدۇ؛ ئىك-
كىنچىدىن، ئوزۇقلۇق ماددىلارنى يۈرۈشتۈرۈپ توشۇيدۇ، شۇ-
نىڭدەك ماددا ئالمىشىشتىن ھاسىل بولغان كېرەكسىز نەرسى-
لەرنى سىرتقا چىقىرىدۇ؛ ئۈچىنچىدىن، بەدەنگە ھەر خىل قۇۋ-
ۋەتلەرنى يەتكۈزۈش ئارقىلىق سىرتتىن كېلىدىغان زىيان -
زەخمەتلەرگە تاقابىل تۇرىدۇ؛ تۆتىنچىدىن، تېرە تاسادىپىي زە-
خمىلىنىپ ئەسلىگە كېلىش جەريانىدا يېڭى قان تومۇرلارنى
ھاسىل قىلىدۇ.

تېرىدە سەزگۈر نېرۋا تالالىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئا-
ساسلىق رولى تېرىگە سىرتقى مۇھىتتىن كەلگەن ھەر خىل
تەسىرلەر (مەسىلەن ئىسسىق - سوغۇق، بېسىلىش، سۈركە-
لىش، ئاغرىش، قىچىشىش قاتارلىقلار) نى سېزىپ مەركەزگە
ئىنتىلگۈچى نېرۋا تالاسى ئارقىلىق چوڭ مېڭىگە يەتكۈزىدۇ،
ئاندىن مەركەزدىن قاچقۇچى نېرۋا تالاسى ئارقىلىق يەرلىك ئو-
رۇنغا يەتكۈزۈپ تېرىدە رېفلىكس پەيدا قىلىدۇ. يۇقىرىدا تىلغا

ئېلىنغان بۇ ئىككى خىل نېرۋا تالاسى پاراللېل قارىمۇقارشى يۆلىنىشتە ئورۇنلاشقان بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، قان تومۇر، تەر بېزى ۋە تۈك تىكلىگۈچى مۇسكۇللارنىڭ خىزمىتىنى تەڭشەيدىغان ۋېگېتاتىۋ نېرۋىدىن بۆلۈنگەن ھەرىكەت تالاسىمۇ بار.

7. مۇسكۇللار

تېرىدە ئاساسلىقى سىلىق يوللۇق ۋە توغرا يوللۇق مۇسكۇلدىن ئىبارەت ئىككى خىل مۇسكۇل بولىدۇ. سىلىق يوللۇق مۇسكۇل ئادەتتە تۈكلەرنى تىكلەش رولىغا ئىگە. ئۇنىڭ بىر تەرىپى تۈك خالتىسىنىڭ تۆۋەنكى ئۇچتىن بىر قىسمىغا، يەنە بىر تەرىپى ھەقىقىي تېرىنىڭ يۇقىرىقى قاتلىمىغا ئورۇنلاشقان. ئۇ قىسقارغاندا چاچ - تۈكلەر تىكلىشىدۇ. قان تومۇر دىۋارى، ئەمچەك دېغى، ئۇرۇق خالتىسى، مۇسكۇل پەردىلىرىنىڭ ھەممىسىدە بۇ خىل مۇسكۇللار بولىدۇ. توغرا يوللۇق مۇسكۇللار ئومۇمەن يۈز قىسمىدا بولۇپ، يۈز نېرۋىسى تەرىپىدىن باشقۇرۇلىدۇ.

2. تېرىنىڭ رولى

تېرىمۇ باشقا ئەزالارغا ئوخشاش ھاياتلىق پائالىيىتىگە قاتنىشىپ، بەدەن بىلەن سىرتقى مۇھىتنىڭ دىئالېكتىكىلىق بىرلىكىنى ساقلاپ، تەن ساغلاملىقىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ. تېرىنىڭ فىزىئولوگىيىلىك رولى تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

1. قوغداش رولى

تېرىنىڭ قوغداش رولى كۆپ تەرەپلىملىك بولۇپ، بەدەن

(ئەسەب) تۈرلىرى بولغاچقا، ھەر خىل تاشقى تەسىرلەرنى دەر- ھال سېزىپ، مېڭىگە ئۇچۇر يەتكۈزەلەيدۇ. تېرە نېرۋىلىرىدا تەسىرلەرنى سېزىش (ئىسسىق، سوغۇق، ئۇرۇلۇش، تېگىش، ئاغرىش، قاتتىق - يىرىك نەرسىدىن يېقىمىسىزلىنىش، سىلىق، يۇمشاق نەرسىدىن راھەتلىنىش، توڭۇپ تىترەش، ئېغىر - يەڭ- گىللىكنى پەرق ئېتىش قاتارلىق) تەك ئىقتىدار بولىدۇ. تېرە يەنە قىچىشىشنى دەر ھال سېزىدۇ. بەدەننىڭ ھەرقايسى جايلىرى- نىڭ قىچىشىشنى سېزىشىدە روشەن پەرق بولىدۇ. كۆنكرېت ئېيتساق، سىرتقى قۇلاق يولى، بۇرۇن، سىرتقى جىنسىي ئەزا قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ سىزگۈلۈكى كۈچلۈكرەك بولىدۇ.

6. ماددا ئالماشتۇرۇش رولى

تېرىدە خېلى زور مىقداردىكى سۇ ۋە مايلا ساقلانغان بولىدۇ. ئادەم بەدىنىدىكى سۇنىڭ تەخمىنەن 18% — 20% ى تېرىدە ساقلانغاندىن باشقا، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى ئاقسىل، قەنت، ۋىتامىن قاتارلىق ماددىلار پۈتۈن ئورگانىزىمىدىكى ماددا ئالمىشىشقا قاتنىشىدۇ. شۇڭا، ئورگانىزىمىدىكى ماددا ئالمىشىش توسالغۇغا ئۇچرىغاندا، تېرىنىڭ نورمال ماددا ئالماشتۇرۇشىغا تەسىر كۆرسىتىپ، مەلۇم تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ پەيدا بولۇ- شىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەكسىچە، تېرىنىڭ ماددا ئالماش- تۇرۇشى توسالغۇغا ئۇچرىغاندىمۇ پۈتۈن ئورگانىزىمىدىكى ماددا ئالمىشىشقا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ئۈستۈنكى تېرىنىڭ ئەڭ سىرتقى قاتلىمى (مۇڭگۈز قە- ۋەت) نىڭ كېپەكلىشىپ چۈشۈپ كېتىپ يەنە يېڭىدىن شەكىللە- نىش ۋە تېرە زەخىملىرىدىكى ئىششىقلارنىڭ ياخشىلىنىشقا يۈز- لىنىشىمۇ تېرىدىكى بىر خىل ماددا ئالماشتۇرۇش جەريانىدىن ئىبارەت.

ئاقكېسەلنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرى

ئاقكېسەلنىڭ قانداق پەيدا بولىدىغانلىقى تېخى ئېنىقلانغىنى يوق. قەدىمدىن تاكى ھازىرغا قەدەر ئۆتكەن تېببىي ئالىملارنىڭ ناھايىتى نۇرغۇن داۋالاش ۋە كۆزىتىش نەتىجىلىرى، مۇھاكىمە، تەتقىقاتلىرى، كلىنىكىلىق داۋالاش تەجرىبىلىرى بولسىمۇ، لېكىن بۇ ھەقتىكى قاراشلارنىڭ كۆپچىلىكى ئىلىم - پەننىڭ بۈگۈنكى تەرەققىياتى تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى نەزەردىن ئۆتكۈزۈلگەن ئاساسلار ئالدىدا خېلىلا يىراقتا تۇرماقتا. شۇنداقتىمۇ كۆز يۈمۈشقا بولمايدۇكى، ئەجدادلىرىمىز زامانىۋى پەن - تېخنىكا شارائىتى بولمىغان ئوتتۇرا ئەسىرلەردىلا ئۆزلىرىنىڭ شۇ زامانغا يارىشا تەپەككۈر ئىقتىدارى، ئەقىل - پاراسىتىنى ئىشقا سېلىپ، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك نەزەرىيە ئاساسلىرىدىكى تۈپكى قاراشلارنى چىقىش قىلغان ھالدا ئاقكېسەلنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرى ھەققىدە ئىلمىيلىق كىشىنىڭ زوقىنى كەلتۈرىدىغان خېلى مۇكەممەل قاراشلارنى ئوتتۇرىغا قويغان. تارىختا ئۆتكەن ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئورتاقلىققا ئىگە پىكىرلىرى ۋە قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاشتىكى 40 نەچچە يىللىق ئەمەلىيىتىدىن چىقىرىلغان يەكۈنلىرىگە ئاساسلانغاندا، ئاقكېسەلنىڭ تېرە توقۇلمىلىرىدا پەيدا بولۇش سەۋەبى ناھايىتى مۇرەككەپ ۋە كۆپ تەرەپلىملىك ئامىللارغا باغلىق بولۇپ، بۇلارنى تۆۋەندىكىدەك نۇقتىلارغا يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ:

1. رەئىس ئەزالار خىزمىتى

قالايمقانلىشىش

مېڭە، يۈرەك ۋە جىگەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان رەئىس ئەزا-لارنىڭ خىزمىتى ئىچكى ۋە سىرتقى ئامىللار تەسىرىدىن قالايىم-قانلاشقاندا بارلىق ئەزا ۋە توقۇلمىلار جۈملىدىن تېرىنىڭ ئو-زۇقلاندۇرغۇچى كۈچى (قۇۋۋىتى جازىبە)، تۇتۇپ تۇرغۇچى كۈچى (قۇۋۋىتى ماسكە)، ھەزىم قىلىش كۈچى (قۇۋۋىتى ھازىمە)، شەكىللەندۈرگۈچ كۈچى (قۇۋۋىتى مۇسەۋۋىدە) ۋە ھەيدەپ چىقارغۇچى كۈچى (قۇۋۋىتى داپىئە) قاتارلىقلارنىڭ قالايىمقانلىشىشى تېرىنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىغا تو-سالغۇ پەيدا قىلىش بىلەن تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ ھاسىل بولۇ-شىنى تەسىرگە ئۇچرىتىش نەتىجىسىدە ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ. بىر قىسىم كىشىلەردە ئاقكېسەل پەيدا بولۇشتىن ئىلگىرى يۈز بەرگەن ئەسەب (نېرۋا) ئاجىزلىقى، نېرۋا سىستېمىسىنىڭ خىزمىتىنىڭ بۇزۇلۇشى، ئىچكى سىكرېتسىيە بەزىلىرى خىزمە-تىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى، روھىي زەربە، روھىي ئازابلى-نىش ۋە ياشلارنىڭ كۆپ ئېھتىلام بولۇشى قاتارلىق كۆپ تەرەپ-لىمە ئەھۋاللار بۇ نۇقتىنى ئىسپاتلايدۇ.

2. مىجەز بىلەن خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقى

بۇزۇلۇش

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئادەم بەدىنىدىكى خىلىتلارنى تۆت چوڭ ماددا (ئوت، ھاۋا، سۇ، تۇپراق) نىڭ ئوخشىمىغان نىس-سە

بەتتە بولۇشىدىن ھاسىل بولغان تۆت خىل «سۇيۇقلۇق» دەپ قارايدۇ. تەبىئىي جەھەتتىن ئۇلار: ئوت ياكى سەپرا (قۇرۇق ئىسسىق)، قان (ھۆل ئىسسىق)، بەلغەم (ھۆل سوغۇق)، سەۋدا (قۇرۇق سوغۇق) قاتارلىقلارغا بۆلۈنىدۇ.

بۇ تۆت خىل سۇيۇقلۇقنىڭ ھەربىر ئادەمدىكى نىسبىتى ئوخشىمايدۇ، يەنى جەزمەن بىر خىلى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەيدۇ. بۇ خىل ئۈستۈنلۈك كىشىلەرنىڭ تەبىئىتى (مىجەزى) نى بەلگىلەيدۇ. شۇڭلاشقا، كىشىلەرنىڭ مىجەزى قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، ھۆل سوغۇق ۋە قۇرۇق سوغۇقتىن ئىبارەت تۆت خىل بولىدۇ.

مىجەز بىلەن خىلىتلار ئادەم بەدىنىدىكى ھاياتلىق پائالىيەتلىرىنىڭ ئىچكى مۇھىتى ھېسابلىنىدۇ. ئىنسانلار ئىستېمال قىلغان ئوزۇقلار ئاشقازان، ئۈچەيدىكى ھەزىم بولۇش جەريانىنى تاماملىغاندىن كېيىن، بەدەنگە كېرەكلىك قىسمى ئۈچەيدە سۈمۈرۈلۈپ جىگەرگە يېتىپ بارىدۇ، ئاندىن جىگەرنىڭ پىششىقلىشى ئارقىسىدا سەپرا، قان، بەلغەم ۋە سەۋدالاردىن ئىبارەت تۆت خىلنى ھاسىل قىلىدۇ.

ئوزۇقلارمۇ تۆت خىل چوڭ ماددىدىن تەركىب تاپقانلىقى ۋە تەركىبىدىكى تۆت خىل ماددىنىڭ بىرى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەنلىكى ئۈچۈن، قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، ھۆل سوغۇق ۋە قۇرۇق سوغۇقتىن ئىبارەت تۆت خىل تەبىئەتتە بولىدۇ. ئادەم ھاياتلىق پائالىيەتنىڭ مۇھىم ئىچكى مۇھىتى بولغان مىجەز بىلەن خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقى كۈندىلىك تۇرمۇشتا داۋاملىق ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللار (يېمەك - ئىچمەك ۋە مۇھىت قاتارلىقلار) نىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بىراق، نورمال ئەھۋالدا رەئىس ئەزالار (مېڭە، يۈرەك، جىگەر) نىڭ تەڭشىشى بىلەن داۋاملىق ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى ساقلايدۇ. ئەگەر بۇ خىل

ھەرىكەتچان نەڭپۇڭلۇق ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇزاقراق ئۇچرىسا، مەجەز بىلەن خىلىتلارنىڭ تەبىئىي (نور-مال) تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇپ، بىر تەرەپتىن رەئىس ئەزالار (مې-ڭخە، يۈرەك، جىگەر) نىڭ خىزمىتى قالايمىقانلىشىدۇ، يەنە بىر تەرەپتىن خىلىتلارنىڭ ئۆزئارا نىسبىتى بىلەن خۇسۇسىيىتىدە ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، بەدەندە غەيرىي تەبىئىي مۇھىت شەكىللەنمىدۇ. بۇ خىل غەيرىي تەبىئىي مۇھىت ئاقكېسەلنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. مەسىلەن:

(1) قان خىلىتىنى ئالسا، ھۆل ئىسسىق تەبىئەتلىك بولۇپ، بەدەننى ساپ ھاۋا (ئوكسىگېن) بىلەن تەمىنلەپ، بۇخارات يەنى كاربون (IV) ئوكسىدنى بەدەن سىرتىغا چىقىرىۋېتىش رولىنى ئويناپ بىلەن، ئورگانىزمنى ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلەيدۇ، بەدەننى قىزىتىدۇ، ھۆللۈك يەتكۈزىدۇ، مۇھاپىزەت قىلىدۇ، ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قان خىلىتىنىڭ تەركىبىدە ئۆزگىرىش يۈز بەرسە ياكى تېرىگە يېتىپ بېرىپ زۆرۈرىي ئوزۇقلۇق ماددىلار تەمىنلىشى توسالغۇغا ئۇچرىسا، تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ ھاسىل بولۇش فۇنكسىيىسى بۇزۇلىدۇ - دە، ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ.

(2) سەپرا خىلىتى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، ئورگانىزمدىكى خىزمىتى ئۈچەيگە چۈشكەن تاماقلار تەركىبىدىكى ياغ ماددىلىرىنى پارچىلاپ، ئۈچەي ۋە جىگەردە ھەزىم بولۇشقا لايىقلاشتۇرۇپ بېرىش بىلەن بىرگە، ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ قىل تومۇرلاردىن ھەربىر ئەزا - توقۇلمىلارغا يېتىپ بېرىشىغا شەرت ھازىرلاشتىن ئىبارەت. شۇڭا، سەپرا خىلىتى ئۆزگىرىپ سەپرائىي غەيرىي تەبىئىيگە (غەيرىي تەبىئەتلىك سەپراغا) ئايلانسا، مۇقەررەر يۈسۈندا يۇقىرىقى رولىغا تەسىر يېتىپ، ئورگانىزمنىڭ زۆرۈرىي ئوزۇقلۇققا ئېرىشىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراپ (ئىچكى

ھاياتلىق پائالىيىتىدە تەڭپۇڭسىزلىق كېلىپ چىقىپ،
 بەدەننىڭ ئۆزگەرتكۈچى ۋە شەكىللەندۈرگۈچى قۇۋۋەتلىرى بۇ-
 زۇلۇش بىلەن خىلىتلار خام قېلىپ، بەدەنگە ئوزۇقلۇق يېتىش-
 تۈرۈپ بېرەلمەسلىك تۈپەيلى ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ.
 (3) ھۆل سوغۇق ھېسابلانغان بەلغەم خىلىتى ئاساسەن
 بەدەنگە ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن كىرگەن ھۆل سوغۇق تەبىئەت-
 لىك ئېلېمېنتلارنىڭ جەۋھىرىدىن بارلىققا كېلىپ، ئاقسىل
 ھاسىل قىلىدىغان سۇيۇقلۇق بولۇپ، ھاياتلىق ئېھتىياجىنى
 قاندۇرۇش ئۈچۈن سەرپ بولغان ياغنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇش
 رولىنى ئوينايدۇ. بەلغەم ماددىسىنىڭ خىزمىتى مۇۋاپىق جارى
 بولۇش ئۈچۈن بەدەندە مۇۋاپىق ھارارەت بولۇش شەرت. ئەگەر
 ھارارەت تۆۋەنلەپ ھۆللۈك زىيادىلىشىپ كەتسە، بەدەندە غەيرىي
 تەبىئىي ھۆللۈك ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەپ، تېرىنىڭ كېرەكلىك
 ئوزۇقلۇقلارنى قوبۇل قىلىپ ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى (قۇۋۋە-
 تى مۇغەييىرەس) تۆۋەنلەپ، خىلىتلار خام قېلىش بىلەن تېرە
 رەڭ ماددىسىنىڭ نورمال ھاسىل بولۇشىغا دەخلى يېتىدۇ - دە،
 ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپا-
 خانىسى 1988 - يىلىدىن 2002 - يىلىغىچە بولغان 15 يىل
 ئىچىدە كېسەلخانغا قوبۇل قىلىپ داۋالانغان 3076 نەپەر ئاقكې-
 سەل بىمارى ئۈستىدە ئېلىپ بارغان كلىنىكىلىق كۆزىتىشتىن
 قارىغاندا، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىدىن پەيدا بولغان ئاقكې-
 سەل بىمارى 1619 نەپەر بولۇپ، ئومۇمىي بىمارلارنىڭ %52.6
 نى ئىگىلىگەن. ھالبۇكى، ئاقكېسەلنى ئۇزاق يىللىق كلىنى-
 كىلىق داۋالاش ئەمەلىيىتى ۋە كۆزىتىش نەتىجىسىگە ئاساسلان-
 غاندا، كېسەللىك يۈز بېرىش نىسبىتى باشقا خىلىتلىق كىشە-

لەرگە قارىغاندا بەلغەم خىلىتلىق (بەلغەم مىجەزلىك) كىشىدە يۈقىرى بولىدۇ.

(4) سەۋدا خىلىتى قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، سەزگۈ ئەزالارنىڭ سېزىش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇش بىلەن تەپەككۈر خىزمىتىگە ياردەم بېرىدۇ. شۇڭا، بەدەن ھەر خىل يەرلىك سېزىم ئەسەب (نېرۋا) لىرىنىڭ غەيرىي تەبىئىي غالىبلىق تەسىرىگە ئۇچرىغاندا، يەرلىك سېزىم ئېشىپ كېتىش تۈپەيلى زىيادە سەزگۈلۈك ھادىسىسى يۈز بېرىش بىلەن، بۇ خىل سەزگۈلۈك ئۇزاق داۋاملىشىش نەتىجىسىدە مېڭە، يۈرەك قاتارلىق رەئىس ئەزالار خىزمىتىگە تەسىر يەتكۈزگەندىن باشقا، بەدەننىڭ مۇھىم ئامىلى بولغان ئىچكى مۇھىتىغا (خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقىغا) تەسىر كۆرسىتىش بىلەن غەيرىي تەبىئىي سەۋدا (كۆيگەن سەۋدا) نىڭ شەكىللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېرە رەڭ ماددىلىرىنىڭ يېڭىدىن قوبۇل قىلىنىشىغا توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ. نەتىجىدە تېرىنىڭ مەلۇم ئورنىدا ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ.

يەنە شۇنىمۇ تەكىتلەش زۆرۈركى، ئاقكېسەلنىڭ ھەممىسى بىر تۈرلۈك كېسەللىك بولغىنى بىلەن داۋالاشتا يەيدىغان ۋە تېرىگە سۈرتىدىغان ئوخشاش دورىلارنى ھەممە كېسەللەرگە ئورداق ئىشلەتكەندە كۆرۈلىدىغان ئۈنۈمى ئوخشىمايدىغانلىقىمۇ ئادەم مىجەزى ۋە بەدەن خىلىتلىرىنىڭ تۈپتىن پەرقلەندۈرۈلۈشىنى تېخىمۇ ئېنىق چۈشەندۈرىدۇ. ھالبۇكى، ئاقكېسەلنى داۋالاشتا مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن خىلىت تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاشقا ئەھمىيەت بەرمەي بولمايدۇ. پەقەت ئورگانىزمىنىڭ خىلىت ئەھۋالىغا ئاساسەن داۋالاش ئېلىپ بارغاندا تولۇق ساقايتىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

3. ئومۇمىي بەدەن ياكى يەرلىك ئورۇندا

كەم قانلىق يۈز بېرىش

ھەر خىل مۇرەككەپ سەۋەب ۋە ئامىللارنىڭ قان ئىشلەش ئەزالىرىنىڭ خىزمىتىنى توسالغۇغا ئۇچرىتىشى تۈپەيلى ئوزۇق-مەزگىل ماددىلار ئومۇمىي بەدەن ۋە يەرلىك توقۇلمىلارغا ئۇزاق مەزگىل يېتىپ بارالماي (مەسىلەن تاماق تاللاش، سۆرەلمە كېسەللىككە گىرىپتار بولۇش، زىيادە تار كىيىم كىيىش، بەل-نى چىڭ باغلاش، كۆكسىنى سىقىدىغان لىپتىكلەرنى داۋاملىق تاقاش قاتارلىقلار) ئومۇمىي بەدەن ۋە يەرلىك توقۇلمىلارغا قان يېتىشمەسلىك، قان تەركىبىدە زۆرۈرىي ماددىلار تولۇق بولماس-لىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ شەكىللىنىشىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىدۇ. دە، بۇنىڭ بىلەن تېرە رەڭ ماددىسى سۈسلىشىپ ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ. داۋالاش جەريانىدىكى كۆزىتىشلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بەدەننى «ئىخچام» كۆرسىتىش مۇددىئاسىدا كەڭ كەمەرنى دائىم چىڭ باغلاپ يۈرگەن بەل، پاچاقنىڭ پايپاق بوغقان جايى، كىچىك كەلگەن دوپپا-تۇماقنى باسۇرۇپ كىيگەن پېشانە قاتارلىق ئورۇنلاردا تېرە رەڭ-گى سۈسلىشىپ ئاقكېسەل پەيدا بولىدىغانلىقى ئىسپاتلاندى. بۇنىڭغا ئاساسلانغاندا، قان ئايلىنىشنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى مەلۇم ئورۇنغا قان يېتىشمەسلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئاقكېسەل پەيدا بولۇشنىڭ بىر ئامىلى بولۇپ قالىدۇ.

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسىنىڭ 80 نەپەر ئاقكېسەل بىمارى ئۈستىدە ئېلىپ بارغان كلىنىكىلىق كۆزىتىشىدىن قارىغاندا، ئاقكېسەل بىلەن ئاغرىش-

تىن ئىلگىرى ئوخشىمىغان دەرىجىدە پۈتۈن بەدەن خاراكتېرلىك كەم قانلىق كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغانلار %25 نى، بوغۇلۇش ياكى بېسىلىش تۈپەيلى بىلەن ياكى باشقا ئورۇنلاردا تاسمىسىمان ئاق داغ پەيدا بولغانلار %38.7 نى ئىگىلىگەن.

4. ئۇدۇم (ئىرسىيەت) ئامىللىرى

ئۇيغۇر تېبابىتى ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈستىدە ئىزدەنگەندە، ئائىلە ئۇرۇق - جەمەتلىرىدە ئاقكېسەل بارلارنى كۆزىتىشكە ئالاھىدە ئەھمىيەت بەرگەن ھەمدە قىسمەن ئەھۋالدا ئاتا - ئانىدەككى ئاقكېسەل جىنسىي بەز ئارقىلىق ئەۋلادىغا مىراس قالىدىغانلىقىنى بايقىغان، شۇنداقلا بۇنى تۇغما ئاقكېسەل ۋە تۇغۇلغاندىن كېيىن پەيدا بولىدىغان ئاقكېسەل دەپ ئىككىگە بۆلگەن.

(1) تۇغما ئاقكېسەل. بۇنىڭدا بالا تۇغۇلغاندىلا تېرىدە يەككە ياكى سىمىمىتلىك (جۈپ) ھالەتتە ئاق داغ بولىدۇ. ئاق داغ دەسلەپتە بايقىغۇسىز دەرىجىدە سۇس بولۇپ، بالىنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ روشەنلىشىشكە باشلايدۇ.

(2) تۇغۇلغاندىن كېيىن پەيدا بولىدىغان ئاقكېسەل بالا ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىدا ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆرۈلىدىغان ئاقكېسەلدۇر.

بۇ ئىككىسىنىڭ قايسى خىلدىكىسى بولمىسۇن ئاتا - ئانا ياكى جەمەتلىرى ئىچىدە ئاقكېسەل كۆرۈلگەنلەرنىڭ كېسەللىك تارىخى بىلەن مەلۇم دەرىجىدە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى جەنۇبىي شىنجاڭدىكى تۆت مىللەتتىن بولغان 7049 كىشى ئىچىدىن ئاقكېسەل بىلەن ئاغرىغانلارنى تەكشۈرگەندە، ئاتا - ئانا، جەددى - جەمەتىدە

ئاقكېسەل تارىخى بارلار %10.5 نى ئىگىلىگەن بولسا، ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ئېلان قىلىنغان ماتېرىياللاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئاقكېسەل بىلەن ئاغرىغانلارنىڭ ئۇرۇق - ئەجدادلىرى ئىچىدە ئاقكېسەل تارىخى بارلار 7 — %37 نى، چەت ئەللەردە ئېلان قىلىنغان ماتېرىياللاردا ئاقكېسەل بىلەن ئاغرىغانلارنىڭ ئۇرۇق - تۇغقان، ئەۋلادلىرى ئىچىدە ئاقكېسەل تارىخى بارلار 18.8 — %40 نى ئىگىلىگەن.

5. يېمەك - ئىچمەك بەدەنگە خىل

كەلمەسلىك

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ھاياتلىقنى ساقلاشتا ئىستېمال قىلىدىغان بارلىق يېمەكلىكلەرنى ئوت، سۇ، ھاۋا، تۇپراقتىن ئىبارەت تۆت خىل ماددىدىن تەركىب تاپىدۇ ھەمدە ھەرقايسى يېمەكلىك تەركىبىدىكى تۆت چوڭ ماددا ئىچىدە بىرەرسىنىڭ نىسبىتى ئۆستۈنلۈكنى ئىگىلىگەنلىكتىن، يېمەكلىكلەرنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، ھۆل سوغۇق ۋە قۇرۇق سوغۇقتىن ئىبارەت تۆت خىل بولىدۇ. ئەگەر كىشىلەر (بولۇپمۇ سوغۇق مېجەزلىك كىشىلەر) داۋاملىق تەبىئىتى سوغۇق (مەسىلەن سۈت، قېتىق، سوغۇق سۇ قاتارلىق) يېمەك - ئىچمەكلىكنى ئۇزاق ۋاقىت يەككە ياكى بىرقانچىسىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىستېمال قىلسا، بەدەندىكى سوغۇقلۇق غالىب كېلىپ، بىر تەرەپتىن جىگەردىكى تەبىئىي ھارارەت كېمىيىش-تىن خىلىتلار (بولۇپمۇ بەلغەم خىلىتى) خام قالىدۇ، يەنە بىر تەرەپتىن بەدەندىكى سوغۇق كەيپىياتنىڭ يۇقىرىلىقىدىن مېجەز سوغۇققا مايىللىشىدۇ - دە، سوغۇقلۇق ئېشىپ كېتىپ مېجەز-

نىڭ نورماللىقى بۇزۇلىدۇ دەپ قارايدۇ.

يىغىنچاقلاپ ئېيتقاندا، تەبىئىتى سوغۇق يېمەك - ئىچمەك - لىكلەر بىلەن تەستە ھەزىم بولىدىغان يېمەك - ئىچمەكلەر (مە - سىلەن سۈت، قېتىق، تۇخۇم، كالا گۆشى) نى ئۇزاق مەزگىل كۆپ مىقداردا يەككە ياكى بىرقانچىسىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىستې - مال قىلغاندا مېجەز بىلەن خىلىتلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇپ، بەدەندىكى «تۆت ھەزىم» ياخشى بولماسلىق ۋە ياكى بەدەننىڭ مەلۇم بىر خىل يېمەكلىكتىن سەسكىنىشى (زىيادە سەزگۈر - لۈك) قاتارلىق سەۋەبلەر ئاقكېسەلنى پەيدا قىلىدۇ. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى 15 يىل مابەينىدە كىلىد - كىدا داۋالىغان 3076 نەپەر ئاقكېسەل بىمارى ئىچىدە ھۆل سوغۇق مېجەزلىكلەر 1619 كىشى بولۇپ، ئومۇمىي بىمارلار سانىنىڭ %52.6 نى ئىگىلىگەن. بۇلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسى - مى ئاقكېسەلگە دۇچار بولۇشتىن ئىلگىرى خېلى ئۇزاققىچە لەڭپۇڭ، راڭچىزا، قېتىق، سۈت، تۇخۇم، كالا گۆشى، گاز سۈيى، بىڭگۈر ۋە پىۋا قاتارلىق تەبىئىتى سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغان ۋە بۇ خىل يېمەك - ئىچمەك - لەرنى ياخشى كۆرۈشنى ئادىتىگە ئايلاندۇرغان.

داۋالاش ئەمەلىيىتى جەريانىدىكى تەكرار كۆزىتىش نەتىجى - سىدىن قارىغاندا، تەبىئىتى سوغۇق مېۋە - چېۋە، كۆكتات ۋە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلىد - ىغان ئاقكېسەل بىمارلىرىنى داۋالاش ئۈنۈمى نىسبەتەن ياخشى بولغان. مەخسۇس تېببىي خادىملارنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك كۆزد - تىشى ۋە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ نەزەرىيە ئاساسلىرىدىكى ماھىيەت - لىك قاراشلارغا ئاساسلانغاندىمۇ، يېمەك - ئىچمەك بەدەنگە خىل كەلمەسلىك نەزەرىيىسىنىڭ ئىلمىي ئاساسى بارلىقىنى كۆرۈۋال - غىلى بولىدۇ.

6. ھەزىم قىلىش سىستېمىسى خىزمىتى

ياخشى بولماسلىق

مەلۇمكى، ھەر خىل ئامىللار ۋە تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلى ھەزىم قىلىش سىستېمىسى (ئېغىز بوشلۇقى، ئاشقازان، جىگرە، ئۈچەي قاتارلىقلار) نىڭ خىزمىتى توسالغۇغا ئۇچرىسا ياكى مەلۇم كېسەللىككە دۇچار بولۇپ ئۆز ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرالمىسا، «چالا ھەزىم» ئەھۋالى كۆرۈلۈپ، بەدەن ئېھتىدىيالىق بولغان ئوزۇقلۇق ماددىلارغا ئېرىشەلمەيدۇ. بۇ خىل ھالەت ئۇزاق مەزگىل داۋاملاشسا، بەدەننىڭ ھەربىر ئەزا - توقۇلمىلىرىغا بارىدىغان ئوزۇقلۇقلار توسالغۇغا ئۇچراپ، ئومۇمىي بەدەن خاراكتېرلىك چېكىنىش يۈز بېرىدۇ. دە، بەدەننىڭ تەبىئىي قوغدىنىش ئىقتىدارى (ئىممۇنىتېت كۈچى) ئاجىزلايدۇ. بۇنىڭ بىلەن تېرىگە يېتىپ بارىدىغان ئوزۇقلۇق ماددىلار (خىلىتلار) كېمىيىپ، تېرە توقۇلمىلىرىنىڭ قانغا بولغان ئېھتىياجىنى قاندۇرالمىدۇ. نەتىجىدە تېرىدىكى رەڭ ماددىسىنىڭ ئىشلىنىشى كاپالەتكە ئىگە بولالمىدۇ. دە، ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ.

7. نېرۋا فۇنكسىيىسى ئاجىزلىشىش

مېڭە پۈتۈن بەدەننىڭ ئىچكى - تاشقى ھەرىكەت - پائالىيەتلىرىگە قوماندانلىق قىلىدىغان مۇھىم ئەزادۇر. شۇڭا، بەزى روھىي ۋە جىسمانىي بېسىملار مېڭىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسەتەكەندە، مەركىزىي نېرۋا يېتەرلىك ئورۇنغا ياخشى قوماندانلىق

قىلالمايلا قالماستىن، بەلكى بۇ خىل بىنورمال ئەھۋال دەرھاللا ئومۇمىي بەدەنگە كۈچلۈك تەسىر كۆرسىتىپ، ئاقكېسەل پەيدا قىلغۇچى ئامىللارنى كۈچەيتىش بىلەن ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ. ئۇزاق يىللىق داۋالاش ئەمەلىيىتى كۆرسەتتىكى، كۆپلىگەن بىمارلارنىڭ نېرۋا ئاجىزلىق كېسەلىگە گىرىپتار بولۇشى تۇيۇق. سىز يېقىن تۇغقانلىرى ياكى ئاتا- ئانا، بالا- چاقىلىرى قازا قىلغانلىقى، بەزىلەرنىڭ بولسا ئائىلىۋى تۇرمۇشى كۈتۈلمىگەن ئوڭۇشسىزلىقلارغا ئۇچرىغانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر. ئىند- چىكىلەپ تەكشۈرۈلۈشچە، بەزى كىشىلەر نېرۋا ئاجىزلىق ۋە مېڭە كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولۇپ ئۇزاق ئۆتمەي، ئاقكې- سەلگە دۇچار بولغانلىقى توغرىلىق مەلۇماتلار بار. بۇ خىل ئەھۋاللار ئاقكېسەلنىڭ يۈز بېرىشى نېرۋا كېسەللىكلىرى بىلەنمۇ مەلۇم دەرىجىدە مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ.

8. ھەر خىل ئامىللاردىن زەخمىلىنىش

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئاقكېسەلنىڭ پەيدا بولۇشىنى يۇقد- رىدىكى بىر قاتار ئامىللاردىن باشقا، ئېغىر دەرىجىدىكى كۆيۈك، ئۇششۇك، تېرىنىڭ ھەر خىل زەخمىلىنىشى، ئوپىراتسىيە زە- خىملىرىنىڭ ئۇزاق مۇددەتكىچە ساقايماستىقى ۋە تېرىنىڭ زېدد- لىنىپ يۇقۇملىنىشى قاتارلىق ئەھۋاللار يۈز بەرگەندە ئۆز ۋا- قىدا داۋالىنىشقا سەل قاراش تۈپەيلى جاراھەت ئورنى قايتا - قايتا يۇقۇملانسا ياكى جاراھەت قەقەچلىرى بالدۇر (خام) سويۇ- ۋېتىلسە يەرلىك ئورۇندىكى تېرە رەڭ ماددىسى يېتىشمەي (ئەس- لىگە كېلەلمەي)، تاتۇق ئاق داغ شەكىللەندۈرىدىغان، بىر قىسىم تەڭگە تەمرەتكە، سىڧىلىس كېسەللىكلىرى داۋالاش ئارقىد-

لىق ساقايغاندىن كېيىنمۇ زەخمىلەنگەن تېرىلەردە سۇس ياكى ئېنىق پارقراق ئاق داغلار كېسەللىك ئاسارتى سۈپىتىدە پەيدا بولىدىغان ئەھۋاللارمۇ بولىدۇ.

بۇنىڭدىن باشقا يەنە، تېرە تازىلىقنىڭ ياخشى بولماسلىقى، جىسمانىي ھەرىكەتلەر بىلەن يېتەرلىك شۇغۇللانماسلىق ياكى ھەددىدىن تاشقىرى ئېغىر ئەمگەك قىلىپ چارچاش، ئولتۇراق ئۆي زەي ياكى كۈن چۈشمەيدىغان بولۇش، ئۇزاق مەزگىل سايە ياكى زەي ئورۇندا خىزمەت قىلىش، جۇغراپىيىلىك شارائىت بىلەن ھاۋا كىلىماتى ۋە ئىچىملىك سۇنىڭ ساپ بولماسلىقى قاتارلىق نۇرغۇن مۇرەككەپ ئامىللارمۇ ئاقكېسەلنى پەيدا قىلىدىغان قوشۇمچە سەۋەبلەردۇر.

9. بەدەن تەبىئىتى سۇسلىشىش

ئۇيغۇر تېبابىتى بەدەن تەبىئىتى (بەدەننىڭ قوغدىنىش — ئىممۇنىتېت كۈچى) نى ئومۇمىي بەدەن تەبىئىتى ۋە ئەزالار تەبىئىتى دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىيدۇ.

بەدەن تەبىئىتى تۈرلۈك تەسىرلەر تۈپەيلى ئاجىزلىغاندا تېرە، جۈملىدىن تېرىنىڭ مەلۇم قىسمىنىڭ تەبىئىتىمۇ ئاجىزلىشىدۇ. بۇنىڭ بىلەن تېرىنىڭ تەبىئىي يوسۇندا ماددا ئالماشتۇرۇشى قالايمىقانلىشىپ، يەرلىك ئورۇندا غەيرىي تەبىئىي خىلىتلەر ھەمىسەلەپ كۆپىيىش نەتىجىسىدە يەرلىك توقۇلمىلاردىكى قان ئايلىنىش سۇسلىشىپ توقۇلمىلارنىڭ قان ۋە ئوزۇقلۇقلارغا بولغان ئېھتىياجى قانمايدۇ. دە، بەدەننىڭ مەلۇم بۆلىكىدە ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ.

ئاقكېسەلگە دىئاگنوز قويۇش ئۇسۇلى

ئادەتتە بەدەن تېرىسىنىڭ خالىغان يېرىدە ھەر خىل چوڭ-
لۇقتا پەيدا بولغان سۇس ياكى ئېنىق، پارىراق، سۈزۈك ئاق
داغ ۋە ئۇنىڭ چوڭىيىپ تارقىلىش دائىرىسى ۋە شەكلى، بەلگە-
لىك چوڭىيىپ تەرەققىي قىلىشى، چېگرا ھاسىل قىلىپ، نور-
مال تېرىدىن روشەن پەرقلىنىپ تۇرۇشى، چېگرا سىزىقلىرىنىڭ
رەتلىك ياكى رەتسىز بولۇشى، بەزىلەردە «كېسەللەنگەن» تېرە
ئۈستىدىكى تۈكلەرنىڭ پۈتۈنلەي ياكى ئاز - تولا ئاقىرىشى ۋە
شەكلى قاتارلىقلارغا ئاساسلانغاندا ئاقكېسەلگە دىئاگنوز قويۇش
ئانچە قىيىن توختىمايدۇ.

ئۇزاق يىللىق كلىنىكىلىق كۆزىتىشلەردىن قارىغاندا، ئاق-
كېسەلنىڭ يوشۇرۇن (ئاشكارىلانمىغان) تىپى ۋە ئۇنىڭ تەرەق-
قىيات ئۆزگىرىشلىرى بىلەن تۇراقلىق (ئاشكارىلانغان) تىپىدە-
كىسىنىڭ تېرە قەۋەتلىرىگە تەسىر قىلىش جەريانىغا بەكرەك
دېققەت قىلىشقا ئىززىيدۇ.

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك ئىزدىنىشلىرى بى-
لەن بىمارلار تەمىنلىگەن ئەھۋاللارغا ئاساسلانغاندا، يوشۇرۇن
تىپلىق (ئاشكارىلانمىغان) ئاقكېسەل پەيدا بولۇشتىن ئىلگىرى
ئاق داغ شەكىللەنگەن ئورۇندىكى تېرىلەردە (بىر قىسىم بى-
مارلاردا) ئوخشىمىغان دەرىجىدە قىچىش ياكى ئېچىشقا
ئوخشاش غەيرىي سېزىم كۆرۈلىدۇ. بىراق، بۇ سېزىمنىڭ رو-

شەن ئىپادىلىنىش ياكى ئىپادىلەنمەسلىكى كىشىلەرنىڭ نېرۋا
تىپىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ھەر خىل بولىدۇ. تەھلىل
قىلىشىمىزچە، بۇنداق غەيرىي سېزىم سۈپىتى ئۆزگەرگەن غەي-
رىي تەبىئىي خىلىتلارنىڭ تېرىدىكى قىل تومۇرلاردا چۆكمە
ھاسىل قىلىپ، سەزگۈر نېرۋىلارنى غىدىقلىغانلىقى بىلەن مۇنا-
سۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. بۇ خىل غەيرىي سېزىم يېنىك
بولسا بىمارنىڭ دىققىتىنى ئانچە قوزغىمايدۇ ياكى ۋاقىت ئۇزار-
غانسېرى بىمار كۆنۈكۈپ قالىدۇ. ئاقكېسەلنىڭ بۇ خىل تىپىنى
كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ. پەقەت ئاپتاپقا قاقلاش نەتىجىسىدە
دە ساق تېرە نىسبەتەن قارايدىغاندا ياكى لوپا ئەينەك (چوڭ
كۆرسىتىش ئەينىكى) بىلەن سىنچىلاپ تەكشۈرگەندىلا ئاندىن
بايقىغىلى بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، يەنە ئاقكېسەل پەيدا بولغان
ئورۇندىكى تېرە قەۋىتىنىڭ زەخمىلىنىش دەرىجىسىنىڭ ئوخشى-
ماسلىقىغا قاراپمۇ پەرقلىنىدۇرگىلى بولىدۇ.

مەسىلەن، ئاقكېسەل تېرە قەۋىتىنىڭ يۈزە قەۋىتى (مۇڭ-
گۈز قەۋەت بىلەن تىكەنلىك قەۋەتلەر) دە پەيدا بولغان بولسا،
ئاق داغنىڭ يۈزى ئاقۇچ (مونجاما قەغەز دەك) بولۇپ، تېگى
سۇس قىزغۇچ ياكى سارغۇچ قىزغۇچقا مايىلراق كېلىدۇ، ئانچە
سىدام بولمايدۇ، مايلىق دورىلار سۈركەلسە ئاسانلا سىڭىدۇ.
ئاق داغ بار ئورۇننى بارماق بىلەن سۈرتۈپ ئۇۋۇلىغاندا ياكى
ئاپتاپقا قاقلىغاندا ئاسانلا قىزىرىدۇ. تەرلىگەندە ئازدۇر - كۆپ-
تۈر تەر چىقىدۇ. ئاق داغ بار ئورۇندىكى تېرىنى كۆتۈرۈپ
تۈرۈپ دېزىنفېكسىيە قىلىنغان يىڭىنى سىنجىسا قان چىقىدۇ.
ئاق داغ بار ئورۇننىڭ ئاز - تولا تەرلىشى ۋە يىڭى سىنجىغاندا
قان چىقىشى تېرە قان تومۇرلىرى بىلەن تەر بەزلىرىنىڭ پۈتۈن-
لەي زەخمىلەنمىگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
ھەقىقىي تېرە قىل تومۇرلىرى زەخمىلەنگەن بولسا، ئاق

ئاقكېسەلنىڭ سېلىشتۇرما

دىئاگنوزى

مەلۇمكى، قاراپلا بىلگىلى بولىدىغان ئاقكېسەلنى پەرق ئېتىپ دىئاگنوز قويۇش ئوڭاي. لېكىن، دەسلەپكى مەزگىللىك تېرە پىگمېنتلىرىنىڭ يوقىلىشى روشەن بولمىغان ئاق داغ، تېرە زەخمىلىرى ۋە زامبۇرۇغلۇق يۇقۇملانغان مۇناسىۋەتلىك تېرە رەڭلىرى تولۇق بولماسلىق تىپىدىكى ئاق داغلارنى كەسكىن پەرقلىنىدۇرۇشكە توغرا كېلىدۇ.

1. گۈللۈك تەمرەتكە

گۈللۈك تەمرەتكە ئۇيغۇر تېبابىتىدە بەھەق، غەرب تېبابىتىدە تەر تەمرەتكىسى دېيىلىدۇ. ئۇ ئاساسەن خىلىتلار تەڭپۇڭ-لۇقىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە بىر خىل زەمبۇرۇغسىمان مىكروب كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تېرە يۈزەكى قىسمىدىكى يۇقۇملانغان تېرە زەخمىسى ئومۇمەن كېسەللەنگەن ئورۇندىكى تېرە رەڭلىرى (پىگمېنتلار) نىڭ كۆپىيىپ كېتىشى ياكى سۇسلىشىشىغا ئوخشاش كېپەكلىشىپ تۇرىدىغان چېكىتسىمان ياكى ياپىلاق داغدىن ئىبارەت بولۇپ، ئادەتتە قىچىشمايدۇ. بىر قىسىم كىشىلەر تەرلىگەندە يېنىك قىچىش ئەھۋالى بولىدۇ. كۆپىنچە بويۇن، دۈمبە، كۆكرەك، بىلەك قىسىملىرىدا سىمپتىرىك ھالەتتە كۆرۈلىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكنى ئاقكېسەلدىن پەرقلىنىدۇ.

4. نېرىپ بويلاپ تارالغان ئاق داغ

بۇ خىل ئاق داغ كۆپىنچە بالا تۇغۇلۇپلا ياكى ئۈچ ياشقا توشقۇچە ئارىلىقتا پەيدا بولىدۇ. ئۇنىڭ تەرەققىياتى ئاستا-بو-لۇپ، داۋانى ئاسان قوبۇل قىلمايدۇ، بەلكى بىر ئۆمۈر يوقالمايدۇ، رەڭگىنىڭ ساق تېرە رەڭگىدىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغانلىقىغا قاراپ پۈتۈنلەي يوقالمايدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. شەكلى ھەر خىل، چېكىتسىمان تۈز ياكى ئەگرى - بۈگرى سىزىقلىق كېلىدۇ.

تېرە زەخمىسى كۆپىنچە بەدەننىڭ بىر تەرىپىدە نېرىپلار بويلاپ تارقالغان بولىدۇ. روشەن كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلمەيدۇ. ئاقكېسەلدىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان تەرىپى شۇكى، رەڭگى ئاق، يۈزى سىلىق، ئاقكېسەلدەك پارىقراق بولمايدۇ. ئەتراپىدىكى چېگرا سىزىقى (پىگمېنت بەلۋېغى) ئاقكېسەلنىڭ كىدەك ئېنىق بولمايدۇ.

5. ياشانغانلار ئاق دېغى

بۇ، قېرىلىق ئاق دېغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ياشانغانلاردا كۆرۈلىدۇ. ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ تېرىنىڭ رەڭگى ھاسىل قىلىش قابىلىيىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى بىلەن پەيدا بولىدۇ، بۇ ئاساسلىقى «پىگمېنتلار» نىڭ مەلۇم ئورۇندىكى ئولتۇرۇشۇشى ياكى يوقىلىشى خاراكتېرلىك ئاق داغ بولۇپ، 50 ياشتىن يۇقىرى كىشىلەردە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. كېسەللىك ئالاھىدىلىكى كى بولسا گۈرۈچ ياكى ماش چوڭلۇقىدا، يۇمىلاق، چېگرىسى

ئېنىق كېلىدۇ، ئوتتۇرىسى ئويمان، ئېنىق سان چەكلىمىسى يوق، چېكىتلىك ئاق داغدىن ئىبارەت بولۇپ، يەرلىك ئورۇندا قىچىشىش، ئاغرىشتەك ئالامەتلەر بولمايدۇ. ئادەتتە كۆكرەك، دۈمبە، قورساق، تۆت مۇچە قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ (14 - بەتتىكى A، B سۈرەتكە قاراڭ)، بەزىلىرىدە قان تومۇر ئۆسمىسى ۋە ماي تەپچىپ مۇڭگۈزلىشىش كېسەللىكىنىڭ ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ خىل ئاق داغنى داۋالاش ھاجەتسىز.

6. تېرە زەخمىلىنىشتىن كېيىنكى

ئاق داغ

بۇ خىل ئاق داغ مەلۇم سەۋەبلەر، مەسىلەن كۆيۈك، تېرە ياللۇغى، ھۆل تەمرەتكە، كالا تەمرەتكىسى، بۆرە چاقمىسى، توپانسىمان ئەسۋە، تۈرلۈك سىرتقى زەخمىلىنىشلەر، ئوپىراتسىيىدىن كېيىنكى تېرە زەخمىلىرى قاتارلىقلار ئۇزاق ۋاقىت داۋاملىشىش نەتىجىسىدە تېرە ياللۇغىنىڭ سوزۇلما ھالەتكە ئۆزگىرىشى بىلەن ياللۇغلانغان ئورۇندىكى تېرە رەڭلىرى (پىگمېنتلار) نىڭ قايتا يېتىلىش ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش سەۋەبلىك زەخمىلىنىگەن يەرلىك ئورۇنلاردىكى تېرىلەردە «رەڭ» نىڭ ۋاقىتلىق سۈلىشىشىدىن پەيدا بولىدۇ. ئەگەر بۇنداق ئاق داغ پەيدا بولغانلارنىڭ ئەجدادلىرىدا ئاقكېسەل بىلەن ئاغرىغانلار بولمىسا «كېسەللەنگەن» ئورۇن تېرىسىنى مۇھاپىزەت قىلىپ بەرسىلا 2 — 4 ئايدا ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ. بۇ خىل ئاق داغ كۆرۈنۈشتە ئاقكېسەلگە ئوخشاپ كەتمىسىمۇ، ساق تېرە ئەتراپىدىكى چېگرا سىزىقى ئاقكېسەلنىڭكىدىن قېنىقراق بولىدۇ

ئاقكېسەلنىڭ بەدەندە ئىگىلىگەن

كۆلىمىنى بېكىتىش

ئۇسۇلى

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاش تارىخى نىسبەتەن ئۇزاق بولسىمۇ، لېكىن قەدىمكى ياكى يېقىنقى زامان تېبابەت ئەسەرلىرىدە كېسەللىكنىڭ بەدەندە ئىگىلىگەن كۆلىمى (تارقىلىش دائىرىسىنىڭ ئومۇمىي بەدەن تېرىسىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى) نى بېكىتىش مەسىلىسىدە ئېنىق قاراش خاتىرىلەنمىگەن. ئەمما، قەدىمكى ئۇيغۇر تېۋىپلىرى ۋە يېقىنقى زاماندىكى ھۆكۈملەر بۇ خىل كېسەللىك ئەھۋالىغا توغرا دىئاگنوز قويۇش، بىر يۈرۈش داۋالاش ئۇسۇل - چارىلىرىنى قوللىنىش ئارقىلىق، بەلگىلىك ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىگە دائىر ئىشەنچلىك تارىخىي ماتېرىياللار يېتەرلىك تېپىلىدۇ. ئازادلىقتىن كېيىن پارتىيە، ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر تېبابىتىگە ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈشى، سىياسەت ۋە ئىقتىساد جەھەتتىن قوللىشى نەتىجىسىدە ئۇيغۇر تېۋىپلىرى تۈركۈملەپ يېتىشىپ چىقىپ، شىنجاڭنىڭ قەشقەر، خوتەن، ئۈرۈمچى، تۇرپان، ئاقسۇ قاتارلىق ۋىلايەت - شەھەرلىرىدە ئىلگىرى - كېيىن دۆلەت ئىگىلىكىدىكى ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىلىرى ئارقا - ئارقىدىن قۇرۇلۇپ، ئاقكېسەلنى داۋالاش بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقىنىغا نەچچە ئون يىل بولدى. شۇغىنىسى ھەرقايسى شىپاخانىلار ئاقكېسەلنىڭ بەدەندە

ئىگىلىگەن كۆلىمىنى بېكىتىشتە ئۆز ئالدىغا ھەر خىل ئۇسۇل-
 لارنى قوللىنىپ كېلىۋاتىدۇ. شۇ تۈپەيلى ھازىرغىچە كېسەللىك
 كۆلىمىنى بېكىتىشنىڭ بىرلىككە كەلگەن، ئورتاقلىققا ئىگە
 ئۆلچىمى يوق. مەن تۆۋەندە قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت
 شىپاخانىسى تېرە كېسەللىكلىرى بۆلۈمى يېقىنقى 21 يىلدىن
 بۇيان كلىنىكىدا ئىزچىل قوللىنىپ كېلىۋاتقان ئاقكېسەلنىڭ
 بەدەندە ئىگىلىگەن كۆلىمىنى بېكىتىش ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇپ
 ئۆتمەن:

1. پۈتۈن بەدەندە تارقالغان ئەزا ۋە بۆلەكلەرنى بىرلىك قىلىپ بېكىتىش ئۇسۇلى

ئەگەر باش قىسمى 3%، يۈز قىسمى 3%، بويۇن قىسمى
 3%، قورساق - كۆكرەك قىسمى 13%، دۈمبە - بەل قىسمى
 13% جىنسى ئەزا 1%، بىر قولىنىڭ يۇقىرى بىلەك قىسمى
 3.5%، تۆۋەنكى بىلەك قىسمى 3%، قولىنىڭ ئاللىقان ۋە دۈمبە
 قىسىملىرى 2.5%، بىر تەرەپ يوتا 10.5%، پاقالچاق 6.5%،
 پۇتنىڭ تاپان - دۈمبە قىسىملىرى 3.5%، بىر تەرەپ ساغرا
 2.5% دېيىلسە، تۆۋەندىكى جەدۋەلدىكىدەك بولىدۇ:

ئورۇنلار		كېسەللىك ئىگىلىگەن دائىرە	
		جەمئىي	يەككە
باش، يۈز، بويۇن قىسىملار	باش قىسمى	3%	9%
	يۈز قىسمى	3%	
	بويۇن قىسمى	3%	


18%	$3.5\% \times 2$	يۇقىرى بىلەك	يۇقىرىقى مۇچىلەر
	$3\% \times 2$	تۆۋەنكى بىلەك	
	$2.5\% \times 2$	قولنىڭ ئالغان دۈمبىلىرى	
46%	$10.5\% \times 2$	يوتا قىسمى	تۆۋەندىكى مۇچىلەر ۋە ساغرا
	$6.5\% \times 2$	پاچاق	
	$2.5\% \times 2$	ساغرا	
	$3.5\% \times 2$	پۇت	
27%	13%	كۆكرەك - قورساق،	كۆكرەك، دۈمبە، قورساق، بەل قىسىملار ۋە جىنسى ئەزا
	13%	دۈمبە، بەل	
	1%	جىنسى ئەزا	

2. بىر قولنىڭ ئالىقىنىنى ئۆلچەم قىلىپ بېكىتىش ئۇسۇلى

بۇنىڭدا بىمارنىڭ قول بارماقلىرىنى جۈپلەپ تۇرغاندىكى كېسەللىك ئىگىلىگەن كۆلەم 1.5% ھېسابلىنىدۇ.

بىرىنچى خىل ئۇسۇل كلىنىكىدا ۋە ئامبۇلاتورىيە تەكشۈرۈشىدە قوللىنىشقا بىرقەدەر مۇۋاپىق، پىرسەنت (%) ھېسابلاشقا ئاسان بولسىمۇ، كېسەللىكنىڭ ھەرقايسى ئەزا - بۆلەكلەردە ئىگىلىگەن پىرسەنتىنى ئاسان ئۇنتۇپ قېلىشتەك ئەھۋاللار دائىم كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان بولغاچقا، كېيىنكى يىللاردا كېسەللىك دائىرىسىنى بېكىتىشتە ھەربىر بىمارنىڭ قول بارماقلىرىنى جۈپلەپ تۇرغاندىكى ئالغان قىسمىنى ئۆلچەم قىلىش ئۇسۇلى قوللىنىلغان. بۇ خىل ئۇسۇل مەشغۇلات جەريانى ئاددىي، پىرسەنتىنى ھېسابلاش قۇلاي بولۇشتەك ئارتۇقچىلىقىغا

ئىگە. تۆۋەندىكى رەسىمدە پۈتۈن بەدەندىكى ئىزا ۋە بۆلەكلەرنى بىرلىك قىلىپ، كېسەللىك كۆلىمىنى پىرسەنتلەشتۈرۈپ ھېسابلاش ئۇسۇلى كۆرسىتىلدى (رەسىمگە قارالسۇن).



1 - رەسىم: پۈتۈن بەدەندىكى ئىزا ۋە بۆلەكلەرنى بىرلىك قىلىپ كېسەللىكنىڭ كۆلەم پىرسەنتىنى ھېسابلاشنىڭ كۆرسىتىلىشى.

ئاقكېسەلنى خىلىت تىپى بويىچە تۈرلەرگە ئايرىش

ئاقكېسەلنى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاساسىي نەزەرىيىلىرىگە ئاساسلىنىپ مېجەز - خىلىت تىپى بويىچە تۈرلەرگە ئايرىش ۋە مۇۋاپىق كېلىدىغان دورىلارنى تاللاپ داۋالاش كېسەللىكىنىڭ قايتا قوزغىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئالاھىدە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى ئاقكېسەل ئۈستىدە 40 نەچچە يىل ئىزدىنىپ، كلىنىكىلىق كۆزىتىش، تەتقىقاتلارنى ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق كېسەللىكنى بەلغەم خىلدە تىپىدىكى ئاقكېسەل، سەۋدا خىلىتى تىپىدىكى ئاقكېسەل، سەپرا خىلىتى تىپىدىكى ئاقكېسەل، قان خىلىتى تىپىدىكى ئاقكېسەل ۋە مۇرەككەپ خىلىت تىپىدىكى ئاقكېسەل دېگەندەك تۈرلەرگە ئايرىپ، ھەرقايسى تۈرگە مۇۋاپىق كېلىدىغان داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ كۆرۈنەرلىك ئەمەلىي نەتىجىگە ئېرىشتى. كېسەللەرنىڭ مېجەز ۋە خىلىت تىپىنى مۇقۇملاشتۇرۇشتا ئۇلارنىڭ بەلگىلىك مېجەز ۋە خىلىت تىپىغا خاس بولغان بەدەن بەلگىلىرى، كېسەللىك يۈز بەرگەن پەسىل ياكى قايتا قوزغالغان مۇھىت - شارائىت، تۇرمۇش ئادىتى، جىنسى، يېشى قاتارلىق تەرەپلەر تەپسىلىي ئىگىلىنىپ، ئەتراپلىق مۇھاكىمە ئېلىپ بېرىلىدۇ. بۇنىڭغا ئاساسەن كېسەل كىشىنىڭ خاس ياكى مۇرەككەپ خىلىت تىپى بېكىتىلىپ، شۇ ئاساستا داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

ئاقكېسەلنىڭ خىلىتلار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

خىلىت دېگىنىمىز، ئادەم ئورگانىزىمىدىكى تۆت خىل ئا-
رىلاشما سۇيۇقلۇق بولۇپ، قان، بەلغەم، سەپرا ۋە سەۋدانى
كۆرسىتىدۇ. بۇ سۇيۇقلۇقلار (قىسقارتىپ تەن سۇيۇقلۇقى دې-
يىلىدۇ) ئادەمنىڭ تەبئىي ھاياتى ۋە فىزىئولوگىيىلىك پائالى-
يەتلىرى جەريانىدا بەدەن ئىچكى مۇھىتىنىڭ نىسپىي تۇراقلىق-
لىقىنى ساقلاپ، ئىنسانلارنىڭ ھاياتلىق پائالىيىتىنى كاپالەتلەند-
ۈرىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابىتى ئادەم بەدىنىنىڭ ساغلام تۇرۇشى ۋە كې-
سەللىنىشىدە خىلىتلارنىڭ سان - سۈپەت ئۆزگىرىشى مۇھىم
رول ئوينايدۇ، كېسەل بولۇش بەدەندىكى نىسپىي تەڭپۇڭلۇقنىڭ
بۇزۇلۇشى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك دەپ قارايدۇ.

خىلىتلار ھاياتلىق باشلانغاندىن تارتىپ تاكى ھاياتلىق ئا-
خىرلاشقانغا قەدەر بەدەندە (ئاساسلىقى جىگەردە) بىر تەرەپتىن
ئىشلىنىپ ھاياتلىق ئېھتىياجىنى قامدىغاندىن باشقا، ماددا ئالما-
شىش جەريانىدا سەرپ بولغان خىلىتلار (تەن سۇيۇقلۇقى) نىڭ
ئورنىنى ئۈزلۈكسىز تولۇقلاش نەتىجىسىدە پۈتۈن بەدەن ۋە ھەر-
بىر ئەزانىڭ نورمال ھاياتلىق پائالىيىتىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ.
ئادەم ھاياتلىق پائالىيىتىنىڭ مۇھىم ئىچكى ئامىلى بولغان
خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقى كۈندىلىك تۇرمۇشتا داۋاملىق ئىچكى ۋە
تاشقى ئامىللار (يېمەك - ئىچمەك ۋە روھىي ھالەت قاتارلىقلار)

نىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. لېكىن، نورمال شارائىتتا رەئىس ئەزالار (مېڭە، يۈرەك، جىگەر) نىڭ تەڭشەپ تۇرۇشى بىلەن داۋاملىق ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى ساقلايدۇ. ئەگەر بۇ خىل ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇق ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللارنىڭ ئۇزاقراق تەسىر كۆرسىتىشىگە دۇچ كەلسە، خىلىتلارنىڭ تەبىئىي (نور-مال) تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇپ، بىر تەرەپتىن رەئىس ئەزالارنىڭ خىزمىتى قالايمىقانلىشىدۇ، يەنە بىر تەرەپتىن خىلىتلارنىڭ ئۆزئارا نىسبىتى بىلەن خۇسۇسىيىتىدە ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، بەدەندە غەيرىي تەبىئىي مۇھىت شەكىللىنىدۇ. بۇ خىل غەيرىي تەبىئىي مۇھىت ئاقكېسەلنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇ-لۇشىدىن ئاقكېسەل پەيدا بولىدىغانلىقىنى تۆۋەندىكىچە چۈ-شەندۈرىدۇ:

بىرىنچىدىن، خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشى مۇقەر-رەر ھالدا ماددىلىق مىجەز بۇزۇلۇش (ئۆزگىرىش) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مىجەز ئۆزگەرگەندە ئالدى بىلەن رەئىس ئەزالار-نىڭ خىزمىتى قالايمىقانلىشىدۇ. دە، ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ.

ئىككىنچىدىن، بەدەندىكى خىلىتلار ئىچىدە بەلغەم خىلىتى بىلەن سەۋدا خىلىتىنىڭ نىسبىتى كۆپىيىپ، ئۈستۈنلۈكنى ئى-گىلىگەندە (بەدەندىكى سوغۇقلۇق غالىب كەلگەندە)، بەدەن بو-لۇپمۇ جىگەردىكى ھارارەت (ئىسسىقلىق) تۆۋەنلەپ، سوغۇقلۇق ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەندە، بەدەن بولۇپمۇ جىگەردىكى ھارارەت تۆۋەنلەپ، سوغۇقلۇق ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدۇ. نەتىجىدە، بىر تەرەپتىن قان ئايلىنىش سۇسلىشىپ ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن ھاۋائىي نەسىيمە (ئوكسىگېن) نىڭ تېرىنىڭ ئەڭ ئۇششاق بىر-لىكلىرى (ھۈجەيرىلىرى) گىچە يېتىپ بېرىشى توسقۇنلۇققا

ئاقكېسەلنىڭ قان تىپى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسى ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈستىدە ئېلىپ بارغان كلىنىكىلىق تەتقىقاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرىنى ئىنچىكىلەپ ئىزچىل كۆزەتكەندىن باشقا، قان تىپى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى نەزەردىن ساقىت قىلمىدى. بۇ جەرياندا 460 نەپەر ئاقكېسەل بىمارىنىڭ كېسەللىك ئەھۋالىنى قان تىپىغا باغلاپ تەكشۈرۈپ دەسلەپكى قەدەمدە تۆۋەندىكىچە نەتىجىگە ئېرىشتى:

460 نەپەر ئاقكېسەل بىمارى 1984 - يىلىدىن 1986 - يىلىغىچە بالىنىستتا يېتىپ داۋالانغان بولۇپ، كۆپچىلىكى ئۇيغۇر (389 نەپەر، 238 ئەر، 151 ئايال)، ئاز قىسمى خەنزۇ (71 نەپەر، 41 ئەر، 30 ئايال)؛ كېسەللەنگەن ۋاقتى قىسقىلار ئىككى ئاي، ئۇزاقلار 25 يىل. بۇلارنىڭ ئۆلچەملىك قان تىپىنى قەشقەر ۋىلايەتلىك 1 - خەلق دوختۇرخانىسى قان ئىسكىلاتى بېكىتكەن، قان تىپىنى ئېنىقلاشتا ئويۇتۇش ئۇسۇلى قوللىنىلغان. قان ئەۋرىشكىسى 1 ~ 2 سائەت ئىچىدە ئىشلىنىپ بولغان.

1 - جەدۋەل: 460 نەپەر ئاقكېسەل بىمارنىڭ قان تىپى، مىللەت ۋە جىنس ئايرىمىسى

قان تىپى		بىمار		جىنس		O		A		B		AB	
مىللەتى	سانى	مىللەتى	سانى	مىللەتى	سانى	مىللەتى	سانى	مىللەتى	سانى	مىللەتى	سانى	مىللەتى	سانى
ئۇيغۇر	389	ئەر	75	61.98	56	60.87	85	58.62	22	70.97			
		ئايال	46	38.02	36	39.13	60	41.38	9	29.03			
		جەمئىي	121	31.11	92	23.65	145	37.28	31	7.97			
خەنزۇ	71	ئەر	12	60.0	13	56.52	12	60.0	4	50.0			
		ئايال	8	40.0	10	43.48	8	40.0	4	50.0			
		جەمئىي	20	28.7	23	32.39	20	28.17	8	11.27			
جەمئىي	460	ئەر	87	61.70	69	60.0	97	58.79	26	66.67			
		ئايال	54	38.30	46	40.0	68	41.21	13	33.33			
		جەمئىي	141	35.65	115	25.0	165	35.87	39	8.48			

1 - جەدۋەلدىن ئۇيغۇر مىللەتىدىكى AB قان تىپلىق ئەرلەر سالمىقىنىڭ ئەڭ چوڭلۇقى (70.97% ، $22/31$)، مۇناسىپ ھالدا جەمئىي ساندىكى ئەرلەر سالمىقىنىڭمۇ چوڭلۇقى (66.67% ، $26/39$)؛ ئەمما، ھەممە بىمارلارنىڭ ئىچىدە AB قان تىپىدىكىلەرنىڭ نىسبىتىنىڭ ئەڭ ئازلىقى (8.48% ، $39/460$)؛ AB قان تىپىدىكى ئۇيغۇر ۋە خەنزۇ ئەرلەرنىڭ ئاياللاردىن ئومۇمىيۈزلۈك كۆپلۈكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. گەرچە قان تىپىنى تەكشۈرگەن ئاقكېسەل ئاياللارنىڭ سانى ئاز ($181/460$) بولسىمۇ، ئەمما ئۇ يەنىلا ئاقكېسەل ئەرلەرنىڭ ئاياللاردىن كۆپ ئىكەنلىكىدىن بېشارەت بېرىدۇ.

2 - جەدۋەل: ئاقكېسەللەر بىلەن ساغلام كىشىلەرنىڭ قان تىپى جەھەتتىكى مۇناسىۋىتى

مىللىتى % قان تىپى	ئۇيغۇر			خەنزۇ		
	ئاقكېسەل بىمارلار (%)	ساغلام كىشىلەر (%)	پەرقى	ئاقكېسەل بىمارلار (%)	ساغلام كىشىلەر (%)	پەرقى
O	39.11	27.25	11.16	28.17	30.49	-2.23
A	23.65	29.22	-5.57	32.39	27.51	4.88
B	27.28	31.92	-4.64	28.17	32.33	-4.16
AB	7.97	11.36	-3.39	11.27	9.67	1.60

يۇقىرىقى جەدۋەلدىن O قان تىپلىق ئۇيغۇر، B قان تىپلىق خەنزۇ ئاقكېسەل بىمارلارنىڭ ساغلام كىشىلەردىن كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە يۇقىرى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.

3 - جەدۋەل: شىپاخانىمىز كېسەلخانىسىدا يېتىپ داۋالانغان 460 نەپەر ئاقكېسەل بىمارنىڭ قان تىپى بىلەن قېرىنداش دوختۇرخانا تەكشۈرگەن بىمارلارنىڭ قان تىپى سېلىشتۇرمىسى

قان تىپى				ئورۇن
AB	B	A	O	
8.48	35.87	25.0	30.65	قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى
6.65	27.40	23.29	42.47	فۇجىيەن ئۆلكىلىك تېرە كېسەللىكلەر تەتقىقات ئورنى
1.63	8.47	1.71	-11.82	پەرقى

يۇقىرىقى جەدۋەلدىن فۇجيەن ئۆلكىلىك تېرە كېسەللىكلەرى تەتقىقات ئورنى ئامبۇلاتورىيىسىدىكى ئاقكېسەل بىمارلىرى ئىچىدە O قان تىپىدىكىلەرنىڭ، شىپاخانىمىزدا داۋالانغان ئاقكېسەل بىمارلىرى ئىچىدە B قان تىپىدىكىلەرنىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. A ۋە AB قان تىپىدىكىلەرنىڭ پەرقى ئانچە چوڭ ئەمەس.

ئاقكېسەلنىڭ سەۋەبى ھازىرغىچە ئېنىق ئەمەس ياكى ھەر-خىل سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدۇ. ئۇنىڭ ئىچىدە ئىرسىيەتتىن كېلىپ چىقىدۇ، دەيدىغان قاراش كۆپرەك. ھەرقايسى جايلاردا ئاقكېسەل بىمارلارنىڭ ئاتا-ئانىسىدىمۇ ئاقكېسەل بارلىقى ھەق-قىدىكى دوكلاتلار كۆپرەك (30% — 40%). قان تىپى ئىرسىيەتنىڭ مۇھىم بىر ئۆلچىمى. سىرېۋاستاۋا قاتارلىقلار تەكشۈرگەن 583 نەپەر ئاقكېسەل بىمارنىڭ قان تىپىدىن قارىغاندا، A ۋە AB قان تىپىدىكى كىشىلەر ناھايىتى ئاسانلا ئاقكېسەلگە گىرىپتار بولىدىغانلىقى بايقالغان. بىزنىڭ تەكشۈرگىنىمىزگە قارىغاندا، B قان تىپلىق كىشىلەردە ئاقكېسەلگە گىرىپتار بولىدىغانلار ئەڭ كۆپ. AB قان تىپىدىكىلەردە ئەكسىچە ئاز، قان تىپىنىڭ ئىرق ۋە رايون بىلەن مۇناسىۋىتى بارمۇ - يوق؟ بۇنى بۇنىڭدىن كېيىن يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا تەتقىق قىلىشقا ئەرزىيدۇ.

قۇرۇلۇش ئورنى	O	A	B	AB
بۇيۇق قىزىقۇلۇش يىغىنى	28.00	0.25	72.25	84.4
بۇيۇق قىزىقۇلۇش يىغىنى	71.25	42.25	44.75	28.8
بۇيۇق قىزىقۇلۇش يىغىنى	28.11	19.1	74.8	29.1

ئاقكېسەلنىڭ رەئىس ئەزالار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالارنى ئورگا-
نىزىمىدىكى ۋەزىپىسىگە قاراپ رەئىس (باشقۇرغۇچى) ئەزالار
(مېڭە، يۈرەك، جىگەر) ۋە خىزمەت ئۆتگۈچى ئەزالار (ئۆپكە،
بۆرەك، تال، ئاشقازان قاتارلىقلار) دەپ ئىككى چوڭ تۈرگە
ئايرىش بىلەن، ئاقكېسەلنىڭ پەيدا بولۇشىدا رەئىس ئەزالار خىز-
مىتىنىڭ بەلگىلىك مۇناسىۋىتى بارلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ.

1. مېڭە

مېڭە ئادەم بەدىنىنىڭ ئالىي قوماندانلىق ئورگىنى بولۇپ،
بەدەندىكى روھىي كۈچ (قۇۋىتى نەپسانى) نىڭ مەركىزى ھېساب-
لىنىدۇ. ئۇ ئەسەب (نېرۋا) يىپچىلىرى ئارقىلىق بەدەندىكى
بارلىق ئەزا - توقۇلمىلارنىڭ نورمال خىزمىتىگە يېتەكچىلىك
قىلىپ، تەخشەش رولىنى ئۆتىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ خىزمىتىدە
نورمالسىزلىق كۆرۈلسە، بەدەننىڭ ئىچكى مۇھىتىدا تەڭپۇڭ-
سىزلىق شەكىللىنىش بىلەن ئاقكېسەل پەيدا بولۇش ئېھتىمال-
لىقى تۇغۇلىدۇ.

2. يۈرەك

يۈرەك بەدەنگە ھاياتى كۈچ بىغىشلىغۇچى رەئىس ئەزادۇر. ئۇ، ھاياتلىق كۈچى (قۇۋۋىتى ھاياۋانى) نىڭ مەركىزى بولۇپ، بەدەننى ساپ قان ۋە ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. شۇنداقلا بەدەننى ئايلىنىپ قايىقان بۇزۇق قانلارنى تازىلاش ئەزالىرى (ئۆپكە، يۈرەك ۋە تېرە) غا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ، ماددا ئالمىشىشتىن ھاسىل بولغان كېرەكسىز ماددىلارنى بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ، بەدەننىڭ نورمال پائالىيىتىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ. ئەگەر يۈرەك ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلى زەئىپلىشىش ۋە قان ئىشلىگۈچى ئەزالارنىڭ خىزمىتى ئاجىزلىشىش ئەھۋاللىرى يۈز بەرسە، قان رەڭ ماددىسى كېمىيىش، قان تومۇرلار توسۇلۇش بىلەن تېرىگە زۆرۈرىي ئوزۇقلۇق ماددىلار يېتىشمەي، تېرىنىڭ رەڭ ھاسىل قىلىش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ، ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ.

3. جىگەر

جىگەر ئوزۇقلۇقلارنى بەدەندىكى ھەرقايسى ئەزالارنىڭ ئېھتىياجىغا ماس تەركىبلەرگە ئايلاندۇرۇپ، ھۈجەيرىلەرنىڭ يېتىلىشىنى تۈرۈشنى ماددىي قۇۋۋەت بىلەن تەمىن ئېتىشتەك مۇھىم ۋەزىپىنى بېجىرىدۇ. شۇڭا، ئۇ تەبىئىي كۈچ (قۇۋۋىتى تەبىئىي) نىڭ مەركىزى بولۇش سۈپىتى بىلەن، بىرىنچىدىن، ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنىڭ خىزمىتىگە ياردەم بېرىدۇ؛ ئىككىنچىدىن، ھەزىم بولغان ئوزۇقلۇقلارنى ھاياتلىق ئۈچۈن زۆرۈر

بولغان تۆت خىلىت (سەپرا، سەۋدا، قان، بەلغەم) قا ئايلاندۇ.
 رۇپ، بەدەننىڭ نورمال پائالىيىتىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ.
 ئەگەر جىگەر ھەر خىل سەۋەبلەر بىلەن نورمال ئىقتىداردە
 نى يوقاتسا ياكى ئاجىزلاشسا، ئىشلىنىپ چىقىدىغان خىلىتلار
 خام قېلىش، خىلىتلار نىسبىتىدە سان ۋە سۈپەت ئۆزگىرىشلىرى
 رى يۈز بېرىش ئارقىلىق، بەدەن ئىچكى مۇھىتىدا تەڭپۇڭسىز-
 لىق كۆرۈلۈپ، ئاقكېسەل پەيدا بولۇش ئېھتىماللىقى تۇغۇلىدۇ.

ئاقكېسەلنىڭ باسقۇچلارغا بۆلۈنۈشى

مەيلى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى بولسۇن، مەيلى ھازىرقى زامان تېببىي ئىلمى بولسۇن، ھەرقانداق كېسەللىكنى يۈز بەرگەندىن كېيىنكى تەرەققىيات ئۆزگىرىشلىرىنىڭ تېز - ئاستىلىقى ۋە ئېغىر - يېنىكلىكىگە قاراپ دەسلەپكى باسقۇچ، ئوتتۇرا باسقۇچ ۋە ئېغىر باسقۇچ دېگەنلەرگە بۆلىدۇ. ئاقكېسەلنىمۇ مانا شۇنىڭغا ئوخشاش يۈزەكى ياكى دەسلەپكى باسقۇچى، چوڭقۇر ياكى ئېغىرراق باسقۇچى دەپ بۆلۈشكە بولىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ ئاقكېسەل يېنىكرەك بولسا تېرىدە بولىدۇ، ئېغىرلاشقاندا تېرە ئاستى ماي قاتلىمىمۇ ئاقىرىدۇ، ئەڭ ئېغىر بولغاندا مۈسكۈل ھەتتا سۆڭەكلىرىگىچە ئاقىرىدۇ دېگەن قاراشلىرى مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا ئاقكېسەلنىڭ دەرىجە پەرقىنىمۇ چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ ئاقكېسەلنى يۇقىرىقىدەك باسقۇچلارغا بۆلۈشتە ئاساسلانغان تۈپكى نەزەرىيىۋى قاراشلىرى ۋە بىزنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۇستىدە ئېلىپ بارغان ئۇزاق يىللىق تەتقىقات، كلىنىكىلىق كۆزىتىش نەتىجىلىرىمىزدىن قارىغاندا، تېرە رەڭگىگە يېقىن كېلىدىغان سۇسراق ئاق داغلارنى يۈزە ياكى دەسلەپكى باسقۇچتىكى ئاقكېسەل (7 - بەتتىكى A، B سۈرەتكە قاراڭ)، سۈزۈك، پارقرىق، نورمال تېرىدىن رو-شەن پەرقلىنىدىغان ئاق داغنى ئېغىرراق باسقۇچتىكى ئاقكېسەل (7 - بەتتىكى سۈرەتكە قاراڭ)، تېرە ئاقارغاندىن سىرت،

تېرىدىكى تۈكلەرمۇ ئاقىرىپ كەتكەن ھەتتا بەدەننىڭ كۆپ قىسىمىغا تارىغان ئاق داغلارنى تېرە توقۇلمىلىرى شۇنداقلا مۇسكۇللارغا قەدەر تەسىر كۆرسەتكەن ئېغىر باسقۇچتىكى ئاقكېسەل (8 - بەتتىكى A، B سۈرەتكە قاراڭ) دەپ ئايرىشقا بولىدۇ. يۈزەكى ئاق داغ (ئاقكېسەل) بىلەن ئېغىرراق باسقۇچتىكى ئاق داغ (ئاقكېسەل) نى داۋالاشتا تېرە رەڭگى نورمال تېرە رەڭگىگە كەلگۈچە داۋاملاشتۇرۇش كۇپايە قىلىدۇ. لېكىن، تېرىنىڭ چوڭقۇر قەۋىتىگىچە يېتىپ بارغان ئېغىر باسقۇچتىكى ئاقكېسەل نى داۋالاشتا تېرە ئەسلىگە كېلىپ، تۈكلەر قارىيىپ بولمىغۇچە بولدى قىلماسلىق ياكى دورىنى مەلۇم ۋاقىت توختىتىپ بەدەننى ئارام ئالدۇرغاندىن كېيىن يەنە ئۈزۈلدۈرمەي 2 — 3 باسقۇچ داۋاملاشتۇرۇش زۆرۈر دەپ قارايمەن.

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسىنىڭ ئاقكېسەل ئۈستىدە ئېلىپ بارغان 20 نەچچە يىللىق داۋالاش، كلىنىك كىلىق كۆزىتىش - تەتقىق قىلىش ئەمەلىيىتىدىن مەلۇم بولۇشچە، بىر قىسىم بىمارلاردىكى ئاق داغ بىرقانچە ئاي ھەتتا بىرقانچە يىل تەرەققىي قىلماي بىر خىل تۇرغان، بەزى بىمارلاردا ئاق داغنىڭ بىردىنلا ئۈزلۈكسىز كېڭىيىۋاتقانلىقى، ئاز ساندىكىلەردە بولسا داۋالنىۋاتقان مەزگىللەردىمۇ ساق ئورۇنلاردا يېڭىدىن ئاق داغلارنىڭ پەيدا بولۇۋاتقانلىقى سېزىلگەن. كېسەللىك كېڭىيىپ كېتىشتەك بۇنداق ئەھۋاللارنىڭ كۆرۈلۈشى بىمارلارنى ئەندىشىگە سېلىپلا قالماي، تەجرىبىسى كەمچىل بەزى دوختۇرلاردىمۇ باش قېتىنچىلىق پەيدا قىلىدۇ. دە، بىمارنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى ئۈستىدە ئەتراپلىق، ئىلمىي تەھلىل يۈرگۈزمەي ياكى ئىنچىكە كۆزىتىش ئېلىپ بارماي، ئىشلىتىۋاتقان دورىلارنى دەرھال ئۆزگەرتىدۇ ياكى دورا مىقدارىنى كۆپەيتىدۇ، ھەتتا ئاپتاپ زىيان قىلىپتۇ دەپ ئاپتاپقا قاقلىنىش.

ئاقكېسەلنىڭ كلىنىكىلىق تۈرلەرگە ئايرىلىشى

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاش تارىخىغا ئائىت يازما خاتىرىلەرگە ۋە ئۇزاق يىللىق كلىنىكىلىق كۆزىتىش - تەتقىقاتلىرىغا ئاساسلانغاندا، ئاقكېسەل ئادەتتە تېرىنىڭ رەڭگىگە قاراپ ئاق ئاقكېسەل (بەرەس سەفەد)، قارا ئاقكېسەل (بەرەس سىياھ) دېگەن ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

ئاق ئاقكېسەل كلىنىكىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئومۇمىي ئاقكېسەل كېسەللىكىنىڭ %99 نى كۆپرەكىنى ئىگىلەيدۇ. كۈندۈز رەت قىلىپ ئېيتقاندا، تۆۋەندىكىدەك بىرقانچە تۈرگە بۆلۈنىدۇ:

1. چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ تۈرگە ئايرىش

1. چېكىتسىمان شەكىلدىكى ئاقكېسەل
ئاقكېسەلنىڭ بۇ خىلدىكىسى ياش - ئۆسمۈرلەر ۋە ئوتتۇرا ياشلىق كىشىلەردە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. ئومۇمىي ئاقكېسەل كېسەللىكىنىڭ %26.3 نى ئىگىلەيدۇ. كېسەللىك ئىپادىسى جەھەتتە، ئاق داغ چېكىتسىمان ياكى قوناق چوڭلۇقىدا، سىم-مېترىك، چېگرىسى ئېنىق، پارقراق ھالەتتە، قىسمەنلەردە پۇرچاق چوڭلۇقىدا تارقاق ياكى چاچما شەكىلدە پەيدا بولۇپ،

پارقىراق كېلىدۇ، چېگرىسى ئېنىق بولۇپ، قىچىشمايدۇ.

2. تۇراقسىز (يۆتكىلىشچان، ھەرىكەتچان) ئاق-كېسەل

ئاقكېسەلنىڭ بۇ تۈردىكىسى كۆپىنچە ئەتىياز، ياز پەسىل-لىرىدە كۆپ ئۇچرايدۇ. تولا ھاللاردا يەڭگىل قىچىش بىلەن باشلىنىپ، دەسلەپتە نورمال تېرىدىن ئانچە پەرقلىنمەيدىغان سۇس رەڭسىزلىنىش بىلەن ئىپادىلىنىپ، تەدرىجىي سۈزۈلۈپ سۈزۈك، پارقىراق ھالەتتىكى ئاق داغقا ئۆزگىرىدۇ. ئاق داغ بىرلا ۋاقىتتا بىر ياكى بىرقانچە ئورۇندا پەيدا بولۇپ قىسقا ۋاقىت ئىچىدىلا يوشۇرۇن ھالەتتىكىلىرىمۇ ئاشكارىلىنىپ، سۈزۈك، پارقىراق ئاق داغ شەكىللىنىش بىلەن ئەسلىدىكى كىچىك دائىرىلىك ئاقكېسەللەر ئۈزلۈكسىز چوڭىيىپ بارىدۇ. ئاق داغ-نىڭ چېگرىسى رەتسىز بولىدۇ (11، 12 - بەتتىكى A، B، C، D سۈرەتكە قاراڭ).

بىر قىسىم بىمارلاردا داۋالىنىۋاتقان مەزگىللەردىمۇ ئەسلىدىكى ئاق داغلار ئۈزلۈكسىز چوڭىيىش بىلەن بىر چاغدا يەنە يېڭىدىن پەيدا بولىدىغان ئەھۋاللارمۇ ئۇچرايدۇ. بۇ خىل ئۆزگىرىشلەرنىڭ يۈز بېرىشى بىمارنىڭ مەجەزى بىلەن خىلىتىدا توختاۋسىز ئۆزگىرىش بولۇۋاتقىنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇڭا، بۇنداق ئەھۋالدا سىرتتىن دورا ئىشلەتمىگەن تۈزۈك بولمىسا تېرە سېزىمچانلىقى ئۈستۈن بىمارلارنىڭ تېرىسىدە رېئاكسىيە پەيدا بولۇپ، ئاق داغ كېڭىيىپ كېتىش مەسىلىسى كېلىپ چىقىدۇ.

5. ئىرسىيەتلىك ئاقكېسەل

ئاقكېسەل بىلەن ئاغرىغۇچىلارنىڭ يېقىنقى ئۈچ ئەۋلادلىرى

(جەمەتلىرى) ئىچىدە بۇ خىل كېسەللىككە گىرىپتار بولغانلار بولسا «ئىرسىيەتلىك تۈر» گە كىرىدۇ. ئاقكېسەلنىڭ بۇ تۈردىكى كىشى ئومۇمىي ئاقكېسەل ئىچىدە %10.5 نى ئىگىلەيدۇ. كۆپىنچە نارەسىدە بالىلار ۋە ياشلاردا كۆرۈلىدۇ (13). بەتتىكى A ، B سۈرەتكە قاراڭ. بۇ سۈرەتلەردە ئاقكېسەل بېقىنقى 20 نەچچە يىللىق كىلىنكىلىق داۋالاش ئەمەلىيىتىدە، تۇغۇلۇپ ئىككى ئايلىقتىن ئاشقان ۋە بىر ياش ئىچىدىكى بوۋاقلاردىمۇ ئاقكېسەلنىڭ بۇ تۈردىكىسى ئۇچرىغان.

6. تۇغما ئاقكېسەل

بۇ، بالا تۇغۇلۇپ 40 كۈندىن 1.5 ياشقىچە بولغان ئارىلىقتا بايقالغان ئاقكېسەلنى كۆرسىتىدۇ. كۆپىنچە ئاتا - ئانىلار بالىلارنى يۇيۇش ۋە كىيىمنى ئالماشتۇرۇش جەريانىدا تېرىدىكى ئانچە روشەن پەرقلەنپ كەتمەيدىغان قىسمەن دائىرىدىكى سۇس ئاق داغلارنى كۆرۈپ، گۇمانىي ئاساستا تەكشۈرتۈش ئارقىلىق كېسەللىك مۇقىملاشتۇرۇلىدۇ. بۇ خىل ئاق داغلار بالىلارنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ چۈشىنىدۇ، بىر ياكى بىرقانچە پارچە بىلەن چەكلىنىدۇ.

7. نېرۋا شاخچىلىرىنى بويلاپ تاسمىسىمان پەيدا بولىدىغان ئاقكېسەل

بۇ، بەدەننىڭ بىر تەرىپىدە تاق (يەككە) ھالەتتە تاسما شەكىلدە پەيدا بولغان ئاقكېسەلنى كۆرسىتىدۇ. كېسەللىك يې-

ئىدىن پەيدا بولغاندا نورمال تېرىدىن ئانچە پەرقلەنىپ كەتمەيدۇ. بىراق، تېرە رەڭلىرى قىسمەن سۇسلانغان ھالەتتە ۋاقىتلىق ئۆتۈش بىلەن سۇس داغلار تەدرىجىي كۆپ بىمارلاردا چېگرىسى رەتسىز، قىسمەنلەردە قىيپاش سوزۇلغان سۈزۈك، پارقراق ئاق داغقا ئۆزگىرىدۇ، كۆپچىلىكى قىچىمايدۇ؛ بەلكىم، پاچاق، يوتا قىسىملىرىدا كۆپرەك ئۇچرايدۇ (12 - بەتتە - كى A ، B سۈرەتكە قاراڭ). كېسەللىك تەرەققىياتى ئاستا بولىدۇ. بالىلار ۋە ياشلاردا نىسبەتەن كۆپ كۆرۈلىدۇ.

8. مەڭ خاراكتېرلىك ئاقكېسەل

بۇ، بەدەننىڭ مەلۇم يېرىدە ئەسلىدە بار بولغان مەڭ ياكى ئەمچەك تۈگمىسىنى مەركەز قىلىپ ئاقارغان ئاق داغقا قارىتىلغان بولۇپ (14 - بەتتىكى A ، B سۈرەتكە قاراڭ)، يالغۇز مەڭ خاراكتېرىدە كۆرۈلىدىغىنى نىسبەتەن ئاز ئۇچرايدۇ. باشقا تۈر - دىكى ئاقكېسەللەر بىلەن ئارىلىشىپ پەيدا بولىدىغانلىرى خېلى نىسبەتەن ئىگىلەيدۇ.

بۇ خاراكتېرلىك ئاقكېسەلنىڭ مەركەزىي قىسمىدا ئاق داغ بار، ئۇنىڭ ئايرىم - ئايرىم قىسمىدا ئاق داغ بار، ئۇنىڭ ئايرىم - ئايرىم قىسمىدا ئاق داغ بار.

بۇ خاراكتېرلىك ئاقكېسەلنىڭ مەركەزىي قىسمىدا ئاق داغ بار، ئۇنىڭ ئايرىم - ئايرىم قىسمىدا ئاق داغ بار.

بۇ خاراكتېرلىك ئاقكېسەلنىڭ مەركەزىي قىسمىدا ئاق داغ بار، ئۇنىڭ ئايرىم - ئايرىم قىسمىدا ئاق داغ بار.

بۇ خاراكتېرلىك ئاقكېسەلنىڭ مەركەزىي قىسمىدا ئاق داغ بار، ئۇنىڭ ئايرىم - ئايرىم قىسمىدا ئاق داغ بار.

بۇ خاراكتېرلىك ئاقكېسەلنىڭ مەركەزىي قىسمىدا ئاق داغ بار، ئۇنىڭ ئايرىم - ئايرىم قىسمىدا ئاق داغ بار.

ئاقكېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى تەدبىرلەر

ھەممىمىزگە مەلۇم، ھەرقانداق كېسەللىكنىڭ كېسەللىك سەۋەبچىسى ئېنىقلانسىلا، ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش تەدبىرلىرىنى تېپىش ئانچە قىيىنغا چۈشمەيدۇ. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ ئاقكېسەلنىڭ كېسەللىك سەۋەبچىسى ھەققىدىكى نەزەرىيىۋى قاراشلىرى 6737 نەپەر بىمارنى كلىنىكىلىق داۋالاش جەريانىدا ئېرىشكەن تەجرىبىسىگە ئاساسلىنىپ يەكۈنلەنگەن بولۇپ، تۆۋەندىكى ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى بۇ جەھەتتە ئىزدىنىۋاتقانلارنىڭ مۇھاكىمە قىلىپ كۆرۈشى ۋە بىمارلارنىڭ پايدىلىنىشىغا ئىززىيدۇ.

1. ھەزىم قىلىش سىستېمىسى

خىزمىتىنى كۈچەيتىش

بۇنىڭدا جىگەر ۋە ئاشقازاننىڭ ھەزىم قىلىش (ئوزۇق)لارنى ئورگانىزمنىڭ قوبۇل قىلىشىغا لايىقلاشتۇرۇش (ئىقتىدار)نى كۈچەيتىش ئارقىلىق قان تومۇرلار ۋە توقۇلمىلارنىڭ ھاياتى كۈچىنى ئاشۇرۇش ئالاھىدە زور ئەھمىيەتكە ئىگە. چۈنكى، ئوزۇقلۇقلارنىڭ پارچىلىنىشى، بەدەن ئېھتىياجلىق تەركىبلىرىگە ئايرىلىشى ۋە شۈمۈرۈلۈپ ئۆزلىشىشى ھەزىم قىلىش سىستېمىسى

تېمىسىنىڭ خىزمىتى ئارقىلىق تاماملىنىدۇ. ئەگەر جىگەر ئاجىزلاشسا ماددىلار خام قېلىش بىلەن سۈپەتسىز ئاجىزلىقلار (خىلىتلار) قان تومۇرلار، كاۋاك ئەزالار ۋە توقۇلمىلارغا يىغىلىپ، تېرىنىڭ نورمال ئوزۇقلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ - دە، ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ.

2. رەئىس ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىغا

ئەھمىيەت بېرىش

رەئىس ئەزالارنىڭ خىزمەت پائالىيىتى ئاجىزلاشسا بەدەننىڭ ئىچكى - تاشقى ئەزالار خىزمىتى قالايمىقانلىشىپ، خىلىتلارنىڭ يېڭىلىنىپ تۇرۇشى ئاستىلايدۇ. نەتىجىدە بەدەن ئىچكى مۇھىتىنىڭ نىسبىي تۇراقلىق ھالىتى كاپالەتلەندۈرۈلمىگەندىن باشقا، ئەتراپتىكى ئەزالارغا ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك، سەزگۈ، ھەرىكەتنى ئىدارە قىلغۇچى نېرۋىلار توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىق ئامىللار تەسىرى بىلەن مەلۇم ئورۇندا ئاقكېسەل پەيدا بولىدۇ. شۇڭا، رەئىس ئەزالارنىڭ خىزمەت ئىقتىدارىدىكى ئۆزگىرىشلەرگە دىققەت قىلىپ تۇرۇش كېرەك.

3. تېرىنى غىدىقلىغۇچى نەرسىلەرنى

ئىشلىتىشتىن ئېھتىيات قىلىش

مەلۇمكى، سەزگۈرلۈكى يۇقىرى (بەدەننى غىدىقلايدىغان) ھەر خىل خىمىيىۋى بۇيۇملارنى ئىشلەتكەندە تېرىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش، تېرە پۈتۈنلۈكىنى بۇزىدىغان زىيانلىق نەرسىلەرنى قەتئىي ئىشلەتمەسلىك، تېرە تازىلىقىغا

ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. سىرتقى زەخمىلەر (مەسىلەن كۆيۈك ۋە باشقا زەخمىلىنىشتىن يارىلىنىشلار) دىن ساقلانمىغاندا ياكى يارا يۈزى قەقەچلىنىپ پىشماستىنلا خام سويۇۋېتىپ تېرىنى بىھۈدە زەخمىلەندۈرۈشلەرمۇ بەزى ھاللاردا ئاقكېسەلنى پەيدا قىلىدۇ.

4. مېجەز تەخپۇخلۇقىغا دىققەت قىلىش

بۇنىڭ ئۈچۈن، بەدەندە مەلۇم ئۆزگىرىش بايقالسۇن - باي. قالمىسۇن تېۋىپ - دوختۇرغا كۆرۈنۈپ تۇرۇش، بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بەدەن ئەھۋالى ۋە ئەسلىي مېجەزنى بىلىۋېلىش، شۇنداقلا مېجەزنىڭ بۇزۇلۇشىنى يېمەكلىك ئارقىلىق تەڭشەشنى ئۆگىنىۋېلىش كېرەك. ئادەمنىڭ مېجەزى بۇزۇلغاندا ئۇيقۇسىزلىق ياكى كۆپ ئۇخلاش، ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، چوڭ - كىچىك تەرىتنىڭ قېتىمى ئازلاش ياكى زىيادە كۆپىيىش، روھىي ھالەتتە ئۆزگىرىش پەيدا بولۇش بىلەن ماغدۇرسىزلىنىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ. كۆز ئېقى، تىلنىڭ تەم سېزىشى، گەز باغلىشى ۋە تومۇرنىڭ سوقۇشى قاتارلىقلاردا ئۆزگىرىش بولىدۇ.

بۇ خىل ئەھۋاللار بەدەندە مېجەزنىڭ ئۆزگىرىشىنى شەكىللەندۈرۈپ، ئاقكېسەلنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەبچى بولىدۇ. شۇڭا، بۇنداق ئۆزگىرىشلەر كۆرۈلگەندە بىپەرۋالىق قىلماي، خىل كېلىدىغان تاماق تۈرلىرى ياكى چاي دورىلىرى ئارقىلىق دەرھال مېجەزنى ئوڭىلىۋېلىش ۋە ياكى ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈپ مېجەز بۇزۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

5. يېمەك - ئىچمەك تۈرلىرىگە

ئەھمىيەت بېرىش

بۇنىڭدا، قۇرۇق سوغۇق مېجەزلىكلەر تەبىئىتى ھۆل ئىس-ساق يېمەك - ئىچمەكلەرنى، قۇرۇق ئىسسىق مېجەزلىكلەر تەبىئىتى ھۆل سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلەرنى، ھۆل ئىسسىق مېجەزلىكلەر تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلەرنى، ھۆل سوغۇق مېجەزلىكلەر تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.

مەيلى قايسى خىل مېجەزدىكى كىشىلەر بولۇشتىن قەتئىي-ئەنەزەر، تۇخۇم، سۈت، قېتىق، پىۋا، ھاراق، ھەر خىل گاز-لىق سۇلار، بىڭگۈر، سوغۇق سۇ قاتارلىق يېمەك - ئىچمەكلىك-لەرنى ئىستېمال قىلىشتىن ياكى ئۇزاق مەزگىل كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

6. ئۆگىنىش، خىزمەت بىلەن دەم

ئېلىش مۇۋاپىق بولۇش

بۇنىڭدا، جىسمانىي ھەرىكەت بىلەن مۇۋاپىق شۇغۇللىنىپ، بەدەن چېنىقتۇرۇشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش، ئەمما تار كىيىم كىيىش، «گۈزەللىك» قوغلىشىپ بەدەن ۋە ئەزالارنى ئۇزاق ۋاقىت بوغۇپ قويۇپ مەشغۇلات قىلىش، يەرلىك ئەزا ۋە توقۇلمىلارنىڭ قان بىلەن تەمىنلىنىشىگە تەسىر يەتكۈزۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك.

7. ياخشى روھىي كەيپىيات تۇرغۇزۇش

ئۆز كېسەللىدىن نومۇس قىلىپ يوشۇرىدىغان، ئاقكېسەلگە گىرىپتار بولغانلارنى كەمسىتىدىغان ئادەتلەر تەربىيە كۆرمىگەنلىك ۋە نادانلىقنىڭ ئىپادىسى. شۇڭا، بىمارلار ۋە ئۇلارغا مۇناسىۋەتلىك كىشىلەر ئاقكېسەلگە بولغان تونۇشىنى توغرىلاپ، ياخشى روھىي كەيپىيات تۇرغۇزغاندىلا داۋالاشقا ماسلىشىپ، ساقىيىش ۋە ساقايتىش ئىشەنچىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

ئاقكېسەلنى قايسى ۋاقىتتا داۋالاش كېرەك

نۆۋەتتە كىشىلەرنىڭ سەھىيە - ساقلىقنى ساقلاش ئىشلىرىدا غا بولغان تونۇشى كۈنساين يۇقىرى كۆتۈرۈلۈش بىلەن، ھەر- خىل كېسەللىكلەرگە قارىتا دىققىتى قوزغىلىپ، كېسەللىكلەر- نىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبى ۋە تارقىلىش جەريانىنى چۈشىنىشىمۇ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى. بۇ ساغلاملىقنى كاپالەتلەندۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۆز گېپىمىزگە كەلسەك، ئاقكېسەلگە گىرىپتار بولغان كىشىلەرنىڭ كۆپچىلىكى ۋاقىتتا تەكشۈرتۈپ ۋە داۋالىنىپ ياخشىلانغان بولسىمۇ، بەزىلەر كېسەلدىن نومۇس قىلىپ دوختۇرغا كۆرۈنمەي ۋە داۋالانماي ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈ- ۋېتىپ، ئاق داغ تەرەققىي قىلىپ بەدىننىڭ كۆرۈنىدىغان يەر- لىرى (قول، يۈز، بويۇن قاتارلىق جايلار) غا تارىغاندىلا داۋال- ىنىشقا ئالدىرايدۇ. يەنە بەزىلەر ئاقكېسەلنى داۋالىتىشنىلا كۆزدە تۇتۇپ باشقا «ئەگەشمە كېسەللىك» لىرى بىلەن كارى بولماي ئۆزى بىلگەنچە دورا ئىشلىتىپ، پەرھىزنى قاتتىق تۇتۇپ مەجەز- نىڭ غەيرىي نورمال ھالىتىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. نەتىجىدە خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقى ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇلۇش بىلەن ئاقكېسەلنى ساقىيىش ئۇياقتا تۇرسۇن، سالامەتلىكىدە يامان ئا- قىۋەتلەر كۆرۈلىدۇ. بۇنداق ئەھۋال بەزى ياشانغان ياكى ئوتتۇرا ياشلىقلاردا كۆپرەك ئۇچرايدۇ، يەنى قان تومۇر قېتىشىش ۋە مېڭىگە قان چۈشۈش خاراكتېرلىك پالەچ بولۇپ قېلىش ئەھۋال.

لىرى يۈز بېرىدۇ.

ھالبۇكى، ئاقكېسەلگە گىرىپتار بولغان بىمارلار قايسى ۋاقىتتا داۋالانسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدىغانلىقى ئۈستىدە داۋالاش ئەمەلىيىتى ئارقىلىق يەكۈنلىگەن قاراشلىرىمنى تۆۋەندىكى بىر-قانچە نۇقتا بويىچە ئوتتۇرىغا قويىمەن:

(1) كېسەللىك يېڭىدىن پەيدا بولغان ياكى ئاقكېسەللىك بىلەن دەپ گۇمان قىلغانلار ۋاقىتنى كېچىكتۈرمەي دوختۇرغا كۆرۈنۈپ، دىئاگنوز بېكىتىلگەن ھامان قايسى پەسىل بولۇشتىن قەتئىينەزەر داۋالاش كېرەك. ئەكسىچە ئەھۋالدا ئاق داغنىڭ يەنە باشقا ئورۇنلارغا كېڭىيىپ كېتىشىنى تىزگىنلىگىلى بولماي-لاقالماستىن، بەلكى كىچىك دائىرىدىكى ئاق داغنىڭ چوڭىيىش ۋە ئۆزئارا تۇتىشىپ، كەڭ دائىرىلىك ئاق داغ ھاسىل بولۇش بىلەن داۋالاش ۋە ساقىيىش ئۈنۈمىگە تەسىر يېتىدۇ.

(2) ئاقكېسەل يۈز بەرگىنىگە بىرقانچە يىل بولغان ۋە بۇ جەرياندا كۆپ قېتىم ئامبۇلاتورىيە ۋە بالىنىستتا داۋالانغانلارغا قارىتا ئېيتقاندا، كېسەللىك كېڭىيىش ياكى يېڭىدىن ئاق داغ پەيدا بولۇش ئەھۋالى كۆرۈلمىگەن بولسا، ئەڭ ياخشىسى 4 - ئايدىن باشلاپ سىستېمىلىق داۋالاش كېرەك. چۈنكى، بۇ رايونىمىز ھاۋاسى كۈنساين ئىسسىق بىلەن قۇياش نۇرى تەرەككەندىكى ئاقكېسەل داۋالاشقا پايدىلىق ئۇلترا بىنەپشە نۇرنىڭ يەر يۈزىگە چۈشۈشى نىسبەتەن يۇقىرى بولىدىغان، كېچە - كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقىمۇ بارغانسېرى كىچىكلەيدىغان، كەڭ دائىرىلىك ئاقكېسەللەرنى داۋالاشنى ئۇزاقراق داۋاملاشتۇرغىلى بولىدىغان پەسىل بولۇپ، ئاقكېسەل داۋالاشتا ئەۋزەل شارائىتلاردىن تولۇق پايدىلانغىلى ۋە داۋالاش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ.

(3) ھامىلىدار ئاياللار ئاقكېسەل بىلەن ئاغرىغان بولسا

ياخشىسى تۇغۇپ بولغاندىن كېيىن داۋالنىش كېرەك. چۈنكى، ئاڭكېسەلنى داۋالاشتا بەدەندىكى ھۆللۈكنى ھەيدەپ، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى سۈرگە دورىلىرىنىڭ ياردىمىدە چىقىرىپ تاشلاپ، تېرە ۋە توقۇلمىلاردىكى زىيادە خىلىتلارنى نورماللاشتۇرۇش ئارقىلىق مېجەزنى تەڭشەشكە توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن، بەدەننى قىزىتىپ، ھارارەت (قۇۋۋەت) نى كۈچەيتىدىغان تەبىئىي ئىسسىق دورىلار ئاساس قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. بۇ مۇقەررەر ھالدا ھامىلىنىڭ نورمال ئۆسۈپ يېتىلىشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

(4) ئاڭكېسەلدىن باشقا يەنە قانداي مىقدارى ئېشىپ كېتىش كېسەلى، يۇقىرى قان بېسىم كېسەلى، ئارتېرىيە قېتىش كېسەلى، يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى، دىئابت، ئۆتكۈر تۈپىر كۈلىوز كېسەللىكى، ھەزىم قىلىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى قاتارلىقلار بىلەن ئاغرىغانلار ئىمكانبار بۇنداق «ئەگەشمە كېسەللىك» لىرىنى ئالدى بىلەن داۋاللىتىپ، ياخشىلانغاندىن كېيىن، ئاندىن دوختۇرنىڭ مەسلىھىتى بويىچە داۋالنىش كېرەك. چۈنكى، ئاڭكېسەلنى داۋالاشتا بەدەندىكى زىيادە ھۆللۈكلەرنى ھەيدەپ، قاننى جانلاندۇرۇش، قۇۋۋەتنى كۈچەيتىپ قىزىتقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش، يۇقىرى ئوزۇقلۇق قىممىتى بار يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش قاتارلىق بىر يۈرۈش ئۇسۇل - چارىلەر بىلەن كۈن نۇرغا قاقلاش بىرلەشتۈرۈلۈپ ئېلىپ بېرىلغاچقا، داۋالاش ۋاقتىنىڭ ئۇزاقراق بولۇشى بىمارلارنىڭ سالامەتلىكىگە بىۋاسىتە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

(5) ئاڭكېسەل كىچىك دائىرىلىك، كېسەللىك تارىخى ئانچە ئۇزۇن بولمىغان بىمارلار مۇمكىنقەدەر كېسەللىك بايقالغان ھالدا مان كېچىكتۈرمەي داۋالنىش كېرەك. بۇنىڭدا كېسەللەنگەن ئورۇننى دورا بىلەن تېڭىپ ئىسسىق ساقلاش، دائىم يەڭگىل

ئۇۋۇلاپ بېرىش، مەخسۇس تېرە كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىدۇ. لىدىغان ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغىنى سېتىۋېلىپ قەرەللىك قاقلاش ئۇسۇللىرىنى بىرلەشتۈرۈپ قوللانغاندا، ياز پەسلىدىكى ئوخشاش ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى 2001 - يىلىدىن 2003 - يىلىغىچە 63 نەپەر بىمارنى كۈز ۋە قىش پەسلىدە بالىنىستتا ياتقۇزۇپ مۇشۇ ئۇسۇلدا داۋالاپ تولۇق ساقىيىش ئۈنۈمىنى %18.2 كە، ئۈنۈم بېرىش نىسبىتىنى %88.4 كە يەتكۈزگەن. يازدىن باشقا پەسلىلەردە ئاقكېسەل بىمارلىرىنى كېسەلخانىدا ياتقۇزۇپ داۋالا. شۇ شىپاخانىنىڭ تارىخىدىكى تۇنجى قېتىملىق ئىش بولۇشىغا قارىماي، تەتقىقات، داۋالاش نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك بولغان. دېمەك، بۇ يازدىن باشقا پەسلىلەردىمۇ ئاقكېسەل دورىلىرىنى ئىشلىتىش بىلەن فىزىكىلىق ئۇسۇللارنى بىرلەشتۈرۈپ قوللانغاندا ئوخشاشلا ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.

ئاقكېسەلنى داۋالاشتىكى ئاساسلىق پرىنسىپ - ئۇسۇللار

ئۇيغۇر تېبابىتى ئاقكېسەلنى داۋالاشتىكى ئۇزاق يىللىق كلىنىكىلىق تەجرىبە ئەمەلىيىتى جەريانىدا، تېبابەتچىلىك ئاساسىي نەزەرىيىلىرىنى يېتەكچى قىلىپ، ئالدى بىلەن كېسەللىك سەۋەبچىسىنى يوقاتقاندىن باشقا، روھىي جەھەتتىن داۋالاش، يېمەك - ئىچمەك ۋە پەرھىز ئارقىلىق داۋالاش، مەجەز ۋە خىلىتلارنى تەڭشەش، خاس دورىلار بىلەن قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىش ۋە ئاپتاپقا قاقلاش بىلەن دورا سۈركەشنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق ئۇسۇل - پرىنسىپلارنى مۇئەييەنلەشتۈردى.

تۆۋەندىدە داۋالاشنىڭ ئۇسۇل - پرىنسىپلىرى ئۈستىدە بىر - بىرلەپ توختىلىمىز.

ئاقكېسەلنى داۋالاشتا ئومۇمەن بىرلەشمە داۋالاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن كېسەللىكنى پەيدا قىلغۇچى سەۋەب تېپىپ چىقىلىدۇ، ئاندىن كېسەللىك سەۋەبچىسىنىڭ قايسى خىلىتقا تەۋە ئىكەنلىكى ئېنىقلىنىپ، كېسەللىك پەيدا بولۇش جەريانىدا بىمار ئۆزى بايقىغان ئۆزگىرىشلەر ۋە تۈرلۈك ئامىللار ئۈستىدە ئەتراپلىق مۇھاكىمە ئېلىپ بېرىلىدۇ، بىمارلارنىڭ ئەسلىي مەجەزى ۋە ھازىرقى مەجەزى، شۇنداقلا جىمسا - نىي ھالەتلىرىدىكى ئۆزگىرىشلەر ئەتراپلىق مۆلچەرلىنىپ تەھلىل يۈرگۈزۈلىدۇ. بىمارنىڭ مەجەزى ۋە خىلىت تېپى ئايرىد.

لىپ، خىلىتقا (كېسەللىك ماددىسىغا) قارىتا مۇنزىچ (ماددىنى پىشۇرغۇچى — يىغقۇچى) دورا نۇسخىلىرى بېرىلىدۇ، ماددىنى پىشۇرۇپ سۈرۈپ چىقىرىش دەرىجىسىگە يەتكەنلىكى بايقالغاندىن كېيىن، مۇسھىل (سۈرگە دورىلار تەسىرى بىلەن كېسەللىك ماددىسىنى بەدەندىن چىقىرىدىغان) دورا نۇسخىلىرى بېرىلىدۇ. بەدەن تازىلىنىپ خىلىتلار تەڭشەلگەندە ھۆلۈكلەرنى ئازايدى. تىپ قاننى ھەرىكەتلەندۈرۈش چارىسى قوللىنىلىپ، ئاق داغ ئورنىغا قاننىڭ ئېقىپ كېلىشى كۈچەيتىلىدۇ. بۇنىڭغا بىرلەش-تۈرۈپ تېرىگە رەڭ پەيدا قىلغۇچى ۋە ئومۇمىي بەدەننى كۈچەيت-كۈچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. ئۇيغۇر تېبابىتىدە ئاقكېسەلنى داۋالاش تۆۋەندىكى بەش جە-ھەتتىن ئېلىپ بېرىلىدۇ:

1. روھىي جەھەتتىن داۋالاش

ئاقكېسەلنى روھىي جەھەتتىن داۋالاش ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئۇزاقتىن بېرى قوللىنىپ كېلىۋاتقان ئاساسلىق ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى. شۇڭا، ئاقكېسەلنى داۋالاشتا روھىي تەسىرنىڭ ئۈنۈمىگە سەل قاراشقا بولمايدۇ. چۈنكى، ئاقكېسەل چىراي گۈزەللىكىگە ئوخشىمىغان دەرىجىدە نۇقسان يەتكۈزگەچكە، بىمارلاردا ئېغىر روھىي بېسىم پەيدا قىلىپ، خىزمەت، تۇرمۇش ۋە ئەر - ئاياللىق مۇناسىۋەت قاتارلىقلاردا بەلگىلىك بېسىم پەيدا قىلىدۇ. بىر قىسىم بىمارلار ھەتتا نېرۋا ئاجىزلىق ۋە روھىي چۈشكۈنلۈك قاتارلىق قوشۇمچە كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولىدۇ، بولۇپمۇ ياش ۋە ئوتتۇرا ياشتىكى قىز - چوكانلارنىڭ بەدىنىنىڭ كۆرۈند-ىدىغان ئورۇنلىرىدا ئاقكېسەل پەيدا بولغاندا بۇ خىل ئەھۋال

تېخىمۇ گەۋدىلىك بولىدۇ. ئاز ساندىكى بىمارلاردا بولسا تۈر-
 مۇشتىكى ئوڭۇشسىزلىقلار تۈپەيلى بۇ خىل كېسەللىكنى داۋا-
 لاش مۇددىتى سوزۇلۇپ كېتىدۇ. دە، ئۇلاردا ئۆز ھاياتىدىن
 ئۆمىدسىزلىنىدىغان، ھەتتا ياشاش ئىرادىسىنى يوقىتىدىغان ئې-
 چىنىشلىق ئاقىۋەتلەر كېلىپ چىقىدۇ.

شۇڭلاشقا، ئاقكېسەلنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن بىمار-
 لارغا بولغان ئىدىيىۋى تەربىيىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق، ئۇلار-
 نىڭ ئىدىيىسىدىكى قاتمال ھالەتنى ئۆزگەرتىشكە ياردەم بېرىپ،
 چوقۇم ساقىيىپ كېتىدىغانلىق ئىشەنچىنى تۇرغۇزۇش زۆرۈر.
 بىمارلارغا بۇ ھەقتە ئەتراپلىق خىزمەت ئىشلىگەندىن تاشقى-
 رى، ئاقكېسەلنىڭ يۇقمايدىغانلىقى ۋە خىزمەت - ئەمگەك ئىقتى-
 دارىغا ھېچقانداق تەسىر يەتكۈزمەيدىغانلىقى قاتارلىق ئەھۋاللار-
 نى ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغىچە چۈشەندۈرۈشكە ھەقىقىي ئەھمىيەت
 بېرىش كېرەك، شۇنداقلا جەمئىيەتكىمۇ ئاقكېسەلنىڭ يۇقۇملۇق
 كېسەل ئەمەسلىكى توغرىسىدىكى تەشۋىقاتنى كۈچەيتىپ، بۇ
 پەقەت تېرىدىكى رەڭ ئىشلىگۈچى توقۇلمىلار خىزمىتىنىڭ تو-
 سالغۇغا ئۇچرىشىدىن كېلىپ چىققان كېسەللىك ئىكەنلىكىنى،
 داۋالسا ساقىيىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە، بىمارلارنى
 دائىم بەدەننى چېنىقتۇرۇپ تۇرۇش، كەيپىياتنى خۇشال - خۇ-
 رام، روھلۇق تۇتۇش، دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسىنى ۋاقتىدا تو-
 لۇق ئورۇنداش، كۆپ قايغۇرماسلىققا ئىلھاملاندۇرۇش كېرەك.
 روھىي جەھەتتىكى بۇ بىر يۈرۈش خىزمەتلەر ئەستايىدىل
 ياخشى ئىشلەنسە ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈ-
 رۈشتە ئالاھىدە رول ئوينايدۇ.

بۇنىڭدا ئاقكېسەل بىلەن ئاغرىغۇچىلارنى روھىي جەھەتتىن
 ئىلھاملاندۇرۇپ، دوختۇرنىڭ ئەتراپلىق داۋالاشىغا ئەستايىدىل
 ماسلىشىشنى قولغا كەلتۈرۈش كۆزدە تۇتۇلىدۇ. بىمارلارنى

كۈچلەندۈرۈش ئارقىلىق قاننى كۆپەيتكەندىلا كېسەللىك ئۈستىدىن غەلبە قازانغىلى بولىدۇ. دېمەك، ئوزۇقلۇق ۋە پەرھىز ئارقىلىق ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاساسلىق مۇھىم ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى. بۇنىڭدا ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ مىجەز ۋە خىلىت ھەققىدىكى تۈپكى نەزەرىيە قاراشلىرى ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان. ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ قارشىچە، ئىنسانلار ئىستېمال قىلىدىغان يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، قۇرۇق سوغۇق، ھۆل سوغۇقتىن ئىبارەت تۆت خىل بولىدۇ. ئادەم بەدىنىدىكى خىلىتلارنىڭ شەكىللىنىشى ئىستېمال قىلغان ئوزۇقلۇق ماددىلارغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. كىشىلەرنىڭ مىجەز ۋە خىلىت تەڭپۇڭلۇقىنى ئۇزاق ۋاقىت نىسپىي تۇراقلىق ھالەتتە ساقلاش ئۈچۈن، قۇرۇق ئىسسىق مىجەزدىكىلەر تەبىئىيەتتىن ھۆل سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش؛ ھۆل سوغۇق مىجەزلىكلەر تەبىئىيەتتىن قۇرۇق ئىسسىق يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش؛ ھۆل ئىسسىق مىجەزلىكلەر تەبىئىيەتتىن قۇرۇق سوغۇق يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش؛ قۇرۇق سوغۇق مىجەزلىكلەر تەبىئىيەتتىن ھۆل ئىسسىق يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئەگەر ئىسسىق مىجەزلىك كىشىلەر يەنە داۋاملىق تەبىئىيەتتىن ئىسسىق يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلسا ياكى سوغۇق مىجەزلىك كىشىلەر يەنە داۋاملىق سوغۇق تەبىئەتلىك يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلسا بەدەننىڭ ئىسسىق - سوغۇقلۇقى ياكى قۇرۇق - ھۆللۈكى غالىب كېلىش تۈپەيلى مىجەز ۋە خىلىتلاردا ناچار ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، كېسەللىك كېلىپ چىقىدۇ. بۇ قاراشلارغا ئاساسلانغاندا، ھەربىر بىمار ئۆز مىجەزىگە ماس ھالدىكى يېمەكلىك بىلەن ئورۇقلىنىشى، شۇنداقلا مىجەزىگە ياقىدۇ.

مايدىغان يېمەك - ئىچمەكلەردىن پەرھىز تۇتۇشى كېرەك .
 بۇلاردىن باشقا، بىمارلارنىڭ يېشى، ئۆرپ - ئادىتى، بەدەن قۇۋۋىتى، قوشۇمچە كېسەللىكلىرى، كېسەللىك يۈز بەرگەن پەسىل، ھايات كەچۈرۈۋاتقان ماكاننىڭ جۇغراپىيىلىك ئەھۋالى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىملىك ئامىللارمۇ يېمەك - ئىچمەك جەھەتتە مۇناسىپ چەك قويىدۇ . ئاڭكېسەل بىمارلىرى ئوزۇقلۇق بىلەن پەرھىز پرىنسىپلىرىغا قاتتىق ئەمەل قىلغاندىلا ئىشلىتىلگەن دورىلار ئۆز تەسىرىنى ئۈنۈملۈك جارى قىلىپ، كېسەللىكنىڭ بالدۇرراق ساقىيىشىدا رول ئوينايدۇ . بۇنىڭ ئۈچۈن، مېجەز ۋە خىلىتلارنىڭ ئۇزاق ۋاقىت نىسپىي تەڭپۇڭلۇق ھالدىتىنى ساقلاشقا كاپالەتلىك قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ .
 ئاڭكېسەلنىڭ ھۆل سوغۇق مېجەزلىك كىشىلەردە كۆپرەك كۆرۈلۈشتەك ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، بىمارلار تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىپ بېرىش بىلەن ھۆل سوغۇق تەبىئەتلىك يېمەك - ئىچمەكلەردىن مۇۋاپىق پەرھىز تۇتۇش كېرەك . ئوزۇقلىنىشتا ئۇچار قاناتلارنىڭ ئوتقا قاقلاپ پىشۇرۇلغان گۆشلىرى، قوي گۆشىنىڭ شورپا، كاۋاپلىرى، پولۇ، پېتىر مانتا قاتارلىقلار ئاساس قىلىنىشى كېرەك، بۇلارغا زىرە، قارىمۇچ، سىيادان، قارا كۈنجۈت، زەنجىر - ۋىل قاتارلىق دورا - دەرملەكلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا سېلىپ ئىستېمال قىلسا تېخىمۇ پايدىلىق بولىدۇ . قۇۋۋىتى يۇقىرى يېمەكلىكلەردىن ھەسەل ھەرقانداق مېجەزلىك بىمارلار بولسۇن ماس كېلىۋېرىدۇ، ئۇزاق مەزگىل ئۈزۈلدۈرمەي ئىستېمال قىلىپ بەرگەندە ھەسەل تەركىبىدىكى گۈل چېڭىدا تېرە رەڭلىرىنى (تېرە خاللىرىنى) ھاسىل قىلغۇچى رەڭ ماددىسى ناھايىتى مول بولىدۇ . ئۇنىڭدىن باشقا ھۆل مېۋىلەردىن ئەنجۈر، پىشقان ئۈزۈم، قارا ئۈجمە، تاتلىق ئانار قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق يەپ

كېسەللىكلىرى)، كېسەللىك يۈز بەرگەن پەسىل ۋە مېجەز - خىلىت تېپى قاتارلىقلار بىلەن ھېسابلاشماي ياكى ئەتراپلىق مۇھاكىمە يۈرگۈزۈپ پەرقلەندۈرمەي يېمەك - ئىچمەككە قارا - قويۇق چەكلىمە قويۇش ۋە ياكى مەلۇم بىرنەچچە خىل نەرسىنىلا يېيىشكە كۆنۈكتۈرۈپ قويۇشتەك ئەھۋاللار ئەمەلىي داۋالاش پىرىنسىپلىرىغا ئۇيغۇن ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇنداق ئەھۋال - لاردىن ساقلىنىش زۆرۈر، ئەلۋەتتە.

بىمارلارمۇ ئاقكېسەل پەيدا بولغان ھامان يوشۇرماستىن ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈپ تەرتىپلىك داۋالىنىشنى قولغا كەلتۈرۈش، ئۆزى خالىغانچە يېمەك - ئىچمەكلەردىن پەرھىز تۇت - ماسلىق، كۆيدۈرگۈچى (كىسلاتالىق) خاراكتېرىدىكى دورىلار - نى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش، كېسەللىككە پايدىلىق ۋە زىيانلىق نەرسىلەرنى ئىلمىي ئاساستا بىلىۋېلىش لازىم.

3. دورا بىلەن مېجەز ۋە خىلىتلارنى

تەڭشەش ئارقىلىق داۋالاش

ئۇيغۇر تېبابىتى ئاقكېسەلنى داۋالاشتا مېجەز ۋە خىلىت نەزەرىيىلىرىگە ئاساسەن بىمارلارنىڭ مېجەزى ۋە خىلىت تېپىنى چىقىش قىلىپ، مېجەزنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىنى تىز - گىنلەپ، كېسەللىكنىڭ تەرەققىياتىنى توسۇش، غەيرىي تەبىئىي مېجەزنى تەڭشەش، ئۆزگەرگەن خىلىتلارنى نورماللاشتۇرۇش ئارقىلىق، رەئىس ئەزالار (مېگە، يۈرەك، جىگەر) نىڭ خىزمە - تى بىلەن بەدەندىكى قۇۋۋەتنىڭ نورمال رولىنى ئەسلىگە كەلتۈ - رۈپ، بەدەننىڭ كېسەللىك ئۈستىدىن غالىب كېلىشىگە پايدىلىق بەدەن ئىچكى مۇھىتى يارىتىش ئۈچۈن، مېجەزگە مۇناسىپ

كېلىدىغان دورا خىللىرىنى بېرىش ۋە يېمەك - ئىچمەك بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنى تۈپ پرىنسىپ قىلىدۇ.

ئاقكېسەلنى دورا بىلەن داۋالاش تۆۋەندىكى تۆت باسقۇچ ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ:

بىرىنچى، مېجەز ۋە خىلىتلارنى تەڭشەش؛
ئىككىنچى، خاس دورىلار بىلەن بەدەننى قۇۋۋەتلەيدىغان دورىلارنى ئىشلىتىشنى بىرلەشتۈرۈش؛
ئۈچىنچى، كېسەللىك بار ئورۇنغا بىۋاسىتە دورا كىرگۈزۈش؛

تۆتىنچى، سىرتىدىن دورا سۈركەش.
مېجەز ۋە خىلىتلارنى تەڭشەش ئارقىلىق داۋالاش ئېلىپ بارغاندا، مۇنزىچ (كېسەللىك ماددىلىرىنى پىشۇرۇپ يىغقۇچى) دورا نۇسخىلىرىنى ئىشلىتىپ، مېجەزنى تەڭشەش ۋە مۇسھىل (كېسەللىك ماددىلىرىنى بەدەندىن ھەيدىگۈچى) دورا نۇسخىلىرىنى ئىشلىتىپ بەدەننى تازىلاشتىن ئىبارەت ئىككى باسقۇچ قوللىنىلىدۇ.

مۇنزىچ دورا نۇسخىلىرىنى ئىشلىتىشتە ئالدى بىلەن بىمارنىڭ مېجەزى ۋە خىلىت تىپى ئايرىلىپ كېسەللىك سەۋەبچىسى تېپىپ چىقىلىدۇ. بىمارنىڭ مېجەز ۋە خىلىت تىپى بېكىتىلگەندىن كېيىن، شۇ خىل غەيرىي تەبىئىي خىلىتقا قارىتا مۇنزىچ دورا نۇسخىلىرى ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭدا ھەر بىر خىلىتقا مۇنزىچ دورا ئىشلىتىش مۇددىتى شۇ خىلىتنىڭ خاراكتېرى ۋە خاسلىقىغا قاراپ ئوخشىمايدۇ.

ئۇيغۇر تېبابىتى مۇنزىچ دورا نۇسخىلىرىنى باشقا دورىلار بىلەن بىرلا ۋاقىتتا ئىشلەتمەسلىكنى تەكىتلەيدۇ. ئۇيغۇر تېبابىتى بىر تەجىلىكىدە ئىشلىتىلىدىغان مۇنزىچ دورا نۇسخىلىرىنىڭ خىللىرى بىرقەدەر كۆپ بولۇپ، تۆۋەندە نۇقتىلىق قىلىپ قەشقەر

ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى تېرە كېسەللىكلەر بۆلۈ-
مى يېقىنقى 20 نەچچە يىلدىن بۇيان كلىنىكىدا ئىزچىل تۈردە
ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان بىر قىسىم مۇنزىچ دورا نۇسخىلىرىنى
تونۇشتۇرىمىز.

(1) غەيرىي تەبىئىي بەلغەمنى پىشۇرۇش ئۈچۈن بەدىيان
يىلتىزى پوستى، كاسىنە يىلتىزى پوستى، بەدىيان، پىرسىياۋ-
شان، گۈل بىنەپشە، گۈلسۈرۈخ، ئەنگۈر شىپالارنىڭ ھەربىرى-
دىن 20 گرامدىن؛ گاۋزبان، گۈل گاۋزبان، ئىزخىر مەك-
كىلەرنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن تەييارلىنىدۇ، ئاندىن 30
گرام ئەنجۈر قېقى، 60 گرام ۋاسالغۇ ئۈزۈم، 200 گرام
گۈلقەنت ھازىرلىنىدۇ. يىلتىز دورىلار پاكىز تازىلانغاندىن كې-
يىن چالا سوقۇلىدۇ، قالغان دورىلارمۇ تازىلىنىپ تەلەپكە لايىق-
لاشتۇرۇلۇپ، 1000 مىللىتىمىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلد-
نىپ، پەس ئوتتا 600 مىللىتىمىر دورا سۈيى قالغۇچە قاينىتىد-
لىنىدۇ، ئاندىن داكا ياكى خام بىلەن سۈزۈلۈپ، ئۈستىگە گۈل-
قەنت سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. شۇ يوسۇندا تەييارلان-
غان دورا ياسالمىسى سىرلىق قاچىدا سوۋۇتۇلۇپ، چوڭلارغا
كۈنىگە 3 قېتىم ئەۋالغا قاراپ 50 — 100 مىللىتىمىردىن
بېرىلىدۇ. بۇ تاكى كېسەللىك ماددىسى پىشقانغا قەدەر داۋاملاش-
تۇرۇلىدۇ.

(2) غەيرىي تەبىئىي سەپرانى پىشۇرۇش ئۈچۈن كاسىنە
ئۇرۇقىدىن 30 گرام، چىلاندىن 10 دانە، سەرىستاندىن 15
گرام، گۈل بىنەپشە، قىزىلگۈل، شاھتەررە، كاسىنە يىلتىزى
پوستى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن، ئەينۈلىدىن
10 دانە، نېلۇپەردىن 10 گرام، بەدىيان يىلتىزى پوستىدىن 10
گرام تەييارلىنىدۇ، يىلتىز دورىلار تازىلىنىپ چالا سوقۇلىدۇ،
قالغان دورا ماتېرىياللىرى تەلەپكە لايىقلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن

750 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 500 مىللىلىتىر دورا سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن داكا ياكى خام بىلەن سۈزۈپ سوۋۇتۇلۇپ، چوڭلارغا كۈندىگە 2 — 3 قېتىم ئەھۋالغا قاراپ 50 — 100 مىللىلىتىردىن كېسەللىك ماددىسى پىشقانغا قەدەر ئىچۈرۈلىدۇ.

(3) غەيرىي تەبىئىي سەۋدانى پىشۇرۇش ئۈچۈن ئەنگۈر شىپا، گۈل بىنەپشە، قىزىلگۈل، گاۋزبان، بەدىيان، ئۈستە-قۇددۇس، بادرنەجبۇيا، پىرسىياۋشان قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن، چىلاندىن 10 گرام، سەرپىستاندىن 12 گرام، ئاقلانغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزىدىن 12 گرام، گۈلقەنتتىن 100 گرام تەييارلىنىدۇ، قاتتىق دورا ماتېرىياللىرى چالا سوقۇلۇپ 750 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 500 مىللىلىتىر دورا سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىپ داكا ياكى خام بىلەن قالدۇقى سۈزۈۋېتىلگەندىن كېيىن، گۈلقەنت سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، ئاندىن سوۋۇتۇلۇپ چوڭلارغا ئەھۋالغا قاراپ كۈنىگە 3 قېتىم، 60 — 120 مىللىلىتىردىن كېسەللىك ماددىسى پىشقانغا قەدەر ئىچۈرۈلىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ قارشىچە، نوقۇل غەيرىي تەبىئىي قان خىلىتىنى پىشۇرۇش ھاجەتسىزدۇر. بىراق، قان خىلىتىغا باشقا غەيرىي تەبىئىي خىلىتلار ئارىلاشقان بولسا، شۇ خىلىتلارنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ئۇنىڭغا ماس كېلىدىغان ئايرىم-ئايرىم نۇسخىلار ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن:

(1) قان خىلىتىغا غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ئارىلاشقان (مۇندەزىج بەلغەم مۇنى بەرەس) بولسا رۇمبەدىياندىن 62 گرام، ئۈستقۇددۇس، ئەنجۈر قېقىنىنىڭ ھەر بىرىدىن 31 گرامدىن؛ چىڭشەي يىلتىزى پوستى (بىخ كەرەپشە)، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، چىڭشەي ئۇرۇقى، زەنجۈبىل، بەدىيان يىلتىزى پوستى

(پوستى بىخ بەدىيان) نىڭ ھەربىرىدىن 21 گرامدىن؛ ۋاسالغۇ (ئۇرۇقسىز ئۈزۈم) دىن 150 گرام، پۈدىنىدىن 15 گرام، سانالغۇ مەككىدىن 15 گرام، سۈمبۈل چىنىدىن 11 گرام، قۇستى تەلىختىن 9 گرام، ھەسەلدىن 500 گرام تەييارلىنىدۇ. يىلتىز دورا ماتېرىياللىرى تازىلىنىپ چالا سوقۇلىدۇ. قالغان دورا ماتېرىياللىرى ئاداللىنىپ تەلەپكە لايىقلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن، 1500 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا بىر كېچە چىلىنىپ، پەس ئوتتا 1000 مىللىلىتىر دورا سۈيى قالدۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن داكا ياكى خام بىلەن قالدۇقى سۈزۈۋېتىلىپ، ھەسەل ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ھەمدە پەس ئوتتا يەنە بىر قېتىم قاينىتىلىپ سىرلىق قاچىدا سوۋۇتۇلۇپ، چوڭلارغا ئەھۋالغا قاراپ كۈنىگە 3 قېتىم، 60 — 120 مىللىلىتىردىن كېسەللىك ماددىسى پىشقانغا قەدەر ئىچۈرۈلىدۇ. بالىلار ۋە قېرى، تېنى ئاجىز كىشىلەرگە ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى كېچەيتىپ بېرىلىدۇ.

(2) قان خىلىتىغا غەيرىي تەبىئىي سەۋدا ۋە سەپرا ئارىلاش-قان بولسا «مۇنزىچ سەپرا، سەۋدائى بەرەس» دېيىلىپ، چىلاندىن 7 دانە، گۈل بىنەپشە، نېلۇپەر، شاھتەررە، كاسىنە يىلتىزى پوستى، قارا ھېلىلە، گاۋزىبان، ئۇستقۇددۇس، پىرسە-ياۋشان، ئارپىبەدىيان، سېرىق ھېلىلە پوستى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 7 گرامدىن؛ كاسىنە ئۇرۇقى، بادام مېغىزىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرامدىن؛ سەرپىستاندىن 21 گرام، يانتاقشې-كىرىدىن 150 گرام تەييارلىنىپ، ئۇرۇق، يىلتىز دورىلار تازىلانغاندىن كېيىن چالا سوقۇلىدۇ، قالغان دورىلار ئاداللىنىپ تەلەپكە لايىقلاشتۇرۇلۇپ، يانتاقشېكىرىدىن باشقىلىرى 1000 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا قاينىتىلىدۇ، قايناۋاتقان دورا سۈيىدىن ئايرىم قاچىغا ئېلىنىپ يانتاقشېكىرى تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، ئېرىگەندىن كېيىن

سەل تىندۇرۇلۇپ، يەنە قايناۋاتقان دورىغا تۆكۈلىدۇ، ئاندىن ئاستىدىكى دۇغى تۆكۈۋېتىلىپ، بىرلەشتۈرۈلگەن دورىلار پەس ئوتتا 600 مىللىتىر دورا سۈيى قالدۇچە قاينىتىلىدۇ ۋە داكا ياكى خام بىلەن دورا قالدۇقى سۈزۈۋېتىلىپ، سوۋۇتۇلغاندىن كېيىن چوڭلارغا كۈنىگە 2 قېتىم، 100—150 مىللىتىردىن كېسەللىك ماددىسى پىشقانغا قەدەر ئىچۈرۈلىدۇ.

يۇقىرىقى ئىككى خىل (مۇنزىجى بەلغەم مۇنى بەرەس) بىلەن «مۇنزىج سەپرا، سەۋدائى بەرەس» مۇرەككەپ مۇنزىچ نۇسخا قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى تېرەك سەللىكلەر بۆلۈمىدىكى پېشقەدەم مۇتەخەسسسى ئىبراھىم قارى ھاجى، مۇھەممەت مۇسا ھاجى، ئېزىز كەنجى ھاجىلارنىڭ ئاق كېسەلنى كلىنىكىلىق داۋالاشقا سىڭدۈرگەن نەچچە ئون يىللىق ئەجرى ئارقىلىق بېكىتىلگەن بولۇپ، قايتا - قايتا كۆزىتىش ۋە كلىنىكىلىق تەتقىق قىلىشلاردىن ئۆتۈپ، مۇرەككەپ مەجىز تىپىدىكى ئاقكېسەل بىمارلىرىغا بىرقەدەر ئورتاق قوللىنىش تەشەببۇس قىلىنغان رېتسېپ شەكىللەندۈرۈلگەن. شۇڭا، 1990 - يىلىدىن 2002 - يىلىغىچە بالىنىست شارائىتىدا 2360 نەپەر ئاقكېسەل بىمارغا خىلىت تىپىغا ئاساسەن بىرقەدەر سىس-تېمىلىق ئىشلىتىلىپ، بۇ دورىنىڭ مەجىزنى تەڭشەش، كېسەللىك ماددىسىنى يىغىشتا ياخشى ئۈنۈمى بارلىقى، ئەكس تەسىردىن نىڭ يوقلۇقى ئىسپاتلانغان.

(3) قان خىلىتىغا غەيرىي تەبىئىي سەۋدا ئارىلاشقان بولسا سېرىق ھېلىلە پوستى، كابۇل ھېلىلىسى پوستىنىڭ ھەر بىرىدىن 60 گرامدىن، ئۇرۇقىدىن ئايرىلغان ۋاسالغۇ (ئۇرۇقسىز ئۈزۈم)، ئەپتىمۇن (سېرىق يۆگەي — سېرىقئوت) نىڭ ھەر بىرىدىن 30 گرامدىن؛ ئەنجۈر قېقىدىن 100 گرام، پوستى تۈربۇت، ئاقلانغان بىخۇس، ئىزخىرلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 5

گرامدىن؛ رۇمبەدىيان، چىڭسەي ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن 6 گرامدىن تەييارلىنىپ، 1000 مىللىلىتىر ئىلمان سۇدا بىر كېچە تۇغۇزۇلۇپ، سۇس ئوتتا سۇ تەركىبى 600 مىللىلىتىر قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن دورا تىرىپىلىرى سۈزۈپ ئېلىۋېتىلىپ، سىرلىق قاچىدا ئاغزىنى ياپماي سوۋۇتۇلىدۇ. دورا تەييارلانغاندىن كېيىن چوڭلارغا كۈنىگە 3 قېتىم، 30 — 60 مىللىلىتىردىن ئىچۈرۈلىدۇ. بالىلار ۋە قېرى، تېنى ئاجىز كىشىلەرگە بەدەن قۇۋۋىتى ۋە يېشىغا قاراپ دورا مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ. ئەگەر قان خىلىتى غالىب كېلىپ قويۇلۇپ كەتكەن بولسا سەندەل شەرىبىتى، ئەينۇلا شەرىبىتى، شاھتەررە قاينىتىلمىسى (مەتبۇخى شاھتەررە)، سوپۇپ ئىتىرفىل قاتارلىق قاننى سۇيۇلدۇرغۇچى دورىلارنىڭ بىر خىلى ئىشلىتىلىدۇ. قان خىلىتىغا زىيادە بەلغەم خىلىتى ئارىلىشىشتىن قان سۇيۇلۇپ كەتكەن بولسا، بەلغەم خىلىتىنى پىشۇرغۇچى دورا نۇسخەلىرى ياكى خىلىت تىپى ئېنىق بولمىغان غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى پىشۇرۇشتا ئورتاقلىققا ئىگە تۆۋەندىكى مۇنزىچ نۇسخەسى ئىشلىتىلسە، ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

【تەركىبى】 بەدىيان يىلتىزى پوستى، چىڭسەي يىلتىزى پوستى، كاسىنە يىلتىزى پوستى، ئادراسمان ئۇرۇقى، رۇمبەدىيان قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرامدىن؛ كاسىنە ئۇرۇقى، ئاق لەيلى ئۇرۇقى، رەيھان ئۇرۇقى، سىيادان ئۇرۇقى، بابۇنە ئۇرۇقى، بادىرەنجىبۇيا ئۇرۇقى، ئىزخىرلەرنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ ئاقلانغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزىدىن 10 گرام.

【تەييارلاش ئۇسۇلى】 يۇقىرىقىلار ئۆلچەم بويىچە تەييارلىنىپ، يىلتىز، ئۇرۇق تۈرىدىكىلەر چالراق سوقۇلۇپ 1000 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت ئەتراپىدا چىلىنىدۇ ۋە سۇس ئوتتا 600 — 1000 مىللىلىتىر دورا سۈيى قالغۇچە قاينىتىدۇ.

لىپ، دورا تىرىپىلىرى سۈزۈۋېتىلگەندىن كېيىن، كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلدىن 200 گرام سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدى. دورا تەييارلانغاندىن كېيىن چوڭلارغا كۈنىگە 3 قېتىم، 50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچۈرۈلدى. بالىلار ۋە قېرى، تېنى ئاجىز كىشىلەرگە ئەھۋالغا قاراپ دورا مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلدى. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى ئاقكېسەلنى ئۇزاق يىللىق كلىنىكىلىق داۋالاش ئەمەلىيىتى جەريانىدا يەكۈنلەنگەن تەجرىبىلەر ۋە بىمارلار تەمىنلىگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلىنىپ، يېقىنقى 12 يىل ئىچىدە ھەر خىل تىپتىكى 993 نەپەر ئاقكېسەل بىمارى مۇنزىچ ئىچكەن كۈندىن باشلاپ (بەلغەم ۋە قان خىلىتىغا مەنسۇپ بىمارلارنىڭ ئومۇمىي بەدىنىنى كۈنىگە 1 — 2 قېتىم، 10 — 20 مىنۇتتىن، سەپرا ۋە سەۋدا خىلىتىغا مەنسۇپ بىمارلارنىڭ كېسەللەنگەن يېرىنى كۈنىگە 1 — 2 قېتىم، 5 — 10 مىنۇتتىن ئاپتاپقا قاقلاپ كۆزەتكەن ۋە سىستېمىلىق داۋالاش ئېلىپ بارغان. نەتىجىدە 111 نەپەر بىماردا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە ياخشى ئۈنۈم كۆرۈلگەن، يەنى مۇنزىچ ئىچىپ 4 — 8 كۈندە ئاق داغ ئورنىغا ئۇششاق، شالاڭ خال پەيدا بولغان. ھالبۇكى، ئاقكېسەل بىمارلىرى مۇنزىچ ئىچىشكە كىرىشكەن كۈندىن باشلاپ مۇۋاپىق ھالدا ئاپتاپقا قاقلاپ داۋالاشنى بىرلەشتۈرگەندە مەجەزنى تەڭشەپ، خىلىتلارنى پىشۇرۇشقا، توقۇلمىلارنىڭ ماددا ئالمىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى تېزلىتىشتە مۇئەييەن رول ئويناپ، تېرە خالىلىرى پەيدا بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. 【پەيدا بولغان خالىلىرى】

شۇڭا، ئاقكېسەلنى ئەمەلىي داۋالاش جەريانىدا مۇنزىچ دورىلارنى بېرىش بىلەن ئاپتاپقا قاقلاپ داۋالاشنى بىرلەشتۈرۈپ، نەتىجىسىنى يەنىمۇ ئىنچىكە كۆزىتىپ، بۇ ھەقتە تەھلىل ۋە

تەتقىقات ئېلىپ بېرىش زۆرۈر. (مەسىلەن پالەك لىقائەت)

مۇنزىچ دورىلارنى ئىشلىتىش مەجەزنى تەڭشەپ، خىلىتلارنى پىشۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ. بۇ تۆۋەندىكى جەھەتلەردە ئىپادىلىنىدۇ:

(1) كېسەللىك پەيدا قىلىشتا بىۋاسىتە مۇناسىۋىتى بولغان غەيرىي تەبىئىي ماددىلار (خىلىتلار) نىڭ بەدەن ئىچكى مۇھىتىدىكى رولىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، مەجەز تەڭپۇڭلۇقىنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ئۈچۈن شارائىت يارىتىپ بېرىدۇ؛

(2) بەدەندىكى كېسەللىك سەۋەبچىلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان زەھەرلىك ماددىلارنى چەكلەش، زەھەرسىزلىنىدۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ؛

(3) پۈتۈن بەدەن بولۇپمۇ جىگەردىكى تەبىئىي ئىسسىقلىقنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق، خام خىلىتلارنىڭ پىششىقىنى تېزلىتىدۇ؛
(4) رەئىس ئەزالار (مېڭە، يۈرەك، جىگەر) بىلەن قۇۋۋەتلىرىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇش ئارقىلىق باشقا ئەزا - توقۇلمىلارنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ؛

(5) قاندىكى چۆكمىلەرنى ئېرىتىپ تومۇرلارنىڭ راۋانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يەللەرنى تارقىتىپ توسالغۇلارنى ئاچىدۇ؛

(6) يېنىك دەرىجىدىكى سۈرۈش - ھەيدەش تەسىرى ئارقىلىق بەدەندىكى زىيادە يىغىلىپ قالغان ھۆلۈكلەرنى ئازايتىپ، خىلىتلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ، مەجەزنى تەڭشەيدۇ؛

(7) مۇسھىل (سۈرگۈچى) دورىلارنىڭ كېسەللىك ماددىلىرىنى سۈرۈپ بەدەن سىرتىغا چىقىرىۋېتىشكە شارائىت ھازىرلاپ بېرىدۇ.

مۇنزىچ بېرىش ۋاقتى بىمارنىڭ مەجەزى ۋە خىلىت ئەمەلىي

ئەھۋالغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ. چۈنكى، خىلىتلارنىڭ پىششىق مۇددىتى ئۇلارنىڭ خۇسۇسىيەت - ئالاھىدىلىكىگە بېقىپ پەرقلىق بولغاچقا، ھەر بىر خىل خىلىتقا مۇنزىچ دورىلارنى ئىشلىتىش ۋاقتىمۇ ئوخشىمايدۇ. شۇڭا، بۇنىڭدا كىتابلاردىكى ۋاقىت ئۆلچىمىگە نوقۇل ئېسىلىۋالماستىن، ھەر بىر خىلىتنىڭ خاس ياكى مۇرەككەپ خۇسۇسىيەت تىپىنى ئېنىقلاپ، ماس كېلىدىغان دورا تۈرلىرىنى بېرىشكە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بىمارلار دورا ئىچىۋاتقان مەزگىلدە بەدىنىدە ئىپادىلىنىدىغان ئالامەتلەر ئارقىلىق خىلىتلارنىڭ پىشقان - پىشمىغانلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ. ئومۇمىي بەدەن ۋە كېسەللەنگەن ئورۇندىكى ئۆزگىرىشلەرگە قاراپ مۇنزىچ ئىشلىتىش ۋاقتىنى ئۇزارتىش ياكى توختىتىشنى بەلگىلەش لازىم. مەسىلەن:

(1) غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنىڭ پىششىق ئۈچۈن 5 كۈن مۇنزىچ بېرىلىدۇ؛

(2) غەيرىي تەبىئىي بەلغەمنىڭ پىششىق ئۈچۈن 9 كۈن مۇنزىچ بېرىلىدۇ؛

(3) غەيرىي تەبىئىي سەۋدانىڭ پىششىق ئۈچۈن 15 - 40 كۈن مۇنزىچ بېرىلىدۇ؛

(4) خىلىت تىپى ئېنىق بولمىغان بىمارلارغا مۇنزىچ بېرىش ۋاقتىنى بەلگىلەشتە كېسەللىك ئەمەلىي ئەھۋالى بىلەن مۇنزىچ ئىچكەندىن كېيىنكى ئۆزگىرىش ئالامەتلەرگە قارىلىدۇ. مۇنزىچ ئىچكەن بىمارلاردىكى ماددا (خىلىت) نىڭ پىشقان - پىشمىغانلىقىنى بىلىشتە تۆۋەندىكى ئالامەتلەرگە قارىلىدۇ:

(1) خىلىت پىشقاندا بىمارنىڭ ئۇيقۇسى بىلەن ئىشتىھاسىدا كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىش كۆرۈلىدۇ؛

(2) بىمارنىڭ چوڭ - كىچىك تەرەت قېتىمى نىسبەتەن

كۆپىيىدۇ؛

(3) بىمارنىڭ بەدىنىدە قىزىغاندەك سېزىم پەيدا بولىدۇ.

لېكىن، ئۆلچىگەندە بەدەن تېمپېراتۇرىسى نورمال چىقىدۇ؛

(4) بىمارنىڭ روھىي كەيپىياتى تېتىكىلىشىپ، پۈت - قول -

لىرىغا ماغدۇر كىرگەندەك ھېس قىلىدۇ؛

(5) بەزىلەردە ئاق داغ بار ئورۇن قىچىشىش، ئايرىملاردا

ئاق داغ بار ئورۇن قىزىرىپ، ھەتتا ئاق داغ چۆرىسىدىن مەركەزىگە قاراپ كىچىكلەش، بەزىلەردە ئوخشىمىغان شەكىلدە تېرە

خالىلىرى پەيدا بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. مۇسھىل

(سۈرگە) دورا نۇسخىلىرىنى ئىشلىتىش باسقۇچىدا ئالدى بىلەن

بىمارلارنىڭ مەجەزى ۋە خىلىت تىپى بېكىتىلىپ مۇنزىچ دورىلار

بېرىلىدۇ، خىلىتلار پىشقانلىقىنىڭ بەدەن بەلگىلىرى روشەن

كۆرۈلگەندىن كېيىن، ئاندىن شۇ خىل خىلىت تىپىغا ماس

كېلىدىغان مۇسھىل دورا نۇسخىلىرى بېرىلىدۇ. خىلىتلارنىڭ

ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن مۇسھىل دورىلارنى بېرىش مۇددىتى

ۋە دورا خىللىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئۇيغۇر تىبابىتى بىمار -

لارغا مۇسھىل دورا بېرىلگەن مەزگىللەردە قايناق سۈنى كۆپرەك

ئىچىپ بېرىش، ئاسان سىڭىدىغان تاماقلار بىلەن غىزالىنىش،

ئاپتاپقا قاقلىنىشنى ۋاقتىنچە توختىتىپ تۇرۇش ۋە مۇۋاپىق

ئارام تەلىپىنى قويدۇ. ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىدە ئىشلىتىلىدىغان

مۇسھىل (سۈرگە) دورا نۇسخىلىرىنىڭ خىللىرى بىرقەدەر

كۆپ بولۇپ، تۆۋەندە قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخا -

نسى تېرە تاشقى كېسەللىكلەر بۆلۈمى يېقىنقى 20 نەچچە يىل -

دىن بۇيان ئاڭكېسەلنى كلىنىكىلىق داۋالاشتا ئىزچىل تۈردە

ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان بىر قىسىم مۇسھىل دورا نۇسخىلىرىنى

نۇقتىلىق تونۇشتۇرىمىز.

(1) غەيرىي تەبىئىي بەلغەمنى مۇسھىل قىلىش (سۈرۈش)

ئۈچۈن ئۈستقۇددۇس، پىرسىياۋشان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، گۈل بىنەپشەلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 30 گرامدىن؛ سانائى مەككى (مەككە ساناسى)دىن 45 گرام، يانتاقشېكىرىدىن 60 گرام، ئىنجۈر قېقىدىن 250 گرام، ناۋاتتىن 40 گرام تەييارلىنىپ، يانتاقشېكىرى ۋە سانائى مەككىدىن باشقىلىرى پاكىز تازىلىنىپ تەلەپكە لايىقلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن، 1200 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇلىدۇ، ئاندىن پەس ئوتتا قاينىتىلىپ، قايناۋاتقان دورا سۈيىدىن ئىككى قاچىغا بەلگىلىك مىقداردا ئېلىنىدۇ ۋە يانتاقشېكىرى، سانائى مەككى ئايرىم - ئايرىم چىلىنىدۇ. يانتاقشېكىرى ئېرىپ بولغاندا سەل تىندۈرۈلۈپ، ھەر ئىككىسى قايناۋاتقان دورا ئۈستىگە تۆكۈلىدۇ ھەمدە سۈيى 800 مىللىلىتىر قالغۇچە قاينىتىلىپ، تىرىپلىرى داكا ياكى خام بىلەن سۈزۈۋېتىلىپ، دورا سۈيىگە ناۋات سېلىنىپ ئېرىتىلىدۇ. مۇشۇ يوسۇندا تەييارلانغان دورا سوۋۇتۇلۇپ، چوڭلارغا كۈنىگە 3 قېتىم، 70 — 150 مىللىلىتىردىن بېرىلىدۇ.

(2) غەيرىي تەبىئىي سەپرانى مۇسھىل قىلىش (سۈرۈش) ئۈچۈن سېرىق ھېلىلە پوستى، تەمرى ھىندى، سانائى مەككى (مەككە ساناسى)، ئەنگۈرى شىپا (ئىتتۇزۇمى) نىڭ ھەر بىرىدىن 30 گرامدىن؛ يالىپۇز، قىزىلگۈلنىڭ ھەر بىرىدىن 12 گرامدىن؛ كاسىنە ئۇرۇقى، چىلان، گۈل بىنەپشە، ئەپتىمۇن ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 9 گرامدىن؛ يانتاقشېكىرىدىن 120 گرام تەييارلىنىپ، يانتاقشېكىرى ۋە قىزىلگۈلدىن باشقىلىرى تازىلىنىپ تەلەپكە لايىقلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن 800 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلىنىپ، پەس ئوتتا قاينىتىلىدۇ. قايناۋاتقان دورا سۈيىدىن ئايرىم قاچىغا ئازراق ئېلىنىپ، يانتاقشېكىرى ئېرىتىلىدۇ، ئاندىن بىر ئاز تىندۈرۈلۈپ قايناۋاتقان دورا ئۈستىگە قىزىلگۈل بىلەن يانتاقشېكىرى «ئېرىتمىسى»

تۆكۈلىدۇ ۋە بىرلا قاينىتىلىپ قالدۇقلار داكا ياكى خام بىلەن سوزۇۋېتىلىدۇ. نەتىجىدە 500 مىللىلىتىر ئەتراپىدا دورا سۈيى قالىدۇ. تەييارلانغان دورا سوۋۇغاندىن كېيىن چوڭلارغا كۈ-نىگە 2 — 3 قېتىم، 60 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(3) غەيرىي تەبىئىي سەۋدانى مۇسەھىل قىلىش ئۈچۈن ئۈستقۇددۇس، شاھتەررە، پىرسىياۋشان، بەدىيانلارنىڭ ھەربى-رىدىن 24 گرامدىن؛ ئەپتىمۇن، سانائى مەككى، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، گاۋزىبان، بادىرەنجىبۇيالارنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرام-دىن؛ خىيارشەمبەردىن 20 گرام، يانتاقشېكىرىدىن 60 گرام، گۈلقەنتتىن 250 گرام تەييارلىنىپ، يانتاقشېكىرى، سانا، ئەپتىمۇندىن باشقىلىرى تازىلىنىپ تەلەپكە لايىقلاشتۇرۇلغان-دىن كېيىن، 1100 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلىد-نىپ، پەس ئوتتا قاينىتىلىدۇ، قاچىغا قاينىغان دورا سۈيىدىن ئازراق ئېلىنىپ يانتاقشېكىرى ئېرتىلىدۇ، ئاندىن سەل تىندۇ-رۇلۇپ، قايناۋاتقان دورا ئۈستىگە سانا، ئەپتىمۇن سېلىنىپ ۋە يانتاقشېكىرى «ئېرتىمىسى» تۆكۈلۈپ بىرلا قاينىتىلىدۇ ھەمدە داكا ياكى خام بىلەن تىرىپىلىرى سۈزۈۋېتىلىدۇ. بۇ جەرياندا 700 مىللىلىتىر ئەتراپىدا دورا سۈيى قالىدۇ. ئۇنىڭغا گۈلقەنت سېلىنىپ ئېرتىلگەندىن كېيىن سوۋۇتۇلۇپ، چوڭلارغا كۈنىگە 3 قېتىم، 50 — 120 مىللىلىتىردىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(4) قان خىلتىغا ئارىلاشقان غەيرىي تەبىئىي بەلغەم (مۇس-ھىلى بەلغەم خۇنى بەرەس) نى مۇسەھىل قىلىش ئۈچۈن ئامىلەمۇ-قەششەر، بەلىلە پوستى، زەنجىۋىل، شەھمى ھەنزەلىنىڭ ھەربى-رىدىن 30 گرامدىن؛ سىياداندىن 60 گرام، كابۇل ھېلىلىسى پوستىدىن 80 گرام، تۈربۇت پوستىدىن 100 گرام، ھەسەلدىن 750 گرام تەييارلىنىپ، قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلىدۇ، قال-

غان دورىلار تازىلىنىپ تەلەپكە لايىقلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن 1200 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلاپ قويۇلۇپ، پەس ئوتتا 800 مىللىلىتىر قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن داكا ياكى خام بىلەن تىرىپىلىرى سۈزۈۋېتىلىپ، دورا سۈيگە ھەسەل سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ۋە پەس ئوتتا يەنە بىر قېتىم قاينىتىلىدۇ. تەييارلانغان بۇ دورا سىرلىق قاچىدا سوۋۇتۇلۇپ، چوڭلارغا كۈنگە 2 — 3 قېتىم، 60 — 150 مىللىلىتىردىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ، كىچىك بالىلار ۋە قېرى، تېنى ئاجىز كىشىلەرگە مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

5) قان خىلىتىغا ئارىلاشقان غەيرىي تەبىئىي سەۋدا، سەپرا (مۇسھىلى سەۋدا، سەپرايى بەرەس) نى مۇسھىل قىلىش ئۈچۈن بەدىيان، شاھتەررە، كاسىنە ئۇرۇقى، رۇمبەدىيان، سانائى مەككى (مەككە ساناسى) نىڭ ھەربىرىدىن 8 گرامدىن؛ بادەرە، جىبۇيا، قىزىلگۈل، ئەپسەنتىن، گاۋزىبان، ھەشقىپچەك ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن 9 گرامدىن؛ چىلان، ئۈستقۇددۇسىنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن؛ كۈدە ئۇرۇقىدىن 40 گرام، غەينۇللىدىن 15 گرام، سوقمۇنىيادىن 5 گرام، گۈل بىنەپشىدىن 13 گرام، سېرىق ھېلىلە پوستىدىن 27 گرام، يانتاقشېكىرىدىن 150 گرام تەييارلىنىپ، سوقمۇنىيا، يانتاقشېكىرى ۋە قىزىلگۈلدىن باشقىلىرى تەلەپكە لايىق تازىلانغاندىن كېيىن، 1000 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ، ئاندىن پەس ئوتتا قاينىتىلىپ، قايناۋاتقان دورا سۈيىدىن ئايرىم قاچىغا ئازراق ئېلىنىپ يانتاقشېكىرى ئېرىتىلىدۇ، بىرئاز تىندۇرۇلغاندىن كېيىن قايناۋاتقان دورا ئۈستىگە قىزىلگۈل ۋە يانتاقشېكىرى «ئېرىتمىسى» تۆكۈلۈپ يەنە ئازراق قاينىتىلىدۇ ھەمدە داكا ياكى خام بىلەن تىرىپىلىرى سۈزۈۋېتىلىدۇ. نەتىجىدە 700 مىللىلىتىر ئەتراپىدا دورا سۈيى قالىدۇ. بۇ دورا سىرلىق قاچىدا

سوۋۇتۇلۇپ، چوڭلارغا كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 15 — 50 مىللىتىردىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

يۇقىرىقى ئىككى خىل مۇسھىل (مۇسھىلى بەلغەم خۇنى بەرەس) بىلەن (مۇسھىلى سەۋدا، سەپراۋى بەرەس) نۇسخىسىنى قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى تېرە كېسەللىكلىرى بۆلۈمى 1990 - يىلىدىن 2002 - يىلىغىچە كلىنىكىدا ئىزچىل ئىشلىتىپ كەلگەن. ئۇ سىناقىتىن ئۆتكەن مۇرەككەپ قايناتما دورا رېتسېپى بولۇپ، ياخشى ئۈنۈم كۆرۈلدى، ئەكس تەسىرى بايقالمىدى.

مۇسھىل دورىلار تۆۋەندىكىدەك ئۈنۈمگە ئىگە:

(1) سۈيىدۈكنى ھەيدەش ۋە ئىچنى سۈرۈشتەك تەسىرلىرى بىلەن، كېسەللىك پەيدا قىلىشتا بىۋاسىتە رول ئوينايدىغان غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشلاپ ئورگانىزمنى پاكلاشتۇرىدۇ؛

(2) بەدەندىكى زىيادە نەملىكنى كېمەيتىپ، ھەرقايسى ئەزا-توقۇلمىلارنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، چوڭ - كىچىك قان تومۇرلارنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەزا، تومۇرلارنىڭ ئوزۇقلۇقلار بىلەن تەمىنلىنىشىنى ياخشىلايدۇ؛

(3) بەدەندە تۇرۇپ قالغان يەللەرنى تارقىتىش بىلەن تەبىئىي ھارارەتنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ ۋە قاننى جانلاندۇرىدۇ؛

(4) ئەزا - توقۇلمىلاردىكى قۇۋۋەتلەرنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بەدەن ئىچكى مۇھىتىنىڭ نىسپىي تەڭ-پۇڭلۇقىنى ساقلاشقا شارائىت يارىتىدۇ.

مۇسھىل (سۈرگە) دورىلارنى بېرىش ۋاقتى ھەر بىر كىشىنىڭ مەجەزى، خىلىت تىپى، يېشى، جىنسى، بەدەن قۇۋۋىتى ۋە پەسىل قاتارلىق كونكرېت ئەھۋاللارغا قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ. مەسىلەن:

بەدنى كۈچلۈك، بەلغەم مېجەزلىك ياكى قان خىلىتلىق بىمارلارغا 2 — 5 كۈن ئەتراپىدا؛ سەپرا ياكى سەۋدا مېجەزلىك بىمارلارغا كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ 1 — 20 كۈنىگىچە يەڭ-گىل، ئوتتۇرا ھال ياكى كۈچلۈك سۈرگە دورىلىرى بېرىلىدۇ. سۈرگە دورىلىرىنى ئىمكانقەدەر ئەتىگەندە تاماقتىن بۇرۇن ياكى غىزالىنىپ ئىككى سائەت ئۆتكەندە ئىشلىتىش لازىم. ئەگەر بىمارنى تەكشۈرگەندە كېسەللىك ماددىسى كۆيگەن سەۋدا خىلىتلىق ئىكەنلىكى بايقالسا، سەۋدا خىلىتىنىڭ مۇنزىچ ۋە مۇسھىل نۇسخىلىرىنى كېسەللىك ماددىسى تىزگىنلەنگەن قەدەر بېرىش تەلەپ قىلىنىدۇ.

مۇسھىل (سۈرگە) دورىلار بىلەن بەدەننىڭ تازىلانغانلىقىنى تۆۋەندىكى بەلگىلەرگە قاراپ بىلىشكە بولىدۇ: بىمار مۇسھىل (سۈرگە) دورىلىرىنى ئىچىپ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە مۇنزىچ دورىلارنى ئىچكەندە كۆرۈلگەن ماددا پىشقانلىق ئالامەتلىرى تېخىمۇ روشەن ئىپادىلەنگەندىن باشقا، بەدەندىكى ھەربىر خىلىتقا تەۋە تەبىئىي بەلگىلەر، مەسىلەن چىراي، كۆز ئېقى، تىل ئۈستىدىكى ئۆزگىرىش (رەڭگى قانداق، گەز باغلىدەيمۇ - يوق قاتارلىق) لەر، تەمنى سېزىش ئەھۋالى، تومۇرنىڭ سوقۇشى، سۈيدۈك رەڭگى، روھىي ھالىتى، ئىشتىھاسى، ئۈي-قۇسى قاتارلىقلار ئۇنىڭ ئەسلىدىكى نورمال خىلىت تىپىدىكى ۋاقىتغا تامامەن ياكى ئاساسەن ئۇيغۇنلاشقان بولسا بەدنى تازىلانغان بولىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابىتىدە ئىشلىتىلىدىغان مۇسھىل (سۈرگە) دورىلىرىنىڭ خىللىرى بىرقەدەر كۆپ بولۇپ، ئومۇمىي بەدەن ياكى مەلۇم ئەزالارنى تازىلاش مەقسىتىدە تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ. ئۇلار تەسىر قىلىش جەھەتتىكى خۇسۇسىيىتىگە قاراپ كۈچلۈك سۈرگە دورىلىرى، ئوتتۇرا ھال سۈرگە دورىلىرى ۋە يەڭگىل

سۈرگۈچى دورىلار دەپ ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىدۇ. شۇڭا، بۇ خىل دورىلارنى ئىشلەتكەندە بىمارنىڭ مىجەزى (خىلىت ئەھۋالى)، بەدەن قۇۋۋىتى، ياش قۇرامى، جىنسى، ئەگەشمە كېسەللىكلەرى، پەسىل ۋە ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارى قاتارلىقلارغا قاراپ تۈرى ۋە دورا مىقدارىنى بەلگىلەپ ئىشلىتىش كېرەك. بەلغەم خىلىتلىق بىمارلارغا كۆپىنچە كۈچلۈكرەك سۈرگە دورىسى بەرگەندىن باشقا، قالغان خىلىتتىكى بىمارلارغا ئوتتۇرا ھال ياكى يەڭگىل سۈرىدىغان سۈرگە دورىلىرى بېرىلىدۇ. بىمارلارغا بەزى ھاللاردا مۇنزىچ دورىلارنى بەرمەيلا سۈرگە دورىلىرىنى بېرىپ، بەدەننى بىر قېتىم تازىلىغاندىن كېيىن، ئاندىن ئاساسلىق دورىلارنى بېرىپ داۋالسىمۇ ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. بۇنىڭدا ئاساسلىقى بەلغەم، قان مىجەزلىك بىمارلارغا چالاپا گۈلقەنت، قۇرسى ئىيارەنجى پەرقىيانى؛ سەپرا، سەۋدا مىجەزلىك بىمارلارغا ھەببى مۇنزىچ، قۇرسى ئوقيا، ئىتىرفىل سانا قاتارلىق دورىلارنىڭ بىر خىلى تاللىنىپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

مۇسھىل (سۈرگە) دورىلىرىنى بېرىشكە بولمايدىغانلار تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

- (1) سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىك بىلەن ئۇزاقتىن بېرى داۋاللىنىۋاتقانلار ياكى داۋاللىنىپ قىسمەن ياخشىلانغانلار، مەسىلەن تۈبېركۇلىوز كېسەللىكلىرى، ئۈچەي يارىلىرى، ئاياللار كېسەللىكلىرى، جىگەر، ئاشقازان ياللۇغلىرى، قان ئازلىق، قالدانسىمان بەز خىزمىتى توسالغۇغا ئۇچراش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر ۋە دىئابت كېسەلى بارلار؛
- (2) يېشى چوڭ، تېنى ئاجىز كىشىلەر، كىچىك بالىلار، ھامىلىدار ۋە ھەيزدار ئاياللار، ئۈچەي توسۇلۇش كېسەلى بار ۋە قان بېسىمى نورمالسىز كىشىلەرگە سۈرگە دورىلىرىنى بېرىش.

رىشكە بولمايدۇ؛

(3) يۈرەك كېسەللىكلىرى ۋە ئۆسمە كېسەللىكى بىلەن ئاغرىغانلارغا تومۇزنىڭ ئىسسىق كۈنلىرىدە سۈرگە دورىلىرىنى ئىشلەتمەسلىك ياكى ئېھتىياتچانلىق بىلەن يەڭگىل سۈرگە دورىلىرىنى تاللاپ ئىشلىتىش لازىم.

4. خاس دورىلار بىلەن قۇۋۋەت دورىلىرىنى بىرلىكتە ئىشلىتىپ داۋالاش

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاشتىكى ئۇزاق يىللىق ئەمەلىي تەجرىبىلىرى ئىسپاتلىدىكى، خاس دورىلار بىلەن بەدەننى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەتكەندە كۆرۈنەرلىك ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرگىلى بولۇپلا قالماستىن، داۋالىنىش جەريانىدا يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى بولغان ئەگەشمە كېسەللىكلەر (مەسىلەن ئىشتىھاسى تۈتۈلۈش، ئاشقازان - ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىشى ياخشى بولماسلىق، ئۇيقۇسى كېمىيىش ياكى كۆپ ئۇخلاش، يۈرەك قوزغىلىش، باش ئاغرىش، ئەرلەردە ئېھتىلام بولۇش قاتارلىقلار) نىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە بىرقانچە باسقۇچ ئۈزەي داۋالىغاندىمۇ ئىچكى ئورگانىزىملارنىڭ بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، مەجەز تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاش ۋە بەدەننىڭ كېسەللىك ئۈستىدىن غالىب كېلىشى ئۈچۈن نىسپىي تۇراقلىققا ئىگە بولغان بەدەن ئىچكى مۇھىتىنى يارىتىش-تا مۇھىم ئەھمىيىتى بار. ئۇ يەنە تېرە رەڭلىرىنىڭ پەيدا بولۇشىنى تېزلىتىشكە پايدىلىق بولغان دورىلار ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلىگۈچى دورا خىللىرىنى شۇنىڭدەك ئوزۇقلۇقلارنى بىمارنىڭ مەجەزى، خىلىت تېپى، يېشى قاتارلىقلارغا ماسلاشتۇرۇشنى

ئاجىز، قېرى كىشىلەرگە ئەھۋالغا قاراپ دورا مىقدارى كېمەي-
تىپ بېرىلىدۇ (بۇ دورا بەلغەم ۋە قان مىجەزلىك كىشىلەرگە
مۇۋاپىق كېلىدۇ).

مەجۇنى كالىي زىرە

بۇ دورىنى چوڭلار دەسلەپكى 4 — 7 كۈندە كۈنىگە 2 —
3 قېتىم، 10 گرامدىن ئىچىدۇ. بىر ھەپتىدىن كېيىن مىقداردا-
نى كۆپەيتىپ ھەر قېتىمدا 15 — 25 گرامدىن ئىچسە بولىدۇ.
بالىلار ۋە تېنى ئاجىز كىشىلەرگە مىقدارىنى مۇۋاپىق كېمەيتىپ
بېرىش تەلپ قىلىنىدۇ (بۇ دورا سەۋدا ۋە سەپرا مىجەزلىك
كىشىلەرگە، بولۇپمۇ ئاشقازان ئۈچمەي يولى كېسەللىكلىرى بار
بىمارلارغا بەكمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ).

قورى كالىي زىرە

بۇ دورىنى چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 5 — 7
گرامدىن تاماقتىن كېيىن ئىچسە بولىدۇ. بالىلار ۋە يېشى
چوڭ، تېنى ئاجىز كىشىلەرگە ئەھۋالغا قاراپ مىقدارىنى كېمەي-
تىپ ئىشلەتسە بولىدۇ (تەبىئىي ھەببى كالىي زىرە بىلەن
ئوخشاش).

كالىي زىرە ئوكۇلى

بۇ دورا چوڭلارغا كۈنىگە 1 — 2 قېتىم، 2 — 4
مىللىلىتىردىن مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. بالىلارغا يېشىغا
قاراپ مىقدارى كېمەيتىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

2. كەرۋىيا ياسالمىلىرى

مەجۇنى كەرۋىيا

بۇ دورا چوڭلارغا كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 10 گرامدىن
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. دورا ئىچىشنى بىر ھەپتە داۋاملاشتۇرغاندىن
كېيىن، ئەھۋالغا قاراپ ھەر قېتىمدا 15 — 25 گرامدىن ئىچسە

بولدۇ. بالىلارغا دورا مىقدارى مۇۋاپىق كېمەيتىپ ئىشلىتىلدى.
دۇ (بۇ دورا سەپرا، سەۋدا مېجەزلىك كىشىلەرگە مۇۋاپىق
كېلىدۇ).

ھەببى كەرۋىيا

بۇ دورىنى چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، تاماقتىن كېيىن
4 — 6 گرامدىن ئىچسە بولىدۇ، بىر ھەپتە داۋاملاشتۇرغاندىن
كېيىن دورا مىقدارىنى كۆپەيتىپ (8 — 10 گرامغا يەتكۈزۈپ)
ئىچسە بولىدۇ. بالىلارغا ۋە قېرى، تېنى ئاجىز كىشىلەرگە
ئەھۋالغا قاراپ دورا مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ (بۇ دورا
بىلغەم، قان مېجەزلىك كىشىلەرگە مۇۋاپىق كېلىدۇ).

كەرۋىيا دانچىسى (كەرۋىيا جوڭجى)

بۇ دورىنى چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 4 — 6 گرامدىن
ئىچسە بولىدۇ، 5 كۈن داۋاملاشتۇرغاندىن كېيىن دورا مىقدارى
نى كۆپەيتىپ (10 گرامدىن) ئىچسە بولىدۇ. بالىلارغا ۋە
قېرى، تېنى ئاجىز كىشىلەرگە دورا مىقدارى ئەھۋالغا قاراپ
كېمەيتىپ بېرىلىدۇ (بۇ دورىنى ھەرقانداق مېجەزدىكى كىشى
لەرگە ئىشلىتىشكە بولىدۇ).

كەرۋىيا ئوكۇلى

بۇ دورا چوڭلارغا كۈنىگە 1 قېتىم، 2 — 4 مىللىلىتىردىن
مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ دورا مىقدار
رىنى مۇۋاپىق بەلگىلەپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

3. بايىچى ياسالمايلىرى (جىنكېۋىزى ئۇرۇقى تۈ-

رىدىكى ياسالمايلىرى)

مەجۈنى بايىچى

بۇ دورا چوڭلارغا كۈنىگە 2 قېتىم، 5 — 10 گرامدىن
تاماقتىن كېيىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. كىچىك بالىلارغا دورا

9. سۇيۇپ خولسېنجان

بۇ دورىنى ھەرقانداق خىلىت تىپىدىكى بىمارلار ئەھۋالغا ناراپ ئۇسسۇلۇق ئورنىدا چاي دەملەپ ئىچسە ياكى كېسەللەنگەن ئورۇننى يۇيۇش ئۈچۈن ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. يۇقىرىقىلاردىن سىرت يەنە ئاقكېسەلنى داۋالاشتا كەم بولسا بولمايدىغان دورا تۈرلىرىدىن قۇرى بەرەس نۇسخىلىرى، مەجۇنى بەرەسنىڭ بىرقانچە تۈرلىرى، خارخەسەك دەملەمىسى، ئىپار ئوكۇلى، زەپەر ئوكۇلى، مەجۇنى چۆپچىنى ئىتىرىفل كەبىر، مەجۇنى سۇم ۋە بىر قىسىم سىرتتىن ئىشلىتىدىغان دورا خىللىرى قاتارلىقلار بار.

ئاقكېسەلنى داۋالاشتا قوشۇپ ئىشلىتىلىدىغان بەدەننى قۇۋ-ۋەتلىگۈچى دورىلاردىن مەجۇنى ماددە تۈلھايات (ھەبىي ماددە تۈل-ھاياتنىڭ تەسىرىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش) چوڭلارغا كۈنىگە 2 قېتىم، 5 — 10 گرامدىن بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارىنى كېمەيتىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ؛ مەجۇنى سۆللەپ (ھەبىي سۆۋ-لەپ بولسىمۇ بولىدۇ) نى چوڭلارغا كۈنىگە 2 قېتىم 3 — 5 گرامدىن، بالىلارغا يېشىغا قاراپ دورا مىقدارى كېمەيتىلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

بۇنىڭدىن باشقا مەجۇنى مەسھا، مەجۇنى زەرئۇنى شەرىپىتى ئەۋرىشىم قاتارلىق دورىلارنىمۇ بىمارنىڭ مىجەزى، خىلىت تىپى، يېشى ۋە شۇ ۋاقىتتىكى كونكرېت ئەمەلىي ئەھۋالغا ئاساسەن تاللاپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

بۇ يەردە شۇنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتۈشكە ئەرزىيدۇكى، ئاقكېسەلنى خاس داۋالايدىغان خاس دورىلارغا مۇۋاپىق ئاساستا (بىمارنىڭ مىجەزى، خىلىت تىپى، داۋالىنىۋاتقان پەسلى قاتارلىق-لارنى كۆزدە تۇتۇپ) بىر قىسىم قوشۇمچە دورىلارنى (مەسىلەن

بەلغەم مەجەزلىك بىمارلارغا مەجۈنى جاۋارش كومۇنى، مەجۈنى ئىتىرفىل كەبىر ھەبىي جەدۋار، داۋائىلمىشكى ھار، مائول ھەسەل مۇرەككەپ؛ سەپرا - سەۋدا، قان مەجەزلىك ۋە ئارىلاشما (مۇرەككەپ) مەجەز تىپىدىكى بىمارلارغا قىزىل گۈلقەنت، ئا- نار شەرىبىتى، بېھى شەرىبىتى، ئامىلە نۆشۈدۈرا، خېمىرى گاۋ- زىبان، خېمىرى مەرۋايىت، داۋائىلمىشكى شېرىن، مائول ھە- سەل ساددە قاتارلىق دورىلارنىڭ بىر ياكى ئىككى خىلىنى بىر- لەشتۈرۈپ ئىشلەتكەندە ساقىيىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، داۋالىنىش مۇددىتىنى قىسقارتىش ۋە بىمارلارنىڭ مەجەز تەڭ- پۇڭلۇق ھالىتىنى ئۇزاقراق تۇراقلاشتۇرۇش، داۋالاش جەريانى- دىكى ئەگەشمە كېسەللىك ئۆزگىرىشى (مەسىلەن باش ئاغرىش، يۈرەك قوزغىلىش، ئىچى سىقىلىپ ئۇيقۇسى قېچىش، ئىشتىھا- سى كىمىيىش قاتارلىقلار) نىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالىنىش باس- قۇچىغا تولۇق كاپالەتلىك قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە بەلگىلىك ئۈنۈمى بولىدىغانلىقى ئۇزاق يىللىق كلىنىكىلىق داۋالاش ئەمە- لىيىتىدە ئىسپاتلانغان. شۇڭا، بىمارلار دورا ئىشلەتكەندە بۇ نۇقتىغىمۇ ئەھمىيەت بېرىشى زۆرۈر.

5. دورا ئىچۈرۈش بىلەن كۈن نۇرىغا

قاقلاننى بىرلەشتۈرۈپ داۋالاش

ئاقكېسەلنى داۋالاشتا دورا ئىچۈرۈش بىلەن كۈن نۇرىغا قاقلاننى بىرلەشتۈرۈپ قوللىنىش ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ ئۆزگىچە تەدبىرلىرىنىڭ بىرى. بۇنىڭدا كۈن نۇرىغا قاقلان ئاقكېسەلنى داۋالاشتىكى مۇھىم ئۇسۇل ھېسابلىنىدۇ. پەن - تېخنىكا ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىپ دۇنيادا كۈندە

دېگۈدەك يېڭىلىقلار مەيدانغا كېلىۋاتقان، جۈملىدىن مېدىتسىنا ئىلمى ساھەسىدىمۇ ئالەمشۇمۇل ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىپ نۇر-غۇن قىيىن مەسىلىلەر ھەل بولۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، ئاڭكې-سەلنى دورا ئىچۈرۈپ ۋە سىرتىدىن دورا سۈركەپ داۋالاشنىڭ يۈزدەيۈز ئىشەنچلىك دورىسى كەشىپ قىلىنىمىغان ئەھۋالدا، دورا ئىشلىتىش بىلەن كۈن نۇرىغا قاقلاشنى بىرلەشتۈرۈش ئۇسۇلى بۇ خىل كېسەللىكنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈمنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتە يەنىلا مۇھىم رول ئوينايدۇ.

شىنجاڭنىڭ جۇغراپىيىلىك ئەھۋالىغا ئاساسلانغاندا، ئاڭكېسەلنى كۈن نۇرىغا قاقلاپ داۋالاشقا 5 - ئايدىن 10 - ئايغىچە بولغان ۋاقىت نىسبەتەن مۇۋاپىق كېلىدۇ. لېكىن، ئاپتاپقا قاقلىغاندا تېرىنىڭ كۈن نۇرىغا بولغان سەزگۈرلۈكىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش، بولۇپمۇ كىچىك بالىلارنىڭ تېرىسىنىڭ كۈچ-لۈك كۈن نۇرىدا زەخمىلىنىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

ئاپتاپقا قاقلىنىشتا قورساق توق بولۇش، يېتەرلىك مىقداردا ئۇسسۇلۇق تەييارلىۋېلىش، ھەر بىر ئادەمنىڭ مىجەزى، خىلىت تىپى، ياش قۇرامى، كەسپى، بەدەن قۇۋۋىتىنى نەزەرگە ئالغان ھالدا، تۇرۇش ۋاقتىنى مۇۋاپىق بەلگىلەش، كېسەللىك ئورنىنى كۈن نۇرىغا ئۇدۇل توغرىلاش، چىدامچانلىق بىلەن قاقلىنىش قاتارلىقلارغا ھەقىقىي ئەھمىيەت بەرگەندە داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى ھەقىقەتەن ياخشى بولىدۇ. ئەمما، ئاڭكېسەل بولسىلا ئاپتاپقا قاقلىنىۋەرسىمۇ ياخشى داۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى بولمايدۇ.

ئۇزاق يىللىق ئەمەلىي داۋالاش جەريانىدا يەكۈنلەنگەن تەج-ربىلەرگە ئاساسەن يېقىنقى 15 يىلدىن بۇيان 3076 نەپەر ئاڭكېسەل بىمارىنى مىجەز ۋە خىلىت تىپى بويىچە ئايرىپ، ئاپتاپقا قاقلاش ۋاقتىنى مۇۋاپىق بەلگىلەپ بىرقەدەر سىستېمى-

لىقراق كۆزەتكىنىمىزدە، كېيىنكى ئۈنۈم ئالدىنقى مەزگىللەر-
دىكىگە قارىغاندا كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغانلىقى ئىسپاتلاندى.
مەسىلەن:

بەلغەم، قان مېجەز تىپىدىكى بىمارلارنى دورا ئىچىشكە
باشلىغان كۈندىن باشلاپ كۈنگە 1 — 2 قېتىم، 15 — 30
مىنۇتتىن ئاپتاپقا قاقلاپ بىر ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن ۋاقتىنى
1 سائەتكە، بىر ئايدىن كېيىن 2 — 3 سائەتكە ئۇزارتقاندا،
ئاپتاپتا تۇرۇش ۋاقتى ئۇزارغانسېرى ئاپتاپقا قاقلىنىش قېتىم
سانىمۇ مۇناسىپ كۆپەيتىلىپ، كۈنگە 2 — 4 قېتىمغا يەتكۈ-
زۈلگەن، ئىككى ئايدىن كۆپرەك داۋالانغانلارنىڭ كۈنلۈك ئاپتاپقا
قاقلىنىش ۋاقتى 5 سائەتتىن ئېشىپ كەتمىگەن. بۇ خىل مېجەز
تىپىدىكى بىمارلار دەسلەپكى ئىككى ھەپتەدە پۈتۈن بەدىنىنى
ئاپتاپقا قاقلىغان بولسا، كېيىن كېسەللەنگەن ئورۇننىلا ئاپتاپقا
قاقلاش بىلەن چەكلەندى.

سەپرا، سەۋدا مېجەز تىپىدىكى بىمارلار دورا ئىچكەندىن
باشلاپ دەسلەپتە كۈنگە 1 — 2 قېتىم، 5 — 10 مىنۇتتىن
10 كۈنگىچە ئاپتاپقا قاقلاندى. كېيىن، قاقلىنىش ۋاقتىنى 20
كۈنگە ئۇزارتىپ كۈنگە 20 — 30 مىنۇتتىن سىجىل داۋاملاشتۇر-
تۇردى. شۇ تەرىقىدە تاكى كېسەللىك ساقايغانغا قەدەر كۈنلۈك
ئاپتاپقا قاقلىنىش ۋاقتىنى كۆپ بولغاندىمۇ 2 — 3 سائەتتىن
ئاشۇرماي داۋاملاشتۇردى. بۇ خىل مېجەز تىپىدىكى بىمارلارنى
ئاپتاپقا قاقلاشتا دەسلەپكى 8 كۈن پۈتۈن بەدەننى، ئاندىن كې-
سەللەنگەن ئورۇننى قاقلاش ئاساس قىلىندى.

بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ نەتىجىسىنى خۇلاسەلىگەندە-
مىزدە، ئالدىنقى مەزگىللەردە مېجەز تىپىغا ئانچە ئېتىبار قىل-
ماي ئاپتاپقا قاقلىنىپ داۋالانغانلارنىڭ كۆرگەن ئۈنۈمى تۆۋەن-
رەك بولغان، يەنى مېجەز تىپى بويىچە ئاپتاپقا قاقلىنىش ۋاقتى-

نى بەلگىلەپ داۋالىغاندا تولۇق ساقىيىش نىسبىتى %2، كۆرۈ-
نەرلىك ئۈنۈم بېرىش نىسبىتى %3، ئادەتتىكىچە ئۈنۈم بېرىشى
%1 تىن يۇقىرى بولغان. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىش مۇمكىنكى،
ئاقكېسەلنى ئاپتاپقا قاقلاپ داۋالىغاندا قاقلىنىش ۋاقتىنى مە-
جەز، خىلىت تىپى بويىچە بەلگىلەش ئىنتايىن مۇھىم ئىكەنلىكى
داۋالاشنىڭ ئەمەلىي مىساللىرىدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.

ئاقكېسەلنى ئاپتاپقا قاقلاپ داۋالاش بولسا، ئۇيغۇر تىبابەت-
چىلىكىنىڭ كېسەللىكنىڭ ساقىيىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈ-
رۈش، داۋالاش مۇددىتىنى قىسقارتىشنىكى ئالاھىدە قوشۇمچە
تەدبىرى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى ئۆزگىچە بىر خىل ئۇسۇل-
دۇر. بىمارلارنى ئاپتاپقا قاقلاشتىن بۇرۇن ئۇلارنىڭ مەجەزى،
خىلىت تىپى، يېشى، رەڭگىرىيى، ئۆسۈپ يېتىلگەن جۇغراپى-
يىلىك مۇھىتى، بەدەن قۇۋۋىتى، شۇغۇللىنىدىغان كەسپى قا-
تارلىقلارنى نەزەرگە ئېلىش بىلەن بىرگە رەئىس ئەزالار (مېڭە،
يۈرەك، جىگەر) نىڭ خىزمەت ئىقتىدارىغىمۇ دىققەت قىلىش
كېرەك. بۇنىڭدىن مەقسەت بىمار تېرىسىنىڭ كۈن نۇرىغا قارىتا
سېزىمچانلىق (تەسلىنىش) دەرىجىسى (بۇ، تېز، ئوتتۇرا-
ھال، ئاستا دەپ ئايرىلىدۇ) نى ئايرىش ھەم كۆزىتىش ئارقىلىق
شۇنىڭغا مۇناسىپ كېلىدىغان ئاپتاپقا قاقلاش ئۇسۇلى ۋە ۋاقتىنى
بېكىتىشتىن ئىبارەت.

تېرىسىنىڭ كۈن نۇرىغا قارىتا سېزىمچانلىقى تېز بولغانلار-
نىڭ ئاپتاپقا قاقلىنىش قېتىم سانىنى كۆپەيتىپ، ئاپتاپتا تۈ-
رۈش ۋاقتىنى قىسقارتىش ياكى چۈشتىن بۇرۇن شىنجاڭ ۋاقتى
سائەت 9 يېرىمدىن 10 يېرىمىغىچە، چۈشتىن كېيىن 4 يېرىمدىن
5 يېرىمىغىچە قىلىپ بەلگىلەپ، كۈن نۇرىنىڭ ھارارىتى نىسبە-
تەن تۆۋەنرەك ۋاقىتتا قاقلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك. بۇنداق
بىمارلارنى كۈن نۇرىغا قاقلىغاندا ئىنچىكە كۆزىتىش ئېلىپ

بېرىلمىسا، قىسمەن كىشىلەردە تېرە سېزىمچانلىقى ئېشىپ كې-
تىش سەۋەبلىك ئاق داغ كېڭىيىپ كېتىشتەك ئەھۋاللار كېلىپ
چىقىدۇ. شۇڭا، ئاپتاپ رېئاكسىيە قىلغانلىقى ئىسپاتلانغانلارنى
قاقلاشتىن مەلۇم ۋاقىت توختىتىپ، بەدەن سېزىمىنى تۆۋەنلى-
تىش تەدبىرىنى كۆرۈش بىلەن مېجەز ئۆزگىرىشىگە دىققەت
قىلىش كېرەك.

كۈن نۇرىغا بولغان سېزىمى تۆۋەنرەك بىمارلارنى ئاپتاپقا
قاقلاشتا قېتىم سانىنى قىسقارتىپ، ۋاقتىنى ئۇزارتقان ياخشى،
شۇنىڭ بىلەن بىر چاغدا بۇنداقلارنى ئاپتاپقا قاقلاش ئالدىدا
كېسەللەنگەن ئورۇننى ئۇۋۇلاش ياكى خام، پاختا رەختلەر بىلەن
قىزارغىچە سۈرتۈش ۋە ياكى ئاپتاپقا قاقلىنىپ 10 مىنۇتتىن
كېيىن تېرىنى غىدىقلايدىغان دورىلارنى سۈركەپ يەنە قاقلىنىش
ئارقىلىق تېرىنىڭ تەسىرلىنىشىنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشىش
لازىم.

ئاقكېسەلنى ئاپتاپقا قاقلاپ داۋالاش تۆۋەندىكى بىرقانچە
تەرەپنى مەقسەت قىلىدۇ:

(1) كۈن نۇرىنىڭ تەبىئىي ھارارىتى ۋە تەركىبىدىكى ماددە-
لارنىڭ تەسىرى بىلەن تېرىنى قىزىتىپ سۇ كۆتۈرگۈزۈپ (سۇ-
لۇق قاپارتما شەكىللەندۈرۈپ)، تېرە خاللىرىنىڭ پەيدا بولۇشى-
غا شارائىت يارىتىش؛

(2) ئۈستۈنكى تېرە قاتلىمىدىكى قان تومۇرلارنى كېڭەيتىپ
يەرلىك ئورۇندىكى توقۇلمىلارنىڭ ئوزۇقلىنىشىنى ياخشىلاش
ئارقىلىق تېرە رەڭلىرىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈ-
رۈش ۋە رەڭ ئىشلەش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇش؛

(3) يەرلىك ئەزا ۋە توقۇلمىلارنىڭ چوڭقۇرراق قاتلاملىرىغا
ئورۇنلاشقان بۇزۇق ماددا (خىلىت) لارنى كېسەللەنگەن ئورۇن
ۋە ئومۇمىي بەدەننى ئاپتاپقا قاقلاپ تەرلىتىش ئارقىلىق بەدەن

سىرتىغا چىقىرىش، شۇنىڭ بىلەن بىر چاغدا بۇزۇق ماددىلارنى يەرلىك ئورۇن (تۈك يىلتىزى، ماي ۋە تەر بەزلىرى، رەڭ ھۈجەيرىلىرى) خىزمىتىگە تەسىر يەتكۈزۈشتىن توسۇش؛

(4) يەرلىك ئورۇندىكى قان تومۇرلارنىڭ كېڭىيىشىنى تېزلىتىش ئارقىلىق ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى كۈچەيتىپ، توسالغۇ-لارنى ئېچىپ قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، يەرلىك ئورۇندىكى تېرىنىڭ نورمال ئوزۇقلىنىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىپ تېرە رەڭگىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش؛

(5) تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ بىرىكىش، ھاسىل بولۇشى (پىگمېنت ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئۆسۈپ كۆپىيىشى) نى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىقلار.

ئاقكېسەلنى ئاپتاپقا قاقلاپ داۋالاشتا دىققەت قىلىشقا تې-گىشلىك ئىشلار:

(1) بىمارلار ئاپتاپقا قاقلىنىشتىن بۇرۇن قورسىقىنى ئوب-دان تويدۇرۇش، ئۆسۈملۈك ئۈچۈن چاي دورىسى، ھەسەل سېلىنغان ئىچىملىكلەرنى يېتەرلىك تەييارلاش. چۈنكى، كۆپ تەرلەش نەتىجىسىدە بەدەندىكى سۇيۇقلۇق ۋە تۈز ماددىلىرى (ئېلېكترولىتلار) چىقىپ كېتىپ، باشقا ئۆزگىرىش يۈز بېرىش-تىن ساقلىنىشتا ئۆسۈملۈكنى كۆپرەك ئىچىش تەلەپ قىلىنىد-دۇ. ياخشىسى چېيىغا ئازراق ئاش تۈزى سېلىۋېتىش، ئاپتاپ-تىن چۈشكەندىن كېيىن سوغۇق سۇدا يۇيۇنماسلىق، بەلكى ئىسسىق چۈمكىنىپ 1 — 2 سائەت ئوبدان ئارام ئېلىشقا ئەھمىد-يەت بېرىش لازىم.

(2) ئاپتاپقا ھاۋا ئوچۇق كۈنلەردە قاقلىنىش، ھەربىر بى-مارنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا ئاساسەن ۋاقىت بەلگىلەپ، قاقلىماق-چى بولغان ئورۇننى كۈن نۇرىغا ئۇدۇل توغرىلاش، كۈن نۇر-نىڭ كېسەللەنگەن ئورۇنغا بولغان تەسىرىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن

ئاپتاپقا قاقلىنىشتىن ئىلگىرى پۈتۈن بەدەننى ئىسسىق سۇدا سوپۇن سۈركەپ پاكىز يۇيۇش، ئاپتاپقا قاقلىنىۋاتقاندا ئۇ - ياق - بۇياققا مېڭىپ يۈرمەي جىم تۇرۇش كېرەك.

(3) ئاپتاپقا قاقلىنىش جەريانىدا يەرلىك ئورۇندا سۇلۇق قاپارتما پەيدا بولسا قاقلىنىشنى ۋاقىتنىچە توختىتىش ياكى ئازايتىش، قاپارتما سۈيىنى ئاستى ياكى يان تەرىپىدىن پاكىز يىڭنە بىلەن تېشىپ چىقىرىۋېتىش، ئاندىن يۇقۇملىنىپ (يىرىڭلاپ) قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، پاكىز داكا بىلەن يۆگەپ قو-يۇش، بىرنەرسە تېگىپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئەگەر كېسەللىك دائىرىسى كەڭ، قاپارتما ئورنى چوڭراق بولسا

5 — 10% لىك مامۇرانچىن قاينىتىلمىسىغا چىلانغان داكىنى ئەھۋالغا قاراپ كۈنىگە 2 — 4 قېتىم قويۇپ بېرىش ياكى قايناتقان دورا سۈيىدە يۇيۇپ بېرىش ئارقىلىق ياللۇغ قايتۇرۇپ، تېرىنىڭ تېزلىكتە قېتىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىم.

5% لىك مامۇرانچىن قاينىتىلمىسى مۇنداق تەييارلىنىدۇ:
5 گرام مامۇرانچىن سىرلىق قاچىغا سېلىنىپ، ئۈستىگە 250 مىللىلىتىر سۇ قويۇلىدۇ، ئاندىن قاچىنىڭ ئاغزىغا لايىق كەلگۈدەك داكا كېسىلىپ سۇنىڭ يۈزىگە قويۇلۇپ، پەس ئوتتا 100 مىللىلىتىر دورا سۇيۇقلۇقى قالدۇرۇپ قاينىتىلىدۇ. مانا بۇ ئۇسۇلدا تەييارلانغان دورا سۈيى سوۋۇتۇلۇپ بەدەن كۆيىمگۈدەك بولغاندا، قاپارتما ئۈستىگە دورا سۈيىدىكى داكا 4 — 5 قەۋەت يېپىلىپ، ئۈستىدىن دورا سۈيى تامدۇرۇلىدۇ. بۇ خىل داۋالاش ھەر قېتىم ئاز دېگەندە 30 مىنۇتتىن 1 سائەتكىچە داۋاملاشتۇرۇلىدۇ.

(4) يۈرەك، يۇقىرى قان بېسىم، جىگەر، ئۆپكە سىلى، دىئابىت، قالدۇرۇلغان خىزمىتى ئېشىپ كېتىش، قان ئازلىق كېسەللىكى بار، تېنى ئاجىز كىشىلەر، ھەيز مەزگىلىدىكى ئايال.

لار، قاناشقا مايىللىقى بارلار، سوزۇلما كېسەللىك بىلەن ئاغ-
رىپ ئۇزاق داۋالانىپمۇ ئەسلىگە كېلەلمىگەنلەر ھەمدە ياشانغان-
لار ۋە كىچىك بالىلارنى ئاپتاپقا قاقلىماسلىق ياكى كۈچلۈك
كۈن نۇرىدا كۆپ تۇرغۇزماسلىق كېرەك. (5) ھاۋا تۇتۇق كۈنلەردە ياكى كۈز، ئەتىياز، قىش پەسلى-
لىرىدە ئاپتاپقا قاقلاش ئىمكانىيىتى بولمىسا زامانىۋى داۋالاش
ئۈسكۈنىلىرى، مەسىلەن ئوزۇن ۋە ئۇلترا دولقۇنلۇق ئۇلترا
بىنەپشە نۇر چىرىغى، قىزىل نۇر چىرىغى شۇنداقلا TDP غا
قاقلىنىش ئوخشاشلا ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ-
غىمۇ ئىمكانىيەت بولمىسا سامساق مەجۈنىنى ئىستېمال قىلىپ
بەرسە مەلۇم ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

6. ئاپتاپقا قاقلاش بىلەن دورا سۈركەشنى بىرلەشتۈرۈپ داۋالاش

ئاقكېسەلنى داۋالاشتا دورا ئىچۈرۈشلا كۇپايە قىلمايدۇ،
بەلكى ئاپتاپقا قاقلاش بىلەن دورا سۈركەشنى بىرلەشتۈرۈش
كېرەك. بۇ، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاشتا ئۇزاق-
تىن بېرى قوللىنىپ كېلىۋاتقان ئۆزگىچە داۋالاش ئۇسۇللىرى-
دىن بىرى. كۈن نۇرىغا قاقلاش بىلەن دورا سۈركەشنى بىرلەش-
تۈرۈپ داۋالاش ئارقىلىق بەدەندىكى ئىسسىقلىقنى ئاشۇرۇش،
تېرىدىكى ئاق داغ بار ئورۇندىكى قان تومۇرلارنى كېڭەيتىش
مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن يەرلىك توقۇلمىلارغا
كېلىدىغان قان مىقدارى كۆپىيىپ، تېرىنىڭ ئوزۇقلۇقلار بىلەن
تەمىنلىنىشى ياخشىلىنىدۇ. بۇ ئۇسۇل يەنە تەرلىتىش رولىنى
ئويناپ بەدەندىكى ئارتۇق نەملىك ۋە زىيانلىق ماددا (خىلىت)

لارنىڭ بەدەن سىرتىغا چىقىرىلىشىنى تېزلىتىپ، خىلىتلارنىڭ ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ، ئاق داغ بار ئورۇندىكى چۆكمىلەرنىڭ پارچىلىنىشىنى تېزلىتىش بىلەن، يەرلىك قان تومۇرلارنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى ئاشۇرۇپ، كۈن نۇرى تەركىبىدىكى ماددىلارنىڭ تېرىگە قوبۇل قىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. سۈرتۈلگەن مايلىق دورىلارنىڭ غىدىقلاش، يۇمشىتىشتەك تەسىرلىرى تۈرتكىسىدە، كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ قان بىلەن تەمىنلىنىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق تېرى رەڭ ماددىسىنىڭ ھاسىل بولۇشى ئىشقا ئاشىدۇ. ئاقكېسەلنى سىرتىدىن دورا سۈركەپ داۋالاش ئۇسۇلى ئۆپ-غۇر تېبابىتىنىڭ مۇھىم تەدبىرلىرىدىن بىرى بولۇپ، تېرىنى غىدىقلاش، يۇمشىتىش، كېسەللەنگەن ئورۇندىكى قان تومۇرلارنى كېڭەيتىش ئارقىلىق قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، توقۇلمىلارنىڭ ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، تېرىنىڭ رېئاكسىيىلىنىشىنى تېزلىتىش ۋە سېزىمچانلىقىنى پەسەيتىش ئارقىلىق قىچىشىنى توختىتىشتەك روللارغا ئىگە.

بۇنىڭدا دورا ئىچۈرۈپ داۋالاش بىلەن سىرتىدىن دورا سۈركەپ داۋالاشنى ئۆزئارا زىچ بىرلەشتۈرۈپ، بىمارلارغا مۇۋاپىق كېلىدىغان دورا تۈرى ۋە دورا ياسالغىنىنى تاللاپ ئىشلىتىش پرىنسىپىنى قوللانغاندا، ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈنۈمىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. سىرتىدىن دورا ئىشلەتكەندە بىمارلارنىڭ كېسەللىك يۈز بەرگەن ئورۇننىڭ ئاناتومىيىلىك ئالاھىدىلىكى ۋە دورىلارغا بولغان سەزگۈرلۈك ئەھۋالىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش، ئىشلەتمەكچى بولغان دورا ياسالغىنىنى كېسەللەنگەن ئورۇنغا ئالدىن سىناق تەرتىپىدە سۈركەپ بىر سوتكا ياكى 12 سائەت كۆزەتكەندىن كېيىن (بولۇپمۇ ئىسپىرتلىق ياسالغىلار ۋە

كۈچلۈك غىدىقلىغۇچى تەسىرگە ئىگە جىنكېۋىزى ئۇرۇقى چىلانمىسى، بالادور چىلانمىسى قاتارلىقلار كۆزدە تۇتۇلىدۇ، رېئاكسىيىلىك ئالامەتلەر كۆرۈلمىگەندە، ئاندىن كېسەللىك دا-ئىرسىگە قاراپ دەسلەپ كىچىك دائىرىلىك ئورۇنلارغا ئىشلىتىش لازىم. شۇنداق قىلغاندا، دورا رېئاكسىيىسىدىن كېلىپ چىقىدىغان ئاق داغ كېڭىيىپ كېتىش ۋە باشقا قوشۇمچە كېسەللىكلەر يۈز بېرىشتەك ئەكس تەسىرلەردىن ساقلىنىشقا بولىدۇ. دورا سۈركەشتىن بۇرۇن كېسەللەنگەن ئورۇننى پاكىز خام ياكى لوڭگە بىلەن سۈرتۈپ تېرىدىكى كىرلەرنى چىقىرىۋېتىش لازىم. قولىتۇق، قاپاق، جىنسىي ئورگان قاتارلىق تېرە قاتلاملىرى نېپىز، شىللىق پەردە تۈسىنى ئالغان ئورۇنلاردىكى ئاق داغلارنى دورا سۈركەپ داۋالاشتا تەسىرى نىسبەتەن تۆۋەنرەك مەلھەملەر-نى، مەسىلەن مەلھىمى بىيىزى رەۋغېنى قۇستى، تۆۋەن پىر-سەتلىك مۇرەككەپ قەلەمپۇر چىلانمىسى قاتارلىقلارنىڭ بىرەر خىلىنى ياكى ئىككى خىلىنى قويۇقلۇقىنى تۆۋەنلىتىپ ئىشلىتىش كېرەك.

قول - پۇت قىسمىدىن باشقا ئورۇنلاردىكى ئاقكېسەلگە سىرتىدىن سۈركەيدىغان دورا ئىشلەتكەندە، ئاساسلىق دورىلارنى ئىستېمال قىلىپ بىر ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن تېرىنى ئوتتۇرا ھال غىدىقلىغۇچى، مەسىلەن روغنى پەرىپىيۇن، مەلھىمى ئە-قاپ، مەلھىمى باپىچى، زىمادى بەرەس، زىمادى خەردەل ۋە قويۇقلۇقى %5 تىن تۆۋەن بولغان جىنكېۋىزى ئۇرۇقى چىلانمىسى قاتارلىق دورىلارنىڭ مۇۋاپىقلىرىنى تاللاپ ئوتتۇرا ھال دەرىجىدە 1 ياكى 2 قېتىم سۇ كۆتۈرگۈزۈپ داۋالاش، كېيىنكى باسقۇچلىرىدا تېرىنى مۇھاپىزەت قىلىش رولىغا ئىگە مايلارنى، مەسىلەن ئاساسلىق تەركىبى بادام يېغى، زەيتۇن يېغى، تۇخۇم يېغى، قوي يېغى، ئېيىق يېغى، تۆگە يېغى، ئاپتاپپەرەس

يېغى، كۈنجۈت يېغى بولغان يۇمشاقچى مايلىق دورىلارنى ئىش-
لىتىش كېرەك. دورا ئىشلىتىشتىن بۇرۇن كېسەللىك ئورنىنى
3 — 10 مىنۇت بوش تۇتۇلۇپ، ئاندىن دورىنى سۈركىگەندە
داۋالاش ئۈنۈمىنى تېزلىتىشتە كۆرۈنەرلىك رول ئوينايدۇ.
قول - پۇت قىسمىدىكى ئاقكېسەلنى يۇقىرىقى ئۇسۇلدا
داۋالغاندا كېسەللىك ئورنىدا ماھىيەتلىك ياخشىلىنىش كۆرۈل-
مىسە كۈچلۈكرەك غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە زىمادىلار، مەلھەم-
لەر ۋە چىلانمىلار (مەسىلەن زىمادى خەردەل، مەلھىمى باپى-
چى، زىمادى بەرەس، قويۇقلۇقى %5 تىن يۇقىرى جىنكېۋىزى
چىلانمىسى، بالادور چىلانمىسى قاتارلىقلار) نى ئېھتىيات بىلەن
ئىشلىتىش كېرەك، ھەدپگەندە ھەممە ئورۇنلارغا تەڭ ئىشلىتىپ
بىمارلارنىڭ ئازابىنى بىراقلا ئېغىرلاشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلى-
نىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن بىرقانچە قېتىمغا بۆلۈپ سۈركەپ
تېرىنى بۇزۇۋېتىپ ئاندىن داۋالاش كېرەك. بالادور تەركىبلىك
دورىلارنى ئىشلىتىشتە ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىنمىسا بىر قىسىم
بىمارلاردا ئەكس تەسىرى ئېغىر بولىدۇ.

ئاقكېسەلنى 20 نەچچە يىل تەتقىق قىلىش ۋە كلىنىكىلىق
داۋالاش ئەمەلىيىتىگە بىۋاسىتە قاتنىشىش نەتىجىسىدە شۇنى
چۈشىنىپ يەتتىمكى، بەلغەم مېجەز تىپىدىكى بىمارلارغا سىرت-
تىن دورا ئىشلەتكەندە كېسەللەنگەن ئورۇندىكى تېرىلەرنى بىر
ياكى بىرقانچە قېتىم ئېغىرراق سۇ كۆتۈرگۈزۈش ئارقىلىق
توقۇلمىلارنى بۇزۇۋېتىپ داۋالغاننىڭ ئۈنۈمى تېرىنى ئۆز پېتى
ساقلاپ قېلىپ داۋالغاننىڭكىدىن كۆرۈنەرلىك ياخشى بولىدۇ.
باشقا مېجەز تىپىدىكى بىمارلارنىڭ تېرىسىنى يەڭگىل غىدىقلاپ
بېرىش، كېسەللەنگەن تېرىدىكى توقۇلما سۇيۇقلۇقىنى كۆپ
چىقىرىۋەتمەي داۋالاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈنۈمى كېسەللىك ئور-
نىنى ئېغىر سۇ كۆتۈرگۈزۈپ، توقۇلما سۇيۇقلۇقىنى كۆپلەپ

ئاققۇزۇپ داۋالغاندىن كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە ياخشى بولىدۇ. بۇ يەردە ئەسكەرتىپ قويۇش ھاجەتكى، مەيلى قايسى خىل مىجەز تىپىدىكى ئاقكېسەل بىمارلىرى بولسۇن قول، پۇت، ئوشۇق بوغۇمى ئەتراپىدا ۋە قول بىلەن زۇك بوغۇمى بۆلەكلىرىدە پەيدا بولغان ئاق داغلارغا سىرتىدىن دورا ئىشلەتكەندە بىرقانچە قېتىم سۇ كۆتۈرگۈزۈشلا كۇپايە قىلمايدۇ. شۇڭا، بۇنداق ئورۇندىكى ئاق داغلارغا دورىنى بىرقانچە باسقۇچقا بۆلۈپ سۈركەپ تاكى ساقايغۇچە سۇ كۆتۈرگۈزۈش، قەرەللىك ھالدا يەڭگىل ئۇۋۇلاپ بېرىش ئارقىلىق قان ئايلىنىشىنى تېزلىتىش كېرەك. كېسەللەندىگەن ئورۇننىڭ سىزىمچانلىق ئەھۋالىغا قاراپ غىدىقلىغۇچى دورىلارنى ئۈزمەي ئىشلەتكەندىن باشقا، تېرىگە رەڭ بەرگۈچى چىلانما دورىلارغا دائىم چىلاپ بېرىش بىلەن تېرىگە دورا رەڭلىدىرىنى سىڭدۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.

مەيلى قانداق ئورۇندىكى كېسەللەنگەن تېرىلەرگە سىرتتىن دورا ئىشلىتىشتىن قەتئىينەزەر، دورا تەسىر قىلىپ سۇلۇق قاپارتمىلار ھاسىل بولغاندىن كېيىن، يۇقۇملىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن تېرە تازىلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. سۇ ئۆرلىگەن ئورۇندىكى قاپارتمىلارنى پاكىز يىغىنە بىلەن يان تەرىپىدىن تېشىپ سۈيىنى چىقىرىۋېتىپ پاكىز داكا بىلەن يۆگەپ ساقلاش، سۇلاشقان ئورۇن قېتىشىپ قەقەچ ھاسىل بولمىغۇچە تېرىنى غىدىقلىغۇچى دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك، قەقەچ ھاسىل بولغاندىن كېيىن بالدۇر سۇيۇۋېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. قەقەچلەر ئۆزلۈكىدىن ئاجرايدىغان باسقۇچقا كەلگەندە بوشاتقۇچى مايلا بىلەن مايلاپ، ئۈستىدىن خام بىلەن تېڭىپ قويۇش پايدىلىقتۇر.

ئاقكېسەلنى داۋالاشتا سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار گەرچە داۋالاشتا ياردەمچى دەپ قارالسۇمۇ، لېكىن ئۆز نۆۋىتىدە

ئاساسلىق رولىنىمۇ ئويناپ قالدۇ. شۇڭا، ئاقكېسەلنى داۋالاشتا سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلارغا ھەرگىز سەل قارىماسلىق كېرەك. سىرتىدىن دورا ئىشلەتكەندە ھەربىر بىمارنىڭ تېرىسىدىن ئىلگىرى سۈرۈلۈشى، كېسەللىك تارقالغان ئورۇننىڭ ئاناتومىيىسىگە ئاساسلانغان ۋە چىدامچانلىقىغا قاراپ دورا نۇسخىسىنى تاللاش تەلەپ قىلىنىدۇ.

دورىلارنى ئەمەلىي ئىشلىتىشتىن بۇرۇن بەدەننىڭ كىيىم-كېچەك بىلەن يۆڭىلىپ تۇرىدىغان ئورۇنلىرىغا كىچىك دائىرىدە سۈركەپ سىناق قىلىپ بېقىش، ئالدىراپلا ئۇچۇق تۇرىدىغان ئورۇنلارغا ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئەگەر بىپەرۋالىق قىلىنىپ، ئۆتكۈر (كۈچلۈك غىدىقلىغۇچى) ۋە ئىشقارلىق (كۆيدۈرگۈچى) دورىلار قاراملىق بىلەن ئىشلىتىپ قويۇلسا ئاق داغ بار ئورۇننى يامانلاشتۇرغاندىن باشقا، قوشۇمچە تېرە كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىمۇ مۇمكىن.

7. كېسەللىك ئورنىغا بىۋاسىتە

دورا كىرگۈزۈپ داۋالاش

ئاقكېسەلنى داۋالاش ئەمەلىيىتى جەريانىدىكى ئۇزاق يىللىق تەجرىبىلەر ۋە كلىنىكىلىق كۆزىتىشلەرگە ئاساسلانغاندا، كېسەللىك ئورنىغا بىۋاسىتە دورا كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنىڭ ئەمەلىي رولىغا سەل قاراشقا بولمايدۇ. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى يېقىنقى 15 يىل مابەينىدە بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلى ئۈستىدە تەجرىبە، ئىنچىكە كۆزىتىش ئېلىپ بېرىپ، تۆۋەندىكىدەك خۇلاسەنى يەكۈنلەپ چىقتى:

(1) ھەر خىل تىپتىكى ئاقكېسەل بىمارلىرىدىن 690

كىشىگە ئاساسلىق دورىلارنى ئىشلىتىپ بىر ئايدىن كېيىن 4 — 5 كۈندە 1 قېتىم، 1 — 6 مىللىلىتىردىن ئىپار ئوكۇلىنى ئاق داغ دائىرىسى ۋە ئىگىلىگەن ئورنىغا قاراپ بىرقانچە ئورۇنغا بۆلۈپ، تېرە ئاستىدىن 30 — 45 كۈنگىچە ئوكۇل قىلىپ نەتىجىسىنى كۆزەتكەندە، بىمارلارنىڭ ھەممىسىدە دېگۈدەك ئوخشاشمىغان دەرىجىدە تېرە رەڭلىرى قېنىقلىشىپ، خاللارنىڭ پەيدا بولۇشى تېزلەشكەنلىكى، يەككە تىپلىق ئاق داغلار بولسا ساق تېرە ئەتراپىدىن ئاق داغ مەركىزىگە قاراپ قورۇلۇپ كىچىكلەگەنلىكى مەلۇم بولدى، ئۈنۈمى كۆرۈلمەسلىك ئەھۋالى بايقالمىدى. بۇلار ئىچىدە باش، بويۇن، پېشانە قىسىملىرىدا چاچما ۋە يۇمىلاق شەكىلدە ئاق داغ پەيدا بولغان 91 نەپەر بىماردىن 62 نەپىرى تولۇق ساقىيىپ كەتتى.

(2) كېسەل تارىخى 3 — 10 يىلغىچە بولغان، بەدىنىنىڭ يېپىق ئورۇنلىرىدا ھەر خىل شەكىللەردە ئاقكېسەل پەيدا بولۇپ بىرقانچە قېتىم مەخسۇس داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى كىچىك - كېسىل ساقىيىپ كېتەلمىگەن 251 نەپەر بىمارغا مەخسۇس دورىلارنى بىر ئاي ئىشلەتكەندىن كېيىن، كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ ھەپتىدە 1 قېتىم، 2 — 6 مىللىلىتىردىن كالىي زىرە ئوكۇلىنى كېسەللەنگەن ئورۇن تېرە ئاستىغا (بىرقانچە ئورۇنغا) ئوكۇل قىلىپ، ئاندىن بۇنىڭغا بىرلەشتۈرۈپ ئاپتاپقا قاقلاپ داۋالاشنى بىر ئاي داۋاملاشتۇرۇپ كۆزەتكىنىمىزدە، 71 نەپەر بىمارنىڭ ئاق داغ بار ئورۇنلىرىدا ئۇششاق خال پەيدا بولغان ياكى خال چىقىشقا باشلىغان، 156 نەپەر بىماردا ئوخشىمىغان دەرىجىدە ياخشىلىنىش ئالامىتى كۆرۈلگەن. پەقەت 24 نەپەر بىمارنىڭ كېسەللىكىدە ماھىيەتلىك ئۆزگىرىش بولمىغان.

يۇقىرىقى داۋالاش ئۈنۈمىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ - كى، ئاقكېسەلنى داۋالاش كېسەللىك ئورنىغا بىۋاسىتە تېرە

رەڭ ماددىسىنى تولۇقلىغۇچى ۋە رەڭ ماددىسىنىڭ ھاسىل بولۇ-
 شىنى ئىلگىرى سۈرگۈچى دورا ياسالمايلىرى بىلەن تېرە قان
 تومۇرلىرىنى جانلاندۇرغۇچى ۋە تېرە نېرۋا شاخچىلىرىنى قۇۋ-
 ۋەتلىگۈچى دورا ياسالمايلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەتكەندە ئەمە-
 لىي داۋالاش جەريانىدىكى ئۈنۈمى تۆۋەن بولغان بىمارلاردا ئۇ-
 نۈمنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى، پەقەت ئۈنۈمى بولمىغان بىمارلاردا
 ئۈنۈم بولۇشنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. بۇ كىلىنىكىدا قول-
 لىنىشقا بولىدىغان بىر خىل تولۇقلىما داۋالاش ئۇسۇلىدىن
 ئىبارەت.

شۇنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇكى، پەقەت بۇ-
 خىل ئۇسۇلنىلا قوللىنىپ ئاقكېسەلنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى كۆ-
 گۈلدىكىدەك بولمايدۇ.

ئاقكېسەلنى داۋالاشتىكى قوشۇمچە ئۇسۇللار

ئاقكېسەلنى داۋالاشتا يۇقىرىقى بىر يۈرۈش ئۇسۇللارنى قوللانغاندىن باشقا، بانكا قويۇش، كېسەللەنگەن ئورۇننى يىڭنە (پەللىگە سانجىشتا ئىشلىتىدىغان يىڭنە) دە چېكىش، خام بىلەن يۆگەپ ئىسسىق ساقلاش ۋە قۇمغا كۆمۈلۈش قاتارلىق قوشۇمچە تەدبىرلەرنى كلىنىكىدا قوللانغاندا، ساقىيىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، داۋالاش ۋاقتىنى قىسقارتىپ، راسخوتنى تېجەش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

1. يىڭنىدە چېكىپ داۋالاش

كېسەللەنگەن ئورۇننى يىڭنىدە چېكىش قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسى ئاقكېسەلنى داۋالاش ئەمەلىيىتى جەريانىدا ئۇزاق مەزگىل كلىنىكىدا قوللىنىپ كۆزىتىش، ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىش ۋە تەجرىبە قىلىش ئاساسىدا يەكۈندەلەپ چىققان ئىجادىي خاراكتېرلىك تولۇقلىما ئۇسۇللاردىن بىرىدۇر. بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلى 1980 - يىلىدىن 2002 - يىلىغىچە 865 نەپەر بىمار ئۈستىدە سىناق قىلىنىپ بەلگىلىك ئۈنۈمگە ئېرىشكەن. بۇنىڭدا كېسەللىك يۈز بەرگەن ئورۇننىڭ ئاناتومىيىلىك تۈزۈلۈش ۋە كېسەللىكنىڭ تارقىلىش ئالاھىدىلىكى

كىگە قاراپ يانتۇ شەكىلدە چېكىش، تېرە تەكشىلىك يۆلىنىش بويىچە چېكىش، تىك ھالەتتە چېكىشتىن ئىبارەت ئۈچ خىل ئۇسۇل قوللىنىلىدۇ.

(1) يانتۇ شەكىلدە چېكىش. بۇ خىل ئۇسۇل كۆپىنچە بەدەننىڭ مۇسكۇل قاتلىمى نىسبەتەن قېلىن ئورۇنلىرى (مەسىلەن بېقىن، يوتا، كاسا، بويۇن، تاغاق قاتارلىق جايلار) دا پەيدا بولغان ئاقكېسەلگە دورا سۈركەپ، ئاپتاپقا قاقلىغاندا ئۆزگىرىش كۆرۈلمىگەن ياكى قىسمەن ئۆزگىرىش يۈز بەرگەن بولسىمۇ تېرە رەڭلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشى كۆرۈنەرلىك بولمىغان، تېرە خاللىرى پەيدا بولغىنى بىلەن چوڭىيىشى ئاستا ھەتتا مەلۇم ۋاقىت توختىۋالغان ئاق داغلارغا قوللىنىلىدۇ.

بۇنىڭدا كېسەللىك دائىرىسى، بىمارنىڭ ئەھۋالى كۆزدە تۇتۇلۇپ، ھەپتىدە بىر قېتىم چېكىش، چېكىپ بولۇپلا ئاپتاپقا قاقلاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. 7 — 10 قېتىم چېكىش بىر داۋالاش باسقۇچى قىلىنىدۇ، بىرقانچە داۋالاش باسقۇچىغا قوللىنىشقا بولىدۇ.

(2) تېرە تەكشىلىك يۆلىنىشى بويىچە چېكىش. بۇ خىل ئۇسۇل كۆپىنچە كۆز، بۇرۇن، قۇلاق ئەتراپى، پېشانە، قولىتۇق قاتارلىق تېرە قاتلاملىرى نېپىزرەك ئورۇنلاردا پەيدا بولغان ئاقكېسەلگە قوللىنىلىدۇ. بۇنىڭدا ساق تېرە ئەتراپىدىكى ئاق داغ چېگرىسىدىن ئاق داغ مەركىزىگە قاراپ يۈزەرەك چېكىش تەلپ قىلىنىدۇ، چېكىپ بولۇپلا ئاپتاپقا قىسقا ۋاقىت قاقلاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ 5 — 8 كۈندە بىر قېتىم قوللىنىلسا بولىدۇ. بەش قېتىملىقى بىر داۋالاش باسقۇچى قىلىدۇ. نىپ، ئىككى داۋالاش باسقۇچى داۋاملاشتۇرۇلىدۇ.

(3) تىك ھالەتتە چېكىش. بۇ خىل ئۇسۇل كۆپىنچە قول-پۇت قىسمىدىكى ئاق داغلار، ئوشۇق، بىلەيزۇك بوغۇم ئەتراپىدە

دا، جەينەك، تېز بوغۇملىرىدا پەيدا بولغان جاھىل خاراكتېر-
لىك ئاقكېسەللەرگە قوللىنىلىدۇ. بۇنىڭدا ئاق داغ ياكى ئاقكې-
سەل پەيدا بولغان ئورۇنغا خاس ياكى مۇرەككەپ دورىلار (زى-
ماد، تېنىكتۇرسى قاتارلىقلار) سۈركىلىپ، ئاندىن تۈكچىلىك
يىڭنە (مىيخۇاجىن) بىلەن تېرە ئاساسىي قاتلاملىرىغىچە چېكى-
لىدۇ. ھەر 10 كۈندە 1 قېتىم ئېلىپ بېرىلىپ، 8 قېتىمى
بىر داۋالاش باسقۇچى قىلىنىدۇ. ھەر باسقۇچى ئاخىرلاشقاندا
بىر ئاي ئارام ئالدۇرۇلۇپ، شۇ يوسۇندا 3 — 4 باسقۇچ
داۋاملاشتۇرۇلىدۇ. مەيلى قايسى خىل چېكىش ئۇسۇلى قوللى-
نىلىشىدىن قەتئىينەزەر، كېسەللەنگەن ئورۇن، ئىشلەتكەن
يىڭنە قاتارلىقلارنىڭ دېزىنڧېكسىيىسىگە ئالاھىدە ئەھمىيەت بې-
رىش بىلەن بىرگە، چېكىپ داۋالاش ئۇسۇلى قوللىنىلغان ھەر-
بىر ئادەمنىڭ تېرە سېزىمچانلىق ئەھۋالىغىمۇ دىققەت قىلىش،
سېزىمچانلىق ئېشىپ كېتىش سەۋەبلىك ئاق داغ كېڭىيىپ كې-
تىش ھادىسىسى يۈز بېرىشتىن ساقلىنىش لازىم.

2. بانكا قويۇپ داۋالاش

ئاقكېسەلنى ئەمەلىي داۋالاش تەجرىبىلىرىگە ئاساسلانغاندا،
كېسەللىك تارىخى 10 يىلدىن ئاشقان، كۆپ قېتىم داۋالانمى-
ھەر خىل دورىلارنى ئىشلەتكەن بولسىمۇ ئۈنۈمى ياخشى بولمى-
غان يەككە ۋە تارقاق شەكىلدىكى ئاق داغلارنى بانكا قويۇپ
داۋالانغاندا ئۈنۈمى بىرقەدەر ياخشى بولىدۇ. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن
كېسەللەنگەن ئورۇن چاي دورىسى سۈيىدە يۇيۇلۇپ، خام ياكى
لۇڭگە بىلەن تېرە قىزارغۇچە سۈرتۈلىدۇ، ئاندىن يەرلىك ئو-
رۇن %75 لىك ئىسپىرتتا دېزىنڧېكسىيە قىلىنىپ بانكا قويۇلىدۇ

ياكى تۈكچىلىك يىغىنىدە چېكىپ ئازراق قان چىقىرىلىدۇ. بۇ ئۇسۇللارنى قوللىنىش بىرقەدەر ئوڭاي بولۇپ، تېرىنىڭ رەڭلىرىنىشە بەلگىلىك رول ئوينايدۇ. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى يېقىنقى 5 يىلدىن بېرى كېسەلخانا ۋە ئامبۇلاتورىيە شارائىتىدا 112 نەپەر ئاقكېسەل بىمارىنى بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن داۋالاپ كۆزىتىش ئارقىلىق 67 نەپەر بىمارنىڭ كېسەللىكىدە خېلى ياخشى ئۈنۈم كۆرۈلگەنلىكىنى، 16 نەپەر بىمارنىڭ كېسەللەنگەن ئورنىدا خال پەيدا بولغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈردى.

بۇنىڭدا بانكىنى كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ 5 — 10 مىنۇت توختىتىپ ئېلىۋەتكەندىن كېيىن يەرلىك ئورۇن پاكىز داكىدا سۈرتۈۋېتىلىپ، 15 — 30 مىنۇت ئاپتاپقا قاقلىنىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇل كۆپىنچە قۇرامىغا يەتكەنلەرگە قوللىنىلىپ، ھەپتىدە بىر قېتىم ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئەسكەرتىپ قويۇش زۆرۈركى، مەشغۇلات جەريانىدا ساق تېرىلەرنى كۆيدۈرۈپ زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن ئېھتىيات قىلىش لازىم.

3. كېسەللەنگەن ئورۇننى

ئىسسىق ساقلاش

ھەر خىل تىپتىكى ئاقكېسەل بىمارلىرىنى ئاپتاپقا قاقلىدىغاندا ئورۇنلاشتۇرۇش ئالدىدا ئاق داغ بار ئورۇننى يېنىك ئۇۋۇلاش، ئاپتاپقا قاقلىنىپ بولغاندا نەچچە قەۋەت خام ياكى پاختا سېلىپ تىكىلگەن نېپىز كۆپىدە يۆگەپ ئىسسىق ساقلاش ئۇسۇلى كېسەللىكنىڭ ساقىيىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتە مۇئەييەن ئەھمىيەتكە ئىگە. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت

شېپاخانىسى ئاقكېسەل ئۈستىدە ئۇزاق مەزگىل داۋالاش، كىلىنىكلىق كۆزىتىش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق يۇقىرىقى قوشۇمچە داۋالاش تەدبىرىنىڭ ھەقىقەتەن مەنپەئەت بېرىدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈردى. شېپاخانا ئاقكېسەل بۆلۈمى 1997 - يىلىدىن 2003 - يىلىغىچە ئارىلىقتا 1394 نەپەر ئاقكېسەل بىمارىنى داۋالاش - تەجرىبە ئوبىيېكتى قىلىپ يۇقىرىقى ئۇسۇلنى قوللىدى. ئىچى كۆزەتكەندە، ئىلگىرىكى چاغلاردا كېسەل جايغا خال پەيدا بولۇپ 40 — 60 كۈندە تۇتىشىپ ساق تېرە شەكىللەنگەن بولسا، ئەمدىلىكتە خال چىقىپ 30 — 50 كۈندە تۇتىشىپ ساق تېرە شەكىللەنگەن، بولۇپمۇ بىمار ئاپتاپتىن چۈشۈش ئالدىدا كېسەل ئورۇننى يەڭگىل ئۇۋۇلاپ، يېنىك غىدىقلايدىغان مەلەمەت مى بىزى، رەۋغىنى قۇستى قاتارلىق دورىلارنى سۈركەپ بىرىش نەچچە قەۋەت خام بىلەن يۆگەپ ئىسسىق ساقلىغاندا ئۈنۈم بېرىش روشەن بولغان. دېمەك، بۇ خىل قوشۇمچە داۋالاش ئۇسۇلى ساقىيىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، داۋالاش ۋاقتىنى قىسقارتىش، ھاسىل بولغان خاللارنىڭ تۇتىشىشنى تېزلىتىش ۋە نورمال تېرىلەرنىڭ شەكىللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە خېلى زور ئەھمىيەتكە ئىگە.

بۇ ئۇسۇلنى قوللانغاندا دىققەت قىلىش ھاجەتكى، كېسەللىككە ئىگە ئورۇننى يۆگەپ تاڭغاندا ساق ئورۇننى بوغۇپ قويۇش تۈپەيلى، قان ئايلىنىشقا تەسىر يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىش لازىم.

4. قۇمغا كۆمۈپ داۋالاش

قۇم ئارقىلىق كېسەللىك داۋالاش ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئۇزاق يىللىق ئەنئەنىۋى ئۇسۇللىرىنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، رېماتىزىم

تېز، پالەچ، لەقۋالىق كېسەلى، ئاياللار كېسەللىكى ۋە بىر قىسىم تېرە كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتىكى ئۈنۈمگە سەل قارمىغانلىقى بولمايدۇ. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ قۇم ئارقىلىق كېسەل داۋالاشتىكى نەزەردىن ئۆتكۈزۈلۈشىنى يېتەكچى قىلىپ، ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈنۈمىنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈش، كلىنىكىلىق تەتقىقاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش مەقسىتىدە يېقىنقى يىللاردىن بېرى دورا ئىشلىتىپ داۋالاش بىلەن قۇمغا كۆمۈپ داۋالاشنى زىچ بىرلەشتۈرۈپ، خېلى ياخشى داۋالاش ئۈنۈمى ۋە مول كلىنىكىلىق تەجرىبە ئاساسىغا ئېرىشتى.

بۇنىڭدا 1998 - يىلىدىن 2002 - يىلىغىچە بولغان 5 يىلدا 211 نەپەر ھەر خىل مىجەز تىپىدىكى ئاقكېسەل بىمارى ئۈستىدە قۇم بىلەن داۋالاش، كلىنىكىلىق كۆزىتىش تەجرىبىسى ئېلىپ بارغان، قۇمغا كۆمۈلۈش ئورنىنى دۆلەت يولى 314 - بۆلۈكىدىن ئىككى ياپچان بازىرىغا يېقىن ياقىسىدىن تاللىغان. قۇم دۆۋىلىرىنىڭ شىمالى، غەربى تەرەپلىرى كەڭ كەتكەن سازلىق، جەنۇبى تەبىئىي ئۆسكەن توغراقلىق بولۇپ، ھاۋا شارائىتى قۇرغاق بولۇشتەك ئەۋزەللىككە ئىگە.

قۇمغا كۆمۈپ داۋالاشنىڭ ئۈنۈمىنى بىر قەدەر ئېنىق پەرق ئېيتىش ئۈچۈن بىمارلارنى تۆۋەندىكى تۈرلەر بويىچە رەتكە تۈرگۈزۈلگەن:

- (1) بالىسىغا يېتىپ داۋالانغان ۋاقتى بىر ئايدىن ئاشقانلار؛
- (2) غەيرىي تەبىئىي بەلغەم مىجەز تىپىدىكىلەر؛
- (3) بەدىنىدىكى ھۆلۈك ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەن غەيرىي تەبىئىي مىجەزدىكىلەر؛
- (4) يېشى 13 ياشتىن يۇقىرىلار؛
- (5) يۈرەك قان تومۇر، زىققە، ئۆپكە سىلى، ئۆپكە ھاۋالىق

ئىششىقى، دىئابت، قاندا ماي ئېشىپ كېتىش، جىگەر ياللۇ-
غى، يۇقىرى قىزىتما كېسەللىكلىرى بارلار ۋە ھەيز مەزگىلىدە-
كى ئاياللار كېسەللىكلىرىدىن باشقىلار، سۈرگە دورىسى بېرىل-
مىگەنلەر، ئىچى سۈرۈۋاتقان كىشىلەردىن باشقا، كۈچلۈك كۈن
نۇرى تېرىسىدە رېئاكسىيە پەيدا قىلمايدىغانلار قۇمغا كۆمۈپ
داۋالاش ئوبيېكتى قىلىندى؛

(6) كېسەللىك دائىرىسى بەدەن ئومۇمىي تېرىسىنىڭ 3%
دىن ئېشىپ، كېسەللىك پۈتۈن بەدەنگە تارقالغانلار؛

(7) كېسەللىك تەكرار داۋالانمىسىمۇ ئۈنۈمنى كۆرمىگەن-
لەر، داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولمىغانلار، شۇنداقلا
كېسەللىك ساقايغاندىن كېيىن قايتا قوزغالغان ۋە كېسەللىك
يەككە خاراكتېرلىك بولۇپ ئۈنۈمى كۆرۈلمىگەنلەر.

قۇمغا كۆمۈپ داۋالاش ۋاقتى ھەر يىلى 6 - ئاينىڭ 25-
كۈنىدىن 8 - ئاينىڭ 15 - كۈنىگىچە بولۇپ، ھاۋا ئوچۇق
كۈنلىرى شىنجاڭ ۋاقتى چۈشتىن كېيىن سائەت 1 — 5 كىچە
كۆمۈلۈش بېكىتىلدى. چۈنكى، بۇ مەزگىلدە قەشقەر رايونىنىڭ
ھاۋا شارائىتى ئىسسىق ھەم ئەڭ قۇرغاق بولغاچقا، قۇمنىڭ
نەملىكى ئاز، تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى بولۇشتەك تەبىئىي جۇغرا-
پىيىلىك ئەۋزەللىك كېسەل داۋالاشقا تازا باب كېلىدۇ. قۇمغا
كۆمۈلۈشتە ھەر 5 كۈن بىر باسقۇچ ھېسابلىنىپ، يىلىغا جەم-
ئىي 5 — 7 باسقۇچ داۋالانىش بېكىتىلدى. بىمارلار قۇمغا
كۆمۈلۈشتىن ئىلگىرى ئوبدان غىزالاندۇرۇلغاندىن سىرت،
ھەر بىر كىشىگە يېتەرلىك مىقداردا ئۇسۇلۇق تەييارلاش تەلەپ
قىلىندى.

قۇمغا كۆمۈلۈش تۆۋەندىكى تەرتىپ بويىچە ئېلىپ
بېرىلدى:

(1) قۇمغا كۆمۈلۈشتىن بۇرۇن قۇم رايونىدا 10 مىنۇت

تۈرۈپ، شۇ ئورۇننىڭ مۇھىت شارائىتىغا ماسلىشىش؛ (2) قۇم ئۈستىدە يالاڭ ئاياغ ماغدۇرۇلۇپ بەدەننى قۇم تېمپېراتۇرىسىغا ماسلاشتۇرۇش؛ (3) دەسلەپتە ئىككى پۇتنى ئوشۇققىچە كۆمۈپ، تەدرىجىي ھالدا كېسەللىك بار ئورۇنغا قەدەر كۆمۈلۈش قاتارلىقلار.

بىمارلار كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ قۇمغا ھەر 10 — 15 مىنۇت كۆمۈلۈشنى ئۆلچەم قىلىپ، شۇ تەرىقىدە 2 — 3 قېتىم كۆمۈلگەندىن كېيىن، قۇمدىن ئايرىلىپ سايە جايدا بىر سائەت ئارام ئالدۇرۇلىدۇ، ئاندىن يۇقىرىقى ئۆلچەم داۋاملاشتۇرۇلۇپ، يەنە قۇم ئۈستىدە يالاڭ ئاياغ 10 مىنۇت مېڭىش تەرتىپى بويىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ.

قۇمغا كۆمۈلۈپ داۋالاشنى باشتىن - ئاخىر تېببىي خادىم - لارنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بېرىلىپ، تېببىي خادىملار بىمارلارنىڭ قۇمغا كۆمۈلۈش جەريانىدىكى ئەھۋالىنى ئىزچىل كۆزىتىپ تۇرۇش كېرەك.

قۇمغا كۆمۈلۈش جەريانىدا بىمارلاردا يۈرەك سوقۇشى تېز - لىشىپ كېتىش، نەپەس سىقىلىپ ھاسىراش ۋە بېشى ئاغرىپ كۆڭلى ئېلىشىشتەك غەيرىي ئەھۋاللار كۆرۈلگەن ھامان قۇم بىلەن داۋالاشنى دەرھال توختىتىپ، سالقىن ئورۇندا ئارام ئالدۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. ئەھۋالى نورمال بىمارلار قۇمدىن چىقىپ 1 — 2 كۈنگىچە سوغۇق سۇلۇق مۇنچىغا چۈشۈشكە بولمايدۇ.

211 نەپەر ئاقكېسەل بىمارى ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان قۇمغا كۆمۈپ داۋالاش تەجرىبىسىدىن قارىغاندا، ئۇلار ئىچىدىكى 151 نەپەر بىمارنىڭ كېسەللىكىدە ئوخشىمىغان دەرىجىدە ياخشىلىنىش كۆرۈلگەن. 15 نەپەر بىماردىكى چامچا شەكىللىك قوناق - بۇغدايچىلىك ئاق داغلار ئۈچ قېتىملىق داۋالاش

ئارقىلىق تولۇق ساقايغان، دورا بىلەن داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى كۆ-
رۈلمىدى دېيىلگەن 30 نەپەر بىمارنىڭمۇ كېسەللەنگەن ئورنىغا
ئۇششاق ۋە شالاڭ خاللار چىققان. دائىرىسى چوڭراق ئاق داغ-
لارنىڭ ئەتراپىدا قورۇلۇش ئالامىتى كۆرۈلگەن، بولۇپمۇ بەلغەم
(ھۆل سوغۇق) مەجەز تىپىدىكى بىمارلاردا بۇ خىل ئۈنۈم
روشن ئىپادىلەنگەن.

ئاقكېسەل بەلغەم مەجەزلىك كىشىلەردە كۆپرەك كۆرۈل-
دىغان بولغاچقا، بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلىنى قوشۇمچە قوللانغان-
دا، كۈن ئوردا قىزىغان قۇم ئۆز تەركىبى ۋە ھارارىتى بىلەن
تېرىنى قىزىتىش ئارقىلىق سېزىمچانلىقنى ئاشۇرۇپ، تېرە قە-
ۋەتلىرىنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش بىلەن
تەر ۋە تۈك بەزىلىرىنىڭ ئاجىزىتىپ چىقىرىشىنى جانلاندۇ-
رىدۇ. دە، يەرلىك ئورۇنلاردىكى غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىل-
تىنى تەر بىلەن بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ، مەجەز ۋە خىلىت-
لارنى نورماللاشتۇرىدۇ. نەتىجىدە كېسەللەنگەن ئورۇنلاردىكى
تېرە رەڭلىرى (تېرە خاللىرى) نىڭ پەيدا بولۇشىنى تېزلىتىدۇ،
كىچىك دائىرىدىكى ئاق داغلاردا بولسا تېرە رەڭلىرىنىڭ ھاسىل
بولۇشى تېزلىشىپ، ئاق داغلار ئەتراپىدىن قورۇلۇپ ساقىيىشقا
يۈزلىنىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلىرى

ئۇيغۇر تېبابىتى ساھەسىدىكىلەر ۋە ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتقان، تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان كەسپداشلارنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەتقىقات ئىشلىرىغا ئاز - تولا ياردەمى بولار دېگەن نىيەتتە، قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى ئاقكېسەل ئۈستىدە داۋالاش ئېلىپ بارغان 46 يىل جەريانىدا ھاسىل قىلغان بىر قىسىم تەجرىبىلەرنى يىغىنچاقلاپ تونۇشتۇرۇپ ئۆتمەن. بۇ قىسىمدا ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈستىدە 1955 - يىلى قۇرۇلۇپ، ئىسمائىلجان ئاكىنىڭ ئىزچىل تەشەببۇسى، ئەينى چاغدىكى شىپاخانا باشلىقى يۈسۈپ ھاجى قەشقەرنىڭ قوللىشى بىلەن 1958 - يىلىدىن باشلاپ ئاقكېسەل بىمارلىرىنى كېسەلخانىدا ياتقۇزۇپ، ئاتىرلال - ھازىرقى كالىي زىرە ئۇرۇقى ۋە كەرۋىيا بىلەن داۋالاشنى يولغا قويغان. 1958 - يىلىدىن 2003 - يىلىغىچە كېسەلخانىدا ياتقۇزۇپ داۋالىغان ئاقكېسەل بىمارلىرى جەمئىي 6737 نەپەر ئادەم قېتىمغا يەتكەن. ئەمما، 1981 - يىلىغىچە ئارىلىقتىكى كلىنىكىلىق داۋالاش ئۈنۈمىنى كۆرسىتىدىغان سانلىق مەلۇماتلار تولۇق بولمىغاچقا، پەقەت كېسەلخانىدا يېتىپ داۋالانغان ئومۇمىي ئادەم قېتىم سانىلا جەدۋەلگە كىرگۈزۈلدى.

1982 - يىلىدىن 2003 - يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە بولغان 22

1988 - يىلىدىن 2003 - يىلىغىچە 16 يىللىق كلىنىكىلىق داۋالاشتىكى ياش پەرقى خۇلاسى جەدۋىلى

ئومۇمىي ئۈنۈم نېسبىتى			ئۈنۈمى بۆلۈمى			ئۈنۈمى ئادەتتىكىچە بۆلۈمى			ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بۆلۈمى			تولۇق سا قايعىنى		ئىگەللىگەن نېسبىتى (%)	ئومۇمىي سانى	ياش پەرقى ئايرىمىسى
%	سانى	%	سانى	%	سانى	%	سانى	%	سانى	%	سانى	%	سانى			
98.1	838	1.8	16	24.5	209	59.2	420	24.5	209	25.4	854	10 — 1 ياشقىچە				
97.5	982	2.5	25	22.7	229	48.3	486	26.5	267	30	1007	20 — 11 ياشقىچە				
96.1	567	3.9	23	28.3	167	43.8	259	23.9	141	17.6	590	30 — 21 ياشقىچە				
93.8	459	6.1	30	26.8	131	45.2	221	21.9	107	14.6	489	40 — 31 ياشقىچە				
90.5	219	9.5	23	42.1	102	30.6	74	17.7	43	7.2	242	50 — 41 ياشقىچە				
86.2	150	13.8	24	38.5	67	37.9	66	98	17	5.2	174	70 — 51 ياشقىچە				
95.8	3215	4.2	141	26.9	905	45.5	1526	23.4	784	100	3356	ياشقىچە				ئومۇمىي سانى

جەدۋەلدىكى سانلىق مەلۇماتلاردىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى، دەسلەپكى يىللاردا تولۇق ساقايغانلار بىلەن داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى بولمىغانلار ئاز، كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم بەرگەنلەر بىلەن داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى بولغانلار نىسبىتى يۇقىرى بولغان. 80 - يىللاردىكىگە قارىغاندا 90 - يىللاردا تولۇق ساقىيىش نىسبىتى خېلى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن، بولۇپمۇ 20 ياشتىن تۆۋەن بىمارلارنىڭ تولۇق ساقىيىش نىسبىتى يۇقىرى بولغان. داۋالاش ئۈنۈمى بولماسلىق ئەھۋالى تەدرىجىي تۆۋەنلىگەن.

داۋالاش ئۈنۈمىنىڭ بۇنداق يۇقىرى - تۆۋەن بولۇشى مۇقەررەركى، داۋالاش تېخنىكىسى، دورىنىڭ سۈپىتى، تېرىگە قارىتا تەسىر كۆرسىتىشى، شۇنىڭدەك بىمارنىڭ مېجەز ۋە خىلىت تىپىنى توغرا ئايرىش، كۈن نۇرى، يېمەك - ئىچمەكتە پەرھىز تۇتۇش قاتارلىق ئامىللارنىڭ ئۆزئارا ماسلاشتۇرۇلۇپ قوللىنىلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغاندىن باشقا، شۇ يىلى قوبۇل قىلىنغان كېسەللەرنىڭ كېسەللىككە دۇچار بولغان ۋاقتىنىڭ ئۇزاق - قىسقىلىقى، كېسەللىكنىڭ ئېغىر - يېنىكلىكى دەرىجىسى، كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ ئاناتومىيىلىك تۈزۈلۈشى، تۈكلەرنىڭ ئاقارغان - ئاقارمىغانلىقى، ئاق داغنىڭ يەككە ياكى سىمىيەتلىك ئىكەنلىكى، قول - پۇت، بارماق ئۇچلىرىدىكى غەيرىي ئۆزگىرىشلەر قاتارلىق كۆپ تەرەپلىمە ئەھۋاللارغىمۇ باغلىق.

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى 46 يىلدىن بۇيان ئاقكېسەلنى تەتقىق قىلىش - داۋالاشتا ئەنە شۇنداق ئالدىنقى قىلارنىڭ ئىزىنى كېيىنكىلەر بېسىپ، ياش تېۋىپلار پېشقەدەم تېۋىپلارنىڭ ۋە ئەجدادلارنىڭ داۋالاشتىكى تەجرىبىلىرىگە ۋارىسلىق قىلىش ئاساسىدا زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ئۈنۈملۈك داۋالاش تەجرىبىلىرىنى يارىتىش بىلەن خۇشاللىنارلىق نەتىجە.

ئاقكېسەلنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈم بېرىش مۇددىتى ۋە بۇنى باھالاش ئۆلچىمى

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىگە دائىر تارىخىي خاتىرىلەر ۋە داۋالاش ئەمەلىيىتى جەريانىدىكى كۆزىتىش ھەم بىمارلار تەمىنىلگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، ئاقكېسەلنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈم بېرىش مۇددىتىنى ھەر بىر بىمارنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالى، يەنى بەدەندىكى كېسەللەنگەن كۆلەم، ئورۇن، كېسەللىكنىڭ پەيدا بولغان ۋاقتى، ئېغىر - يېنىكلىك دەرىجىسى، داۋالىنىش تارىخى قاتارلىق ئۆلچەملىك ئامىللار بەلگىلەيدۇ. كۈنكېرىتلاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ئاقكېسەل بىمارلىرىنىڭ داۋالاشقا قارىتا ماسلىشىشچانلىقى مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. كۆپ تەرەپلىملىك ئەھۋاللارغا قاراپ 3 — 8 ئاينى بىر داۋالاش مۇددىتى قىلىپ، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغانلارنى ئۈزۈمەي داۋالاش، بىر داۋالاش مۇددىتىدە دېگەندەك ئۈنۈمى كۆرۈلمىگەنلەرنى دورا ئالماشتۇرۇپ يەنە داۋالاش كېرەك. 2 — 3 داۋالاش مۇددىتىدە ئۈزۈمەي داۋالىنىپمۇ ساقىيالمىغانلار داۋالىنىشنى بىر مەزگىل توختىتىپ بەدەننى ئارام ئالدۇرغاندىن كېيىن يەنە داۋالانسا بولىدۇ. شۇنىمۇ ئېيتىپ قويۇش ھاجەتكى، داۋالاش جەريانىدا بىمارلارنىڭ مەجەز ۋە خىلىت ئۆزگىرىشىنى كۆزىتىشكە ئەھمىيەت بېرىپ، مەجەزىدە ئۆزگىرىش كۆرۈلگەنلەرگە قارىتا كېسەللىك ماددىسىنى پىشۇرۇش ۋە بەدەندىن سۈرۈپ چىقىرىش ئۇسۇل - چارىلىرىنى قوللىنىپ، مەجەز - خىلىت تەڭشەلگەندىن

كېيىن، مەخسۇس دورىلارنى ئۆزىمەي ئىشلەتسە بولۇۋېرىدۇ. ئاقكېسەلنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈمىنى باھالاشتا رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ھەر خىل ئۆلچەملەر قوللىنىلماقتا. ئورنىدىن مېزنى ئالساق، قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى قۇرۇلۇپ 1980 - يىلىغىچە تولۇق ساقايغانلار، ئۈنۈمى بولغانلار ۋە بولمىغانلار دەپ ئۈچ گۇرۇپپىغا ئايرىلغان. داۋالاش جەريانىدىكى كۆزىتىشنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ساقىيىش نىسبىتىنى يەنىمۇ توغرا ئېنىقلاش مەقسىتىدە 1980 - يىلىدىن ئېتىبارەن بىرقەدەر ئورتاقلاشقان تۆۋەندىكى ئۆلچەم قوللىنىلىپ، داۋالاش ئارقىلىق ساقايغانلار، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغانلار، ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئۈنۈمى كۆرگەنلەر ۋە ئۈنۈمى كۆرۈلمىگەنلەر دەپ تۆت تۈرگە ئايرىلىپ كەلمەكتە.

1. ساقايغانلار

بۇنىڭغا بەدەننىڭ ھەرقايسى ئورۇنلىرىدىكى ئاق داغلار داۋالاش ئارقىلىق ساق تېرە رەڭگى بىلەن تامامەن (100%) ئوخشاش ياكى قېنىقراق بولغانلار كىرىدۇ.

2. ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغانلار

بۇنىڭغا بەدەننىڭ ھەرقايسى ئورۇنلىرىدىكى ئاق داغنىڭ پىگمېنتلىشىش (نورمال تېرە رەڭلىرى ھاسىل بولۇش) نىسبىتى 60% تىن ئاشقانلار كىرىدۇ.

3. داۋالاش ئۈنۈمى كۆرۈلگەنلەر

بۇنىڭغا بەدەننىڭ ھەرقايسى ئورۇنلىرىدىكى ئاق داغنىڭ پىگمېنتلىشىش (نورمال تېرە رەڭلىرى ھاسىل بولۇش) نىسبىتى 10% تىن ئاشقانلار كىرىدۇ.

4. ئۈنۈم كۆرۈلمىگەنلەر

بۇنىڭغا بەدەننىڭ ھەرقايسى ئورۇنلىرىدىكى ئاق داغنىڭ پىگمېنتلىشىش (نورمال تېرە رەڭلىرى ھاسىل بولۇش) نىسبىتى 10% تىن تۆۋەن بولغانلار ياكى ھەرقانچە داۋالاش ئېلىپ بېرىلسىمۇ ھېچقانداق ئۆزگىرىش كۆرۈلمىگەن ۋە ياكى ئاق داغ ئەكسىچە كېڭىيىپ كەتكەنلەر كىرىدۇ.

ئاقكېسەلنىڭ ساقىيىش ئالامىتى

- بۇنى تۆۋەندىكى ئۈچ جەھەتتىن كۆرگىلى بولىدۇ:
- (1) داۋالاش ئۈنۈم بېرىپ، سۇلۇق قاپارتقۇ پەيدا بولىدۇ، ئاندىن تېرە خاللىرى شەكىللىنىش بىلەن ساقىيىدۇ.
 - (2) ئاق داغ تەدرىجىي مەركىزىگە قاراپ كىچىكلەپ ئاخىر قورۇلۇش ئارقىلىق ساقىيىدۇ.
 - (3) يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئالامەت بىللە ئىپادىلىنىش بىلەن ساقىيىدۇ.

ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈنۈمىنى سېلىشتۇرۇش

ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈنۈمىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكى كې-
سەللىك ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن - قىسقىلىقى، دەرىجىسىنىڭ ئېغىر-
يېنىكلىكى، كېسەللەنگەن ئورۇندىكى تۈكلەرنىڭ ئاقارغان -
ئاقارمىغانلىقى، تارقىلىش شەكلىنىڭ يەككە ياكى سىممېترىك
ئىكەنلىكى، قول ۋە پۇت بارماق ئۇچلىرىغا قەدەر تارقالغان -
تارقالمىغانلىقى، ئوشۇق بوغۇم ۋە بىلەزۈك بوغۇم ئەتراپىدىكى
ئاق داغنىڭ تارقىلىشى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىملىك ئەھۋاللار
بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. ئۇزاق يىللىق داۋالاش ئەمەلىيىتى
جەريانىدىكى كۆزىتىشكە ئاساسلانغاندا، بۇنى تۆۋەندىكى بىر قانچە
نۇقتىغا يىغىنچاقلاش مۇمكىن:

(1) ئادەتتىكى سىممېترىك شەكىلدە تارقالغان ئاقكېسەل-
نى داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى يەككە يەرلىك شەكىللىك ئاقكېسەلنى
داۋالاشنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ؛

(2) خال پەيدا بولۇپ ساقىيىشقا باشلىغانلىرىنىڭ ئۈنۈمى
سىرتتىن قورۇلۇپ ساقىيىشقا باشلىغانلىرىنىڭكىدىن يۇقىرى
بولىدۇ؛

(3) باش، يۈز، گەۋدە قىسىملىرىدا پەيدا بولغان ئاقكېسەل-
نىڭ داۋالانغاندىن كېيىنكى ساقىيىش ئۈنۈمى قول - پۇت قى-
سىملىرىدا پەيدا بولغانلىرىنىڭكىدىن يۇقىرىراق بولىدۇ؛

(4) يوتا، بىلەك، پاچاق قىسىملىرىدا پەيدا بولغان ئاقكې-

- سەلنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى شىللىق پەردىلەردە پەيدا بولغانلىرىد-
نىڭكىدىن يۇقىرىراق بولىدۇ؛
- (5) كېسەللەنگەن ئورۇندىكى تۈكلەردە ئاقىرىش يۈز بەرمىد-
گەن ئاقكېسەلنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى تۈكلەر ئاقارغانلىرىد-
نىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ؛
- (6) مۇۋاپىق پەرھىز تۇتقانلارنىڭ كېسەللىكنىڭ داۋالاش ئۈ-
نۈمى پەرھىز تۇتمىغانلارنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ؛
- (7) كىچىك بالىلاردىكى ئاقكېسەلنى داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى
چوڭ كىشىلەرنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ؛
- (8) مۇسكۇللار قېلىن ئورۇنلاردا پەيدا بولغان ئاقكېسەلنى
داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى مۇسكۇللار نېپىزرەك ئورۇنلاردىكىدىن يۇ-
قىرى بولىدۇ؛
- (9) ئادەتتىكى ئاقكېسەلنىڭ داۋالاش ئۈنۈمى مەڭ شەكىل-
لىك ئاقكېسەلدىن يۇقىرى بولىدۇ؛
- (10) نۇرغا قاقلىغاندا تېز تەسىرى كۆرۈلگەن ئاقكېسەلنى
داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى نۇرغا قاقلىغاندا تەسىرلىنىشى ئاستا ياكى
ھېچبىر تەسىر كۆرۈلمىگەنلىرىنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ؛
- (11) تىز، جەينەك بوغۇملىرىدا پەيدا بولغان ئاقكېسەلنى
داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى ئوشۇق، بىلەزۈك بوغۇملىرىنىڭ ئىچكى
قىسمىدا پەيدا بولغانلىرىنىڭكىدىن يۇقىرىراق بولىدۇ؛
- (12) ئاقكېسەلنى تەبىئىي كۈن نۇرى بىلەن داۋالاشنىڭ
ئۈنۈمى سۈنئىي نۇر بىلەن داۋالاشنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ؛
- (13) بەلغەم ۋە قان مىجەزلىكلەردە پەيدا بولغان ئاقكېسەل-
نى داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى سەپرا ۋە سەۋدا مىجەزلىكلەرنىڭكىدىن
يۇقىرى بولىدۇ؛
- (14) كېسەللەنگەن ئورۇننى تېڭىپ ئىسسىق ساقلاپ
داۋالاشقا ماسلىشىپ بەرگەنلەرنىڭ ساقىيىش ئۈنۈمى كېسەللەن-
گەن ئورۇننى ئوچۇق قويغانلارنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ.

ئاقكېسەل دورىسى يوق كېسەللىك ئەمەس

تېببىي ئىلىمنىڭ قارشىچە، ھەرقانداق كېسەللىكنىڭ دو-
را - داۋاسى بولىدۇ. كۆرۈنۈشتە بەزى كېسەللىكلەرنىڭ بىرەر
ئۈنۈملۈك دورىسى يوقتەك تۇيۇلسىمۇ، تېببىي ئىلىمنىڭ ئۈز-
لۈكسىز ئىزدىنىشى ۋە چوڭقۇرلاپ تەتقىقات ئېلىپ بېرىشى
نەتىجىسىدە ئىنسانىيەت چوقۇم كېسەللىك ئۈستىدىن غەلىبە
قىلىدۇ، گەپ پەقەت ئىلگىرى - كېيىنلىك مەسىلىسى خالاس.
ئاقكېسەلنى ئالسا، ئۇيغۇر تېبابىتى ئۇنىڭ ئۈنۈملۈك دورىسى-
نى تېپىش ئۈستىدىكى ئىلمىي تەتقىقات - ئىزدىنىشنى بىر كۈنمۇ
توختاتقنى يوق. قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى
1955 - يىل 9 - ئايدا قەشقەر شەھىرى تاغارچى كوچىسىدىكى
ھېپزىخان مەخسۇمنىڭ قورۇسىدا ئالتە نەپەر يەككە تېۋىپنىڭ
شەخسىي دورا ماتېرىياللىرى ۋە دورا ياساش ئۈسكۈنە - سايمانلى-
رىنى پاي سۈپىتىدە قوشۇشى بىلەن قۇرۇلغان «داۋالاش پونكى-
تى» ئاساسىدا بارلىققا كەلگەن يېرىم ئەسىردەك ۋاقىتتىن بۇ-
يان، ئاقكېسەلنى داۋالاشقا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ كەلدى.
ئەينى چاغدا تېۋىپلار «پاي» قىلىپ قوشقان دورا ماتېرىياللىرى
ئىچىدە بىر خىل «قارا ئۇرۇق» بولۇپ، «خام دورا» ئامبىرىدا
ساقلانغان؛ 1958 - يىلىغا كەلگەندە شىپاخانىنىڭ ئاساسلىق
قۇرغۇچىلىرىدىن بولغان يۈسۈپ ھاجى قەشقەرى بىلەن ئىسما-
ئىلجانلار كىشىلەر «داۋاسى يوق» دەپ قاراپ كەلگەن ئاقكېسەل-

نى داۋالاشقا ئىرادە باغلاپ، كۆپ ئىزدىنىش ئارقىلىق يەككە دورىلار ھەققىدىكى قەدىمكى ئەسەرلەردە «ئاقكېسەل دورىسى» سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان «ئاترىلال» دېگەن ئۆسۈملۈكنىڭ ئۆز رۇقىدىن ياسالغان نۇسخىلاردىن پايدىلانماقچى بولغان. ئۇلار ئۆز ۋاقتىدىكى خام دورا ئامبىرىدا ساقلانغان ھېلىقى قارا ئۇرۇقنى ھەقىقىي «ئاترىلال» دەپ قاراپ ئۇنىڭدىن «مەجۇنى ئاترىلال» ياساپ، ئاقكېسەل بىمارلىرىنى داۋالاپ بىرقەدەر ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكەن. لېكىن، «ئۇرۇق» نىڭ مىقدارى ئاز بولغاچقا، كېيىنكى ۋاقىتلاردا تېخىمۇ كۆپ بىمارلارنى داۋالاشقا مۇمكىنچىلىك بولمىغان. مەرھۇم مەشھۇر تېۋىپ ئىسمائىلجان بۇ مەسىلىنى يەرلىك دورىلارغا تايىنىپ ھەل قىلىشنى ئويلاپ كۆپ ئىزدىنىشلەر ئارقىلىق پامىر تاغ تىزمىلىرى باغرىدىن ياۋا زىرە ئۇرۇقى (تاغ زىرىسى CarumCaruiP) نى تېپىپ كېلىپ، دورا ياساپ ئاۋۋال ئىتقا يېگۈزگەن، ئاندىن ئۆزى ھەر خىل مىقداردا ئىستېمال قىلىپ ناچار تەسىرلىرى كۆرۈلمىگەندىن كېيىن، رەسمىي يوسۇندا مەجۇن ۋە كۈمۈلچ دورا تەييارلاپ، ئاقكېسەل بىمارلىرىغا كلىنىكىدا كۆزىتىش ئاساسىدا ئىشلىتىپ ئوخشاشلا ياخشى داۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشكەن ۋە بۇ خىل دورىغا «يەرلىك ئاترىلال» دەپ نام بېرىپ، ئاقكېسەلنى داۋالاشقا قوللانغان.

1972 - يىلى رايونىمىزنىڭ پاكىستان بىلەن بولغان چېگرا سودىسىنىڭ ئېچىلىشى شىپاخانىدا ھەقىقىي «ئاترىلال» غا ئېرىشش ئۈمىدىنى تۇرغۇزۇپ، پاكىستانغا چىقىدىغان چېگرا سودا ئۆمىكىگە پېشقەدەم تېۋىپ، مۇدىر ۋىراج مەرھۇم ئابدۇقادىر مۇھەممەتنى قوشۇپ، ھېلىقى «ئاترىلال» نامىدا ئىشلەتكەن قارا ئۇرۇقنىڭ ئەۋرىشكىسىنى ئېلىپ بېرىپ، سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئەۋرىشكىگە ئوخشايدىغان دورىنى ئەكىپلىش ۋەزىپىسىنى تاپشۇرغان. «دورا» شىپاخانىغا كىرگۈزۈلگەندىن كېيىن ئۇنىڭ

دىن ياسالغان دورىلارنى «ئاترىلال» نامى بىلەن ئىشلەتكەن. بىراق، پاكىستاندىن «ئاترىلال» نامى بىلەن كىرگۈزۈلگەن بۇ دورىنى قەشقەردىكى بىر قىسىم تېۋىپلار «ئاترىلال» دېسە، خوتەندىكى بىر قىسىم تېۋىپلار «ئاترىلال» ئەمەس، بەلكى «ھو-مامە — amomum» ئىسىملىك چۆپنىڭ ئۇرۇقى دېيىشكەن. دەرۋەقە قەدىمكى كىتابلاردا «ھومامە» ئۇرۇقىنىڭ ئاقكېسەلگە ئۈنۈمى بارلىقى كۆرسىتىلگەن.

بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن شىپاخانىدىكى پېشقەدەم تېۋىپلار ھەر تەرەپلىمە ئىزدىنىپ، قەدىمكى تېببىي ئەسەرلەرنى كۆرۈش ئارقىلىق، بۇ خىل دورىنىڭ نامىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش نىيىتىدە ئۇنى ئوردۇچە يېزىلغان مەقسۇنۇل ئەدۋىيە — «يەككە دورا ئۆسۈملۈكلەر ئىلمى» دېگەن كىتابتا كۆرسىتىلگەن كالىي زىرە ئۇرۇقى بولۇشى مۇمكىن دەپ قاراپ، شۇ نامدا ئىشلەتكەن. 1974 - يىلى شىپاخانا بۇ خىل ئۇرۇقنى دىيارىمىزدا تېرىپ ئۆستۈرۈپ مۇۋەپپەقىيەت قازاندى. شۇنىڭ بىلەن دورا نامىنى ئىلمىي ئاساستا بېكىتىش ئۈچۈن ئاپتونوم رايونلۇق دورا تەتقىقات ئورنى ۋە لەنجۇ، نەنجىڭ قاتارلىق شەھەرلەردىكى دورا تەتقىقات ئورۇنلىرىغا ئىلتىماس قىلدى. يۇقىرىقى ئورۇنلارنىڭ مۇتەخەسسىسلەرنىڭ تەكشۈرۈشى نەتىجىسىدە، بۇ خىل ئۇرۇق «ھومامە» (amomum) بولماي، كالىي زىرە — «vernionio anthe mintica wud» دېگەن چۆپنىڭ ئۇرۇقى ئىكەنلىكى ئىلمىي ئاساستا مۇقىملاشتۇرۇلدى.

قەدىمكى كىتابلاردا، كالىي زىرە بەلغەمنى تازىلاش، ئۈچەيدىكى قۇرتنى چۈشۈرۈش ۋە قوقاقنى قايتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىشتەك خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە دەپ تەرىپلەنگەن، ئاقكېسەل داۋالايدىغانلىقى توغرىسىدا ھېچقانداق خاتىرىلەر قالدۇرۇلمىغان. ئەمما، مەيلى ئەينى چاغدا پاكىستاندىن كىرگۈزگەن

كالىي زىرە ئۇرۇقىنى ئاترىلال چۈشەنچىسى بىلەن ئىشلىتىلىپ
ياكى پامىر تاغلىرى باغرىدىن يىغىپ كېلىنگەن تاغ زىرىسىنى
يەرلىك ئاترىلال دەپ ئىشلىتىلىپ، ھەر ئىككىلا خىل دورىنىڭ
ئاقكېسەلگە ياخشى ئۈنۈمى بولىدىغانلىقى 46 يىللىق كىنىكىدە
لىق داۋالاش ئەمەلىيىتىدە ئىسپاتلاندى.

شىپاخانا يەنە ۋىلايەتلىك دورا تەكشۈرۈش ئورنى بىلەن
بىرلىكتە كالىي زىرىنى خىمىيىۋى جەھەتتىن ئانالىز قىلىپ
ئۇنىڭ تەركىبىدە فىلاۋونلار، فېنوللۇق تەركىبلەر، كۇمارىن،
ئانتوتسىياندى، ستروئىد قاتارلىق ماددىلارنىڭ بارلىقىنى ئې-
نىقلاپ چىقتى. كېيىن شاڭخەي جۇڭگوچە تېببىي دورىلار تەت-
قىقات ئورنى بىلەن بىرلىكتە ئەتراپلىق تەكشۈرۈپ ئۇنىڭ خىمى-
يىۋى تەركىبىنى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئېنىقلاپ، كالىي
زىرە سىترئالكاھولى بارلىقىنى بېكىتتى. يېقىندا شىئەن شە-
ھەرلىك يەرلىك كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئورنى يۇقىرىدە-
دا دېيىلگەن تەركىبلەردىن باشقا يەنە كالىي، ناترىي، كالتسىي،
ماگنىي، فوسفور ھەمدە مولىبدېن، لىتسىي، مىس سترونىسي
قاتارلىق ماددىلارنىڭ بارلىقىنى ئېنىقلىدى.

كالىي زىرە بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بولۇپ،
ئېگىزلىكى 1 مېتىر ئەتراپىدا كېلىدۇ. يوپۇرمىقى سوزۇنچاق
(ئۇزۇنلۇقى 3 — 7 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 1 — 5 سانتىمې-
تىر)، چۆرىسى ھەرە چىشىسىمان، يۈزى تۈۋىتلىق بولىدۇ.
گۈلى يېرىم شار شەكلىدە، يوپۇرماق تومۇرى شېخنىڭ ئۈچىدا
بولىدۇ. چەيزە رەڭدە، پارقىراق كېلىدۇ. ئۇرۇقى غىلاپ ئىچىدە-
دە بولۇپ، غىلىپى ئۇزۇنراق، ئۇرۇقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 5 سان-
تىمېتىر كېلىدۇ، 8، 9 - ئايلاردا يىغىۋېلىنىدۇ. پىشقاندا
كۆكۈچ قارا رەڭگە كىرىدۇ، تەمى ئۆتكۈر ئاچچىق كېلىدۇ.
تەبىئىتى 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

كالىي زىرە ئەسلىدە ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق دۆ-
لەتلەردە ئۆسىدىغان ياۋا ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، قەشقەر
ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى قايتا - قايتا تېرىپ
سېناق قىلىش ئارقىلىق مۇۋەپپەقىيەت قازاندى. ھازىر رايونىد-
مىزدا كۆلەملەشكەن تېرىپ ئۆستۈرۈش بازىسى ئاقسۇ بوز يەر
ئۆزلەشتۈرۈش مەيدانىدا بارلىققا كېلىپ، مول يەرلىك دورا
ماتېرىياللىرى مەنبەسىگە ئايلاندى. شىپاخانا دورا زاۋۇتى ئىش-
لىگەن كالىي زىرە تەركىبلىك دورىلار (ھەببى كالىي زىرە ۋە
كالىي زىرە ئوكۇلى) 1994 - يىلى دۆلەتلىك دورا تەكشۈرۈش
ئىدارىسىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈپ مەملىكىتىمىز ئىچىدە ۋە چەت
ئەللەردىمۇ بىردەك ئىشلىتىشكە بولىدىغان ئۈنۈمى ياخشى بىر-
دىنبىر ئاقكېسەل دورىسىغا ئايلاندى. ھازىر شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر
تېبابەت شىپاخانىلىرى كەڭ قوللانغاندىن باشقا، ئاپتونوم رايون-
لۇق 1 - خەلق دوختۇرخانىسى تېرە كېسەللىكلەر بۆلۈمى،
شەن شەھەرلىك يەرلىك كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش
ئورنى ۋە نەنجىڭ، بېيجىڭ قاتارلىق چوڭ شەھەرلەردىكى بىر
قىسىم دوختۇرخانىلارمۇ ئاقكېسەلنى داۋالاشقا ئاساسلىق دورا
سۈپىتىدە ئىشلەتمەكتە.

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسىنىڭ ئاقكې-
سەل دورىلىرى ئۈستىدە ئېلىپ بارغان ئۇزاق يىللىق ئىلمىي
تەتقىقات ۋە داۋالاش نەتىجىلىرى ئۆز زامانىسىدا ئۆتكەن بىر قانچە
ئەۋلاد پېشقەدەم تېۋىپلارنىڭ جاپالىق ئىزدىنىشلىرى ئاساسىدا
كېيىنكىلەرنىڭ ئىزچىل تىرىشىشى ئارقىلىق قولغا كەلگەن
ئىجادىي خاراكتېرلىك مۇۋەپپەقىيەت، شۇنداقلا ھازىرقى زامان
ئۇيغۇر تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ ئاقكېسەل داۋالاش ئىشلىرىغا
قوشقان ئەڭ چوڭ تۆھپىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
ئۆز زامانىسىدا پېشقەدەم ئۇستازلار ئاقكېسەلنى داۋالاشقا

قوللانماقچى بولغان «ئاترىلال» دورىسىغا كەلسەك، قەدىمكى تېببىي كىتابلاردا ھەقىقىي ئاترىلال (ammi majus) ھەققىدە مۇنداق يېزىلغان: «ئاترىلال» دېگەن نام ئەسلىي پەبەر (پەھلىدە ۋى) تىلى بولۇپ، قاغا پۇتى ئاسمانى دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. تۈركچە غاز ئايىغى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ ئۆسۈملۈك ئائىلىسىگە تەۋە دورا بولۇپ، شاخلىرى تۆت قىرلىق، يوپۇرماقلىرى چېچىدە لاڭغۇ، گۈلى ئاق، ئۇرۇقى سېرىقچىكەننىڭ ئۇرۇقىغا ئوخشايدۇ. باھارنىڭ ئاخىرىدا پىشىپ يېتىلىدۇ. ياخشى مىسرەدىن چىقىدىغىنى بولۇپ، رەڭگى قارامتۇل بولىدۇ. ئۆزى سوزۇنچاق بولۇپ، ئۇششاق بولسىمۇ ۋەزنى ئېغىرراق كېلىدۇ. تەمى ئىندى تاينىن ئاچچىق ۋە ئۆتكۈر بولۇپ، تىلنى ئىچىشتۈرىدۇ. تەبىئەتتىكى 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، يەلنى تارقىتىش، تېرىنى پارقىرىتىش، ئارتۇق ماددىلارنى سۈيدۈك بىلەن بەدەن سىرتىغا چىقىرىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، بۆرەك ۋە دوۋسۇننى تازىلاش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە. بۇنىڭدىن باشقا ئۇنى زىماد قىلىپ چاپسا، يىرىڭلىق جاراھەتلەرنى قۇرۇتىدۇ، ئۇ جاراھەت ئورنىدا تاتۇق قالدۇرماي ساقايتىش ۋە ئاقكېسەلنى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدۇ...

قەدىمكى ئۇيغۇر تېبابەت كىتابلىرىدا «ئاترىلال» نىڭ ئاق-كېسەلنى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدىغان ئاساسلىق دورا ئىكەنلىكى ۋە ئىلگىرىكى زامانلاردا رايونىمىزنىڭ ھىندىستان بىلەن سودا ئالاقىسى بولۇپ تۇرغان چاغلاردا بۇ خىل ئۇرۇقنىڭ چەتتىن كىرگەنلىكى ھەققىدە خاتىرىلەر بولسىمۇ، ئەمما ئۇنى كۆرگەن، بىۋاسىتە ئىشلەتكەن پېشقەدەم ئۇيغۇر تېۋىپلار ئارقا - ئارقىدىن ئالەمدىن ئۆتكەنلىكى سەۋەبلىك، كېيىنكى تېۋىپلارنىڭ بۇ خىل ئۇرۇقنى ئىشلىتىش ئىمكانىيىتى بولمىغاچقا، «ئاترىلال» ھەققىدە كەسكىن پىكىر قىلالىشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى، ئەلۋەتتە.

تە. مەيلى ئالەمدىن ئۆتكەن ئۇستازلىرىمىز، مەيلى ھازىر ھايات بار ئۇستازلىرىمىز بولسۇن، ھەقىقىي ئاتىرلانى كۆرگەنلەر ۋە تولۇق تونۇيدىغانلار يوق. يېقىنقى مەزگىللەردە ئاقكېسەلنى داۋالاش ۋە تەتقىق قىلىش ئىشلىرى يىلمۇيىل چوڭقۇرلىشىپ، بۇ جەھەتتە ئىزدىنىۋاتقان ئۇيغۇر تېۋىپلىرى بارغانسېرى كۆپىيىپ، ھەقىقىي ئاتىرلارغا ئېرىشكەندە ئاقكېسەلنى داۋالاش ئۈنۈمىنى يەنە بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرگىلى، ئاقكېسەل دورىلىرى ئۈستىدىكى ئىلمىي تەتقىقاتنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرگىلى، ئالەمدىن ئۆتكەنلەرگە ۋارىسلىق قىلىپ كېيىنكىلەرگە يول ئېچىپ، دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلىگىلى بولىدىغانلىقىنى قەلبىگە پۈكۈپ ئۆز-ئۆزىگە ئىزدەنمەكتە.

ئاقكېسەلنى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدىغان دورا ياسالما مىللىرى

1. مەجۇن دورىلار

مەجۇنى بەرەس (I)

【تەركىبى】 كابۇل ھېلىلىسى پوستى 15 گرام، ئاقىرقەرھە

20 گرام، بەلىلە پوستى 15 گرام، شەترەنجى ھىندى 20

گرام، ئامىلە، قىچا، تەپتىمۇن، سامساق، گۈلدارچىن، ئور-

دان، قەردمانا، زەنجىۋىل، پىلىپىل، جوزبەۋۋا، گۈلقەنت، ئەند-

سەللەرنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ ھەسەل 800 گرام.

【تەييارلىنىشى】 ئالدى بىلەن دورىلار سوقۇپ تاسقىلىدۇ،

ئاندىن كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەل بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار ھەر كۈنى 2 قېتىم، 6

گرامدىن (تامماقتىن كېيىن) ئىستېمال قىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننى قىزىتىش، قۇۋۋەتلىش، تېرىگە

رەڭ بېرىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل، بەھق ۋە سۈ-

غۇقتىن بولغان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

مەجۇنى بەرەس (II)

【تەركىبى】 ئوغرىتىكەن 30 گرام، ئاقىرقەرھە 60 گرام،
تاغ زىرىسى 90 گرام، سۈمبۈل 15 گرام، ھەسەل 600 گرام.
【تەييارلىنىشى】 ئالدى بىلەن دورىلار سوقۇپ تاسقىلىدۇ،
ئاندىن كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.
【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار دەسلەپتە كۈنىگە ئىككى
قېتىم 7 — 15 گرامدىن، كېيىن مىقدارنى تەدرىجىي كۆپەيتىپ
ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ دورا مىقدارى
كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى ھەزىم قىلغۇچى «قۇۋۋىتى ھا-
زىم» ۋە ھەيدىگۈچى «قۇۋۋىتى داپئە» لەرنىڭ خىزمىتىنى تەڭ-
شەپ، تېرىنىڭ رەڭ ھاسىل قىلىشىنى تېزلىتىدۇ.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ھەر خىل مېجەزدىن پەيدا
بولغان ئاقكېسەللەر.

مەجۇنى بەرەس (III)

【تەركىبى】 كالىي زىرە، ئاقىرقەرھە، پوستى تۇرپۇت،
سىيادانلارنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرامدىن؛ ھەسەل 300 گرام.
【تەييارلىنىشى】 ئاۋۋال دورىلار سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن
كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.
【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار ھەر كۈنى تاماقتىن كې-
يىن 2 — 3 قېتىم، 7 — 15 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ.
بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننىڭ رەڭ ھاسىل قىلىشىنى تېزلىتىدۇ، تېرىگە رەڭ بېرىدۇ. 【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل ۋە ھەر خىل ئاق داغلار.

مەجۇنى بەرەس (Ⅳ)
【تەركىبى】 ئارچا مۇنچىقى، شىۋاق، قەيسۇم، جىنتىيانا، يۇمىلاق زىراۋەندى، قارىمۇچ، ئۇزۇن پىلىپىل، جاۋاشر ئو- شەق، سەكپەنەج، مۇقەل، ئۈستقۇددۇس، پەرپىيۇن، كامازىر- يوس، قاراخەربەق، ياۋا پىياز، سازەج ھىندى، سۇمبۇل تىب، زەنجىۋىل، پەتەر سالىيون، كالىي زىرە، قوزاق دارچىن، قېلىن دارچىن، ئود بىلسان، جۈندە بەدەستەر جوۋنا، چىڭسەي ئۇرۇ- قى، جۈسەي ئۇرۇقى، ئىزخىر، بىستىپايەنچ، قەردمانا، بۆرە سويىمىسى يىلتىزىنىڭ پوستى، پىننە قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرى- دىن 6 گرامدىن؛ بىلسان يېغى، سەبىرى، مورى مەككىنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ سوقمۇنيا، غارىقون، شەھەنزەل، سېرىق ئوتنىڭ ھەربىرىدىن 21 گرامدىن، ئاندىن بۇ دورىلارنىڭ 3 ھەسسىسىگە باراۋەر ھەسەل.

【تەييارلىنىشى】 ئاۋۋال دورىلار سوقۇپ تاشقىلىدۇ، ئاندىن كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. 【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم، 5 — 10 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى سوغۇق يەللەرنى تارقىتىش، بەدەننى قىزىتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش، بەدەندىكى قۇۋۋىتى مۇغەير (ئۆزگەرتكۈچى قۇۋۋەت) ۋە قۇۋۋىتى تەبىئىي (تەبىئىي

قۇرۇۋەت) لەرنى كۈچەيتىش قاتارلىقلار. **【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】** ئومۇمىي بەدەنلىك جاھىل تىپتىكى ئاقكېسەل، گۈللۈك تەمرەتكە ۋە كالا تەمرەتكىسى قاتارلىقلار.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 قۇرۇق ئىسسىق ۋە ئىسسىق مەجەزلىك كىشىلەرگە دورا مىقدارىنى كېمەيتىپ ياكى باشقا دورىلار بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىش لازىم.

مەجۇنى بەرەس (V)

【تەركىبى】 ئاق تۇرپۇت پوستى، ئاقىرقەرھا، توم زەنجىر، ۋىل، قۇرۇتۇلغان يەرلىك توقماق يىلانلارنىڭ ھەر بىرىدىن 50 گرامدىن؛ تاغ زىرىسى 150 گرام، ھەسەل 1350 گرام. **【تەييارلىنىشى】** ئاۋۋال دورىلار سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. **【تەبىئىتى】** ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە تاماقتىن كېيىن 2 — 3 قېتىم، 8 — 15 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ. **【خۇسۇسىيىتى】** بەدەن ۋە تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىش، يەنى لەرنى تارقىتىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ھەر خىل تىپتىكى ئاقكېسەل، چاچ - ساقالنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىپ كېتىشى، بەھق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

مەجۇنى بەرەس (VI)

【تەركىبى】 گۈلچە 10 گرام، مەستىكى 40 گرام، ئەندەسەل 10 گرام، جويۇز 20 گرام، شەھمەنزەل 10 گرام، گۈلى

سۆسۈن 5 گرام، نۇرپۇت پوستى 10 گرام، سېرىقئوت 5 گرام،
ھەسەل 500 گرام، غارىقۇن 5 گرام، سامساق 750 گرام.
【تەييارلىنىشى】 سامساق يۇمشاق سوقۇلۇپ ئېزىلىدۇ، ئاندىن
باشقا دورىلار سوقۇپ تاسقىلىپ، سامساق بىلەن قوشۇ-
لۇپ، كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.
【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم،
10 — 15 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ.
【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننىڭ رەڭ ئىشلەش ئىقتىدارىنى كۈ-
چەيتىش، بەدەننى قىزىتىش ۋە قۇۋۋەتلەش قاتارلىقلار.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل ۋە بەھەق
(گۈللۈك تەمرەتكە) قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

I نۇسخا مەجۈنى سوم (سامساق مەجۈنى)
【تەركىبى】 ئاقلانغان سامساق 270 گرام، كاۋاۋىچىن،
زەنجىۋىل، جويۇز، پىلىپىل، ئاقىرقەرھە، قارىمۇچ، خولىند-
جان، قەلەمپۇرلارنىڭ ھەربىرىدىن 6 گرامدىن، زەپەر 3 گرام،
قوزاق دارچىن 6 گرام، گۈل يېغى 30 مىللىلىتىر.
【تەييارلىنىشى】 سامساق سوقۇلۇپ، 400 مىللىلىتىر كالا
سۈتىدە تاكى سامساققا سىڭىپ بولغۇچە قاينىتىلىدۇ،
ئاندىن 400 گرام ھەسەل بىلەن قىيام قىلىنىدۇ. قازان ئوتتىن
ئېلىنىپ، گۈل يېغى ئېلىشتۇرۇلىدۇ. ئاۋۋال سوقۇپ تەييار-
لانغان زەپەر ئاخىرىدا، قالغان دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ، تاس-
قىلىپ، سۈت ۋە ھەسەل قوشۇلغان دورىلارغا سېلىنىپ تەكشى
ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.
【خۇسۇسىيىتى】 زەھەر قايتۇرۇش، سوغۇق يەللەرنى تار-

قىتىش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، زىيادە نەملىكنى ئازايتىش، تېرى-
گە رەڭ بېرىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىشى】 ئاشقازان ئاجىزلىقى، پالەچ، ئۇنتۇغاق-
لىق، دەم سىقىلىش، ئاقكېسەل ۋە بەھەق، تىل كالۋالىشىش،
بەدەن ئاجىزلىق ۋە ھۆللۈكتىن بولغان ھەر خىل كېسەللەرگە
بېرىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 1 قېتىم، 7
گرامدىن تاماقتىن كېيىن ئىستېمال قىلىدۇ.

I نۇسخا مەجۇنى سوم (سامساق مەجۇنى)
【تەركىبى】 كالىي زىرە ئۇرۇقى 37 گرام، زىرە 0.5
گرام، سۆسۈن پوستلۇق سامساق 451 گرام، بوز بوغا، زەپەر،
زەنجۋىل، بەسباسە، قەلەمپۇر، قارىمۇچ، جويۇز، قوزاق دار-
چىن، كاۋاۋچىن، پىلىپپىنلارنىڭ ھەربىرىدىن 0.5 گرامدىن؛
مەشكە ماي 500 گرام، كالا سۈتى 810 مىللىلىتىر، ھەسەل
1000 گرام.

【تەييارلىنىشى】 سامساق يانچىلىپ سۈتكە سېلىنىپ،
سۇس ئوتتا تاكى ئۇماچ ھالىتىگە كەلگۈچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن
ئۇنىڭ سىم ئەگلەكتىن ئۆتكۈزۈلگەن سۈيىگە ھەسەل ۋە مەشكە
ماي سېلىنىپ قاينىتىلىپ، ھالۋا ھالىتىگە كەلتۈرۈلگەندىن
كېيىن ئۈستىگە سوقۇلغان دورىلارنىڭ قېلىن ئەگلەكتىن ئۆت-
كۈزۈلگەن تالقىنى سېلىنىپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ مەجۇن
تەييارلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننى قۇۋۋەتلەش، قاننى قىزىتىش،
بەدەندىكى زىيادە ھۆللۈكنى كېمەيتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش
قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 سوغۇق ۋە ھۆل ئىسسىق مېجىزدىكى ئاقكېسەل، بۆرەك ئاجىزلىق، پۇت - قول سىرقدى - راپ ئاغرىش، چاچ - ساقال ۋاقىتسىز ئاقىرىش ۋە مويلىرى ئاقىرىپ كەتكەن كېسەللەرگە ئىشلىتىلىدۇ. 【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم، 7 — 10 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 قۇرۇق ئىسسىق مېجىزىلىك كىشىلەرگە ئىشلىتىشكە توغرا كەلگەندە، مىقدارىنى كېمەيتىپ ياكى باشقا دورىلارغا يانداشتۇرۇپ (قوشۇپ) ئىشلىتىش لازىم.

II نۇسخا مەجۈنى سوم (سامساق مەجۈنى)

【تەركىبى】 ئاقلانغان سامساق 270 گرام، كاۋاۋچىن 6 گرام، سىيادان 36 گرام، زەنجىۋىل 18 گرام، جويۇز 6 گرام، خارخەسەك 18 گرام، پىلپىل 16 گرام، ئاقىرقەرھە 18 گرام، قارىمۇچ 16 گرام، خولىنجان 6 گرام، قەلەمپۇر 16 گرام، زەپەر 3 گرام، دارچىن 16 گرام، گۈل يېغى 36 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 سامساق سوقۇلۇپ 400 مىللىلىتىر كالا سۈتىدە تاكى سۈت سامساققا سېڭىپ بولغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن 400 گرام ھەسەل بىلەن قىيام قىلىنىدۇ. قازان ئوتتىن ئېلىنىپ گۈل يېغى ئېلىشتۇرۇلىدۇ. دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ، تاسقالغاندىن كېيىن قىيامغا ئارىلاشتۇرۇلۇپ مەجۈن تەييارلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق. 【ئىشلىتىلىش】

【خۇسۇسىيىتى】 زەھەر قايتۇرۇش، سوغۇق يەللەرنى يوقۇتۇش قاتارلىقلار. 【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاشقازان ئاجىزلىقى،

سوغۇقتىن بولغان ئاقكېسەل، پالەچ، ئۇنتۇغاقلىق، تىترەيدىر.
غان پالەچ، دەم سىقىلىش، تىل كالۋالىشىش، بەلغەملىك يۆ-
تەل، ئاۋاز بوغۇلۇش قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.
【مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 1 — 2 ۋاخ، 7 گرامدىن
ئىستېمال قىلىدۇ.

IV نۇسخا مەجۇنى سوم (سامساق مەجۇنى)
【تەركىبى】 ئاقلانغان قىزىل پوستلۇق سامساق 300 گرام،
سۈمبۈل 20 گرام، زىرە 40 گرام، بوز بوغا 20 گرام،
ئوغرىتىكەن 40 گرام، بەھمەن سەفت 20 گرام، قارا كۈنجۈت
40 گرام، مېھرىگىياھ 30 گرام، قوزاق دارچىن 20 گرام،
بەسباسە 5 گرام، زەنجىۋىل 20 گرام، سۈت 700 مىللىلىتىر،
ھەسەل 1000 گرام.

【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ قېلىن
ئەگلەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ، سامساق سويۇلۇپ يەنجىلگەندىن كې-
يىن، سۈتكە سېلىنىپ پەس ئوتتا تاكى ئۇماچ ھالىتىگە كەلگۈ-
چە قاينىتىلىپ، سىم ئەگلەكتىن ئۆتكۈزۈلگەن سۈيىگە ھەسەل
سېلىنىپ قاينىتىلىپ ھالۋا ھالىتىگە كەلتۈرۈلىدۇ، ئاندىن
ئۇنىڭغا تالقان دورىلار سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق. 【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننى قۇۋۋەتلەش، قاننى قىزىتىش،
بەدەندىكى زىيادە ھۆللۈكنى كېمەيتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش
قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىشى】 ھۆل سوغۇق مەجەزدىكى ئاقكېسەل ۋە
بەدەن قۇۋۋىتى ئاجىز (ئىممۇنىتېت كۈچى ئاجىز)، داۋالىنىپ
ساقىيىپ يەنە تېز قايتىلانغان تىپتىكى ئاقكېسەللەرگە ئىشلى-
تىلسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنىگە 1 — 2 قېتىم،
5 — 10 گرامدىن 1 — 2 داۋالاش كۈرسى بېرىلىدۇ.

مەجۇنى ئىتىرفىل بەرەس (I نۇسخا)
【تەركىبى】 سېرىق ھېلىلە، سانائى مەككى، كابۇل ھېلىلە-
لىسى پوستلىرىنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرامدىن؛ دوقو ئۇرۇقى
60 گرام، مەستىكى رۇمى 10 گرام، ئەپسەنتىن 15 گرام،
ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 90 گرام، ھەسەل 400 گرام.
【تەييارلىنىشى】 ئاۋۋال دورىلار سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن
كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق.
【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم، 8 —
15 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى
كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.
【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى يەللەرنى تارقىتىش، توسالغۇ-
لارنى ئېچىش، بەدەننى قىزىتىش بىلەن رەڭ ئىشلەش ئىقتىدارى-
نى كۈچەيتىش قاتارلىقلار.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل ۋە بەھەق كېسە-
لىلىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

مەجۇنى ئىتىرفىل بەرەس (II نۇسخا)
【تەركىبى】 كابۇل ھېلىلە پوستى 30 گرام، مەستىكى 19
گرام، زىرە 19 گرام، سانا 30 گرام، ئەپسەنتىن 15 گرام،
ياۋا سەۋزە ئۇرۇقى 60 گرام، ئۇرۇقى ئېلىنغان ئۈزۈم 90
گرام، ئىگىر 6 گرام، ھەسەل 730 گرام.
【تەييارلىنىشى】 يۇقىرىدىكى دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ئې-

لىنىدۇ، ئېزىپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلۈپ، كۆپۈكى ئېلىنغان
ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇلۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ. **【تەبىئىتى】** ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 قاننى تازىلاش، توسالغۇلار ئېچىش، خى-
لىتلارنى تەڭشەش قاتارلىقلار. **【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】** بەھەق، بەرەس (ئاقكې-
سەل) گە ئىشلىتىلىدۇ. **【ئىشلىتىلىش مىقدارى】** كۈنىگە 2 قېتىم، قايناق سۇ
بىلەن 6 — 8 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

مەجۇنى ئىتىرفىل كەبىر (I نۇسخا)
【تەركىبى】 كابۇل ھېلىلىسى پوستى، سېرىق ھېلىلە پوس-
تى، تازىلانغان ئامىلە، چىڭسەي ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن 20
گرامدىن؛ شەترەنجى ھىندى، جوۋنە، يالپۇزنىڭ ھەربىرىدىن
25 گرامدىن؛ سۈمبۇل، كالىي زىرە، لاچىنداننىڭ ھەربىرى-
دىن 10 گرامدىن؛ دارچىن 6 گرام، قارىمۇچ، ئاقمۇچ، نار-
مىشكى، نەمكى ھىندى (ھىندى تۈزى) نىڭ ھەربىرىدىن 12
گرامدىن؛ نۆشۈدۈر 13 گرام، ھەسەل 750 گرام. **【تەييارلىنىشى】** دورىلار سوقۇپ تاسقىلىپ، بادام يېغى
بىلەن نەمدىلىدۇ، ئاندىن كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى
ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق. **【ئىشلىتىلىش مىقدارى】** چوڭلار ھەر كۈنى 2 قېتىم،
6 — 12 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارنىڭ يېشىغا قاراپ
دورا مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ. **【خۇسۇسىيىتى】** ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، قاننى تازىلاش،
بەدەندىكى سوغۇق يەللەرنى تارقىتىش، مەجەزنى تەڭشەش، رە-

ئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاشقازان ئاجىزلىقى، بو-
لۇپمۇ سوغۇقتىن ئاشقازان مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى، قان قويۇق-
لۇق، ئۇنتۇغاقلىق، ئۇيقۇسىزلىق، ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارى ئا-
جىزلىشىش، ھەر خىل سەۋەبلىك جىگەر، ئاشقازان خىزمىتى ئا-
جىزلىشىش ۋە ھەر خىل تىپتىكى ئاقكېسەللەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】

(1) دورا مىقدارىنى بىمارنىڭ مېجەزىگە ئاساسەن مۇۋاپىق تەڭشەپ ئىشلىتىش كېرەك.

(2) ئاقكېسەلنى 20 نەچچە يىللىق كلىنىكىلىق داۋالاش جەريانىدا باشقا ئاقكېسەل دورىلىرىغا باشتىن - ئاخىر قوشۇپ ئىشلىتىش ئارقىلىق ئاشقازان - جىگەر خىزمىتىگە ھېچقانداق غىدىقلاش تەسىرىنىڭ يوقلۇقى، بەلكى ئاقكېسەلنىڭ ساقىيىش ئۈنۈمى ياخشى بولغانلىقى ئىسپاتلانغان.

(3) دائىرىسى كىچىك چاپما ئاقكېسەللەرگە بۇ خىل دورى-
نى خاس بېرىپ، كۈن نۇرىغا قاقلىغاندا ياخشى ئۈنۈم كۆرۈلگەن-
لىكى داۋالاش ئەمەلىيىتىدە بايقالغان.

مەجۈنى ئىتىرىفىل كەبىر (Ⅱ نۇسخا)

【تەركىبى】 كابۇل ھېلىلىسى پوستى، بەلىلە پوستىنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن؛ قارا ھېلىلە، ئامىلە پوستىنىڭ ھەر بىرىدىن 22 گرامدىن؛ قارىمۇچ، پىلىپىلنىڭ ھەر بىرىدىن 18 گرامدىن؛ شاقاقول مىسىرى، زەنجىۋىل، سېرىق تۇدرى، قىزىل تۇدرى، لىسانىل ئاساپىر، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھ-
مەن، ناۋات، ھەببى قەلقل، كۈنجۈت، ئاق كۆكنارنىڭ ھەر بى-
رىدىن 7 گرامدىن؛ بادام يېغى 50 مىللىلىتىر، ھەسەل 570
گرام.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ھەر خىل ئاشقازان كېسەللىكلىرى، خۇسۇسەن كونا ئاشقازان كېسەللىكى، نېرۋا ئاجىزلىقى، يەلدىن بولغان بوۋاسىر كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، سەمىرىتىش، پەينى چېكىتىش رولىغا ئىگە.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈنىگە 1 قېتىم، ئاستىدا 4 — 6 گرامدىن ئەرەقى گاۋزىيان بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

مەجۇنى ئىتىرىفىل ھامانى

【تەركىبى】 كابۇل ھېلىلىسى پوستى 60 گرام، بەلىلە پوستى 30 گرام، تازىلانغان ئامىلە 30 گرام، ئۈستقۇددۇس 21 گرام، سېرىقئوت 30 گرام، بىستىپايەنچ 21 گرام، بەرەڭگى كابۇل 30 گرام، غارىقۇن 15 گرام، تۇربۇت پوستى 45 گرام، كۈندۈر 9 گرام، شەترەنجى ھىندى 6 گرام، قۇستى شېرىن 9 گرام، سەئىدكۆپى 9 گرام، مەستىكى رۇمى 6 گرام، زەنجىۋىل 9 گرام، قەلەمپۇر 6 گرام، زوپاخوشكى 9 گرام، يالپۇز 6 گرام، قارىمۇچ 12 گرام، پىلىپىل 12 گرام، تارمىشكى 12 گرام، ھەسەل 1180 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇلۇپ تاسقىلىپ، كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ تەييارلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 7 — 15 گرامدىن بېرىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 قاننى تازىلاش، تېرىگە رەڭ بېرىش ۋە تېرىنىڭ رەڭ ئىشلەش ئىقتىدارىنى ئىلگىرى سۈرۈش، يەللەرنى

تارقىتىش قاتارلىق تەسىرگە ئىگە. **【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】** ئاقكېسەل، كالا تەمرەتە-
كىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

مەجۇنى ئىتىرىفىل سەغىرى
【تەركىبى】 سېرىق ھېلىلە پوستى، كابۇل ھېلىلىسى پوس-
تى، بەلىلە پوستى، ئامىلە مۇقەششەرنىڭ ھەربىرىدىن 35
گرامدىن، ھەسەل 420 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇلۇپ تاسقىلىپ، كۆپۈكى
ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. **【تەبىئىتى】** مۆتىدىل.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنىگە 2 قېتىم،
6 — 10 گرامدىن بېرىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى
كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، قاننى تازى-
لاش، ھەزىمنى كۈچەيتىش قاتارلىق تەسىرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 نېرۋا ئاجىزلىقى، باش
ئاغرىش ۋە قىيىش، ھەرخىل ئاشقازان ئاجىزلىقلىرى، يۈرەك
ئاجىزلىقى، بوۋاسىر كېسىلى ۋە سەپرا - سەۋدانىڭ زىيادىلىكى-
دىن بولغان چاچ ئاقىرىش، ئاقكېسەللەرگە بېرىلىدۇ.

مەجۇنى ئەفئال (I نۇسخا)
【تەركىبى】 ئاق يەر يىلىنى 20 گرام، سۈپۈرگە ئۇرۇقى
30 گرام، زىرە 10 گرام، سوزاپ يوپۇرمىقى 30 گرام،
زەرچىۋە 10 گرام، ھەسەل 300 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلارنى سوقۇپ تاسقاپ، كۆپۈكى ئې-
لىنغان ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرسا بولىدۇ.

گرامدىن؛ سەبىرى 32 گرام، ھەسەل 192 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ،
سوقۇپ تاسقالغاندىن كېيىن، كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەلگە تەكشى
ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.
【خۇسۇسىيىتى】 غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاش، تو-
سالغۇلارنى ئېچىش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش ۋە تازىلاش، قويۇق
بەلغەمنى سۈرۈپ چىقىرىش، ئاغرىق پەسەيتىش قاتارلىق تەسىر-
لەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 بەرەس، بەھەق ۋە ھەر
خىل تېرە كېسەللىكلىرى، باش ئاغرىقى، پالەچ، لەقۋا، بوغۇم
ئاغرىقى رېماتىزم ئاغرىقلىرىنى داۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈنىگە 1 قېتىم، 4 — 6 گرام.
دىن، ئۇخلاشتىن ئىلگىرى قايناق سۇ ياكى ھەسەل سۈيى بىلەن
ئىچىلىدۇ.

【ئەسكەرتىش】 ئايارەجلەر ئۆز تەركىبى بىلەن بۆرەككە زد-
يان قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، دورا ئىستېمال قىلىدىغان چاغدا
مۇۋاپىق مىقداردا چىلان يەپ بېرىش لازىم. چۈنكى، چىلان بۇ
دورىنىڭ ئەكس تەسىرىنى يوقىتىدۇ. ئايارەجلەرگە ئىتىرىفل-
لەرنى قوشۇپ ئىستېمال قىلسا مېڭىنى، گۈلقەنت قوشۇپ ئىس-
تېمال قىلسا ئاشقازاننى تازىلايدۇ. شۇڭا، ئۇنى مۇۋاپىق دورىلار
بىلەن بىرگە ئىستېمال قىلىش كېرەك.

مەجۈنى جاۋارش كۈمۈنى

【تەركىبى】 زىرە مۇدەببەر 200 گرام، قېلىن دارچىن 8
گرام، قارىمۇچ 60 گرام، نېپىز دارچىن 8 گرام، زەنجىۋىل
80 گرام، سۈمبۈل 8 گرام، سۇزاپ ياپرىقى 80 گرام، بىلسان

ئۇرۇقى 8 گرام، توغرىغا 20 گرام، مەستىكى 8 گرام،
دارچىن 8 گرام، ھەسل 1464 گرام. 【تەييارلىنىشى】

زىرە توپا - ئەخلەتلىرىدىن ئايرىلىپ قاچى-
غا سېلىنىپ، ئۈستىگە تۆت ئىلىك يۇقىرى نىسبەتتە سىركە
قويۇلىدۇ ۋە بىر كېچە - كۈندۈز تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن سۈزۈ-
ۋېلىنىپ سايە يەردە قۇرۇتۇلىدۇ، ئاندىن ئازراق ئىسسىق ئۆتكۈ-
زۈپ قۇرۇتۇلۇپ چالا سوقۇلىدۇ. بۇ زىرە مۇدەببەر دېيىلىدۇ.
زىرىدىن باشقا دورىلار سوقۇپ تاسقىلىدۇ. كۆپۈكى ئېلىنغان
ھەسلەگە توغرىغا ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. قالغان دورىلار توغرىغا ئا-
رىلاشتۇرۇلغان ھەسلەگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ مەجۈن تەييار-
لىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق. 【خۇسۇسىيىتى】 ئاغرىق توختىتىش، ئىشتىھانى ياخشىلاش
تەسىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ھەر خىل ئاشقازان، 12
بارماق ئۈچەي ئاغرىقلىرى ۋە يارىلىرى، ئۈچەي - ئاشقازان ۋە
بەدەندىكى يىل، شۇنداقلا ئاياللارنىڭ بالىياتقۇ يىل كېسىلى،
يېڭىدىن يۈز بەرگەن سېرىقئەت يىرتىلىش (گىرىث) كېسەللىك-
لىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈنگە 1 قېتىم، 3 — 4 گرام.
دىن ئىستېمال قىلىنىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى
ئازايتىپ بېرىلىدۇ.

مەجۈنى چۆبچىن

【تەركىبى】 قەلەمپۇر، جويۇز، بەسباسە، قىزىلگۈل، زە-
پەر، زەرچىۋە، خولىنجان، سۆڭى كۈپىنىڭ ھەربىرىدىن 4
گرامدىن؛ زەنجۈل، پىلىپىل، ئاقىرقەرھە، جەدۋارنىڭ ھەربى-
رىدىن 4 گرامدىن.

【تەسىرى】 يۈرەك، مېڭە، تال، جىگەر، بۆرەك ۋە باشقا ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، رەڭگىروينى گۈزەللەشتۈرۈش، چاچ - مويلارنى قارايتىش، ئېغىز سېسىق پۇراشنى يوقىتىش تەسىرلىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 نېرۋا ئاجىزلىق، يۈرەك كېسىلى، تۇتاقلىق، نېرۋا كېسەللىكلىرى، ئاقكېسەل ۋە ۋا. قىتسىز چاچ ئاقىرىش كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىدۇ، ئىشتىھا - سىزلىق ۋە جىنسىي ئاجىزلىقنى داۋالايدۇ. داۋاملىق ئىستېمال قىلسا ئادەمنى تېتىكلەشتۈرىدۇ، خۇشخۇي قىلىدۇ، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ. قېرىشنى كېچىكتۈرىدۇ، زېھنىنى ئاچىدۇ، ئىستىسقىنىڭ باشلىنىشىدا ئىشلىتىلسە تېز تەسىر قىلىدۇ.

【ئىشلىتىش مىقدارى】 كۈندە 2 قېتىم، 5 — 9 گرامدىن ئەتىگەن - كەچتە تاماقتىن ئىلگىرى ئىستېمال قىلىنىدۇ. بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى ئازايتىپ بېرىلىدۇ.

مەجۇنى زەرئۇنى

【تەركىبى】 قارىمۇچ، پىلىپىل، زەنجىۋىل، نېپىز دار - چىن، دارچىن، قەلەمپۇر، خولىنجاننىڭ ھەربىرىدىن 40 گرامدىن؛ قىزىل تۇدرى، ئاق تۇدرى، قىزىل بەھمەن، ئاق بەھمەن، بوزىدان، ئەرمىدۇن ئۇرۇقى، تاتلىق قۇستە، سۆڭىدى ھىندى، سۈمبۈلنىڭ ھەربىرىدىن 120 گرامدىن؛ كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەل 4000 گرام.

【تەييارلىنىشى】 يۇقىرىقى دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ تاسىقىنىپ، ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇلۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، پەينى چىدەتتىدۇ، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەپ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 جىنسىي ئاجىزلىق، پەي بوشاپ كېتىش، ئىشتىھا تۇتۇلۇش، ئاشقازان خىزمىتى ناچارلىشىش، ئاغزىدىن شالى ئېقىش، لەقۇا، پالەچلىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈندە 1 قېتىم، 5 — 6 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

مەجۇنى ئىتىرىفىل ئۇستقۇددۇس
【تەركىبى】 سېرىق ھېلىلە پوستى، ئاق تۇرپۇت، كابۇل ھېلىلىسى پوستى، بىستىپايەنچ، بەلىلە پوستى، ئۇستقۇددۇس، قارا ھېلىلە، سانا، مەستىكى، ئامىلە، ۋاسالغۇنىڭ ھەربىرىدىن 22 گرامدىن؛ ھەسەل 792 گرام.
【تەييارلىنىشى】 يۇقىرىدىكى دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھا-زىرلىنىپ، سوقۇپ تاسقالغاندىن كېيىن بادان يېغى بىلەن ياغلىنىدۇ، ئاندىن ھەسەلگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق.
【خۇسۇسىيىتى】 ئاغرىق توختىتىدۇ، چاپنى قارايتىدۇ، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 باش ئاغرىقى، نېرۋا ئاجىزلىق، بەلغەم-سەۋدامەنبەلىك كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىلىش مىقدارى ۋە ۋاقتى】 كۈنىگە 1 قېتىم ئاشتىدا ياكى ئۇخلاش ئالدىدا 3 — 5 گرامدىن، گاۋزىبان ئەرەقى بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

مەجۇنى مەسھا

【تەركىبى】 قىزىلگۈل، زۆرەمبات، ئاقىرقەرھا، زەپەر، سۆدى كۆپى، جويۇز، قەلەمپۇر، قاقىلە، سۈمبۇل، لاچىندا- نە، مەستىكىنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن؛ قەنت، ھەسەل 220 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ تاسقىلىدۇ، قەنت گۈلاپ بىلەن قىيام قىلىنىپ، ھەسەلنىڭ كۆپۈكى ئېلىندۇ. خاندىن كېيىن بىرلەشتۈرۈلىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا تالقانلار سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. 【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 مەنىي تۇتۇش، ئاشقازاننى تازىلاش، نېر- ۋىنى تىنچلاندۇرۇش، چاچنى قارايتىش تەسىرلىرىگە ئىگە. 【ئىشلىتىلىشى】 ئاشقازان ئاغرىقى، ئومۇمىي بەدەن ئاجىز- لىق، مەنىي تېز كېتىش، مېڭە، نېرۋا ئاغرىقلىرى، بوغۇملار ئاغرىش، ياش تۇرۇپ چاچ ئاقىرىپ كېتىشلەرنى داۋالاش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈندە 1 قېتىم، 4 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ. بالىلارغا ئەھۋالىغا قاراپ مىقدارى مۇۋاپىق ئازايتىپ بېرىلىدۇ.

مەجۇنى داۋائىلمىشكى شېرىن

【تەركىبى】 زۆرەمبات، دۇرۇنەج، ئىقرەبىي، مەرۋايىت، كەھرېۋا، مارجان يىلتىزىنىڭ ھەربىرىدىن 40 گرامدىن؛ قىر- قىلغان پىلە غوزىسى، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، سازەج، سۈمبۇل، قاقىلە، قەلەمپۇرنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن؛ ئۆشەنە، پىلىپىل، زەنجۈلنىڭ ھەربىرىدىن 16 گرامدىن، مۇش-

كى (ئىپار) 8 گرام، كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەل 1188 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلاردىن ئىپار بىلەن پىلە غوزىسىدىن
باشقىلىرى يۇمشاق سوقۇلۇپ تاسقىلىدۇ. پىلە غوزىسى ئەگەك-
تىن ئۆتكۈدەك يۇمشاق قىرغىلىپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن ئىپار
سالايە قىلىنىپ، خام ھەسەل بىلەن ئوبدان ئارىلاشتۇرۇلىدۇ،
ئاندىن تاسقالغان باشقا دورىلار ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ تەكشى ئارىلاش-
تۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق. پىلىدە ۋەلىدە نەلىدە پالەك سەدە
【خۇسۇسىيىتى】 يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇ-
رۇش، كەيپىياتنى خۇشال قىلىش تەسىرلىرىگە ئىگە.
【ئىشلىتىلىشى】 يۈرەك كېسەللىكلىرى، پالەك، يىقىلما
(سەرئى)، تۇتاقلىق، ئەسەبىيلىك كېسەللىكلىرى، 4 كۈندە 1
قېتىم تۇتىدىغان تەپ (بەزگەك) كېسىلى ۋە ساراڭلىق، ھامىلىدە
دارلىق مەزگىلىدىكى يەل كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈندە 1 قېتىم، 3 گرامدىن
ئىستېمال قىلىنىدۇ. بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى كېمەي-
تىپ بېرىلىدۇ.

قىزىلگۈل گۈلۈقەنتى
【تەركىبى】 قىزىلگۈل بەرگى 1000 گرام، شېكەر 3000
گرام.

【تەييارلىنىشى】 يېڭىدىن ئېچىلغان قىزىلگۈل ئۈزۈۋېلىدە-
نىپ، بەرگىلىرىنىڭ ئاستى تەرىپى (ئاق يېرى) كېسىۋېتىلگەندە-
دىن كېيىن، بىر ھەسسە گۈلگە ئۈچ ھەسسە شېكەر ياكى ھەسەل
قوشۇلۇپ، ئۆزىگە ئالغۇدەك دەرىجىدە ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، ئاندىن
ئەينەك شېشىگە قاچىلىنىپ، ئاغزى مەھكەم ئېتىلىپ، 40 كۈن
ئاپتاپتا تۇرغۇزۇلىدۇ. ئاپتاپتا تۇرغان مەزگىلدە كۈندە بىر

قېتىم ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. ئەگەر دورا قۇرۇپ قېتىپ قېلىش ئەھۋالى كۆرۈلسە، ئەرەقى گۈلاپتىن ئازراق قۇيۇپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 شېكەر قوشۇلغىنى مۆتىدىل؛ ھەسەل بىلەن تەييارلانغىنى ئىسسىق ھەم قۇرۇق بولىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 ئاشقازان، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، كېسەل سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان، بەدەندە يۆتكىلىپ يۈرۈپ ئاغرىتىدىغان يەللەرنى تارقىتىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىشى】 ئاشقازان، نېرۋا كېسەللىكلىرى، مۇپا-سىل، پالەچ ھەم بەدەندىكى يۆتكىلىپ ئاغرىتىدىغان يەللەر ئۈ-چۈن ئىشلىتىلىدۇ.

【مىقدارى】 كۈنگە 1 قېتىم، 8 — 15 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

مەجۈنى خېمىرى مەرۋايىت

【تەركىبى】 تېشىلىمىگەن مەرۋايىت 10 گرام، ئەرەقى گۈ-لاپ 10 مىللىلىتىر، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، يۇمىخاقسۇت ئۇرۇقى، كاسىنە گۈلى، فەرەنجى مۈشكى، گاۋزىبان، بادىرە-جىبۇيا ئۇرۇقى، كاسىنە ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن 6 گرامدىن؛ ناۋات 200 گرام، ئەرەقى گاۋزىبان 10 مىللىلىتىر، قىرقل-غان پىلە غوزىسى 10 گرام، ئىپار، ئەنەبىر 1 گرامدىن، ئالما شەربىتى 100 مىللىلىتىر، ئامىلە مۇرابباسى 100 گرام.

【تەييارلىنىشى】 مەرۋايىت گۈلاپ ۋە ئەرەقى گاۋزىبان بى-لەن سالايە قىلىنىپ، ئۈپىدەك ئېزىلگەندىن كېيىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. ناۋات گۈلاپ بىلەن قىيام قىلىنىپ ئالما شەربىتى ۋە مۇراببالار بىلەن ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، ئاندىن بۇنىڭغا تالقانلار

سېلىنىپ خېمىر قىلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 سوغۇق.

【خۇسۇسىيىتى】 رەئىس ئەزالار خىزمىتىنى ياخشىلاش،

بولۇپمۇ يۈرەك، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش رولىغا ئىگە.

【ئىشلىتىلىشى】 يۈرەك، مېڭە، جىگەر كېسەللىكلىرىگە

بېرىلىپ، رەئىس ئەزالارنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاش مەقسەت

قىلىنىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 ھەر كۈنى كەچتە 1 قېتىم، 1

گرامدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

【تەبىئىتى】 سوغۇق.

【خۇسۇسىيىتى】 يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى

تىنچلاندۇرۇش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

مەجۈنى خېمىرى گاۋزىبان

【تەركىبى】 گاۋزىبان، بالەنگۈ ئۇرۇقى، ئاقلانغان يۇمىغا.

سۈت ئۇرۇقى، ئاق سەندەل كېپىكى، قىرقلانغان پىلە غوزىسى،

فەرەنجى مۈشكى، ئاق بەھمەننىڭ ھەربىرىدىن 9 گرامدىن؛

ئىپار، كۆيدۈرۈلگەن مەرۋايىتنىڭ ھەربىرىدىن 0.75 گرام.

دىن؛ ناۋات 360 گرام، ئەنەبىر 1.5 گرام.

【تەييارلىنىشى】 يۇقىرىدىكى دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھا.

زىرلىنىپ، ئەنەبىر، مەرۋايىت، ئىپار، ناۋاتتىن باشقىلىرى چالا

سوقۇلۇپ 1000 مىللىلىتىر سۇغا بىر كېچە - كۈندۈز چىلىند.

دۇ، ئاندىن ئۈچتىن بىر قىسمى قالغۇچە قاينىتىلىپ، «دورا»

سۈزۈۋېتىلىپ، سۈيىگە ناۋات سېلىنىپ قىيام قىلىنىدۇ. ئاندىن

قىيام ئىلمان ھالغا كەلگەندە يۇمشاق سوقۇپ تاسقاپ تەييار.

لانغان ئىپار، ئەنەبىر، مەرۋايىت قاتارلىقلار سېلىنىپ تەكشى

ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل سوغۇق.

【خۇسۇسىيىتى】 مېڭە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى

تىنچلاندۇرۇش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىشى】 مېڭە، يۈرەك كېسەللىكلىرى، نېرۋا ئا-
جىزلىقى، خاپىغان، تۇتقاقلىق، ئايلىنىپ كېتىش كېسەللىكى
قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈنگە 2 قېتىم، تاماقتىن كې-
يىن 1.5 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

مەجۇنى شۇشۇنىز (سىيادان مەجۇنى)
【تەركىبى】 سىيادان 150 گرام، ھەسەل 750 گرام، توم
زەنجىۋىل 100 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار تەلەپكە لايىق تازىلانغاندىن كېيىن
سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن ھەسەل ئېرىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىنىدۇ.
تىلىپ، سوۋۇغاندىن كېيىن، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلگەن دورىلار
سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.
【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننى قىزىتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش،
چاچلارنى قارايتىپ جۇللاندۇرۇش (پارقىرىتىش) قاتارلىقلار.
【ئىشلىتىلىشى】 سوغۇق مەجەز تىپىدىكى ئاقكېسەل ۋە
تۈكلەر ئاقىرىش خاراكتېرلىك ھەر خىل ئاقكېسەللەرگە، چاچ-
ساقال، قاش- كىرىپكەلەرنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىپ كېتىشى قاتار-
لىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنگە 2 — 3 قېتىم،
5 — 10 گرامدىن 2 — 3 داۋالاش كۈرسى بېرىلىدۇ.

【ئەسكەرتىش】 بۇ خىل دورا نۇسخىسىنى قەشقەر ۋىلايەتلىك
ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى تېرەكېسەللىكلەر بۆلۈمى 1990-،
1991- يىللىرى 31 نەپەر ئاقكېسەل بىمارغا مەخسۇس ئىشلى-
تىپ كلىنىكىدا كۆزىتىپ ئۈنۈم بېرىش نىسبىتىنىڭ %92.8
بولغانلىقىنى بايقىغان. بىمار 25 — 90 كۈن داۋالانغان بولۇپ،

بىر قىسىم بىمارلار دورىنى ئىستېمال قىلىپ 7 — 20 كۈن ئىچىدە ئاق داغ ئورنىغا خال چىققان، بەزىلەردىكى ئاق داغ چۆرىسىدىن مەركىزىگە قاراپ تېز سۈرئەتتە قورۇلغان.

مەجۈنى چالاپا گۈلقەنت
【تەركىبى】 چالاپا 7 گرام، گۈلقەنت ئاپتاپى 21 گرام.
【تەييارلىنىشى】 چالاپا ئۆلچەم بويىچە ھازىرلىنىپ، يۈم-شاق سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن گۈلقەنتكە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ۋە غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى سۈرۈش ھەم ئۈچەيدىكى ئارتۇق ھۆل-لۈكلەرنى سۈرۈشتەك تەسىرى ئارقىلىق خىلىتلارنى نورماللاشتۇرىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 قۇرامغا يەتكەنلەر ناشىدا 28 گرام دورىنى قايناق سۇ بىلەن بىراقلا ئىچىدۇ. دورىنى ئىچكەندىن كېيىن ھەرىكەت قىلىپ بېرىش تەلەپ قىلىنىدۇ.
【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】

(1) بۇ دورىنى تومۇز كۈنلىرى ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك.

(2) قېرى، تېنى ئاجىز كىشىلەر، ھامىلىدار ۋە ھەيز مەزگىلىدىكى ئاياللار، سوزۇلما كېسەللىك بىلەن ئۇزاق مۇددەت ئاغرىق ئازابى تارتقانلار ۋە كىچىك بالىلارغا بەرمەسلىك ياكى مىقدارىنى كېمەيتىپ ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك.

(3) دورىنى ئىچكەندىن كېيىن، قايناق سۇنى كۆپرەك ئىچىپ بېرىش، 2 سائەت ئارىلىقىدا تاماق يېمەسلىك كېرەك.

(4) دورىنى ئىچكەندىن كېيىن 4 — 6 سائەتكىچە ئىچ سۈرۈش ئالامىتى روشەن كۆرۈلمىسە كىندىك ئەتراپىنى يەڭگىل

ئۇۋۇلاش ياكى ئورنىدا تۇرۇپ سەكرەپ بېرىش ئارقىلىق ئۈچەي ھەرىكىتىگە ياردەم بېرىش كېرەك. (5) ئاشقازان - ئۈچەي كېسەللىكى بارلارغا ئىشلەتمەسلىك كېرەك.

مەجۇنى كالىي زىرە (I نۇسخا)
【تەركىبى】 كالىي زىرە ئۇرۇقى 222 گرام، ئاقىرقەرھە، ئاق تۇرپۇت پوستى، تۆم زەنجۋىلىنىڭ ھەربىرىدىن 44 گرام-دىن؛ ھەسەل 1000 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ، تازىلانغاندىن كېيىن يۇمشاق سوقۇلىدۇ ۋە تاسقىلىدۇ. ھەسەل ئېرىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىنىپ، سىرلىق قاچىغا تۆكۈلىدۇ، يەنە بىر قازانغا مۇۋاپىق مىقداردا سۇ قويۇلۇپ قاينىتىلغاندىن كېيىن، سۇ ئۈستىگە ھەسەل بار قاچا سېلىنىپ پەس ئوتتا تاكى ھەسەل ئېرىپ ئۈستىگە كۆپۈكى چىققۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن قاچا يەرگە ئېلىنىپ ھەسەل سوۋۇغاندىن كېيىن، سوقۇلغان دورىلار تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ۋە پۈتۈنلەي سوۋۇپ بولغۇچە قاچا ئاغزى ئوچۇق قويۇلىدۇ.
【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننى قىزىتىش، زىيادە ھۆللۈكلەرنى ئازايتىش، مېجەزنى نورماللاشتۇرۇش، تېرىنىڭ رەڭ ئىشلەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، تېرە خالىرىنى جانلاندۇرۇش ۋە خال پەيدا قىلىش قاتارلىقلار.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، تاماق-تىن كېيىن 10 — 15 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. 10 ياشتىن تۆۋەن بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ كۈنىگە 3 قېتىم، 4 — 7 گرامدىن بېرىلىدۇ.

【دققەت قىلىدىغان ئىشلار】
(1) بۇ خىل دورا قۇرۇق سوغۇق مېجەزلىك كىشىلەرگە بەكمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ.
(2) دورىنى دەسلەپكى 10 كۈندە يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن مىقدار بويىچە ئىشلىتىپ، كېيىن بىمارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ مىقدارىنى كۆپەيتسە بولىدۇ.

مەجۇنى كالىي زىرە (Ⅱ نۇسخا)
【تەركىبى】 كالىي زىرە 100 گرام، ئاقىرقەرھە 30 گرام، تۇربۇت، رەنجبۇل، سىيادان، گۈل دارچىنىنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن؛ ھەسەل 600 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئۆلچەم بويىچە ھازىرلىنىپ تازىلانغاندىن كېيىن، سوقۇپ تاسقىلىدۇ. ھەسەل سىرلىق قالدۇرۇپ ئېرىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىنىپ سوۋۇتۇلغاندىن كېيىن، تال-قان دورىلار سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.
【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.
【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننى قىزىتىش ۋە قۇۋۋەتلەش، تېرىگە رەڭ بېرىش ۋە تېرە خاللىرىنى جانلاندۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.
【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 5 — 10 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ. 10 كۈندىن كېيىن مىقدارنى بىر ئاز كۆپەيتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ. بالىلارغا بېرىلىدىغان دورا مىقدارىنى ئەھۋالغا قاراپ بېكىتسە بولىدۇ.

مەجۇنى كالىي زىرە (Ⅲ نۇسخا)
【تەركىبى】 كالىي زىرە ئۇرۇقى 60 گرام، ئاقىرقەرھە 30

گرام، بىخ كەبىر 30 گرام، ھەسەل 450 گرام، شەترەنجى ھىندى 30 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ، سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ھەسەل سىرلىق قاچىدا ئېرىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىۋېتىلىدۇ، سوۋۇغاندىن كېيىن تالقان دورىلار سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 مەجۇنى كالىي زىرە I نۇسخا بىلەن ئوخشاش.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە 2 — 3 قېتىم، تاماقتىن كېيىن 5 — 10 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. ئىستېمال قىلىشقا باشلاپ 10 كۈندىن كېيىن دورا مىقدارىنى تەدرىجىي كۆپەيتسە بولىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ دورا مىقدارى بەلگىلىنىدۇ.

مەجۇنى باپىچى (I نۇسخا)

【تەركىبى】 سىيادان 90 گرام، باپىچى ئۇرۇقى 270 گرام، ئوغرىتىكەن 90 گرام، قارا ھېلىلە 45 گرام، زەنجىۋىل 45 گرام، ھەسەل 1800 گرام، قىزىل قىچا 45 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىدۇ، تازىلىنىپ يۇمشاق سوقۇلىدۇ ۋە تاسقىلىدۇ. ھەسەل سىرلىق قاچىدا ئېرىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىۋېتىلىدۇ ۋە سەل سوۋۇغاندىن كېيىن تالقان دورىلار سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىگە رەڭ بېرىش، تېرىنىڭ رەڭ ھا- سىل قىلىش ئىقتىدارىنى ئىلگىرى سۈرۈش، خال پەيدا قىلىش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللەكلەر】 ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم،
5 — 10 گرامدىن ئەھۋالغا قاراپ تاماقتىن كېيىن ئىستېمال
قىلىدۇ. 【نۇسخا】

مەجۇنى باپىچى (I نۇسخا)
【تەركىبى ۋە تەييارلاش ئۇسۇلى】 باپىچى ئۇرۇقى، چىڭ-
سەي ئۇرۇقى، چىڭگىت مېغىزى، نېلۇپەرگۈلى قاتارلىقلار ئوخ-
شاش مىقداردا ئېلىنىپ يۇمشاق سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن
ئۇلارنىڭ ئومۇمىي مىقدارىغا ئۈچ ھەسسە قارا شېكەر ياكى
ھەسەل قوشۇلۇپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ تەييارلىنىدۇ.
【خۇسۇسىيىتى ۋە ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】

مەجۇنى باپىچى I نۇسخا بىلەن ئوخشاش.
【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم،
تامماقتىن كېيىن 5 — 8 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. كىچىك
بالىلارغا ئىشلىتىشكە توغرا كەلسە مىقدارى يېشىغا قاراپ كېمەي-
تىپ بېرىلىدۇ. 【نۇسخا】

مەجۇنى كەرۋىيا (I نۇسخا)
【تەركىبى】 كەرۋىيا ئۇرۇقى 445 گرام، زەنجىۋىل، پوس-
تى تۇرپۇت، ئاقىرقەرەھانىڭ ھەر بىرىدىن 145 گرامدىن؛ ھە-
سەل 2640 گرام. 【نۇسخا】
【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ پا-
كىز تازىلىنىدۇ ۋە سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ھەسەل ئېرىتىلىپ كۆ-
پۈكى ئېلىۋېتىلىپ، بىر ئاز سوۋۇغاندىن كېيىن تالقان دورىلار
سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، قاچىنىڭ ئاغزىنى مەجۇن
سوۋۇمغۇچە يېپىشقا بولمايدۇ. 【تەبىئىتى】 ئىسسىق. 【نۇسخا】

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى يەل ۋە سوغۇقنى ھەيدەيدۇ؛ قاننى تازىلايدۇ، يىغىلىپ قالغان غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى پىشۇرۇپ تازىلايدۇ. پۈتۈن بەدەن ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ. تېرىنىڭ رەڭك ھاسىل قىلىش قابىلىيىتىنى كۈچەيتىپ، تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل، بولۇپمۇ تۈك-لەر ئاقىرىش تىپىدىكى ئاقكېسەلنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. 【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 10 — 15 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بۇ نۇسخىنى مەجەزى قۇرۇق سوغۇق ۋە قۇرۇق ئىسسىق كىشىلەر ئۈزۈلدۈرمەي ئىستېمال قىلسا ئۈنۈمى بەك ياخشى بولىدۇ. ئاشقازان - ئۈچەي يوللىرى خىزمىتىدە مەسىلە بارلارغىمۇ ئەكس تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.

مەجۇنى كەرۋىيا (Ⅱ نۇسخا)
【تەركىبى】 كەرۋىيا ئۇرۇقى 300 گرام، قارا كۈنجۈت، ئوغرىتىكەن، زەنجىۋىلىنىڭ ھەر بىرىدىن 60 گرامدىن؛ ھەسەل 1440 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ پا-كىز تازىلىنىدۇ ۋە سوقۇپ تاسقىلىدۇ (ئوغرىتىكەن پەس ئوتتا سارغايغۇچە قورۇلىدۇ). ھەسەل پەس ئوتتا ئېرىتىلىپ، كۆپۈ-كى ئېلىۋېتىلىپ بىر ئاز سوۋۇغاندىن كېيىن تالقانلار سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق. 【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 مەجۇنى كەرۋىيا (Ⅰ نۇسخا) بىلەن ئوخشاش بولغاندىن باشقا،

چاچ - ساقالنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىپ كېتىشى، بەھەق كېسىلى ۋە ئۇزاق يىللىق ئاق كېسىللەرگە بىرقانچە داۋالاش كۈرىسى ئۈزۈلدۈرمەي ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

【ئىشلىتىش مىقدارى ۋە دىققەت قىلىدىغان نىشلار】 مەجۈنى كەرۋىيا I نۇسخىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

مەجۈنى پىلىپىل بەرەس
【تەركىبى】 پىلىپىل، قارىمۇچلارنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن؛ ئاق يەر يىلىنى بىر دانە، ئاقىرقەرھا، كابۇل ھېلدەلىسى پوستى، سىيادان، ئامىلە مۇقەششەر، قارا كۈنجۈتنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن؛ ناۋات 20 گرام، ھەسەل 270 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئۆلچەم بويىچە ھازىرلىنىپ تازىلىنىدۇ ۋە ناۋاتتىن باشقىلىرى بىرلەشتۈرۈلۈپ سوقۇپ تاسقىلىنىدۇ (ناۋات ئايرىم سوقۇلىدۇ). ھەسەل ئېرىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىنىدۇ. ناۋات ھەم تالقان دورىلار تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. ھەسەل بىر ئاز سوۋۇغاندىن كېيىن دورىلارنىڭ ھەممىسى بىرلەشتۈرۈلۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ھەمدە مەجۈن پۈتۈنلەي سوۋۇپ بولمىغۇچە قاچىنىڭ ئاغزىنى يېپىشقا بولمايدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى سوغۇق يەل ۋە ھۆللۈكلەرنى ھەيدەيدۇ. زىيادە ھۆللۈك ۋە غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى نورماللاشتۇرۇپ، مەجەزنى تەڭشەيدۇ. بەدەننى قىزىتىپ تېرىنىڭ رەڭ ھاسىل قىلىش ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل ۋە سوغۇقتىن بولغان بەھەق (گۈللۈك تەمرەتكە) كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە 2 — 3 قېتىم،
تامماقتىن كېيىن 8 — 15 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. تېنى
ئاجىز، ياشانغان كىشىلەر ۋە بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ مىقدارىنى
كېمەيتىپ بەرسە بولىدۇ.

2. كۇمىلاچ دورىلار

ھەبىي ئايارەنج پەيقرى
【تەركىبى】 سۇمبۇل، ئودىلسان، دارچىن، ئاسارۇن،
مەستىكى رۇمى، زەپەر، ھەبىي بىلساننىڭ ھەر بىرىدىن 5 گرام-
دىن؛ سەبرى 10 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ،
يۇمشاق سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن ئەرەقى بەدىيان بىلەن خېمىر
قىلىنىپ كۇمىلاچ تەييارلاش قائىدىسى بويىچە 0.2 گراملىقتىن
كۇمىلاچ قىلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.
【خۇسۇسىيىتى】 بەدەن ۋە مېڭىدىكى غەيرىي تەبىئىي ھۆل-
لۈكلەرنى چىقىرىش ۋە باش ئاغرىقىنى پەسەيتىش تەسىرىگە
ئىگە.

【ئىشلىتىلىشى】 پالەچ، لەقۋا، ھۆللۈك زىيادىلىكتىن
بولغان كېكەچلىكنى داۋالاش، ئاشقازان ۋە ئۈچەيلەرنى پاكىز-
لاش، سوغۇقتىن بولغان ئاقكېسەل، كالا تەمرەتكىسى، بېغىش
ئاغرىقلىرىنى پەسەيتىش، قەي قىلدۇرۇش قاتارلىقلارغا ئىشلى-
تىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈندە 1 — 2 قېتىم، ئاچ قور-
ساق چاغدا ھەسەل سۈيى ياكى قايناق سۇ بىلەن 7 — 11 دانىدىن

ئىستېمال قىلىنىدۇ. بالىلارغا مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

ھەببى قوقىيا

【تەركىبى】 سەبرى، ئەپسەنتىن، مەستىكى رۇمى، غارد. قۇنىڭ ھەربىرىدىن 6 گرامدىن؛ شەھەنزەل، سوقمۇنيانىڭ ھەربىرىدىن 1 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسىتىلگەن بويىچە ئېلىنىپ سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن چىڭسەي ئۇرۇقى قاينىتىلغان سۇ بىلەن خېمىر قىلىنىپ كۇمىلاچ تەييارلاش قائىدىسى بويىچە 0.3 گرامدىن كۇمىلاچ قىلىنىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 ئاغرىق پەسەيتىش، ئارام بېرىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، تەرەتنى يۇمشىتىش تەسىرلىرىگە ئىگە. 【ئىشلىتىلىشى】 سەرسام، شەققە، كۆز ياشاڭغىراش، يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدۇ. 【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈندە 1 قېتىم (كەچتە) 15 دانىدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ. بۇ دورا ئىچىنى سۈرۈشى مۇددەت كىن، سۈرۈپ بولغاندىن كېيىن لۇڭگە بىلەن باشنى تېڭىپ قويۇش كېرەك.

ھەببى بەرەس (I نۇسخا)

【تەركىبى】 ئەپتەمۇن، خارخەسەك، سوقمۇنيانىڭ ھەربىرىدىن 30 گرامدىن؛ لاپتۇەرد تېشى 21 گرام، رۇمبەدىيان، موقەللەرنىڭ ھەربىرىدىن 13 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇپ تاسقىلىپ، چىڭسەي سۇ-يىدە يۇغۇرۇلۇپ، كۇمىلاچ تەييارلاش قائىدىسى بويىچە نۇقۇت چوڭلۇقىدا (0.3 گرام) كۇمىلاچ تەييارلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا ھەر كۈنى 1 قېتىم،
3 — 6 گرامدىن تاماقتىن كېيىن بېرىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى يەللەرنى تارقىتىش، توسالغۇ-
لارنى ئېچىش، خىلىتلارنى ساپلاشتۇرۇش، رەئىس ئەزالارنى
قۇۋۋەتلەش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 سەۋدا ۋە سەپرادىن بول-
غان ئاقكېسەل، كالا تەمرەتكىسى، باش ئاغرىقى، ئۈنتۇغاقلىق
قاتارلىقلار.

ھەببى بەرەس (Ⅱ نۇسخا)

【تەركىبى】 جىنكېۋىزى ئۇرۇقى 35 گرام، كەتىرا 25
گرام، چىڭسەي ئۇرۇقى 35 گرام، چىڭگىت مېغىزى 35 گرام،
نېلۇپەرگۈلى 35 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلارنى سوقۇپ، تاسقاپ ھەسەل ياكى
نەخۇا ئەرەقىدە يۇغۇرۇپ كۇمىلاچ تەييارلاش قائىدىسى بويىچە
نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەپ (0.3 گرام) تەييارلىنىدۇ.
【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا ھەر كۈنى 1 قېتىم،
ھەرقېتىم 3 — 6 گرامغىچە بېرىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ
دورا مىقدارىنى كېمەيتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 توسالغۇلارنى ئېچىش، يەللەرنى تارقىتىش،
تېرىنىڭ رەڭ ھاسىل قىلىش قابىلىيىتىنى كۈچەيتىش،
ئەستە ساقلاش ئىقتىدارىنى ياخشىلاش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل، كالا تەمرە-
تكىسى، نېرۋا ئاجىزلىق كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

ھەبىي جەدۋار

【تەركىبى】 جۇڭگو جەدۋارى، تېشىلىمىگەن مەرۋايىت، ئۇ-زۇن پىلىپىل، ساپ كەھرىۋانىڭ ھەربىرىدىن 4 گرامدىن؛ قارى-مۇچ، زەنجىۋىل، خولىنجان، نېپىز دارچىن، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، ئودقىمارى، قەلەمپۇر، كاۋاۋىچىنىڭ ھەرىدىرىدىن 8 گرامدىن؛ سۆلەپ، شاقاقۇل، بادىرەنجىبۇيا ئۇرۇقىدىن 12 گرامدىن؛ زەپەر 2 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ، يۇمشاق سوقۇپ تاسقالغاندىن كېيىن، قىيام بىلەن خېمىر قىلىنىپ 0.2 گراملىقتىن كۇمىلاچلىنىدۇ. ئىمكانىيەت بولغاندا كۇمىلاچ ئالتۇن ۋاراققا يۆگىلىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 مېڭىنى تازىلاش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، يىرىڭنى يوقىتىش، ئۈچەي ھەرىكىتىنى نورماللاشتۇرۇش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش تەسىرلىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 يۈرەك كېسەللىكلىرى، ئىستە ساقلاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەش، قۇلاقتىن يىرىڭ ئېقىش، ئىچ سۈرۈش، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقلىرى، جىنسىي ئاجىزلىق، سوغۇقتىن بالىياتقۇ چىقىپ قېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كۈندە 1 قېتىم، 4 — 7 دانىدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

ھەبىي مۇخرىچ

【تەركىبى】 سەبرى 8 گرام، پوستى ئېلىنغان بادام مېغىدى 10 گرام، ئاق تۇرپۇت 16 گرام، جەۋەرلىمۇنى 4 گرام،

سېرىق ھېلىلە پوستى 32 گرام، رۇمبەدىيان 4 گرام، دەند (ھەببى سالاتىن) 60 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دەند (ھەببى سالاتىن) نىڭ مېغىزىنى شا-كىلىدىن ئايرىغاندىن كېيىن ئىچىدىكى تىلى ئېلىپ تاشلىنىدۇ. قىزىلگۈل، رۇمبەدىيانلار 4 گرامدىن ئېلىنىپ، دەند مېغىزىغا قوشۇلىدۇ، ئاندىن بۇغداي ئۇنى خېمىرىغا يۆگىلىپ قوقاسقا كۆمۈلىدۇ. ئالدى - ئارقىسى نانغا ئوخشاش تەكشى پىشقاندا خېمىردىن ئاجرىتىپ، يۇمشاق سوقۇپ تاسقالغان كېيىن، باشقا تالقانلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ۋە ئەرەقى بەدىيان بىلەن خېمىر قىلىنىپ 0.2 گراملىقتىن كۇمىلاچلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق، ئۈنۈم بېرىش مۇددىتى بىر يىل.

【خۇسۇسىيىتى】 ئىچىنى سۈرۈش، بەدەندىكى غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى سۈرۈش ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ مەجەزنى نورماللاشتۇرۇش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 قورساق ئاغرىقى، قەۋ-زىيەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. ھامىلىدار ئايال، تولا خۇن كېلىپ تۇرىدىغان ئاياللارغا بېرىلمەيدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ 5 — 7 دانىدىن بېرىلىدۇ. تېنى ئاجىز، قېرى كىشىلەر ۋە كىچىك بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ مىقدارىنى كېمەيتىپ ئېھتىيات بىلەن بېرىلىدۇ.

【قۇرۇق بەرەس (I - نۇسخا)】

【تەركىبى】 كابۇل ھېلىلىسى پوستى، بەلىلە پوستى، ئا-مىلە مۇقەششەر، ئەپتىمۇن، ئاقىرقەرھە، پىلپىل، شەترەنجى ھىندى، قىچا، زەنجىۋىل، ئوردان، جويۇز، قۇرۇق سامساق،

ئەسەل (تاغ پىيىزى)، گۆڭگۈرت، گۈل دارچىنىنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ ئەرەب يېلىمى 20 گرام، ھەسەل مۇۋاپىق مىقداردا.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ئېلىنىپ تازىلانغاندىن كېيىن، سوقۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن يېپىشتۇرغۇچى ئەرەب يېلىمى ۋە ھەسەل مۇۋاپىق مىقداردا ئارىلاشتۇرۇلۇپ، 0.3 گراملىقتىن قورس تەييارلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق. **【خۇسۇسىيىتى】** بەدەننى قىزىتىش، مىجەزدىكى زىيادە ھۆللۈكنى پەسەيتىش، سوغۇق يەللەرنى تارقىتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش ھەم تىرىنىڭ رەڭ ئىشلەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 5 — 7 دانىدىن تاماقتىن كېيىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى مۇۋاپىق بەلگىلىنىپ ئىشلىتىلسە بولىدۇ. دورىنى ئىستېمال قىلىپ 10 كۈن ئۆتكەندە مىقدارى ئاشۇرۇلسا بولىدۇ. دورا بىلەن بىرلىكتە مۇۋاپىق مىقداردا ھەسەل ئىستېمال قىلىپ بېرىش لازىم.

قۇرس بەرەس (I نۇسخا)

【تەركىبى】 جىنكېۋىزى ئۇرۇقى 130 گرام، زەنجىۋىل 30 گرام، سىيادان 60 گرام، قىزىل قىچا 30 گرام، قارا ھېلىلە 60 گرام، ئەرەب يېلىمى 20 گرام، ئاقىرقەرھە 30 گرام، ئوغرىتىكەن 60 گرام، ھەسەل مۇۋاپىق مىقداردا، قارا كۈنجۈت 60 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئۆلچەم بويىچە ھازىرلىنىپ تازىلىنىپ،
لانغاندىن كېيىن، سوقۇپ تاسقىلىپ قورسقا لايىقلاشتۇرۇلدى.
دۇ، ئاندىن ئەرەب يېلىمى ۋە مۇۋاپىق مىقداردىكى ھەسەل
يېپىشتۇرغۇچى قىلىنىپ، 0.3 گراملىق قورس تەييارلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.
【خۇسۇسىيىتى】 بەدەننى قىزىتىش، سوغۇق يەللەرنى تار-
قىتىش، سىجەزدىكى زىيادە ھۆللۈكنى پەسەيتىش، تېرىنىڭ
رەڭ ھاسىل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش ۋە كۈن نۇرىدىكى
ئۇلترا سىنەش نۇرنىڭ تېرىگە قوبۇل قىلىنىشى ھەم نۇرغا
بولغان سېزىمچانلىقىنى ئاشۇرۇش، تۈك بەزلىرىنىڭ خىزمەت
ئىقتىدارىنى ياخشىلاش، ئورگانىزمنى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق تە-
سىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەردىن】 ئاقكېسەلگە ئىشلىد-
تىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم،
تاماقتىن كېيىن 5 — 7 دانىدىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا
ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ. دورىنى ئىستېمال
قىلىشقا باشلاپ 15 كۈندىن كېيىن مىقدارىنى كۆپەيتىپ ئىشلىد-
تىشكە بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىر چاغدا مائۇل ھەسەل ساددىنى
ياكى ھەسەلنى مۇۋاپىق ئىستېمال قىلىپ بېرىش لازىم.

【ھەببى ئەفئال (ھەببى ماری بەرەس)】

【تەركىبى】 چارىلان (قۇرۇقلۇق يىلىنى بولسىمۇ بولىد-
دۇ) 280 گرام، كۇچىلا 28 گرام، كېلەر 14 گرام، زەپەر
2 گرام، كۈندۈر 42 گرام، ئاقىرقەر 280 گرام، سەبرى
7 گرام، چايان 30 گرام، ئىلى پاقىسى 280 گرام، سوقمۇنىيا
7 گرام، ئېگىر 46 گرام، ھەسەل 224 گرام، شېكەر 12

تىن كېيىن ئەڭ ياخشىسى ئەتىگەن ياكى چۈشتە تاماق يەپ 1
 سائەت ئىچىدە ئىستېمال قىلىش لازىم.
 2) سوزۇلما كېسەللىك بىلەن ئۇزاق ۋاقىت ئاغرىغان
 كىشىلەر دورىنى ئىشلىتىش بىلەن بىرگە ھەسەل ئىستېمال
 قىلىپ تۇرۇش لازىم.
 3) بىرقانچە قېتىم داۋالىنىپ قايتىلانغان ئاقكېسەل ۋە
 كالا تەمرەتكىسى بىلەن ئاغرىغانلار داۋالىنىپ ساقايغاندىن كې-
 يىنمۇ 1 — 2 كۈرس ئىستېمال قىلىپ بەدەن تەبىئىتىنى
 (ئىممۇنىتېت كۈچىنى) ئاشۇرۇپ، كېسەللىكنىڭ قايتىلىنىد-
 ىنى ئازايتىش كېرەك.

3. تالقان دورىلار

سۇپۇپ ھېلىلە سىياھ (I نۇسخا)
 【تەركىبى】قارا ھېلىلە، ئامىلە پوستى، سېرىق ھېلىلە
 پوستى، سىيادان، تاتلىق بادام مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 80
 گرامدىن، شېكەر 600 گرام.
 【تەييارلىنىشى】دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ئېلىنىپ تازىلىد-
 ىدۇ (بادام مېغىزى قايناق سۇغا چىلىنىپ پوستىدىن ئايرىلىپ
 قۇرۇتۇلىدۇ)، ئاندىن بارلىق دورىلار بىرلەشتۈرۈلۈپ، شې-
 كەرگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ، يۇمشاق سوقۇپ تاسقىلىدۇ ۋە
 مۇۋاپىق ئاكاۋا بىلەن دانچە قىلىپ قۇرۇتۇلىدۇ.
 【تەبىئىتى】قۇرۇق سوغۇق.
 【خۇسۇسىيىتى】غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى پىشۇرىدۇ.
 زىيادە ھۆللۈكلەرنى تەڭشەيدۇ. تېرە قان تومۇرلىرىنىڭ ئۆتكۈ-
 زۇشچانلىقىنى ياخشىلاپ، قان ئايلىنىشى راۋانلاشتۇرىدۇ. تې-

زىنىڭ رەڭ ھاسىل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، رەڭ پەيدا قىلىدۇ. چاچ ۋە تۈكلەرنى قارايتىدۇ. تۈك يىلتىزىنى چىڭىتىپ چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. **【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】** ئاقكېسەل، گۈللۈك تەمرەتكە، چاچ - ساقالنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىپ كېتىشى، چاچ چۈشۈش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. **【ئىشلىتىلىش مىقدارى】** چوڭلار كۈنىگە 1 — 2 قېتىم، 5 — 10 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

سۈپۈپ ھېلىلە سىياھ (I نۇسخا)
【تەركىبى】 قارا ھېلىلە، قارا كۈنجۈت، تاتلىق بادام مېغى - زىنىڭ ھەر بىرىدىن 50 گرامدىن؛ سېرىق ھېلىلە پوستى ۋە سىياداننىڭ ھەر بىرىدىن 25 گرامدىن؛ شېكەر 300 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ئېلىنىپ سوقۇپ تالقانلىنىدۇ.
【تەبىئىتى】 قۇرۇق سوغۇق.

【خۇسۇسىيىتى】 سۈپۈپ ھېلىلە سىياھ I نۇسخا بىلەن ئوخشاش.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل، گۈللۈك تەمرەتكە، چاچ - ساقالنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىپ كېتىشى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 سۈپۈپ ھېلىلە سىياھ I نۇسخا بىلەن ئوخشاش.

سۈپۈپ زەرچىۋە
【تەركىبى】 زەرچىۋە 100 گرام، شەترەنجى ھىندى 30

گرام، كاۋاۋچىن، ئوردان، زەپەر خېمىكى، يالپۇز، خولىند-
جاننىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن؛ ئانار پوستى 10 گرام،
قوزاق دارچىن 30 گرام، مامۇرانچىن 5 گرام.
02 **【تەييارلىنىشى】** كۆرسەتمىدىكى دورىلار تەقلىنپ چالا سو-
قۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق. **【رىئەتلىك】**
【خۇسۇسىيىتى】 ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، يەرلىك توقۇلمى-
لارنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى ياخشىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش، تې-
رىنىڭ كۈن نۇرىغا بولغان سەزگۈرلۈكىنى ئاشۇرۇش، تېرە
رەڭ ماددىلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى تېزلىتىش، تېرىگە رەڭ
بېرىش، تېرىنىڭ زىيادە سېزىمچانلىقىنى پەسەيتىش قاتارلىق
تەسىرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە
ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كېسەللىك ئورنىنىڭ
دائىرىسىگە قاراپ مۇۋاپىق سۇدا قاينىتىپ ئومۇمىي بەدەننى ياكى
كېسەللىك ئورنىنى كۈنىگە 1 — 2 قېتىم يۇيۇپ بەرسە ئۈنۈمى
بولىدۇ.

ئاقكېسەلگە ئىشلەتكەندە كېسەللەنگەن ئورۇننى ئۇۋۇلاپ،
تېرە ئازراق قىزارغاندىن كېيىن، قاينىتىلغان دورا سۈيىدە
يۇيۇپ ئاپتاپقا قاقلاپ بېرىش كېرەك.
قول - پۇت قىسمىدا پەيدا بولغان جاھىل خاراكتېرلىك
ئاقكېسەللەرگە قارىتا بۇ دورىنى قاينىتىپ تېرە كۆيىمگۈدەك
سوۋۇغاندىن كېيىن، كۈنىگە بىرقانچە قېتىم چىلاپ بەرسە ساق
تېرىنىڭ رەڭلىرى جانلىنىپ ئاق داغنىڭ كىچىكلىشىنى ئىلگى-
رى سۈرىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 دورىنى ئىشلىتىش جەريانىدا

كۆزگە كىرىپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم.

سۇيۇپ كاۋاۋىچىن

【تەركىبى】 كاۋاۋىچىن 100 گرام، قوزاق دارچىن 50 گرام، ئەمەن 25 گرام، گۈل دارچىن 25 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئۆلچەم بويىچە تەقلىنىپ چالا سۇ-قۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنىڭ زىيادە سېزىمچانلىقىنى پەسەيتىدۇ. قىچىشىنى توختىتىدۇ، تېرىگە رەڭ بېرىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 200 گرام دورىنى 20 لىتىر سۇدا 15 مىنۇت قاينىتىپ بەدەننى ھەر كۈنى ياكى 2 كۈندە 1 قېتىم يۇيۇپ بەرسە مەنپەئەتتى بولىدۇ.

4. سۇيۇق دورىلار

جىنكېۋىزى ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (I)

【تەركىبى】 جىنكېۋىزى ئۇرۇقى 100 گرام، 75% لىك ئىسپىرت 1000 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 جىنكېۋىزى ئۇرۇقى چالا سوقۇلۇپ، ئۇل-چەمدىكى ئىسپىرتقا سېلىنىدۇ ۋە شېشە ياكى ئاغزى مەھكەم

سىرلىق قاچىدا 10 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ. مۇشۇ ئۆلچەم بويىچە

ھەر خىل پىرسەنتلىك (مەسىلەن 5%، 20%، 30%، 40%

لىك) دورا نۇسخىسىنى تەييارلاشقا بولىدۇ. دورا پىرسەنتىنى

تۆۋەنلەشتۈرۈش توغرا كەلسە تەييارلانغان دورىغا مۇۋاپىق مە-

داردا ئىسپىرت قوشۇلىدۇ. دورا پىرسەنتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن تەييارلانغان دورىغا مۇۋاپىق ئۆلچەمدە دورا قوشۇلىدۇ. **【خۇسۇسىيىتى】** كېسەللەنگەن ئورۇننى غىدىقلايدۇ، سۇ كۆتۈرگۈزۈپ تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تېرە قاتلاملىرىدىكى غەيرىي تەبىئىي ماددا (خىلىت) لارنى تېرىنى سۇ كۆتۈرگۈزۈپ تېرە پۈتۈنلۈكىنى بۇزۇش ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ، يەرلىك توقۇلمىلارنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشىنى تېزلىتىپ تېرىگە رەڭ بېرىدۇ. **【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】** ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 ئاپتاپقا قاقلىنىشقا بىرلەشتۈرۈپ، كېسەللەنگەن يەرلىك ئورۇنغا كۈنگە 1 قېتىم ياكى 3 كۈندە 1 قېتىم سۈركىلىدۇ.

【دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك نۇقتىلار】 1) تېرىنىڭ دورىغا بولغان سېزىمچانلىقىغا ئالاھىدە دېققەت قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن دورىنى بەدەننىڭ كىيىم بىلەن يېپىلىپ تۇرىدىغان يېرىگە ئالدىن سۈركەپ، 24 سائەت كۆزدە تىش تەلەپ قىلىنىدۇ. كۆز تىش جەريانىدا سېزىمچانلىق (غەيرىي ئالامەتلەر) بايقالسا ئىشلىتىش كېرەك.

2) دورىنى كېسەللەنگەن ئورۇن ئەتراپىدىكى ساق تېرىدىن قاچۇرۇپراق سۈركەش لازىم. ئۇنداق قىلىمىغاندا سۇلۇق قاپارتما دائىرىسى چوڭىيىش بىلەن، بەزىلەردە ئاق داغ كېڭىيىپ كېتىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ.

3) دورىنى كۆز، يۈز ۋە شىللىق پەردىلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش، بىمارلارنىڭ ئازابىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىش.

تېشىتىن ساقلىنىش كېرەك.

جىنكېۋىزى ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (I)

【تەركىبى】 جىنكېۋىزى ئۇرۇقى 50 گرام، قارا كۈنجۈت

60 گرام، قوزاق دارچىن 30 گرام، 75% لىك ئىسپىرت 500

مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ، ئىسپىرتقا چىلان

غاندىن كېيىن بىر ھەپتە تۇرغۇزۇلىدۇ، بۇ جەرياندا كۈندە 1

قېتىم چالغۇتۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تۇرۇش تەلەپ قىلىنىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 جىنكېۋىزى ئىسپىرتلىق چىلانمىسى I

نۇسخا بىلەن ئوخشاش.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە ئىش

لىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللەنگەن ئورۇنغا كۈندىگە

1 — 2 قېتىم ئاپتاپقا قاقلىنىشقا بىرلەشتۈرۈپ سۈركىلىدۇ.

بۇ دورىنى ئىشلىتىشتە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار جىنكېۋىزى

ئىسپىرتلىق چىلانمىسى I نۇسخىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

جىنكېۋىزى ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (II)

【تەركىبى】 جىنكېۋىزى ئۇرۇقى 100 گرام، قىزىل باش

لىق سامساق 40 گرام، خولىنجان 30 گرام، 70% لىك ئىس

پىرت 500 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ ئىسپىرتقا چىل

نىپ 10 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى ۋە ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى، ئىش

لىتىلىش ئۇسۇلى ۋە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 جىنكېۋىزى

ئىسپىرتلىق چىلانمىسى I نۇسخا بىلەن ئوخشاش.

جىنكېۋىزى ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (Ⅳ)

【تەركىبى】 جىنكېۋىزى 30 گرام، ئاقىرقەرھە 20 گرام، جوۋىنە (نەنخۇا) 10 گرام، ئوردان 10 گرام، خولىنجان 10 گرام، 90% لىك ئىسپىرت 400 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ، ئۆلچەمدىكى ئىسپىرتقا چىلىنىپ 10 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى غىدىقلاش، تېرە رەڭ ماددىسىنى جانلاندۇرۇش، خاللارنىڭ تۇتىشىنى تېزلىتىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 داۋالىنىۋاتقان مەزگىلدە كۈندە ئاپتاپتىن چۈشۈپ 2 سائەت ئۆتكەندە كېسەللەنگەن ئورۇننى يەڭگىل ئۇۋۇلىۋەتكەندىن كېيىن بۇ دورا سۈركىلىدۇ.

【دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار】

(1) رېئاكسىيە كۆرۈلگەنلەرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

(2) مۇكۆتۈرۈپ كەتكەن ئورۇنلارغا سۈركەشكە بولمايدۇ.

جىنكېۋىزى ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (Ⅴ)

【تەركىبى】 70% ئىسپىرت 500 مىللىلىتىر، جىنكېۋىزى 20 گرام، ئاقىرقەرھە 80 گرام، كالىي زىرە ئۇرۇقى 20 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ ئۆلچەمدىكى ئىسپىرتقا چىلىنىپ، بىر ھەپتە ئاپتاپتا ياكى ئىسسىق ئورۇندا تۇرغۇزۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى يەڭگىل غىدىقلاش، تېرە رەڭ ماددىسىنى جانلاندۇرۇش، تېرە خاللىرىنىڭ تۇتىشىنى تېزلىتىدۇ.

تىش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە ئىشلە-

تىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 چاچما شەكىلدىكى ئاقكېسەللەرگە

كۈنىگە ئەتىگەن - كەچتە سۈرتۈلۈپ، يېرىم سائەتتىن كېيىن

مەلھىمى بېيرى بىلەن ئۈستىنى مايلاپ، يەرلىك ئورۇن ئۇۋۇلا.

پ بېرىلىدۇ.

ھەرقانداق پەسىلدە جىنكېۋىزى ئۇرۇقىغا سەزگۈرلۈكى

بولمىغانلارغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. قاش، يۈز، پېشانە قىسمى-

لىرىغا ئۈنۈمى ئالاھىدە ياخشى بولىدۇ.

قەلەمپۇر ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (I)

【تەركىبى】 قەلەمپۇر 100 گرام، قوزاق دارچىن 20

گرام، زاراڭزا چېچىكى 10 گرام، قىزىل قىچا 20 گرام،

70% لىك ئىسپىرت 450 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ ئۆلچەمدىكى ئىس-

پىرتقا چېلىنىپ، 10 كۈن ئاپتاپ ياكى ئىسسىق ئورۇندا تۇرغۇ-

زۇلىدۇ، بۇ جەرياندا كۈنىگە بىرقانچە قېتىم چالغۇتۇپ بېرىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى يەڭگىل غىدىقلاش، قىزىتىش،

تېرىگە رەڭ بېرىش ۋە تېرە رەڭلىرىنىڭ جانلىنىشىنى تېزلى-

تىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە ئىش-

لىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كۈنىگە 1 ياكى 2 قېتىم سۈركە-

گەندىن كېيىن، ئاپتاپقا قىسقا ۋاقىت قاقلىنىش تەلپ قىلىنىد-

دۇ. دورىنى ئىشلەتكەندە كۆزگە ئېقىپ كېتىشتىن ئېھتىيات

قىلىش لازىم.

قەلەمپۇر ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (I)
 【تەركىبى】 قەلەمپۇر 50 گرام، خولسناجان 50 گرام،
 ئاقىر قەرھە 25 گرام، ئوردان 15 گرام، نەخۇا 15 گرام، 70%
 لىك ئىسپىرت 500 مىللىلىتىر.
 【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ ئۆلچەمدىكى ئىس-
 پىرتقا چىلىنىپ، 10 كۈن ئاپتاپ ياكى ئىسسىق ئورۇندا تۇرغۇ-
 زۇلىدۇ.
 【خۇسۇسىيىتى】 كېسەللىككە قارىتا تەسىرى I - نۇسخا
 بىلەن ئوخشاش بولغاندىن باشقا، تەڭگە تەمرەتكە، بەدەن تەمرە-
 كىسى، ساقال يارىسى، تۈك خالتا ياللۇغى قاتارلىقلارغا مەنپە-
 ئەت قىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەل، تەڭگە تەم-
 رەتكە، بەدەن تەمرەتكىسى، ساقال يارىسى، تۈك خالتا ياللۇغى
 قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كۈنىگە 1 — 3 قېتىم كېسەللەن-
 گەن ئورۇنغا سۈركىلىپ، قىسقا ۋاقىت ئاپتاپقا قاقلىنىش تەلەپ
 قىلىنىدۇ.

قەلەمپۇر سىركە چىلانمىسى
 【تەركىبى】 قەلەمپۇر 80 گرام، شەترەنجى ھىندى 40
 گرام، كاۋاۋىچىن 40 گرام، ئانار پوستى 20 گرام، كالىي
 زىرە ئۇرۇقى 40 گرام، كۈنرىغان ئۈزۈم سىركىسى 1000
 مىللىلىتىر.
 【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ، ئۆلچەمدىكى سىر-
 كىگە چىلىنىپ ئىككى ھەپتە ئاپتاپتا ياكى ئىسسىق ئورۇندا
 تۇرغۇزۇلىدۇ. بۇ جەرياندا كۈنىگە 1 قېتىم چالغۇتۇپ بېرىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىگە رەڭ بېرىش ۋە تېرىنىڭ رەڭ قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ھەر خىل تەمرە تىكلەر (بەدەن تەمرە تىكىسى، باش تەمرە تىكىسى، ھۆل تەمرە تىكە قاتارلىق-لار) نى داۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللەنگەن ئورۇنغا كۈنىگە بىر-قانچە قېتىم سىرتتىن سۈركىلىدۇ. ئاقكېسەلگە ئىشلىتىشتە، ئاپتاپتىن چۈشكەندىن كېيىن ئاۋۋال كېسەللەنگەن ئورۇن ئۇۋۇ-لىنىدۇ، ئاندىن بۇ دورا سۈركىلىدۇ.

ئاقىرقەرھە ئاچچىقسۇ چىلانمىسى
【تەركىبى】 ئاقىرقەرھە، جوۋىنە (نەخۋا)، قوزاق دار-چىن، قۇستى تەلىخ، زەپەر خېمىكى، موزا، كەرۋىيا ئۇرۇقى، زانكار، مۇۋاپىق مىقداردا ئانار پوستى.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئېھتىياجغا لايىق ھازىرلىنىپ، چالا سوقۇلغاندىن كېيىن مۇۋاپىق مىقداردىكى كونا ئاچچىقسۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ، ئاندىن كېيىن پەس ئوتتا 2 سائەت ئەتراپىدا قاينىتىلىپ تىرىپى داكىدا سۈزۈۋېتىلىپ، سۈيى ئېلىنىدۇ.
【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنىڭ رەڭ قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 نورمال تېرە رەڭگىگە يېقىن كېلىدىغان ئاق داغلارغا ۋە شىللىق پەردە قىسمىدا پەيدا بولغان ئاق داغلارغا كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم بېرىدۇ. بەھق ۋە ئاق تەمرە تىكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللىك بار ئورۇنغا كۈنىگە بىر قانچە قېتىم سىرتتىن سۈركىلىدۇ. دورىنى ئىشلىتىشتىن

بۇرۇن كېسەللىك بار ئورۇننى ئۇۋۇلاپ تېرىنى قىزىتىپ سۈر-
كسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى كۆرۈلىدۇ.

ئاقىرقەرها ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (I)
【تەركىبى】 ئاقىرقەرها 100 گرام، ئوردان 30 گرام،
75% لىك ئىسپىرت 400 مىللىلىتىر.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ ئۆلچەمدىكى ئىس-
پىرتقا چىلىنىپ 10 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ.
【خۇسۇسىيىتى】 تېرىگە رەڭ بېرىش، تېرىنىڭ رەڭ ھا-
سىل قىلىش ئىقتىدارىنى جانلاندۇرۇش ۋە باش تەمرەتكىسى،
تۈك خالتا ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كالىپۇك، قولتۇق، يۈز - كۆزلەر
ئەتراپىدىكى ئاق داغلارغا بەكمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ. كېسەللىك
بار ئورۇنغا سىرتىدىن كۈنىگە 2 — 3 قېتىم سۈركىلىدۇ. دورا
سۈركەش جەريانىدا كۆز ۋە بۇرۇنغا كىرىپ كېتىشتىن ساقلى-
نىش لازىم.

ئاقىرقەرها ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (I)
【تەركىبى】 ئاقىرقەرها 50 گرام، شەترەنجى ھىندى 25
گرام، قۇرۇتۇلغان خېنە ياپىرقى 10 گرام، چەشمە خوروز 10
گرام، زەپەر 5 گرام، 70% لىك ئىسپىرت 400 مىللىلىتىر.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ ئۆلچەمدىكى
ئىسپىرتقا چىلىنىپ، ئاغزى چىڭ شېشىدە ئىككى ھەپتە
تۇرغۇزۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى ۋە ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】
ئاقىرقەرها ئىسپىرتلىق چىلانمىسى I نۇسخىنىڭكى بىلەن ئوخ-
شاش. 100 مىللىلىتىر ۋە ۲۰۰ مىللىلىتىر ۰۰۲ پىنىدا

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللىك بار ئورۇننى يېنىك ئۇۋۇلاپ ئازراق ئاپتاپقا قاقلىغاندىن كېيىن، كۈنگە 3 — 4 قېتىم سۈركەپ بېرىلىدۇ.

ئاقىرقەرھە ئىسپىرتلىق چىلانمىسى (Ⅲ)
【تەركىبى】 ئاقىرقەرھە 70 گرام، قەلەمپۇر 35 گرام، خولىنجان 15 گرام، %70 لىك ئىسپىرت 400 مىللىلىتىر.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ ئۆلچەمدىكى ئىسپىرتقا چىلىنىدۇ ۋە ئاغزى مەھكەم شېشىگە قاچىلىنىپ 10 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرە خالىرىنى جانلاندۇرۇش، تېرىنىڭ رەڭ قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 بەدەن تەمرەتكىسى ۋە باش تەمرەتكىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بۇ دورا چاچما، تارقاق شەكىلدىكى ئاقكېسەللەرگە ئىشلىتىشكە مۇۋاپىق كېلىدۇ. دورىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن كېسەللىك بار ئورۇننى ئۇۋۇلاپ بېرىش لازىم. كۈنگە 1 — 2 قېتىم سۈركىلىدۇ.

5. ئاددىي زىمادى (تاخما)

بەرەس نۇسخىلىرى

زىمادى بەرەس (I)

چىڭگىلىكنىڭ يوپۇرماق ۋە غوللىرىدىن 100 گرام تەييارلىنىپ 500 مىللىلىتىر سۇغا سېلىنىپ، سۇ 100 مىللىلىتىر

قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن چىڭگىلىك سۈزۈۋېتىلىپ، سۈيى ئاق داغ بار ئورۇنغا سۈركىلىدۇ ياكى داكا چىلىنىپ ئاق داغ بار ئورۇن 30 مىنۇتتىن 1 سائەتكىچە تېگىلىدۇ. بۇ ئۇسۇل ھەپتىدە 1 — 2 قېتىم قوللىنىلىدۇ، 20 — 30 كۈن داۋاملاشتۇرۇلسا ئاق داغ بار ئورۇن تەدرىجىي قارىداپ تېرە نورمال رەڭگە كىرىدۇ. بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلى دائىرىسى كىچىك ئاق داغلارغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

زىمادى بەرەس (Ⅱ)
100 گرام يۆگمەچ ئوت پاكىز يۇيۇلۇپ، قىغراق بىلەن يۇمشاق سوقۇلغاندىن كېيىن ھۆل پېتى داكىغا ئورىلىپ كېسەللىك بار ئورۇنغا تېگىلىدۇ. ئەگەر يەرلىك ئورۇندا ئاغرىش ئەھۋالى كۆرۈلسە دورا ئېلىۋېتىلىدۇ. بۇ دورا كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ ھەپتىدە 2 — 3 قېتىم ئىشلىتىلسە بولىدۇ. كېسەللىك بار ئورۇندا قاپارتما ياكى ئىششش - قىزىش ئالامىتى كۆرۈلسە دورا تېگىش توختىتىلىدۇ، سۇ كۆتۈرگەن بولسا قاپارتما سۈيى چىقىرىۋېتىلىدۇ. دورىنى ئىشلەتكەندە ئاپ-تاپقا 30 مىنۇتتىن 1 سائەتكىچە قاقلاسا بولىدۇ. بۇ خىل دورا نۇسخىسى چاچما دائىرىلىك شەكىلدىكى ئاق داغلارنى داۋالاشقا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

زىمادى بەرەس (Ⅲ)
مۇۋاپىق مىقداردا قىزىل قىچا تەييارلىنىپ يۇمشاق سوقۇلىدۇ ۋە ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلۈپ قىزىق سۇ بىلەن خېمىر قىلىنىدۇ، ئاندىن كېسەللىك بار ئورۇنغا تېگىلىدۇ. قاتتىق ئاغرىش - قىزىش ئالامىتى بولمىسا 5 — 8 سائەت تۇرغۇزۇلىدۇ. ئاغرىسا 1 — 2 سائەتتىن كېيىن ئېلىۋېتىلىدۇ.

بۇ ئۇسۇل 2 — 4 كۈندە 1 قېتىمدىن 3 — 5 نۆۋەت قوللىنىلسا كۇپايە قىلىدۇ.

تەسىرلىنىش نىسبەتەن قىيىن ئورۇنلاردىكى ئاق داغلار (مەسىلەن، جەينەك، قول - پۇت، ئوشۇق بوغۇملىرى ئەتراپىدىكى داغلار) غا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

زىمادى بەرەس (IV)

بۇنىڭدا ئەنجۈر ياپرىقىنى ئۈزگەندە ساپىقىدىن چىققان ئاق سۇنى ئۈزگەرمىگەن ئورۇنلاردىكى ئاق داغلارغا سۈركەپ، ئاپ-تاپقا قاقلىنىپ بەرسە مەنپەئەتتى بولىدۇ. تېرە سېزىمى تۆۋەن بىمارلار بۇنى سۈركەشتىن بۇرۇن ئاق داغ بار ئورۇننى خام بىلەن تەكرار سۈرتۈپ قىزارتىپ ئاندىن سۈركەسە تېز تەسىر قىلىدۇ. كۈندە ياكى كۈن ئارىلاپ سۈركەسە بولىدۇ. سۇ كۆ-تۈرگەندىن كېيىن قاپارتما سۈيىنى چىقىرىۋېتىش، تەكرار ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. قاپارتما ئورنى قېتىشقاندىن كېيىن يۇمشاققۇچى ماي تېپىدىكى دورىلارنى سۈركەپ ئاپتاپقا قاقلاپ بېرىش لازىم. بۇ دورىنى كەڭ دائىرىلىك ئاق داغلارغا ئاز - ئازدىن بۆلۈپ ئىشلىتىش ۋە شىللىق پەردىلەرگە ئىشلەتكەندە ئېھتىيات قىلىش كېرەك.

زىمادى بەرەس (V)

چاققاق ئوتتىن مۇۋاپىق مىقداردا تەييارلاپ قىغراق بىلەن چاناپ يۇمشاتقاندىن كېيىن سىقىپ سۈيىنى قول - پۇت قىسمىدىكى دائىرىلىك ئاق داغلارغا كۈنىگە 1 قېتىمدىن 2 — 3 كۈن سۈركەسە، كېسەللىك بار ئورۇندا قاپارتما ھاسىل قىلىدۇ، قاپارتمىنىڭ سۈيىنى چىقىرىۋېتىپ تەكرار ئىشلەتمەسەمۇ بولىدۇ. قىسمەن ئەھۋاللاردا تېرە سېزىمى ئېشىپ كېتىش خاراكتېرى

تېرىلىك يەل تاشما پەيدا قىلىشى مۇمكىن. شۇڭا، ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم. جىنسىي ئورگان، قولتۇق، قاپاق قىسمىدىكى ئاقكېسەللەرگە مۇمكىنقەدەر ئىشلەتمەسلىك ياكى دورا پىرسەنتىنى تۆۋەنلىتىپ ئاز - ئازدىن ئىشلىتىش لازىم.

زىمادى بەرس (VI) ئۈجمە ياغىچىنى كۆيدۈرۈپ كۈلىنى سۇ بىلەن قاينىتىپ، كېسەللىك بار ئورۇنغا كۈنىگە 1 — 2 قېتىم سۈركەپ ئاپتاپقا قاقلاپ بەرسە، شىللىق پەردىدىكى ئاق داغلارغا تېزلا مەنپەئەت قىلىدۇ.

زىمادى بەرس (VII) ھۆل ياڭاق پوستىدىن 10 گرام، گۆڭگۈرتتىن 1 گرام تەييارلاپ يۇمشاق ئېزىپ مەلھەم قىلىپ ئاق داغقا تېڭىپ بەرسە، ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

بۇ دورىنى كۆرۈنىدىغان ئورۇندىكى ئاق داغلارغا بويلاق ئورنىدا ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ. (IX)

زىمادى بەرس (VIII) كالىنىڭ مۇڭگۈزىنى كۆيدۈرۈپ، كۈلىنى يۇمشاق ئېزىپ كونا سىركىگە ئارىلاشتۇرۇپ، يامرىغۇچى ئاق داغلارغا چېپىپ بەرسە ئۈنۈمى بولىدۇ.

زىمادى بەرس (IX) تېرىنىڭ ھەر خىل زەخمىلىنىشىدىن پەيدا بولغان ئاق داغقا كۆك كەپتەر قېنىنى سۈركەپ، ئاپتاپقا قاقلاپ، گۆشىنى ئوتتا كاۋاپ قىلىپ پىشۇرۇپ يەپ بەرسە، تېرىنىڭ رەڭگى تېزلا

ئەسلىگە كېلىدۇ.

زىمادى بەرەس (X)

پىدىگەن ساپىقىنى ئېزىلگۈدەك دەرىجىدە سۇدا قاينىتىپ،

كېسەللىك بار ئورۇننى خام بىلەن سۈرتۈپ قىزارتقاندىن كې-

يىن، قايتا - قايتا چېپىپ ئاز ۋاقىت ئاپتاپقا قاقلاپ بەرسە،

تېرىگە رەڭ پەيدا بولىدۇ. بۇ ئۇسۇل يەككە تىپتىكى يېپىق

ئورۇنلاردىكى ئاق داغلارغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

زىمادى بەرەس (XI)

ھەمىشباھاردىن مۇۋاپىق مىقداردا تەييارلاپ سۇدا قاينى-

تىپ، تىرىپىنى سۈزۈپ ئېلىۋېتىپ، سۈيىنى پەس ئوتتا داۋام-

لىق قاينىتىپ، قويۇلغاندا سوۋۇتۇپ، ئاق داغ بار ئورۇنغا ھەر

كۈنى 1 — 2 قېتىم چېپىپ بەرسە، تېرە قىزىرىپ خال پەيدا

بولىدۇ.

زىمادى بەرەس (XII)

بىر دانە يىلاننىڭ قورسىقىنى يېرىپ ئىچىنى تازىلاپ،

شاھتەررىنى سوقۇپ سېلىپ، تىكىپ، ئوتقا قاقلاپ ئاققان يىغى-

نى قىزىق پېتى تارقاق شەكىلدىكى ئاق داغلارغا ئېقىتىپ داغلاپ

بەرسە، دائىرىلىك ئاقكېسەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (XIII)

مۇۋاپىق مىقداردىكى ھەشقىپچەك ئۇرۇقىنى ئاق ھاراققا

ئۈچ سوتكا چىلاپ، ئاق داغ بار ئورۇننى ئاز - ئازدىن يۇيۇپ

بەرسە، سۇ كۆتۈرۈپ قاپارتما ھاسىل قىلىدۇ. دورىنى ئىشلەت-

كەندە چىدىغۇسىز ئېچىشتۇرىدىغان بولغاچقا، كىچىك بالىلارغا،

يۈز ۋە شىللىق پەردىدىكى ئاق داغلارغا ئىشلەتمەسلىك ياكى
ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك.

بۇ دورىنى بىرقانچە قېتىملا ئىشلىتىش كۇپايە قىلىدۇ.
تارىخى كونا، دورىنىڭ تەسىرى ئاستا بولغان ئاق داغلارغا مەلۇم
ۋاقىت ئۈزۈلدۈرمەي ئىشلەتسىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

زىمادى بەرەس (XIV)

كېلەرنىڭ بېشىنى تۆۋەن قىلىپ ئېسىپ، تومۇزنىڭ ئاپتە-
پىغا قاقلاپ، ئاغزى ئۇدۇلغا يوغان قاچىنى قويۇپ قويسا،
ئىچىدىكى يېغى ئېرىپ تامچىپ چۈشىدۇ. ئاق داغ بار ئورۇننى
يەڭگىل ئۇۋۇلاپ بۇنىڭدا مايلاپ بەرسە، تېرە قاتتىقلىشىۋالغان
ئاقكېسەلگە تېز مەنپەئەت قىلىدۇ، تېرىنى يۇمشىتىدۇ.

زىمادى بەرەس (XV)

ھۆل ئەمەننى سىقىپ سۈيىنى چىقىرىپ، ئاق داغ بار
ئورۇنغا سۈركەپ، ئاپتاپقا قاقلاپ بەرسە، قاپارتقۇ پەيدا قىلىپ
خال چىقىرىدۇ.

زىمادى بەرەس (XVI)

ئالاقاغىنىڭ قېنى ۋە يېغىغا شەپەرەڭ قېنىنى ئارىلاشتۇ-
رۇپ، ئاق داغ بار ئورۇنغا چاپسا تېزلا خال پەيدا قىلىدۇ. ئاق
داغ ئەتراپىدىن ئىچىگە قاراپ قورۇلىدۇ.

زىمادى بەرەس (XVII)

چىپارىيەلەرنىڭ قېنى ۋە يېغىغا پاختەك قېنىنى قوشۇپ،
ئۇنىڭغا ئاز مىقداردا ئاق خەربەق، پەرىپىيۇنلارنى سوقۇپ ئارى-
لاشتۇرۇپ مەلھەم تەييارلاپ ئاق داغ بار ئورۇنغا تېڭىپ بەرسە

مەنپەئەت قىلىدۇ. (XVIII)

زىمادى بەرەس (XVIII) چايان، ئاق خەربەقنى باراۋەر مىقداردا، ھۆل ئېگىرنى بۇلارنىڭ ئىككى ھەسسىسىچىلىك تەييارلاپ چالا سوقۇپ، كۈچ-لىۋك سىركىگە چىلاپ بىر ھەپتە تۇرغۇزۇپ، ئاق داغ بار ئورۇنغا چاپسا، كېڭىيىش ھالىتىدىكى ئاق داغلارنىڭ تېز كېڭىيىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

زىمادى بەرەس (XIX) كۆيدۈرۈلگەن بېلىق سۆڭىكى، موزا، شەترەنجى ھىندى، سۈرمە، زاك، جوۋىنلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ، تاسقاپ كۈدە سۈيىدە يۇغۇرۇپ قۇرس تەييارلىنىدۇ. ھەرقېتىم ئىشلىتىدىغاندا قۇرس كونا سىركىدە ئېزىلىپ، ئاق داغ بار ئورۇنغا سۈركەپ ئاپتاپقا قاقلىسا ياكى ئاپتاپتىن چۈشكەندىن كېيىن كېسەللىك بار ئورۇنغا تېڭىپ يۆگەپ بەرسە مەنپەئەت قىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (XX) نۆشۈدۈر، سامساق، كۆك تۇتىيالارنى ئېزىپ لىمون سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئاق داغ بار ئورۇنغا چاپسا يەرلىك ئورۇندا داغلىغاندەك رەڭ پەيدا قىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (XXI) ھۆل زەنجۋىلىدىن مەلۇم مىقداردا، سامساقتىن شۇنىڭ يېرىمىچىلىك ئېلىپ ئېزىپ، زىماد تەييارلاپ، يەككە، تارقاق شەكىلدىكى ئاقكېسەلگە 2 — 3 كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇزاق

مۇددەت تېڭىپ بەرسە، كېسەللىك بار ئورۇننى قىزارتىپ رەڭ پەيدا بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئاق داغ ئەتراپى قورۇلۇپ كىچىكلەيدۇ. دورىنى تاڭغاندىن كېيىن قىزىرىپ سۇ كۆتۈرۈپ كەتسە دورا ئىشلىتىشنى ۋاقتىنچە توختىتىپ، كېيىن يەنە ئىشلىتىش لازىم.

زىمادى بەرەس (XXI)

دائىرىلىك ئاقكېسەل ۋە تۈكلەر ئاقىرىپ كەتكەن ئاقكېسەل. لەرگە كۈنىگە بىرقانچە قېتىم ھۆل زەنجىۋىل سۈيىنى سۈر. كەپ، كېسەللىك بار ئورۇننى يەڭگىل ئۇۋۇلاپ بەرسە خال پەيدا بولۇپ، ئاق داغ قىزىرىپ ئاق تۈكلەرمۇ تەدرىجىي قارىداپ ياخشىلىنىشقا يۈزلىنىدۇ. بۇ خىلدىكى ئاقكېسەل بىمارلىرى سىيادان ئورۇقنى مۇۋاپىق مىقداردا ئۈزمەي ئىستېمال قىلىپ بەرسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

6. مۇرەككەپ زىمادى بەرەس نۇسخىلىرى

زىمادى خەردەل (I)

【تەركىبى】 خەردەل (قىچا)، كەپتەر مايىقى، بۇغداي ئۇ. نىنىڭ ھەر بىرىدىن 30 گرامدىن؛ مۇۋاپىق مىقداردا تۇخۇم يېغى ياكى كالىنىڭ يىلىكى. 【تەييارلىنىشى】 قىچا بىلەن كەپتەر مايىقى سوقۇپ تاسقىد. لىپ بۇغداي ئۇنىغا قوشۇلىدۇ، ئاندىن كۆرسەتمىدىكى ئىككى خىل مايىنىڭ بىر خىلىغا تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. 【خۇسۇسىيىتى】 يەرلىك ئورۇننى غىدىقلاش، قىزىتىش ئارقىلىق تېرە رەڭلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشنى تېزلىتىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 بىمارنىڭ كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ ئاپتاپقا قاقلىنىۋاتقاندا ياكى ئاپتاپتىن چۈشكەندىن كېيىن يەرلىك ئورۇنغا دورا چېپىلىپ خام بىلەن تېڭىپ قويۇلىدۇ، يەرلىك ئورۇندا قىزىش - ئاغرىش سېزىلگەن ھامان دورا ئېلىۋېتىلىدۇ.

بۇ دورىنى كىچىك بالىلارغا ۋە شىللىق پەردە تىپىدىكى ئاق داغلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ ھەر 3 — 5 كۈندە 1 قېتىم ئىشلىتىش لازىم.

زىمادى خەردەل (Ⅱ)
【تەركىبى】 خەردەل 20 گرام، سەبرى سوقۇترى 7 گرام، مۇۋاپىق مىقداردا رەۋغېنى قۇستى.
【تەييارلىنىشى】 خەردەل بىلەن سەبرىنى يۇمشاق سوقۇپ تاسقاپ، رەۋغېنى قۇستىغا قوشۇش ئارقىلىق ئۇماچ ھالەتتىكى دورا تەييارلىنىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى قىزىتىش، غىدىقلاش ئارقىلىق تېرىدە رەڭ ھاسىل بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كېسەللىك بار ئورۇننىڭ كۆلىمىگە قاراپ ئاپتاپقا قاقلىنىۋاتقاندا ياكى ئاپتاپتىن چۈشكەندىن كېيىن دورا سۈركىلىپ، ئۈستىدىن خام بىلەن تېڭىپ قويۇلىدۇ. يەرلىك ئورۇندا ئاغرىش ئالامىتى سېزىلسە ئېلىۋېتىلىدۇ. بۇ دورىنى كىچىك بالىلارغا ۋە شىللىق پەردىدە پەيدا بولغان ئاق داغلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

زىمادى داۋائى ھىندى بەرەس
【تەركىبى】 شەترەنجى ھىندى، مىس دېتى، ھاك، زىراۋەندى، زەرنىخنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن؛ جوۋىنە (نەنخۇا)

5 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇپ تاسقالغاندىن كېيىن، كىچىك بالىلارنىڭ سۈيدۈكى بىلەن ئارىلاشتۇرۇلۇپ، 5 كۈن ئاپتاپتا قويۇلىدۇ، ئاندىن سۈزۈۋېتىلىدۇ. 【خۇسۇسىيىتى】 كېسەللىك بار ئورۇننى غىدىقلاش، قىزدىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار. 【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللىك بار ئورۇنغا سۈركىتىلىپ، ئاپتاپقا قاقلىنىدۇ. بۇ دورىنى كۆز، بۇرۇن، ئەتراپىدىكى ئاق داغلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

زىمادى بەرەس (I)

【تەركىبى】 شاخار 18 گرام، پىياز 500 گرام، ئاق خەر-بەق 9 گرام، قارا خەر-بەق 9 گرام، ئوردان 9 گرام، ھۆل ئېگىر 30 گرام، شۇرا 16 گرام، ئاقىرقەرھە 9 گرام، ھىندى تۈزى 16 گرام، كۆك تاش 3 گرام، نۆشۈدۈر 6 گرام، ھەسەل 200 گرام.

【تەييارلىنىشى】 ئالدى بىلەن پىياز قىيما قىلىنىپ، چەك-كىلەنگەن ھەسەلدە پىشۇرۇلىدۇ، ئاندىن قالغان دورىلار سوقۇپ تاسقىلىپ، ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللىك بار ئورۇننى ئۇۋۇلاپ سەل قىزارتقاندىن كېيىن دورا سۈركىلىپ ئاپتاپقا قاقلىنىدۇ. 【خۇسۇسىيىتى】 كېسەللەنگەن تېرىلەرنى غىدىقلاش، قىزدىرتىش، تېرە رەڭلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، تېرىنى يۇمشىتىش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

زىمادى بەرەس (II)

【تەركىبى】 كۆيدۈرۈلگەن مىس، سېرىق زەرەنخ، شەترەندى جى ھىندىنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ ھاك، زىراۋەندى،

زەنجىۋىلىنىڭ ھەر بىرىدىن 12 گرامدىن ئېلىنىدۇ.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇپ تاسقىلىپ، كىچىك بالىنىڭ سۈيۈكى ياكى كونا سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇلۇپ، 20 كۈن ئاپتاپتا قويۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 كېسەللەنگەن ئورۇننى يەڭگىل غىدىقلاش، قىزارتىش، تېرە خاللىرىنى پەيدا قىلىش قاتارلىق تەسىرى بار.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللىك بار ئورۇنغا كۈنىگە 1 قېتىم سۈركىلىپ ئاپتاپقا قاقلاپ بېرىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (Ⅲ)

【تەركىبى】 ئادراسمان ئۇرۇقى 10 گرام، زەپەر 3 گرام، جويۇز بۇۋا 10 گرام، تەنكار 10 گرام، ئامىلە 7 گرام.

【تەييارلىنىشى】 ئادراسمان، جويۇز، ئامىلە قاتارلىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى ئەرەقى نەخۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇلىدۇ، ئەتىسى سوقا ھاۋانچىدا سۈيى بىلەن ئېزىلىپ، ئۈستىگە تەنكار بىلەن زەپەر سېلىنىدۇ ۋە يەنە ئېزىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورىنىڭ تەسىرى Ⅱ نۇسخا بىلەن ئوخشاش.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللىك بار ئورۇننى ئۇۋۇلاپ، ئاپتاپقا 10 مىنۇت قاقلىغاندىن كېيىن دورا سۈركىلىپ يەنە ئاپتاپقا قاقلاش تەلەپ قىلىنىدۇ.

زىمادى بەرەس (Ⅳ)

【تەركىبى】 قىزىل زەرنىخ، سېرىق زەرنىخ، جىنكېۋىزى ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن؛ چەشمە خوروز 10

گرام. **【تەييارلىنىشى】** دورىلار سوقۇپ تاسقىلىپ، كونا سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 يۇقىرىقى نۇسخىلارنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كۈنىگە 1 قېتىم ئايتاپقا قاقلاش بىلەن بىرلىكتە سۈركىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (V) **【تەركىبى】** ياۋا پىياز، سۆگەتگۈل ياپرىقى، گۈڭگۈرت ئەسلى، قىزىل زەرىنخنىڭ ھەر بىرىدىن 25 گرامدىن؛ شەترەندى جى ھىندى، ئادراسمان ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرامدىن؛ ئازاراقى (كۇچۇلا) يېغى 250 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ تاسقىلىدۇ، ئاندىن كۇچۇلا يېغىغا ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى غىدىقلاش، يۇمشىتىش، تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ يېتىلىشىنى تېزلەشتۈرۈش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 ئايتاپقا قاقلىنىشقا بىرلەشتۈرۈپ يەرلىك ئورۇنغا سۈركىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (VI) **【تەركىبى】** شەترەنجى ھىندى 30 گرام، ئوردان 20 گرام، تۇرۇپ ئۇرۇقى 20 گرام، قىچا 30 گرام، ھۆل زەنجىر 20 گرام. **【تەييارلىنىشى】** دورىلار سوقۇلغاندىن كېيىن، كونا سىرگە چىلىنىپ 5 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 يۇقىرىقى نۇسخانىڭكى بىلەن ئوخشاش.
【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كۈنگە 1 قېتىم ئاپتاپقا قاقلاشقا
بىرلەشتۈرۈپ سۈركىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (VII)

【تەركىبى】 مۇۋاپىق مىقداردا تېشىلىمىگەن مەرۋايىت، تۇ-
تيا.

【تەييارلىنىشى】 مەرۋايىت بىلەن تۇتيا يۇمشاق ئېزىلىپ،
مۇۋاپىق مىقداردىكى كونا سىركىگە ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى يۇمشىتىش، سىلىقلاش، تېرە قان
تومۇرلىرىنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېرە رەڭ
ماددىسىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى تېزلىتىش قاتارلىق تەسىرلەرگە
ئىگە.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللەنگەن ئورۇننى ئاپتاپقا يا-
كى ئۇزۇن دولقۇنلۇق بىنەپشە نۇر چىرىغىغا قاقلاپ، كۈنگە
1 قېتىم دورا سۈركىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (VIII)

【تەركىبى】 شەترەنجى ھىندى، تۇرۇپ ئۇرۇقى، ئاقىرقەر-
ھا، قىچا، ھۆل زەنجىۋىللىرىنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرامدىن؛ ئاق
توغرىغا، قۇستى تەلىخ 25 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇلغاندىن كېيىن كونا سىركى-
گە چىلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ، ئاپتاپتا 7 كۈن تۇرغۇزۇ-
لىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى غىدىقلاش، قىزارتىش، تېرە رەڭ
ماددىسىنىڭ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، قىسمەن ھاللاردا
قاپارتما پەيدا قىلىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 بىمار ئاپتاپقا قاقلىنىپ تۇرۇپ كېسەللىك بار ئورۇنغا سۈركەيدۇ ياكى ئاپتاپتىن چۈشكەندىن كېيىن كېسەللىك بار ئورۇنغا چېپىپ، خام بىلەن يۆگەپ قوي-سىمۇ بولىدۇ. ھەر 3 — 4 كۈندە 1 قېتىم تېخىلىدۇ.

زىمادى بەرەس (IX)
【تەركىبى】 پەرىپىيۇن 8 گرام، كۆيدۈرۈلگەن بالادور 8 گرام، قارا خەربەق 25 گرام، تاغ لالىسى 25 گرام، كۆك تاش 4 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇلۇپ تاسقالغاندىن كېيىن، كونا سىركىگە چېلىنىپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 VIII نۇسخىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.
【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 بىمار كېسەللىك بار ئورۇننى ئاپتاپقا قاقلاپ تۇرۇپ دورىنى سۈركەيدۇ. كىچىك بالىلارغا ۋە شىللىق پەردىلەردە پەيدا بولغان ئاق داغلارغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

زىمادى بەرەس (X)
【تەركىبى】 ئاقىرقەرھە، شەترەنجى ھىندى، سىيادان، تاغ لەيلىسى، سېرىق زەرنىخنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرامدىن، سېرىق قىچا، مورى مەككىنىڭ ھەر بىرىدىن 25 گرامدىن.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار يۇمشاق سوقۇپ تاسقىلىپ ئوغلاق-نىڭ قېنى بىلەن ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تەسىرى IX نۇسخىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.
【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 ئاپتاپقا قاقلىنىپ تۇرۇپ كېسەللىك بار ئورۇننى ماتا بىلەن سۈرتۈپ قىزارتىپ، ئاندىن دورىنى سۈركەپ 8 سائەتتىن كېيىن ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇۋېتىپ

تۇخۇم يېغىدا مايلاپ بەرمە بولىدۇ. (X) (يېغىدا مايلاپ بەرمە بولىدۇ. تۇخۇم يېغىدا مايلاپ بەرمە بولىدۇ.)

زىمادى بەرمە (XI) (يېغىدا مايلاپ بەرمە بولىدۇ. تۇخۇم يېغىدا مايلاپ بەرمە بولىدۇ.)

【تەركىبى】 ئەنجۈر ياپرىقى، ئاغىچە ياپرىقى، ئامۇت ياپرىقى، ئانار پوستى، قۇرۇتۇلغان ئوسما، ياڭاق پوستىنىڭ ھەرىدى.

رىدىن 30 گرامدىن؛ جىنكېۋىزى ئۇرۇقى 15 گرام، مۇۋاپىق مىقداردا ياڭاق يېغى.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇپ تاسقالغاندىن كېيىن، ياڭاق يېغىغا ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تەسىرى X نۇسخىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كۈندە ياكى 2 كۈندە 1 قېتىم ئاپتاپقا قاقلىنىش بىلەن بىرلىكتە كېسەللىك بار ئورۇنغا سۈر-كىلىدۇ.

زىمادى بەرمە (XII) (يېغىدا مايلاپ بەرمە بولىدۇ. تۇخۇم يېغىدا مايلاپ بەرمە بولىدۇ.)

【تەركىبى】 شەترەنجى ھىندى، زەرنىخ، زىراۋەندى، زەردە-جىۋىل، كۆيدۈرۈلگەن ھاكنىڭ ھەربىرىدىن 25 گرامدىن؛ مىس دېتى پاراشوكى ۋە كۆك كەپتەر مايىقىنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ، يېتەرلىك مىقداردا كىكى كونسىرىغان ئۈزۈم سىركىسىگە چىلىنىپ، 3 ھەپتە ئاپتاپتا تۇرغۇزۇلىدۇ، بۇ جەرياندا 3 كۈندە 1 قېتىم ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، ئاندىن تەركىبلەرنىڭ قالدۇقى داكىدا سۈزۈۋېتىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 كېسەللىك بار ئورۇننى غىدىقلاش، قارا-تىش، تېرىنىڭ قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش ئارقىلىق رەڭ ھاسىل بولۇشنى تېزلىتىش رولىغا ئىگە.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 بىمار كېسەللىك بار ئورۇنغا كۈندە

1 قېتىم سۈركەپ ئاپتاپقا قاقلىنىدۇ. **【ئەسكەرتىش】** دورا تەييارلىغاندا سۈزۈۋېتىلگەن قىسمىنى قول، پۇت، دۈمبىدىكى ئاق داغلارغا تېڭىپ بەرسىمۇ مەنپەئەتتى بولىدۇ. **【تەييارلىنىشى】**

زىمادى بەرەس زەنجىۋىل **【تەركىبى】** ھۆل زەنجىۋىل 60 گرام، جىنكېۋىزى ئۇرۇقى 20 گرام، زەپەر خېمىكى 10 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ %75 لىك 350 مىللىلىتىر ئىسپىرتقا چىلىنىپ بىر ھەپتە تۇرغۇزۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى غىدىقلاش، يەرلىك ئورۇننى قىزارىتىش، سۇلۇق قاپارتما ھاسىل قىلىپ، تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى تېزلىتىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كېسەللىك بار ئورۇننى خام ياكى پەتلىك رەخت بىلەن سۈرتۈپ قىزارىتىپ ئاپتاپقا قاقلىنىپ تۇرۇپ سۈركىلىدۇ. دورىنى تېرىدىن سۇ كۆتۈرۈلگۈچە ئىشلىتىپ، قاپارتما قېتىشىپ تېرە ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن 4 — 6 كۈندە 1 قېتىم سۈركىلىدۇ.

【دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار】 تېرىنىڭ سېزىمچانلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش لازىم.

زىمادى بەرەس سىيادان **【تەركىبى】** سىيادان 70 گرام، نەنخۇا (جوۋنە) 25 گرام، سامساق 70 گرام، ئاقىرقەرھە 25 گرام، يۆگمەچ ئوت ئۇرۇقى 50 گرام، زاراڭزا چېچىكى 25 گرام، تۇخۇم سېرىقى 100 گرام، كونسىرغان ئۈزۈم سىركىسى 500 مىللىلىتىر. **【تەييارلىنىشى】** قاتتىق دورىلار سوقۇپ تاسقىلىدۇ. ئۈزۈم

سۈركىسىگە تۇخۇم سېرىقى سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، ئاندىن سوقۇپ تەييارلانغان دورىلار ئۇنىڭغا ئارىلاشتۇرۇلۇپ، ئاغزى مەھكەم شېشە ياكى ساپال قاچىدا 40 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ. **【خۇسۇسىيىتى】** تەسىرى زىمادى بەرەس سۈرمىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كۈنىگە 1 — 2 قېتىم، ئاپتاپقا قاقلانغاندا سۈركىلىدۇ.

زىمادى بەرەس سۈرمە **【تەركىبى】** سۈرمە تېشى 20 گرام، شەترەنجى ھىندى، كۆيدۈرۈلگەن بېلىق سۆڭىكى، موزا، قىزىل زاك، نەخۇا (جو-ۋىنە) نىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرامدىن. **【تەييارلىنىشى】** دورىلار سوقۇپ تاسقالغاندىن كېيىن، سا-لاھىيە قىلىنىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى كونا سۈركىگە ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىگە رەڭ بېرىدۇ، تېرە رەڭلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى تېزلىتىدۇ. يەرلىك ئورۇننى غىدىقلايدۇ. تېرىنىڭ قان ئايلىنىشىنى ياخشىلايدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كۈنىگە 1 — 2 قېتىم، ئاپتاپقا قاقلانغاندا سۈركىلىدۇ.

بىمار بۇ دورىنى ئىشلىتىش ئالدىدا كېسەللىك بار ئورۇننى خام ياكى پەتلىك رەختلەر بىلەن يەڭگىل سۈرتۈپ، تېرە قىزارغاندىن كېيىن 10 مىنۇت ئاپتاپقا قاقلىۋېتىپ ئاندىن سۈركەپ يەنە ئاپتاپقا قاقلىسا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

زىمادى بەرەس كەپىرەس **【تەركىبى】** كەپىرەس، گۆڭگۈرت ئەسلىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 30 گرام؛ زىراۋەندى 10 گرام، بۇيا ئۇرۇقى 5 گرام،

قوي يېغى 100 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار يۇمشاق سوقۇلغاندىن كېيىن سالا-
ھىيە قىلىنىپ، كۆرسەتمىدىكى قوي يېغىغا ئارىلاشتۇرۇلۇپ،
مۇۋاپىق ئىسسىقلىق بىلەن قىزدۇرۇلىدۇ.
【خۇسۇسىيىتى】 تېرە رەڭلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى ئىل-
گىرى سۈرۈش، تېرىنى يۇمشىتىش، يەڭگىل غىدىقلاش قاتار-
لىقلار.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 بىمار ئاپتاپقا قاقلىنىپ تۇرۇپ
كېسەل بار ئورۇنغا سۈركەيدۇ. ئاپتاپتىن چۈشۈپ خارخەسەك
تەركىبلىك چاي دورىسى سۈيىدە يەرلىك ئورۇننى يۇيۇپ
بېرىدۇ.

【دورا ئىشلەتكەندە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار】

1) دورىنى قاپاق، بۇرۇن ۋە جىنسى ئەزالارغا ئېھتىيات
بىلەن ئىشلىتىش، بولۇپمۇ كۆزگە كىرىپ كېتىشتىن ساقلى-
نىش كېرەك.

2) دورىنى ئىشلەتكەندە بەدەننىڭ سىزىمچانلىقىغا ئالاھىدە
دىققەت قىلىش كېرەك.

زىمادى بەرەس زەرنىخ

【تەركىبى】 سېرىق زەرنىخ، مىس دېتى پاراشوكلىرىنىڭ
ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن؛ ئوردان، گۈلقەقە، زەنجۈبىللەرنىڭ
ھەر بىرىدىن 5 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ تاسقىلىپ، يې-
تەرلىك مىقداردىكى كونا ئۇزۇم سىركىسىگە ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.
【خۇسۇسىيىتى】 كېسەللىك بار ئورۇننى غىدىقلاش، تېر-
نىڭ رەڭ ئىشلەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش

قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 كۈنىگە 1 قېتىم، ئاپتاپقا قاقلاندىغاندا سۈركىلىدۇ ياكى يەرلىك ئورۇنغا دورىنى چېپىپ، ئۈستىدىن خام بىلەن يۆگەپ بېرىلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】

(1) يەرلىك ئورۇنغا دورىنى سۈركەپ تاختىغاندا ئاغرىش، قىزىش، ئېچىش ئالامىتى سېزىلسە تېخىقنى دەرھال يېشىۋېتىش لازىم.

(2) بۇ دورىنى كۆز ئەتراپى، جىنسىي ئورگان قاتارلىق ئورۇنلارغا ئىشلەتمەسلىك كېرەك.

زىمادى بەرەس تىزايى

【تەركىبى】 مۇۋاپىق مىقداردا نۆشۈدۈر، سامساق، كۆك تۇتىيا (تۇتىيا بولمىسا ئورۇنغا كۆك تاشنى كۈشتە قىلىپ ئىشلىتىلسىمۇ بولىدۇ)، مۇۋاپىق مىقداردا لىمون سۈيى (لىمون سۈيى تېپىلمىسا كۈچلۈك سىركە بولسىمۇ بولىدۇ).

【تەييارلىنىشى】 دورىلار سوقۇلغاندىن كېيىن لىمون سۈيى ياكى سىركىگە چېلىنىپ، قاچىنىڭ ئاغزى ھىم ئېتىلىپ، تومۇز ئاپتېپىدا 10 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ، ئاندىن داكا بىلەن قالدۇقلار سۈزۈۋېتىلىدۇ ۋە سۈيى ئىشلىتىلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى غىدىقلاش، قىزىتىش، تېرە رەڭ-لىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولىغا ئىگە. 【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 بۇ دورىنى شىللىق پەردىدىن باشقا ئورۇنلاردىكى ئاق داغلارغا ئەھۋالغا قاراپ كۈنىگە 1 قېتىم سۈركەسە بولىدۇ. كىچىك بالىلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

7. ياغ (رەۋەن) تەركىبلىك

دورملار

رەۋغېنى لەۋزى (بادام يېغى)

【تەركىبى】 مۇۋاپىق مىقداردا بادام مېغىزى.

【تەييارلىنىشى】 بادام مېغىزىنىڭ پوستى سويۇۋېتىلىپ ئاقلىنىدۇ ۋە سوقۇلىدۇ، ئاندىن قەلەيلەنگەن مىس لېگەنگە سېلىنىپ، چوغنىڭ ئۈستىگە قويۇلۇپ، ئاز - ئازدىن سۇ قۇيۇپ ئېزىپ يۇمشىتىلىدۇ. شۇ چاغدا لېگەن بىر تەرەپكە يانتۇ قىلىندى. سا بادام يېغى ۋىزىلداپ ساقىيدۇ. ساقىپ چۈشكەن ياغ ئۇدۇل - لۇق باشقا قاچىغا چۈشۈرۈلىدۇ، مەشغۇلات بادام مېغىزى پۈتۈندى. لەي ياغسىز لانغانغا قەدەر داۋاملاشتۇرۇلىدۇ. بۇ خىل دورا تازى - لانغان جۇۋازدا ياغ سىقىش ئۇسۇلىدا تەييارلانسىمۇ بولىدۇ. 【تەبىئىتى】 تاتلىق بادامنىڭ يېغى ھۆل ئىسسىق ۋە مۆتىدە.

دەل؛ ئاچچىق بادامنىڭ مېغىزى قۇرۇق ئىسسىق. 【خۇسۇسىيىتى】 ئىششىق ياندۇرىدۇ، مۇسكۇل ۋە تېرىلەر - نى بوشىتىپ يۇمشىتىدۇ، ئاغرىق پەسەيتىدۇ، ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ، تارتىشىپ قالغان پەيلەرنى بوشىتىدۇ، ئاۋازنى نورماللاشتۇرىدۇ، مېڭىدىكى قۇرۇقلۇقنى يوقىتىپ، ھۆللۈك پەيدا قىلىدۇ. قۇلاق ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ، قۇسۇشنى توختىتىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 مېڭە ۋە باش ئاغرىقى، ئۇيقۇسىزلىق، قۇلاق ئاغرىقى، ئۆپكە ئىششىقى، تېرە قۇرغاق - لىشىپ يېرىلىش قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ، تېرىگە نەملىك يەتكۈزىدۇ. كونا يۆتەل، دەم سىقىلىش، مۇپاسىل قاتارلىق كېسەل -

لىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【مىقدارى】 كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىچۈرۈش، سىرتتىن ياغلاش ۋە تېمىتىش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ ھەمدە ئىتىرىفىل دورىلارنى تەييارلاشتا مەخسۇس ياغلاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

رەۋغېنى شۇنىز (سىيادان يېغى)

【تەركىبى】 مەلۇم مىقداردا سىيادان.

【تەييارلىنىشى】 (1) سىيادان پاكىزلىنىپ، جۇۋاز ياكى ياغ تارتىش ماشىنىسىدا ياغ چىقىرىلىدۇ؛ (2) گىلى ھېكمەت ئۇسۇلى بىلەن يېغى ئېلىنىدۇ؛ (3) 100 گرام سىيادان چالا سوقۇلغاندىن كېيىن قاچىغا سېلىنىپ، 300 مىللىلىتىر 85% لىك ئىسپىرت قۇيۇلۇپ بىرنەچچە كۈن تۇرغۇزۇلۇپ سۈزۈۋېلىنىپ، يەنە 300 مىللىلىتىر 75% لىك ئىسپىرت قۇيۇلۇپ ئۈچ كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ ۋە تىرىپى سۈزۈۋېلىنىپ، ئالدىنقى قېتىملىق ئىسپىرت بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ، ئەينەك كولىغا قۇيۇلۇپ سوغۇق تەسىر قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئىسپىرت يىغىۋېلىنىپ يېغى ئېلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىگە جۇلا (رەڭ) بېرىش، پەينى يۈمىشىتىش، ھەيز ماغدۇرۇش، سۈت پەيدا قىلىش، چاپنى قارايتىش، سۈيدۈك ھەيدەش تەسىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل، پالەچ، لەقۇا، پەي تارتىشىپ قېلىش، چاچ ئاقىرىپ كېتىش، قىچىش-قاق قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ.

【مىقدارى】 كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا سىرتتىن مايلاش ياكى پىشۇرۇلغان سۈتكە ئارىلاشتۇرۇپ ئىد-

چىشكە بېرىلىدۇ. رەۋغېنى ئازاراقى
【تەركىبى】 كۈچۈلا 1000 گرام، كۈنجۈت يېغى 200 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 كۈچۈلا 5000 مىللىلىتىر سۇ قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن كۈچۈلا سۈزۈۋېلىنىپ سىقىلىدۇ ۋە ئۇنى قايناتقان سۇغا كۈنجۈت يېغى قۇيۇلۇپ تاكى سۇ تۈگەپ يېغى قالغۇچە قاينىتىلىدۇ.
【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 پەيلەرنى چىڭىتىش، تېرىنى قىزىتىش، تېرىنى يەڭگىل غىدىقلاش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 بەلغەمدىن بولغان ئاق-كېسەل، لەقۋالىق، مۇفاسىل، بەل ئاغرىقى قاتارلىق كېسەل-لىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ. مىقدارى كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

رەۋغېنى دۈب (ئېيىق يېغى)
【تەييارلىنىشى】 ئېيىقنىڭ يېغى ئاپتاپتا ياكى قازاندا ئېرىد-تىلىپ چىگىدىكى ئايرىۋېتىلىدۇ. مانا بۇ ئۇسۇلدا ئايرىلغان ياغ رەۋغېنى دۈب دەپ ئاتىلىدۇ.
【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 مۇفاسىل، بېغىش ئاغرىقلىرى، سوغۇق-تىن بولغان مۈسكۈل ۋە تېرىلەرنىڭ تارتىشىپ قېلىشىنى داۋالاش، چىڭىپ ۋە تارتىشىپ قالغان پەيلەرنى يۇمشىتىش تەسىرلىرىگە ئىگە.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 قول ۋە پۇت قىسمىدا

رىدىكى قاتتىقلىشىۋالغان ئاقكېسەل ۋە كونا مۇفاسىل ئاغرىقلىرى، پەيلەر تارتىشىپ قېلىش كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ. دورا مىقدارى كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ، سىرتىدىن ياغلىنىدۇ.

رەۋغېنى قۇستە (قۇستە يېغى)
【تەركىبى】 قۇستە 30 گرام، پىلىپىل، پەرىپىيۇن، ئاقىر-قەرھالارنىڭ ھەر بىرىدىن 12 گرامدىن؛ جۈندەبى دەستۇر (قۇندۇز قەھرى) 7 گرام، كونا مۇسەللەس 300 مىللىلىتىر، زەيتۇن يېغى ياكى كۈنجۈت يېغى 150 مىللىلىتىر.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ، قۇستە، پىلىپىل، ئاقىر-قەرھالار چالا سوقۇلغاندىن كېيىن مۇسەللەسكە بىر كېچە چىلىنىدۇ، ئەتىسى 150 مىللىلىتىر قالغۇچە قاينىتىلىپ سوۋۇغاندا سۈزۈۋېلىنىدۇ. سىقىۋېلىنغان دورا تىرىپىلىرى تاشلىۋېتىلىپ، مۇسەللەس قايتىدىن قازانغا قويۇلۇپ ئۈستىگە كۈنجۈت يېغى ياكى زەيتۇن يېغى تۆكۈلىدۇ، ئاندىن مۇسەللەس تۈگىپ ياغ قالغۇچە قاينىتىلىپ، يۇمشاق سوقۇلۇپ تاسقالغان قۇندۇز قەھرى بىلەن پەرىپىيۇن تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. دورا سوۋىغاندىن كېيىن بىر قېتىم چەككىلىنىدۇ.
【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.

خۇسۇسىيىتى】 ئاغرىق پەسەيتىش، پەينى چىگىتىش، چاپچى قارايتىش، تېرىنىڭ رەڭ ھاسىل قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، ئاشقازان، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش تەسىرلىرىگە ئىگە.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 لەقۋا، پالەج، مۇفاسىل، ئاشقازان - جىگەر ئاغرىقلىرى، ئاقكېسەل ۋە چاچ ئاقىرىپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
كېسەللىكنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئاغرىغان جاي سىرتىدىن ياغلىنىدۇ.

8. مەلھەم دورىلار

مەلھەمى پەرپىيۇن (I)

【تەركىبى】 نۆشۈدۈر 190 گرام، شاكىلىدىن ئايرىلغان قىزىل ئابدەمىلىك 33 گرام، پەرپىيۇن 10 گرام، ئاقىرقەرھە 10 گرام، كۈچۈلا يېغى 550 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ، ئابدەمىلىكتىن باشقىلىرى يۇمشاق سوقۇلىدۇ. ئابدەمىلىك چا-لىراق سوقۇلغاندىن كېيىن، ھاۋانچىغا ئازراق كۈچۈلا يېغى قۇيۇلۇپ ئوبدان ئېزىپ ئارىلاشتۇرۇلۇپ، ئۈستىگە تالقان دورى-لار سېلىنىدۇ، ئاندىن كۈچۈلا يېغىنىڭ قالغىنى تۆكۈلۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى قىزىتىش، قۇرۇتۇش، يەڭگىل غىدىقلاش، تېرە رەڭ ماددىسىنىڭ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈ-رۈش، ئاغرىق توختىتىش تەسىرلىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىشى】 ئاقكېسەل، بەھەق، پەلەچ، لەۋزا كېسەل-لىكلىرىگە بەدەن سىرتىدىن ئىشلىتىلىدۇ.

ئاقكېسەلگە ئىشلەتكەندە ئاۋۋال كېسەللىك بار ئو-رۇننى 5 — 10 مىنۇت ئاپتاپقا قاقلاش، ئاندىن دورىنى سۈركەپ يەنە 10 — 15 مىنۇت ئاپتاپقا قاقلاپ بېرىش، كېسەللىك بار ئورۇندا خال (قارا چېكىتلەر) پەيدا بولغاندىن كېيىن ئاپتاپتىن چۈشۈش ئالدىدا ياكى ئاپتاپتىن چۈشۈپ 1 سائەت ئىچىدە يەرلىك ئورۇنغا سۈركەپ پاختا رەخت ياكى خام بىلەن يۆگەپ ئىسسىق ساقلاپ بەرسە داۋالاش ئۈنۈمى ئالاھىدە پەرقلىق بولىدۇ.

دورنى ئىشلەتكەندە تېرىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن
ئېھتىيات قىلىش كېرەك. 8.

مەلھىمى پەرىپىيۇن (I)

【تەركىبى】 نۆشۈدۈر 200 گرام، ئابدېمىلىك 35 گرام،
پەرىپىيۇن، ئاقىرقەرھە، جوۋىنە (نەنخۇا)، قارىمۇچلارنىڭ
ھەرىرىدىن 10 گرامدىن؛ كۇچۇلا يېغى 600 مىللىلىتىر.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە ھازىرلىنىپ،
ئابدېمىلىكتىن باشقىلىرى يۇمشاق سوقۇلىدۇ. پوستىدىن ئاي-
رىلغان ئابدېمىلىك ھاۋانچىدا سوقۇلغاندىن كېيىن، ئۈستىگە
ئازراق كۇچۇلا يېغى تۆكۈلۈپ يۇمشاق ئېزىلىدۇ. تالقان دورىلار
سېلىنىپ قالغان كۇچۇلا يېغى بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.
تەبىئىتى، خۇسۇسىيىتى ۋە ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر مەل-
ھىمى پەرىپىيۇن (I) نىڭكى بىلەن ئوخشاش.

مەلھىمى ئوقاپ

【تەركىبى】 نۆشۈدۈر 100 گرام، ھەسەل 300 گرام.
【تەييارلىنىشى】 نۆشۈدۈر يۇمشاق سوقۇپ تاسقىلىپ ئۇپا
ھالىتىگە كەلتۈرۈلىدۇ. ھەسەل ئېرىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىۋېتىل-
گەندىن كېيىن نۆشۈدۈر تالقىنى سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇ-
لىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى غىدىقلاش، سۇ كۆتۈرگۈزۈپ تېرە
رەڭلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى تېزلىتىش تەسىرىگە ئىگە.
【دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار】

1) دورىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن كېسەللىك بار ئورۇننى
لۆڭگە ياكى پەتلىك رەختتە سۈرتۈپ تېرىنى قىزارتىش، ئاندىن
دورنى ئارىلاشتۇرۇپ سۈركەش كېرەك.

(2) خال چۈشكەن ئورۇنلارغا ئىشلەتمەسلىك ياكى ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

مەلھىمى بەرەس (I)

【تەركىبى】 ئاق ئۆشۈدۈر 21 گرام، شاپتۇل مېغىزى يېغى 30 گرام، ئاقىرقەرھا 21 گرام، نەخۇا (جۇۋنە) 7 گرام. 【تەييارلىنىشى】 دورىلار يۇمشاق سوقۇپ تاسقىلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى ھەسەل بىلەن مەلھەم تەييارلىنىدۇ. 【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 يەرلىك ئورۇننى قىزىتىش، تېرىنىڭ رەڭ ھاسىل قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، تېرە خاللىرىنى جانلاندۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ھەر خىل ئاقكېسەل ۋە بەھەقلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. چوڭلار كۈنىگە ئەۋالغا قاراپ 1 — 2 قېتىم، ئاپتاپقا قاقلىنىپ 15 مىنۇتتىن كېيىن دورىنى سۈرۈپ كەپ يەنە ئاپتاپقا قاقلىنىدۇ. كېسەللىك بار ئورۇنغا زىماد قىلىپ تېڭىشقىمۇ بولىدۇ.

مەلھىمى بەرەس (II)

【تەركىبى】 سېرىق زەرنىخ، زەھەرسىزلەندۈرۈلگەن مىس، شەترەنجى ھىندى، ھاك، زىراۋەندىنىڭ ھەربىرىدىن 50 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلغاندىن كېيىن، يېتەرلىك مىقداردىكى كونا سىركىگە چىلىنىپ، تومۇزنىڭ ئاپتېپىدا 20 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى غىدىقلاپ رەڭ ھاسىل قىلىدۇ. 【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە

ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كېسەللىك بار ئورۇنغا كۈنىگە 1 — 2 قېتىم سۈركەپ، قاقلاپ بەرسە بولىدۇ. دورىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن قوچۇپ ئېلىشتۇرۇش تەلەپ قىلىنىدۇ.

مەلھىمى قۇستە (مۈرەككەپ)
【تەركىبى】 ئاچچىق قۇستە 150 گرام، شەترەنجى ھىندى، زەرنىخ، قارىمۇچ، زەنكارلارنىڭ ھەربىرىدىن 100 گرامدىن؛ كونا سىركە 3000 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ، ئاغزى مۇستەھ-كەم شېشە ياكى ساپال قاچىدىكى كونا سىركىگە سېلىنىدۇ ۋە تومۇز ئاپتېپىدا 10 كۈن تۇرغۇزۇلىدۇ. بۇ جەرياندا كۈنىگە بىر قېتىم ئارىلاشتۇرۇپ تۇرۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 تېرىنى غىدىقلاش، تېرىگە رەڭ بېرىش ۋە تېرە رەڭلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش تەسىرلىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كېسەللىك بار ئورۇنغا كۈنىگە بىر قېتىم سۈركەپ ئاپتاپقا قاقلاپ بەرسە بولىدۇ. دورىنىڭ ئاستىدىكى دۇغلۇق قىسمىنى قول - پۇت قىسمىدىكى ئاق داغلارغا زىماد قىلىپ تېڭىپ بەرسە مەنپەئەت قىلىدۇ.

مەلھىمى بەيزە (تۇخۇم سېرىقى مەلھىمى)

【تەركىبى】 20 دانە تۇخۇم سېرىقى، قىزىل قىچا، سىيادان، قەلەمپۇر، قارا كۈنجۈتلەرنىڭ ھەربىرىدىن 100 گرامدىن؛ قوي مېيى 1000 گرام.

ئۆزئارا تۇتۇشۇشنى تېزلىتىش، تۈك بەزىلىرىنىڭ خىزمەت فۇنكسىيەسىنى ياخشىلاش ئارقىلىق ئاق تۈكلەرنى قارايتىش تەسىرلىرىگە ئىگە. **【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】** ئاقكېسەلگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كېسەللىك بار ئورۇننى ئاپتاپقا قاقلاشقا بىرلەشتۈرۈپ كۈنىگە 1 — 2 قېتىم مايلىسا بولىدۇ.

【ئەسكەرتىش】 دورىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن يەرلىك ئورۇننى ئۇۋۇلاپ تېرە ئازراق قىزىغاندىن كېيىن، مايلاپ ئاپتاپقا قاقلىسا كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم بېرىدىغانلىقى ئىسپاتلانغان.

9. شەربەت دورىلار

شەربەتى ئانار شېرىن (تاتلىق ئانار سۈيى شەربەتى)

【تەركىبى】 ياخشى پىشقان تاتلىق ئانار سۈيى 1500 مىللىلىتىر، شېكەر 1000 گرام.

【تەييارلىنىشى】 ئانارنىڭ دانلىرى ئايرىلىپ سىقىلىدۇ، ئاندىن كۆرسەتمىدىكى ئانار سۈيى بىلەن شېكەر ئارىلاشتۇرۇلۇپ، پەس ئوتتا ئاۋايلاپ قاينىتىلىدۇ.

【تەبىئىتى】 مۆتىدىل.

【خۇسۇسىيىتى】 يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، قان كۆپەيتىدۇ، يۆتەل توختىتىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 يۈرەك ئاجىزلىق، كەم قانلىق، تۈرلۈك سەۋەبلەردىن قان يوقىتىش، ھەرخىل قاناشنى

توختىتىش قاتارلىقلارغا بەدەننى قۇۋۋەتلەش مەقسىتىدە بېرىلدى.
دۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئۈچەي كېسەللىكلىرىگە مۇناسىۋەتلىك ئىچ
سۈرۈشنى داۋالاش، رەڭگىروينى چىرايلىق قىلىش رولىمۇ بار.
【مىقدارى】 كۈنگە 3 قېتىم، 8 — 15 مىللىلىتىر ياكى
ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك ئىستېمال قىلىنسا بولىدۇ.

شەرىبىتى ئەۋرىشىم (پىلە غوزىسى شەرىبىتى)
【تەركىبى】 ئەۋرىشىم 500 گرام، زەپەر 10 گرام، خو-
لىنجان 30 گرام، شېكەر 300 گرام، مەستىكى رۇمى 30
گرام، سۇ 4000 مىللىلىتىر، ئېگىر 30 گرام.

【تەييارلىنىشى】 پىلە غوزىسى قاچا بىلەن ئۇششاق قىرقىد-
لىپ، ئىچىدىكى قۇرتى ئېلىۋېتىلىدۇ ۋە ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈ-
لۇپ، ئېگىر، خولىنجان قاتارلىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ قوشۇ-
لىدۇ، ئاندىن سىرلىق تۇڭ، ئەينەك شېشە ياكى قەللىلەنگەن
قاچىغا سېلىنىپ كۆرسەتمىدىكى سۇ (گۈلاپ بولسا تېخىمۇ ياخ-
شى) غا ئۈچ كېچە - كۈندۈز چىلاپ قويۇلىدۇ ۋە پەس ئوتتا
سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، تەمى چىققاندىن كېيىن
پىلە غوزىسى سۈيىگە شېكەر سېلىنىپ يەنە پەس ئوتتا قاينىتىلىد-
دۇ. قىيامى تەڭشەلگەندە سوۋۇتۇلۇپ، زەپەر بىلەن مەستىكى
رۇمى يۇمشاق تالقانلىنىپ سېلىنىپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق.
【خۇسۇسىيىتى】 يۈرەك، مېڭە، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش تە-
سىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ھەر خىل قۇرۇق سو-
غۇقتىن بولغان نېرۋا، يۈرەك، ئۆپكە، ئاشقازان، ئۈچەي،
جىگەر كېسەللىكلىرى ھەمدە سەمىرتىش، جىنسىي ئاجىزلىقنى
داۋالاش، رەڭگىروينى چىرايلىق قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنىگە 3 قېتىم، 6 — 12 مىللىلىتىردىن بېرىلىدۇ. بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

شەرىپىتى زەبىپ (ئۈزۈم سۈيى شەرىپىتى)
【تەركىبى】 ئۈزۈم سۈيى 2000 مىللىلىتىر، جويۇز 25 گرام، قوي گۆشى 2000 گرام، خولىنجان 25 گرام، كۆك كەپتەر باچكىسى 4 دانە، زۈرەمبات 25 گرام، كەكلىك بىر دانە، ئارپىيەدىيان 50 گرام، دارچىن 25 گرام، چىڭشىي ئۇرۇقى 50 گرام، شاقاقۇل 25 گرام، زىرە 50 گرام، بەسباسە 25 گرام.

【تەييارلىنىشى】 ئاۋۋال ھۆل ئۈزۈم پاكىز يۇيۇلۇپ سىقىپ سۈيى چىقىرىلىپ، ئۇرۇق - تىرىپلىرىدىن ئايرىلىدۇ، ئاندىن قازانغا تۆكۈلۈپ كەپتەر باچكىسى، كەكلىك ھەم قوي گۆشى كاۋاپ قىلىنىپ سېلىنىدۇ ۋە باشقا دورىلارمۇ چالا سوقۇلۇپ قوشۇلغاندىن كېيىن پەس ئوتتا قاينىتىلىدۇ. ئاخىرىدا تەمى چىقىپ بولغان گۆش ۋە دورا تىرىپلىرى سۈزۈۋېتىلىپ، كوزا ياكى ئاغزى مۇستەھكەم قاچىلارغا ئېلىنىپ، ئاپتاپتا بىر ئاي تۇرغۇزۇلىدۇ ياكى ئورەكتىكى ئات قىغىغا 12 — 15 كۈن كۆمۈلىدۇ. ئاپتاپ ياكى ئات قىغىدا قانچە ئۇزاق تۇرسا شۇنچە كۈچىيىدۇ. بۇ دورىنى قىشلىقى قۇرۇق ئۈزۈمدىن تەييارلىسىمۇ بولىدۇ.

بۇنىڭ ئۈچۈن قۇرۇق ئۈزۈم پاكىز يۇيۇلۇپ، قازانغا سېلىنىپ ئۈستىگە يېتەرلىك مىقداردا سۇ قۇيۇلۇپ قاينىتىلىدۇ. قۇرۇق ئۈزۈم ئېسىلىپ تەمى سۇغا چىققاندىن كېيىن، تىرىپى سۈزۈپ ئېلىۋېتىلىدۇ ۋە شەرىپىتىگە دورىلار سېلىنىپ يۇقىرىقىدەك مەشغۇلات بويىچە تەييارلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، بەدەننى قىزىتىش، جىنسىي ئاجىزلىقنى ياخشىلاش، ئاغرىق پەسەيتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش تەسىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 بۆرەك، ئاشقازان ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەشكە، ئۈچەي ئاغرىقلىرى، تېرە كېسەللىكلىرى، بولۇپمۇ ئاقكېسەلگە قاننى قىزىتىش، تېرىگە رەڭ ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈندە 3 قېتىم، 30 — 50 مىللىلىتىردىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بالىلارغا مىقدارى كىچىك.

رى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

شەربىتى سەپەرچىل (بېھى سۈيى شەربىتى)
【تەركىبى】 بېھى سۈيى 500 مىللىلىتىر، شېكەر 500 گرام.

【تەييارلىنىشى】 پىشقان، ياخشى بېھىنىڭ تۈكلىرى پاكىزلىنىپ، قىرغۇچ ياكى قىيما ماشىنىسىدا قىيما قىلىنىدۇ، ئاندىن ماتا ياكى سىقىما ماشىنىسى ئارقىلىق سىقىپ سۈيى چىقىرىلىدۇ ۋە چەككىلىنىپ، كۆرسەتمىدىكى بېھى سۈيىگە شېكەر سېلىنىپ سۇس ئوتتا ئاۋايلاپ قاينىتىلىپ قىيام ھالەتكە كەلتۈرۈلىدۇ.

【تەبىئىتى】 مۆتىدىل (بېھى ئاچچىق بولسا شېكەر كۆپرەك سېلىنىدۇ، تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىققا ئايلىنىدۇ).

【خۇسۇسىيىتى】 يۈرەك، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ھەزىمە ياردەم بېرىش، روھنى خۇش قىلىش تەسىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 يۈرەك، ئاشقازان، ئۈچەي، جىگەر كېسەللىكلىرى، ئىچى سۈرۈشنى توختىتىش،

سىرتقى تەرەپتىكى ئۇششۇقلارنى ياندۇرۇش، كۆڭۈل ئېلىش، ئىشتىھاسزلىقلار ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنىگە 3 قېتىم.

تىم، 30 — 40 مىللىلىتىردىن بېرىلىدۇ. بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ كېمەيتىپ بېرىلىدۇ. بەدەن سىرتىدىكى ئىششىقنى قايتۇرۇش ئۈچۈن قىيام قىلىمىغان بېھى سۈيى قايناق سۇ بىلەن چېپىلىدۇ.

مائۇل ھەسەل ساددە (ھەسەل سۈيى)

【تەركىبى】 ھەسەل 300 گرام، سۇ 700 مىللىلىتىر.

【تەييارلىنىشى】 ھەسەلگە كۆرسەتمىدىكى سۇ قۇيۇلۇپ پەس ئوتتا قاينىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىنىپ، ئۈچتىن ئىككى قىسمى قالغاندا قاينىتىش توختىتىلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 مىجەز ۋە خىلىتلارنى تەڭشەش، تېرىنى

پارقىرىتىش، ئىچىنى يۇمشىتىش، بەلغەمنى پىشۇرۇش، ئاشقا-

زان ۋە ئىچكى ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، سوغۇقتىن بولغان پەي

ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، زەھەرلىك دورىلارنىڭ زەھەرىنى قايتۇ-

رۇش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى ماڭدۇرۇش تەسىرلىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاشقازان، نېرۋا ئاجىز-

لىقى، سوغۇقتىن بولغان مېڭە ۋە پەي كېسەللىكلىرى، چوڭ

بوغۇملار ئاغرىش، بۆرەك ۋە جىنسىي ئاجىزلىق، قورساق ئې-

سىلىش، چوڭ تەرەت قېتىۋېلىش، ئاقكېسەل ۋە كالا تەمرەتكە-

سى قاتارلىق سوزۇلما خاراكتېرلىك جاھىل تېرە كېسەللىكلى-

رى ھەمدە ئومۇمىي بەدەن زەئىپلىشىشكە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ كۈند-

گە 3 قېتىم، 30 — 50 مىللىلىتىردىن بېرىلىدۇ. كىچىك

باللارغا دورا مىقدارى مۇۋاپىق كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

مۇرەككەپ مائۇل ھەسەل (I)

【تەركىبى】 ئاقىرقەرھە، خولىنجانلارنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرامدىن؛ زەنجىۋىل، سۇمبۇللارنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ ھەسەل 1000 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ، 3 كىلوگرام ئىلمان سۇغا 6 سائەت چىلاپ قويۇلغاندىن كېيىن، پەس ئوتتا سۇنىڭ ئۈچتىن ئىككىسى قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن دورا تىرىپىلىرى سۈزۈپ ئېلىۋېتىلىپ، كۆرسەتمىدىكى ھەسەل سېلىنىپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ، پەس ئوتتا يەنە بىر قېتىم قاينىتىلىدۇ ۋە كۆپۈكى ئېلىنىپ ئاغزى ئوچۇق ھالدا سالقىن ئورۇندا سوۋۇتۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 مېجەزنى تەڭشەيدۇ، خىلىتلارنى نورماللاشتۇرىدۇ، ھەزىم سىستېمىسىنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ، تېرە رەڭ ماددىلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى ياخشى مۇھىت بىلەن تەمىنلەيدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 مائۇل ھەسەل ساددە بىلەن ئوخشايدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 بالىلار ئەۋالغا قاراپ 10 — 20 مىللىلىتىر، چوڭلار 30 — 60 مىللىلىتىردىن كۈنگە 1 — 2 قېتىم، تاماقتىن كېيىن ئىستېمال قىلىدۇ.

مۇرەككەپ مائۇل ھەسەل (II)

【تەركىبى】 قەلەمپۇر، ئۇدى ھىندى، خولىنجان، قاقىلە، قوزاق دارچىن، لاچىندانە، بەسباسە، جوزبۇۋا، سازەنج ھىندى.

نىڭ ھەر بىرىدىن 6 گرامدىن؛ سۇ 2000 مىللىلىتىر، ھەسەل 300 گرام.

【تەييارلىنىشى】 كۆرسەتمىدىكى دورىلار چالا سوقۇلۇپ داكا خالتىغا ئېلىنىدۇ ۋە قازانغا كۆرسەتمە بويىچە سۇ قۇيۇلۇپ، دورا خالتا بىلەنلا سېلىنىدۇ ھەمدە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ كۆپۈكى ئېلىنىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، خىلىتلارنى نورماللاشتۇرۇش، مىجەزنى تەڭشەش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، زىيادە ھۆللۈك ۋە سوغۇق يەللەرنى تارقىتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش تەسىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 مائۇل ھەسەل ساددە بىلەن ئوخشايدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 1 — 2 قېتىم، 30 — 60 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ مىقدارنى كېمەيتىپ بەرسە بولىدۇ.

شەرىپىتى بەرەس (I)

【تەركىبى】 قۇرۇق ئۈزۈم 150 گرام، رۇمبەدىيان، سىيا-دان، قىچىنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن؛ سامساق 10 گرام، زەنجىۋىل، قەردىمانە ۋە يالپۇزنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرامدىن؛ ئاقىرقەرھە، شەترەنجى ھىندى، ئوردان، ئەپسەنتىن، شەھى مىنرەل، بابۇنە ۋە ئوغرىتىكەننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن، كەرۋىيا ئۇرۇقى 30 گرام، گۈلقەنت 50 گرام، ھەسەل 300 گرام.

【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 1000 مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا 2 سائەت چېلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن داكىدا تىرىپى

سۈزۈۋېتىلىپ، ھەسەل بىلەن گۈلقەنت سېلىنىپ تەكشى ئارد-
لاشتۇرۇلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3
قېتىم 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ
مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

شەرىپىتى بەرەس (Ⅱ)

【تەركىبى】 سېرىق ھېلىلە پوستى، تۇرپۇت پوستى، ئامد-
لىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 30 گرامدىن؛ قارا كۈنجۈت، زىرىلەر-
نىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن؛ زەنجبۇل 10 گرام، شېكەر
250 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ، 750 مىللىلىتىر
سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 350 مىللىلىتىر سۇ
قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن داكىدا تىرىپى سۈزۈۋېتىلىپ،
شېكەر سېلىنىپ يەنە 1 قېتىم قاينىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەلگە بېرىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3
قېتىم، 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ
مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

شەرىپىتى بەرەس (Ⅲ)

【تەركىبى】 ئاقىرقەرھا 10 گرام، ئامىلە 15 گرام، سۇد-
بۇل 10 گرام، سېرىق ھېلىلە پوستى 15 گرام، بەدىيان
ئۇرۇقى 20 گرام، زەنجبۇل 15 گرام، سىيادان 60 گرام،
زەپەر خېمىكى 15 گرام، قۇرۇق ئۈزۈم 600 گرام، ھەسەل
500 گرام، قاقىلە 15 گرام، قارا ھېلىلە 20 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلارنىڭ قاتتىقلىرى چالا سوقۇلۇپ،

1200 مىللىلىتىر سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىدۇ، ئاندىن داكا بىلەن تىرىپى سۈزۈۋېتىلىپ، ھەسەل سېلىنىپ بىرلا قاينىتىلىدۇ. **【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】** ئاقكېسەلگە بېرىلىدۇ. **【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】** چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

شەربىتى بەرەس (IV)

【تەركىبى】 بەدىيان يىلتىزى پوستى 40 گرام، رۇمبەددىيان 40 گرام، كاسنە ئۇرۇقى 20 گرام، چىڭسەي يىلتىزى 40 گرام، ئاق لەيلى ئۇرۇقى 20 گرام، ئادراسمان ئۇرۇقى 40 گرام، رەيھان ئۇرۇقى 20 گرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 20 گرام، سىيادان 40 گرام، شىرخىست، بابۇنە، زەنجۈبىل، بادرنەجبۇيىلارنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن؛ كاسنە يىلتىزى پوستى 40 گرام، ھەسەل 2000 گرام، قوزاق دارچىن 20 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ 3000 مىللىلىتىر سۇغا بىر سوتكا چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ، تىرىپلار سۈزۈۋېتىلىدۇ، ئاندىن ھەسەل سېلىنىپ يەنە 1 قېتىم قاينىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىلىپ بېرىلىدۇ.

شەربىتى بەرەس (V)

【تەركىبى】 قەلەمپۇر، سىيادان، قوزاق دارچىنلارنىڭ

ھەربىرىدىن 30 گرامدىن؛ رۇمبەدىيان، چىڭسەي ئۇرۇقى، جويۇز، رەيھان ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن 40 گرامدىن؛ بادىرەندى جىبۇيا 20 گرام، تورۇنچى پوستى 25 گرام، قورۇق ئۈزۈم 100 گرام، ئوغرىتىكەن 25 گرام، زەنجىۋىل 20 گرام، قارا شېكەر 400 گرام. 【ئىشلىتىلىش】

【تەييارلىنىشى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ 1500 مىللىلىتىر سۇغا 4 سائەت چىلىندۇ ۋە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ، تىرىپى داكا بىلەن سۈزۈۋېتىلىپ، قارا شېكەر سېلىنىپ يەنە بىر قېتىم قاينىتىلىدۇ. 【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە بېرىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم، 50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ. 【ئىشلىتىلىش مىقدارى】

شەرىپىتى بەرەس (VI) 【تەركىبى】 سىيادان، گۈلقەقە، رۇمبەدىيانلارنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن؛ قىچا، ئاقىرقەرھە، ئوردانلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرامدىن؛ ئەپسەنتىن 20 گرام، ھەسەل 150 گرام، زەنجىۋىل، قوزاق دارچىن، جويۇز، پىننە، سامساق، زىرىلەرنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ قورۇق ئۈزۈم 100 گرام. 【ئىشلىتىلىش مىقدارى】

【تەييارلىنىشى】 دورىلارنىڭ قاتتىقلىرى چالا سوقۇلۇپ، 800 مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا 2 سائەت چىلىندۇ ۋە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ، تىرىپى سۈزۈۋېتىلىدۇ ھەمدە ھەسەل سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. 【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەلگە بېرىلىدۇ. 【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 50 —

100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

شەرىپىتى بەرەس (VII)

【تەركىبى】قۇرۇق ئۈزۈم 500 گرام، رۇمبەدىيان 300 گرام، سىيادان 200 گرام، سېرىقئوت 100 گرام، شېكەر 3000 گرام، تۇرپۇت 100 گرام، سەككىنەچ 50 گرام، ياۋا پىياز 100 گرام، گۈلچە 500 گرام، ئاقىرقەرھە 100 گرام، زەپەر 5 گرام.

【تەييارلىنىشى】دورىلارنىڭ قاتتىقلىرى چالا سوقۇلۇپ 6000 مىللىلىتىر سۇغا بىر كېچە چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ تىرىپى سۈزۈۋېتىلىدۇ، ئاندىن شېكەر سېلىنىپ يەنە بىر قېتىم قاينىتىلىپ، سەل سوۋۇغاندىن كېيىن زەپەر ئازراق شېكەر بىلەن سالاھىيە قىلىنىپ يۇمشىتىلىپ، دورا سۈيىگە سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 30 — 50 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

سەندەل شەرىپىتى

【تەركىبى】ئاق سەندەل 50 گرام، قىزىلگۈل 25 گرام، قىزىل سەندەل 50 گرام، شېكەر 1250 گرام.

【تەييارلىنىشى】ئاق، قىزىل سەندەللەر يۇمشاق سوقۇلىدۇ. قىزىلگۈل ئايرىم تەييارلىنىپ، سوقۇلغان دورىلار 1200 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا بىر كېچە چىلىنىپ پەس ئوتتا قاينىتىلىدۇ. 600 مىللىلىتىر دورا سۈيى قالغاندا قىزىلگۈل سېلىنىپ

يەنە 1 قېتىم قاينىتىلىپ، خام بىلەن سۈزۈلىدۇ، ئاندىن دورا سۈيىگە ئۆلچەمدىكى شېكەر سېلىنىپ قاينىتىلىپ، قىيام تەڭ شەلگەندىن كىيىن ئاغزى ئوچۇق ھالەتتە سوۋۇتۇلۇپ، سىرلىق قاچا ياكى قۇرۇق شېشىدە ساقلىنىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 خىلىتلارنى تەڭشەش، بولۇپمۇ قان خىلىت-ئالغابلىقىدىن خىلىتلار قويۇلۇپ غەيرىي تەبىئىي خىلىت سىل بولغان مىجەز تىپىدىكى بىمارلارغا خىلىت ۋە مىجەزنى نۇرماللاشتۇرۇش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىشى】 بىمارلاردا قان خىلىتى قويۇلۇش تۈپەيلى خىلىتلاردا ئۆزگىرىش يۈز بېرىش نەتىجىسىدە پەيدا بولغان ھەر خىل تىپتىكى ئاقكېسەل، كالا تەمرە تەككىسى قاتارلىقلارغا مۇنزىچ (خىلىت پىشۇرغۇچى) دورىلار بىلەن بىرگە قوشۇپ ئىستېمال قىلىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 30 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ.

【ئەسكەرتىش】 ئاقكېسەلگە قوشۇلۇپ كەلگەن يۇقىرى قان بېسىم، يۈرەك رېتىمى تېزلىشىش، قان تومۇر قېتىشىش كېسەللىكلىرىگە ئاقكېسەل دورىسىغا قوشۇپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

مەتبۇخى شاھتەررە (شاھتەررە قاينىتىلمىسى)

【تەركىبى】 شاھتەررە 60 گرام، سېرىق ھېلىلە پوستى 30 گرام، تەمرى ھىندى 30 گرام؛ ئەينۇلا، سەرپىستان، كاسىنە ئورۇقى، گۈل بىنەپشە، خىيارشەنبەر، سانائى مەككى، ئەنگۈر شىپا (ئىتئۇزۇمى)، چىلاننىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن؛ سېرىق قىيوت، ئۆشپە (تومۇر دورىسى)، ئۇستقۇددۇسنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 كۆرسەتمىدىكى دورىلار ئۆلچەم بويىچە ئې-

لىنىپ تازىلىنىدۇ. سانائى مەككى، سېرىقئوت ۋە باشقىلار 2500 مىللىمېتىر ئىلman سۇغا 6 سائەت چىلىنىپ، پەس ئوتتا 1500 مىللىمېتىر دورا سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىپ، سانائى مەككى، سېرىق ئوت قاتارلىقلار دورا سۈيىگە سېلىنىپ يەنە 1 قېتىم قاينىتىلىپ، قېلىن ئەگلەك ياكى ئىككى قەۋەت خامدا سۈزۈلۈپ، ئازراق تىندۈرۈلغاندىن كېيىن سىرلىق قاچىغا تۆكۈلۈپ، ئاستىدىكى دۇغى ئايرىۋېتىلگەندىن كېيىن، ئايرىم قاچىدا ساقلىنىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 قاننى تازىلاش، سۈددە (توسالغۇلارنى ئېچىش)، بولۇپمۇ قان خىلىتىنىڭ غالىبلىقىدىن قان تەركىبىدىكى ماددىلارنىڭ ئېشىپ كېتىشى (مەسىلەن قاندىكى ماي ماددىسى ۋە قان شىرنىسى قاتارلىقلارنىڭ ئېشىپ كېتىشى) سەۋەبلىك خىلىتلارنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشلىرىنى نورماللاشتۇرىدۇ.

【ئىشلىتىلىشى】 قان خىلىتى قويۇلۇش تۈپەيلى خىلىتلاردا ئۆزگىرىش كۆرۈلۈش نەتىجىسىدە پەيدا بولغان ئاقكېسەل ۋە كالا تەمرەتكىسى كېسەللىكلىرىنىڭ مۇنزىچ دورىلىرىغا قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 30 — 90 مىللىمېتىردىن مۇنزىچ دورىلارغا قوشۇپ ئىچىدۇ. قېرى كىشىلەر ۋە ھامىلىدار ئاياللارغا دورا مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ. ئاشقازان، ئۈچەي پائالىيىتى ياخشى بولمىغان بىمارلار دورىنى قايناق سۇ قوشۇپ ئىچىش لازىم.

10. مۇنزىچ (ماددىنى پىشۇرغۇچى) دورىلار

ئاقكېسەلنى پەيدا قىلغۇچى سەۋەبلەرنىڭ ئوخشىماسلىقى تۈپەيلىدىن خىلىتلاردىكى ئۆزگىرىشتىمۇ روشەن پەرق بولىدۇ.

بەزى بىمارلاردا خىلىتلار ئۆزئارا ئارىلىشىپ كېتىدىغان ئەھۋال-
لارمۇ ئۇچراپ تۇرىدۇ. شۇڭا، مۇنزىچ (ماددىنى پىشۇرغۇچى)
دورىلارنى بېرىشتە، ئالدى بىلەن بىمارنىڭ مىجەزىنى توغرا
ئىگىلەش ۋە كېسەللىك ماددىسى (خىلىت تىپى) نى توغرا ئاي-
رىش بىلەن بىر چاغدا ياش قۇرامى، كېسەللىك تارىخى، بەدەن
ھالىتى (ئورۇق - سېمىزلىكى، ئاجىز - كۈچلۈكلۈكى) ئۈس-
تىدە چۈشەنچە ھاسىل قىلىپ، ئاندىن مۇنزىچ دورىلارنىڭ ماس
كېلىدىغان ھەم تېز تەسىر قىلىدىغان تۈرىنى تاللاپ ئىشلىتىش،
بۇ جەرياندا يۈز بەرگەن ئۆزگىرىشنى كۆزىتىشنى بىرلەشتۈرۈش
كېرەك.

مۇرەككەپ مۇنزىچ بەلغەم
(بۇ نۇسخا بەلغەمگە سەۋدا ياكى سەپرا ئارىلاشقانلارغا بېرىد-
لىدۇ.)

【تەركىبى】 بەدىيان يىلتىزى پوستى، چىڭسەي يىلتىزى،
ئاقلاغان چۈچۈكبۇيا، سىيادانلارنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرامدىن؛
بېھى ئۇرۇقى 10 گرام، زەنجىۋىل 8 گرام، جوۋنە (نەخۇا)
12 گرام، قۇرۇق ئۈزۈم 200 گرام، گاۋزىبان، بادىرەنجىبۇيا،
چىلانلارنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ قارا ھېلىلە، ئامىلە،
پىرسىياۋشان، سەرىپستانلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرامدىن.

【تەييارلاش ئۇسۇلى】 دورىلار چالا سوقۇلۇپ 1500
مىللىلىتىر سۇغا بىر كېچە چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا تولۇق تەمى
چىققۇچە قاينىتىلىپ، تىرىپى سۈزۈۋېتىلىدۇ (800 مىللىلىتىر
دورا سۈيى قالسا بولىدۇ).

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى】 چوڭلار كۈندىگە 3 قېتىم،
50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ
مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

مۇرەككەپ مۇنزىچ بەرەس
【تەركىبى】 سوزاپ ئۇرۇقى، سىيادانلارنىڭ ھەربىرىدىن 60 گرامدىن؛ ۋاسالغۇ ئۈزۈم 120 گرام، كەرەپشە ئۇرۇقى، بابۇنە، سۆتتەر، سانائى مەككىلەرنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرام. دىن؛ قىزىلگۈل 24 گرام، شەترەنجى ھىندى 24 گرام، رۇم. بەدىيان 12 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئۆلچەم بويىچە ئېلىنىپ، تازىلانغاندىن كېيىن، سانا، قىزىلگۈلدىن باشقىلىرى 2000 مىللىلىتىر ئىلمان سۇغا 4 سائەت چىلاپ قويۇلىدۇ ۋە پەس ئوتتا قاينىتىلىپ، مەلۇم مىقداردىكى سۈيى ئايرىم قاچىغا ئېلىندۇ ھەمدە سانا ۋە قىزىلگۈللەر سېلىنىپ بىر ئازدىن كېيىن، قايناۋاتقان دورا ئۈستىگە سېلىنىپ يەنە بىر قېتىم قاينىتىلىپ، داكا ياكى خامدىن ئۆتكۈزۈلگەن دورا سۈيىدىن 1000 مىللىلىتىر تەييارلىنىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ (بۇ مۇنزىچ خىلىت تىپى ئېنىق بولمىغان ئاقكېسەل بىمارلىرىغا كېسەللىك ماددىسى پىشقانغا قەدەر بېرىلىدۇ).

ئەتىياز، كۈز پەسىللىرىدە ئىشلىتىلىدىغان مۇنزىچ

【تەركىبى】 ئاق لەيلى ئۇرۇقى، پىرسىياۋشان، گاۋزبان، ئودى ھىندىلارنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرامدىن؛ ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 60 گرام، شەترەنجى ھىندى 30 گرام، ئوردان 20 گرام، گۈلسۈرۈخ 10 گرام.

【تەييارلىنىشى】 گۈلسۈرۈختىن باشقا دورىلار 1000

مىللىتىر سۇغا 4 سائەت چىلانغاندىن كېيىن پەس ئوتتا تەمى چىققۇچە قاينىتىلىپ، گۈلسۈرۈخ سېلىنىپ بىرلا قاينىتىلىدۇ ۋە داكىدا تىرىپى سۈزۈۋېتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە 2 — 3 قېتىم، 50 — 100 مىللىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

ئادەتتە كۆپرەك ئىشلىتىلىدىغان مۇنزىچ
【تەركىبى】 رۇمبەدىيان 10 گرام، بابۇنە 26 گرام، سىيا-دان 12 گرام، چىڭسەي ئۇرۇقى 26 گرام، ھەسەل 370 گرام، سانائى مەككى 26 گرام، قىزىلگۈل 15 گرام، سۆتتەر 26 گرام، قوستى تەلىغ، شەترەنجى ھىندى، سوزاپ تۇخۇملىرىنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئىچىدىن قاتتىقلىرى چالا سوقۇ-لۇپ، قىزىلگۈل، سانائى مەككى، ھەسەلدىن باشقىلىرى 2000 مىللىتىر سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا قاينىتىلىپ، ئازراق سۈيى قاچىغا ئېلىنىپ، قىزىلگۈل، سانائى مەككى چى-لاپ قويۇلىدۇ. دورىلارنىڭ تەمى چىقىپ تىرىپى سۈزۈۋېتىلىش ئالدىدا قىزىلگۈل، سانائى مەككى چىلانمىسى تۈكۈلۈپ يەنە بىر قاينىتىلىدۇ ھەمدە داكا بىلەن تىرىپى سۈزۈۋېتىلىپ، ھەسەل سېلىنىپ بىرلا قاينىتىلىپ سىرلىق قاچىدا سوۋۇتۇلىدۇ.

【ئىشلىتىلىشى】 چوڭلار كۈنگە 2 — 3 قېتىم، تاماقتىن بۇرۇن 50 — 80 مىللىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارىنى كېمەيتىپ بەرسە بولىدۇ.

مۇنزىچ بەرەس (I)

【تەركىبى】 رۇمبەدىيان، چىڭسەي ئۇرۇقى، سىيادان،

سانائى مەككىلەرنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن؛ زەنجىۋىل،
ئۈستقۇددۇس، سۆتەر، بەدىيان يىلتىزى پوستىلىرىنىڭ ھەر-
بىرىدىن 30 گرامدىن؛ چىڭسەي يىلتىزى پوستى 25 گرام،
سۇمبۇل 10 گرام، قۇرۇق ئۈزۈم 150 گرام، يانتاقشېكرى
100 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئىچىدىكى قاتتىقلىرى چالا سوقۇ-
لۇپ، 2000 مىللىلىتىر قايناق سۇغا 2 سائەت چىلاپ قويۇلىدۇ
ۋە پەس ئوتتا 1000 مىللىلىتىر قالغۇچە قاينىتىلىپ، بىر پىيالە
قايناق سۇغا ئايرىم چىلانغان سانا بىلەن رەنجىۋىلنىڭ تەمى
چىققاندىن كېيىن قايناۋاتقان دورىغا قوشۇلۇپ، تىرىپى سۈزۈۋې-
تىلىپ قايتىدىن يەنە بىر قېتىم قاينىتىلىدۇ. 【ئىشلىتىلىش مىقدارى】
چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم 100
مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەي-
تىپ بېرىلىدۇ.

مۇنزىچ بەرەس (Ⅱ)
【تەركىبى】 بەدىيان يىلتىزى پوستى، ئەنجۈر قېقى، چىڭ-
سەي يىلتىزى پوستى، رۇمبەدىيان، كاسىنە يىلتىزى پوستى،
سىيادان، پىرسىياۋشان، بابۇنىلەرنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرام-
دىن، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، گاۋزىبان، بادىرەنجىبۇيا، ئۈستقۇد-
دۇسنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ سېرىقئوت 20 گرام، شەت-
رەنجى ھىندى 10 گرام، قۇرۇق ئۈزۈم 150 گرام، ئوردان
10 گرام، قىزىل گۈلقەنت 150 گرام.

【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 2000
مىللىلىتىر سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 1200
مىللىلىتىر سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىپ، تىرىپى داكىدا سۈزۈۋې-
تىلىپ، ئاكاۋادا ئېرىتىپ تەييارلانغان قىزىل گۈلقەنت سۈيى

سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. **【ئىشلىتىلىش مىقدارى】** چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم 50 — 100 مىللىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ. 01 نۆمۈر 001 نۆمۈر.

مۇنزىچ بەرەس (Ⅲ) **【تەركىبى】** رۇمبەدىيان، پوستى ئېلىۋېتىلگەن چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 16 گرامدىن؛ قوزاق دارچىن، گۈل-دارچىن، قىزىلگۈللەرنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن؛ پىرسىد-ياۋشان 15 گرام، زەنجىۋىل 20 گرام، ئەنجۈر قېقى 50 گرام، ئوغرىتىمىكەن 10 گرام، گۈلقەنت 90 گرام. **【تەييارلىنىشى】** قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 700 مىللىتىر سۇغا 3 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 400 مىللىتىر قالغۇچە قاينىتىلىپ، تىرىپى سۈزۈۋېتىلىش ئالدىدا قىزىلگۈل سېلىنىپ بىرلا قاينىتىلىپ، داكىدا سۈزۈلگەندىن كېيىن، دورا سۈيىگە گۈلقەنت سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. **【ئىشلىتىلىش مىقدارى】** چوڭلار ھەر كۈنى 3 قېتىم، 50 — 70 مىللىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ. 05 نۆمۈر 01 نۆمۈر.

مۇنزىچ بەرەس (Ⅳ) **【تەركىبى】** رۇمبەدىيان 90 گرام، قىزىلگۈل 24 گرام، سىيادان 60 گرام، شەترەنجى ھىندى 24 گرام، قۇرۇق ئۈزۈم 150 گرام، سوزاپ 24 گرام، بابۇنە 30 گرام، گۈلقەنت ھەسلى 15 گرام، چىڭسەي ئۇرۇقى 30 گرام، ئۈستقۇددۇس 12 گرام، سانائى مەككى 30 گرام، پىرسىياۋشان 12 گرام،

سۆتەر 30 گرام. پىششىقلىق رىقابىتى ئىنتايىن يۇقىرى.

【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 1500 مىللىلىتىر قايناق سۇغا 2 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا قاينىتىلىدۇ. سانائى مەككى بىلەن قىزىلگۈل يېتەرلىك ئىلماق سۇغا ئايرىم چىلاپ قويۇلىدۇ. قايناۋاتقان دورىلارنىڭ سۈيى 1000 مىللىلىتىر قالغاندا، چىلانغان دورىلار سېلىنىپ بىرلا قاينىتىلىپ داكىدا تىرىپى سۈزۈۋېتىلىدۇ، ئاندىن ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلقەنت سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ (تەڭگەر ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلقەنت بولمىسا شۇ مىقداردا ھەسەل سالىسىمۇ بولىدۇ).

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنىگە 3 قېتىم، 50 — 80 مىللىلىتىردىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

مۇنزىچ بەرەس (V)

【تەركىبى】 بەدىيان، بادىرەنجىبۇيا، ئۈستقۇددۇس، بىخ-سۇس مۇقەششىرى (پوستى ئاقلانغان بىخسۇس)، پىرسىياۋ-شاننىڭ ھەربىرىدىن 10 گرامدىن؛ گۈلقەنت ھەسەلى 30 گرام. 【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 400 مىللىلىتىر قايناق سۇغا 2 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ تىرىپى سۈزۈۋېتىلىپ، ئاكاۋادا ئېرتىپ تەييارلانغان گۈلقەنت ھەسەل سۈيى سېلىنىپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. مۇشۇ ئۆلچەم بويىچە دورا مىقدارى كۆپەيتىلىپ تەييارلانسا بولىدۇ. نوقۇت سۈيىنى قوشۇمچە ئىچىپ بەرسە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. بالىلار-

غا يېشىغا قاراپ دورا مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

مۇنزىچ بەرەس (VI)

【تەركىبى】 چىڭسەي يىلتىزى پوستى 100 گرام، سېرىق-ئوت 20 گرام، بەدىيان يىلتىزى پوستى 100 گرام، بەدىيان 40 گرام، چىڭسەي ئۇرۇقى 40 گرام، ئىنجۇر قېقى 80 گرام. 【تەييارلىنىشى】 سېرىقئوت مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇغا ئايرىم چىلىنىپ تەمى چىقىرىلىدۇ، قالغان دورىلار 1000 مىللىلىتىر سۇغا 4 سائەت چىلىنىپ، پەس ئوتتا 500 مىللىلىتىر سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىدۇ ۋە تىرىپى سۈزۈۋېتىلىش ئالدىدا سېرىقئوت چىلانغان سۇ قۇيۇلۇپ، بىرلا قاينىتىلىپ داكا بىلەن تىرىپى سۈزۈۋېتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 30 — 60 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

مۇنزىچ بەرەس (VII)

【تەركىبى】 بابۇنە 40 گرام، شەترەنجى ھىندى 15 گرام، جوۋىنە 20 گرام، قىزىلگۈل 15 گرام، سىيادان 15 گرام، بەدىيان يىلتىزى پوستى 30 گرام، شەھى ھەنزەل 15 گرام، چىڭسەي يىلتىزى پوستى 30 گرام، يالپۇز 15 گرام، قۇرۇق ئۈزۈم 150 گرام، ئۈستقۇددۇس 15 گرام، گۈلقەنت 200 گرام.

【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 2000 مىللىلىتىر قايناق سۇغا 2 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 1200 مىللىلىتىر سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىپ تىرىپى سۈزۈۋېتىلىش ئالدىدا قىزىلگۈل سېلىنىپ بىرلا قاينىتىلىدۇ ھەمدە داكىدا

تەربىيە سۈزۈۋېتىلىپ، ئاكاۋادا ئېرىتىپ تەييارلانغان گۈلچەنت سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. **【ئىشلىتىلىش مىقدارى】** چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

مونۇزىچ بەرەس (VIII)

【تەركىبى】 بەدىيان يىلتىزى پوستى 60 گرام، قىزىلگۈل 18 گرام، چىڭسەي يىلتىزى پوستى 60 گرام، بابۇنە 18 گرام، سىيادان 50 گرام، ياۋا سەۋزە ئۇرۇقى 30 گرام، شەترەنجى ھىندى، سامساق، ئاقىرقەرھە، يالپۇز، شەھىمى ھەنزەل، ئىپ-تىمۇن (سېرىقئوت)، تاغ خېنىسى، ئوردان، جوۋىنە، بابۇنە-لەرنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ سانائى مەككى 20 گرام، يانتاقشېكىرى 100 گرام، ھەسەل 100 گرام.

【تەييارلىنىشى】 يانتاقشېكىرى، سانائى، قىزىلگۈل ئايرىم-ئايرىم قاقچىدىكى مۇۋاپىق سۇغا چىلىنىدۇ، قالغان دورا ماتېرىياللىرىنىڭ قاتتىقلىرى چالا سوقۇلۇپ، 2000 مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 1000 مىللىلىتىر قالغۇچە قاينىتىلىپ، چىلانغان ھېلىقى دورىلار سېلىنىدۇ ھەم-ئە بىرلا قاينىتىلىپ، تەربىيەلىرى داكىدا سۈزۈۋېتىلگەندىن كېيىن ھەسەل سېلىنىپ يەنە 1 قېتىم قاينىتىلىدۇ. **【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】** چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

مونۇزىچ بەرەس (IX)

【تەركىبى】 قارا ھېلىكە 30 گرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى

15 گرام، سانائى مەككى 30 گرام، بادرنەنجىبۇيا 15 گرام، سېرىقئوت 30 گرام، ئۈستقۇددۇس 15 گرام، سېرىق ھېلىلە 30 گرام، گاۋزبان 15 گرام، تۇربۇت پوستى 15 گرام، نېلۇپەر 10 گرام، قىزىلگۈل 15 گرام، سەرپىستان 10 گرام، بەلىلە 15 گرام، گۈل بىنەپشە 10 گرام، بادام مېغىزى 50 گرام، يانتاقشېكەرى 100 گرام، ئەينۇلا 50 گرام، شېكەر 1000 گرام.

【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلىدۇ. سانا، قىزىلگۈل، يانتاقشېكەرى يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا ئايرىم چىلىنىدۇ. سوقۇلغان دورىلار 3000 مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا بىر كېچە چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا ئۈچتىن ئىككى قىسىم سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىپ، ئايرىم چىلانغان دورىلار سېلىنىپ يەنە بىر قاينىتىلىدۇ ھەمدە تىرىپى داكا بىلەن سۈزۈۋېتىلىپ، شېكەر سېلىنىپ يەنە 1 قېتىم قاينىتىلىدۇ. 001 رەقەبىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈندىگە 3 قېتىم، 50 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

مۇنزىچ بەرەس (X)

【تەركىبى】 ۋاسالغۇ ئۈزۈم 50 گرام، پىرسىياۋشان 15 گرام، گۈلى غاپەس 12 گرام، زوپامۇشكى 10 گرام، گۈلى گاۋزبان 12 گرام، چىلان 10 گرام، بادرنەنجىبۇيا 12 گرام، كاسىنە ئۇرۇقى 10 گرام، گۈلى بابۇنە 12 گرام، شاھتەررە 10 گرام، چىڭسەي يىلتىزى پوستى 15 گرام، ئەينۇلا 10 گرام، قۇرۇتۇلغان سەۋزە يىلتىزى 15 گرام، يانتاقشېكەرى 100 گرام، بەدىيان يىلتىزى پوستى 15 گرام، گۈلقەنت 100 گرام.

【تەييارلىنىشى】 يانتاقشېكىرى يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا ئايرىم چېلىنىدۇ. قالغان قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 1000 مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا 2 سائەت چېلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 600 مىللىلىتىر سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىپ، يانتاقشېكىرى چىلانغان دورا سۈيى قۇيۇلۇپ يەنە 1 قېتىم قاينىتىلىدۇ ھەمدە تىرىپى داكىدا سۈزۈۋېتىلىپ، گۈلقەنت سېلىنىپ تەكشى ئاردا-لاشتۇرۇلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم (ئەتى-كەن ۋە كەچتە تاماقتىن بۇرۇن)، 30 — 50 مىللىلىتىردىن ئازراق قايناقسۇ قوشۇپ ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

مۇنزىچ بەرەس (XI)

【تەركىبى】 بەدىيان يىلتىزى پوستى 15 گرام، رۇمبەددە-يان، گۈل بىنەپشە، ئاق لەيلى ئۇرۇقى، پىرسىياۋشان، سې-مىزئوت ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 11 گرامدىن؛ چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئۈستقۇددۇس، ئوغرىتىكەن، گاۋزىبانلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن؛ چىڭسەي يىلتىزى 15 گرام، گۈلقەنت 200 گرام.

【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 750 مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا 2 سائەت چېلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا 400 مىللىلىتىر سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىپ تىرىپى سۈزۈۋېتىلىپ، ئاكاۋادا ئېرىتىلگەن گۈلقەنت سۈيى سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 3 قېتىم، 50 — 70 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلسە بولىدۇ.

11. مۇسھىل (ماددىنى سۈرگۈچى) دورىلار

ئاقكېسەلگە ماددا (خىلىت) پىشقاندىن كېيىن بېرىلىدىغان (مۇسھىل) دورىلارنى ئىشلىتىشتە، ھەر بىر بىمارنىڭ مىجەزى، خىلىت تىپى ۋە پەسىلگە مۇۋاپىق كېلىدىغانلىرىنى تاللىغاندىن باشقا، ئۇلارنىڭ ياش قۇرامى، جىنسى، بەدەن قۇرۇلۇشىدىكى پەرق (كۈچلۈك - ئاجىزلىقى) قاتارلىقلارنى نەزەرگە ئېلىش زۆرۈر. ئەگەر قوشۇمچە كېسەللىكلەر بولۇپ، مۇسھىل دورىلارنى ئىشلىتىشكە بولمايدىغان ئەھۋال بايقالسا، بەدەن ۋە مىجەزگە ماس باشقا دورىلارنى تاللاپ ئىشلىتىش لازىم.

مۇسھىل بەرەس (I)

【تەركىبى】 سانائى مەككى 21 گرام، قىزىلگۈل، بابۇنە، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئۈستقۇددۇس، چىلان، سەرپىستاننىڭ ھەربىرىدىن 10.5 گرامدىن؛ بەدىيان يىلتىزى پوستى، چىڭ-سەي يىلتىزى، گاۋزىبان، سېرىقئوت، رۇمبەدىيان، قارا ھېلىلىنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ يانتاقشېكىرى 200 گرام، گۈلقەنت 150 گرام.

【تەييارلىنىشى】 سانا بىلەن يانتاقشېكىرى يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا چىلىنىدۇ. قالغان قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 800 مىللىلىتىر سۇغا 2 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ، يانتاقشېكىرى بىلەن سانا چىلانمىسى تۆكۈلۈپ يەنە بىر قاينىتىلغاندىن كېيىن، تىرىپى داكا بىلەن سۈزۈۋېتىلىپ، گۈلقەنت سېلىنىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ (بۇ نۇسخىنى ئاساسلىقى سەپرا مىجەز تىپىدىكىلەرگە

ئىشلىتىش كېرەك. ئەگەر بىمارنىڭ خىلىتى بەلغەمگە يېقىن بولسا، مەزكۇر مۇسەھلغا تۇرپۇت، زەنجىۋىلىنىڭ ھەربىرىدىن 15 گرامدىن؛ سەپراغا سەۋدا ئارىلاشقان بولسا بىستىپايەنچىتىن 15 گرام قوشۇپ تەييارلىنىدۇ. 【ئىشلىتىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 50 — 150 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى كىمەيتىپ بېرىلىدۇ.

【تەييارلىنىشى】 سانا بىلەن يانتاقشېكرى يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا ئايرىم چىلىنىدۇ. قالغان دورىلارنىڭ قاتتىقلىرى چالا سوقۇلۇپ 2000 مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ، سانا بىلەن يانتاقشېكرى چىلانمىسى قۇيۇلىدۇ ھەمدە يەنە بىر قاينىتىلىپ، دورا تىرىپلىرى داكا بىلەن سۈزۈۋېتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم، 150 — 100 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

تى، ۋاسالغۇ ئۈزۈم، سېرىقئوتنىڭ ھەر بىرىدىن 30 گرامدىن؛
بىستېپايەنچ 15 گرام، رۇمبەدىيان 6 گرام، ئەنجۈر قېقى 30
گرام، تۇربۇت پوستى 10 گرام، ئاقلانغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى
10 گرام، ئىزخىر 10 گرام، چىڭسەي ئۇرۇقى 6 گرام، بادام
مېغىزى 10 گرام. 【تەييارلىنىشى】

800 【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ
مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا بىر كېچە چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا
سۇنىڭ يېرىمى قالغۇچە قاينىتىلىپ تىرىپى سۈزۈۋېتىلىدۇ.
【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە 2 — 3 قېتىم،
30 — 60 مىللىلىتىردىن ئازراق قايناق سۇ قوشۇپ ئىچىدۇ.
بالىلارغا يېشىغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىپ بېرىلىدۇ.

مۇسھىل بەرەس (Ⅳ)

【تەركىبى】 سېرىق ھېلىلە پوستى، ئامىلە پوستى، بەلىلە
پوستى، قارا ھېلىلەنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن، بادەرنىجى-
جۇيا، گاۋزبان، ئۈستۈددۈس، پىرسىياۋشان، بەدىيان، شاھ-
تەررە، چىلان، سەرپىستان، تۇربۇتنىڭ ھەر بىرىدىن 25 گرام-
دىن؛ رەۋەن، خىيارى شەنبەر، گۈل بىنەپشىنىڭ ھەر بىرىدىن
10 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 قاتتىق دورىلار چالا سوقۇلۇپ 1500
مىللىلىتىر ئىسسىق سۇغا 4 سائەت چىلىنىدۇ ۋە پەس ئوتتا
800 مىللىلىتىر سۈيى قالغۇچە قاينىتىلىپ تىرىپى سۈزۈۋېتىل-
لىدۇ. 【تەييارلىنىشى】

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 چوڭلار ئەھۋالغا قاراپ كۈندە-
گە 2 — 3 قېتىم، 50 — 150 مىللىلىتىردىن ئىچىدۇ. بالىلار
ۋە تېنى ئاجىز كىشىلەرگە دورا مىقدارى مۇۋاپىق كېمەيتىپ
بېرىلسە بولىدۇ. 【تەييارلىنىشى】

12. چايلىق دورىلار

سۇيۇپ گۈلدارچىن (I)

【تەركىبى】 گۈلدارچىن 10 گرام، گاۋزىيان، پىلىپىل،
بادرەنجىبۇيلارنىڭ ھەر بىرىدىن 5 گرامدىن؛ زەنجىۋىل 10
گرام، رۇمبەدىيان 5 گرام، سىيادان 10 گرام، چىڭسەي
ئۇرۇقى، رەيھان ئۇرۇقى، زىرە، پىننە، سۆڭەكلەرنىڭ ھەر بىرىدىن
5 گرامدىن؛ لاپىندانە 3 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئارىلاشتۇرۇلغان ھالەتتە چالا سو-
قۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 مۆتىدىل.

【خۇسۇسىيىتى】 خىلىتلارنى تەڭشەش، ئۇسۇزلۇقنى بې-
سىش، ئۇيقۇنى، ئىشتىھانى ياخشىلاش، تېرىگە رەڭ پەيدا بو-
لۇشنى تېزلىتىش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.
【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەل، نېرۋا، يۈ-
رەك ئاجىزلىقى، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلى-
تىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش مىقدارى】 قايناق سۇغا مۇۋاپىق مىقداردا
سېلىپ دەملەپ ئىچىدۇ. ھەرقانداق مىجەزلىك كىشىلەرنىڭ
ئىشلىتىشىگە باب كېلىدۇ.

سۇيۇپ گۈلدارچىن (II)

【تەركىبى】 گۈلدارچىن، پىلىپىل، زەنجىۋىل، خولىنجان-
نىڭ ھەر بىرىدىن 50 گرامدىن، كابۇل ھېلىلىسى 10 گرام.
【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە تەقلىنپ تازى-
لىنىدۇ.

لانغاندىن كېيىن چالا سوقۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى سوغۇق ھۆللۈكلەرنى تارقىتىش، يەل ھەيدەپ، مىجەزنى تەڭشەش، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، تېرىگە رەڭ بېرىش تەسىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەرى】 يۇقىرىقى بىلەن ئوخشاشدۇ.

【ئىشلىتىلىشى ۋە مىقدارى】 (1) قايناق سۇغا مۇۋاپىق مىقداردا سېلىپ چاي ئورنىدا دەملەپ ئىچسە بولىدۇ؛ (2) كېسەللىك بار ئورۇننى قايناتقان دورا سۈيىدە يۇيۇپ كۈن نۇرىغا قاقلىسىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ.

سۇيۇپ زەنجىۋىل

【تەركىبى】 رۇمبەدىيان، سىيادان، ئوردان، زەنجىۋىل، ئاقىرقەرھە، بەدىياننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن؛ زىرە، چىڭسەي ئۇرۇقى، خولىنجان، سۇمبۇلنىڭ ھەر بىرىدىن 5 گرامدىن، قەلەمپۇر 15 گرام.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار ئۆلچەم بويىچە تەقلىنىپ، چالا سوقۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 مىجەزدىكى ھۆللۈكنى كېمەيتىش، خىمىيەلىكلەرنى قىزىتىش ئارقىلىق نورماللاشتۇرۇش، ئۇسسۇزلۇقنى بېسىش، تېرىگە رەڭ پەيدا بولۇشنى تېزلىتىش تەسىرلىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەرى】 ئاقكېسەل، ئېرۋا، يۈرەك ئاجىزلىقى، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 قايناق سۇغا مۇۋاپىق مىقداردا سېلىپ دەملەپ ئىچسىمۇ، قېنىقراق دەملەپ ئاق داغ ۋە ئومۇمىي بەدەننى يۇيۇپ بەرسىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ.

سۇيۇپ خولىنجان (I)
【تەركىبى】 خولىنجان، زەنجىۋىل، كالىي زىرە، ئوغرىتە، كەن، قاقىلىنىڭ ھەر بىرىدىن 50 گرامدىن؛ پىلىپىل، سۈم-جۈل، قەلەمپۇر، قوزاق دارچىنىنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن. 【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە تەقلىنىپ چالا سوقۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.
【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى ھۆلۈكلەرنى كېمەيتىش، ھارەتتىن ئۆزلىتىش ۋە قان تومۇرلارنىڭ ھەرىكىتىنى كۈچەيتىش، قۇۋۋىتى تەبىئىنىڭ ھارارىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، تېرە رەڭلىرىنىڭ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش تەسىرىگە ئىگە. 【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەل، نېرۋا، يۈ-رەك ئاجىزلىقى، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 (1) بىمار ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا دەملەپ ئىچىدۇ؛ (2) قېنىقراق دەملەپ كېسەللىك بار ئورۇننى ياكى ئومۇمىي بەدەننى يۇيۇشقا ۋە ياكى ۋاننا ئارقىلىق يۇيۇنۇشقا بولىدۇ.

سۇيۇپ خولىنجان (II)
【تەركىبى】 خولىنجان 50 گرام، قەلەمپۇر 20 گرام، زەنجىۋىل 50 گرام، قوزاق دارچىن 20 گرام، قاقىلە 40 گرام، سۈمبۈل چىنى 20 گرام، پىلىپىل 20 گرام، لاچىندانە

ھىندى 10 گرام، ئارپىبەدىيان 20 گرام. **【تەييارلىنىشى】** دورىلار ئۆلچەم بويىچە تەقلىنىپ، ئايرىم - ئايرىم تازىلانغاندىن كېيىن بىرلەشتۈرۈلۈپ چالراق سوقۇلىدۇ.

【خۇسۇسىيىتى】 مېجەزنى تەڭشەيدۇ، خىلىتلارنى نورمال - لاشتۇرىدۇ، رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەيدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى پە - سەيتىدۇ، تېرە رەڭ ماددىلىرىنى غىدىقلايدۇ. تېرىنىڭ كۈن نۇرىغا بولغان سەزگۈرلۈكىنى ئاشۇرىدۇ.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەل، مېڭە، يۈ - رەك ئاجىزلىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بىمار كۈنگە 2 — 3 قېتىم، سۇدا 3 — 5 گرامدىن قاينىتىپ ياكى قايناق سۇدا دەملەپ ئىچىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 قۇرۇق ئىسسىق مېجەزلىك بىمارلار دورا مىقدارىنى ئازايتىپ ئىشلىتىش ياكى باشقا چايلارغا ئارىلاشتۇرۇپ دەملەپ ئىچىش لازىم. ئۇنداق بولمىغاندا سۈيدۈك مىقدارى ئازلاش ھادىسىسى يۈز بېرىدۇ.

سۇپۇپ خارخەسەك (I)

【تەركىبى】 خارخەسەك، زەنجىۋىل، قوزاق دارچىن، پىل - پىلىنىڭ ھەربىرىدىن 50 گرامدىن؛ لاچىندانە ھىندى 10 گرام. **【تەييارلىنىشى】** دورىلار ئۆلچەم بويىچە تەقلىنىپ تازىلانغاندىن كېيىن چالا سوقۇلۇپ تەييارلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 مېجەزنى تەڭشەش، توسالغۇلارنى ئې - چىش، سۈيدۈكنى نورماللاشتۇرۇش، نېرۋىنى پەسەيتىش، تې - رىگە رەڭ بېرىش تەسىرلىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەللەرگە ئىشلە-

تىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەرقېتىم قايناق سۇغا 3 — 5 گرامدىن سېلىپ دەملەپ ئىچسىمۇ، قېنىقراق دەملەپ كېسەللىك بار ئورۇننى يۇسىمۇ بولىدۇ.

سۇيۇپ خارخەسەك (II)

【تەركىبى】 خارخەسەك 20 گرام، پىلىپ 10 گرام، خولىنجان 20 گرام، قەلەمپۇر، زەنجىۋىل، سۇمبۇل چىنى، قاقىلە، كەرۋىيا ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە تەقلىنىپ تازى- لانغاندىن كېيىن چالا سوقۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسسىق.

【خۇسۇسىيىتى】 بەدەندىكى يەللەرنى تارقىتىپ، زىيادە ھۆللۈكنى تەڭشەيدۇ. مېجەزنى نورماللاشتۇرىدۇ. ئۇسۇزلۇق- نى بېسىپ، نېرۋىنى تىنچلاندۇرىدۇ، تېرىگە رەڭ بېرىدۇ. 【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاقكېسەللەرگە ئىشلە- تىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بىمارلار ئەھۋالغا قا- راپ قايناق سۇغا 2 — 4 گرامدىن سېلىپ دەملەپ ئىچىدۇ ياكى كېسەللىك بار جاينى يۇيۇپ ئاپتاپقا قاقلايدۇ.

سۇيۇپ خولىنجان كەرۋىيا

【تەركىبى】 خولىنجان 40 گرام، قوزاق دارچىن 20

گرام، كەرۋىيا، قاقىلە، زەنجىۋىل، سۇمبۇل، پىلىپ، رۇم- بەدىيان، قەلەمپۇرنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرامدىن.

【تەييارلىنىشى】 دورىلار كۆرسەتمە بويىچە تەقلىنىپ، تازى-

لانغاندىن كېيىن چالا سوقۇلىدۇ. 【تەبىئىيەت】

【تەبىئىيەت】 ئىسسىق.

【خۇسۇسىيەت】 مېھزنى تەڭشەش، ئاشقازاننى قىزىتىش، بەدەندىكى ئارتۇق ھۆللۈكلەرنى كېمەيتىش، ئېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، تېرىگە رەڭ بېرىش تەسىرلىرىگە ئىگە.

【ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئاقكېسەل، مېڭە، يۈرەك ئاجىزلىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 (1) قايناق سۇغا مۇ-ۋاپىق مىقداردا سېلىپ دەملەپ ئىچسە بولىدۇ؛ (2) قېنىقراق دەملەپ، كېسەللىك بار ئورۇننى كۈنگە بىر قېتىم يۇيۇپ، ئاپتاپقا قاقلىسىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ.

13. سۇيۇپ تىپىدىكى ئاددىي دورىلار

1 - نۇسخا

بەدەننى مۇنزىچ ۋە مۇسھىل دورىلار بىلەن تازىلاپ، قىزىل بەھمەن، سىياداننى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، كۈنگە 2 قېتىم، 2 — 4 گرامدىن ئۈزۈلدۈرمەي 40 — 60 كۈن ئىچىپ بەرسە، ئاقكېسەل ۋە چاچ ئاقىرىپ كېتىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2 - نۇسخا

خارخەسەك، لالە ئۇرۇقىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ تاسقاپ، كۈنگە 3 — 5 گرامدىن ئۈزۈلدۈرمەي 60 كۈن ئىستېمال قىلىپ بەرسە ئاقكېسەلگە داۋا بولىدۇ. 【تەبىئىيەت】

3 - نۇسخا

8 【تەركىبى】 سىيادان، توم زەنجىۋىلىدىن باراۋەر مىقدار ئېلىپ سوقۇپ تاسقاپ، سۇپۇپ (تالقان) تەييارلاپ، چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم، 2 — 4 گرامدىن ئۈزۈلدۈرمى 40 كۈن ئىستېمال قىلىپ بەرسە ئاقكېسەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ، چاچ ۋاقىتىسىز ئاقىرىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ (بۇ دورىنى ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلاپ ئىستېمال قىلىسىمۇ بولىدۇ).

4 - نۇسخا

【تەركىبى】 زىرە 15 گرام، قارا ھېلىلە 5 گرام، شېكەر 10 گرام. بۇلارنى سوقۇپ تاسقاپ، سۇپۇپ (تالقان) تەييارلاپ، چوڭلار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، 4 — 6 گرامدىن 2 ئاي ئىستېمال قىلىپ بەرسە ئاقكېسەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

5 - نۇسخا

【تەركىبى】 كالىي زىرە ئۇرۇقى 40 گرام، قۇندۇز قەھرى 3 گرام، كۆكنار ئۇرۇقى 6.5 گرام، ناۋات 15 گرام، بۇلارنى سوقۇپ تاسقاپ، سۇپۇپ (تالقان) تەييارلاپ، چوڭلار كۈنىگە 1 — 2 قېتىم، 2 — 3 گرامدىن يەپ بەرسە ئاقكېسەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ ۋە ئاقكېسەلنىڭ قايتا قوزغىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، بەدەن ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. ئەرلەردىكى مەنىي بالدۇر كېتىش كېسەلى ۋە بۆرەك سوغۇقتىن ئاجىزلىشىشلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

6 - نۇسخا

【تەركىبى】 كابۇل ھېلىلىسى پوستى 30 گرام، خارخەسەك 60 گرام، شېكەر 30 گرام، قارا كۈنجۈت 15 گرام، بۇلاردىن

خارخەسەكنى پەس ئوتتا سارغايغۇچە قورۇپ، سويغاندىن كې-
يىن قالغان دورىلار بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، سوقۇپ تاسقاپ سۇ-
پۇپ (تالقان) تەييارلاپ، چوڭلار كۈنىگە 2 قېتىم، 4 — 8
گرامدىن ئۈزۈلدۈرمەي 2 ئاي يەپ بەرسە ئاقكېسەلگە مەنپەئەت
قىلىدۇ.

7 - نۇسخا (غەلىبە تەمىنە قىلىشقا مەسۇب بىلىمە ئالمىشە)
غەلىبە تەمىنە قىلىشقا مەسۇب بىلىمە ئالمىشە

【تەركىبى】 سېرىق ھېلىلە پوستى 20 گرام، قارا كۈنجۈت
30 گرام، ئىلى پاقىسى 5 دانە، شېكەر 30 گرام، بۇلارنى
سوقۇپ، تاسقاپ سۇپۇپ (تالقان) تەييارلاپ، چوڭلار كۈنىگە 2
قېتىم، 4 — 8 گرامدىن ئۇزاق ۋاقىت يەپ بەرسە، ئاقكېسەلگە
پايدا قىلىدۇ ۋە كالا تەمرەتكىسىنىڭ قايتا - قايتا قوزغىلىشىنىڭ
ئالدىنى ئالىدۇ.

غەلىبە تەمىنە قىلىشقا مەسۇب بىلىمە ئالمىشە

8 - نۇسخا

【تەركىبى】 باپىچى ئۇرۇقى 30 گرام، زىرە 30 گرام،
مېھرىگىياھ 15 گرام، ھەسەل 225 گرام. قاتتىق دورىلارنى
سوقۇپ تاسقاپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلاپ، چوڭ-
لار كۈنىگە 2 — 3 قېتىم، تاماقتىن كېيىن 6 — 15 گرامدىن
ئۈزۈلدۈرمەي 60 كۈن ئىستېمال قىلىپ بەرسە، كۆپ قايتىلاند-
غان ئاقكېسەللەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ. بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت
كۈچىنى ئاشۇرۇپ، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ. پۇت - قول ئاغرىق-
لىرىنى ياخشىلاپ، ئەستە ساقلاش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ.

نۇسخا 8

غەلىبە تەمىنە قىلىشقا مەسۇب بىلىمە ئالمىشە

غەلىبە تەمىنە قىلىشقا مەسۇب بىلىمە ئالمىشە