

ئەخمەتجان ئىسمائىل

ئۇيغۇر تىبابىتىدە پەھىز بۇيرۇش



شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

مۇقاۋىنى لايىھىلىگۈچى : ئادىلجان ئابىت



ISBN 7-5372-3712-3



ISBN 7-5372-3712-3

(维文) 定价: 12.00 元

9 787537 237123 >

ئەخمەتجان ئىسمائىل

ئۇيغۇر تېبابىتىدە پەرھىز بۇيرۇش

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

图书在版编目(CIP)数据

维吾尔医禁忌疗法/艾合买提江编. —乌鲁木齐:新疆人民卫生出版社, 2003. 12
ISBN 7-5372-3712-3

Ⅰ. 维… Ⅱ. 艾… Ⅲ. 维吾尔族—民族医学—疾病—食物疗法 Ⅳ. R291.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 119569 号

责任编辑: 阿不力克木·努尔买买提阿吉
责任校对: 热依汗·努尔

维吾尔医禁忌疗法 (维吾尔文)

艾合买提江·依斯玛义 编著

新疆人民卫生出版社出版
(乌鲁木齐市龙泉街 66 号 邮编: 830001)

新疆石油报社印刷厂印刷

新疆新华书店发行

850×1168 毫米 32 开本 6.75 印张

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—4000

定价: 12.00 元

كىرىش سۆز

پەرھىز بۇيرۇش ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكىدە.
رىدىن بىرى. پەرھىز ئۆلچەملىرى شۇ جاي ۋە ئىقلىمنىڭ،
شۇنداقلا شۇ جايدىكى خەلقنىڭ دۇنيا قارىشى ۋە مىللىي مەدەنىيىتى.
تى ئاساسىدا بارلىققا كېلىدۇ. مىللىي مەدەنىيەت تەركىبىدە
ھاياتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە چېتىلىدىغان پەرھىزلەر بولغان
بولىدۇ. تېببىي خادىملارنىڭ بۇيرىغان پەرھىزلىرى مىللىي مە-
دەنىيەت تەركىبىدىكى پەرھىزلەر ئىچىدىكى بىر قەدەر ئىلمىي
پەرھىزلەر بولۇپ، تېببىي مەدەنىيەتنى تەرەققىي قىلغان خەلقلەر-
نىڭ ئومۇمىي مەدەنىيىتىدە ئوخشاشلا ئەھمىيەتلىك بولغان تەبى-
ئەت قانۇنىيەتلىرى سۈپىتىدە شۇ خەلقنى ئەبەدىي ياشىتىدۇ ۋە
قوغدايدۇ.

بۇ يىغىنچاق كىتابتا ئومۇمىي پەرھىزلەر ئىچىدىن نۆۋەتتە
كىشىلەر كۆپرەك كۆڭۈل بۆلىدىغان بىمارلار پەرھىزلىرىنى تال-
لاپ چىقىم ھەمدە ئەمەلىي تەجرىبەم ئاساسىدا كۆپ ئۇچرايدىغان
كېسەللىكلەرنىڭ يېمەك - ئىچمەك ۋە باشقا جەھەتلىرىدىكى پەر-
ھىزلىرىنى يېزىپ چىقىم، يەنە بىر قىسىم ئىستېمال بويۇملى-
رىنىڭ خۇسۇسىيەتلىرىنى قىستۇرۇپ ئۆتتۈم. چۈنكى كۆرۈنگەن-
لى كەلگەنلەر ئەقەللىي پەرھىزلەرنى ئۆزلىرى بىلگەن بولسىدى،
كېسەللىك قوزغىلىپ ۋە ئېغىرلىشىپ ئىقتىسادىي جەھەتتىن
ئېغىر بەدەل تۆلىمىگەن، دوختۇرلارمۇ ئادەتتىكى پەرھىزلەرنى

كۈندە تەكرارلاپ ئولتۇرماي، ۋاقتى ۋە زېھنىنى تېخىمۇ چوڭ تېمىلارغا سەرپ قىلغان بولار ئىدى.

دۆلەتتە قانۇن، ئائىلىدە قائىدە بولغىنىدەك، ھەر بىر شەخسىنىمۇ ياشاش ئۆلچىمى بولۇشى كېرەك. ئۇلۇغ غايە ۋە بۈيۈك نىشانى بولغان ئادەم ھەم روھىي جەھەتتىن، ھەم جىسمانىي جەھەتتىن ساغلام بولالىشى شەرت. ئەقەللىي پەرھىزلەرنى بىلگەن كىشى ھايات سەپىرىدە ئورۇنسىز زىيان ۋە كاشىلىقلارغا ئاز ئۇچراپ، مەركىزىي مەسىلە ياكى نىشان ئۈچۈن كۆپرەك ۋاقىت ئاجرىتالايدۇ. ئۆزىنى ھەم كۆپچىلىكنى ئۈمىدۋار ۋە كۈچ-تۈڭگۈر قىلالايدۇ.

مەن ئۈرۈمچى خەلق رادىئو ئىستانسىدا 3 يىلدىن بۇيان ئېلىپ بارغان ۋە بېرىۋاتقان «ئەلشېپا» قىزىق لىنىيىلىلا رادىئو ئامبۇلاتورىيىسى، «سەيپۈن» ئىنفىرا نۇر مەھسۇلاتلىرىنى تو-نۇشتۇرۇش پروگراممىسى، «ئوقۇغۇچىلارغا پىسخىك مەسلىھەت بېرىش پروگراممىسى» دا مەخسۇس كېسەللىكلەر توغرىسىدا سۆزلىگەنلىرىم ئاساسىدا ئوشبۇ كىتابنى يېزىپ چىقتىم. چۈشەند-مىگەن ياكى تولۇق بولمىغان يەرلەر بولسا رادىئو ئىستانسىسى ياكى مەندىن بىۋاسىتە سورىسا بولىدۇ.

ئاپتوردىن

2003 - يىلى 3 - ئاي

مۇندەرىجە

- 1 ئومۇمىي چۈشەنچە
- 1 ماددىسىز ئىسسىقلىق بولغان باش ئاغرىقى
- 1 ماددىسىز سوغۇقلىق بولغان باش ئاغرىقى
- 1 قان خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقى
- 2 سەپرا خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقى
- 2 بەلغەم خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقى
- 3 سەۋا خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقى
- 3 يەلدىن بولغان باش ئاغرىقى
- 3 سەۋدادىن بولغان ئاشقازان مەنبەلىك باش ئاغرىقى ...
- 4 يەلدىن بولغان ئاشقازان مەنبەلىك باش ئاغرىقى
- 4 يۇقىرى قان بېسىمىدىن بولغان باش ئاغرىقى
- 5 ئۇيقۇسىزلىقتىن بولغان باش ئاغرىقى
- 5 ھاراقىتىن بولغان باش ئاغرىقى
- 5 جىنسىي ئالاقىدىن بولغان باش ئاغرىقى
- 6 ئۇيقۇدىن بولغان باش ئاغرىقى
- 6 مېڭە زەئىپلىشىشتىن بولغان باش ئاغرىقى
- 6 مېڭە سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىشتىن بولغان باش ئاغ-
رىقى
- 7 باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش — شەقىقە
- 7 ئىسسىقلىقتىن بولغان مېڭە پەردە ياللۇغى

- 8 سوغۇقتىن بولغان مېڭە پەردە ياللۇغى
- 8 ئۇيقۇسىزلىق
- 9 ئۇنۇتقۇچىلىق
- 9 خىيال قىلىش كۈچى بۇزۇلۇش
- 10 قاندىن بولغان مالىخۇلىيا
- 10 سەپرادىن بولغان مالىخۇلىيا
- 10 سەۋدادىن بولغان مالىخۇلىيا
- 11 قاندىن بولغان قارا بېسىش
- 11 بەلغەم ۋە سەۋدادىن بولغان قارا بېسىش
- 12 مېڭە مەنبەلىك سەرئى
- 12 بەلغەمدىن بولغان سەرئى
- 12 سەۋدادىن بولغان سەرئى
- 13 قان ۋە سەپرادىن بولغان سەرئى
- 13 سەكتە
- 14 قاندىن بولغان باش قىيىش
- 14 سەپرادىن بولغان باش قىيىش
- 14 بەلغەمدىن بولغان باش قىيىش
- 15 سەۋدادىن بولغان باش قىيىش
- 15 سوغۇق يەل ۋە بۇسلاردىن بولغان باش قىيىش
- 15 ئاپتاپ ئۆتۈشتىن بولغان باش قىيىش
- 16 ئەسەب (نېرۋا) ئاجىزلىقى
- 16 ھېستىرىيە
- 17 قاش ئۈستى نېرۋىلىرىنىڭ ئاغرىشى
- 17 لەقۋا ئىستىرخائى
- 18 پالەج

- 18 پالەچ ۋە ئىستىرخا
- 20 بەل تۈۋى پالەچلىنىش
- 20 تىترەشلىك پالەچ
- 21 بالىلار پالچى
- 21 لەقۇۋا
- 22 مېڭە قاناش
- 22 تەشەننۇچ - تارتىش
- 23 قاتما
- 24 رەئىشە - تىترىمە كىسەك
- 24 سېزىمنى يوقىتىش
- 24 ساراڭلىق
- 26 سەرسام
- 26 سەپرادىن بولغان سەرسام
- 27 نەزلە زىققىسى
- 27 بەلغىمى زىققە
- 28 يەلدىن بولغان زىققە
- 29 ئۆتكۈر خاراكتېرلىك زىققە
- 29 يۈرەك خاراكتېرلىك دەم سىقىش
- 30 ئاشقازان خاراكتېرلىك دەم سىقىش
- 30 ئىسسىقتىن بولغان يۆتەل
- 31 ھۆللۈكتىن بولغان يۆتەل
- 31 سۇغۇقتىن بولغان يۆتەل
- 32 غىدىقلىنىش خاراكتېرلىك يۆتەل
- 32 بالىلار يۆتلى
- 33 قان تۈكۈرۈش

- 33 ئۆپكە ياللۇغى
- 34 ئىسسىق (قان ۋە سەپرا) دىن بولغان زاتىرىيە
- 35 ئۆپكە قېتىش خاراكتېرلىك زاتىرىيە
- 35 ئۆپكە سۇلۇق ئىششىقى
- 36 يىرىك تۈكۈرۈش
- 37 ئۆپكە تالالىشىش
- 37 ئۆپكە راكى
- 38 ئۆپكە سىلى
- 42 لىمفا سىلى
- 43 قان ۋە سەپرادىن بولغان كۆكرەك پەردە ياللۇغى
- 44 كۆكرەك پەردە ياللۇغى (زاتىلجەنبى)
- 44 يوقۇملىنىشتىن بولغان كۆكرەك پەردە ياللۇغى
- 45 دىئافراگما ياللۇغى
- 45 كۆكرەككە سۇ چۈشۈش
- 45 يۈرەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقتىن بۇزۇلۇشى
- 46 يۈرەك مىزاجىنىڭ سۇغۇقتىن بۇزۇلۇشى
- 47 يۈرەك سانجىقى
- 48 ئىسسىقتىن بولغان خەفەقان
- 48 سۇغۇقتىن بولغان خەفەقان
- 49 ماغدۇرسىزلىقتىن بولغان خەفەقان
- 49 سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىشتىن بولغان خەفەقان
- 50 يۈرەك سىقىلىش
- 50 يۈرەك ھاۋالىنىشنىڭ بۇزۇلۇشى
- 51 يۈرەك قېپى ياللۇغى
- 51 يۈرەك قاپقاقلرى ئىششىقى

- 51 ئايلىنىپ كېتىش (غەشپە)
 52 يۇقىرى قان بېسىم كېسىلى
 53 قان ئازلىق
 54 سۈت ئازلىق
 54 ئىسسىقلىقتىن بولغان ئەمچەك ياللۇغى
 55 سۇغۇقتىن بولغان ئەمچەك ياللۇغى
 55 قانتېقىلىشىش خاراكتېرلىك ئەمچەك ياللۇغى
 56 گال چاقىسى (ئانگىنا)
 56 گال قۇرغاقلىشىش
 57 ئىسسىقلىقتىن بولغان قىزىلئۆڭگەچ ياللۇغى
 57 سۇغۇقتىن بولغان قىزىلئۆڭگەچ ياللۇغى
 58 زۇكام ۋە نەزلە سەۋەبىدىن بولغان ئاۋاز پۈتۈش
 58 ۋاقىراشتىن بولغان ئاۋاز پۈتۈش
 58 ئىسسىقلىقتىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى
 59 ئاشقازان يىرىڭلىق يارىسى
 59 سۇغۇقتىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى
 60 سوزۇلما ئاشقازان ئىششىقى
 61 ئاشقازان يارىسى
 61 ئاشقازان ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى
 62 ئاشقازان كۆپۈش
 63 ئاشقازان ئاغرىش
 63 ئاشقازان خىزمىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى
 64 ھەزىم ئاجىزلىقى
 65 ھەزىم ناچارلىشىش
 65 ئىشتىھا بۇزۇلۇش

- 66 ھەزىمىنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشى
- 66 ئىشتىھانىڭ زىيادىلىكى
- 67 قان قۇسۇش
- 68 ھېق تۇتۇش
- 68 ئاشقازان كىرىش ئېغىزىنىڭ ئاغرىقى
- 68 ئاشقازان ئېچىش
- 69 ئاشقازان غىدىقلىنىش
- 69 ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش
- 70 ئاشقازانغا زەربە تېگىش
- 70 جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلۇشى
- 71 جىگەر مىزاجىنىڭ سوغۇقلىقتىن بۇزۇلۇشى
- 71 جىگەرنىڭ سوغۇقلىقتىن ئاجىزلىشىشى
- 71 ئىسسىقلىقتىن بولغان جىگەر ياللۇغى
- 72 سوغۇقلىقتىن بولغان جىگەر ياللۇغى
- 72 جىگەر قېتىش
- 73 جىگەر يىگىلەش
- 73 جىگەر كىچىكلەش
- جىگەر مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان بەدەن كۆپۈپ
- 74 ئىششىش
- 74 جىگەر سانجىقى
- 75 سۇلۇق ئىششىق
- 76 قورساققا سۇ يىغىلىش
- 76 قورساققا يەل يىغىلىش
- 77 ئۆت تېشى كېسەللىكى
- 77 تال ياللۇغى

77	 تال چوڭىيىش
78	 تال توسۇلۇش
78	 تال ئاغرىش
78	 تاماقتىن ئىچى سۈرۈش
79	 ئۈچەي مەنبەلىك ئىچى سۈرۈش
80	 سوزۇلما خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش
81	 قانلىق ئىچى سۈرۈش
81	 سەپرادىن بولغان قان تولغاق
82	 ئۈچەي توسۇلۇش
82	 سازاڭسىمان ئۈسۈكچە ياللۇغى
82	 قەۋزىيەت
83	 ئۈچەي ياللۇغى
83	 ئۈچەي سىلى
84	 ئۈچەي يارىسى
84	 بەلغەمدىن بولغان قۇلۇن ئۈچەي ئىششىقى
85	 ئۈچەي قۇرت كېسىلى
85	 مەقئەت بوۋاسىرى
86	 يەللىك بوۋاسىرى
86	 مەقئەت ئاقمىسى
87	 مەقئەت ياللۇغى
87	 مەقئەت چىقىپ قىلىش
88	 مەقئەت يارىسى
88	 بەزگەك
89	 كىزىك
90	 ئورۇقلاپ كېتىش

- 90 سەمىرىپ كېتىش
- 91 بۆرەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقى بۇزۇلۇشى
- 92 بۆرەك مىزاجىنىڭ سۇغۇقلىقى بۇزۇلۇشى
- 92 بۆرەك ئاجىزلىقى
- 93 ئىسسىقلىقتىن بولغان دىئابىت
- 93 سۇغۇقلىقتىن بولغان دىئابىت
- 94 بۆرەك ئورۇقلاپ كېتىش
- 94 بۆرەك ۋە سۈيدۈك يولىغا تاش چۈشۈش
- 95 دۈۋساق ئاجىزلىشىش
- 95 دۈۋساق ئاغرىقى
- 95 سۈيدۈك تۇتۇلۇش
- 96 سۈيدۈك تامچىلاپ ۋە ئىچىشىپ كېلىش
- 96 سۈيدۈك تۇتالماسلىق
- 97 سىيىپ يېتىش
- 97 قان سىيىش
- 98 دۈۋساق ياللۇغى
- 98 باھ ئاجىزلىقى
- 99 مەنىي تېز كېتىپ قېلىش
- 99 كۆپ ئېھتىلام بولۇش
- 100 قولدا لەرزە تىلىنىش
- 100 ئۇرۇقدان ياللۇغى ۋە ئۇرۇقدان ئاغرىقى
- 101 ئۈچەي چۈشۈش
- 101 زەكەر ياللۇغى ۋە يارىسى
- 102 تۇغماسلىق
- 102 ھەيز كەلمەسلىك

103	 ھەيز كۆپ كېلىش
103	 ئاق خۇن كۆپىيىش
104	 بويىدىن ئاجىراپ كېتىش
105	 ھىستېرىيە
105	 بالياتقۇ ياللۇغى
106	 بالياتقۇ يارىسى
106	 جىنسىي يول ياللۇغى
107	 مۇپاسىل
107	 نىقرەس
107	 غول ئاغرىش
108	 يانپاش بوغۇم ئاغرىقى
108	 ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى
	پاچاق ۋېنا تومۇرلىرىنىڭ ئەگرى - بۇگرى بولۇپ قېلىشى
109	 قىچىشقاق (قونۇر)
109	 چالاش
111	 تېرە كېپەكلىشىش
111	 بۆرە چاقىسى
112	 يەلتاشما
112	 قىچىشقاق
113	 بەدەن تەمرەتكىسى
114	 ئاقكېسەل
116	 داغ
117	 سىڧىس
118	 دائىرىلىك چاچ چۈشۈش

- 118 چاچ بالدۇر ئاقىرىپ كېتىش
 118 چاچ چۈشۈش
 119 كۆزگە قاناتسىمان گۆش ئۈسۈپ قېلىش
 120 كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى
 120 كۆزگە قۇرۇقلۇق يېتىش
 120 كۈندۈزى كۆرمەسلىك
 121 كۆزنىڭ يورۇقلۇقتىن قېچىشى
 121 كۈچلۈك نۇر تەسىرىدىن كۆز تورلىشىش
 122 ئۈزۈمسىمان پەردىنىڭ چىقىپ قېلىشى
 123 كۆز قوتۇرى - تراخوما
 123 كۆز ياشاغغۇراش
 124 كۆزگە زەربە تېگىش
 124 نامازشام قارىغۇسى
 125 ئالغايلق
 125 كۆرۈش ئاجىزلىشىش
 126 قاپاق ساڭگىلاش
 126 يىڭناسقۇ
 126 قاندىن بولغان كۆز ياللۇغى
 127 يۇقۇملۇق كۆز ياللۇغى
 127 قۇلاق ئاقىمىسى
 128 قۇلاق ئېغىرلىقى ۋە گاسلىق
 128 قۇلاق غۇڭۇلداش
 128 قۇلاقتىن يىرىك ئېقىش
 129 ئىسسىقتىن بولغان زۇكام ۋە نەزلە
 129 سوغۇقتىن بولغان زۇكام ۋە نەزلە

- پۇراش سېزىمى ئاجىزلىشىش ياكى پۈتۈنلەي يوقىد.
- 131 لىش
- 131 بۇرۇن ياللۇغى
- 131 بۇرۇن ئىچىگە يىرىڭلىق چاقا چىقىش
- 132 كۆپ چۈشكۈرۈش
- 132 بۇرۇن قۇرۇش
- 133 بۇرۇق ئىچىشىش
- 134 بۇرۇن قورۇلۇش
- 134 بۇرۇن يولغا توسالغۇ پەيدا بولۇش
- 135 بۇرۇن قىچىشىش
- 135 كالىپۇك يېرىلىش
- 136 كالىپۇك ياللۇغى
- 136 ئېغىزغا مۇدۇر چىقىش
- 137 قان ۋە سەپرادىن بولغان ئېغىز پىشلاق بولۇش ...
- 137 شۆلگەي كۆپ ئېقىش
- 137 ئېغىز پۇراش
- 138 ئېغىز ۋەرمىسى
- 139 تىل ئېغىرلىقى ۋە كېكەچلىك
- 139 تىل چوڭىيىپ قېلىش
- 139 تىل ياللۇغى
- 140 تېتىش سېزىمىنىڭ بۇزۇلۇشى
- 140 تىل قۇرغاقلىشىش
- 140 تىل يېرىلىش
- 141 تىل قۇرۇش
- 141 ئىسسىقلىقتىن بولغان چىش ئاغرىقى

142	 سوغۇقتىن بولغان چىش ئاغرىقى
142	 چىش مىلكى قاناش
143	 ئاۋاز پۈتۈش
143	 كۆپ تەرلەش
145	 قوشۇمچە. خاسىيەتلىك ئەشيالار
145	 1. ھاۋالار
146	 2. سۇلار
148	 3. دانلىق زىرائەتلەر
151	 4. ياغلار
155	 5. گۆشلەر
159	 6. ھايۋان ئەزالىرى
164	 7. سۈتلەر
166	 8. مېۋىلەر ۋە مېغىزلار
176	 9. كۆكتاتلار
183	 10. شەربەتلەر
187	 11. ۋاراقلار
188	 12. شېكەرلەر
190	 13. خۇش پۇراقلار
191	 14. خۇرۇچلار

..... 151

..... 152

..... 153

..... 154

..... 155

..... 156

ئومۇمىي چۈشەنچە

«پەرھىز» سۆزى تۇرمۇشىمىزغا سىڭىپ كىرگەن مىڭ يىلدىن بۇيان، ئۇنىڭ «دىققەت قىلىش، ئالدىنى ئېلىش، تۇتۇۋېلىش، ھۇشيار بولۇش...» قاتارلىق كەڭ مەنىلىرى رايونىمىز خەلقىنىڭ ئۆزگىچە مەدەنىيىتىدە قانۇن ۋە ئەخلاق مىزانلىرى بىلەن تەڭ دېگۈدەك سۈپەت بىلەن ئۆزىنىڭ ئىجابىي قۇدرىتىنى نامايەن قىلىپ كەلمەكتە. دىنىي سەۋەبلەر بىلەن گەرچە «پەرھىز» دېگەن سۆز ئەرەبچىدىن قوبۇل قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن پەرھىزدىن ئىبارەت قىممەت قارىشى ئۇندىن بۇرۇنمۇ مەدەنىيىتىمىزدە مەھكەم ئورۇن تۇتقان ئىدى. بۇ خىل قىممەت قارىشى پاكىزلىق، سالامەتلىك ۋە ئىنسانىي سۈپەت تۇقتىسىدىن ئېيتقاندا بىر قەدەر تەرەققىي قىلغان ئەللەردە ھاسىل بولىدىغان دۇنيا قاراش بولغاچقا، ئۇنى تەتقىق قىلىش ۋە ھازىرقى زامان ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش ناھايىتى زور رېئال ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ ھەرگىزمۇ ئاددىيلا يېمەك - ئىچمەك پەرھىزىنى كۆرسەتمەيدۇ، ئومۇمەن ئىنسانىي سۈپەت بىلەن ياشىمەن دېگەن ھەرقانداق ئادەم ھاياتىنىڭ ھەرقايسى تەرەپلىرىگە چېتىلىدىغان زىيانلىق ئىشلاردىن پەرھىز قىلىشى لازىم. يولۇپمۇ خەلقنىڭ اجەۋىرى ۋە يىلىكى ھېسابلانغان ئوقۇمۇشلۇق زىيالىيلار ۋە ئوقۇغۇچى - ئوقۇتقۇچىلار روھىي ۋە جىسمانىي ئاپەتلەرنى ئېلىپ كەلگۈچى زىيانلىق ماددىلاردىن ھەمدە تەبىئىيلىكتىن، مىللىيلىكتىن ياتلاشقان تۇرمۇش ئۇسۇللىرىدىن قول ئۇزۇشلىرى شەرت. پەرھىز بۇيرۇش يالغۇز تېبابەتنىڭ كەسپ ئالاھىدىلىكى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى پۈتكۈل ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قىممەت

قارشى سىستېمىسىدىكى بىباھا گۆھەر. ئۇنىڭ بىر ئۇچى قانۇن ۋە ئەخلاققا تۇتاشسا، يەنە بىر ئۇچى ئىنساننىڭ روھىي دۇنياسى ۋە ئۇنىڭ ئىززەت - ھۆرمىتىگە تۇتۇلغان مەسئۇلىيەتچان پوزىتسىيىگە بېرىپ تاقىلىدۇ. تەبىئەت دۇنياسىنى ئاسراش ۋە گۈزەللەشتۈرۈشتىن تارتىپ، ئىنساننىڭ جىسمانىي ۋە روھىي سالامەتلىكىنى ياخشىلاشقا بولغان بۇ ئارىلىق، دېمەككە ئاسان بولغىنى بىلەن خۇددى ساما يوللىرى ئارىسىدىكى مىليارتلىغان كىلو-مېتىرلىق مۇساپىدىن ئۇزۇن بولغان مۇشەققەتلىك ئەمما شەرەپلىك بىر سەپەر. ئۇنى ئورۇنلاش ھەر بىر ئىنساننىڭ گۈزەل ئەخلاقلىرىدىن ۋە ۋەزىپىلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر بىر ئىنسان تەبىئەتنى خالىغانچە بۇزىدىكەن، ئۇنى ۋەھشىلىك ۋە مەدەنىيەتسىزلىكنىڭ ئۇچىغا چىققان ئىجراچىسى دەپ تونۇيمىز، ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتى، تېنى ۋە سالامەتلىكىنى چۈشەنمەيدىغان ۋە ئۇنى بۇزىدىغان بولسا، بىز ئۇنى ئاخىرى بىر كۈنى پۇشايمان ۋە خارلىق ئىچىدە نىجاسەن يەپ ياتىدىغان ناتونۇش مەخلۇق دەپ ھۆكۈم قىلىمىز. چۈنكى بۇلارنىڭ ھەر ئىككىسىدىلا ئىنسانلىق پەرھىزلەر ئادا قىلىنىمىغان، ھەتتا ئىنسانلىقنى ئۇنتۇلغان بولىدۇ. مەزكۇر كىتابنىڭ ھەجىمى ۋە باشقا ئەھۋاللار ئويلىشىلىپ، ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي، قانۇنىي، ئەخلاقىي ۋە مىللىي پەرھىزلىرى بۇ يەردە سۆزلەنمەيدۇ، شارائىت بولغاندا ئايرىم بىر ئەسەردە مەخسۇس توختالماقچىمەن.

مەخسۇس كېسەللىكلەر پەرھىزلىرى ئومۇمىي پەرھىزلەرنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ، ھەممە ئادەمنىڭ مەنپەئىتىگە بىۋاسىتە تاقىلىدۇ. چۈنكى بىر ئادەم بەدىنىنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى مۇھىتلىرى بۇزۇلۇش تۈپەيلىدىن، روھىي تەڭپۇڭسىزلىقلارنىڭ ئازابلىشىشى سەۋەبىدىن ئىممۇنىتېت كۈچى تۆۋەنلەپ ئاسانلا كېسەلگە دۇچار بولىدۇ. ئاغرىغان ئادەم ئىش - ئوقەت قىلالىمىغا چاقما ئۇنىڭ كىرىمى تۆۋەنلەيدۇ، كېسەلنى داۋالىتىشقا ئىقتىدارى

ساد سەرپ قىلىدۇ، نەتىجىدە بىر ئائىلىنىڭ تۇرمۇش سۈپىتى تېزلا تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. جىددىي كېسەللىك يامرىغان يەرلەردە ھەمدە روھىي بېسىم ئېغىر جايلاردا ئومۇميۈزلۈك نامراتلىق ۋە نادانلىق ئەۋج ئالىدۇ. دېمەك كېسەللىك، نامراتلىق ۋە نادانلىق بىر - بىرىگە مەھكەم چاپلاشقان «قېرىنداش» لار ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا ناچار تۇرمۇش ئادەتلىرىدىن، ئىلىم ئۆگەنمەسلىكتىن ۋە ئۆزىنى چۈشەنمەسلىكتىن قاتتىق پەرھىز تۇتۇش لازىم. بولۇپمۇ كېسەل بولغان مەزگىلدە يېمەك - ئىچمەك، كىيىم - كېچەك، تۇرالغۇ ۋە روھىي سالامەتلىك جەھەتلەردە پەرھىزلەرگە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بۇ ھەقتە «ياشلار سەمىگە - تەدبىرنىڭ قانداق بولسا، تەقدىرنىڭ شۇنداق بولۇر» ناملىق كىتابىمدا تەپسىلىي توختالدىم، پايدىنىلىسا بولىدۇ.

ئەمدى كونكرېت كېسەللىكلەرگە كەلسەك، ئامبولاتورىيە ۋە ياتاق شارائىتىدىكى بىمارلارغىلا پەرھىز بۇيرۇپ قالماستىن، ساق كۆرۈنگەن بارلىق كىشىلەرگە ۋە ئۆيىدە ئارام ئېلىۋاتقان بىمارلارغىمۇ ئالاھىدە تېببىي كۆرسەتمە ۋە ئاگاھلاندۇرۇشلار بېرىلىشى لازىم. پەرھىز بۇيرۇش قانداقتۇ ھەرقانداق نەرسىنى چەكلەش بولماستىن، بەلكى شۇ كىشىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا يارىشا تەرتىپ بېكىتىشتىن ئىبارەت. پەرھىز يەنە ئومۇملۇق نۇقتىسىدىنمۇ بېرىلىدۇ، مەسىلەن، قۇرغاق يەرلەر كىشىلىرىگە ئومۇميۈزلۈك لازا چەكلىنىدۇ، سوغۇق يەرلەر كىشىلىرىگە گاڭ - پەن، شوخلا، ئاچچىقسۇ قاتارلىقلار بېرىلمەيدۇ ۋاھاكازا. بۇلارنى بەلگىلەشتە تېۋىپ بولغان كىشى يالغۇز دوختۇر بولۇپلا قالماي بەلكى كېلىماتشۇناس، ئىنسانشۇناس ۋە ئوزۇقشۇناس بولۇشلىرى لازىم.

پەرھىز بۇيرۇشنىڭ ئۇسۇللىرى بىر قەدەر مۇرەككەپ بولۇپ، بۇ كىتابىمدا پەقەت ماۋزۇ خاراكتېرىدىكى ئۇقۇملارنى كۆرسىتىپ ئۆتۈمەن. پەرھىزلەر تۆۋەندىكى ئەھۋاللارنى ئاساس

قىلىپ بەلگىلىنىدۇ.

1. كېسەللىكنىڭ مەنبەسى
2. كېسەللىكنىڭ كونكرېت ئالامىتى
3. كېسەللىكنىڭ ئىلگىرى - كېيىنلىكى
4. بىمارنىڭ تەن ئالاھىدىلىكى
5. بىمارنىڭ روھىي ھالىتى ۋە دۇنيا قارىشى
6. مىللىتى
7. يۇرتى ۋە تۇرمۇش ئادەتلىرى
8. كېلىماتى
9. ئىقتىسادىي ئەھۋالى
10. سەۋىيە ۋە ساپاسى

بىز يۇقىرىقى ئەھۋاللارغا قاراپ، ئومۇمىي پەرھىزلەرنى سۆزلەش بىلەن بىرلا ۋاقىتتا شەخس پەرھىزلىرىنى جىددىي تەلەپپۇزدا بۇيرۇيمىز. بولۇپمۇ تۇرمۇش ئادەتلىرى ۋە كېسەللىك مەنبەسىگە قاراپ بېكىتىلىدىغان پەرھىزلەرنى ئەستايىدىل چۈشەندۈرۈپ، بىمارنىڭ تېۋىپ بىلەن ماسلىشىشنى كاپالەتلەندۈردىمىز. ئۇنداق بولمايدىكەن، كېسەللىك ياخشىلانماي، بىمار ئىقتىسادىي جەھەتتىن خارابلىشىشى ۋە تېۋىپنىڭ ئەجرى زايە بولۇشى مۇمكىن. مەسىلەن، يۈرەك ۋە مېڭىنى ياخشىلايدىغان دورا ۋە مەسلىھەتلەرنى بەرسەك، بىمار ھاراق - شاراب ۋە باشقا ئەسكىلىكلەردىن قول ئۈزمەسە، بۇ ئىش ئۈچۈن كەتكەن پۇل ۋە زېھنىگە ئېچىنماي بولمايدۇ. بولۇپمۇ مەدەنىيەت تارقىتىش شەرىپىگە لايىق بولغان تېۋىپلارنىڭ ۋاقتى ۋە تىرىشچانلىقى بىر كارغا كېتىدۇ. ئۇندىن باشقا ئەسكەرتىدىغىنىم شۇكى، پەرھىز بېكىتىشكە مۇناسىۋەتلىك يۇقىرىقى ئامىللار يەككە بولماستىن، بىر - بىرىنى ئىلگىرى سۈرگەن ياكى ئارىلاشقان ھالەتتە بولغاچقا، تېۋىپ كېسەل كۆرۈشتىلا قېتىرقىنىپ قالماستىن، بەلكى

پەرھىز بۇيرۇشتىمۇ ئىنچىكىلىك بىلەن تەھلىل قىلىشلىرى لازىم. نۆۋەتتە كۈنگە 50 — 60 تىن كېسەل كۆرۈۋاتقان تېببىي خادىملارنى مېڭە ئىشلىتىپ ئەستايىدىل كېسەل كۆرىدۇ ۋە پەرھىز بۇيرۇيدۇ دەپ كىممۇ ئېيتالايدۇ؟

پەرھىز بۇيرۇش يۈكسەك بىر ئىلىم، ئۇ ئۆز نۆۋىتىدە بىر خىل مەسئۇلىيەت ۋە بۇرچ، تېۋىپ بولغان كىشى بىمارنىڭ ئىمكان قەدەر ساغلام تۇرۇشى، تولا ئاغرىپ ياكى ئاغرىتىپ ئىقتىسادىدىن ئايرىلىپ قالماسلىقى ۋە بۇلارنىڭ شاراپىتىنى پۈتۈن دىققەتنى ئېلىم ئۆگىنىشكە قارىتىش جەھەتلەردە تولىمۇ كېرەكلىك ۋە سۆيۈملۈك كىشى ھېسابلىنىدۇ. لېكىن تېۋىپلارغا شۇنداقمۇ پەرھىز بۇيرۇش كېرەككى، بىمارنىڭ كېسەللىنى زېھىن قويۇپ كۆرمىي، سايمانلارغا چۈشۈرۈپ پۇل تېپىشقا، پەرھىز بۇيرىماي ياكى خاتا بۇيرۇپ، خۇددى «ئايغى يىرتىلسا مەن ياماپ پۇل تاپسام» دېگەندەك روھىي ھالەتتە بولۇشقا قەتئىي بولمايدۇ. تارىختىن بۇيان شۇنداق بىر ھەقىقەت ھۆكۈم سۈرۈپ كەلدىكى، خەلقنى قاخشاتقان تېۋىپ ۋە دوختۇر باي بولغان ئەمەس، باي بولغانلىرىمۇ ياخشى كۈنگە قالغان ئەمەس.

ھەممە ئەل ۋە خەلقنىڭ ئىشىنىدىغان بىر قىممەت قارشى بولۇشى لازىم. ئۆزىگە خاس بولغان ئېتىقادى ۋە ئەقىدىسى بولغاندىلا ئالاھىدىلىكىنى ساقلاپ قالغىلى ۋە راۋاجلاندۇرغىلى بولىدۇ. ئۇيغۇر تېبابىتى رايونىمىز خەلقىنىڭ ئېتىقادى ۋە چۈشەنچىلىرىنىڭ يادروسى بولغاچقا، بۇ خىل روھنى تەكىتلەش كېرەككى ئۇنتۇشقا بولمايدۇ. بۇ كىتابىم مۇشۇ جەھەتتە تېگىشلىك رول ئوينىسا ئەجەب ئەمەس.

ماددىسىز ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىقى

باش قولغا ئىسسىق بىلىنىدۇ، بۇرۇن ۋە گال قۇرۇيدۇ، ئۇسسۇزلۇق ئۆتكۈر بولىدۇ، سوغۇق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندا ياكى سوغۇق ھاۋاغا ئۇچراشقاندا ئاغرىق پەسىيدۇ. ئوزۇقلىنىشى ئۈچۈن چۈجە گۆشى شورپىسىغا تازىلانغان ماش، كۆك يۇمغاقسۇت، قېتىق، غورا سۈيى قاتارلىقلارنى سېلىپ قاينىتىپ ئىستېمال قىلىش كېرەك.

ماددىسىز سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقى

باش ۋە پېشانە سوغۇق بولىدۇ، ئىسسىق ھاۋادا ياكى ئوتنىڭ ئالدىدا ئولتۇرغاندا ئاغرىق پەسىيدۇ. ۋاراڭ - چۇرۇڭدىن، كۈچلۈك نۇردىن مۇداپىئە قىلىنىدۇ. ئېغىر ئەقلىي ئەمگەكتىن ۋاقىتنىچە پەرھىز قىلىش لازىم. ئوزۇق قىلغاندا ئۇستىخان شورپىسى سېلىپ، ئازراق زەنجبىل قوشۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ. سەۋزە، بادام، تۇخۇم، گۈلقەنت قاتارلىقلار كۆپ-رەك يېگۈزۈلىدۇ. ماددە تۇلھايات بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى.

قان خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقى

باش ئېغىر بولىدۇ، پۈتۈن باش ئاغرىيدۇ، يۈزى ۋە كۆزلىرى قىزىرىپ چىقىلىدۇ. ئېغىز تەمى تاتلىق بولىدۇ. مايلىق، كۈچلۈك تاماقلاردىن ۋە ياتاردا ئېغىر تاماق، زور-لانغان غىزا يېيىشتىن ئالاھىدە پەرھىز تۇتۇلىدۇ. قېزا، قېرى قوي گۆشى ۋە شورپا ئىستېمال قىلىنمايدۇ، داۋا يېمىشكى بې-

رىلمەيدۇ. يازدا قارا كىيىم كىيىشتىن، ئاپتاپ ئۆتۈشتىن ساق-
لىنىدۇ. تۇخۇمنىڭ ئېقى، ھەر خىل سوغۇق تەبىئەتلىك ئەرەق-
لەر، خېمىرى سەندەل ئىستېمال قىلسا ۋە سوغۇق مېۋىلەر سۈيى
ئىچىلسە مۇۋاپىق كېلىدۇ.

سەپرا خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقى

چىرايى، تىلى ۋە كۆزلىرى سارغىيىدۇ. ئېغىزى ئاچچىق
بولىدۇ، گال قۇرۇيدۇ، ئۇسسايىدۇ، تومۇرى تېز سالىدۇ، سۈي-
دۈكنىڭ رەڭگى سارغۇچ بولىدۇ، ئۇيقۇسى كەلمەيدۇ. قاتتىق
غەزەپلىنىشتىن، يۈگرەشتىن، قورۇلغان تاماقلار-
دىن پەرھىز قىلىنىدۇ. قىزىل ۋە سېرىق رەڭلىك كىيىملەردىن،
كۈچلۈك نۇردىن، ئىنچىكە ۋە كۈچلۈك ئاۋازدىن ھۇداپىئە قىلى-
نىدۇ. تۇخۇم سېرىقى بېرىلمەيدۇ. كاسىن ۋە زىرىق سۈيى،
بۇلاق سۈيى، گاپلېس سۈيى مەنپەئەت قىلىدۇ.

بەلغەم خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقى

سېزىمى سۇس، بېشى ئېغىر بولىدۇ، ئېغىزدىن، بۇرۇندىن
سۇيۇقلۇق كۆپ كېلىدۇ، تومۇر ھەرىكىتى سۇس بولىدۇ، سۈي-
دۈكى ئاق، قويۇق كېلىدۇ. ئىسسىقلىق يەتكۈزسە باش ئاغرىقى
پەسىيىدۇ.

نەملىكتىن، سوغۇقتىن ئالاھىدە پەرھىز قىلىنىدۇ. لەغ-
مەن، سۇيۇقلۇق، چۆچۈرە بېرىلمەيدۇ. پايپاق ۋە ئايپىقى قۇرغاق
تۇتۇلىدۇ. بىمارنى تەنھەرىكەت قىلىشقا ئۈندەش لازىم. بەزى
ئىسسىق تەبىئەتلىك پۇراقلىق دورىلار بىلەن چۈشكۈرتۈشمۇ پايدى-
لىق. ئوكسىگېن كەم، تۇمانلىق جايلاردا تۇرۇشتىن، مونچىدا
ئۇزۇن يۈيۈنۈشتىن، ئىسپىرتلىق ۋە سوغۇق ئىچىملىكلەردىن

پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. قۇرۇق مېۋىلەر ۋە قورۇلغان تاماقلار بېرىلىدۇ.

سەۋدا خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقى

تىلى، يۈزى ۋە كۆزلىرىنىڭ رەڭگى قارىغا مايىل بولىدۇ، ئۇيقۇسى كەلمەيدۇ، تومۇرى ئىنچىكە سالىدۇ، بۇرۇن ۋە ئېغىزى قۇرۇيدۇ، مېڭىسىگە قۇرۇقلۇق يېتىدۇ، دەسلەپكى سۈيىدىكى سۇيۇق، ئاق رەڭلىك بولىدۇ، قان ۋە سەپرا خىلىتىدىن بولغان باش ئاغرىقىغا سېلىشتۇرغاندا ئاغرىق بەك قاتتىق بولمايدۇ. قورقۇنچلۇق خەۋەرلەردىن، قەرز ۋە بېسىم خاراكتېرىدىكى گەپلەردىن پىنھان تۇتۇلىدۇ. سوغۇق سۇ، دادۇر، پەتىنگان، يۇمىق سۈت بېرىلمەيدۇ. يەڭگىل شورپا، سۇدا پىشۇرغان تۇخۇم، تاتلىق ئالما، پىننە، سۈتلۈك نان، ھەسەل، سەۋزە قاتارلىقلار مەنپەئەت قىلىدۇ.

يەلدىن بولغان باش ئاغرىقى

باش ئاغرىقى بىر ئورۇندىلا بولمايدۇ، قۇلاق غوڭغۇلايدۇ، ئىسسىقلىق يەتكۈزسە باش ئاغرىقى پەسىيىدۇ. يەل پەيدا قىلغۇچى نەرسىلەردىن پىياز، دادۇر، كالا گۆشى، لازا ۋە ھاراقىلاردىن پەرھىز تۇتۇلىدۇ. مېڭە قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، باش تومۇرلىرىنى ئېچىش ئالدىن ئويلىشىلىدۇ. بىمارنى تەنھەرىكەت قىلىشقا ئۈندەش كېرەك.

سەۋدادىن بولغان ئاشقازان مەنبەلىك باش ئاغرىقى

ئاشقازاندا ئېسىلىش ۋە ئېچىش زىيادە بولىدۇ، قورساق

بەك ئاچىدۇ، ئەگەر سەۋدا ماددىسى قەي ئارقىلىق چىقىپ كەتسە،
باش ئاغرىقىمۇ پەسىيدۇ، تال چوڭىيدۇ، تال ساھەسىدە ئاغ-
رىش بولىدۇ، كۆزلىرىنىڭ رەڭگى كۆكۈشكە مايىل بولىدۇ.
كۆپ تاماق يېيىشتىن، تۇرۇپ قالغان ۋە ئېچىغان نەرسى-
لەرنى يەپ قېلىشتىن توسۇش لازىم. ھەسەل، قايماق، قىزىل
ئۈزۈم، مۇراپا ۋە گۈلنەنتىلەر مەنپەئەت قىلىدۇ. توڭلاتقۇدا
ساقلىغان نەرسىلەر، ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر ۋە كۆپ قايىند-
تىلغان چايدىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

يەلدىن بولغان ئاشقازان مەنبەلىك باش ئاغرىقى

ئاشقازان ئاغرىقى پەسەيسە، باش ئاغرىقىمۇ توختايدۇ، يەل-
لىك، قورساقنى ئېسىدىغان نەرسىلەرنى يېگەندە باش ئاغرىقى
كۈچىيىدۇ.

سېسىق پۇراقلىق، چۈچۈمەل نەرسىلەردىن ۋە ئىسپىرتلىق
ئىچىملىكلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. تەستە ھەزىم بولىدىغان يەل-
لىك تاماقلار چەكلىنىدۇ. تاماق يەپلا يېتىشقا بولمايدۇ. لازا،
دورلىق شورپا ۋە پېتىر تاماقلاردىن ۋە تۇخۇم قوشۇلغان كۈدە
قۇرۇمىسىدىن ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىنىدۇ.

يۇقىرى قان بېسىمىدىن بولغان باش ئاغرىقى

بېشى ئاغرىپ كۆزى قىزىرىدۇ، تومۇرلىرى كۆپىشىپ باش
قىسمى لوڧۇلدايدۇ، بىمار ئاسان ئاچچىقلايدۇ، يۈرىكى سالىدۇ.
ئوزۇقلىنىشى ئۈچۈن سۇيۇق - سەلەك ۋە قارا ئۆرۈك
سالغان شوۋىنگۈرۈچ بېرىش، ئات گۆشى قېزىسى ۋە بەك مايلىق
پولۇ قاتارلىق تاماقلاردىن پەرھىز قىلىشى لازىم. باشقا ھادىسى-
لەر كۆرۈلسە تېز قۇتقۇزۇش چارىسى بويىچە بىر تەرەپ
قىلىنىدۇ.

ئۇيقۇسىزلىقتىن بولغان باش ئاغرىقى

بېشى ئېغىرلىشىپ كۆز زىۋى غىۋۇلاشقاندا ك بولىدۇ، پۇت - قولدا ماغدۇر قالمايدۇ، تەپەككۇرى تۆۋەنلەيدۇ. ئاۋۋال سەۋەبى ئامىلىنى يوقىتىپ، بىمارغا يېتەرلىك دەم ئېلىش ۋە ئوزۇقلىنىش شارائىتى يارىتىلىدۇ. ئاچچىق نەرسىدە لىرىدىن، ھېرىپ - چارچاشتىن ۋە ھاۋاسى بولغانغان سورۇنلاردا ئۇزۇن ئولتۇرۇشتىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

ھاراقىتىن بولغان باش ئاغرىقى

بېشى چىڭقىلىدۇ، كۆڭلى ئايىنىدۇ، تاماق خالىمايدۇ. پولو، سۇيقاش، قايماقلىق سۈت قاتارلىقلار ھاۋا قىلىش زەھىرىنى قايتۇرىدۇ، ھاراقىنىڭ خومىرىنى ھاراق بىلەن «كېسىش» كە، چۈچۈمەل نەرسە يېيىشكە ۋە ئاچ پېتى ئۇزۇن يېتىشە قىلىدۇ، ئومۇمەن تاتلىق نەرسىلەر مەنپەئەت قىلىدۇ.

جىنسىي ئالاقىدىن بولغان باش ئاغرىقى

بېشى بوشراق ئەمما ئىزچىل ئاغرىيدۇ، ئىش خوشياقمايدۇ، ماغدۇرسىزلىنىدۇ. بەدەننىڭ ھۆللۈكىنى ئاشۇرىدىغان لەتىپ تاماقلار بېرىلىدۇ. مەسىلەن، توخۇ شورپىسى، پاقلان گۆشى، تۇخۇم سېرىقى قاتارلىقلار.

ئۇيغۇردىن بولغان باش ئاغرىقى

بېشى ئېغىر، قاپقى ئىششىغان، چىرايى تاتارغان بولىدۇ، ئىش خوشياقمايدۇ، نەپەس يېتىشمەسلىك ھېس قىلىنىدۇ. ئاچچىق ۋە چۈچۈمەل نەرسىلەر بېرىلمەيدۇ، يەڭگىل تەنھە-رىكەت قىلىنىدۇ، داۋايىمىشكى يېسە ياكى قىزىق سۇدا يۇيۇنسا بولىدۇ.

مېڭە زەئىپلىشىشتىن بولغان باش ئاغرىقى

مېڭە ئاجىزلىقى سەۋەبىدىن يۇقىرى ئاۋازنى ئاڭلىغاندا ياكى بىرەر كۈچلۈك پۇراقنى پۇرىغاندا باش ئاغرىيدۇ. ئىسپىرتلىق ئىچىملىك، تاماكا ۋە باشقا چېكىملىكلەر چەكلىنىدۇ، تۇرۇپ قالغان ۋە بەك قورۇۋېتىلگەن تاماقلار بېرىلمەيدۇ، ئارتۇقچە جىنسىي تۇرمۇش تەرتىپىگە چۈشۈرۈلىدۇ. ھەسەل، بادام ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ، تەنھەرىكەت ۋە چېنىقىش ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇلىدۇ. ئوكسىگېن شۈمۈرۈشمۇ پايدىلىق.

مېڭە سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىشتىن بولغان باش ئاغرىقى

بۇ خىلدىكى باش ئاغرىقى مېڭىنىڭ سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىشكە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ۋاللى - چۇرۇڭدىن، كۈچلۈك نۇر ۋە پۇراقتىن پەرھىز تۇتۇلىدۇ، مېڭىنى كۈچەيتكۈچى دورىلار ئىستېمال قىلدۇرۇلۇپ.

دۇ. بىمارنى پىسخىك جەھەتتىن دۇالاش، تەنھەرىكەت قىلدۇرۇش ۋە مۇۋاپىق مېغىزلىق دورىلارنى بېرىش بىلەنمۇ ساقايتقىلى بولىدۇ.

باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش — شەقىقە

قايسى خىلىت غالىب بولغان بولسا، شۇ خىلىتنىڭ ئالامەت-لىرى تېپىلىدۇ، كېسەللەنگەن تەرەپتە تارتىشىش زىيادە بولىدۇ، قۇلاق غوغۇلدايدۇ، ئىسسىق ھەم يەل پەيدا قىلىدىغان نەرسىلەرنى يېگەندە باش ئاغرىقى ئېغىرلىشىدۇ. ئالدى بىلەن ماددىنىڭ ئەسلى ھالىتىگە قاراپ پەرھىز بەلگىلىنىدۇ. شۇنداقتىمۇ كۈچلۈك ۋە مايلىق تاماقلارنى كۆپ يېيىشتىن، زورلىنىپ غىزالىنىشتىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ. كۈندە باش يۇيۇش ياكى ئۇزۇنغىچە يۇيماسلىق، ئاغرىق توختاتقۇچ دورا ئىچىش، ئوپىراتسىيە قىلىشقا ئالدىراش مەنىى قىلىنىدۇ.

ئىسسىقلىقتىن بولغان مېڭە پەردە ياللۇغى

قان خىلىتىدىن بولغان مېڭە پەردە ياللۇغى (سەرسام) دائىم قىزىتما بولۇش، باشتا ئېغىر بولۇش، يۈزى، تىلى ۋە كۆزلىرى قىزىل بولۇش، كۆزىدىن ياش ئېقىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

ئاپتاپ ئۆتۈش، ئىسسىق سۇدا يۇيۇنۇش ۋە قارىمۇچ سېلىندىغان تاماق بېرىشتىن ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىنىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكتە ۋاقىتنى چېڭ تۇتۇپ داۋالىتىش، يۇقۇملىنىش ۋە قىزىتما ئۆزلەشنى توسۇدىغان نىلۇپەر، بىنەفشىگە ئوخشاش دورىلارنىڭ دەلىلمىسىنى ئىچكۈزۈش، چاچنى قىسقارتىش ۋە چۈشۈرۈۋېتىش، باشقا تۇخۇم ئېقى سۈركەش لازىم.

سوغۇقتىن بولغان مېڭە پەردە ياللۇغى

سەۋدادىن بولغان سەرسامدا قورقۇش، پەرىشان بولۇش، پۈتۈن بەدەنگە قۇرۇقلۇق يېتىش ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ، قىزىتما يەڭگىل بولىدۇ، ئەمما تۆتىنچى كۈنى قاتتىق تۇتىدۇ، تومۇرى قاتتىق، قىسقا ۋە پەرقلىق سالىدۇ.

بەلغەمدىن بولغان سەرسامدا قىزىتما يەڭگىل، ئەمما دائىملىق بولىدۇ، ئۇنۇتقاق بوپ قالىدۇ، ئېغىزىدىن شالۋاق ئاقىدۇ، تومۇرى چوڭ ۋە پەرقلىق سالىدۇ.

بۇ خىلىدا گەرچە ئۆتكۈر ئالامەتلەر يولمىسىمۇ، ئاسارىتى چوڭقۇر ۋە جاھىل بولغاچقا ئوخشاشلا داۋالاشقا سەل قارىماسلىق لازىم. بۇ جەرياندا تەستە سىڭىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ئىلمان سۇدا باشنى يۇيۇش، يەڭگىل قايىنغان شورپا بېرىش لازىم. مەخسۇس داۋالاش ئۇسۇللىرى بويىچە ياخشى داۋالاتسا سەللىمازا ساقىيىدۇ.

ئۇيقۇسىزلىق

ئۇيقۇسىزلىق ئادەتتە ئىسسىقلىق ۋە قۇرۇقلۇقتىن بولىدۇ، بەزىدە ماددىسىز سەۋەبتىن بولىدۇ، بەزىدە سەپرا ياكى سەۋدا خىلىتىنىڭ غەلبە قىلىشىدىن بولىدۇ، كۆزى، بۇرۇن ۋە تىلى قۇرغاقلىشىدۇ، قاتتىق ئۆسسايدۇ.

باشنى قاپاق يېغى ياكى گۈل يېغىدا ياغلاش لازىم. قاتتىق ئاۋاز، كۈچلۈك نۇردىن ۋە ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ئاچچىق ۋە تۈزلۈك تاماقلار بېرىلمەيدۇ. ياتاردا ئېغىر تاماق يېيىشتىن، تارىخىي تېمىدىكى كىتابلارنى ئوقۇشتىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ. ياخشى كۆرمەيدىغان ئىشلار ۋە ئادەملەر ھەققىدىكى گەپلەرنى بىلمەسكە سېلىش كېرەك.

ئۇنۇتقاقلىق

ئەگەر ئۇنۇتقاقلىق ھۆل سوغۇقلۇق تەسىرىدىن بولغان بولسا، بىمار كۆپ ئۇخلايدۇ. باشنىڭ ئارقا تەرىپىدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. ئەگەر قۇرۇق سوغۇقلۇق ئېشىپ كېتىشتىن ئۇنۇت-تاقلىق كېلىپ چىققان بولسا، ئۇيقۇسى كەلمەسلىك، گال ۋە بۇرۇن قۇرغاقلىشىش، سۆزلەش قىيىنلىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

مېڭىگە ھۆللۈك ۋە ئىسسىقلىق يەتكۈزۈش مەقسىتىدە مىك-يان توخۇ گۆشىنىڭ شورپىسى ياكى باشقا ئۇچار قوشلار گۆشىلەرنىڭ شورپىسى، باچكا گۆشى ۋە قوزا گۆشلىرىنىڭ شورپىسى بىلەن ئوزۇقلاندۇرىدۇ. كالا يىلىكى، تاتلىق بادام يېغى، بابۇنە ياغلىرى، كالا - پاقالچاق شورپىلىرى، بابۇنە قايناتمىسى، زىر-غىر، بىنەپشە شىرىسى قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئارقا مېڭە تەرەپكە تېڭىلىدۇ ۋە ياكى ياغلىنىدۇ.

خىيال سۈرۈش كۈچى بۇزۇلۇش

ئارتۇقچە ۋە ئورۇنسز خىياللاردا بولىدۇ، ئەمما ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلالمايدۇ. گۇمانى كۈچلۈك، مېجەزى تۇراقسىز كېلىدۇ.

كېسەل ماددىسىز بولسا مىزاجى تەڭشەش ئۈچۈن ھەر كۈنى ناشتىدا بىنەپشە شەربىتى، نېلۇپەر شەربىتى، گۈلاب، ئەرقى بېدىمىشكى سوغۇق سۇ بىلەن قۇشۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ، مۇناسىدە ۋەتلىك ياغلار بىلەن ئالدى مېڭە ئۇدۇل تەرىپى ياغلىنىدۇ. شەخەك قويۇش، قەي قىلدۇرۇش كېرەك، جىنسىي ئالاقىنى كۆپ قىلىش، كۆپ غەم قىلىش، ئىچ پۇشۇقى ۋە ئاچچىقلىقنىشلاردىن ساقلىنىش، سوغۇق سۇنى كۆپ ئىچىش، سامساق،

پىياز، كۈدە، ئالما، يۇمغاقسۈتلەرگە ئوخشاش مەخسۇس ئۇنۇتە-
قاقلق پەيدا قىلىش تەسىرى بار نەرسىلەرنى كۆپ يېيىشتىن
ئېھتىيات قىلىش لازىم.

قاندىن بولغان مالىخۇلىيا

بىمار ھەيرانلىق، پەرىشانلىق ئىچىدە تۇرىدۇ. ھەربىر نەرسىدىن قورقىدۇ. خىيال پائالىيىتى بۇزۇلىدۇ. بەزىدە ئاجىز ۋە ھاجەتمەنلىكتىن بىئارام بولىدۇ. بەزىدە زەھەرلىك نەرسىلەرنى يەپ ئۆلۈپ قېلىشتىن قۇرقۇپ، تاماق يېمەيدۇ، سۇ ئىچمەيدۇ. كۆزى قىزىرىپ قالىدۇ. تومۇرى چوڭ سالىدۇ. يولۇ، مايلىق شورپا ۋە ئات گۆشىدىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. قان بېسىمىنى ئۆرلىتىدىغان دورا ۋە شەربەتلەر ئىستېمال قىلدۇرۇلمايدۇ، ھاۋاسى سالقىن ۋە قۇرغاق جايلاردا بىر مەزگىل ئارام ئالدۇرۇلىدۇ، كۆك رەڭلىك كىيىملەر كىيگۈزۈلىدۇ.

سەپرادىن بولغان مالىخۇلىيا

بىمارنىڭ كۆزلىرى سېرىق، تومۇرى تېز سالىدۇ. ھەمىشە غەزەپلەنگەن ھالەتتە بولىدۇ. تۇخۇم سېرىقى، يولۇ، قېز، سېرىق ماي، ياڭاق قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلار بېرىلمەيدۇ، سۇلۇق ۋە ھاۋالىق جايلاردا كۈتۈلىدۇ.

سەۋدادىن بولغان مالىخۇلىيا

كۆزنىڭ رەڭگى قارا، سۈيدۈك رەڭگى قارا بولىدۇ. تومۇرى قاتتىق سالىدۇ. بىمار دائىم قورقۇپ، جۆيلۈپ تۇرىدۇ. دائىم

بۇزۇق ئوي خياللاردا بولىدۇ. بەزىدە يىغلايدۇ ۋە قاتتىق ۋارقىد-
رايدۇ.

دادۇر، ئاچچىقسۇ، كۈدە، سامساق، كالا گۆشى ۋە گاڭپەندىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ئاچچىق نەرسىلەر ۋە مەس قىلغۇچى ئىچىملىك ۋە دورىلار بېرىلمەيدۇ، دائىم خوشھال تۇتۇش، قايغۇ-لۇق خەۋەر ۋە كۈچلۈك نۇرلاردىن يىراق تۇتۇش لازىم.

قاندىن بولغان قارا بېسىش

ئەگەر قان خىلىتى غالىب بولغان بولسا، چىرايى، تىلى، كۆزلىرىدە قىزىللىق بولىدۇ. بىمار قىزىل رەڭلىك نەرسىلەرنى خىيال قىلىدۇ. قان خىلىتىغا خاس ئالامەتلەر بولىدۇ. ئىچى سۈرگۈزۈلىدۇ، مېڭىسى تازىلىنىدۇ. ئاچچىق ۋە مايىلىق تاماقلار چەكلىنىدۇ، بىرلا ۋاقىتتا كۆپ تاماق بېرىلمەيدۇ، سۈيۈك - سەلەك ۋە چۈچۈمەل غىزالار ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ.

بەلغەم ۋە سەۋدادىن بولغان قارا بېسىش

قارا بېسىش بىلەن بىرگە بەلغەم ۋە سەۋدانىڭ خاس ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

ھۆل ئىسسىق تاماقلاردىن پۇلۇ، سەۋزە شورپىسى، ئۇستىدخان شورپىسى ۋە نارىن بېرىلىدۇ، ھەسەل، بادام ۋە تاتلىق ئانار يېگۈزۈلىدۇ. يېشىل ۋە سوغۇق تەبىئەتلىك كۆكتاتلار ۋە گاڭپەن، شىفەن ئىچكۈزۈلمەيدۇ.

مېڭە مەنبەلىك سەرئى

باش ۋە تىلدا ئېغىرلىق بولىدۇ. قورساق ئاچقان ۋاقتىدا باش قايدۇ، كۆزلىرى قاراڭغۇلىشىدۇ. كېسەلنىڭ تۇتۇشى يوق. قالغاندىن كېيىنمۇ باش قېيىش ۋە ئەقلىي ئىقتىدارى توسقۇنلۇققا ئۇچراشنىڭ شىكايىتى بولىدۇ. مېڭە تومۇرلىرىنى ئاچىدىغان دورا ۋە تاماقلار بېرىلىدۇ، ئوبدان ئارام ئالدىرۇپ، ئۇخلىتىلىدۇ. جىددىيلىكتىن، يامان خەۋەرلەردىن ۋە ئۆزىنى خارلاش خاراكتېرىدىكى ئەمگەكلەردىن توسۇلىدۇ.

بەلغەمدىن بولغان سەرئى

ئەگەر بەلغەم ماددىسىدىن بولغان بولسا بەدەن بوش، رەڭگى ئاق بولىدۇ. كېسەل تۇتقان ۋاقىتتا ئېغىزدىن كۆپ مىقداردا كۆپۈك كېلىدۇ.

مېڭىنى قىزىتىدىغان ۋە قان ئايلىنىشىنى ياخشىلايدىغان دورا ۋە تاماقلار بېرىلىدۇ، دائىم يەڭگىل تەنھەرىكەت قىلىشقا ئورۇندلاشتۇرۇلىدۇ. باشنى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇش، پۇتىنى ئۇۋۇ-لاشقا بۇيرۇلىدۇ، گۇمانخورلۇق، تېرىككەكلىك ۋە ئۈمىدسىزلىكتىن قاتتىق پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ.

سەۋدادىن بولغان سەرئى

كېسەل تۇتۇشتىن ئىلگىرى بىماردا ۋەھىمە ۋە قورقۇش كۆرۈلىدۇ. يۈرەك تىترەش، بەدەن تىترەش ئالامىتى بولىدۇ. ئاچچىق، چۈچۈمەل ۋە قاڭغىسىق نەرسىلەردىن يىراق تۇرغۇ.

زۇلىدۇ، يېڭى بېزەلگەن ئۆيدە ياتقۇزۇشقا قەتئىي بولمايدۇ.
تاتلىق ئانار، ئالما، سەۋزە، قىزىل ئۈزۈم، ھەسەل، شورپا،
قۇشتاچ گۆشى بېرىلىدۇ، خۇشھال تۇتۇلىدۇ.

قان ۋە سەپرادىن بولغان سەرئى

كېسەل تۇتقان ۋاقىتتا بىمارنىڭ چىرايىدا قىزىللىق بولىدۇ،
بويۇن تومۇرلىرى كۆپۈشۈپ قالىدۇ، كۆپىنچە بۇرنى قانايىدۇ.

قان بېسىمى ۋە قاننىڭ قويۇقلۇقىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغان ئىسسىق تەبىئەتلىك، مايلىق تاماقلاردىن ۋە ئىسسىقلىق ئىچىملىكىدىن
لەردىن قاتتىق پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ھايۋاننىڭ ئىچكى ئەزالىدىن
رى قەتئىي بېرىلمەيدۇ. مېڭە تومۇرلىرىنى ئاچىدىغان دورا ۋە
تاماقلىرى ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. يەڭگىل سەي شورپىسى، قوناق
ئۇن تاماقللىرى بېرىلىدۇ.

سەكتە

دەسلەپتە ئەسلىي كېسەللىكتىن ئاۋۋال ئارقىمۇ ئارقا باش
ئاغرىيدۇ. باش قايىدۇ، قۇلاققا ۋاراڭ - چۇرۇڭ ئاۋازلار ئاڭلىنىدۇ.
كۆرۈش كۈچىدە پەرق بولىدۇ، بۇرنى قانايىدۇ، كۆڭلى
ئېلىشىدۇ، مېخەزى چېچىلاڭغۇ بولۇپ قالىدۇ، ئەستە تۇتۇش
كۈچى بۇزۇلىدۇ. بىمار خاتا، مۇجەمل سۆزلەرنى قىلىدۇ. بەزىدە
دە لەقۋا بولۇپ قالىدۇ.

جىددىي يۆتكەشتىن ساقلىنىش لازىم. ئۆيدە ئىپار ياكى
مەنبەر بولسا ئازراق پۇرتىتىش، جىددىي دوختۇر چاقىرىش كېرەك.

قاندىن بولغان باش قېيىش

بېشى ئېغىر بولۇپ، كۆزى قىزىرىدۇ. ھەرىكەت قىلغاندا بېشى قايدۇ، ئېغىرلىرىدا مېڭىش قىيىنلىشىدۇ. توخۇ ياكى پاقلان گۆشىنى قېتىق ياكى غورا سۈيى ۋە ياكى ئانار سۈيى قوشۇپ ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. يۇمىلاقسۇت سالغان شويلا مېڭىدىكى بۇخاراتلارنى يوقىتىشقا كۆپ مەنپەئەتى بار. ئىسسىقلىق دورا ۋە تاماقلارنى ئىستېمال قىلماسلىق، ئاپ-ئوتقا ئوخشاش ئىسسىق مۇھىتلارنىڭ تەسىرىدىن ساقلىنىش لازىم.

سەپرادىن بولغان باش قېيىش

يەڭگىل دەرىجىدە باش قايدۇ ھەم ئاغرىدۇ ئېغىزى ئاچچىق بولىدۇ. مىجەزى چۈسلىشىپ كېتىدۇ. توخۇ شورپىسىغا قېتىق ياكى زىرىخ سۈيى ۋە ياكى ئاچچىق ئانار سۈيى قاتارلىقلارنى قوشۇپ ئىچسە بولىدۇ. بىنەپشە، ئاق سەندەللەرنى پۇرسىمۇ بولىدۇ.

بەلغەمدىن بولغان باش قېيىش

باش ئېغىر بولىدۇ، لېكىن لوقۇلداپ ئاغرىيدۇ. روشەن قېيىش سېزىمى بولىدۇ، تۇيغۇ كۈچى تۆۋەنلەيدۇ، روھى چۈشكۈن بولىدۇ. نۇقۇت، پۇرچاق شورپىسىغا دارچىن، زەنجۋىل، يۇمىلاق-سۈت، زىرە سېلىپ ئىچسە، ئىپار، ئەنەب، نەغەز گۈلى پۇرسا بولىدۇ. سوغۇقلىق يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلماسلىق لازىم.

سەۋادىن بولغان باش قېيىش

باش بەك قېيىپ كەتمەيدۇ، ئاغرىشىمۇ ئېغىر بولمايدۇ،
لېكىن تەپەككۇرى سۇس، ئاچچىقى يامان بوپ قالدۇ، پۇت -
قولى قولاشمايدۇ.

دەسلەپتە جىددىي ئىسسىقلىق قىلىشقا بولمايدۇ، ئاچچىق
نەرسىلەردىن ۋە كۈچلۈك ھاراقىلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ.
تۇخۇم ئېقىدا يۇغۇرۇپ ئېتىلگەن سۇيۇقئاش، يەڭگىل شورپا ۋە
ياخشى ھەسەل بېرىلسە بولىدۇ. ئىچىنى يۇمشاتقۇچى دورىلار
ئىچكۈزۈلسە مۇۋاپىق. لېكىن سۈرگە بېرىشكە بولمايدۇ.

سوغۇق يەل ۋە بۇسلاردىن بولغان باش قېيىش

ناچار ھاۋا ۋە چاڭ - توزانلىق مۇھىتتا باش قېيىش ۋە
ئاغرىش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ، كۆرۈش كۈچى ۋە ئاڭلاش ئىقتىدا -
رىمۇ ۋاقىتنىچە توسالغۇغا ئۇچرايدۇ. تەپەككۇرى سۇسلايدۇ.
كاۋاپ ۋە ئىسسىقلىق دورىلار قوشۇلغان نۇقۇت سۈيى ئىس -
تىمال قىلسا بولىدۇ.

ئاپتاپ ئۆتۈشتىن بولغان باش قېيىش

پۈتۈن بەدەن ھالسىزلىنىدۇ، بېشى ئېغىر بولىدۇ، كۆڭلى
ئېلىشىدۇ، بېشى قېيىپ، كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىدۇ. ئېغىر
بولغاندا ئىچكى ئەزالىرىغا قان يېتىشمەسلىكتىن شوك بولۇپ
قالدۇ.

ئەگەر كېسەل ماددىسى پۈتۈن بەدەندە بولسا ئۇنى تازىلاش
بىلەن بىللە گۈل يېغى بىلەن سىركىنى ئارىلاشتۇرۇپ باشنى
ياغلاش كېرەك. بىنەفسە، بادام ياغلىرىنى بۇرۇنغا تېمىتىش،

كېپەك شىرىسى ۋە ئازراق كۆك يۇمغاقسۈتكە قەنت قۇشۇپ داۋاملىق ئىچسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

ئەسەب (نېرۋا) ئاجىزلىقى

نېرۋىسى بارا - بارا ئاجىزلايدۇ، ئۇنۇتقاق، تېرىككەك بو-
لۇپ قالىدۇ، ھەرقانداق گەپ - سۆز ۋە ئىشلارنى ئىنچىكە ئويلاپ
كېتىدۇ، تەھلىل قىلىش كۈچى ئېشىپ، بارغانسېرى ئەقىللىق
بولۇپ قالغاندەك ھېس قىلىدۇ. كۈچلۈك تاماقلارنى ھەزىم قى-
لالمايدۇ ياكى كۆڭلى تارتمايدۇ، يالغۇزلۇقنى خالايدۇ، كۈچلۈك
ئاۋاز ۋە نۇرلاردىن قاچىدۇ. جىنسىي ئىقتىدار چېكىنىدۇ.
تامىقى ئۈچۈن ئاسان سىڭىدىغان تاماقلار بېرىلىدۇ. توخۇ
گۆشى، قۇشقاچ گۆشى، كەكلىك، پاقلان گۆشلىرىنى كاۋاپ
قىلىپ بېرىش، قېمىز، سۈت، تۇخۇم، شېكەر، مائۇل ھەسەل
قاتارلىقلارنى ئەھۋالىغا قاراپ ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك.
تۇخۇم ۋە بادام ھالۋىسىمۇ مەنپەئەتلىك.

ھېستىرىيە

بىمارلارنىڭ كەيپىياتى تۇراقسىز بولۇپ، گاھ كۈلۈپ، گاھ
يىغلايدۇ، ئۇزۇن ۋاقىت ھىجران ئازابى ۋە يالغۇزلۇق تارتقانلىق
تارىخى بولىدۇ. ھەيزى قالايمىقانلىشىدۇ، چىرايى خۇنۇك ۋە
دۇغلاق كۆرۈنىدۇ، بەزىدە ھۇجۇم خاراكتېرىدىكى ھەرىكەتلەرنى
قىلىدۇ.

بىمارلارنىڭ تامىقىغا ماددا ئېتىبارى بىلەن قاراپ مۇۋاپىق
تاماملارنى بېرىش لازىم. مەسىلەن، مىزاجى ئىسسىقلىق تەرەپتە
بولسا قاپاق لېشى، پالەك شورپىسى، ماش سېلىنغان شوۋىنگۈرۈچ
بېرىلسە مۇۋاپىق. ئەگەر سوغۇقلۇق غالىپ بولسا كەكلىك،

پاختەك، قۇشقاچ، قىرغاۋۇل گۆشلىرىگە (شورپىسىغا) دارچىن سېلىپ بېرىلىدۇ. يۇقىرىقى نەرسىلەر تېپىلمىسا، كەپتەر، توخۇ گۆشلىرىمۇ بولىدۇ. ئۆچكە، قوي، كالا گۆشلىرىدىن بىر مەزە گىل پەرھىز قىلىش لازىم.

قاش ئۈستى نېرۋىلىرىنىڭ ئاغرىشى

باش ۋە كۆز ئەتراپلىرىدىن باشلاپ پېشانىنىڭ يان تەرەپىگە چە بولغان ئارىلىق بىر خىل ئاغرىدۇ. بەزىدە بەكرەك تۇتىدۇ. خۇشال بولغان ياكى ياخشى ئارام ئالغان كۈنلىرى پەسىيىپ قالغاندەك بولىدۇ، ئۇۋۇشلاش ئانچە كار قىلمايدۇ. ئوزۇقلىنىشتا سىركە ۋە شېكەر قوشقان غىزالارنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش لازىم. ئارپا يۇمىدىنى پايدا قىلىدۇ.

لەقۋا ئىستىرخائى

(بوشىشىپ كېتىش خاراكتېرلىك لەقۋا)

تاماكلاردىن ئۆزى يۇمشاق، ئاسان سىڭىدىغان ھۆل - قۇرۇقلۇقتا مۆتىدىل تاماقلارنى بېرىش كېرەك. مەسىلەن: مۇدەك كىن بولسا زەيتۇن يېغى ياكى كۈنجۈت يېغى قۇيۇلغان نوقۇت سۈيى بېرىلىدۇ.

سۇدىن ساقلىنىش، ھۆللۈكنى قىزىتىدىغان نەرسىلەر مەسىلەن: ئۈزۈم شىرنىسى، كەپتەر باچكىسى قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم. ئەمما ھەسەل سۈيى ئىچسە زىيىنى يوق. بۇنى بىر كۈندىن تۆت كۈنگىچە ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. كېسەل دەسلەپ باشلانغاندا ئۆتكۈر، تېز دورىلار ئىشلىتىلسە ماددىنىڭ يۇمشاقلىرىنى تارقىتىپ قالغانلىرىنى تېخىمۇ قويۇقلاشتۇرۇپ كېسەل داۋالاشنى تەسلىشتۈرۈپ قويىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ماددا

كېسەل جايغا يىغىلىپ ئورۇنلىشىپ بولغىچە تاقەت قىلىش كېرەك. شۇندلا ماددا توپلىنىۋالمايدۇ ۋە قۇۋۋەتمۇ ئۆز جايىدا بولىدۇ.

پالەچ

كېسەللەنگەن تەرەپ پالەچلىنىپ سېزىم ۋە ھەرىكەت يوقىلىدۇ، ھەزىم بۇزۇلىدۇ، قەۋزىيەت بولىدۇ، بىمار ئولتۇرۇپ - قوپۇش، ئۆرۈلۈشكە ئوخشاش ھەرىكەتلەرنى قىلالمايدۇ. بۇ كېسەللىكتە قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش ناھايىتى مۇھىم بولۇپ، بىمارنى نەم ئۆيدە ئۇزۇن مۇددەت ياتقۇزۇش، سۇيۇق ھەم قۇۋۋەتسىز تاماقنى ئۇزۇن مەزگىل ئىچكۈزۈشتىن پەرھىز قىلىنىدۇ. بىمارغا قۇۋۋەتلىك تاماقلار بېرىلىش بىلەن بىرگە ئۇششاق تومۇرلارنى ئاچقۇچى غىزايى داۋا ياكى دورىلار ئىستېمال قىلدۇلىدۇ. ئاچچىق، چۈچۈمەل نەرسىلەر چەكلىنىدۇ، يىپەك كىيىملەر كىيگۈزۈلمەيدۇ، شارائىتى يارلار يېزىلاردا ھاۋالانغاچ داۋالانسا بولىدۇ.

پالەچ ۋە ئىستىرخا

بىرەر ئەزا ياكى بەدەننىڭ بىر قىسمىنىڭ سەزگۈ ھەرىكىتى يوقالغانلىقى سەۋەبىدىن تۇرمۇش پائالىيىتى ئۆزىنىڭ ئىرادىسىگە باقمايدىغان بولۇپ قالىدۇ. بولۇپمۇ بەلغەم خىلىتىنىڭ ئېشىپ كېتىشى نەتىجىسىدە پۈتۈن بەدەن بوشىشىپ سېزىمىسىزلىنىپ بارىدۇ.

مەزىزلىك، يۇمشاق، كېسەلگە مۇناسىپ كېلىدىغان ۋە ياقدىغان تاماقلارنى بېرىش لازىم. ھەسەل سۈيى بىلەن نان يېسە بولىدۇ. بىمارنىڭ قۇۋۋىتى ئاجىز بولسا، قۇشقاچ، بېغىرتاق،

كەكلىك، توخۇ چۈجىسى، قىرغاۋۇللارنى كاۋاپ قىلىپ يېسە بولىدۇ. ئەمما ھاراق، شاراپ ئىچىش قاتتىق زىيانلىق بۇ، مېڭىگە كېسەللىك ماددىسى چۈشۈرىدۇ. ئاشقازاندا ئېچىپ كىسەلاتاغا ئايلىنىدۇ. بۇ ھەممىدىن زىيانلىق، دەسلەپتە مۇمكىنقەدەر تاماقنى ئاز ئىستېمال قىلىش، زىرە، دارچىنلاردىن تەييارلانغان گۆش سۈيىنى بېرىش لازىم.

ئەگەر بەدەندە ھارارەت بولسا زىرباج (بىرخىل قورسا شور-پا) دىن ياخشىسى يوق. چۈنكى زىرباج ھەم ھارارەتنى پەسەيتىدۇ ھەم بەلغەمنى يوق قىلىدۇ. قۇرۇلغان توشقان مېڭىسى پالەچكە مەنپەئەتلىك. چىلغۇزەنى ھەسەل بىلەن يېسىمۇ مەنپەئەتلىك. ئەسەب نېرۋىلارنى تازىلىغۇچى كومۇلاچ دورا ھەببى مۇنەققى ئەد-ساب بېرىلىدۇ.

تەسىرى ياخشى ھەم تېز. ماددا تازىلانغاندىن كېيىن باش ساھەسى ۋە ئومۇرتقا ئىككى يېنىغا ئوت لوڭقىسى قويسا بولىدۇ. قۇرۇق ھامامدا ئولتۇرۇش، قىزىق قۇمغا كۈمۈلۈش، گۈڭ-گۈرتلۈك ئارشاڭ ۋە گۈڭگۈرتلۈك ۋانىغا چۈشۈش، تەنھەرىكەت قىلىش، قورساقنى ئاچ قويۇش، يۇقىرى ئاۋازدا ناخشا ئېيتىش، يۇقىرى ئاۋاز بىلەن بىر نەرسە ئوقۇش، ئاچچىقسۇ، قىچىلار بىلەن ئېغىزنى غەر - غەر قىلىشلارنىڭ ھەممىسى مەنپەئەتلىك. دېڭىز سۈيى، گۈڭگۈرتلۈك ئارشاڭ سۇلىرىدىن باشقا ھېچقانداق ئىسسىق سۇنى پالەچنىڭ بەدىنىگە تەڭگۈزمەسلىك كېرەك، چۈنكى تاتلىق سۇ قىزىسا ماددىنى ئەزالارغا تېخىمۇ كۆپرەك تارقىتىدۇ، پەيلەرنى بوشىتىدۇ. سوغۇق سۇ كۆپىنچە ھاللاردا ئەزالارنىڭ بوشاشقان ھالىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ. ئەسەب نېرۋىلار ئۈزۈلگەندىن بولغان پالەچكە داۋا يوق.

بەل تۈۋى پالەچلىنىش

بۇ كېسەل ئاستا - ئاستا پەيدا بولىدۇ. ئاۋۋال دۈمبە ۋە بەل قىسمىدا ئاغرىش پەيدا بولىدۇ. تۆۋەنكى مۇچە ئاجزلىشىپ ماغدۇرسىزلىنىدۇ. بىمار دەلدەڭشىپ ماڭىدۇ، كېيىن تۆۋەنكى بەدەن (بەلنىڭ ئاستى) جانسىزلىنىدۇ، چوڭ تەرەت ئىختىيار-سىز چىقىپ كېتىدۇ. ئەگەر دوۋساق ئاجزلاشقان بولسا، سۈي-دۈك تۇتالمايدۇ. بىمار ئۇزۇن مۇددەت ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قېلىشتىن بەل قاتارلىق ئورۇنلاردا ياتاق يارىسى پەيدا بولىدۇ. يەڭگىل، كۈچلۈك تاماقلاردىن ئۇستىخان شورپىسى، مې-غىزلار ھالۋىسى، نارىن چۆپ بېرىلىدۇ، تاتلىق ئانار ۋە باداممۇ پايدىلىق. ئاچچىق ۋە چۈچۈمەل نەرسىلەر ۋە قۇتلىق ئىچىملىك-لەردىن چەكلىنىدۇ. ئومۇرتقا ۋە تاپانلىرى ئۇۋۇۋۇلىنىدۇ.

تېرەشلىك پالەچ

بۇ كېسەل ئاستا - ئاستا باشلىنىدۇ. ئاۋۋال بىمار ھارغىن-لىق ھېس قىلىدۇ، كېيىن بىر پۇتىدا ماغدۇرسىزلىقنى ھېس قىلىپ ئاغرىش باشلىنىدۇ. كېيىن تېرەش باشلىنىپ تەدرىجىي كۈچىيىدۇ. بۇ بەزىدە ئۇخلىغان ۋاقىتلاردىمۇ پەيدا بولىدۇ. بىمارنىڭ ئۆرە تۇرۇش، مېڭىش، ئايلىنىش مۇمكىن بولمايدۇ. ئالدى بىلەن يەرلىك ئورۇنغا تۇز سۈيى بىلەن ئىسسىق ئۆتكۈزۈش، قىزىل قىچىدا مەلھەم ياساپ تېڭىش، كاۋاۋىچىن، قەلەمپۇر يېغى سۈركەش، گۈل يېغى بىلەن سىركىنى قىزىتىپ ياغلاش، سوغۇق سۇ ۋە سوغۇق تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم. گۈلقەنت ياكى مەستىكى ئارىلاشتۇرۇلغان مائۇل ئۇسۇل شەربىتى بېرىلىدۇ. ئايارەج لوغانزىيا ئوبدان پايدا قىلىدۇ. ئۇ-

نىڭدىن باشقا لەقۋانىڭ ۋە پالەچىنىڭ دورىلىرىنى بېرىش كېرەك.

بالىلار پارالىچى

بالىنىڭ مەلۇم ئەزالىرى سېزىمىنى ئاستا - ئاستا يوقىتىشى ۋە ھەرىكىتىنىڭ ئاجىزلىشىپ قېلىشى بىلەن ئىپادىلىنىدىغان بۇ كېسەللىكتە، بىمارنىڭ گەپ سۆزى غەيرىلىك ۋە روھىي ھالىتىدە چۈشكۈنلۈك ئەھۋاللىرى بايقىلىدۇ.

دەسلەپتە ئىسسىتمىنى ياندۇرۇشقا تىرىشىش لازىم. ئىسسىتمىسى يېنىپ بولغاندىن كېيىن يۇقىرىدىكى پالەچ قىسمىدا يېزىلغان دورىلار بېرىلىدۇ. ياتقۇزۇپ دەم ئالدۇرۇپ ئاسان سىڭىدىغان تاماقلارنى بېرىش، بەدەننى بولۇپمۇ ئاغرىق تەرەپنى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇش، چوڭ تەرەتنى بوشتىشقا تىرىشىش كېرەك.

لەقۋا

ئاستىنقى كالپۇكىنىڭ بىر تەرىپى ساڭگىلاپ قالىدۇ، ئېغىزدىن شۆلگەي ئاقىدۇ. كېسەللەنگەن تەرەپ يۈزى ساق تەرەپكە تارتىپ قالىدۇ، يەنى يۈزىنىڭ بىر تەرىپى تارتىشقان بولىدۇ، يەنە بىر تەرىپى ساق بولىدۇ. بىمار تۈكۈرەلمەيدۇ، پۇۋ دېيەلمەيدۇ. سۇ ئىچسە، سىرتقا ئېقىپ كېتىدۇ. بەزى ھەرپلەرنى يەنى «ب، پ، ف» ھەرپلەرنى توغرا تەلەپپۇز قىلالايدۇ. كېسەللەنگەن تەرەپتىكى كۆزى ئوچۇق، ياش ئېقىپ تۇرىدۇ.

قان قويۇقلاتقۇچى مايلىق ۋە ئىسسىق تاماقلارنى ئۇزۇن مۇددەت بېرىشكە بولمايدۇ. مېڭىنى تازىلىغۇچى دورا ۋە يېمەك - ئىچمەكلەر ئالدىن ئويلىنىلىدۇ، بۆرەك ساھەسى ئىسسىق

تۇتۇلدۇ. ئاچچىق ۋە چۈچۈمەل نەرسىلەر بېرىلمەيدۇ. شورپىغا زەنجىبىل سېلىپ بېرىلسە بولىدۇ.

مېڭە قاناش

باش ئاغرىش، كۆز قىزىرىش، بۇرۇن قاناش، پۇت - قول تىترەش، گەپ - سۆزى قولاشماسلىق، كۆڭلى ئاينىش، يۈرەك ساھەسى سىقىلىش قاتارلىق ئالامەتلەر ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئىپادىلىنىدۇ. ئېغىر بولغاندا مېڭىگە قان چۈشۈپ گەپتىن قالدۇ ۋە ماڭالمايدۇ. ۋاقتىدا قۇتقۇزۇلمىسا ئۆلۈپ كېتىدۇ. بىمارنى ئىمكان قەدەر مىدىرلاتماسلىق، بېشىنى تۈز قىلىپ تىنچ ياتقۇزۇپ قويۇش، قول - پۇتلىرىنى ھەرىكەتلەندۈر - مەسلىك، بەك خارقىراپ قالسا تىلىنى تارتىپ ئالدىغا چىقىرىپ قويۇش لازىم. بولمىسا تىلى گېلىغا كەپلىشىپ قېلىپ دەم ئالالا - ماي قالىدۇ. كېسەل ھوشىغا كەلگەندىن كېيىن بىئارام بولسا تىنچلاندۇرغۇچى دورىلاردىن خېمىرى گاۋزەبان ئەمىرى، شەربە - تى خەشخاش بېرىش، ھەسەل سۈيى ئىچكۈزۈش لازىم. شارائىت يار بەرسە تومۇردىن قان ئېلىش پايدىلىق. لېكىن پالەچنى داۋالا - يىمىز دەپ ئىسسىقلىق دورىلارنى قىلىش خەتەرلىك، چۈنكى قان بېسىمى كۆتۈرۈلۈپ كېسەللىك ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ. جىددىي قۇتقۇزۇش تەدبىرلىرىنى قوللىنىشتا غەرب تېبابىتىنىڭ داۋالاش تەدبىرلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ قوللىنىش، ئۇلار بىلەن ھەمكارلى - شىپ تېز قۇتقۇزۇش چارىلىرىنى ئويۇشتۇرۇش لازىم.

تەشەنۈچ - تارتىشىش

تۈپۈقسىز يەڭگىل ھوشسىزلىنىش بولۇپ، يۈز، قول - پۇت ۋە بەدەننىڭ باشقا ئورۇنلىرىدىكى مۇسكۇللار يىغىلىپ تارتىدۇ.

شېپ قالدۇ. كۆزلىرى بوشىشىپ ئۈستىگە تارتىشىپ قالدۇ. يۈزىدە ئاۋۋال قىزىللىق بولۇپ، كېيىن كۆكىرىدۇ، نەپەس قىيىنلىشىدۇ. بەزىدە ئېگەك مۇسكۇل ۋە ئەسەبلىرىدە تارتىشىش بولىدۇ. قەۋزىيەت بولۇپ سۈيدۈك توختاپ قالدۇ، بەزىدە ھېق تۇتۇش سەۋەبىدىن بىمار ئۇخلىيالمىدۇ. مېڭىگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزگۈچى قۇرۇق ئىسسىق ياكى قۇرۇق سوغۇق تەبىئىيلىك دورا ۋە يېمەكلىكلەر بېرىلمەيدۇ، ئاچ-چىق نەرسىلەردىن چەكلىنىدۇ، مەجبۇرىي سوزۇش ياكى ھەرد-كەتلىنىدۇرۇشكە بولمايدۇ. مۆتىدىل مايىلار بىلەن ئارقا مېڭىنى ۋە يەرلىك ئورۇننى مايلاپ بېرىش پايدىلىق.

قاتما

بويۇن مۇسكۇللىرىدا قاتتىقلىق سېزىلىدۇ، بولۇپمۇ ئېغىز-نى ئاچقان ۋە يۇمغان ۋاقىتتا بىلىنىدۇ. كېيىن يۈز مۇسكۇللىرى تارتىشىشقا باشلايدۇ، ئېغىزى يۇمۇلۇپ قېلىپ ئاچقىلى بولمايدۇ. چىشلىرى كىرىشىپ قالىدۇ. بىمار خۇددى كۈلۈپ تۇرغاندەك كۆرۈنىدۇ، تەدرىجىي پۈتۈن بەدەن مۇسكۇللىرى تارتىشىشقا باشلاپ، يىغىلىپ قېلىپ، ئالدىغا ياكى كەينىگە ياكى بىر يان تەرەپكە يادەك ئېگىلىپ قالىدۇ. كۆزى سىرتقا پۇلتىيىپ چىقىپ قالىدۇ، نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىدۇ، كۆپ تەرلەيدۇ، سۆزلەپ يەلمەيدۇ.

ئەگەر بىمارنىڭ ھوشى جايىدا بولۇپ، تارتىشىش ناھايىتى قاتتىق بولسا، بەك ئازابلىنىدۇ.

مېڭىگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزگۈچى تاماقلاردىن، مەس قىلغۇچى دورىلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، مەجبۇرىي تارتىش ۋە تۈزلەش مەنىسى قىلىنىدۇ. قان تازىلاش ۋە جىددىي قۇتقۇزۇش تەدبىرلىرى قوللىنىلىدۇ.

رەئىشە — تىتىرمە كېسەل

يەڭگىل خىلدىكى رەئىشە كېسەلىدە بىمار ئازراق دەلدەڭ-شىيدۇ ۋە پۇتلىرىنى سۆرەپ ماڭىدۇ، بىرەر نەرسىنى كۆتۈرسە قولى تىترەپ كېتىدۇ. ئېغىر تىپتىكى رەئىشە كېسەلىدە ئاۋۋال يۈز مۇسكۇللىرى لىكىلدايدۇ (تىترەيدۇ)، كېيىن قول - پۇت-لىرى ئاجايىپ بىرخىل شەكىلدە ھەرىكەت قىلىدۇ، بەزى ۋاقىت-لاردا يېرىم ياكى پۈتۈن بەدەن مىدىرلاپ تۇرىدۇ، ئۇخلىغان ۋاقىتتا بۇ ھەرىكەتلەر توختايدۇ.

بارلىق ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەردىن، قويۇق غىزالاردىن چەكلىنىدۇ. مۆتىدىل ياغلار بىلەن ياغلىنىدۇ، تۇخۇم ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ.

سېزىمنى يوقىتىش

ھەر خىل سەۋەبلەردىن يەرلىك ئورۇن سېزىمنى يوقىتىدۇ.

تاماق كۆپ بېرىلمەيدۇ، پۇت - قولىنى مۇجۇش، گەنبەر پۇرىتىش ۋە بەدىنىدىن ئارتۇقچە ماددىلارنى تازىلاش ئېلىپ بېرىلدۇ.

ساراڭلىق

ئادەتتىكى نورمال كىشىلەرگە ئوخشىمايدىغان سۆز ۋە ھەردە-كەتلىرىدە بولىدۇ، زامان ۋە ماكانغا قارىماي سۆزلەيدۇ، بەزىلىرى ھۇجۇمكار كېلىدۇ، بەزىلىرى ھەددىدىن تاشقىرى جىمغۇر ۋە ئەندىشىلىك بولىدۇ.

كېسەلگە مۇناسىپ كېلىدىغان ھەر خىل سىڭىشلىق تاماقلار-

نى بېرىش، مەسىلەن: سېمىز چۈجە گۆشى بىلەن تەمرى ھىندى شىرسى (بەدىلىگە قارا ئۈرۈك ياكى ئەينۇلا شىرسى)، ئاچچىق ئانار سۈيى، غورا سۈيى قاتارلىقلارنى قوشۇپ بېرىش كېرەك. پوستى ئاققانغان ماش بىلەن تاماق قىلىپ بەرسە پايدىلىق. بىمارنىڭ بىھۇدە خىياللىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن زورلاپ ئوخلىتىش، بولۇپمۇ يېتەرلىك قان ئالغاندا ياخشى ئوزۇقلاندۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىش زۆرۈر.

بىمارنىڭ خىيال ھەم ۋەسۋەسىنى يوقىتىدىغان ئۇسۇل - چارىلارنى قوللىنىش، يۈرەكنى كۈچلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى قىلىش لازىم. ئەگەر كېسەللىك ياخشىلىنىپ يەنە قايتىلانسا داۋالاش تەدبىرلىرىنىمۇ قايتا تەكرارلاش كېرەك. داۋالاشتىكى ئومۇمىي پرىنسىپى مۇنداق بولىدۇ: بالدۇر داۋالاش، تۇرمۇش شارائىتىنى ياخشىلاش، ھاۋاسى مۆتىدىل، بېساتلىرى كۆپ بولمىغان پاكىز ئۆيگە ئورۇنلاشتۇرۇش، ئۆيىنىڭ ھاۋاسىنى ھۆلەپ تۇرۇش ھەمدە بىمارنى خۇشالاندۇرۇش، بىكار قېلىپ خىيال سۈرۈش-تىن ساقلاش، يېنىدا بىمار ياخشى كۆرىدىغان ۋە ھېقىدىغان كىشى بىللە بولۇش، ئويۇن - كۈلگە ۋە مۇزىكا بىلەن مەشغۇل قىلىش لازىم. بۇلار كېسەل ئۈچۈن ئاساسىي داۋا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۆيىنى خۇش بۇي قىلىش، ياخشى ھەزىم بولىدىغان، كۈچلۈك ھۆللىگۈچى خۇسۇسىيەتكە ئىگە ئوزۇقلۇقلار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش، بەدىنىنى سەمىرىتىش، بىمارنىڭ مىزاجىنى ئىسسىق سىستىمىدىن كۆرە كۆپرەك ھۆللىشتۈرۈش ۋە سەۋدانى پەسەيتكۈچى چارىلارنى قىلىش لازىم، جىنسىي ئالاقە قىلىش، قاتتىق تەرلەشتىن ساقلاش كېرەك. بىمارنىڭ بېشىنى ئىسسىق سۇ بىلەن پات - پات يۇيۇپ بېرىش كۆپ پايدىلىق. تۈزلۈك، تەمى ئۆتكۈر ۋە ئاچچىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش، ياغلىق ۋە تاتلىق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلدۇرۇش، ئامال قىلىپ كېسەلنى ئوخلىتىش لازىم. مېڭىنى ھۆللىشتۈرۈپ ئۇيقۇ كەلتۈرۈش.

رۈش ئۈچۈن قاپاق يېغى ۋە قارا سونا يېغى بىلەن باشنى
ياغلاش لازىم.

سەرسام

داۋاملىق قىزىدۇ، باش ئېغىرلىشىدۇ ۋە قايدۇ، قاتتىق
ئاغرىيدۇ. بىمارنىڭ كۆزى بەك قىزىل بولۇپ كۈلۈپ تۇرۇپ
جۆيلۈيدۇ، كۆزىدىن ياش ئاقىدۇ، نەپەس تېز ۋە خارقىراپ
چىقىدۇ، ھۇشىدىن كېتىدۇ، بەزىدە بۇرىندىن قان چىقىدۇ،
سۈيدۈكى قىزىل بولىدۇ.

قان ئېلىش، ئىچىنى بوشىتىش ئىشلىرىغا سەل قارىماس-
لىق، شۇنىڭدەك قاننىمۇ ئارتۇق ئالماسلىق كېرەك. بولۇپمۇ
بىمارنىڭ ئوزۇقلىنىش ئەھۋالىغا ئوبدان دىققەت قىلىش لازىم.
ئارپا سۈيگە گۈل يېغى ياكى سۇ ۋە زەيتۇن ياغلىرىنى قوشۇپ
ئاچىز ھۆقنە دورىلىرى بىلەن ھۆقنە قىلىش توغرا تەدبىرلەر
بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

سەپرادىن بولغان سەرسام

قىزىتمىسى يۇقىرى، بېشى يېنىك، ئەس - ھۇشى جايدا
ئويۇسىز، بۇرۇن تۆشۈكلىرى قۇرۇق، يۈزى ۋە تىلى سېرىق
بولىدۇ. تومۇرى تېز سالىدۇ. كۆپ جۆيلۈيدۇ. ئاسان ئاچچىقلى-
نىدۇ، ئۆزى ئالاقىزادە، كۆپ بىئارام بولىدۇ.
تەمرى ھىندى، چىلان، ئەينۇلا، قارا ئۆرۈك، سەرىستان،
تەرەنجىبىنلەرنى سۇغا چىلاپ شىرىسىنى ئىچكۈزۈش ئارقىلىق
ئىچىنى يۇمشىتىش كېرەك. بۇ جەھەتتە ئىچىنى يۇمشاتقۇچى
ھەمەلچىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ. ھارارەتنى سوۋۇتۇش، بەدەننى
ھۆللەشتۈرۈشكە تىرىشىش، بۇنىڭ ئۈچۈن تاتلىق ئانار سۈيى،

تەلۋە (ناخۇش) ئانار سۈيى، گۈلاب، خام قاپاق، تاۋۇز، پىدد-
گەن، مارجان شۇخلا قاتارلىقلارنىڭ سۈيى، سۆگەت يوپۇرمىقىد-
نىڭ سۈيى قاتارلىقلارنى باشقا چېپىش پايدىلىق. ھۆل سوغۇق
نەرسىلەر، ھۆللۈك ياغلار، مەسىلەن: قاپاق يېغى، بىنەپشە
يېغى، نېلۇپەر يېغى قاتارلىقلارنى مۇز بىلەن سوۋۇتۇپ باشنى
ياغلاش كېرەك. بىنەپشە، قاپاق، نېلۇپەر، ئاق لەيلى قاتار-
لىقلارنى قاينىتىپ بىمارنىڭ بېشىغا قويۇش كېرەك. ئۇيقۇسى
كەلمىگەن بولسا ئۇخلىتىشقا تىرىشىش، بۇنىڭ ئۈچۈن خەشخاش
شەربىتى قاتارلىقلارنى بېرىش لازىم.

سەپرادىن بولغان سەرسامدا بەدەننى ئارتۇقچە سوۋۇتۇش ۋە
ئارتۇقچە ھۆللەشتۈرۈشتىن قورقماسلىق لازىم. لېكىن قاندىن
بولغان سەرسامدا ئۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ. شۇڭا نورمال ھالدا
سوۋۇتۇش ۋە ھۆللەشتۈرۈش لازىم. ئۇنداق قىلمىغاندا زىيانلىق.

نەزلە زىققىسى

باش ئاغرىيدۇ ھەم ئېغىر بىلىنىدۇ، گالغا مېڭە تەرەپتىن
بىرەر نەرسە چۈشكەندەك بىلىنىدۇ. ئىسسىقتىن ۋە سوغۇقتىن
بولغان نەزلە كېسىلىنىڭ مەخسۇس ئالامەتلىرى ئىپادىلىنىدۇ.
ئالدى بىلەن دەرھال نەزلىنى داۋالاشنى ئاساس قىلىش كې-
رەك. نەزلىنىڭ ئىسسىق - سوغۇقلۇق ئەھۋالىغا ئاساسەن ئاۋ-
ۋال مۇنزىج بېرىپ ئۇنى پىشۇرۇپ ئاندىن كېيىن بەدەننى تازىلاش
كېرەك.

بەلغىمى زىققە

كۆكرەكتە ئېغىرلىق ۋە خىرىلداش بولىدۇ. يۆتەل بىلەن

بىرگە قويۇق بەلغەم تۈكۈرىدۇ، بەزىدە بەلغەم تولۇق چىقىپ كېتىدۇ، بەزىدە بەلغەم تولۇق چىقىپ كەتمەي، كېسەل يەنە قوزغىلىدۇ.

غىزاسىغا قوشقاچ، پاختەك، تورۇلغۇ گۆشلىرى قوشۇپ بېرىلىدۇ. سېرىق ياغ ئىستېمال قىلىدۇ. نانغىمۇ سېرىق ياغ قوشۇپ يېسە بولىدۇ. سۇ ئورنىغا بادىرەنجىبۇيا ۋە گاۋزەبان ئەرەقلىرى قوشۇپ تەييارلانغان ھەسەل سۈيى بېرىلىدۇ. مۇشۇ ئۇسۇل 40 كۈن ئەتراپىدا داۋاملاشتۇرۇلىدۇ.

چاڭ - توزان، سېسىق ۋە ئۆتكۈر پۇراقلاردىن ساقلىنىش، سوغۇق تېگىش، زۇكام بولۇش ۋە ئۆتكۈر غىدىقلىغۇچى نەرسىلەردىن ساقلىنىش زۆرۈر.

غىزا ئۈچۈن ئۇچار قاناتلار گۆشىگە قارىمۇچ، دارچىن، زەنجىبىل قاتارلىق خۇش پۇراق دورىلارنى سېلىپ پىشۇرۇپ يېسە بولىدۇ.

يەلدىن بولغان زىققە

ماددىدىن بولغان زىققىغە ئوخشاش كۆكرەكتە ئېغىرلىق بولىدۇ، بىمار قۇرۇق يۆتىلىدۇ، يەل پەيدا قىلىدىغان نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندا كېسەل ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ.

قىزىتىشنى ئاساس قىلىپ داۋالاش لازىم. ئىسسىق ياغلار بىلەن جۈملىدىن قوينىڭ قۇيرۇق يېغى، جويۇز يېغى، تۇخۇم يېغى، قۇستى يېغى، زەيتۇن يېغى، قەلەمقۇر يېغى، دارچىن يېغى، مەستىكى يېغى قاتارلىقلاردىن تاللاپ بەدەننى ياغلاش كېرەك. دورىلاردىن زۇفا شەربىتى، ئىسكەنجىبىن ئەنسىلى، لۈ-ئۇق ئەنسىلى قاتارلىقلار ياخشى تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئەنجۈر قېقى بىلەن شۈمشىنى سۇدا قاينىتىپ سۇزۇپ ھەسەل قوشۇپ ھەر كۈنى ئەتىگەندە بىر ئاش قوشۇقىدىن ئىچسىمۇ تېز ئۈنۈم بېرىدۇ.

قاتتىق سۇغۇقتىن ساقلىنىدۇ.

ئۆتكۈر خاراكتېرلىك زىققە

تۇيۇقسىز جىددىي دەم سىقىدۇ، نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىدۇ. شۇنداقلا، زىققىنىڭ باشقا ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. سوۋۇتقۇچى شەرىپەتلەر، نۇقۇتلار، لۇئابلار، شىرىلەر، زى-مادلارنى ئىشلىتىپ ھارارەتنى پەسەيتىش لازىم. سوۋۇتۇش ئېھتىياجىغا ئاساسەن بەزىدە كافۇر ئىستېمال قىلىش مۇمكىن بولىدۇ. بىنەپشە شەرىپىتى، خېمىرى بىنەپشە، ئارپا سۈيى، كاسىن سۈيى، مارجان شوخلا قاتارلىقلار قاينىتىپ ئىچكىۈزۈلىدۇ، سېمىز ئوت يوپۇرمىقىنىڭ سىقىپ چىقىرىلغان سۈيى، ئىسپەغۇل لۇئا-بى، ئاق موملارنى بىنەپشە يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆكرەكنى ياغلىسا بولىدۇ.

يۈرەك خاراكتېرلىك دەم سىقىش

نەپەس تۇتۇلىدۇ ئۇسسۇزلۇقى كۆپ بولىدۇ، يۈرەك ۋە كۆكرەك ساھەسىدە ئېچىش بارلىقىنى ھېس قىلىدۇ، جىددىي ھەرىكەت ياكى ئېغىر نەرسىلەرنى كۆتۈرگەندە دېمى سىقىلىدۇ، ھاسىرايدۇ، چىڭقىلىدۇ ھەمدە تومۇرى چوڭ ئارقىمۇ - ئارقا سالىدۇ.

ئىسپەغۇل، بېھى ئۇرۇقى، زىغىر قاتارلىقلارنىڭ شىرىلىدىرى ئىچكىۈزۈلىدۇ. چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىدىغان، بەدەننى بوشىتىدىغان دورىلار: مەسىلەن، نېلۇپەر، بىنەپشە، چىلان قاتارلىقلار ئىچكىۈزۈلىدۇ. يۈرەكنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىش (سوۋۇتۇش) ئۈچۈن كاسىن ئارقى ياكى گاۋزە بان ئارقى بىلەن سېمىز ئوت ئۇرۇقىنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ ئىچكىۈزۈلىدۇ. سەندەل

شەرىپىتى، نېلۇپەر شەرىپىتى ئىچكۈزسىمۇ بولىدۇ. ئاق سەندەلنى يۇمىلاقسۇت سۈيىدە سۈرۈپ تېتىقنى چىقىرىپ كۆكرەك ساھە-سىگە سۈرسە بولىدۇ. دېمەك ئەڭ مۇھىمى بۈرەكتىكى كېسەلنى داۋالاشنى ئاساس قىلىش لازىم.

ئاشقازان خاراكتېرلىك دەم سىقىش

زىيادە يەپ - ئىچكەنلىكتىن يېمەكلىكلەر ئاشقازاندا ئۇزۇن تۇرۇپ قېلىپ دەم سىقىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاشقازان خاراكتېرلىك دەم سىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا تاماقنى تەرتىپكە سېلىش، نورمال ئوزۇقلىنىش، زىيادە يەپ - ئىچىشتىن ساقلىنىش بىلەن بىرگە يەڭگىل، ئاسان سىڭىدىغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك.

ئىسسىقلىقتىن بولغان يۆتەل

ئىسسىقلىقتىن بولغان يۆتەل ئىسسىق ھاۋادا ۋە ئىسسىق تەييار-ئەتىلىك يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلغاندىن كېيىن پەيدا بولىدۇ، ئىسسىق ۋاقىتلاردا يۆتەل كۈچىيىدۇ، سوغۇق ۋاقىتتا پەسەيىدۇ، كۆكرەكتە ئېچىشىش ۋە ئۇسسۇزلۇق ئۆتكۈر بولىدۇ، يۈزىدە قىزىللىق بولىدۇ، تومۇرى تېز ۋە چوڭ سالىدۇ. پەرھىزى: يۇقىرىقى بىلەن ئوخشاش بولۇپ ياغ ئىستېمال قىلىش چەكلىنىدۇ. تەستە سىڭىدىغان يېمەك - ئىچمەكلەر، سۇيۇقلۇقى كۆپ بولغان ھۆل سوغۇق نەرسىلەردىن پەرھىز بۇي-رۇلىدۇ. مەيلى ئىسسىق ياكى سوغۇق بولسۇن قۇرۇقلۇقى ئار-تۇق بولغان نەرسىلەردىن پەرھىز بۇيرۇلىدۇ. قۇرۇق ئىسسىق، ئوفۇنەتلىك نەرسىلەردىن، چوڭ مال گۆشلىرى ۋە چاي دورىلى-رىدىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

ئاشقازاننى بۇزىدىغان، ئىچ سۈرۈشنى كۈچەيتىدىغان يېمەك - ئىچمەكلەردىن چەكلىنىدۇ. قەۋزىيەت كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان قۇرۇق ئىسسىق ۋە بۇخاراتلىق يېمەك - ئىچمەكلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

ھۆل قاپاقنى يالپاقلاپ، ھۆل يۇمغاقسۇت، پالەك ۋە ئو- سۇڭلاردا تاماق تەييارلاپ بېرىلىدۇ. ئىرقى بىدىمىشكى، ئىرقى نېلۇپەر، ئىرقى گۈل قاتارلىقلار بىلەن كۆكرەك سىرتىدىن يۇيۇ- لىدۇ. ئىسسىق تەبىئەتلىك تاماقلاردىن پەرھىز بۇيرۇلىدۇ.

ھۆللۈكتىن بولغان يۆتەل

بۇ خىل يۆتەل ھۆل مىزاج ۋە بەلغەم مىزاج كىشىلەردە، يەنە ياشانغان ئاياللار ۋە بالىلاردا، راھەت - پاراغەتتە ياشايدى- غانلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدىغان بولۇپ، ئاساسلىقى ئۇخلىغاندا كۆكرەكتە خىر - خىر ئاۋاز بولىدۇ.

ھۆل ئۈزۈم، نەشپۈت، جۈزە، گاڭچىپەن، ماش، ئاق بەسەي، كولا قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. پولو، مېغىز شورپى- سى بېرىلىدۇ. يېڭى تاتلىق ئانار، بادام، ياڭاق، ھالۋا بېرىلسە بولىدۇ.

سوغۇقتىن بولغان يۆتەل

سوغۇقتىن بولغان يۆتەلدە يۆتەلگەندە بەلغەم چىقمايدۇ. سو- غۇق ھاۋادا، سوغۇق سۇ ۋە سوغۇق تەبىئەتلىك غىزالارنى ئىستې- مال قىلغاندا يۆتەل كۈچىيىدۇ، ئىسسىق سەۋەبلەرنى قىلسا يەڭ- گىللىيىدۇ، ئۇسسۇزلۇق بولمايدۇ. چىرايىنىڭ رەڭگى كۆكۈش ئاققا مايىل بولىدۇ.

شورپىغا زەنجىبىل قوشۇپ ياكى شورپا گۈرۈچ قىلىپ ئىچىپ-
كۈزۈلىدۇ، بادام يېگۈزۈلىدۇ. ئاچچىق ۋە چۈچۈمەل نەرسىلەر-
دىن ھەمدە گاڭخېن، پولو ۋە سامسىدىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ.

غىدىقلىنىش خاراكتېرلىك يۆتەل

چاڭ - توزاندا ياكى قاتتىق ۋارقىرىغان ۋاقىتتا گالغا قو-
رۇقلۇق يېتىپ بۇخىل يۆتەل پەيدا بولىدۇ. بەزى ۋاقىتلاردا
ئۆتكۈر ۋە ئاچچىق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندىمۇ بۇخىل يۆ-
تەل پەيدا بولىدۇ. گالدا قۇرۇقلۇق بىلىنىدۇ ۋە ئارقىمۇ - ئارقا
قۇرۇق يۆتەل كېلىدۇ.

ئىچى تارلىق، تېرىككەكلىك ۋە جىددىيلىكتىن ساقلىنىلىد-
دۇ، پۇراقلاردىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ. ئىسسىقلىق ئىچىملىكلەر
ۋە ئاچچىق يېمەكلىكلەر چەكلىنىدۇ. توڭلاتقۇدا تۇرۇپ قالغان
يېمەك - ئىچمەكلەر ئىستېمال قىلىنمايدۇ.

بالىلار يۆتەلى

بۇرۇندىن سۇيۇقلۇق زىيادە كېلىدۇ، يۆتەل بىلەن بىرگە
زۇكاممۇ بولىدۇ، يۆتەلگەن ۋاقىتتا بالىلارنىڭ كۆكرىكىدىن بەل-
غەمنىڭ خىر - خىر قىلغان ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ، بەزىدە قۇرۇق
يۆتەلمۇ بولىدۇ، بەزىدە كۆك يۆتەل بولىدۇ.

سامساق سۈيىنى ئىچكۈزۈش، توخۇ، قوي ئۆتلىرىنى شې-
كەرگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈشتەك چارلەرنىڭمۇ ياخشى ئۈنۈمى
بار. ئالدىنقى ئىچىگە ناۋات سېلىپ ياكى سەۋزىنى قوقاسقا
كۆمۈپ پىشۇرۇپ قىزىق يېتى يېگۈزۈشتەك خەلق ئارىسىدىكى
داۋالاش ئۇسۇللىرىنىڭمۇ ياخشى مەنپەئىتى بار.

ياغلىق ۋە ئاچچىق چۈچۈمەل نەرسىلەردىن، بەلغەم پەيدا قىلغۇچى ھۆل - سوغۇق نەرسىلەردىن، قارا شېكەر ۋە ياغدا يۇشۇرۇلغان نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

قان تۈكۈرۈش

كۆكرەكتە ئېغىرلىق بىلىنىدۇ، گال قىچىشىدۇ، قۇرۇق يۆتەل بولىدۇ، دەم ئېلىش قىيىنلىشىدۇ، يۆتەل بىلەن بىرگە كۆپۈكلۈك قان كېلىدۇ. ئەگەر ئۆپكە قىل قان تومۇرى يېرىلغان بولسا، نۆيۇقسىز كۆپ مىقداردا قان تۈكۈرۈپ، ھۇشسىزلىنىدۇ ياكى ئۆلۈپ كېتىدۇ.

قورۇغۇچى دورا ۋە قورۇلغان تاماقلار بېرىلىدۇ، دەرھال سەۋەبى تەكشۈرۈلۈپ، جىددىي قان توختاتقۇچى ۋە يۆتەل پەسەيتىدۇ. كۈچى چارىلار قوللىنىلىدۇ.

مىزاجىنى تەڭشەشتە بىمارنى قاننى ھەرىكەتلەندۈرگۈچى ئا- مىللاردىن، قاتتىق ئىشلەش، سۆزلەش، ھاراق ئىچىش، جىن- سىي ئالاقە قىلىش ۋە ئىسسىقلىق دورا، ئىسسىقلىق يېمەك - ئىچمەكلىكلەردىن چەكلەش كېرەك.

قان توختاتقۇچى دورىلاردىن شەرىپىتى ئەنجىباھار بېرىش لازىم. چۈنكى ئۇ قان تۈكۈرۈش، قانلىق تەرەت قىلىش، ھەيز كۆپ كېلىش قاتارلىقلاردا قان توختىتىش تەسىرىگە ئىگە، نەزلە توختىتىشقا پايدىلىق.

ئۆپكە ياللۇغى

قىزىتما بولىدۇ، كۆكرەك چىڭقىلىدۇ ۋە بىمار ھاسىرايدۇ، كۆپ يۆتلىدۇ نەپەس قىسىلىدۇ. ۋە كۆپ مىقداردا يېپىشقاق بەلغەم چىقىرىدۇ، ئۆپكەدە گىزىلداش ئاۋازى بولىدۇ.

بالىلار بۇ كېسەل بىلەن ئاغرىغاندا ئىمىتكۈچىنىڭ سۈتىنى ياخشىلاش، مىزاجىنى نورماللاشتۇرۇش، سۈتى كۆپ بېرىۋەتە-مەسلىك، ئانا ۋە بالىنى سوغۇق تېگىش، سوغۇق غىزا ۋە سۇ ئىچىشتىن ساقلاش كېرەك. بالىنى ئامال بار يىغلاتماسلىققا تېرىشىش كېرەك. يادام مېغىزى بىلەن ھەسەلدە لۇغۇق تەييارلاپ ئىستېمال قىلدۇرسا پايدىلىق تەسىر كۆرسىتىدۇ، بالىنىڭ بەدە-نىنى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇپ تۇرۇشنىڭ پايدىسى بار.

ئىسسىق (قان ۋە سەپرا) تىن بولغان زاتىرىيە

كېسەللىك ئۇشتۇمتۇت باشلىنىدۇ ۋە ئىستىما دائىملىق بولىدۇ، بىمار كۆپ يۆتىلىدۇ، نەپەس قىستاش ئەھۋالى ئېغىر بولىدۇ، كۆزى چىڭقىلىدۇ، ئاغزىدىن ئىسسىق ھور چىقىدۇ، كۆكرەكنىڭ يۇقىرى تەرىپىدە ئېغىرلىق ۋە چىڭقىلىش بولىدۇ، يۇقىرى ئىسسىتما تەرسىرىدىن ھاسىرايدۇ. بەك ئۇسسايدۇ. بە-مار سالقىن ھاۋانى خالايدۇ.

تامىقىغا تۈزلۈك بېلىق قوشۇپ بېرىش، ئۇخلاش ئالدىدا ھەبىي ئاپارەج ۋە شەھمى ھەنزەلدىن تەييارلانغان ھەبلەرنى بېرىش لازىم. يېرىڭنىڭ ياخشى تازىلىنىشى ئۈچۈن زۇفاغا چۈچۈكبۇيە-نىڭ ئاققانغان يىلتىزى، گۈل سۆسەن يىلتىزى قاتارلىق دورىلار چۈشكەن قايناتىمىنى ھەسەل شارابى بىلەن ئىچىشكە بەرسە بولىدۇ. نۇقۇت ئۇنى ۋە چامغۇرلار بىلەن سۇيۇق تاماق قىلىپ بېرىلىدۇ. ياۋا يېسىمۇق ئۇنى قوشسىمۇ بولىدۇ. يەسىمۇق ۋە ياۋا پىيازىدىن تەييارلانغان يالانچۇق دورىلارمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

ئۆپكە قېتىش خاراكتېرلىك زاتىرىيە

ئۆپكە مىزاجىنىڭ قىزىتلىقىدىن نەپەس قىستىشى بەزىدە يەڭگىل بەزىدە ئېغىر بولىدۇ. داۋاملىق قۇرۇق يۆتىلىدۇ، ئىستى-ما بولمايدۇ. سەۋدادىن بولغان ئۆپكە قېتىشىشتا نەپەس قىستىشى دەسلەپ يەڭگىل بولۇپ كېيىن ئېغىرلىشىدۇ، يۆتەل قۇرۇق، خەپرۇكسىز بولىدۇ. كۆكسى چىڭقىلىش، ھاسىراش، ئۇسساش-تەك بەلگىلەر بولمايدۇ.

تامىقىغا دەسلەپ سۇيۇق، پوستى ئاقلانغان ماش بىلەن قىلىنغان تاماقلارنى بېرىش، مېۋە سۇلىرى، پىشۇرۇلغان كۆكتات سۇلىرىنى بېرىش، گۈلە چىلاپ يىلما ھالدا ئىچكۈزۈش. بە-سەي، يۇمىغاقسۇت، پالەك سېلىنغان سۇيۇق تاماقلارنى بېرىش، ئارپىنى ئاقلاپ ئارپا ئېشى ئېتىپ بېرىش لازىم. گۆش - ياغ، شىزلىك نەرسىلەردىن بىر قانچە كۈن پەرھىز قىلغان ياخشى، ئەمما شۇنىڭغا دىققەت قىلىش لازىمكى بىمارنىڭ بەدەن قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىش مۇھىم داۋا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. دېمەك، پەرھىز بىمارنى ماغدۇرسىزلاندۇرۇۋەتمەي بەلكى تەدرىجىي ھالدا ئادەتتە-كى تاماققا كۆچۈش شەرتى ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك. كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى دەۋرلىرىدە قان ئازلىق كۆرۈلسە، ئەھ-ۋالىغا قاراپ ماددىنى تازىلىغاندىن كېيىن ئىچىشكە ئانار شەربى-تى، يېپىشكە چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىقى بېرىلىدۇ.

ئۆپكە سۇلۇق ئىششىقى

نەپەس سىقىلىش بىلەن بىرگە ئادەتتە يۆتەلمۇ بولىدۇ، سۇ-يۇق بەلغەم تۈكۈرىدۇ، كۆكرەكتە ھۆللۈك زىيادە بولىدۇ، لې-كىن ئاغرىش بولمايدۇ، ئېغىزدىن شالۋاق كۆپ ئاقىدۇ، يۈز

مۇسكۇللىرى بوشىشىپ، رەڭگى قارىغا مايىل بولۇپ قالىدۇ، دائىم يەڭگىل قىزىتما بولىدۇ. قۇرۇق ئىسسىق تاماقلار ھەمدە بادام، چىلان قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. قەۋزىيەت بولۇشتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، سۈيىدۇ. كى راۋانلاشتۇرۇلىدۇ، كۆپ يېتىش چەكلىنىدۇ، ئۆپكەندىن سۇ ئېلىش مۇۋاپىق داۋالاش ئەمەس.

يىرنىڭ تۈكۈرۈش

بۇنداق چاغلاردا بەزى بىمارلاردا گېلى ئىشىشىپ، يۈتۈش تەسلىشىش، تۈگۈپ تىرەش، ئىستىمداش يۈز بېرىپ جاراھەت ئېغىرلىشىش بىلەن بىللە يىرنىڭ تۈكۈرىدۇ، ئېغىزى سېسىق پۇرايدۇ، قاتتىق يۆتەلگەندە يىرنىڭ خەپرۈك ئاجراپ چىقىدۇ. خەپرۈك سېسىق پۇراقلىق بولىدۇ.

يىرنىڭ تولۇق تازىلاپ چىقىرىشقا ئامال قىلىش كېرەك. چۈنكى كۆپىنچە ھاللاردا يىرنىڭ تولۇق تازىلانسا قىزىتما قايتىپ كېسەل ساقىيىپ كېتىدۇ. يىرنىڭ كۆكرەكتىن ۋە ئۆپكە شاخچىسىدىن كېلىپ سۇيۇق بولسا، ھەمدە قىزىتما قوشۇلۇپ كەلسە ئىچىشكە ئارپا سۈيى، مائۇل ھەسەل بېرىلىدۇ. 150 مىل ئېشەك سۈتىگە 10 گرام سوپۇپى سەرتان قوشۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ، ئەگەر ئېشەك سۈتى تېپىلمىسا ياكى كېسەلنىڭ كۆڭلى كۆتەرمىسە ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆچكە سۈتى ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. ئىچىشكە ئەتىگەندە چىلان شەرىبىتى، كەچتە خەشخاش شەرىبىتى بېرىلىدۇ. بادام يېغىدا ھالۋا قىلىپ ئىستىمال قىلدۇرۇلىدۇ. جاراھەت پۈتۈن ياخشىلانغاندا توخۇ، چۈجە كاۋابى، چالا پۇشۇرۇلغان تۇخۇم بېرىلىدۇ، بەلغەم قويۇق بولۇپ تەستە چىقسا، ئەمما ئىسسىق بولمىسا مەخسۇس، پىرسىياۋشان، زۇپا، ئەنجۈر قاتارلىق ماددىلارنى پۇشۇرغۇچى (يېتىلدۈرگۈچى) دورىلار بېرىلىدۇ. ئۇندىن

كېيىن بەلغەم بوشاتقۇچى دورىلار بېرىلىدۇ.

ئۆپكە تالالىشىش

بىمار نەپەس سىقىلىشىنىڭ شىكايىتىنى قىلىدۇ، ئارقىمۇ ئارقا قۇرۇق يۆتەل كېلىدۇ، قوۋۇرغا ئارىلىقلىرىدا ئاغرىق بولىدۇ، غىدىقلىنىش خاراكتېرلىك يۆتەل بولىدۇ، قىسقا نەپەسلەندۇ، ئازراق بەلغەم چىقىدۇ، قىسقا نەپەسلىنىش تەدرىجىي كۈچىيىدۇ. يۆتەلگەندە ئوفۇنەتلىك بەلغەم كۆپ مىقداردا چىقىدۇ، بىمار كۈندىن - كۈنگە ئاجىزلىشىپ ماغدۇرسىزلىنىدۇ، تەدرىجىي قىزىتما كۆتۈرۈلىدۇ، بەزىدە كېچىدە تەرلەيدۇ، كېسەل ئۇزۇن ۋاقىت داۋاملىشىپ ئاخىرىدا ئاجىزلىق ياكى نەپەس توختاپ قېلىش سەۋەبى بىلەن ئۆلۈپ كېتىدۇ.

زۇفا، بادام ۋە سەرىستانغا ئوخشاش دورىلىق ئۇزۇقلۇقلار بېرىلىپ ئۆپكەنى يۇمشىتىش مەقسەت قىلىنىدۇ، يەڭگىل شور-پىلار بېرىلىدۇ، قۇشلار گۆشى مەنپەئەت قىلىدۇ. ئاچچىق ۋە مايلىق تاماقلار ھەمدە جىگەرگە زىيان قىلىدىغان ھەرقانداق دورا بېرىلمەيدۇ.

ئۆپكە راكى

تۇيۇقسىز قاتتىق قېقىلىپ يۆتىلىپ كېتىش، ھاسىراش كۆكسى قادىلىپ ئاغرىش، قارامتۇل ياكى جىگەر رەڭ قان تۆكۈرۈش يۈز بېرىدۇ، بىمارنىڭ تېنى ئاجىزلاپ قېنى ئازلاپ كېتىدۇ، تۆۋەن قىزىتما بولىدۇ.

ئاچچىق نەرسىلەردىن، يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ، ھاراق - شاراب چەكلىنىدۇ. چۈشتىن كېيىن باشلاپ

قويۇق تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇ.

ئۆپكە سىلى

ئۆپكە سىلىنى ئادەتتە كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ دەرىجىسى ئېتىبارى بىلەن 3 باسقۇچقا بۆلۈشكە بولىدۇ.

1 - دەرىجىلىك سىلىنىڭ ئالامىتى: كېسەلنىڭ دەسلەپىدە ئاز - ئازدىن قۇرۇق يۆتەل كېلىدۇ. ئۇيقۇدىن ئويغانغاندا ياكى ئەتىگەندە بەزىدە تاماق يېگەندىن كېيىن يۆتەل كېلىش بىلەن بىرگە قۇسىدۇ، ھەزىم بۇزۇلىدۇ. بىمار ياغلىق غىزالارنى يې-يىشتىن بىزار بولىدۇ. يۈرەك ھەرىكىتى ۋە تومۇر ھەرىكىتى تېزلىشىدۇ، نەپەس ھەرىكىتىمۇ تېزلىشىدۇ، بىمار كۈندىن - كۈنگە ئورۇقلاپ ئاجىزلايدۇ، دەسلەپىدە قۇرۇق يۆتەل كېلىدۇ، لېكىن ئازراق ۋاقىتتىن كېيىن يۆتەلگەندە بەلغەم چىقىدۇ. بۇ-نىڭدا قان يېپىچىلىرى تېپىلىدۇ. كەچتە (شام ۋاقتىدا) يەڭگىل قىزىتما بولىدۇ.

2 - دەرىجىلىك سىلىنىڭ ئالامىتى: ئالقان ۋە تاپانلىرى قىزىيدۇ، كۆپ يۆتىلىدۇ، خۇسۇسەن ئەتىگەندە ئويغانغان ۋا-قتتا يۆتەلگەندە بەلغەم كۆپ چىقىدۇ، يىرىك ئارىلاش كېلىدۇ. ئەگەر بۇ خىلدىكى بەلغەمنى سۇغا تاشلىغاندا چۆكىدۇ. نەپەسلى-نىش قىيىنلىشىدۇ، ئاجىزلىق ۋە ئورۇقلاش ئېغىرلىشىدۇ، تومۇرى تېز - تېز سوقىدۇ، كەچتە قىزىتما پەيدا بولىدۇ. كېچىدە جۇغ - جۇغ بولىدۇ، ئەتىگەندە قىزىتما كۆتۈرۈلگەندە كۆپ تەرلەيدۇ، بىمارنىڭ چىرايىدا قىزىللىق بولىدۇ.

3 - دەرىجىدىكى سىلىنىڭ ئالامىتى: بۇ خىلدىكى سىلدا يۇقىرىدا دېيىلگەن ئالامەتلەر ئېغىرلىشىدۇ، ئۆپكەدە زەخمىلى-نىش بولىدۇ، ئەتىگەندە (تالڭ سەھەردە) يۆتەل كۈچىيىدۇ، كۆپ مىقداردا بەلغەم تۈكۈرىدۇ، بۇنىڭدا كۆپ مىقداردا يىرىك كېلىد-

دۇ، كېچىدە قىزىتما يۇقىرى بولىدۇ. ئەتىگەندە كۆپ تەرلەيدۇ. كى، بىمارنىڭ كىيىملىرى ۋە كۆرپىلىرى ھۆل بولۇپ كېتىدۇ، چاچلىرى چۈشۈپ كېتىدۇ، بەزى ۋاقىتلاردا قۇسىدۇ، بىمار قۇرۇق قاقشاللىشىپ قالىدۇ، قول - پۇتلىرى ئىششىيدۇ.

1. يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئەسلىي سەۋەبلەرگە قارشى تۇرۇپ ئۇلاردىن ساقلىنغاننىڭ سىرتىدا نەملىك، پاسكىنچىلىق، ئاپتاپ چۈشمەيدىغان، ھاۋا ياخشى ئالماشمايدىغان ئورۇنلاردا ياشىماسلىق، بوغىناق، چاڭ - تۇزاڭلار بىلەن كۆپ ئارىلىشىدىغان كەسىپلەردىن ساقلىنىش، كۈن نۇرى ياخشى چۈشىدىغان، ياخشى، پاكىز، ھاۋالىق ئورۇنلاردا ياشاش لازىم. نەملىك جاي، پاسكىنا ئورۇن، چاڭ - تۇزاڭلار بۇ كېسەلنىڭ ئەڭ يامان قوزغاتقۇچىلىرى ھېسابلىنىدۇ.

2. ئوزۇقلۇق ماددىلىرى تولۇق بولمىغان كەم قۇۋۋەت تاماقلارنى يېمەسلىك، بەلكى تېز سىڭىدىغان، قۇۋۋەت دەرىجىسى يۇقىرى بولغان تاماقلارنى يېيىش لازىم. قالايمىقان يەۋىرىپ قۇۋۋەتنى ھازىمەنى خاراپلاشتۇرۇۋەتسە ئەكسىچە بەدەن ئاجىزلاپ ئاسانلا سىل كېسەللىكىگە مايىللىشىپ قالىدۇ.

3. ھاراق، شاراب، نەشە قاتارلىق مەس قىلغۇچى نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

4. ھەددىدىن ئارتۇق ھېرىپ چارچاشتىن ساقلىنىش لازىم.

5. كۆپ كىشىلەر ئارىسىدا ئۇخلىماسلىق، بەك ئادەم كۆپ ئورۇندا مۇمكىنقەدەر تۇرماسلىق كېرەك.

6. ھەمىشە بۇرۇن ئارقىلىق تىنىش، ئېغىز ئارقىلىق تىنىماسلىق كېرەك. ئۆپكەننىڭ پۈتۈن قىسىملىرىغا باراۋەر ھاۋا يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئىمكانقەدەر چوڭ - چوڭ تىنىش، ئۇخلىغان چېغىدا ئېغىز بۇرنىنى چۈمكەپ قويماي ئوچۇق قويۇش لازىم.

7. ياتىدىغان ئۆيدە ھېچقانداق ئىس - تۈتۈن بولماسلىقى كېرەك.

8. خام سۈت ئىچمەسلىك، قاينىتىپ ئىچىش كېرەك، قانۇن ئورگانلىرىمۇ بۇ مەسىلىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ ئۆلتۈرۈلۈپ رۇلىدىغان ۋە سېغىلىدىغان كالىلارنى ئالاھىدە تەكشۈرگەندىن كېيىن ئۆلتۈرۈپ سېتىشقا ياكى سېغىپ سۈتىنى سېتىشقا رۇخ-سەت قىلىشى لازىم.

9. تاماق يېگەندە قولىنى، قانچا - قۇمۇچلىرىنى پاكىز يۇيۇش، سىل كېسىلى بارلارنىڭ قانچا - قۇمۇچلىرىنى ئايرىش كېرەك. شۇنداقلا سىل كېسىلى بارلار بىلەن ئۆلتۈرۈپ تاماق يېمەسلىك لازىم.

10. سىل كېسىلى بارلارنىڭ تۈكۈرگەن بەلغەملىرىنى ۋە بەلغەم يۇققان لۇڭگىلىرىنى كۆيدۈرۈپ تاشلاش ياكى پاكىز يۇغاندىن كېيىن داستا قاينىتىۋېتىش كېرەك.

11. سىل كېسىلى بار ئاتا - ئانىلار بالىلىرىنى تەربىيەلەشتە ناھايىتى ئېھتىياتچان بولۇشى، نەزلە، زۇكام، يۆتەل (بولۇپمۇ كۆك يۆتەل)، قىزىلغا ئوخشاش كېسەللىكلەر بىلەن ئاغرىغاندا ناھايىتى تېزلىكتە داۋالاشنى، سەل قارىماسلىقى، مەلۇم بەلگە-لەر كۆرۈلۈش بىلەنلا دوختۇر ياكى تېۋىپقا كۆرسىتىپ تەكشۈر-تىشى لازىم.

سىل كېسەللىكى دەسلەپكى ۋاقىتتىلا چىڭ توتۇلۇپ تەلتۈ-كۈس داۋالاشقا ساقىيىدۇ. مەيلى قايسى خىلدىكى سىل بولسا. سۈن كېسەل كىشىنى ساپ ھاۋالىق، كۈن نۇرى چۈشىدىغان ئۆيدە ياتقۇزۇش، بەدەن ئېھتىياجلىق ماددىلارغا باي بولغان كۈچ-لۈك مايلىق، گۆشلۈك تاماقلارنى بېرىش لازىم. ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ كېسىلى ئېغىر، ماددىدىن كەتكەنلەرنى چوقۇم ئورۇندا ياتقۇزۇپ ياخشى ئارام ئالدۇرۇش لازىم. كېسەلنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا سەۋەب بولىدىغان ئامىللارغا قارشى تۇرۇش ۋە توختىتىش كېرەك. داۋالاشتا ياخشى ئۈنۈم قازىنىش ئۈچۈن كېسەل كىشىگە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارنى ياخشى ئۆقتۈرۈپ

قويۇش، بىمارمۇ تېۋىپنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە ياخشى رىئايە قىلد-
شى، تېۋىپ بىلەن ياخشى ماسلىشىشى لازىم.

بىمارغا بېرىدىغان تاپشۇرۇقلار:

1. دائىم ئوچۇق، ساپ ھاۋادا ياشاش.
2. لەتىپ، تېز سىڭىدىغان قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى يېيىش،
مەسىلەن: گۆشلۈك، مايلىق تاماقلار، سۈت، تۇخۇم، قايماق،
بېلىق، سېرىق ياغ، كۆكتاتلارغا ئوخشاش. چۈنكى بۇ خىلدىكى
نەرسىلەر ھەقىقەتەن داۋايى غىزا خاراكتېرلىك نەرسىلەر بولۇپ،
بىر تەرەپتىن ئوزۇق بولۇپ سەمىرتىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن
تۈرلۈك قۇۋۋەتلەرنى تولۇقلاپ بەدەننىڭ مۇداپىئە كۈچىنى ئاشۇ-
رىدۇ. بولۇپمۇ جۈدە تىكۈچى قىزىتمىغا سۈتتىن پايدىلىق ھېچقان-
داق تاماق يوق. لېكىن بىر ئۆرلىتىپ ئىچىش لازىم. نورمال
شارائىتتا ھەرقانداق تاماققا رۇخسەت قىلىنىدۇ. يەنى قاتتىق
پەرھىز بۇيرۇلمايدۇ. لېكىن تەس سىڭىدىغان ۋە ئېغىر يەللىك
تاماقلار، چۈچۈمەل نەرسىلەردىن چەكلىنىدۇ.
3. كىيىملىرىنى پاك - پاكىز يۇيۇپ 3 - 4 كۈندە بىر
قېتىم يەڭگۈشلەپ تۇرۇشقا دەۋەت قىلىشى لازىم.
4. كۆرگەنلا يەرلەرگە تۈكەرمەسلىك، مەخسۇس قاچا ۋە
ئورۇنغا ياكى قەغەز خالىغا تۈكۈرۈپ كۆمۈۋېتىش ياكى كۆيدۈ-
رۇپ تاشلاشقا تەۋسىيە قىلىش كېرەك.
5. تاماق يەيدىغان قاچىسىنىڭ تازا بولۇشى، ئايرىم بولۇ-
شى، يۆتەلگەن، ئەسنىگەن چاغلىرىدا ئېغىزغا لۇڭگە تۇتۇپ تۇ-
رۇپ كېيىن لۇڭگىنى قاينىتىپ تۇرۇشقا دەۋەت قىلىش لازىم.
6. جىنسىي ئالاقىنى چەكلەش، جىسمانىي، ئەقلىي ئەم-
گەكلەردىن، ھېرىپ - چارچاشتىن چەكلەش، بولۇپمۇ قىزىتمى-
سى ئۆرلىگەندە قەتئىي يېتىپ دەم ئېلىشقا مەجبۇرلاش كېرەك.
7. ھېرىپ قالمايدىغان دەرىجىدە ئورمانلىقلاردا سەيلە -
تاماشا قىلىشقا ئۈندەش كېرەك. چۈنكى يەڭگىل ھەرىكەت ۋە

سەيلە - تاماشا قىلغاندا كېسەلنىڭ ئىشتىھاسى ئېچىلىدۇ. رو-
ھىي كەيپىياتى ياخشىلىنىدۇ. ئۈمىدۋار بولۇپ كېسەلگە قارشى
كۈچى ئاشىدۇ.

8. كېسەلنىڭ ساقىيىدىغانلىقىنى ئېيتىپ كۆڭۈل خوش-
لۇققا تەۋسىيە قىلىپ غەم - قايغۇدىن يىراقلاشتۇرۇش، مۇمكىن-
قەدەر خاتىرجەم قىلىش لازىم.

بېلىق مېيى ئىستېمال قىلدۇرۇش ئىنتايىن پايدىلىق. چۈن-
كى ئۇنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى بولۇپ بىر تەرەپتىن
بەدەننى سەمىرىتىدۇ ۋە چىقىم بولۇپ كەتكەن قۇۋۋەتنىڭ ئورنىنى
تولدىرىدۇ، يەنە بىر تەرەپتىن بولسا ئەسلىي كېسەللىككە مەنپە-
ئەت قىلىدۇ. 2. ئوقۇنەتلىك تەب قوشۇلمىغان ئەھۋالدا ئادەم
سۈتى، ئېشەك سۈتى ۋە ئۆچكە سۈتلىرىنى ئىچكۈزۈش ئىنتايىن
پايدىلىق، لېكىن سۈتى ئىچىلىدىغان ھايۋان ناھايىتى ساغلام
بولۇشى كېرەك. تەجرىبىلەردىن قارىغاندا، ئۆپكەسىدە ناھايىتى
سېسىق يېرىڭ، قان ئارىلاش بەلغەم بولغان خېلى ئېغىر دەرىجىدە-
دىكى سىل كېسەللىرىگىمۇ مەخسۇس ئېشەك سۈتى بېرىش بىلەن
ساقىيىپ كەتكەن. چۈنكى ئېشەك سۈتى سېسىق پۇراقلىق يېرىڭ
كېلىشكە باشلىغانلىرىغا ئىنتايىن پايدىلىق بولۇپ، بۇخىل يى-
رىڭنى ناھايىتى ياخشى تازىلايدۇ. بېلىق مېيى ئىشلەتكەندە ئىل-
ھان سۈتكە ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ. كۈنجۈت يېغىنى داۋاملىق
ئىشلىتىشىمۇ ياخشى تەسىر قىلىدۇ.

لىمفا سىلى

بويۇن، كۆكرەك، قورساق قىسىملىرىدىكى بەزلەر، بولۇپ-
مۇ بويۇندىكى بەزلەر چوڭىيىدۇ ھەم سىل كېسەلنىڭ باشقا
ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.
قان تازىلىغۇچى دورا ۋە تاماقلار بېرىلىدۇ. كالا گۆشى،

سامسا، لازا ۋە گاڭچەندىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. گۈلھەنت، يەڭگىل شورپا ۋە نۇقۇت بېرىلىدۇ. داۋالاش جەريانىدا ئىششەنغان ئورۇنغا قالايمىقان تېغ تەڭگۈزۈپ گۆش ئېلىشتىن قاتتىق پەرھىز قىلىنىدۇ.

قان ۋە سەپرادىن بولغان كۆكرەك پەردە ياللۇغى

يەڭگىل ھالەتتە قىزىتما كۆتۈرۈلىدۇ، ئەمچەكنىڭ ئاستىدا سانجىق بولىدۇ، كېيىن قاتتىق ئاغرىشقا باشلايدۇ، خۇددى بىر نەرسە سانجىلغاندەك بولىدۇ، نەپەس سىقىلىدۇ، يەنى تېز - تېز نەپەسلىنىدۇ، ئاندا - ساندا قۇرۇق يۆتەل بولىدۇ، نەپەس ئالغان ۋە يۆتەلگەن ۋاقىتتا ئاغرىق كۈچىيىدۇ، ئاخىرىدا بىمار ئاغرىق - تېن قورقۇپ (نەپەس ئېلىش، يۆتەلىش ھەرىكىتى قىلىشتىن قورقىدۇ)، كۆكرەكچە نەپەس ئالالماي، قورساقچە نەپەس ئالىدۇ، تىلىنى گەز باغلايدۇ، تومۇرى تولىغان بولىدۇ، چىرايى قىزىرىدۇ، ئۆپكە ياللۇغى قوشۇلۇپ كەلگەن بولسا، يۇقىرى قىزىتما بولىدۇ، بەزىدە جۈيلۈپ بېشى ئاغرىيدۇ. ئاخىرىدا ئۆپكە تەرەپ كۆكرەك پەردىسى ۋە قوۋۇرغا تەرەپ كۆكرەك پەردىسى ئارىسىغا ھۆللۈك يەنى قان سۇيۇقلۇقى سىرغىپ چىقىپ يىغىلىپ ئوفۇنەتلىنىپ يىرىڭغا ئۆزگىرىدۇ (قاندىن بولغىنىدا نەپەس سىقىلىش ئېغىر بولىدۇ، تومۇرى تولىغان بولىدۇ، سەپرادىن بولغىنىدا ئۇسسۇزلۇق زىيادە بولىدۇ، ئېغىز تەمى ئاچچىق بولىدۇ). سوغۇق نەزلىدىن بولغان يۆتەلنى داۋالاشتىكى چارىلەر بويىچە چارە قىلىدۇ. تەبىئىي ھۆل سوغۇق بولغان نەرسىلەردىن قاتتىق پەرھىز قىلدۇرۇپ، ياۋا پىياز (ئەنسىل) نى ئوتقا كۆمۈپ سارغايىتىپ، ھەر كۈنى ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىم 10 گرامىنى شەرىپىتى بۇزۇرى بىلەن ئىچكۈزۈش كېرەك.

كۆكرەك پەردە ياللۇغى (زاتىلجەنبى)

ئومۇمىي ئەھۋالدىن ئالغاندا سوغۇق ئۇرۇپ كېتىش، ئۆتە-
كۈر ھاراقىلارنى ئىچىش، نورمال بولمىغان ئىسسىقلىققا يولۇ-
قۇش، خىلىتلار كۆيۈش ۋە ئوفۇنەتلىنىش، ئۇزۇن مۇددەت نەزلە
بولۇش، سوغۇق سۈنى كۆپ ئىچىش، قويۇق قان پەيدا قىلىدىغان
غەلىز تاماقلارنى كۆپ يېيىش ۋە باشقا سەۋەبلەردىن كېلىپ
چىقىدۇ. مۇھىت شارائىتى، يېشى، جىنسى ۋە تۇرمۇش شارائىتى-
ئىتلىرىدىن ئالغاندا، ئىسسىق پەسىللەرگە نىسبەتەن سوغۇق پە-
سىللەردە بولۇپمۇ كەچكۈز پەسىللىرىدە كۆپ ئۇچرايدۇ. بالىلار
ۋە قېرىلارغا نىسبەتەن، ياشلار ۋە ئوتتۇرا ياشلىقلاردا كۆپ ئۇچ-
رايدۇ. ئاياللارغا نىسبەتەن ئەرلەردە كۆپ ئۇچرايدۇ. شۇنىڭدەك
ھاراقىكەشلەر، تېنى ئاجىز، يېتەرلىك ياخشى ئوزۇقلىنالمى-
دىغان، تۇرمۇشى چېچىلاڭغۇ ئادەملەر بۇ كېسەللىك بىلەن كۆپ-
رەك ئاغرىيدۇ.

ئۇسسۇسغاندا ھەرگىزمۇ سۇ ئىچىشكە بولمايدۇ. سىزىمنى
يوقتۇقچى خاراكتېرلىك دورىلارنى ئىستېمال قىلدۇرماسلىق،
قاپىز نەرسىلەردىن سامساق، پىياز، بېلىق ۋە باشقىلاردىن ئېھ-
تىيات قىلىش لازىم.

يۇقۇملىنىشتىن بولغان كۆكرەك پەردە ياللۇغى

ئادەتتىكى كۆكرەك پەردە ياللۇغىغا ئوخشاش ئالامەتلەر كۆ-
رۈلىدۇ.

نېلۇپەر، بىنەپشە سۈلىرى ھەمدە گۈرۈچ شورپىسى ئىستې-
مال قىلدۇرۇلىدۇ، شۇنداقلا كۈچلۈك ياللۇغ قايتۇرغۇچى
دورا - ئوكۇللار بېرىلىدۇ.

دئافراگما ياللۇغى

ئۆتكۈر قىزىتما كۆرۈلىدۇ ۋە بىمار ناھايىتى بىئارام بولىدۇ. ئارقىمۇ ئارقا قۇرۇق يۆتىلىدۇ. دئافراگما ساھەسىدىكى قورساق قىسمى سانجىلىپ ئاغرىيدۇ، قورساق مۇسكۇللىرى جىددىيلىشىپ قاتتىقلىشىدۇ، بىمار پەقەت كۆكرەكچە نەپەس ئالالايدۇ، نەپەس سىقىلىدۇ، يۈرەكتە داۋالغۇش كۆرۈلىدۇ، قۇسىدۇ، ئەس - ھوشى قالايمىقانلىشىدۇ.

ئېغىر، يەللىك ۋە تەستە سىڭىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، بىنەپشە، نېلۇپەر سۇلىرى قوشۇلغان شورپا گۈرۈچ بېرىلىپ قىزىتما چۈشكەندىن كېيىن ئاندىن مەخسۇس داۋالاشقا بولىدۇ. مۇجۇش ۋە سىلاشقا، قاننى قىزىتىدىغان دورا ۋە تاماقلارنى بېرىشكە بولمايدۇ.

كۆكرەككە سۇ چۈشۈش

يەڭگىل قىزىيدۇ، دەم سىقىدۇ، دائىم يۆتىلىدۇ، شەبنەمگە ئوخشاش سۇيۇق بەلغەم تۈكۈرىدۇ، قول - پۇتلىرى ئىششىيدۇ ھەم ئىسسىقنىڭ ئومۇمىي ئالامىتى كۆرۈلىدۇ.

پالەك، چىڭسەي، گاڭخېن قاتارلىقلار چەكلىنىدۇ. سوغۇق ئىچىملىكلەر ئىچكۈزۈلمەيدۇ. بىر قېتىمدا كۆپ تاماق يېيىلمەيدۇ. سۇ ئۈزۈشكە بولمايدۇ. داۋالاشتا سۇ ئىلىش ئۇسۇلى ئانچە ئاقىلانلىق ئەمەس.

يۈرەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلۇشى

يۈرەك ھەرىكىتى تېزلىشىدۇ، تومۇرى چوڭ، تېز، ئارقىدىن - ئارقا سالىدۇ، كۆكرەك قىسمى ئادەتتىكىدىن بەكرەك ئىسسىق.

سىق بىلىنىدۇ، سوغۇق سۇ ۋە سوغۇق ھاۋادىن راھەتلىنىدۇ، ئومۇمەن يۈرەكتە بىئاراملىق بولىدۇ، بەزىدە زىيادە ھارارەت سەۋەبىدىن بەدەندىكى ھۆللۈك تارقىلىپ كېتىپ ئورۇقلاش كۆرۈلىدۇ.

قىزىل گۈلگەنتىگە ئازراق چىلاپا ئارىلاشتۇرۇپ بېرىش بىلەن ئىچىنى بوشتىتىپ تۇرۇش كېرەك. سەندەل، كاپۇرنى گۈلاپقا سۈرۈپ كۆكرەككە چېپىش پايدىلىق. زىيانلىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش، ھاراق ئىچمەسلىك، تاماكا چەكمەسلىك، ياخشى ھاۋادا سەيلە قىلىش، غەم قايغۇلارنى يوقىتىش، يېمەك - ئىچمەكنى ياخشىلاش لازىم. چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىقى، ئۇچار قاناتلىقلار گۆشى بولۇپمۇ چۈجە، قۇشقاچلارنىڭ گۆشى پايدىلىق. سالقىن ھاۋادا ئارام ئېلىش، خۇش بوي سوغۇق گۈلاپلار ياكى خۇش پۇراقلىق گۈللەرنى پۇرۇتۇش، ياخشى داۋالاش ۋە مۇۋاپىق پەرۋىش قىلىشنىڭ ئۇزۇنراق داۋام قىلىشى كېسەلنى تەدرىجىي ساقىيىشقا سەۋەبچى بولىدۇ.

يۈرەك مىزاجىنىڭ سوغۇقتىن بۇزۇلۇشى

يۈرەك ھەرىكىتى ناھايىتى سۇس بولىدۇ، تومۇرىمۇ ئاستا ۋە ئىنچىكە سالىدۇ، نەپەس ئاستىلايدۇ، كۆڭلى ئىسسىق نەرسىلەرنى تارتىدۇ.

ئومۇمىي بەدەنگە قۇۋۋەت يەتكۈزۈش ۋە ئىسسىقلىق يەتكۈزۈش لازىم. غىزائى مۇتلەق ۋە غىزائى داۋالار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش، قوي گۆشى، كەپتەر گۆشى، توخۇ، قۇشقاچ گۆشى، كەكلىك گۆشلىرىگە دارچىن، زەپەر، زىرە، ئۇد قاتارلىق خۇش بوي دورىلارنى سېلىپ بېرىش ياكى ئىككى باشلىق ئىرىك قوي گۆشىدە شورپا، كاۋاپ قىلىپ بېرىش لازىم. قۇرۇقلۇقتىن بولغان سوۋى مىزاج سەزەج يۈرەك كېسەلىدە

ئومۇمىي بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش ئاساس قىلىنىدۇ
 ھاۋاسى ھۆل ۋە ساپ جايىلاردا سەيلى قىلسا پايدىلىق
 ھۆللۈكتىن بولغان سوۋى مىزاج سازەج يۈرەك كېسىلىدە
 بەدەننى تەتقىقە قىلىش، ئىسسىقلىق ۋە قۇرۇقلۇق دورىلارنى
 كۆپرەك ئىستېمال قىلىش، يۈرەككە قۇۋۋەت بەرگۈچى، مەسد-
 لىن: قەلەمپۇر، زەپەر، بادىرەنجى بۇيا قاتارلىقلار بېرىلىدۇ.
 جىسمانىي ھەرىكەت ۋە نورمال پائالىيەت قىلىش، تاماق مىقدارى
 ئاز، سىڭىشلىق بولۇشى لازىم. قورۇلغان گۆش ۋە تەبىئىي
 قۇرۇق ئىسسىق دورا - دەرمانلارنى ئىچىش، مونچىدا تەرلى-
 نىش، قۇرغاق جايىلاردا تۇرۇش پايدىلىق. كەپتەر ۋە باچكا گۆ-
 شى، توشقان گۆشى، قۇشقاچ گۆشى ۋە تورۇلغۇ گۆشىنى كاۋاپ
 قىلىپ يېيىش، نوقۇت سۈيى ئىچىش، ئۈزۈم، ياڭاقلىرىنى ئىس-
 تېمال قىلىشى لازىم.

يۈرەك سانجىقى

يۈرەكتە ئۇشتۇمتۇت قاتتىق سانجىق ۋە ئاغرىش پەيدا بول-
 دۇ، بۇ ئاغرىق ئاشقازان كىرىش قىسمىغا تارقىلىدۇ. بىماردا
 كۆكسى سىقىلغاندەك ھېس قىلىدۇ. ئاغرىق سول تەرەپ مۇرە،
 غول، جەينەك ۋە قول ئۇچلىرىغىچە تارقىلىدۇ. بىمار مىدىرلى-
 يالماي قالىدۇ. كېلەركى نۆۋەتتە بۇنىڭدىنمۇ قاتتىق تۇتىدۇ.
 ھاراق، تاماكا، قېنىق چاي، سېمىز گۆشتىن چەكلەش،
 ئاسان سىڭىدىغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. بۇنداق
 بىمارلار غەزەبلەنمەسلىك، نازۇك بولماسلىق، ئېغىر جىسمانىي
 ھەرىكەت قىلماسلىق، تىنچ ئارام ئېلىپ، خاتىرجەم تۇرمۇش
 كەچۈرۈش لازىم. ئېگىز يەرگە چىقىش، يۈگۈرۈش، ئېغىر نە-
 سە كۆتۈرۈش خەتەرلىك، جىنسىي ئالاقىمۇ زىيانلىق.

ئىسسىقتىن بولغان خەفەقان

ئۇسسۇزلۇق كۆپ بولىدۇ، تومۇرى تېز سوقىدۇ، سوغۇق ھاۋا ۋە باشقا سوغۇق نەرسىلەردىن راھەتلىنىدۇ. ماش، پۇرچاق ۋە قوناق ئۇنى ئاساس قىلىنىپ تاماق ئېتىپ بېرىلىدۇ، قاپاق سۈيى، زىرىق ياكى چىلان سۈيى ئىچكۈزۈلىدۇ، قەۋزىيەت بولۇشتىن، مايلىق ۋە ئاچچىق تاماق يېيىشتىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ. ھاراق، تاماكا قاتتىق چەكلىنىدۇ. غەزەپلىنىش ۋە قايغۇ - غەمىدىن يىراق تۇتۇلىدۇ، ئاپتاپ ئۆتۈپ كېتىش، ئاچ قېلىش ياكى قۇمغا چۈشۈش بىمارنىڭ ھاياتىغا تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ.

سوغۇقتىن بولغان خەفەقان

سوغۇق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندا ئارام تاپىدۇ، تومۇرى ئاجىز، سۇس سوقىدۇ ھەم توختاپ - توختاپ سالىدۇ، تەشەنلىق بولمايدۇ. قان كۆپەيتكۈچى دورا ۋە تاماقلار بېرىلىدۇ، ئادەم شالاڭ ۋە ھاۋاسى ساپ يەرلەردە ئارام ئالدۇرۇلىدۇ، تاتلىق ئانار، بادام، ھالۋا، ھەسەل، باققالى، ۋە ئۇستىخان سورپىسى ئىستېمال. مال قىلدۇرۇلىدۇ، ئون تامىقى ئۈچۈم خېمىر تۇخۇم بىلەن يۇغۇرۇلىدۇ، قىزىقارلىق كىتابلار ئوقۇلىدۇ، تەسەللىي ۋە ياردەم تۈرىدىكى سۆھبەتلەرگە قاتناشتۇرۇلىدۇ.

ماغدۇرسىزلىقتىن بولغان خەفەقان

بۇ كېسەل ئادەتتە بەدەندىن كۆپلەپ قان چىقىپ كەتكەندە ياكى كۆپ ئىچى سۈرگەندە ياكى ئوزۇقلىنىش يېتەرسىز بولغاندا ھەم زىيادە جىسمانىي ئەمگەك قىلغاندا بەدەندە ھۆللۈك يوقىلىپ، يۈرەك قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. ئەقلىي ۋە جىسمانىي ئەمگەكتىن توختىلىپ، ھەسەل سۈيى بېرىلىدۇ ۋە ياخشى ئارام ئالدۇرۇلىدۇ، جاراھەت ئېغىزى داۋالد-نىدۇ، ئىچى توختىتىلىدۇ، ھەيزى نورماللاشتۇرۇلىدۇ، تامىقىغا ھەر خىل قۇش گۆشلىرى بېرىلىدۇ، نوقۇت شورپىسى ئىچكۈ-زۇلىدۇ، ياپما، پوشكال، سۈتلۈك نان، باققالى يېگۈزۈلىدۇ، چۈچۈمەل ۋە ئاچچىق نەرسىلەر چەكلىنىدۇ.

سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىشتىن بولغان خەفەقان

بىمار قارماققا كۈچلۈك ھەم ساغلامدەك بىلىنىدۇ، زەئىپ-لىك ئالامەتلىرى تېپىلمايدۇ، پەقەت يۈرەكنىڭ روھىي قۇۋۋەتلىرىنىڭ تارقىلىپ كېتىشى سەۋەبىدىن يۈرەكنىڭ ھېس - سېزىمى كۈچىيىپ قالىدۇ، بۇنىڭ بىلەن ئادەتتە غەم - ئەندىشە، غەم - قايغۇ بولغاندا، خۇشاللانغاندا ھەم زىيادە سوغۇق ياكى ئىسسىق سۇنى ئىچكەندە خەفەقان كېلىپ چىقىشقا سەۋەبچى بولىدۇ. تومۇ-رى چوڭ ۋە كۈچلۈك سوقىدۇ، بەدەننىڭ باشقا پائالىيەتلىرى نورمال بولىدۇ.

بىمار ياخشى ئارام ئالدۇرۇلىدۇ، نېرۋىسىنى كۈچەيتكۈچى دورا ۋە تاماقلار بېرىلىدۇ، پىسخىك مەسلىھەت ئېلىشقا ئىلھاملاندۇرۇلىدۇ، ئۆزىنىڭ جىسمانىي، روھىي ۋە ئىقتىسادىي ئەھۋالى-

غا يارىشا ئىش قىلىشقا ئىلھاملاندۇرۇلىدۇ. قويۇق ۋە يەللىك تاماقلار چەكلىنىدۇ. زۆرۈر بولسا مەخسۇس داۋالىتىلىدۇ.

يۈرەك سىقىلىش

يۈرەك ئۇششۇمىتۇت ئېغىپ كېتىدۇ، ۋە مۇجۇغاندەك ياكى بىر نېمە سىققاندەك بولىدۇ، تومۇر بوش ۋە ئاستا سالىدۇ، كۈندە بىر نەچچە قېتىم باش قاينىدۇ ياكى تەڭگىل دەرىجىدە ھۆشسىزلىنىدۇ.

تاماققا سۈت، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، ئۇچار قۇشلار گۆشى ۋە ئالما، ئانار قاتارلىق مېۋىلەر بېرىلىدۇ.

يۈرەك ھاۋالىنىشنىڭ بۇزۇلۇشى

مەيدە ئېغىرلاشقاندەك، يۈرەك ئاغرىۋاتقاندەك سېزىم بولىدۇ. بەزىدە شۇرۇلىدىغاندەك تۇيۇلىدۇ.

يۈرەكنى كۈچەيتكۈچى دورىلار ۋە يۈرەككە مەخسۇس پايدا قىلىدىغان داۋالىغىچىلار بېرىلىدۇ. داۋالىغىشنى مۇنتىزىن، جەۋارىش ئەنەرى، جەۋارىش ئۇد شېرىن، ھەببى جەدۋار ئەنەرى، نۇشىدار لولۇۋى، خېمىرى مەرۋايىت بېرىلىدۇ. شەرىپىتى فەۋا-كىمى (مېۋىلەر قىيامى)، ئۇچار قۇش گۆشى، سۈت، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، ئانار سۈيى، مائۇللەھمى، مائۇللەسەل، ئەرتقى شىر، ئەرتقى رەيھان بېرىلىدۇ. بەدەننى ئوزۇقلاندۇرۇش، ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش ئۈچۈن باشقا چارە - تەدبىر - لەرمۇ قوللىنىلىدۇ.

يۈرەك قېپى ياللۇغى

يۈرەك ساھەسىدە ئاغرىش بولىدۇ، نەپەس سىقىلغانلىقى بىلىنىدۇ، يۈرەك چاۋالغۇيدۇ (قوزغىلىدۇ، ئاغىدۇ)، باشلىنىد- شىدا قىزىتما، جۇغ - جۇغ بولۇش، باش ئاغرىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

ئاسان زۇكام بولۇشتىن ساقلىنىلىدۇ. ئاچچىق، چۈچۈمەل نەرسىلەر يېيىلمەيدۇ، تۇرۇپ قالغان ۋە ئېچىغان تاماق بېرىلمەي- دۇ، ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلار ۋە قانىنى جانلاندۇرغۇچى باشقا نەرسىلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، يۈرەك خىزمىتىگە زىيان قىلماسلىق ئالدىنقى شەرتى بىلەن ياللۇغقا قارشى ئاماللار قوبۇل قىلىنىدۇ.

يۈرەك قاپقاڭلىرى ئىششىقى

بۇ كېسەلدە يۈرەكنىڭ قاپقاڭلىرى ئىششىپ بىمارنىڭ چىرا- ى سارغىيىپ قالىدۇ. نەپەس ئېلىشتا ئېغىرلىق ۋە قىستىلىش بولىدۇ. يۈرەكنىڭ تارپىش ھەرىكىتىدە سوزۇقلۇق ھېس قىلىد- دۇ. يەڭگىل يۆتەل بىلەن ئاغرىش بۇ كېسەلگە ھەمرا بولىدۇ. تومۇرنىڭ سوقۇشى قاتتىق سۈيىدۈكنىڭ رەڭگى تىق قىزىل بولىدۇ.

چارچاش ۋە دىققەتچىلىكتىن ساقلىنىش لازىم. تامىقىغا ئا- سان سىڭىدىغان قۇۋۋەتلىك تاماقلار بېرىلىدۇ. ئىككىلىملىك قاينىتىلغان سۇغا سىركە، گۈلابتىن ئازراق قوشۇپ ئىلماق ھالدا نۇتۇل قىلىنىدۇ.

ئايلىنىپ كېتىش (غەشىە)

بىمار ئومۇمىي بەدىنىنى ماغدۇرسىز ھېس قىلىدۇ. ئاغزى

قۇرۇيدۇ. سوغۇق تەرلەيدۇ. نەپەس تېز ۋە يۈزە بولىدۇ. چىرايى تاتىرىپ كالىپۇكى كۆكىرىپ كېتىدۇ. روھىي جەھەتتىن بىئارام بولىدۇ. تومۇرى رەتسىز سوقۇپ، پۇت - قولى مۇزلاپ كېتىدۇ.

يۇقىرى قان بېسىم كېسىلى

بۇ كېسەلگە يېڭى گىرىپتار بولغاندا باشنىڭ ئارقا قىسمى بويۇن قوشۇلۇپ ئاغرىيدۇ. باش قايدۇ. كۆز قاراڭغۇلىشىدۇ. بۇرۇن قانايدۇ. ئۇيقۇ قاچىدۇ. بەزىدە يۈرەك قوزغىلىدۇ. كۆك-رەك قىسىلغاندەك ھېس قىلىدۇ. كېسەل ئېغىرلاشقاندا ئەمگەك-تىن كېيىن يۈرىكى سېلىش ۋە دېمى سىقىلىش بولىدۇ. يۆتىلىدۇ. كۆپۈك بەلغەم كېلىدۇ مېڭە قان تومۇرلىرى كۈچلۈك تارتىشىۋالسا ۋاقىتلىق كۆرمەس، سۆزلىيەلمەس، قول - پۇتلىرى ھەرىكەتتىن قالىدۇ

1. غەم - ئەندىشەلەرنى ئۆزىدىن يىراقلاشتۇرۇپ ئىمكان بار روھىي غىدىقلاشلاردىن ساقلىنىش كېرەك.

2. قان بېسىمى بەك ئۆرلەپ كەتمىگەن ئەھۋالدا جىسمانىي ئەمگەكتىن پۈتۈنلەي قول ئۈزۈپ كەتمەي مۇۋاپىق ھالدا ئەمگەك مەشغۇلاتلىرى ۋە يېنىك تەنتەربىيە مەشغۇلاتلىرى بىلەن شۇغۇللىنىش، پىيادە يول يۈرۈش، بەدەننى چېنىقتۇرۇش لازىم. دائىم ھەرىكەت قىلماي يېتىۋېلىش كۆپ ھاللاردا بەدەننى سۇسلاشتۇرۇپ، ئەزانى بوشىتىپ بەدەندە سۇيۇقلۇق يىغىلىپ قېلىپ ئىش-شىق پەيدا بولۇشقا سەۋەبچى بولىدۇ.

3. ھاراق ئىچمەسلىك، تاماكا چەكمەسلىك، تۈزنى ئازراق ئىستېمال قىلىش لازىم. چۈنكى تۈز بەدەندە بولۇپمۇ بۆرەكتە چۆكمە ھاسىل قىلىپ بۆرەك خىزمىتىنى بۇزۇپ ئىششىقنى كۈچەيتىپ كېسەلگە يامان تەسىر كۆرسىتىدۇ. سېمىز كىشىلەر

ئىمكانقەدەر ئورۇقلاشنىڭ ئامالىنى قىلىشى كېرەك. 4. مېۋە - چېۋىلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش، بولۇپمۇ شائوت، ئاق ئۈجمە، ئۈزۈم، شاپتۇل قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش، قىش كۈنلىرى ھېچ بولمىغاندا ئۇلارنىڭ قۇرۇتۇلغان قېقىنى يەپ بېرىشى كېرەك. بولۇپمۇ تاۋۇز سۈيى كۆزگە كۆرۈنەرلىك مەنپەئەت قىلىدۇ، بۇنى تەبىئەت كۆتەرگۈچىلىك ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

غىزالاردىن بەدەندە يىغىلىپ قالمايدىغان، ئاسان ھەزىم بولىدىغان، قاننى قويۇقلاشتۇرمايدىغان غىزالارنى ئىستېمال قىلىش لازىم. مەسىلەن، ئارپا يومىدىنى، ماش پۇرچاق سېلىنغان شورپا گۈرۈچ قاتارلىقلار؛ تۈرلۈك كۆكتاتلاردىن بەسەي، پالەك، تۇرۇپ، چامغۇرلارنىڭ خۇسۇسەن كۆك چىگىسىنىڭ قان بېسىمىنى چۈشۈرۈشتە رولى خېلى چوڭ. ئۇندىن باشقا ماش ئۈندۈرمىسى، دوفۇ، قارا ئۆرۈك، پىنتوزا سېلىنغان دوڭلە (پىنتاڭ) لار پايدا قىلىدۇ. ئەيتۇلا مۇراپباسى، قارا ئۆرۈك مۇراپباسى، ئالۇچا مۇراپباسى، بۆلدۈرگەن مۇراپباسى بۇ كېسەلگە ئالاھىدە پايدا قىلىدۇ.

قان ئازلىق

تېرە ئاقىرىپ قانسىزلىنىش، ھارغىنلىق - ماغدۇرسىزلىق، باش قېيىش، كۆز قاراڭغۇلىشىش، قۇلاق غوغۇلىداش، باش ئاغرىش، ئەستە تۇتۇش تۆۋەنلەش، تەپەككۈرنى بىر يەرگە يىغالماسلىق، ئاشقازان - ئۈچەي خىزمىتى ياخشى بولماسلىق ئىشتىھا تۇتۇلۇش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

ھەفزى سېھەت (ساقلىقنى ساقلاش) تەلىپىگە لايىق بولمىغانلىقتىن كېلىپ چىققان قان ئازلىقلاردا ئوزۇقلىنىشنى كۈچەيتىش، سۈپىتىنى ھەفزى سېھەت تەلىپىگە لايىقلاشتۇرۇش،

يەنى ئوزۇقلۇقلار گۆش، ماي، شېكەر، سۈت، تۇخۇم، ھەرخىل كۆكتات ۋە ھەرخىل پۇرچاق، دادۇر، نوقۇتلاردىن تەركىپ تاپقان بولۇشى زۆرۈر. سەۋەبى بولغان كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا شۇ كېسەللىكلەردە كۆرسىتىلگەن داۋالاش تەدبىرلىرى بويىچە داۋالا- ش ۋە ئالدىنى ئېلىش لازىم. قان كۆچەيتكۈچى دورىلاردىن: تاتلىق ئانار شەرىتىنى ئىشلىتىش لازىم. چۈنكى ئۇ قان ئازلىق- نى داۋالاشتا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ مۇرەككەپ دورىلار قىسمىغا قارالسۇن.

موزاي، قوي، ئۆچكە جىگەرلىرىنى چالا كاۋاپ قىلىپ ئۇ- نىڭغا زىرە، ئارپا بېدىيان سېپىپ يېيىش لازىم. سۈت ئىچىش، يېڭى قايماقنى يېيىشى، يېڭى سەۋزىنى قى- رىپ مېچىپ سۈيىنى چىقىرىپ بىر ئاز ئىسسىتىپ داۋاملىق ئىچىپ بېرىش قاتارلىقلار قان كۆپەيتىپ كىشىنى ماغدۇرلاندۇ- رىدۇ.

سۈت ئازلىق

قان ئازلىق سەۋەبىدىن سۈت ئازىيىپ كېتىدۇ، بەدەن رەڭ- گى سارغىيىپ قالىدۇ، ئورۇقلاش، ئاجىزلىشىش كۆرۈلىدۇ. ھەرقانداق ئۇن تامىقىغا تۇخۇم قوشۇپ بېرىلىدۇ، ھالۋا، ھەسەل، باققالى، سۈتلۈك توقاچ، تاتلىق ئانار ۋە ھەرخىل تاتلىق مېغىزلار دائىم ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ، پاقلان گۆشى، قوچقار گۆشى يېگۈزۈلىدۇ، تونۇر كاۋىپىمۇ خىل كېلىدۇ. يۈم- ىخاقسۇت، چىڭسەي، گاڭپەن، لەڭپوڭ، توخۇ قوردىقى (داپەن- جى) قاتتىق چەكلىنىدۇ.

ئىسسىقلىقتىن بولغان ئەمچەك ياللۇغى

ئەمچەكتە ئاغرىش، چىڭقىلىش سېزىمى بولىدۇ، قىزىرىد-

دۇ، قىزىدۇ ھەم قان ياكى سەپرانىڭ غالىبلىق ئالامەتلىرى تېپىلىدۇ.

ئېغىر، مايلىق تاماقلارنى ۋە سامسا، كالا گۆشى يېيىش-تىن، سىرتىدىن ئىسسىقلىق مايلىرىنى سۈركەشتىن ۋە سېقىشتىن پەرھىز قىلىنىدۇ. دۈم يېتىش، ئېغىر نەرسە كۆتۈرۈش ۋە بېسىلىشتىن ساقلىنىدۇ. بالا ئېمىتىش قاتتىق چەكلىنىدۇ.

سوغۇقتىن بولغان ئەمچەك ياللۇغى

بەلغەم ياكى سەۋدانىڭ غالىبلىق ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. ئاغ-رىش يەڭگىل بولىدۇ، ئەمچەك قاتتىقلىشىدۇ، لېكىن قىزىتما بولمايدۇ، ئەمچەك قىزىرىدۇ.

چۈچۈمەل ۋە ئاچچىق تاماقلار، لەڭپۇڭ ۋە دۇغاپتىن پەرھىز قىلىنىدۇ. سوغاق سۇ بىلەن يۇيۇشقا بولمايدۇ، يىرىك ئىچكىم مۇۋاپىق ئەمەس.

قاتتىقلىشىش خاراكتېرلىك ئەمچەك ياللۇغى

بەلغەمدىن بولغان ياللۇغلىنىشتا تۇتقان ۋاقىتتا يۇمشاق بولىنىدۇ، سەۋدادىن بولغان ياللۇغلىنىشتا رەڭگى قارىغا مايىل بولىدۇ ھەم تۇتقان ۋاقىتتا قاتتىق بىلىنىدۇ.

مەخسۇس ئاپپاراتلار ئارقىلىق تەكشۈرۈپ سۈرەتنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسىگە ئاساسەن ئېھتىيات بىلەن دىئاگنوز قويۇلىدۇ. تاللىشىش ئېغىر بولسا ھەمدە مەلۇم ئورۇندا قويۇق ۋە قاتتىق ماددا بولسا ئوپىراتسىيە ئارقىلىق ئېلىۋېتىلىدۇ. تاللىشىش بەڭگىل ۋە سۈرتىنى سۈزۈكرەك بولسا مەخسۇس تەييارلانغان دورىلار ئارقىلىق توسالغۇلار ئېچىلىدۇ. تۇرۇپ قالغان تاماق، ئىسپىرت-لىق ئىچىملىك قاتتىق چەكلىنىدۇ.

گال چاقىسى (ئانگىنا)

گال ئىچىدە كىچىك - كىچىك مۇدۇرچاقلار ھەم بەلغەم بولىدۇ، شۇڭا بىمار دائىم يۆتىلىپ ھەتتا، ئاۋازى پۈتۈپ قالىدۇ، بەزىدە قىزىلئۆڭگەچتىمۇ مۇدۇرچاقلار پەيدا بولۇپ قېلىپ، تاماق يېيىش قىيىنلىشىدۇ، ئۆتكۈر چۈچۈمەل ھەم تۈزلۈك نەرسىلەرنى يېگەندە ئاغرىش ۋە ئېچىش كۈچىنىدۇ. ئاچچىق، قويۇق تاماقلار ھەمدە بازار تاماقلىرىدىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ئالدىراپ ئوكۇل سالدۇرۇش ھەتتا ئوپىراتسىيە ئارقىلىق ئالدۇرۇۋېتىش ئەڭ ياخشى چارە ئەمەس. بۇنىڭ ئۈچۈن بەدەننىڭ ئىمونىت كۈچىنى ئاشۇرىدىغان ھەمدە گالىنى سىلىقلايدىغان، بۇزۇلغان ماددىلارنى قان ئايلىنىش ئارقىلىق تارقىتىدۇ. خان مەخسۇس تېبابەت دورىلىرىنى ئىشلىتىش لازىم. ئىسپىرتلىق ئىچىملىك قاتتىق چەكلىنىدۇ.

گال قۇرغاقلىشىش

بىمارنىڭ چىرايى قارامتۇل بولىدۇ، ئېغىز تەمى ئاچچىق بولىدۇ، گال قۇرغاقلىشىدۇ، قىچىشىدۇ. ئالدى بىلەن بىمارنىڭ جىگەر، ئۈچەي ۋە تال خىزمىتى تەكشۈرۈلۈپ، خاتا دىئاگنوزنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. قورۇغان تالماق، قېزىل، كۈدە، قۇرۇق نان ۋە قىمىزدىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. غەزەپلىنىش، ھەسەت ۋە گۇمانخورلۇقتىن ساقلىنىدۇ، ئىگىزدە تۇرۇپ پەسكە قاراش، چۆچۈش ۋە ئەقلى ئەمگەكنى كۆپ قىلىش ناھايىتى بەك زىيان قىلىدۇ.

ئىسسىقتىن بولغان قىزىلىۋىڭگەچ ياللۇغى

قىزىيدۇ، قاتتىق ئۇسسايدۇ، ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسى قاتتىق ئاغرىيدۇ ھەم يەڭگىل دەرىجىدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. سەپىرادىن بولغىنىدا بۇ ئالامەتلەر نىسبەتەن ئۆتكۈر بولىدۇ، غىزانى يۇتقاندا قىيىنلىدۇ ھەم ئاغرىيدۇ، بۇ ئالامەتلەردىن كېيىن جۇغ - جۇغ بولۇپ ئىششىق پىشىپ يىرىك يىغىلغانلىقىنىڭ ئالامىتى بولىدۇ.

يىرىك نەرسە يەپ ياللۇغلانغان ئورۇن تېتىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. ئاچچىق ۋە ئىسپىرتلىق نەرسىلەر چەكلىنىدۇ. قابىز ۋە سوغۇق تەبىئەتلىك قارا ئۆرۈك چىلانمىسى، شاتۇت شەرىپىتى مەنپەئەت قىلىدۇ. جىگەر ۋە ئۆتكە زىيان قىلىدىغان ھەرقانداق يېمەكلىك ۋە دورا بۇ كېسەللىككە زىيان قىلىدۇ.

سوغۇقتىن بولغان قىزىلىۋىڭگەچ ياللۇغى

بۇنىڭدا ئاغرىق ناھايىتى يەڭگىل بولىدۇ، لېكىن ئىككى تاغاق سۆڭەك ئوتتۇرىسىدا زىيادە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ، ئۇسسۇز - لۇق ھەم قىزىتما بولمايدۇ. كونا ۋە تۇرۇپ قالغان تاماقلاردىن ۋە ئاچچىق يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. دۈمبە تەرەپتىن ئىسسىق ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئىمونتېت كۈچىنى ئاشۇرىدىغان، قان ئايلىنىشىنى ياخشىلايدىغان تىبابەت دورىلىرى يېگۈزۈلىدۇ، سوغۇق ئوكۇللار كۆپ سالدۇ - رۇلمايدۇ.

زۇكام ۋە نەزلە سەۋەبىدىن بولغان ئاۋاز پۈتۈش

نەزلەنىڭ ئالامەتلىرى ئىپادىلىنىدۇ، بولۇپمۇ ئىسسىق نەزلىدىكىگە ئوخشاش گالدا ئېچىش بولىدۇ، يۆتىلىدۇ، ئاۋازى پۈتۈپ قالىدۇ.

ئاۋۋال سەۋەبچى ماددىنى تازىلاشنى ئاساس قىلىش، خاتا داۋالاپ قويۇشتىن ساقلىنىش لازىم. بولۇپمۇ نەزلىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. بىمارنى ياخشى ئارام ئالدۇرۇش، كونا، ئاچچىق نەرسىلەرنى يەپ سېلىشتىن، ئېغىر ئەمگەكتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ.

ۋارقىراشتىن بولغان ئاۋاز پۈتۈش

يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىرىغاندىن كېيىن ئاۋاز پۈتۈپ قالىدۇ، گال ۋە يۇتقۇنچاقتا ئادەتتىن تاشقىرى قۇرۇقلۇق يەتكەنلىك بىلىنىدۇ.

يىرىك تاماقلار بېرىلمەيدۇ، ئۈزلۈك سۆزلەش ۋە ئۇزۇن جۈملىلىك سۆزلەرنى مەشىق قىلىشتىن پەرھىز تۇتۇلىدۇ. ئاچچىق، ئېغىر كېلىدىغان يېمەكلىكلەر ۋاقتىنچە يېيىلمەيدۇ، بادام مېيىنى قايناقسۇدا ئېرتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

ئىسسىقلىقتىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى

قورساققا يېقىمىسىزلىق بولىدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ، تۈكۈرۈك كۆپ كېلىدۇ، بەزىدە ئاچچىق سۇ ياندۇرىدۇ، كېكىرىدۇ، بەك ئۇسسايدۇ، قىزىيدۇ، قەۋزىيەت بولىدۇ، سۈيدۈكى ئاز كېلىدۇ، باش ئاغرىيدۇ، تىلىدا گەز بولىدۇ، كۆپىنچە قىزىتما بولىدۇ، ئېغىر بولسا ئارقىمۇ ئارقا كۆڭلى ئېلىشىپ قۇسىدۇ،

قۇسۇقىدا تاماق قالدۇقلىرى بولىدۇ، تومۇرى تېز، ئىنچىكە سوقىدۇ.

قارامور، لازا قوشۇلغان ھەرقانداق تاماقتىن پەرھىز قىلىدۇ، ھاراق ئىچىلمەيدۇ، قورساق ساھەسىگە ئىسسىق ئۆتكۈزۈلمەيدۇ، ئىسسىق ئۆتۈپ كېتىشتىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ. قايماق، مېۋە دەملەيمىسى ۋە يۇمشاق پىشقان پاقلان گۆشى (سوۋۇ-تولغان) مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئاشقازان يىرىغلىق يارىسى

ئاشقازان لۇقۇلداپ قاتتىق ئاغرىيدۇ. قۇسىدۇ كۆپىنچە ھاللاردا ئىچى سۈرىدۇ، ھارارەت كۆتۈرۈلىدۇ، قالايمىقان سۆزلىنىدۇ. يىرىك ئېغىز ئالغاندا بەدەن جۇغۇلداش ۋە كۆڭلى ئاينىپ يىرىك ئارىلاش تەرسىلەرنى قۇسىدۇ، ياكى قورسىقى ئاغرىپ قان - يىرىك ئارىلاش ئىچى سۈرىدۇ. ئىششىق يانغاندەك بولىدۇ. غىزاسىغا سۈت ۋە ئارپا سۈيىگە ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ، قاينىتىلغان كېپەك سۈيى ياكى بۇغداي ئومىچى بېرىلىدۇ. مۇ بولىدۇ.

بۇ چارىلەردىن كېيىن غىزاسىغا سېرىق چېچەك ۋە شۈمشە بىلەن پىشۇرۇلغان مېكىيان توخۇ شورپىسى بەرسە بولىدۇ.

سوغۇقتىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى

ھەزىم بۇزۇلۇپ، تاماق يېگەندىن كېيىن ئاشقازاندا ئېغىرلىق، يېقىمىسىزلىق، ئاغرىش بولىدۇ، ئارقىمۇ ئارقا كېكىرىدۇ، قورساق كۆپۈپ، كوركىرايدۇ، ئاشقازان ساھەسىنى باسقاندا قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ، چىش مىلىكى يېرىلىدۇ، ئېغىزدىن سېلىق پۇراق كېلىدۇ، شالۋاق كۆپ ئاقىدۇ، باش ئاغرىيدۇ، كۆپ

ئۇسسايىدۇ. قەۋزىيەت بولىدۇ، ئۇيقۇسى كەلمەيدۇ، سۈيدۈكى قىزىل، مىقدارى ئاز بولىدۇ، سۈيدۈكىنى قويۇپ قويغاندا ئۇنىڭ ئاستىغا چۆكمە چۈشىدۇ، تېرىلىرى قۇرغاقلىشىدۇ، بەدەن تاتىرىدۇ، بىمار كۈندىن - كۈنگە ئورۇقلاپ ئاجىزلىشىپ قالىدۇ. قەۋزىيەت بولۇشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. سوغۇق تەبىئەتلىك ھاراقىلار، سوغۇق ئىچىملىكلەر ۋە توغلاتقۇدا ئۇزۇن تۇرغان يېمەكلىكلەر قەتئىي ئىستېمال قىلىنمايدۇ. گاڭچىپەن، پالەك ۋە ياڭيۇ يېيىلمەيدۇ. گۇمانخورلۇق، تېرىككەكلىكتىن ساقلىنىدۇ. ھەسەل، قايماق بېرىلسە ۋە سىرتىدىن ئىسسىق ياغلار سۈركەلسە بولىدۇ.

سوزۇلما ئاشقازان ئىششىقى

تاماقنى تەرتىپكە سېلىش، ئەسلى سەۋەبىنى تېپىپ يوقىتىش، تاماقنى بەلگىلىك قاراردا يېيىش ھەمدە ئېغىر ۋە يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم. ھاراق، قويۇق چاي، قەھۋە - لەرنى ئىچمەسلىق، تاماكا چەكمەسلىق، ئەتىگەن ۋە كەچقۇرۇلۇق - قى ھاۋا ياخشى ۋاقىتلاردا سەيلە قىلىش، تاماق يېيىشنىڭ ئالدى - كەينىدە ئارام ئېلىش، غەم - قايغۇ، ھەسرەت ۋە قەۋزىيەتتىن ساقلىنىش لازىم.

بىمارنىڭ غىزاسى ئۈچۈن سۈت، ئادەتتىكى شورپا (شۈۋە - گۈرۈچ)، ماش پۇرچاق سېلىنغان سۇيۇق تاماقلار ۋە تېز سېڭىدىغان يېنىك تاماقلار بېرىلىدۇ. ئېچىشتۇرغۇچى ئۆتكۈر دورا ۋە لازا قاتارلىق يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش، ئاشقازان ساقلىنىش لازىم. باشقا چارە - لەر ئەھۋالغا قاراپ قىلىنىدۇ ياكى ئاشقازان ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلۇشىنى داۋالاشتىكى چارلەر بىلەن ئوخشاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

ئاشقازان يارىسى

ئاچچىق - چۈچۈك نەرسىلەرنى يەنى سىركە، قىچا قاتارلىق-
لارنى ئىستېمال قىلغاندا قاتتىق ئاغرىيدۇ، ھەزىم بۇزۇلىدۇ،
سېسىق پۇراقلىق كېكرىك كېلىدۇ، كۆڭلى ئېلىشىپ، كۆپ
قۇسىدۇ، ئېغىزى قۇرۇيدۇ، يەڭگىل قىزىتما بولىدۇ، ئاشقازان
كىرىش ئېغىزى قىسمى ياكى كىندىكىگە يېقىن ئۈستى تەرەپتە
ئاغرىق بولىدۇ، ئۇسسۇزلۇق زىيادە بولىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا،
قەي ۋە ئىسھال بىلەن بىللە ئازدۇر - كۆپتۇر قان ۋە يىرىك
بىللە چىقىدۇ. بەزىدە ھوشسىزلىنىپ بىمارنىڭ قول - پۇتلىرى
سۇۋۇپ كېتىدۇ.

ئالدى بىلەن روھىي جەھەتتىن قاتتىق پەرھىزلەر بۇيرۇلىد-
دۇ، ئۇندىن كېيىن ماددىي جەھەتتىن ئاچچىق، يىرىك ۋە سو-
غۇق، يېمەكلىكلەر، ھاراق - شاراپلار چەكلىنىدۇ. بولۇپمۇ
كونارغان، توڭلاتقۇدا ساقلانغان ھەمدە ھەر خىل تەم تەڭشىگۈچ-
لەر قوشۇلغان بازار تاماقللىرى قەتئىي بېرىلمەيدۇ. يۈگرەش،
سەكرەش، روھىي زەربىگە ئۇچراش ئەھۋاللىرى بۇ كېسەللىكنى
ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ.

ئاشقازان ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى

ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسىدا كۆپرەك قورساق ئاچ
ۋاقتىدا يېرىم كېچىدە ئاغرىيدۇ، ئاغرىش دۈمبە تەرەپتە بولىدۇ.
ئاشقازان ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسىنى داۋالاشتا ئاش-
قازاننى غىدىقلاپ ئېچىشتۇرىدىغان نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش،
روھىي كەيپىياتنى ياخشىلاش، ئەھۋال ئېغىر بولسا ئورۇندا
ياتقۇزۇپ داۋالاش كېرەك. تامىقى ئۈچۈن ئوزۇقلۇققا باي، ئو-

ئىككىنچى ھەزىم قىلىدىغان تاماقلارنى بېرىش، ئاز - ئازدىن كۆپ قېتىم يېيىش كېرەك.

ئاشقازان يارىسىنى داۋالاش جەريانىدا ئىككىنچى قېتىم قېلىش-تىنىش ساقلىنىش، ئىككىنچى يۇمشىتىش، تاماق ۋە كەچكى ئۇيقىدىن بۇرۇن يېرىم سائەت ئاۋۋال ھەرقېتىمدا 50 گرامدىن ھەسەلنى يېرىم پىيالە قايناق سۇ بىلەن ئېرىتىپ ئىچىپ تاماق يېسە، يارىنى مۇھاپىزەت قىلىپ، يامان تەسىرلەردىن ساقلاپ، يارىنىڭ ساقىيىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. كەچتە ئىچكەن ھەسەل سۈيى يۇقىرىقىلاردىن باشقا يەنە ياخشى ئۇخلىتىش، تەرەتنى يۇمشىتىش رولىنى ئوينايدۇ.

پەرھىزگە دىققەت قىلىپ، ئىزچىل تۈردە ئاكتىپ داۋالانسا كۆپىنچە ھاللاردا ساقىيىپ كېتىدۇ. ئەكسىچە بولسا ئاقىۋىتى ياخشى بولمايدۇ. كەمقانلىق، بۈرەك ئېغىش، باش قېيىش كېسەللىكلىرى كېلىپ چىقىدۇ.

ئاشقازان كۆپۈش

ئاشقازاندا ئىسسىقلىق ياكى سوغۇقلۇقنىڭ ئالامىتى بولمىدى، كېكىرىدى، كۆركىراش ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ، ئاشقازاننى باسقاندا بىئاراملىق بولىدۇ، ئەگەر ئۆتكۈر ھارارەت تۈپەيلىدىن قىزىتما پەيدا بولسا، ئاشقازان ئېچىشىدۇ. قورساق ئاچمايدۇ، سۈيىدەك رەڭگى سېرىق بولىدۇ.

ئاشقازان سۇيۇقلۇقىنى تەڭشەش ئۈچۈن بېھى، ئاچچىق ئانار سۈيى ۋە زىرە سۈيى بىللە ئىچكۈزۈلىدۇ، قاتتىق ئىسسىقلىق دورىلار چەكلىنىدۇ، كالا گۆشى سامسىسى، يەللىك تاماقلار پەرھىز قىلىنىدۇ، ئەگەر زۆرۈرىيەت بولسا قوستۇرۇش چارىسى قوللىنىلىدۇ، بىراق سېرىق چىچەك ئىچكۈزۈشكە بولمايدۇ.

ئاشقازان ئاغرىش

ئىسسىقلىقتىن بولغان ئاشقازان ئاغرىشتا ئاشقازان قىزىش، ئېچىش، ئۇسسۇزلۇق زىيادە بولۇش، ئېغىز قۇرۇش، سوغۇق نەرسىلەر پايدا قىلىش قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ. سوغۇقتىن بولغان ئاشقازان ئاغرىشتا ئەكسىچە بولىدۇ. يەل تولۇشتىن بولغان ئاشقازان ئاغرىشتا قورساقنى غولدىرلاش ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ. يېمەكلىك بۇزۇلۇشتىن بولغىنىدا ئاچچىق كېكرىك كېلىدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ، بەزىدە تۇيۇقسىز قۇسىدۇ. ئەھۋالىغا قاراپ ھەر خىل مېۋە سۇلىرى بېرىلىدۇ. ئېغىر ۋە گۆشلۈك تاماقلار ۋاقتىنچە بېرىلمەيدۇ. بولۇپمۇ ئاشقازان ئاستى بەز خىزمىتى تولۇق تەكشۈرۈلگەندىن كېيىن ھەزىمنى ياخشىلىغۇچى داۋايى غىزالار يېگۈزۈلىدۇ، بىراق قارىمۇچ ۋە ئاقمۇش قوشۇلۇپ قالمىغاي.

ئاشقازان خىزمىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى

ماددىسىز ئىسسىقلىقتىن بولغىنىدا ئۇسسۇزلۇق زىيادە بولىدۇ، كېكرىدۇ، ئىسسىق، ئۆتكۈر (ئاچچىق) نەرسىلەرنى يىگۈسى كەلمەيدۇ، سوغۇق نەرسىلەرنى ياخشى ھەزىم قىلىدۇ ھەم سوغۇق غىزالار ياخشى پايدا قىلىدۇ، سېسىق كېكرىدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ، بەزىدە قۇسىدۇ، سۈيدۈكى سېرىق، چوڭ تەرتى قۇرغاق كېلىدۇ. تومۇرى ناھايىتى تېز، ئارقىمۇ ئارقا سالىدۇ، مىزاج سوغۇق (بەلغەم) دىن بۇزۇلغان بولسا قورساق ئاچمايدۇ، ئاچچىق ۋە تۈزلۈك نەرسىلەرنى يېيىشنى خالايدۇ، بەزىدە يالغان ئۇسسۇزلۇق بولىدۇ، قورساق كۆپىدۇ، ئاچچىق كېكرىدۇ، ھۆ بولىدۇ، قۇسىدۇ، سەۋدادىن بولغىنىدا قورساق بەك ئاچىدۇ، ھەزىم ئاجىزلىشىپ كۆپۈش ئېغىر بولىدۇ، قورساق ئاچ ۋاقتىدا

ئاشقازان كۆيۈشىدۇ، قەي ئارقىلىق سەۋدا ماددىسى چىقىپ كەتسە ئېچىش پەسىيدۇ.

ئارتۇقچە رىقابەت، كۆڭۈل ئاغرىقى ۋە ئەھمىيىتى يوق جەد-دەللەردىن ئۆزىنى چەتكە ئېلىش، كۈچلۈك ھاراقىلاردىن پەرھىز قىلىش، سوغۇق تەبىئەتلىك شەرىپەت ۋە كۆكتاتلىرىنى ۋاقىتتىنچە بولسىمۇ تەرك ئېتىش لازىم. كەچكىچە ئۇخلىماسلىق، تاماق يېمەي زورۇقۇپ ئىشلەش، ھەسەت قىلىش ياكى سەھەتكە ئۈچ-راشمۇ ناھايىتى زىيانلىق، ھەسەل، سەۋزە، پاقىلان گۆشى، قويىنىڭ ئاشقازىنى، قايماق قاتارلىقلار مەنبەئەتلىك.

ھەزىم ئاجىزلىقى

بۇ كېسەلدە ئاشقازان مىزاجىنىڭ ماددىسىز ئىسسىقلىق بولغان بولسا، ئۇسسۇزلۇق كۆپ بولىدۇ. ئېغىزى لاۋزا تېتىيدۇ، ياكى بېلىق پۇرىقىدەك سۇيىغىلىدۇ. سوغۇق نەرسىلەرگە كۆڭلى تارتىدۇ. ئەگەر ئاشقازان مىزاجىنىڭ سوغۇقلىقتىن بولغان بولسا ئۇسسۇزلۇق بولمايدۇ، ئىسسىق نەرسىلەرگە كۆڭلى مايىل بو-لۇشتەك ئامىللار بولىدۇ.

بۇ كېسەلنى داۋالاشتىكى ئەڭ ياخشى چارە تاماقلاندىنى رەتكە سېلىش، سۈپەتنى ياخشىلاپ، ساننى كېمەيتىش، بەلگىلىك ۋاقىتتا تاماقلاندىنى ئىبارەت. يەڭگىللىرى شۇنىڭ بىلەنلا سا-قىنىپ كېتىدۇ. داۋالاش لازىم تېپىلغاندا ئەسلى سەۋەبىنى ياخشى ئېنىقلاپ، سەۋەبىگە قارىتا داۋالاش لازىم.

تامىقىغا ئاساسەن سىڭىدىغان ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى بولغان تاماقلار بېرىلىدۇ. بەك تويۇنۇپ تاماق يېيىش، تەستە سىڭىدىغان يەللىك تاماقلارنى مەسلەن، پىياز، كالىدەك بەسەي قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش، قورۇلغان ۋە قىيمىلىق تاماق-لارنى يېيىش، تاماقنى تېز ۋە قالايمىقان يېيىشتىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

ھەزىم ناچارلىشىش

قوساق كۆپىدۇ، يېگەن تاماق مەيدىسىدە تۇرۇۋالغانلىقىنى بەزىدە ئېچىشتۇرۇۋاتقانلىقىنى سېزىدۇ. سېسىق كىكىرىدۇ، كۆڭلى ئايىنىدۇ. بەزىدە قۇسىدۇ، چوڭ تەرىتى ئادەتتىن تاشقىد-رى سېسىق پۇرايدۇ. ۋە باشقىلار.

تاماق مىقدارىنى ئىزايتىش، تاماقلانۇش ۋاقتىنى قاتتىق تىزگىنلەش، قورساق تازا ئېچىپ ئىشتىھا تولۇق تارتقاندا دار-چىن، قارامۇچ، زەپەرلەر بىلەن خۇش پۇراقلاشتۇرغان كەكلىك، چۈجە، توخۇ قاتارلىقلارنىڭ شورپىسىغا ئوخشاش تېز سىڭىدىغان تاماقلار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇلىدۇ. نورمال ھالدا تەنھەرىكەت قىلىش، مۇنچىغا چۈشۈش، ئاشقازان سەھەسىنى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇش ياكى ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ بېرىش، قول - پۇتلىرىنى سوغۇق سۇغا چىلاپ تۇرۇشقا ئوخشاش ھەزىمگە ياردەم بېرىدىغان چارىلەرنى قوللىنىش لازىم.

ئىشتىھا بۇزۇلۇش

غەيرىي نورمال نەرسىلەرنى يېيىش خاھىشى بولىدۇ، مەسىلەن: توپا، سېغىز، ھاك قاتارلىقلارنى يېيىشنى خالايدۇ. تامىقىنى تەرتىپكە سېلىش، ھەر خىل دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى يېگۈزۈش، بىر خىللا تاماق تۈرىگە ئۆگىنىپ قالماسلىق لازىم. قوشۇمچە ئوزۇقلۇق تولۇقلانغاندا ھەر خىل ھايۋانىي يېمەك-لىكلەر ھەمدە رايك، تاسما بېلىق قاتارلىقلارنى بېرىش، ھاراق ۋە لازىدىن ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىش كېرەك.

ھەزىمنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشى

بۇ كېسەلدە چىرايى تاتىرىش دېمى سىقىش، ئاشقازاندىن يەل ئۆرلەش سەۋەبلىك باش ئاغرىش، ئاشقازان ئاغرىش، ھىق تۇ- تۇش، ھورۇنلىشىش، ماغدۇرسىزلىنىش، قورساق كۆپىشىپ كۆڭلى ئاينىش، ئىچى سۈرۈش بەزىدە ئىچى قېتىشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ.

زۆرۈر تېپىلغاندا ئىللمان سۇغا تۇز قوشۇپ ئىچكۈزۈپ قۇس- تۇرۇش، ئاشقازاننى بوشىتىپ بولغاندىن كېيىن قىممىتى يۇقىرى ۋە ئاسان سىڭىدىغان تاماقلاردىن ئاز مىقداردا يىگۈزۈش، مۇۋاپىق تەنھەرىكەت قىلدۇرۇش، مۇنچىدا يۇيۇندۇرۇش، تەرلى- تىش قاتارلىق ئىچكى - تاشقى بەدەن تازىلاش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىپ، بۇزۇلغان تاماقنىڭ قالدۇق تەسىرلىرىدىن ئومۇمىي بەدەننى تازىلاش، ئاندىن كېيىن ئاشقازاننى كۈچلەندۈرۈش ۋە ھەزىمنى ياخشىلاش مەقسىتىدە داۋالاش لازىم.

ئەڭ مۇھىمى تاماقنى ئاز يېيىش، تېز سىڭىدىغان ۋە ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى تاماقلارنى يېيىش، رېتىملىك ئوزۇق- لىنىش، مۇۋاپىق تەنھەرىكەت قىلىپ بەدەننى، ئاشقازان ۋە ھە- زىمنى كۈچلەندۈرگۈچى چارىلەرگە كۆندۈرۈش كېرەك.

ئىشتىھانىڭ زىيادىلىكى

بىمارنىڭ قورسىقى پات - پات ئاچىدۇ. ھازىر تاماق يېگەن بولسىمۇ، يەنىلا ئېچىپ تۇرىدۇ. شۇڭا بىمار پەرىشان بولۇپ روھىي چۈشۈپ كېتىدۇ، يۈرىكى سىقىلغاندەك ھېس قىلىدۇ. بەزىدە تاماقنى كۆپ يىسىمۇ سەرمەي ئەكسىچە ئورۇقلاپ

كېتىدۇ.

بىمار تۈزلۈك، زىيادە ئاچچىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلد-
شى، تاتلىق، ياغلىق تاماقلارنى ئىچكىۈرۈپ قۇستۇرۇش، قەي
قىلىپ بولغاندىن كېيىن پىستە مېغىزى ۋە بادام مېغىزىنى ئې-
زىپ كۈنجۈت يېغى ۋە شېكەر ئارىلاشتۇرۇپ يېگۈزۈش لازىم.
ئادەتتىكى چاغلاردا مېغىزلاردىن ياڭاق، چىلغوزە، بادام مېغى-
زى، خاسىڭ سېغىزى، كۈنجۈت ماتىڭى (زىماتاڭ) قاتارلىقلارنى
كۆپرەك ئىستېمال قىلىشى، شارائىت يار بەسە بىمارنىڭ غىزا-
سىغا زەپەرنى قوشۇپ بېرىش كېرەك.

غىزاسى ئۈچۈن توخۇ ۋە قوي گۆشلىرىنى ئىستېمال قىلسا،
نوقۇتنى سېرىق ياغ ياكى بادام يېغى بىلەن قورۇپ يېسە بولىدۇ
بەدەن ئاجىز بولسا داۋا ئىلمىشكى مۆتىدىلىدىن 5 گرام
ئېلىپ مائوللەھمى (گۆش سۈيى) بىلەن ئىستېمال قىلسا بولىد-
دۇ. قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى غىزالاردىن، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم
سېرىقى، توخۇ كاۋىپى، شېكەر، بادام يېغى قاتارلىقلارنى مۇۋا-
پىق ئارىلاشتۇرۇپ يەپ بەرسە بولىدۇ.

قان قۇسۇش

بەزىدە ئاشقازان ساھەسىدە كۆيۈشكەندەك سېزىم بولىدۇ.
بەزىدە شىددەت بىلەن قان قۇسىدۇ. بەزىدە سۇيۇق، بەزىدە قو-
يۇق، بەزىدە كۆپۈك ئارىلاش ۋە بەزىدە غىزا ئارىلاشقان قۇسىدۇ.
بەزىدە ساپ قان قۇسىدۇ. بەزىدە مىقدارى ئاز، بەزىدە ناھايىتى
كۆپ بولىدۇ. ئاشقازان ساھەسىدە يېقىمسىزلىق بولىدۇ.

بۇ مەزگىلدە قان تولۇقلاش ۋە قان كۆپەيتىش خاراكتېرىد-
كى دورىلار بېرىلمەيدۇ. قان قۇسۇشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئېنىقلاپ
شۇنىڭغا قارىتا داۋالاش ھەمدە كۆپ چارچاش، قاتتىق غەزەپلى-
نىش، ئاچ قېلىش، زورۇقۇپ ئىشلەش قاتارلىقلاردىن پەرھىز

قىلىش لازىم.

ھېق تۇتۇش

ئارقىمۇ ئارقا ھېق تۇتدۇ. خىلمۇ - خىل سەۋەبلەر تۈپەيى-
لىدىن ئوخشىمىغان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.
ئالدى بىلەن روھىي جەھەتتىن تىنچلاندۇرۇلىدۇ، قور-
قۇش، تاماقنى تېز يۇتۇش ياكى مۇزدەك نەرسىنى ئالدىراپ
يېيىشتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، قورساق ساھەسىگە ئىسسىق
ئۆتكۈزۈلىدۇ.

ئاشقازان كىرىش ئېغىزىنىڭ ئاغرىقى

ماددىسىز ئىسسىقلىقتىن بولغان بولسا، ئاغرىق قاتتىق بولىدۇ،
بىمار ھوشسىزلانغان بولىدۇ. قول - پۇتلىرى سوۋۇپ
كېتىدۇ. ماددىلىق سەپرادىن بولغان بولسا، يۇقىرىقى ئالامەتلەر-
دىن باشقا ئۇسسۇزلۇق ئۆتكۈر بولىدۇ، يۈز، كۆزلىرى سېرىق
بولىدۇ، گال ۋە ئېغىزى قۇرۇيدۇ، ئېغىزى ئاچچىق بولىدۇ،
قويۇق يەلنىڭ يىغىلىپ قېلىشىدىن بولغان بولسا كېكىرىدۇ،
يەل بار ۋاقتىدا ئاغرىق ناھايىتى قاتتىق تۇتىدۇ.
ئاز - ئازدىن تاماق يېيىشكە كۆندۈرۈلىدۇ، گۇمانخورلۇق،
كۆپ ئويلىنىش ۋە جاھىللىق بۇ كېسەللىكتە قاتتىق چەكلىنىدۇ.

ئاشقازان ئېچىش

قورساق ئاچ ۋاقتىدا ئاغرىق كۈچلۈك بولىدۇ، شۆلگەي
كۆپ ئاقىدۇ، ئازراق بىر نەرسە يېگەندىن كېيىن پەسىيدۇ،

ھەم قايسى خىلىتىن بولغان بولسا، شۇنىڭ خاس ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

ئاشقازان سۇيۇقلۇقىنى نورمالسىزلاندۇرىدىغان ئىسپىرت تۈرىدىكى ھەرقانداق ئىچىملىكتىن ۋە تاماكتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ئىچىنى سۈرىدىغان دورىلار قاتتىق چەكلىنىدۇ، روھىي جەددىلىكتىن يىراق تۇتۇلىدۇ.

ئاشقازان غىدىقلىنىش

ئاچچىق - چۈچۈمەل نەرسىلەرنى يېگەندە ئاشقازان ئېچىشىدۇ ۋە ئاغرىيدۇ. ئاشقازان ساھەسىدە ئېغىرلىق بولىدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ، بەزىدە قۇسۇپ بەلغەم چىقىپ كېتىدۇ. ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىدا قىلىنىدىغان پەرھىزلەردىن سامسا، لەڭپۇڭ، لازا قاتارلىقلاردىن ساقلىنىدۇ. پىتىر تاماق، لىمون سۈيى، دۇغاپ قاتارلىقلار چەكلىنىدۇ.

ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش

ئاشقازان مۇسكۇللىرى ئاجىزلىشىپ، بوشىشىپ، ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىدۇ، بىماردا كۆپىنچە قەۋزىيەت ئېغىر بولىدۇ، بىرەر نەرسىنى يېيەلمەيدۇ. ھەزىم بۇزۇلىدۇ، ئاشقازان كۆپىدە، باسقاندا كوركىراش ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ، بىمار بوشىشىپ ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ.

كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ئاساسىي سەۋەبلەرنى يۇقىتىش، قوشۇمچە كېسەللىكلەر بولسا داۋالاش لازىم. ئاشقازان زەئىپلىكىنى داۋالاپ ئاشقازان - ئۈچەي خىزمىتىنى ياخشىلاش، ئوزۇقلىنىش - نى ياخشىلاش، كۈندىلىك تۇرمۇشنى رەتكە سېلىپ، ئەمگەك - خىزمەت بىلەن ئارام ئېلىشنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش، تەنتەربىيە

بىيە پائالىيەتلىرىگە مۇۋاپىق تۈردە قاتنىشىش قاتارلىقلار ئارقىلىق ئومۇمىي بەدەننى كۈچەيتىش، بەدەننى سەمىرىتىش بىلەن بىللە ئىچى ۋە سىرتىدىن مۇۋاپىق دورىلارنى بېرىش لازىم. تامىقى ئۈچۈن پاقلان گۆشى، بېلىق گۆشى، گۈرۈچ تاماق-لار، ھەرخىل ئوتياشلارنى مۇۋاپىق تۈردە بېرىش لازىم. كالىي، بەسەي، ياڭيۇ، باش پىياز، قورساق كۆپتۈرىدۇ. ياڭيۇ ئورنىغا ئاش چامغۇر، باش پىياز ئورنىغا سۇڭپىياز ئىشلەتسە بولىدۇ.

ئاشقازانغا زەربە تېگىش

ھەر خىل سەۋەبلەر بىلەن ئاشقازانغا زەربە تەگكەنلىك تارىخى بولىدۇ، ئاشقازان ساھەسى ئاغرىيدۇ. دەرھال تەكشۈرۈپ، ئىچىدىن زەخمىم يېگەنلىك ئەھۋالىنى ئېنىقلاپ، ياللوغ قايتۇرغۇچى دورىلار بىلەن قان كۆپەيتكۈچى ئاماللار قىلىنىدۇ. بۇ جەرياندا قان بېرىش، ئېغىر زۇكام بو-لۇش، سەكرەش، يىرىك تاماق يېيىش قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقى بۇزۇلۇشى

ئوڭ تەرەپ قوۋۇرغا ئاستىدا ئېغىرلىق ھەم يەڭگىل ئاغرىق بولىدۇ. جىگەر چوڭىيىدۇ، ھەزىم بۇزۇلىدۇ، ئوڭ تاغاق قىس-مى ئاغرىيدۇ. قەۋزىيەت بولىدۇ. بەزىدە يەڭگىل سېرىقلىق چۈشۈپ يەڭگىل دەرىجىدە ئىسسىق بولىدۇ. بۇ سەۋەبتىن جىگەر ئاجىزلىقى ۋە جىگەر ئاغرىقىنىڭ شىكايىتى بولىدۇ. كاۋاپ، سامسا، پېتىر مانتا، پولو، ھالۋا ۋە پوشكالدىن قەتئىي پەرھىز تۇتۇلىدۇ، تۇخۇم سېرىقى زىيان قىلىدۇ، غەزەپلىن-دىن ئىشتىن ساقلىنىدۇ.

جىگەر مىزاجىنىڭ سوغۇقتىن بۇزۇلۇشى

جىگەر ساھەسى ئېغىر، ئاغزى بەتتەم، سۈيدۈك رەڭگى ئاق بولىدۇ. جىگەر ئاجىزلىقى، جىگەر ئاغرىش، سوئولقونىيە ۋە ئىستىسقانىڭ شىكايىتى بولىدۇ.

يەڭگىل سىڭىدىغان، قان كۆپەيتىدىغان، ھەزمنى ياخشىلايدىغان دورا ۋە تاماقلار بېرىلىدۇ، قۇشقاچ گۆشى ۋە پاقلان گۆشىنى كاۋاپ قىلىپ، زىرە سېپىپ بەرسە ۋە چېپىغا بادىيان قوشۇپ بەرسە پايدىلىق، ئاچچىق ۋە چۈچۈمەل نەرسىلەردىن، سوغۇق ئىچىملىكلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ.

جىگەرنىڭ سوغۇقتىن ئاجىزلىشىشى

تىلنىڭ رەڭگى ئاق بولىدۇ، ئۇسسمايدۇ، بەدىنى بوشاپ، يۈزى ئىششىپ قالىدۇ، سۈيدۈكى ئاق، قويۇق كېلىدۇ، بەزىدە قۇسىدۇ.

ئالدى بىلەن ھەزمنى ياخشىلىغۇچى، قان كۆپەيتكۈچى دورا ۋە تاماقلار بېرىلىدۇ، بىر قېتىمدا كۆپ تاماق يېيىشتىن، ئىسپىرتلىق ئىچىملىك ئىچىشتىن، كۆپ ئۇخلاشتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. پۇت ۋە بېشى ئىسسىق تۇتۇلىدۇ.

ئىسسىقتىن بولغان جىگەر ياللۇغى

جىگەر ساھەسىدە ئاغرىق ۋە ئېغىرلىق بىلىنىدۇ، ئىشتىھاسى تۇتۇلىدۇ، كۆپ ئۇسسمايدۇ. بىمار ئولتۇرغاندا تەرەپنى بېسىپ ياتالمايدۇ. قۇسۇش، قەۋزىيەت بولۇش، قول - پۇتلىرى سوۋۇپ

كېتىش قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ.
قاتتىق غەزەپلىنىشتىن، ئېغىر ھەرىكەتتىن ۋە بارلىق ئىس-
سىق ۋە مايلىق تاماقلاردىن قاتتىق پەرھىز قىلىنىدۇ. ئىسپىرت-
لىق ئىچىملىكلەر مەڭگۈ چەكلىنىدۇ. داۋالاشتا جىددىي تۇتۇش
قىلىنىپ، سەل قاراشتىن ساقلىنىدۇ.

سوغۇقتىن بولغان جىگەر ياللۇغى

يۈز ۋە تىلنىڭ رەڭگى ئاق بولىدۇ، كۆپ ئۇسسمايدۇ،
ئاغرىق ۋە تەپ ئۆتكۈر بولمايدۇ، جىگەر ساھەسىدە ئېغىرلىق
زىيادە بولىدۇ. ھېق تۇتۇپ، قۇسىدۇ، ئەگەر ياللۇغ ئۆتكۈر
بولسا، نەپەس سىقىلىش ۋە يۆتەل بولىدۇ.
زىيانلىق ئىچىملىكلەر، مايلىق تاماقلار ۋە ئاچچىق نەرسى-
لەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ، بىر قېتىمدا كۆپ تاماق بېرىلمەيدۇ.
چۈچۈمەل ئىچىملىك، دادۇر، كونا گۆش، ئېشىپ قالغان تاماق
يېيىشكە بولمايدۇ.

جىگەر قېتىش

بۇ كۆپىنچە جىگەرنىڭ سوغۇق ھەم ئىسسىقتىن بولغان
ياللۇغلىنىشىدا ئىششىق ياخشى تارقالماسلىقتىن پەيدا بولىدۇ،
بەزىدە سەۋدانىڭ يىغىلىپ قېلىشىدىن بولىدۇ، جىگەر ساھەسىدە
قاتتىقلىق بىلىنىدۇ، ئاغرىش ۋە تەپ بولمايدۇ، ئىشتىھاسى
كېمىيىدۇ، كۈندىن - كۈنگە ئورۇقلايدۇ.
بارلىق ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر مەڭگۈ چەكلىنىدۇ، غەم
ئەندىشە ۋە غەزەپلىنىشنىڭ زىيانلىق ئىكەنلىكى تەكىتلىنىدۇ.
كۆپ ھەرىكەت قىلىشتىن ۋە كۆپ خىزمەت قىلىشتىن پەرھىز
قىلىنىدۇ، قارا كىيىم ۋە قات - قات كىيىم كىيىشكە بولمايدۇ.

جىگەر يىگىلەش

كەپلۈس جىگەر تەرەپكە ياخشى شۈمۈرۈلمەيدۇ، بەزىدە كۆڭ-لى ئېلىشىدۇ، بەزىدە ھۆ بولىدۇ، ئوڭ تەرەپ قوۋۇرغا ئاستىدا ئاغرىق بولىدۇ، كېسەلنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە جىگەر بىر ئاز چوڭىيىدۇ، ئەمما كېيىن كىچىكلەيدۇ، بەزىدە يەڭگىل قىزىتىدۇ، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، قورساق كۆپۈش، قەۋزىيەت قاتارلىقلار بولىدۇ. تېرىلىرى قۇرغاقلىشىدۇ، ۋە سېرىقلىق چۈشىدۇ، بەدىنى ئاجىزلايدۇ ھەم ئورۇقلايدۇ، ئاخىرقى مەزگىلىدە يەرقان (سېرىقلىق چۈشۈش) كېسىلى ياكى ئىستىسقا كېسىلى پەيدا بولىدۇ.

يەڭگىل سىڭىدىغان تاماقلار بېرىلىدۇ، تۆگە، ئېشەك ياكى قوي سۈتى، ئايران ئىچكۈزۈلىدۇ، پاقا ياكى تاشپاقا يېگۈزۈلىدۇ. ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. غەزەپ-لىنىشتىن ساقلىنىپ، مۇۋاپىق ئارام ئالدۇرۇلىدۇ.

جىگەر كىچىكلەش

بۇ كېسەلدە بىمارنىڭ ھەزىم قىلىشى بۇزۇلىدۇ، كۆڭلى ئاينىدۇ. بەزىدە ئاچچىق سۇ ياندۇرىدۇ. دەسلەپتە جىگەر يوغىدەن ئايدۇ كېيىن ئورۇقلاپ كىچىكلەپ كېتىدۇ، يېنىك دەرىجىدە قىزىيدۇ، قورساق كۆپىدۇ بەزىدە قەۋزىيەت بولىدۇ. بەزىدە قورساققا سۇ چۈشىدۇ ۋە قان قۇسىدۇ ۋە باشقىلار. بىمارنى ياتقۇزۇپ تولۇق دەم ئالدۇرۇش لازىم. بىمارنىڭ قۇۋۋىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئوڭاي ھەزىم بولىدىغان تاماق-لار بېرىلىدۇ. سۈت بىلەن قىلىنغان شىپەن، تۇخۇم ئېقى، توخۇ گۆشى، يېلىق گۆشى ۋە بىمارنىڭ مىزاجىغا مۇۋاپىق كېلىدىغان

ئوتباشلار ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. ھەجىمى ئاز، قۇۋۋىتى كۆپ، بەك مايلىق بولمىغان تاماقلار بېرىلىدۇ. ئىسسىقلىق دورىلارنى ئىچمەسلىك، بەك مايلىق گۆشلەرنى كۆپ يېمەسلىك، لازا ۋە ھەرخىل ئاچچىق نەرسىلەرنى، قويۇق چاي قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلماسلىق، ھاراق - شاراپ ئىچمەسلىك لازىم.

جىگەر مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان بەدەن كۆيۈپ ئىششىش

يۈز ۋە قاپاقلىرى ئىششىيدۇ، ئىششىق قول - پۇتلىرىغا چۈشىدۇ، بەدەن تېرىلىرىنىڭ رەڭگى سېرىق ياكى ئاق بولىدۇ، قورساققا كوركىراش تاۋۇشى ئاڭلىنىدۇ. سامسا، پېتىر مانتا، مايلىق شورپا، لازا قاتارلىقلاردىن قاتتىق پەرھىز قىلىنىدۇ، پىشمىغان، بۇزۇلغان تاماقلار ۋە زورلىغان غىزالار قاتئىي يېيىلمەيدۇ. كېسەللىك ماددىسىنى ئېنىقلىماي تۇرۇپ سۈيىدۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ.

جىگەر سانجىقى

ئوڭ تەرەپ قۇۋۇرغىلار ئارىسىدا تۇيۇقسىز قاتتىق ئاغرىش پەيدا بولۇپ بىمارنى بىئارام قىلىدۇ. ئاغرىش قورساق، ئاشقا-زان، مۈرە ۋە بوينىنىڭ ئوڭ تەرەپىگە تارقىلىدۇ. كۆڭلى ئېلىد-شىپ ئاچچىق سۇ ياندۇرىدۇ ياكى قۇسىدۇ، ھېق تۇتۇپ قورسىقى كۆپىدۇ، قەۋزىيەت بولىدۇ، بەزىدە ئاغرىق كۈچەيسە بىمار ئايلىد-نىپ كېتىدۇ. غىزاسى ئۈچۈن ئاچچىق - چۈچۈك نەرسىلەر جۈملىسىدىن

ئەينۇلا مۇرابباسى، لىمۇن شەرىپىتى، ئاچچىق ئانار شەرىپىتى، ئاپلەسەن شەرىپىتى، نەشپۇت، ئامۇت قاتارلىق جىگەرنىڭ ھارارىد-تىنى پەسەيتكۈچى يېمەكلىكلەر ئىستېمال قىلىنىدۇ. چوڭ ھاي-ۋان گۆشلىرى، تۇخۇم، ھالۋا، كاۋاپ قاتارلىق ئېغىر، تەستە سىڭىدىغان يېمەكلىكلەرنى يېمەسلىك لازىم.

سۇلۇق ئىششىق

پۈتۈن بەدەندە بولۇپمۇ قورساق ۋە پۇت قىسمىدا سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلىدۇ. بۇ كۆپىنچە يۈرەك ھەرىكىتىگە مۇناسىۋەتلىك.

تامىقى ئۈچۈن توخۇ، كەپتەر، پاقلان گۆشلىرىنى نوقۇت بىلەن پىشۇرۇپ بېرىش مۇمكىن. ئاچچىق تەملىك غىدىقلىغۇ-چى، ئېچىشتۇرغۇچى، تەركىبىدە تۇز كۆپ بولغان يېمەكلىكلەر-دىن ۋە سۇدىن پەرھىز قىلىش بۇيرۇلىدۇ، يەنە شۇنى ئەستە تۇتۇش لازىمكى، ھەرقانداق سۇلۇق ئىششىق كېسىلىدە سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى ئىشلەتكەندىن كېيىن جىگەرنى قۇۋۋەتلەندۈرىدىغان قۇرسى ئەنبەرى بارس قاتارلىقلارنى بېرىش لازىم. ئىستىسقا تالىنىڭ ئاجىزلىقىدىن بولسا، داۋالاشتا بەدەندىن سەۋدا ماددىسىنى تازىلاش، ئاندىن تالىنى قۇۋۋەتلەش دورىلىرى ئىشلىتىش لازىم. ئىستىسقا كۆپ قان يوقاتقانلىقتىن بولسا، ئۈچەينىڭ، جىگەرنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاش، ئۈزۈم شەرىپىتى بېرىش، تۇخۇم سېرىقىنى شېكەر بىلەن ئىستېمال قىلدۇرۇش، پاقلان گۆشى، توخۇ، كەكلىك گۆشلىرىنى كاۋاپ قىلىپ يېيىش-كە بۇيرۇش ۋە سۈت ئىچىشنى تەۋسىيە قىلىش لازىم.

قورساققا سۇ يىغىلىش

جىگەر ۋىنا تومۇرىنىڭ توسۇلۇشى ۋە جىگەرنىڭ ئۆتكۈزۈش-چانلىقى تۆۋەنلەش نەتىجىسىدە قورساق ساھەسى كۆپۈپ يوغىنايدۇ، سۈيدۈكى ئازلايدۇ ھەمدە گۆش يۇيغان سۈدەك كېلىدۇ، نەپىسى قىيىنلىشىدۇ.

تامىقى ئۈچۈن پاققان گۆشى، توخۇ، قىرغاۋۇل، كەكلىك گۆشلىرىنى قورۇپ بېرىشكە بولىدۇ. قىزىتمىسى بولمىسا مەز-كۈر گۆشكە زىرە، دارچىن سېلىپ بېرىش مۇمكىن. ئەگەر كېسەلدە قىزىتما بولۇپ، يۆتلى بولمىسا، مەزكۈر گۆشكە زىرىق سۈيى، سىركە ياكى قېتىقنىڭ بىرىنى قوشۇپ بېرىش لازىم. بۇ كېسەلگە تۈگە سۈتى ياخشى داۋا بولىدۇ. چۈنكى ئۇ، سۈيدۈك-نى راۋان قىلىپلا قالماي، بەلكى بەدەنگە ئوزۇق بولىدۇ، ئۇنى قىزىتىپ سەل ھور چىققاندىن كېيىن بېرىش ۋە بەدەن قوبۇل قىلالغىدەك مىقداردا بېرىش كېرەك. جىگەر قېتىش سەۋەبىدىن قورساققا سۇ چۈشكەن بولسا، ئېشەك سۈتىنى ئىچىشكە بەرسە تېخىمۇ پايدىلىق. ئۇنىڭ جىگەرنى ياشارتىپ، يۇمشىتىش، قور-ساق سۈيىنى ئازايتىش ئۈنۈمى تۈگە سۈتكە قارىغاندا كۈچلۈك. ئۇنى سىل كېسەللىكىدە كۆرسىتىلگەن ئۇسۇل بويىچە مىقدارىنى تەدرىجىي ئاشۇرۇپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

قورساققا يەل يىغىلىش

قورساق كۆپۈپ كېتىدۇ. قورساق تېرىسى چىڭقىلىپ تار-تىلغاچقا كىندىك سىرتقا پۇلتىيىپ چىقىدۇ، قورساقنى چەكسە ناغرىدەك ئاۋاز چىقىدۇ.

تاماقنى چەكلەش، بىمارنىڭ ئەھۋالى ياخشى ۋاقتىدا تامىقىدە.
نىڭ يېرىمى ياكى ئۈچتىن بىر ھەسسە تاماق بىلەن قانائەت
قىلدۇرۇش، ئۈسسۈزلۈك بېرىشكە توغرا كەلسە مارجان شوخلا
ئەرقى، بادىيان ئەرنىلىرىنى ئاز - ئازدىن بېرىش، سېرىق ئوت
ئۇرۇقىنى سوقۇپ سۇ قۇيۇپ شىرنىسىنى چىقىرىپ، شەربىتى
بۇزۇرى بىلەن بىللە بېرىش، گۈلچەنى كۆپرەك ئىستېمال قىل-
دۇرۇش لازىم. يەل پەيدا قىلغۇچى تاماقلار، پىياز، ماش، كالا
گۆشى، ياخشى پىشمىغان تاماقلارنى بەرمەسلىك كېرەك.

ئۆت تېشى كېسەللىكى

ئوڭ تەرەپ يۇقىرى قورساق قىسمى ئاغرىش، مۇزلاپ تىت-
رەش، يۇقىرى قىزىتما بولۇش، سېرىقلىق چۈشۈش كۆرۈلىدۇ.
سامسا، گۆش نان، تۇخۇم سېرىقى، پولو، قازان كاۋىپى،
قېزا قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، كۆپ تاماق يېيىلمەي-
دۇ، ھاراق ئىچىش چەكلىنىدۇ.

تال ياللۇغى

يەرلىك ئورۇندا ئىششىق ۋە قاتتىقلىق بولىدۇ. ئۇندىن
باشقا ئاچچىق كېكىرىش، ئاشقازان كىرىش ئېغىزى قىسمى كۆپ-
شۈش، ئاچچىق قەي قىلىش، سۈيدۈك رەڭگى قارىغا مايىل
قىزىل بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.
ئاچچىق نەرسىلەر چەكلىنىدۇ. چوڭ - كىچىك تەرەت راۋان-
لاشتۇرۇلىدۇ، تېزدىن داۋالاش، سەل قارىماسلىق كېرەك.

تال چوڭىيىش

تال ساھەسى ئاغرىپ، ئېغىرلىشىپ، قورساق كۆپىدۇ

بۇنىڭغا جىگەر چوڭىيىشقا قوللانغان ئۇسۇللار قوللىنىلدى.
دۇ، تېزىدىن داۋالاشقا تۇتۇش قىلىش لازىم.

تال توسۇلۇش

تال ساھەسى ئېغىرلىشىپ، بەدەن رەڭگى قارىغا مايىل بولىدۇ، تال چوڭىيىپ، قاتتىقلىشىدۇ.
يەللىك، ئېغىر تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، سوغۇق سۇ چەكلىنىدۇ.

تال ئاغرىش

يەلدىن بولغان ھەم سوغۇقتىن بولغان تال ئاغرىقىدا ئىشتە-ھاسى تۇتۇلىدۇ، كۆپ ئۇسسمايدۇ. قورساق كۆپۈش، قورساق غولدۇرلاش قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ، تالنىڭ ئىسسىقى ئېشىپ كەتسە كۆپ ئۇسساش، تال سەھەسى ئېچىشىش، سۈيدۈك رەڭگى قىزىرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.
جىگەر مەنبەلىك قورساققا سۇ چۈشۈش ئالامەتلىرى بىلەن بىللە كەلسە شۇنىڭغا دائىر پەرھىزلەرنى ئوخشاش قوللانسا بولىدۇ، چوڭ - كىچىك تەرىتى راۋانلاشتۇرۇلىدۇ.

تامماقتىن ئىچى سۈرۈش

دەسلەپتە سېسىق كېكىرىدۇ، كۆپ قېتىم ئۈچەي غولدۇر-لاپ، ئىچى سۈرىدۇ، بەزىدە قورساق ئاغرىيدۇ، ئىچى سۈرگەندىن كېيىن بىر ئاز راھەتلىنىپ قالىدۇ.
بىر ئىككى كۈن تاماقنى ئازايتىش لازىم. قايناقسۇ كۆپ ئىچكۈزۈلىدۇ، زۆرۈر بولسا قۇستۇرۇلىدۇ. ئۆي ۋە يېمەكلىك

تازىلىقى ياخشىلىنىدۇ. بىمارغا ئېغىر ۋە قويۇق تاماق بېرىش چەكلىنىدۇ.

ئۈچەي مەنبەلىك ئىچى سۈرۈش

غىزا يەپ ئازراق ۋاقىتتىن كېيىن غىزا ئاشقازاندىن ئۈچەيگە ئۆتكەندە باشلىنىدۇ. قورساق كۆپۈش، قورساق كوركىراش قا. تارلىقلار مەۋجۇت بولىدۇ، بەزىدە تەرتىبى ئازراق يىرىك ياكى قان ئارىلاش كېلىپ، ئۈچەي ساھەسى ئاغرىيدۇ ھەم تاماق ياخشى ھەزىم بولماي تەرەت بىلەن بىللە چىقىدۇ. ئەگەر سەپرا سەۋەبىدىن بولسا، ئۈچەي ئېچىش ۋە چوڭ تەرەت قىلغاندا مەقەت ئېچىشىدۇ. چوڭ تەرتىدىن سېرىق ھەم سەپرا ماددىسى تېپىلىدۇ.

كېسەل باشلىنىپ بىر كۈن ياكى بىر كېچە - كۈندۈز تاماق بەرمەسلىك كېرەك. ئەگەر ئۇسساپ كەتسە قايناق سۇ ياكى تۇخۇم ئېقى، قاينىتىلغان سۇنى سوۋۇتۇپ بېرىش، كۆك سۈت، قېتىق، قۇرۇت سۈيى بېرىش لازىم. 24 سائەتتىن كېيىن بىمارغا ئىلمان سۇيۇق تاماقلارنى بەرسە بولىدۇ. مەسىلەن: كالا سۈتىنى قاينىتىپ سوۋۇتۇپ بىر ئاز تۇز ئارىلاشتۇرۇپ بېرىش، ئەگەر سۈت ئىچكەندىن كېيىن قورساق كۆپۈش كۆرۈلسە سۈت ئورنىغا شوۋىنگۈرۈچ، سۇيۇقراق قىلىنغان ئاق ئاشلارنى بېرىش كېرەك. بىمار بىر ئاز ساقايغاندىن كېيىن ئادەتتىكى غىزالارنى بېرىش، كۆپلەپ سۇ ۋە سۈتلۈك تاماقلارنى بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئىچ سۈرۈشنى دىققەت بىلەن كۆزىتىپ، ئىنچىكىلەپ ئەتراپلىق تەكشۈرۈپ كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەبىنى ئېنىقلىغاندىن كېيىن داۋالاش، ئالدىراپ ئىچىنى توختىتىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىمەسلىك لازىم. ئەگەر ئۈچەيدە غىدىقلىغۇچى ماددىلار يەنى ھەزىم بولمىغان تاماقلار ۋە بۇزغۇچى ماددىلار بولسا يېنىك سۈر.

گە بېرىلىدۇ. مەسىلەن: بىنەپشە، بادىيان، سانا، ئاق لالە يىلتىزغا ئوخشاش دورىلارنى ئىچكۈزۈپ ئۈچەينى تازىلىغاندىن كېيىن ئاندىن ئىچىنى توختاتقۇچى دورىلارنى بېرىش لازىم. بۇ دورىلار خىلىت ئېتىبارى بىلەن تاللاپ ئىستېمال قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ.

سوزۇلما خاراكتېرلىك ئىچ سۈرۈش

بۇ كېسەلدە بىمارنىڭ ئاغزى ۋە تىلى قىزىل بولۇپ ئاغرىيدۇ، بەزىدە ئېغىز ۋە تىلنىڭ يۈزىدە زەخمىلەر ياكى ئۇششاق قاپارتقۇلار بولىدۇ. ئېغىزىدىن شالۋاق ئېقىپ تۇرىدۇ. ئەتىگەندە 3 - 4 قېتىم سېسىق پۇرايدىغان، كۆپۈكسىمان، ئاق رەڭلىك ياكى كۆكۈش تەرەت قىلىدۇ. بىمار ئورۇقلايدۇ.

بۇ كېسەلدە يېمەك - ئىچمەكنى رەتكە سېلىپ مۇۋاپىق ئوزۇقلاندۇرۇش ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. چۈنكى دورا بىلەن داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى ئانچە كۆرۈنەرلىك بولمايدۇ. بۇنىڭغا كالا سۈتى مۇۋاپىقراق كېلىدۇ. شۇڭا بىمارنىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى ياخشى بولسا 1 - 3 ئاي ئۈزەي كالا سۈتى ئىچكۈزۈش كېرەك. سۈتنى ھەزىم قىلالمايدىغانلار قېتىق ئىچسىمۇ بولىدۇ. سۈت - قېتىقلارنى ئىچكەندە بىر گاز ناۋات ياكى شېكەر ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە ياخشىراق. بەزىلەرگە سۈت مۇۋاپىق كەلمەسە، قوي، ئۆچكە ياكى موزاي گۆشلىرىنى ئۇششاق قىيما قىلىپ سۈت بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بەرسە بولىدۇ. تۆش ئارىسىدىكى كىرگىت پەردە گۆشىنى ناھايىتى ئۇششاق توغراپ قىيما قىلىپ، كۈندە 3 قېتىم، ھەرقېتىمدا 30 گرامدىن بەرسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر بۇنىڭغا ئازراق شېكەر ئارىلاشتۇرسا تېخىمۇ ياخشى. قوز-غاتقۇچى دورا ۋە يېمەك - ئىچمەكلەردىن بولۇپمۇ ھاراق قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.

بىمار ئۆزىنى ئىسسىق تۇتۇپ، سوغۇقتىن ساقلىنىشى،
فورسىقىنى كەمەر ياكى پوتا بىلەن چىڭ باغلاپ يۈرۈشى لازىم.
ئەگەر شارائىت يار بەرسە بىمار ھاۋالىق جايلارغا بېرىپ دەم ئالسا
ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

قانلىق ئىچى سۈرۈش

جىگەر مەنبەلىك قانلىق ئىچى سۈرۈشتە ئومۇمەن ئاغرىمايدۇ،
چوڭ تەرىتى قان ئارىلاش كەلمەيدۇ، كۆپ مىقداردا قان
چىقىدۇ، چوڭ تەرىتى سېسىق پۇرايدۇ، كۈندىن - كۈنگە ئورۇق-
لايدۇ. تېرىلىرىگە سېرىقلىق چۈشىدۇ. كېسەلنىڭ باشلىنىشى-
دىن تارتىپ ئاخىرىغىچە قانلا كېلىدۇ ياكى گۆش يۇغان سۈدەك
كېلىدۇ. بەزىدە دەسلەپتە سۈتكە ئوخشاش تەرەت كېلىپ، كې-
يىن قانلىق تەرەت كېلىدۇ.

ئالدى بىلەن جىددىي قۇتقۇزۇش قوللىنىلىدۇ ۋە جىگەر
خىزمىتى تەكشۈرۈلۈپ مۇناسىۋەتلىك داۋالاش ۋە پەرھىزلەرگە
بۇيرۇلىدۇ.

سەپرادىن بولغان قان تولغاق

چوڭ تەرەتنىڭ سانى كۆپ بولىدۇ، كۆپ ئۇسسايدۇ، سولڭ
ئېچىشىدۇ، سوغۇق سۇ ئىچكەندە سەل پەسىيىدۇ.
قويۇق ۋە مايلىق تاماق بېرىلمەيدۇ، كونارغان ۋە تۇرۇپ
قالغان مېغىزلار چەكلىنىدۇ. ئۆتكۈر ۋە ئاچچىق نەرسىلەردىن
پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ ۋە دەرھال مىزاج تەڭشەپ، قان توخ-
تىتىلىدۇ.

ئۈچەي توسۇلۇش

بەلغىمى قوللىنىشقا، كېسەل پەيدا بولۇشتىن ئىلگىرى ئىش-
تىھاسى تۇتۇلۇپ، ھەزىم قىلىش ئاچارلىشىدۇ. قۇرۇق ئىنجىق
بولۇپ قاتتىق ئاغرىيدۇ. ئاق پوتلىسىمان چوڭ تەرەت قىلىدۇ.
پاچاقلىرىدا ئاغرىش ۋە ئېسىلىش بولىدۇ. بەزىدە قۇسىدۇ.
ئاغرىق توختاپ ئىشتىھاسى ئېچىلغاندىن كېيىن پالەك،
قاپاق ۋە باشقا سەيلەرنى چۈچىمەل نەرسىلەر بىلەن قوشۇپ ئىس-
تىمال قىلسا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن توخۇ، چۈجە گۆشى
شورپىلىرى ئىچىلىدۇ.

سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغى

ئۆتكۈر ياللۇغلىنىشتا قورساقنىڭ ئوڭ تەرەپ ئاستى قىسمى
تۇيۇقسىز ئاغرىشقا باشلايدۇ. بىمار بۇ ئاغرىقتىن قاتتىق بىئارام
بولىدۇ. كۆڭلى ئاينىدۇ بىر نەرسە يېسە ياكى ئىچسە دەرھال
قۇسىدۇ، تىترەش بىلەن قىزىتما پەيدا بولىدۇ. ئاغرىغان جايى
بېسىپ كۆرسە قولغا قاتتىق ياكى ئۆسمىدەك بىر نەرسە ئۇرۇلد-
دۇ، پات - پات سۈيۈك قىستايدۇ ۋە سۈيۈككە تۇخۇم ئېقىغا
ئوخشاش بىر نەرسە بىللە كېلىدۇ.

سۇيۇق، تېز سىڭىدىغان تاماقلارنى، مەسىلەن: سۈت ياكى
ئانار سۈيىگە ئارپا سۈيى ئارىلاشتۇرغان جۇلابلارنى بېرىش
كېرەك.

قەۋزىيەت

چوڭ تەرەت قىلىش ۋاقتى ئۇزۇن بولىدۇ، چوڭ تەرەت

قاتتىق، قارامتۇل بولۇپ سېسىق پۇرايدۇ ناھايىتى تەستە كېلىدۇ. بەزىدە چوڭ تەرەتنىڭ قاتتىقلىقىدىن قان ياكى ئاق پوتلىسىدە مان تەرەت قىلىدۇ. گەندىنىڭ ئۈچەيدە ئۇزۇن تۇرۇپ قېلىشىدىن قورساققا سېسىق پۇراقلىق يەل پەيدا بولىدۇ، قورساق ئېسىلىدۇ. شۇنىڭدەك ئىشتىھا تۇتۇلۇش، قورساق كۆپۈش، باش ئېسىلىش، ماغدۇرسىزلىق، كۆڭۈل ئېلىشىش، كۆز قاراڭغۇلىشىش، دىققىتىنى يىغالماسلىق قاتارلىق ئالامەتلەر پەيدا بولىدۇ. مايلىق ۋە ئېغىر تاماق چەكلىنىدۇ. سۈت ئىچكۈزۈلسە ياكى بېھى بېرىلسە بولىدۇ. غەزەپلىنىش، ھەرىكەت قىلماسلىق، قېزا يېيىش، ھاراق ئىچىش ۋە كۈچەپ تەرەت قىلىشتىن ساقلىنىدۇ. يۈەكنى ئاجىزلاشتۇرۇۋەتمەسلىك شەرتى بىلەن سۈرگە بېرىلسە بولىدۇ.

ئۈچەي ياللۇغى

ئەگەر ئۈچەينىڭ ھەممە يېرىنى قوقاق قاپلىغان بولسا، ئىششىغان ساھە ئاغرىيدۇ. ئىششىغان جايىنى باسا قاتتىق ئاغرىيدۇ. ئىستىما ئۆرلەيدۇ. بىمار ئېغىر دەرىجىدە ماغدۇرسىزلىنىپ كېتىدۇ. ئاندىن ئۈچەينىڭ زەخمىلەنگەن جايى تارتىشىپ، پالەچلىنىدۇ. شۇ سەۋەبتىن ئۈچەي توسۇلۇپ ئېغىر قەۋزىيەت بولىدۇ. ھېق تۇتىدۇ. قورساق كۆپىدۇ. بىمارنىڭ تىلى قۇرۇق رەڭگى قارا بولىدۇ.

غىزاسى ئۈچۈن ئارپا سۈيىنى ئانار سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ، چۆچە گۆشىگە ئانار ئۇرۇقى سېلىپ پۇشۇرۇپ يېگۈزۈلىدۇ.

ئۈچەي سىلى

بىماردا ئۇسسۇزلۇق بولىدۇ. قورسىقى ئاغرىپ ئىچى سۈردى.

دۇ. كىندىك ئەتراپىدا ئاغرىق قاتتىق بولىدۇ. چوڭ تەرەتكە قان ۋە يىرىك ئارىلىشىپ كېلىدۇ. شۇنداقلا سىلنىڭ باشقا ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

ياخشى دەم ئالدۇرۇش، ئوزۇقلىنىشنى ياخشىلاپ بەدەننىڭ قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش ھەمدە ئۈچەيدىكى جاراھەتنى يوقىتىشنى مەقسەت قىلغان ھالدا دورا بۇيرۇش لازىم. كۈندىلىك تامىقىدا خام سامساقنى بىللە ئىستېمال قىلىپ بەرسە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئۈچەي يارىسى

گەرچە بۇ كېسەلنىڭ ئالامەتلىرى ھەر خىل بولسىمۇ لېكىن ئىچى سۈرۈش ۋە قورساق ئاغرىش ئومۇميۈزلۈك بولىدۇ. بۇ خىل ئىچى سۈرۈشتە چوڭ تەرەتتە سېسىق پۇراق، يىرىك، بەلغەم ۋە قانمۇ بولىدۇ. بەزىدە چوڭ تەرەتتە ئۈچەي پارچىلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. زەخمىم چوڭ بولسا تولغاق ۋە ئىچى ئۆتۈش كۆرۈلىدۇ.

غىزاسىغا تېز ھەزىم بولىدىغان، ئۈچەينى ئېچىشتۇرمايدىغان، قورساق كۆپتۈرمەيدىغان، تەرەت ئاز بولىدىغان يېنىك تاماقلار بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىستېمال بولسا، كالا سۈتى قېتىقىنى دوغاب قىلىپ ياكى قېتىققا تۆمۈر داغلاپ بېرىلىدۇ. ئەگەر ئايرىن ياكى قۇرۇت بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى، چۈنكى بۇ كېسەلگە سۈت، شورپا ۋە ياغلار زىيان قىلىدۇ.

بەلغەمدىن بولغان قۇلۇن ئۈچەي ئىششىقى

دەسلەپتە بىمارنىڭ قورسىقى ئاغرىپ بىئارام بولىدۇ. ئۇ- نىڭدىن كېيىن ئىچى سۈرىدۇ چوڭ تەرەتتىن تۈگۈر - تۈگۈر

يېپىشقاق ماددىلار كېلىدۇ، قورساققا تولغاقتەك ئاغرىقلار پەيدا بولىدۇ. بىمار پۈتىنى يىغىپ تۈگۈلۈپ قالىدۇ. قورسىقى كۆپۈش ئالامەتلىرى بولىدۇ.

تامىقىغا چۆجە گۆشى ۋە شورپىسى، تونۇر نېنى، پېچىنە، كالا سۈتى، ئاتىلا، بۇغداي ئۆمىچى قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. تاماقنى ئۆز ۋاقتىدا يېيىش، ئۈچەينى غىدىقلايدىغان، ئېچىشتۈرىدىغان، قورساقنى كۆپتۈرىدىغان نەرسىلەردىن ساقلىنىش لازىم. بىمارنىڭ قورسىقىنى داۋاملىق سىلاپ بەرسە، ھاۋالىق خايلاردا، دەريا ياكى سۇ بويلىرىدا ئارام ئالدۇرسا تېز ساقىيىشى ئۈچۈن پايدىلىق.

ئۈچەي قۇرت كېسىلى

قورساق كۆپۈش، غولدىرلاش قاتارلىق ئالامەتلەر يۈز بېرىدۇ. ئەگەر كىچىك بالىدا بولسا بۇرنىنى كۈچىلايدۇ، مەقئەت قىچىشىپ، ئېغىزىدىن سېسىق پۇراق كېلىدۇ، ئىشتىھاسى تۈتۈلىدۇ، باش ئاغرىش، چىرايى سارغىيىش، ئۇخلىغاندا چىشىنى غۇچۇرلىتىش، ئېغىزىدىن شالۋاق ئېقىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

قۇرۇت چۈشۈرۈش دورىلىرى قوللىنىش بىلەن بىرگە، ئوزۇقلاندىنى تەرتىپكە سېلىش كېرەك. شەخسىي تازىلىقنى ۋە ئىچىدىغان سۈنى ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش لازىم. بۇ كېسەللىككە ئۆزۈنچە سەل قاراشقا بولمايدۇ.

مەقئەت بوۋاسىرى

مەقئەت ئاغرىش، چىڭقىلىش، قىچىشىش، كۆيۈشۈش سېزىمى بولىدۇ، تەرەت قىلىشنى خالىمايدۇ، بۇنىڭ بىلەن بۇ

كېسەل تېخىمۇ كۈچىيىدۇ. چۈنكى قەۋزىيەت بۇ كېسەلنى ئېغىر-
لاشتۇرۇپ قويىدۇ. قان بەزىدە چوڭ تەرەت بىلەن ئارىلىشىپ
چىقىدۇ، بەزىدە تەرەتتىن كېيىن ئاز - ئازدىن تامچىلاپ چۈش-
دۇ، بەزىدە كۆپ قان چىقىپ كېتىپ بىمار ھوشسىزلىنىدۇ.
ئارقىمۇ ئارقا قان يوقىتىش سەۋەبىدىن بىمارنىڭ رەڭگى سارغى-
يىدۇ ھەم ئاجىزلاپ ئورۇقلايدۇ. بەزىدە بوۋاسىر تۈگۈنچىلىرى
مەقئەت سىرتىغا چىقىپ يەرلىك ئورۇن ئىششىيدۇ ھەم ناھايىتى
قاتتىق ئاغرىيدۇ.

لارا، ئاچچىقسۇ، ھاراق، قىزا ۋە قازان كاۋىپىدىن ئېھتىد-
يات قىلىنىدۇ، زىيادە تاماقلانۇشقا بولمايدۇ. قورۇغان ۋە كۆي-
گەن نەرسىلەر زىيان قىلىدۇ. ئەڭ ياخشىسى قان ۋە سەپرانى
تەڭشەپ، خىلىتلارنى نورماللاشتۇرۇش ۋە ئوپىراتسىيەگە ئالدى-
راپ كەتمەسلىك لازىم.

يەللىك بوۋاسىر

بۇ، سوغۇقلۇقتىن بولغان مىزاج بۇزۇلۇش سەۋەبىدىن مەق-
ئەت ۋە ئۈچەي ئەتراپىدىكى توقۇلمىلاردا يەل تۇرۇپ قېلىپ
تەرەت قىلغاندا ئاغرىش، قاناش، قەۋزىيەت بولۇش بىلەن ئىپادى-
لىنىدىغان كېسەللىكتۇر.

پېتىر ۋە خام تاماقلاردىن، پىيازدىن ۋە ھاراق، تاماكدىن
پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. چۈچۈمەل، ئاچچىق نەرسىلەر ئىستېمال
قىلىنمايدۇ، قان ئايلىنىشىنى بۇزىدىغان بارلىق دورا ۋە تاماقلار
چەكلىنىدۇ.

مەقئەت ئاقمىسى

مەقئەت گىرۋەكلىرىنىڭ بىرەر جايىدا تۈشۈك (ئېغىز)

بولغان بولىدۇ ھەم شۇ جايدىن دائىم سېرىق سۇ ۋە يىرىك چىقىپ تۇرىدۇ. تۆشۈك ئۈچەيگە يەتكەن بولسا تۆشۈكتىن چوڭ تەرەتمۇ چىقىدۇ.

جىددىي قۇتقۇزۇش چارىلىرىدىن قان تازىلاش، قويۇق يەل-لەرنى تارقىتىش ۋە ياللۇغ قايتۇرۇش قوللىنىلىدۇ. لازا يېيىش ۋە ئۇنىڭ پۇرىقىنى پۇراپ قېلىشتىن، پولو ياكى پېتىرمانتا يېيىشتىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

مەقئەت ياللۇغى

قىزىتما بولىدۇ. مەقئەت قاتتىق ئاغرىيدۇ ۋە ئېچىشىدۇ. قان تازىلاشنى ئاساس قىلىش بىلەن بىرگە ئاچچىق ۋە جۈمەل نەرسىلەردىن، مايلىق تاماقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. كۈدە، ياڭيۇ ۋە قازان كاۋاپلىرى قاتتىق چەكلىنىدۇ.

مەقئەت چىقىپ قېلىش

كېسەلنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە چوڭ تەرەت قىلغاندا رەڭگى قىزىل، پارقىراق بولغان ئۈچەي شىللىق پەردىلىرى چوڭ تەرەت بىلەن بىرگە سىرتقا چىقىۋالىدۇ. تەرەتتىن كېيىن ئۆزلۈكىدىن كىرىپ كېتىدۇ. ئوتتۇرا باسقۇچقا كەلگەندە دائىم چىقىپ تۇرىدۇ. تەرەتتىن كېيىن ئۆزلۈكىدىن كىرىپ كېتەلمەي قول بىلەن كىرگۈزۈۋېتىشكە توغرا كېلىدۇ. ئاخىرقى باسقۇچتا تەرەت قىلغاندا چىقىپلا قالماي، بەلكى يۆتەلگەندە، چۈشكۈرگەندە، ئۆرە تۇرغاندا، ماڭغاندىمۇ ئۆزلۈكىدىن چىقىۋالىدۇ، تەرەت قىلغاندا قاتتىق ئاغرىيدۇ.

ئالدىراپ ئوپىراتسىيە قىلماي، بەلكى ئىممونت كۈچىنى ئاشۇرۇش مەقسەت قىلىنىدۇ. ئاسان سىڭىدىغان ئەمما قۇۋۋەت-

لىك تاماقلار بېرىلىدۇ. نېرۋىنى كۈچلەندۈرىدىغان دورىلار بۇيى-
رۇلىدۇ. ئاچچىق، چۈچۈمەل ۋە بەك سوغۇق تاماقلار چەكلىنىدۇ.

مەقئەت يارىسى

مەقئەت گىرۋەكلىرى ۋە ئەتراپىدا زەخمە (يارا) پەيدا بولىدۇ.

سىرتىدىن گۇڭگۇرتلۇك دورا سۈركەشتىن، ئىچكى جەھەتتىن ئىسسىقلىق دورا ۋە تاماق ئىستېمال قىلىشتىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ. يەڭگىل ۋە مۆتىدىل تاماق بېرىش بىلەن بىرگە، يارا ئەتراپىغا ياللۇغ قايتۇرغۇچ ۋە قۇرۇتقۇچى دورىلار سېپىلىدۇ. ئىچىدىن ماددىلارنى تەڭشىگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ.

بەزگەك

بۇ كېسەلنىڭ يوشۇرۇن دەۋرىدە قىزىتما باشلىنىشتىن بۇرۇن بىمارنىڭ تەبىئىتى سۇسلاپ ھورۇنلىشىدۇ، پۇت - قولى سىرقىراپ بەللىرى ئاغرىيدۇ. بەزىدە يېشى قايدۇ. ئۇيقۇسى كەلمەيدۇ ئىشتىھاسى تۈتۈلىدۇ. بۇ خىل كېسەل ئاۋۋال توڭۇپ ئادىن قىزىش ۋە تەرلەپ قىزىتما بېنىشتەك 3 باسقۇچنى بېسىپ ئۆتىدۇ، بۇ بەزگەكنىڭ ئاساسلىق ئالامىتى ھېسابلىنىدۇ. تەس سىڭىدىغان غەلىز تاماقلاردىن ۋە بەلغەم كۆپەيتىدىغان ھۆل - سوغۇق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك. ئاسان سىڭىدىغان تاماقلارنى، مەسىلەن: ئوغلاق، پاقلان، ئۇچار قانات گۆشلىرىنى ئېلىپ ھۆل زەنجىبىل ۋە پىننىلەر بىلەن قوشۇپ بېرىش كېرەك. بارلىق ئىسسىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. تۈ-

خۇم، خورما، گۈلە، نوقۇت قاتارلىقلار بېرىلمەيدۇ.
تامىقىغا ئانار ئۇرۇقى، ئەينۇلا سېلىپ چۈچۈملەشتۈرۈلگەن ئارپا ئېشى، پالەك، سېمىز ئوت، قاپاق، چۆجە گۆشىلەرى بىلەن تەييارلانغان شورپا ياكى كۆك يۇمىغاقسۇت بىلەن ئەينۇلا سېلىنغان پاقلان بويۇن گۆشىنىڭ شورپىسى بېرىلىدۇ.

كېزىك

بۇ كېسەللىكتە جىگەر ئىشىيدۇ، يېشىل سېرىق قارا رەڭلىك قۇسىدۇ، ئىچى سۈرىدۇ، قورسىقى ئاغرىيدۇ، ئاغزى قۇرۇپ ناھايىتى ئۇسسايىدۇ، كۆڭلى ئاينىش ئېغىر بولىدۇ. قىزىتەمسى يۇقىرى بولىدۇ.

ئوزۇقلۇقىغا تەرخەمەك قاتارلىق ھەرخىل كۆكتاتلار، تاۋۇز، ئالما، ئەينۇلا، نەشپۈت، ماش قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. ھەرقانداق ئىسسىقلىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، مەسىلەن: لازا، قارا شېكەر، سۇماي، تۇخۇم، خورما، سۈت قاتارلىقلار.

تامىقىغا ئارپا ئېشى قىلىپ بېرىپ، تاتلىق ئانار سۈيى قوشۇپ بېرىلىدۇ. بىمار بەك ئاجىزلاپ كەتكەن بولسا چۈجە شورپىسى قوشۇپ بېرىلىدۇ ياكى شورپىغا ئەينۇلا ياكى قارا ئۆرۈك ياكى زىرىق قوشۇپ بېرىلىدۇ. قىزىتما يانغاندىن كېيىن گۈرۈچ شويلىسىنى تەمرى ھىندى مۇرابباسى بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ. تەدرىجىي ھالدا ئادەتتىكى تاماقلارغا كۆندۈرۈلىدۇ. كېسەل بۇ كېسەلدە ئۈچەي تېشىلگەندىن باشقا ئەھۋاللاردا قورساقنى بەك ئاچۇرۇۋەتمەسلىك، بىمارنى بەك ئۇسسۇتۇۋەتمەسلىك لازا ۋە قارىمۇچقا ئوخشاش ئۈچەينى غىدىقلىغۇچى نەرسىلەرنى چەكلەش لازىم.

ئورۇقلاپ كېتىش

بىمار ئىنتايىن ئورۇق بولۇپ، چىرايى تاتىراڭغۇ بولىدۇ، تاماقنى ئاز يەيدۇ، كۆپىنچە ھاللاردا قەۋزىيەت بولىدۇ، سۈيدۈ-كى ئاز، ئۇيقۇسى كەم، ئەرزمەس ئىشلارغا ئاسان ئاچچىقلىنىد-غان بولۇپ قالىدۇ، بەك ئىسسىق ياكى بەك سوغۇق ھاۋاغا بەرداشلىق بېرەلمەي ھۇشىدىن كېتىشى مۇمكىن.

ئالدى بىلەن ئورۇقلاشقا سەۋەب بولغان ئىچكى، تاشقى ئا-مىللارنى ئېنىقلاپ، كېسەل پەيدا قىلغۇچى سەۋەبلەرنى توڭتىش كېرەك. ئاندىن كېيىن بەدەننى سەمىرتكۈچى ھەرخىل يېمەك - ئىچمەك ۋە دورىلارنى ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ تەدرىجىي ھالدا ئىستېمال قىلدۇرۇش، ئوزۇقلۇقلارنى بەدەنگە سىڭدۇرۇپ قول، پۇت ۋە بەدەن تېرىلىرىغىچە يەتكۈزۈش ئۈچۈن كۈن ئارىلاپ يۇيۇندۇرۇپ تۇرۇش لازىم. بەزى كۈنلىرى بەدەننى يۇمشىتىپ ھۆللەشتۈرۈش ئۈچۈن گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى، توخۇ يېغى قاتارلىق ھۆللۈك يەتكۈزگۈچى ياغلار بىلەن ئاز - ئاز ياغلىنىپ تۇرۇش لازىم. تۇرمۇش ۋە روھىي جەھەتتە يۇمشاق، پاكىز كىيىملەرنى كېيىش، خۇش پۇراقلىق، ھاۋالىق جايلاردا ئولتۇ-رۇش، ئارام ئېلىش، دامكا، شاھمات، قەرت قاتارلىق يەڭگىل كۆڭۈل ئېچىش پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇللىنىش لازىم.

غىزاسى ئۈچۈن گۈرۈچ شىرىسى، ئارپا شىرىسى، ئاتىلا، كالا پاقالچەك شورپىسى ۋە گۆشلىرى، ياش توخۇ گۆشى، ئۆر-دەك گۆشى، كەكلىك گۆشى، پاقلان گۆشى، كۆك كەپتەر باچ-كىسى گۆشى قاتارلىق نەرسىلەر بېرىلىدۇ. قانچىلىك ئوزۇقلاند-دۇرۇشنى بىمارنىڭ كۆتۈرەلىشى، ھەزىم قىلىپ سىڭدۇرۇش ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەش لازىم.

سەمىرپ كېتىش

بەدەندە غەيرىي تەبىئىي ماددىلار كۆپىيىپ كەتكەنلىكى سەۋە-

بىدىن بىمار پەرھىز تۇتۇپ تۇرسىمۇ يەنىلا سەمىرىپ كەتكەنلىكىدىن كۆرسىتىدۇ. بويۇن، قوساق، كاسا قىسىملىرى ئالاھىدە سېمىز كۆرۈنىدۇ، نەپىسى قىيىنلىشىدۇ، ئاخىرىدا دىئابىت، يۈرەك تىنقىلمىسى قاتارلىقلار كېلىپ چىقىدۇ. تۇرمۇشنى رەتكە سېلىش ۋە نورمال ئوزۇقلىنىش، تەنتەربىيە، بەدەن چېنىقتۇرۇشقا ئادەتلىنىش، ھاراق - شاراب ئىچىمەسلىك، ماي، سېرىق ياغ، تۇخۇم، سۈت، شېكەر، كەمپۈت، ياغداق مېغىزى، بادام، ئۈزۈم، ئۈجمە، ئەنجۈر، قوغۇن قاتارلىقلارنى ئاز ئىستېمال قىلىش، كەچتە يەڭگىل ئوزۇقلىنىش، ھەرقانداق چاغدا تاماقتىن كېيىنلا ئۇخلىماسلىق، بولۇپمۇ سەمدىرىپ كېتىش ئېھتىمالى كۆرۈلسە سوتكىسىغا يەتتە سائەتتىن كۆپ ئۇخلىماسلىق، ئالما، ئۆرۈك، شاپتۇل، تاۋۇز، كۆكتاتلارنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش ئارقىلىق گۆش، ياغ، ئۇن، گۈرۈچلۈك تاماقلارنىڭ مىقدارىنى ئازايتىش، ئاز تاماق يېيىش، ئۇسسۇزلۇقنى ئازايتىش، چوڭ - كىچىك تەرەت ئازىيىپ كەتسە ياكى قەۋزىيەت بولۇش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە، چوڭ تەرەتنى راۋان قىلىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىشى لازىم.

بۆرەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلۇشى

سۈيىدۈكى قىزغۇچ كېلىدۇ، بۆرەك ساھەسىنى باسقاندا ئىسسىق بىلىنىدۇ، كۆپ ئۇسسايىدۇ كېيىن بۆرەكتە ئورۇقلاش، زەئىپلىشىش كۆرۈلىدۇ. قورغاق تاماقلاردىن، ئاچچىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. مېغىزلىق دورا ۋە يېمەكلىكلەر بېرىلمەيدۇ، ھەر خىل مۇسابىقىلەرگە قاتناشتۇرۇلمايدۇ. يەڭگىل، سىڭىشلىق تاماقلار ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. ئاپتاپ ئۆتۈپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

بۆرەك مىزاجىنىڭ سوغۇقتىن بۇزۇلۇشى

سۈيۈۈكى ئاق كېلىدۇ، بۆرەك ساھەسىنى باسقاندا سوغۇق بىلىنىدۇ ھەم سوغۇقلۇقنىڭ باشقا ئالامەتلىرى تېپىلىدۇ. ئۇزۇن داۋاملاشسا بۆرەك ئۇرۇقلاش، بۆرەك زەئىپلىشىش ۋە بۆرەك ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەر پەيدا بولىدۇ. بۇ كېسەللىكنى بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇشتىن پەرقلەندۈرۈپ داۋالاش كېرەك. ئاچچىق نەرسىلەردىن ئىسپىرتلىق ۋە باشقا قۇتلىق ئىچىملىكلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. نەم يەردە يېيىش، يېلىڭ يۈرۈش ۋە كۆپ ئۇخلاش چەكلىنىدۇ.

بۆرەك ئاجىزلىقى

بۆرەكنىڭ مىزاجى ئىسسىقتىن بۇزۇلۇپ زەئىپلەشكەن بولسا تومۇرى تېز، سۈيۈۈكى قىزىل كېلىدۇ، كۆپ ئۇسسايىدۇ، بۆرەك ساھەسىنى باسقاندا (تۇتقاندا) ئىسسىق بىلىنىدۇ. سوغۇقتىن بولغان بولسا ئۇنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ. ئۇندىن باشقا بىمار ئولتۇرۇپ - قوپقاندا ياكى ئېگىلگەندە بەل ئاجىزلىقى مەلۇم بولىدۇ.

ئەتىيازدا ئۈزۈم تالىدىن تامغان سۇغا بىر ئاز تۇز سېلىپ 9 كۈن ئىچىدە پايدىسى بار. ئاچچىق - چۈچۈك نەرسىلەر بىلەن پىشۇرۇلغان باش - پاقالچاق، سۈت ئېشى، ئارپا ۋە بۇغدايلاردىن تەييارلانغان تالقانلارنى ئىستېمال قىلىش لازىم. بادام، ياڭاق ۋە ھەرخىل مېغىزلار بېرىلىدۇ. بارلىق سوغۇق ئىچىملىك ۋە ھاراقىلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

ئىسسىقتىن بولغان دىئابىت

بىمار كۆپ ئۇسسايىدۇ ئىنچىكە بەل ۋە بۆرەك ئولىدا تۇيۇق-
سىز ئىچىشىش بولىدۇ. كۆپ سىيدۇ سۈيدۈك رەڭگى ئاق بولىدۇ،
ئىشتىھاسى ئېچىلىپ كۆپ يەيدۇ لېكىن ئۇرۇقلاپ كېتىدۇ.
سۈيدۈكتە شېكەر ماددىسى بولغانلىقتىن چىۋىنلەر ئولىشىدۇ.
ئۆلىدۇ.

يېمەك - ئىچمەك جەھەتتە ئاچچىق - چۈچۈك غىزالار
بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇلىدۇ، مەسىلەن، ئاچچىقسۇ، سىركە قاتار-
لىقلارنى ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. چۈنكى بۇلار سوغۇق بولۇپ،
قورغۇچى تەسىرگە ئىگە. ئامىقى ئۈچۈن گۆش، تۇخۇم بېرىلىدۇ.
دۇ. كەپتەر شورپىسى ئىستېمال قىلغان ياخشىراق. نان، يېچىدۇ.
نە قاتارلىقلار چەكلىنىدۇ شېكەر، كەمپۇت قاتارلىق تاتلىق نەرسىلەر
يېرىلمەيدۇ.

سوغۇقتىن بولغان دىئابىت

ئىسسىقلىقنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلمەيدۇ. كۆپ سىيدۇ. لې-
كىن ئۇسۇزلۇقمۇ كۆرۈلىدۇ، ئىسسىق دىئابىتتىكى ئۇسۇزلۇققا
يەتمەيدۇ، سۈيدۈكتە شېكەر بولمايدۇ.
يۈرەكنى قىزىتىش مەقسىتىدە نوقۇتنى قاينىتىپ سۈيىنى
ئېچىپ، ئۆزىنى يېسە بولىدۇ. كەپتەر ۋە قۇچقاچ، چۈجە،
توخۇ، قىرغاۋۇل، چىل، كەكلىك قاتارلىق جانىۋارلارنىڭ گۆش-
لىرىنى كاۋاپ قىلىپ بېرىش، كۆك كەپتەر شورپىسىغا نوقۇت
سېلىپ پىشۇرۇپ بېرىش، كاۋاپ قىلىپ بېرىش، دانلىق ئاشلىق-
لارنى مۇمكىنقەدەر ئاز ئىستېمال قىلىش لازىم. تاتلىق نەرسىدە-
لەرنى، ئىستېمال قىلماسلىق لازىم. لېكىن ساپ ھەسەل بولسا

مەنپەئەت قىلىدۇ.

بۆرەك ئورۇقلاپ كېتىش

بۆرەك مىزاجى ئىسسىق ياكى سوغۇقتىن بۇزۇلۇش، كۆپ جىما قىلىش ياكى كۆپ ئىستىفراغ قىلىش سەۋەبىدىن بۆرەك ئورۇقلاپ كېتىدۇ. سۈيدۈك مىقدارى كۆپ، رەڭگى ئاق بولىدۇ. بەل ئاغرىش، باھ زەئىپلىكى پەيدا قىلىدۇ. بەزىدە باش ئاغرىش، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىشىش كۆرۈلىدۇ.

مېغىزلىق دورا ۋە يېمەكلىكلەر يېگۈزۈلىدۇ. مېغىر ئەقلىي ئەمگەك ۋە يۈك كۆتۈرۈشكە ئوخشاش جىسمانىي ئەمگەكلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ئىسپىرتلىق ۋە چۈچۈمەل ئىچىملىكلەر، سوغۇق كۆكتاتلار چەكلىنىدۇ. مۇۋاپىق تەنھەرىكەت قىلدۇرۇلىدۇ.

بۆرەك ۋە سۈيدۈك يولىغا تاش چۈشۈش

قورساق ئېسىلىش، تاماق يېگەندىن كېيىن كۆپۈش، كېكەك-رىش، باش ئاغرىش، موسكۇللار يىغىلىپ قېلىش، بىئارام-بولۇش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. ئۇندىن باشقا، بەل ئاغرىدۇ. بىمار ماڭالمايدۇ، سۈيدۈكى ئارقىمۇ - ئارقا كېلىدۇ. سىيىپ بولغاندىن كېيىن ياكى سىيگەن ۋاقىتتا سۈيدۈك يولىدا غىدىقلىنىش سېزىمى بولىدۇ. سۈيدۈك يولى ئاغزى قىزىرىپ قالىدۇ سۈيىدۇ. كى قويۇق كېلىدۇ، قەيەرگە سىيسە شۇ يەر ئاقىرىپ قالىدۇ. قويۇق ۋە تەستە سىڭىدىغان تاماقلار بېرىلمەيدۇ، قان-قويۇقلىشىپ قېلىشتىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ. مېغىر ۋە ئۆرە تۇرۇپ ئىشلەيدىغان ئەمگەكلەردىن، يانچە يېتىپ جىما قىلىشتىن ساقلىنىدۇ ھاراق ئىچىلمەيدۇ. يەڭگىل تاماقلار بېرىلىپ، يەڭگىل

ھەرىكەتلەر قىلدۇرۇلىدۇ.

دوۋساق ئاجىزلىشىش

دوۋساق ئاجىزلاپ كەتكەنلىك سەۋەبىدىن بىمارنىڭ سىيگە-سى كېلىپ تۇرىدۇ لېكىن كۈچەپمۇ سىيەلمەيدۇ. دەسلەپتە كەينى - كەينىدىن كېلىدۇ. كېيىن دوۋسۇن سۈيدۈككە تولغانلىق-تىن چوڭىيىدۇ ھەم سۈيدۈك تېمىپ تۇرىدۇ، پۇت ئىششىيدۇ. بۆرەكنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورا ۋە تاماقلار بۇ كېسەللىككە مەنپەئەت قىلىدۇ. بادام، پىستە ۋە ھەسەل بېرىلىدۇ. ئاچچىق ۋە ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

دوۋساق ئاغرىقى

دوۋساق ساھەسىدىن ئاغرىق باشلىنىدۇ، بىمار بۇخىل ئاغ-رىقتىن ناھايىتى پەرىشان بولىدۇ. ياللۇغ قايتۇرۇش چارىلىرى بىلەن بىللە دوۋساق كۈچىنى ئاشۇرۇش تەدبىرلىرى قوللىنىلىدۇ. ئاچچىق ۋە ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر، يەللىك ۋە قويۇق تاماقلار چەكلىنىدۇ. ئىسسىق ئۆتكۈزۈشتىن ساقلىنىدۇ. دورا چېپىشقا تېخىمۇ بولمايدۇ.

سۈيدۈك تۇتۇلۇش

بۇ كېسەلدە سۈيدۈك ناھايىتى تەستە كېلىدۇ ياكى سۈيدۈك تۇتۇلىدۇ. ئەگەر ياشلاردا سۈيدۈك كانلىدا بىرەر سەۋەبتىن توسۇلۇش بولسا، دەسلەپتە كەينى - كەينىدىن سۈيدۈك قىستاي-دۇ، كېيىن سۈيدۈك توختاپ - توختاپ كېلىدۇ، بۇ ۋاقىتتا دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈپ سەۋەبىنى ئېنىقلىتىش لازىم.

ئىچى سۈرۈش سەۋەبلىك سۈيدۈك ئازىيىپ كېتىش بىلەن پەرقلىنىدۇرۇپ ئوزۇقلىنىش لازىم. سەۋەبى ئېنىقلانماستىن بۇ- رۇن كۈچلۈك سۈيدۈك ھەيدىگۈچى چارلىرىدىن ساقلىنىش كې- رەك. قويۇق تاماقلار بېرىلمەيدۇ. دىمىق ھاۋادا تۇرۇشقا بولمايدۇ.

سۈيدۈك تامچىلاپ ۋە ئېچىشىپ كېلىش

بىمارنى دائىم سۈيدۈك قىستاپ تۇرىدۇ. لېكىن بىر تامچە سىيگەندىن باشقا سۈيدۈك چىقمايدۇ. بەزىدە سۈيدۈك كۆيۈشۈپ ئېچىشىپ كېلىدۇ. سۈيدۈك قىزىل ياكى سېرىققا مايىل ھالەتتە بولىدۇ، لېكىن ئۇنىڭدا يىرىك ھەم باشقا ئاجراتما ماددىلار بول- مايدۇ، سىيىپ بولغاندىن كېيىن ئۇزۇنغىچە تامچىلاپ تۇرىدۇ. قوغۇن ئۇرۇقى سۈيى بېرىلىدۇ. قورۇلغان ۋە ئاچچىق تاماقلار، گىرادۇسى يۇقىرى ھاراقلار ھەمدە تاماكا قەتئىي چەك- لىنىدۇ. جىنسىي مۇناسىۋەتتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. قانىنى بۇزىدىغان يەللىك ۋە ئېغىر يېمەكلىكلەر بېرىلمەيدۇ، دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈش لازىم.

سۈيدۈك تۇتالماسلىق

بۇ خىلمۇ - خىل كېسەللىكلەرنىڭ ئالامىتى بولۇپ، مۇس- تەقىل كېسەللىك ئەمەس، بۇ كېسەلدە سۈيدۈك ئىختىيارىي چىقىپ كېتىدۇ.

مېڭىنى مۇداپىئە قىلىش ئۈچۈن ئاچچىق، چۈچۈمەل نەرسى- لەرنى يېيىشتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. دوۋساق ئەتراپىغا مۇۋا- پىق ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ بەرسىمۇ بولىدۇ. سەۋەبى ئېنىقلىتىپ، ساقايغىچە ئۈزمەي داۋالانىش كېرەك.

سىيىپ يېتىش

كېچىدە ئۇخلىغان ۋاقىتتا ئىختىيارسىز ئورنىغا سىيىپ قويدۇ.

بالىلارنى كۆپ يۇيماسلىق، كەچلىكى گاڭچەن، قۇتىلىق ئىچىملىك ياكى تاۋۇز بەرمەسلىك لازىم. تامىقىغا ياڭاق، بادام ۋە باشقا مېغىزلىق مېۋىلەرنى قوشۇپ بېرىش، بالىنىڭ بېلى، يىرىقى ۋە تاپىنىنى ياڭاق مېۋىسى بىلەن مايلاپ بېرىش لازىم. سۈيدۈك توختاتقۇچى دورىلارنى كۆپ بېرىش، زورلاپ مايلىق تاماق بېرىش چەكلىنىدۇ.

مۇمكىنقەدەر ئەسلى سەۋەبىنى تېپىپ داۋالاش لازىم. كىچىك بالىلارنى ئۇرۇپ - تىللاپ، دەشنام بەرمەسلىك، سىلىقلىق بىلەن بالىنىڭ روھىي ھالىتىنى كۆتۈرۈشكە تىرىشىش لازىم. يېمەك - ئىچمەكنى تەڭشەش، ھۆللۈك، سۇيۇقلۇق، سوغۇقلۇق نەرسىلەرنى بەرمەسلىك، كەچتە، ئۇسسۇلۇقنى چەكلەش، ھەسەل گۈلچىنى يېدۈرۈش، ئىسسىق ياغلار بىلەن ياغلاش لازىم، توشقان گۆشنى داۋاملىق يېيىش بۇ كېسەلگە ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ. بالىلارغا ياڭاق مېغىزىدىن مۇۋاپىق مىقداردا چاي سۈت - لەپ بەرسە، خولىجاننى تالقانلاپ تۆت گرام مىقداردا ئېلىپ ئاخشامدا سۇۋۇتۇلغان سۇ بىلەن ئىچكۈزسە بۇ كېسەلگە ناھايىتى پايدىلىق.

قان سىيىش

بەزىدە سۈيدۈككە قان ئارىلىشىپ كېلىدۇ، بەزىدە سۈيدۈك تىن ئىلگىرى ياكى كېيىن قان كېلىدۇ ۋە بەزىدە سۈيدۈك ئورنىغا خاس قان كېلىدۇ.

دوۋساق ۋە بەل قىسىمغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈشكە بولمايدۇ. لازا ۋە ئاق ھاراق قاتتىق چەكلىنىدۇ. قارا نۇقۇت، دارچىنلارنى سېلىپ ئۇستىخان شورپىسى قىلىپ ئىچكۈزۈلسە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ، سەكرەش، ھېرىپ كېتىش ۋە ئەقلى ئەمگەكنى كۆپ قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

دوۋساق ياللىغى

دوۋساق ساھەسىدە ئېغىرلىق ھەم يېقىمىسىزلىق بولىدۇ، سۈيدۈك قېنىق رەڭدە، سېسىق پۇراقلىق بولۇپ، كەينى - كەينىدىن ئاز - ئازدىن كېلىدۇ، دوۋسۇن ساھەسى ئاغرىيدۇ. سۈيدۈككە يېرىك ئارىلاشقان بولىدۇ، بەزىدە ئاغرىق ئۇرۇقدان ھەم يوتا قىسمىغىچە تارقايدۇ، قىزىتما بولىدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ، ئەگەر كېسەل تەرەققىي قىلسا ئاغرىق تېخىمۇ كۈچىيىدۇ. بەزىدە سۈيدۈك تامچىلاپ كېلىدۇ، بەزىدە ئېچىشىش بولىدۇ. قان تازىلاش ۋە يەرلىك ئورۇندىكى ياللىغلارنى قايتۇرغۇچى چارىلەر قىلىنىدۇ. چېيىغا زىرىق، نېلۇپەر ۋە لاجىندەنە سېلىپ بېرىلىدۇ. ھاراق ئىچىش، تاماقنى كۆپ يېيىش ۋە ئاچچىق نەرسىلەرنى يېيىشتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. قەۋزىيەت بوپ قېلىشتىن ساقلىنىلىدۇ.

باھ ئاجىزلىقى

جىنسىي ئەزا بوشىشىپ جىنسىي قۇۋۋىتى ئاجىزلاپ كېتىدۇ، جىنسىي مۇناسىۋەت قىلىشقا ئىنتىلىش بولمايدۇ. ئورۇق كىشىلەر بولسا سەمىرىتىش، مەنى كۆپەيتىش خۇ. سۈسپىتىگە ئىگە دورىلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك. بەزى جىنسىي ئاجىزلىقلارنىڭ كېلىپ چىقىشى روھىي ئامىللارغا ناھايىتى.

يېتى زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇ تولاراق ۋاقىتلىق بولىدۇ. سەۋەبچى ئامىل تۈگىگەندىن كېيىن جىنسىي قابىلىيىتى ئۆزلۈ- كىدىن ئەسلىگە كېلىدۇ.

مەنىي تېز كېتىپ قېلىش

جىنسىي مۇناسىۋەت قىلماي تۇرۇپلا ئۆزىنى تۇتۇۋالماي مەنىي تېز مېڭىپ كېتىپ كۆڭۈلدىكىدەك جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزەلمەيدۇ.

مېڭىگە زىيان قىلىدىغان بارلىق ئىچىملىك - چېكىملىكلەر- دىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ئۇزۇن ئۆرە تۇرۇپ ئىشلەيدىغان كىشىلەر ۋە ئوت ياكى تۆمۈر بىلەن ھەپلىشىدىغان كاسىپلار مېڭە ۋە بۆرەككە پايدىلىق يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىشى كېرەك. باھنى كۈچەيتىدىغان ئوكۇلنى كۆپ سالدۇ- رۇشقا ياكى سۈنئىي دورىلارنى كۆپ يېيىشكە بولمايدۇ.

كۆپ ئېھتىلام بولۇش

نەچچە كۈندە بىر قېتىم ياكى ھەر كۈنى بىر قېتىم كېسەل ئېغىرلاشقاندا ھەر كېچىدە 3 - 2 قېتىم، ھەتتا بەزىدە كۈندۈزى ئۇخلىغان ۋاقىتتىمۇ مەنىي مېڭىپ كېتىدۇ.

مېڭىنى ئاجىزلىتىدىغان ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر، چۈچۈ- مەل قورۇمىلار، ناچار سۆھبەتلەر ھەمدە قالايمىقان جىنسىي ئۇرۇنۇشلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. بىمار يەتتىكىل جىسمانىي ئەم- گەك بىلەن چېنىقتۇرۇلىدۇ. مېڭىزلىق تائاملار بېرىلىپ مېڭى- سى كۈچلەندۈرۈلىدۇ.

قولدا لەززەتلىنىش

بۇنىڭدا بىمار يالغۇز قالغاندا ياكى ئۇخلىغاندا قول بىلەن ياكى باشقا ئۇسۇللار ئارقىلىق كۈندۈز ياكى كېچىدە بىر ياكى بىر قانچە قېتىم مەنىي ماڭغۇزىدۇ. بۇنىڭ بىلەن مەنىنىڭ كۆپ يوقىلىشى سەۋەبىدىن بارلىق ئەزا ھەم قۇۋۋەتلەر ئاجىزلايدۇ. سۈيۈك كەينى - كەينىدىن كۆيۈشۈپ كېلىدۇ. جىنسىي ئەزا (زەكەر) نىڭ تۈۋى ئىنچىكە، بېشى توم بولۇپ قالىدۇ زەكەر كىچىكلەپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن كۆپ ئېھتىلام بولۇش، مەنىي تۇتالماسلىق، باھ ئاجىزلاش قاتارلىقلار پەيدا بولىدۇ. ماغدۇر - سىزلىنىپ ھورۇنلۇشۇپ كېتىدۇ. بەدەن تېرىلىرى سارغىيىپ خۇنۇكلىشىدۇ، قول - پۇتلىرى سوغۇق بولىدۇ، كۆزنىڭ ئاستىغا قارا ھالقا چۈشىدۇ، كۆرۈش كۈچى كۈندىن - كۈنگە ئاجىزلايدۇ، ئىشتىھا تۇتۇلىدۇ، ھەزىم بۇزۇلىدۇ، قەۋزىيەت بولىدۇ، ئەستە ساقلاش ئىقتىدارى ھەم ئەقلىي قابىلىيىتى ئاجىزلايدۇ، باش ئاغرىيدۇ ھەم قايىدۇ.

بۇ ناچار ئادەتنى قەتئىي تاشلاش ئەمما ئىلگىرى قىلغان ئىشلىرىدىن پۇشايمان قىلىپ، روھىي ئازاپقا دۇچار بولۇپ قالماسلىق لازىم. نېرۋىنى كۈچەيتىدىغان مېغىزلىق مېۋىلەر بېرىدۇ، يازلىقى يالاڭ ئاياق توپىدا مېڭىپ بېرىدۇ ۋە يەڭگىل دەرىجىدە قۇمغا كۆمۈلىدۇ. يەڭگىل تەنھەرىكەت ۋە ئەمگەك بىلەن ئىرادىسى چېتىقتۇرۇلىدۇ، بارلىق ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر چەكلىنىدۇ.

ئۇرۇقدان ياللۇغى ۋە ئۇرۇقدان ئاغرىقى

ئۇرۇقدان ياللۇغلانغاندا، ئىششىپ قاققتى ئاغرىيدۇ. ئاغرىق قورساقنىڭ تۆۋەنكى قىسمى بەل ساھەسىدە ئالاھىدە بولىدۇ.

دۇ. ئاغرىق يوتىلارغا قەدەر يېتىپ بارىدۇ، قىزىتما بولىدۇ،
كۆڭلى ئېلىشىدۇ، ھۆ بولىدۇ.
پەرىزى: كالا گۆشى، پىتىرئان، نوقۇت قاتارلىق تەستە
سىڭىدىغان، شۇنىڭدەك يەل پەيدا قىلىدىغان نەرسىلەرنى ئىستىپ-
مال قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

ئۈچەي چۈشۈش

سېرىقئەت يىرتىلغاندا ئۈچەي ئۇرۇقدان خالتىسىغا چۈشۈۋا-
لىدۇ، بۇ كۆپىنچە ئاستا خاراكىتىرلىك بولۇپ، كېسەل ئېغىرلا-
شقاندا خۇددى ئۈچەي توسۇلۇپ قالغاندەك قاتتىق ئاغرىيدۇ.
ھەر خىل قورغۇچى نەرسىلەر، مەسىلەن، لوۋيا، دادۇر،
پۇرچاق، ئامۇت، ئالما قاتارلىق يەللىك مېۋىلەرنى ئىستىمال
قىلىشتىن چەكلەش، پەتەق تاسمىسى بىلەن ئۇنى يۇقىرىغا كۆتۈ-
رۈپ تېڭىۋېلىش، ئېغىر ھەرىكەت قىلىشتىن چەكلەش، يۇقىرى
ئاۋاز بىلەن ۋارقىراش، جىنسىي مۇناسىۋەت قىلىشتىن ساقلى-
نىش، قورساقنى بەك توپغۇزۇۋېتىشتىن ساقلىنىش لازىم. بۇ-
نىڭ بىلەن ياخشى بولمىسا ئەڭ ياخشىسى ئوپېراتسىيە ئۇسۇلى
بىلەن داۋالاش لازىم.

زەكەر ياللۇغى ۋە يارىسى

زەكەردە ياللۇغلىنىش، ئىششىش ئەھۋالى بولىدۇ ھەم قايد-
سى خىلىتتىن بولغان بولسا شۇنىڭغا خاس ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.
بۇ بىرخىل يۇقۇملۇق كېسەل بولۇپ، سۈيدۈك يولى ياللۇغ-
لىنىپ سۈيدۈك يولىدا ئېچىشىش، كۆيۈشۈش ئالامەتلىرى كۆرۈ-
لىدۇ. سۈيدۈك ئېچىشىپ ئاغرىتىپ كېلىدۇ، سۈيدۈكتە يىرىك
بولىدۇ، جىنسىي ئەزاغا ئىشتان تېگىپ كەتسە ئاغرىپ كېتىدۇ.

بەزىدە سۈيۈدۈك يولى ئۆتكۈر دەرىجىدە ياللۇغلانسا سۈيۈدۈك توخ-
تايدۇ ياكى قان سىيىدۇ.
جىددىي داۋالانىش لازىم. بۇ جەرياندا ئاچچىق نەرسىلەرنى
يېيىشتىن، ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەرنى ئىچىشتىن پەرھىز قىل-
دۇرۇلىدۇ. ئېغىر نەرسە كۆتۈرۈش، جىنسىي ئالاقە قىلىش
قاتتىق چەكلىنىدۇ.

تۇغماسلىق

بۇ كېسەلگە گىرىپتار بولغۇچى ئاياللار ئەۋلاد قالدۇرالماي-
دۇ، ئادەتتە باشقا ئالامەت بولمايدۇ.
داۋالانسا خېلى بىر قىسىم ئاياللارنىڭ تۇغۇت ئىقتىدارى
ئەسلىگە كېلىدۇ. شۇڭا ئۈمىدسىزلىكتىن، ئاسما ئوكۇلنى كۆپ
سالدۇرۇشتىن، زىيانلىق ئىچىملىكلەرنى كۆپ ئىچىشتىن پەر-
ھىز قىلىنىدۇ. يەنە بىر قېتىمدا كۆپ كىر يۇيماسلىق، بەك
ئاچچىقلانماسلىق، بەك سەمرىپ كەتمەسلىك لازىم. مېڭىنى
كۈچەيتىش، مەكرو-قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش ناھايىتى
مۇھىم.

ھەيز كەلمەسلىك

ھەيز پەقەتلا كەلمەيدۇ، ياكى بىر ئاز ۋاقىت كېلىپ توختاپ
قالىدۇ ھەمدە مىقدارى ئاز بولىدۇ، كۆپىنچە ئاز - ئازدىن
توختاپ - توختاپ، ئاغرىتىپ كېلىدۇ. ئاغرىقتىن بىمار ناھايىتى
بىئارام بولۇپ، بەزىدە ھوشسىزلىنىپمۇ كېتىدۇ. دوۋسۇن ساھە-
سى، بەل، داس سۆڭىكى ۋە يوتا قىسمىدا ئاغرىش بولىدۇ. بەدەن
ئاجىزلاپ كېتىدۇ، چىراي نۇرسىزلىنىپ سارغىيىدۇ.
مايلىق ۋە قويۇق تاماقلارنى يېيىشتىن، بولۇپمۇ ياتاردا

ئېغىر تاماق پەيلا يېتىشتىن پەرھىز قىلىندۇ. قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، چوڭ - كىچىك تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش ئاساس قىلىپ، دورا ۋە ئوزۇقلىنىشنى شۇ بويىچە تەرتىپكە سېلىش كېرەك. ئوكۇل سالدۇرۇپ مەجبۇرىي ئادەت كەلتۈرۈش كېيىنچە يامان تەسىر بېرىپ قويدۇ. داۋالىنىش مەزگىلىدە قاننى سۈزۈل - تۈزۈلۈش، تەنھەرىكەتنى داۋاملاشتۇرۇش، جۇشقۇن روھىي ھالەتنى ساقلاش تەۋسىيە قىلىندۇ.

ھەيز كۆپ كېلىش

بۇنىڭدا ھەيز كۆپ مىقداردا ھەم تەرتىپسىز كېلىدۇ. ئادەتتە ئىككى خىل شەكىلدە ئۇچرايدۇ، بىرسى، ھەيز داۋاملىشىش ۋاقتى ئۇزۇن بولىدۇ. يەنى ئادەتتە نورمال ۋاقىتتا 5 كۈن داۋاملاشقان بولسا، ھەيز كۆپ كەلگەن ھالەتلەردە 8 - 7 كۈنگىچە داۋاملىشىدۇ، يەنە بىرسى باشقا ۋاقىتلاردا تەرتىپسىز ھالدا ھەيز كېلىدۇ.

ئالدى بىلەن تەكشۈرتۈپ، بالىياتقۇدا ئېغىر ياللۇغلىنىش بولسا ياللۇغ قايتۇرۇش، بۇ ۋاقىتتا ئىسسىق ئۆتكۈزۈلمەسلىك لازىم. ئەگەر قان ئايلىنىش ياخشى بولماسلىق ۋە نېرۋا ئاجىزلىق قى سەۋەبىدىن بولغان بولسا، مېڭىنى كۈچەيتىپ ئىچكى ئاجرات - مىلارنى تەڭشەش ئاساس قىلىندۇ. ھەر ئىككىسىدىلا ئاچچىق ۋە قويۇق تاماق يېيىش، ئۇيغۇسىزلىق ۋە كۆپ ھەرىكەت قىلىش چەكلىنىدۇ.

ئاق خۇن كۆپىيىش

بۇ كېسەلدە ئاياللارنىڭ جىنسىي يولىدىن ئاق سېرىققا مايىل سۇيۇقلۇق چىقىپ تۇرىدۇ، بەل ئاغرىيدۇ، دوۋسۇن چىڭقىلىپ

ئاغرىيدۇ، سۈيۈك كەينى - كەينىدىن كېلىدۇ، تەبىئەت سۇس-
لىشىپ كېسەلچان بولۇپ قالىدۇ، بىرەر ئىش قىلىشنى خالىماي-
دۇ، بەدەن ئاجىزلايدۇ، ئىشتىھاس تۇتۇلىدۇ، ئاغرىتىپ ھەيز
كېلىدۇ، جىنسىي يول قىچىشىدۇ، ھامىلىدار بولالمايدۇ، بۇ
كېسەل كۆپىنچە ياش قىزلاردا ياكى يېڭى توي قىلغانلاردا ياكى
ھەيز كېسىلگەن ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ، ئاق خۇن كۆپىنچە
تۇخۇم ئېقىدەك كېلىدۇ، لېكىن بەك شىرىك بولمايدۇ.

بۇ خىل ئەھۋال ئەسلىدە مېڭىسى ساغلام، تەن سۈپىتى
ياخشى ئاياللاردا يوق ياكى ئاز كۆرۈلىدىغان ئالامەت ھېسابلىنات-
تى. شەھەر - بازار ئاياللىرىدا بۇ ئەھۋالنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى
كۆپىنچە سوغۇق ئىچىملىكلەرنى كۆپ ئىچىش، يېلىڭ كىيى-
نىش، ئىسسىقلىق دورىلار بىلەن يۇيۇنماسلىق، قاتارلىق سالا-
مەتلىككە زىيانلىق تۇرمۇش ئادەتلىرىدىن پەيدا بولىدۇ. بۇ ئۆز
نۆۋىتىدە ئەرلىرىدىمۇ ھەر خىل ياللۇغلارنى پەيدا قىلىپ قويدۇ،
شۇڭا پەرھىزلىرىنى ياخشى ئىگىلەش لازىم.

بويىدىن ئاجراپ كېتىش

بۇ ھامىلىدار بولۇپ 7 ئايلىق بولۇشتىن ئىلگىرى بويىدىن
ئاجراپ كېتىشنى كۆرسىتىدۇ.

بويىدىن ئاجراپ كەتسە ياكى باشقا ۋاسىتىلەر بىلەن بالىنى
ئالدىرۇۋەتسە، بەدەننىڭ ئىممۇنىت كۈچى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ، شۇ-
ڭا، يېتەرلىك ئوزۇقلىنىپ، ئاز دېگەندە 15 كۈن ياخشى ئارام
ئېلىش لازىم. بۇ مەزگىلدە سوغۇق سۇدا يۇيۇنۇش،
كىرى يۇيۇش، گاڭچەن يېيىش ۋە يېلىڭ كېيىنىشتىن ساقلىنىش
لازم.

ھىستېرىيە

بىمار ھوشسىزلانغان بولسىمۇ ئەتراپتىكى ۋاراڭ - چۇرۇڭ - لارنى ئاڭلىيالايدۇ، ئەمما جاۋاب قايتۇرالمىدۇ، ھوشغا كەلگەندىن كېيىن ئاڭلىغان سۆزلىرىنى دەپ بېرەلەيدۇ، چىرايىدا قىزىللىق بولىدۇ، چىشلىرى كىرىشىپ قالغان بولىدۇ، ئەمما تىلىنى چىشلەپ سالمايدۇ، كۆز قارىچۇقى تارىيىپ كېتىدۇ، ھوشسىزلانغان ۋاقىتتا ئېغىزدىن كۆپۈك كەلمەيدۇ، بىمار چۇڭ - قۇر نەپەس ئالىدۇ، بەزىدە يىغلايدۇ، بەزىدە كۈلىدۇ، قورسىقىدىن بىرەر نەرسە ئۈستىگە كۆتۈرۈلۈپ گېلىنى بوغۇۋالغاندەك سېزىم بولىدۇ، كېسەلنىڭ تۇتۇشى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئۆي - قۇسى كەلمەيدۇ، سۈيدۈكى كۆپ بولىدۇ.

يالغۇزلۇق ۋە نېرۋا ئاجىزلىقتىن كېلىپ چىقىدىغان بۇ كېسەللىكتە ئىمكانقەدەر بىمارنى داۋالاش بىلەن بىرگە ئۇنىڭ توي قىلىشنى ئاساسلىق ئويلىشىش لازىم. ئاچچىق ۋە چۈچۈمەل نەرسىلەرنى بەرمەسلىك، خارلىماسلىق، زاخلىق قىلماسلىق لازىم. ئەگەر باشقا كېسەللىكلىرى بولمىسا، توي قىلغاندىن كېيىن كۆپ قىسمى ئوڭشىلىپ كېتىدۇ.

بالياتقۇ ياللۇغى

دوۋسۇن ۋە بەل ئاغرىيدۇ، جىنسىي مۇناسىۋەت قىلغاندا كۆپىنچە ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ، تاشقى جىنسىي ئەزاسى ئېچىشىپ قىزىيدۇ، ھەيز ئاغرىتىپ تەستە كېلىدۇ، سۈيدۈك تامچىلاپ كېلىدۇ. ئەگەر كېسەل ئۆتكۈر بولسا توڭگۇپ تىترەيدۇ، جۇغ - جۇغ بولۇپ قىزىتىدۇ.

يېلىڭ كىيىنىش، چۈچۈمەل نەرسىلەرنى يېيىش، سوغۇق ئىچىملىك ئىچىش ۋە كېسەلنىڭ سوزۇلۇپ كېتىشىدىن ساقلىد.

نىش لازىم. بەل ۋە دوۋسۇنغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش بىلەن بىرگە پۇت ۋە باشنىڭ ئىسسىق تۇتۇلۇشىغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك.

بالىاتقۇ يارىسى

ئاق خۇننىڭ رەڭگى، مىقدارىدا ئۆزگىرىش بولىدۇ، بەزىدە سېرىق، يىرىڭلىق خۇن كېلىدۇ، بەل ئاغرىدۇ، دوۋسۇن چىڭ-قىلىدۇ، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىدۇ. ئالدى بىلەن مۇنتىزىم داۋالىنىپ، شۇ قېتىمدا تولۇق ساقىيىشنى قولغا كەلتۈرۈش لازىم. پۇت ۋە باشنى ئىسسىق تۇتۇش، جىنسىي ئالاقىدىن مەلۇم مۇددەت پەرھىز قىلىش، ئاچچىق نەرسىلەر ۋە مايلىق تاماقلارنى ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك.

جىنسىي يول ياللۇغى

جىنسىي يول ئېچىشىپ، سىيگەندە ئاغرىيدۇ، كەينى - كەينىدىن سىيگۈسى كېلىدۇ، ئەگەر چوڭ - كىچىك جىنسىي ئەزالارمۇ كېسەللەنگەن بولسا، ماڭغاندا ئاغرىش كۈچىيىپ كېتىدۇ، كۆك سېرىققا مايىل سۇيۇقلۇق كېلىدۇ، كېسەل ئۆتكۈر بولسا قىزىتما پەيدا بولىدۇ.

تۆۋەنكى ئەزالارنىڭ تازىلىقى ئالاھىدە تەكىتلىنىدۇ، كونا ۋە يىرىك قەغەز ئىشلىتىش، ئاچچىق نەرسە يېيىش، سوغۇق سۇدا يۇيۇنۇش، قالايىمقان جىنسىي ئالاقە قىلىش چەكلىنىدۇ. يازلىقى قۇمغا چۈشۈش ناھايىتى مەنپەئەتلىك.

مۇياسل

بۇنىڭدا بوغۇملاردىكى پەيلەر يەنى بوغۇم ئىچى ھەم ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى شىللىق تۈزۈلۈشلەر قېلىنلاپ ھەم قاتتىقلىشىپ، بوغۇم ھەرىكىتى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ، پۈتۈن بەدەندىكى بوغۇملار خۇسۇسەن جەينەك، ئوشۇق، تىز بوغۇملىرىدا ئىششىق ۋە ئاغرىش بولىدۇ.

قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، ئىمونىت كۈچىنى ئاشۇرۇشقا ئلاھىدە دىققەت قىلىنىدۇ. بارلىق ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر مىكرو ئېلىمېنتلارنىڭ بەدەندىكى مىقدارىنى ئازايتىپ سۆڭەكنى بۇزىدىغانلىقى ئۈچۈن بۇ كېسەللىكتە قاتتىق پەرھىز قىلىنىدۇ. بادام، ياڭاق بېرىلىدۇ، سوغۇقتا قېلىشتىن، ئېغىر ئەمگەك قىلىشتىن ساقلىنىلىدۇ. خىمىيە تالالىق كىيىملەر كىيىلمەيدۇ.

نقىرەس

ئوشۇق بوغۇمى، قول - پۇت بارماق بوغۇملىرى ئاغرىيدۇ ۋە ئىششىيدۇ.

سوغۇق ئىچىملىك، ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر قاتتىق چەكلىنىدۇ، ياڭاق، بادام ۋە باشقا ئاقسىللىق قۇرۇق مېۋىلەر مەنپەئەت قىلىدۇ. بەزى ئىسسىقلىق مايلارنى ئىشلىتىشمۇ پايدىلىق. بۇ مەزگىلدە سوغۇقتا ئاچ قېلىشقا، ئەقلىي ئەمگەكنى كۆپ قىلىشقا ۋە جىنسىي ئالاقىغا بېرىلىشكە بولمايدۇ.

غول ئاغرىش

غولدا ئېغىرلىق سېزىلىدۇ، كۆكرەك ئومۇرتقىسىدىن تار-

تېپ بەل ئومۇرقىسىنىڭ ئاخىرىغىچە ئاغرىيدۇ، ھەرىكەت قىلغاندا ئاغرىق كۈچىيىدۇ.

ئېغىر نەرسە كۆتۈرۈش، قويۇق تاماقلارنى كۆپ يېيىش ۋە ھاراق ئىچىشتىن پەرھىز قىلىنىدۇ. جىگەر ۋە ئوت خىزمىتى پات - پات تەكشۈرۈلىدۇ ھەمدە قان ئايلىنىش ياخشى بولماسلىق ئەھۋاللىرى كۆرۈلگەن ھامان تەبىئىي داۋالاش ئۇسۇللىرى قوبۇل قىلىنىدۇ.

يانپاش بوغۇم ئاغرىقى

ئاغرىق يانپاشتا بولىدۇ. ئەگەر بۇ ئۇزۇنغىچە داۋاملاشسا ئىرقىنىساغا ئۆزگىرىپ كېتىدۇ، لېكىن بۇنىڭدىكى ئاغرىش يانپاشنىڭ ئىچكى تەرىپىدە بولىدۇ.

ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر سۆڭەكلەرنى بوشاشتۇرىدىغان بولغاچقا ئۇنىڭ بارلىق تۈرلىرى بۇ كېسەللىكتە ئالاھىدە پەرھىز قىلىنىدۇ. قان قوبۇقلىشىشقا قارىتا دورا ۋە يېمەك - ئىچمەكلەر تەرتىپكە سېلىنىدۇ، قويۇق ۋە تەستە سىڭىدىغان تاماقلار چەكلەندۈرۈلىدۇ.

ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى

ئاغرىق يانپاش بوغۇمىدىن باشلىنىپ، تۆۋەنگە يەنى تىز بوغۇمىغىچە ياكى ئۇشۇق بوغۇمىغىچە يىپ تارتقاندا ئاغرىيدۇ، بەزىدە ئاغرىق پۇت بارماقلىرىغا قەدەر يېتىپ بارىدۇ.

ئېغىر نەرسە كۆتۈرۈش، ئۇزۇن مۇددەت ئەمگەك قىلىش ۋە ئوت يېنىدا ئىشلەشتىن ۋاقتىنچە پەرھىز قىلىش، ئۇزۇنغىچە يەڭگىل ھەرىكەت قىلىش لازىم. ئۇزۇلاش، نۇر ئۆتكۈزۈش ياكى پەقەت بولمىغاندا ئوپىراتسىيە قىلىشنى ئويلىشىپ كۆرۈش كېرەك.

پاچاق ۋېنا تومۇرلىرىنىڭ ئەگرى - بۈگرى بولۇپ قېلىشى

بۇ كېسەلدە بىر ياكى ئىككىلا پاچالچەك ۋېنا تومۇرلىرى كېڭىيىپ ئەگرى - بۈگرى كۆپۈپ قالغان بولىدۇ. كۆڭۈل ئاياپ تاماق يېيىش، قويۇق ۋە تەستە سىڭىدىغان ھەمدە مايلىق غىزالارنى ئىستېمال قىلىش، ئېغىر نەرسە كۆتۈرۈش، ئوزۇنغا يۈگۈرۈش قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ، نا-ۋايلىق، ئاشپەزلىك، شوپۇرلۇق ۋە ئوقۇتقۇچىلىق قاتارلىق ئۇ-زۇنغىچە ئۆرە تۇرۇپ ئىشلەيدىغانلار بۇ كېسەللىككە ئالاھىدە دىققەت قىلىشى لازىم. ئوپىراتسىيە قىلىپ ئېلىۋېتىش ئاقىلانى-ئۇسۇل ئەمەس. يەنىلا قان تازىلاش ئۇسۇلى مۇۋاپىق.

قىچىشقاق (قوتۇر)

بىمارنى ئازابلايدىغان ئاساسلىق ئالامىتى قىچىشىشتىن ئىبار-رەت. بولۇپمۇ كېچىسى كۆپرەك قىچىشىدۇ. شۇڭا، كېسەل قىچىشىش ئازابىدىن ئۇخلىيالمايدۇ، بەزى بىمارلاردا قوشۇمچە يۇقۇملىنىپ يېرىڭلايدۇ ۋە بەزى ئالاقىدار بەزىلەر ئىششىپ ئاغ-رىيدۇ.

داۋالىنىش جەريانىدا تۈزلىغان گۆش، تۈزلىغان بېلىق، تۈزغا چىلانغان كۆكتات ۋە ئىسسىقلىق تااملارنى ئىستېمال قىل-ماسلىقى ۋە جىنسىي ئالاقە قىلماسلىقى كېرەك.

چالاش

بىمارنىڭ قۇل بېغىشىدىن تۆۋەن بولغان قول دۈمبىسى،

بويۇن، كۆكرەكنىڭ ئېچىلىپ تۇرىدىغان قىسمى، گەدەن قاتار-
لىق ئورۇنلارنىڭ كىرىشى ئىلگىرى - كېيىن بولۇپ، قوڭۇر
قىزىل تۈسنى ئېلىپ ساق تېرە بىلەن بولغان چېگرىسى ئېنىق
بولىدۇ، كېسەللەنگەن ئورۇن قېچىشىدۇ، تەدرىجىي قېتىشىپ،
قاسراقلىشىپ قېلىنىلىشىدۇ، ئېغىرلاشقاندا، قورساق ئاغرىش
قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

بىمارغا گۆشلۈك، مايلىق ئاسان ھەزىم بولىدىغان يېمەك-
لىكلەر بېرىلىدۇ. يەيدىغان نېنى بىلەن ئاش - تامىقى كېپەكلىك
بۇغداي ئۇنى، پۇرچاق ئۇنى بولۇشى كېرەك. تۇخۇم چالا پىشۇ-
رۇپ بېرىلىدۇ. قىش ئەتىيازدا قۇرۇق مېۋىلەرنى مۇۋاپىق ئىس-
تىمال قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ ۋە مائۇل لەھمى (گۆش سۈيى) بېرىد-
لىدۇ. تەييارلاش ئۇسۇلى: ياغلىرى ئېلىۋېتىلگەن پاقلان گۆش-
نى قىيما قىلىپ داكىدىن ياسالغان خالىتىغا سېلىپ پاكىز داستا
قويۇلىدۇ. ئۈستىگە ئاز - ئازدىن يىلما سۇ قويۇپ قول بىلەن
مىجىلىدۇ ۋە چىققان سۈيىنى ئايرىم قاچىغا قويۇپ تاكى گۆش
ئاقىرىپ گۆش تەمى قالمىغىچە تەكرار مىجىلىدۇ. يىغىلغان
گۆش سۈيى كىچىك داڭقان ياكى قازانغا قويۇپ پەس ئوتتا قاينىد-
تىلىدۇ. قايناشتىن بۇرۇن كۆپىكى ئېلىۋېتىلىدۇ. كۆپ قاينىد-
تىش ھاجەتسىز. بىر ئىككىلا قايناپ ئۆرلىتىش كۇپايە قىلىدۇ.
بىمارنىڭ ماددىسى بىلەن مەجەزگە قاراپ تۈز، قۇرۇتۇلغان يۈم-
خاقسۇت، زىرە، پىننە قوشۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇ ئۇسۇل
خېلى بىر مەزگىل داۋاملاشتۇرۇلىدۇ.

تامىقىغا قاپاق، يۇمخاقسۇت، پالەك سېلىپ بېرىلىدۇ. ئە-
گەر بادام يېغى بولسا تامىقىغا بادام يېغى قوشۇلسىمۇ بولىدۇ.
بىمارنىڭ ماددىسىنى ئېنىقلاپ شۇ ماددىنىڭ پۇشۇرغۇچىسى بىلەن
سۈرگىسى بېرىلىدۇ.

تېرە كېپەكلىشىش

يېنىكرەك بولغاندا تېرىنى ئۇۋۇلىغاندا كېپەكلىشىدۇ، ئې-غىرلىرىدا تېرە كېپەكلىرى ئۆزلىكىدىن چۈشۈپ تۇرىدۇ، تېرە قىچىشىدۇ. ۋە سىلىغاندا تېرە قولغا يېرىك بېلىنىدۇ. بۇ كې-سەلدە كۆپ ھاللاردا بىمارنىڭ ئۇيقۇسى ياخشى بولمايدۇ. ئالدى بىلەن مىجەزنى تەڭشەش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئاۋ-ۋال ماددىنى پۇشۇرغۇچى، كېيىن بەدەننى تازىلىغۇچى دورىلار بىلەن بەدەننى ھۆللەشتۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. دورا ئىشلى-تىشتە قۇرۇق سوغۇق دورىلار بىلەن قۇرۇق ئىسسىق دورىلارنى مۇمكىنقەدەر ئىشلەتمەي، ئەڭ ياخشى ھۆل ئىسسىق ۋە ھۆل سوغۇق كەيپىياتلىق دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك. كالا گۆشى، ئۆچكە گۆشى ۋە تۇزلىغان بېلىق قاتارلىق گۆشلەرنى ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك. بەدەننى گۈل يېغى، قوي يېغى ياكى بادام يېغى بىلەن مايلاپ بېرىش كېرەك.

بۆرە چاقىسى

تېرىنىڭ مەلۇم ئورنى قۇرغاقلىشىپ قىزىرىپ داغ پەيدا بولىدۇ ۋە قىزىل داغلا تېرە يۈزىگە كۆتۈرۈلۈپ چىقىدۇ بۇ داغلار بەزىدە پەيدا بولۇپ بەزىدە يوقاپ كېتىدۇ، قىزىل داغ بار جايدىكى تېرە كېپەكلىشىش مۇمكىن، بەزىدە قىزىل داغ ئاستىدا كىچىك مۇدۇر چاغلار پەيدا بولىدۇ ۋە كىچىك مۇدۇر چاقلار ئۆزئارا بىرلە-شىپ چوڭ - كىچىك ھەر خىل مۇدۇر چاقلارنى پەيدا قىلىدۇ، بۇ خىل ئەھۋالدا يەرلىك ئورۇندا تارتىش ۋە بىئاراملىق ھېس قىلىدۇ، بۇ يەنە يۇقىرى قىزىتما پەيدا قىلىشمۇ مۇمكىن. تاماقتىن پەرھىز بويىرىشتا ھەر خىل غىدىقلىغۇچى ۋە سۇ-

پىتى ئۆزگىرىپ بۇزۇلغان يېمەك - ئىچمەكلىكنى (بۇ ھاراقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېچىتقۇلۇق ئىچىملىكلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) ئىستېمال قىلىش بىلەن تاماكا ۋە باشقا زەھەرلىك چېچىملىكلەرنى چېكىش چەكلىنىدۇ. بىمارغا ئاسان ھەزىم بولىدۇ. خان ۋە ياخشى قان ھاسىل قىلىدىغان قۇۋۋەتلىك يېمەك - ئىچمەكلىكلەر بېرىلىدۇ.

يەلتاشما

بۇ خەلق ئارىسىدا «ئېشەك يېمى» دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ كېسەلدە ھەر خىل چوڭلۇقتىكى ئاچ قىزىل رەڭلىك تاشمىلار (مۇدۇر-لەر) تېرىنىڭ ھەرقانداق يېرىدە (پۈتۈن بەدەندە) پەيدا بولىدۇ، تاشمىلار يەككە - يەككە ياكى غۇژمەكلەشكەن ھالدا پەيدا بولىدۇ، قاتتىق قىچىشىدۇ، كۆيگەندەك ئېچىشىدۇ، ئاغرىمايدۇ، بەزىدە يەڭگىل قىزىتما بولىدۇ.

سامسا، پىياز، گامچەن، شىفەن، بولاق مانا قاتارلىق تاماقلار ۋە ھاراق - تاماكا قەتئىي چەكلىنىدۇ. قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاپ، ئوكسىگېن يېتىشمەسلىكىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ھاۋا-سى ساپ، ئېگىز ئورۇنلاردا ئىزچىل تۈردە يېنىك ھەرىكەتلەرنى ئورۇنلاش، ھەسەلنى ئېرتىپ ئىچىش، شۇنداقلا بەدەننى تازىلاش دورىلىرى ئىچىش لازىم. قەۋزىيەت بولماسلىق ئالاھىدە تەكىتلىنىدۇ.

قىچىشقاق

ھۆل قىچىشقاق كۆپىنچە قول بارماقلىرى ئارىسىغا مۇدۇر-لەر پەيدا بولۇپ باشلىنىدۇ، قۇرۇق قىچىشقاق بولسا پەيدا بولۇپ، تەدرىجىي پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدۇ، ئوخشاشلا قىچىشىدۇ،

تاتىلغاندا يېرىڭلىق زەرداب، قارا قان چىقىدۇ، ئاغرىيدۇ، قىچىد-
شىدۇ، پاقالچەككە ئۇششاق مۇدۇرلار چىقىدۇ.
نېرۋىنى تېنچلاندۇرۇش تەدبىرلىرىنى ئالدىن ئويلىشىش
لازم. ئىنچىكىلىك، نازۇكلۇق ۋە تېرىككە كىلىكتىن ئالاھىدە
پەرھىز قىلىنىدۇ. ئىسسىقلىقى يۇقىرى تاماق ۋە دورىلار چەكلى-
نىدۇ. ھاراق - تاماكا ئىستېمال قىلىنمايدۇ.
داۋالىنىش جەريانىدا تۈزلىغان گۆش، تۈزلىغان بېلىق،
تۈزغا چىلانغان كۆكتات ۋە ئىسسىقلىق تائاملارنى ئىستېمال قىل-
ماسلىقى ۋە جىنسىي ئالاقە قىلماسلىقى كېرەك.

بەدەن تەمرەتكىسى

بۇ جاھىل خاراكتېرلىك تېرە كېسەللىكى بولۇپ، كۆپىنچە
بويۇن، دۈمبە، بەل، يانپاش قىسىملىرىدا كۆپرەك يۈز بېرىدۇ.
بۇ تۆت خىل بولىدۇ:

(1) ھۆل تەمرەتكە: بۇ كىچىك بالىلاردا، بوۋاقلاردا كۆپ
كۆرۈلىدۇ. كۆپىنچە يۈز، قۇلاق ئارقىسى، بويۇن قىسىملىرىدا
يۈز بېرىدۇ. دەسلەپتە كىچىك مۇدۇر پەيدا بولۇپ قىزىرىپ
قىچىشىدۇ، تاتىلغاندىن كېيىن مۇدۇر بۇزۇلۇپ سېرىق سۇ
چىقىدۇ.

(2) يىرىڭلىق تەمرەتكە: بۇ خىل تەمرەتكىنىڭ تەرەققىي قىل-
لىشى تېز بولۇپ، تېرىدە مۇدۇر پەيدا بولغاندىن كېيىن، ئىچىد-
دىن چىققان سېرىق سۇ، يىرىڭلار قەيەرگە تەگسە شۇ يەرگە
يۇقۇپ كېتىدۇ.

(3) قۇرۇق كېپەكلىشىدىغان تەمرەتكە: بۇ بەدەننىڭ بويۇن،
قول - پۇتلىرىدا كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. دەسلەپتە يۇمىلاق، تېرە
يۈزىدىن كۆتىرىلىپ تۇرىدىغان مۇدۇر پەيدا بولىدۇ. تاتىلغاندا
يىرىڭ ياكى سۇ چىقمايدۇ.

4) قاسراقلىق تەمرەتكە: بۇ خەلق ئارىسىدا تەڭگە تەمرەتە-كە، كالا تەمرەتكىسى دەپ ئاتىلىدىغان، ئۇزاق داۋاملىشىدىغان داۋالاش قىيىن، ساقىيىش نەس بولغان جاھىل تېرە كېسەللىك-دۇر. بۇنىڭدا دەسلەپ قىزغۇچ ئۇششاق مۇدۇر شەكلىدە پەيدا بولىدۇ. مۇدۇرلەر بارا - بارا كېڭىيىپ ئۆزئارا قوشۇلۇپ تەڭگە-سىمان ياكى ئۈزۈنچاق، تېرىدىن كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدىغان قاسراق پەيدا بولىدۇ، بەدەننىڭ ئوخشاش تەرىپىدە تەڭمۇ تەڭ پەيدا بولىدۇ. ئىككى جەينەك، بىلەك ئىچكى قىسمى، پاقالچەكنىڭ تاشقى قىسمىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ، يەنە توققۇز كۆز، قورساق يۈزى، زەكەر، ئورۇقدان خالتىسى قاتارلىق ئورۇنلاردىمۇ ئۇچرايدۇ. بەدەن سۇيۇقلۇقلىرىنى تەڭشەش ئاساس قىلىنىش بىلەن بىرگە يەللىك ۋە تەستە سىڭىدىغان تاماقلار بېرىلمەيدۇ. ھاراق - تاماكا چەكلىنىدۇ. قورۇلغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. جىددىيلىك ۋە غەمكىنلىكتىن ساقلىنىلىدۇ. ئاغرىق توختىتىش دورىلىرى ۋە قان بېسىمنى چۈشۈرگۈچى دورىلار قەتئىي ئىچىلمەيدۇ.

ئاقكېسەل

ئاق داغ كۆپىنچە سىمىتلىك ھالەتتە بولۇپ ئاقارغان جايدىد-كى تۈكلەرمۇ بەزىدە ئاقىرىدۇ. ئاق داغ بار تېرىنى كۆتىرىپ تۇرۇپ يېڭى سانسىسا يېڭى ۋاقىتتا قان چىقىسمۇ، كونىرىغاندا ئاقۇش سۇ چىقىدۇ، ئاق داغ كۆپىنچە تېرىنىڭ خالىغان يېرىگە بولۇپمۇ يۈز، بوپۇن، بەل، جىنسىي ئورگانلارغا چۈشىدۇ، چېگە-رىسى ئېنىق بولىدۇ. يەرلىك ئورۇننىڭ سېزىمى بۇرۇنقىدەكلا نورمال بولىدۇ.

تامماقتىن پەرھىز بۇيرۇش غىزايى داۋا دەپمۇ ئاتىلىپ كالا ۋە ئۆچكە گۆشى، بېلىق، تۇخۇم ئېقى، سۈت، قېتىق، پۇرچاق-

تىن ئىشلەنگەن يېمەكلىكلەر، شوخلا، تەرخەمەك، كارتۇشكا (ياغىيۇ)، جاغدۇ، پەتىنگان، باش پىياز، پىشىمغان مېۋە - چېۋە، شاپتۇل، توغاچ، ئالما، نەشپۇت، قارا ئۆرۈك قاتارلىق يېمەكلىكلەر بىلەن ھاراق، بوزا، مۇسسەللەس، پىۋا ۋە باشقا سۇنىي يول بىلەن ياسالغان ئىچىملىكلەر بىلەن سوغۇق سۇ قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىشنى چەكلەپ، كۆپرەك قۇرۇق ئىسسىق ياكى ھۆل ئىسسىق كەيپىياتتىكى يېمەك - ئىچمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش بۇيرۇلىدۇ.

ھەربىر كىشى بولۇپمۇ ئۆسمۈرلەر بىلەن باشلارنى تېۋىپقا كۆرسىتىپ ئۇلارنىڭ مەجەز تىپىنى ئېنىقلىۋېلىش بىلەن بىرگە يېمەك - ئىچمەك ئارقىلىق مەجەز تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاش يولىدىن ئۆتكىنىۋېلىش كېرەك. تاماق تاللايدىغان ئادەتنى ئۆزگەرتىپ ئىسسىق كەيپىياتلىق يېمەك - ئىچمەك بىلەن سوغۇق كەيپىياتلىق يېمەك - ئىچمەكنى ئالماشتۇرۇپ ئىستېمال قىلىپ بېرىشكە ئادەتلىنىش كېرەك. يەنى قۇرۇق ئىسسىق مەجەزلىك كىشىلەر ئارىلاپ ھۆل سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلەرنى؛ ھۆل سوغۇق مەجەزلىك كىشىلەر ئارىلاپ ھۆل ئىسسىق كەيپىياتتىكى يېمەك - ئىچمەكلىكنى؛ ھۆل سوغۇق كەيپىياتلىق كىشىلەر ئارىلاپ قۇرۇق ئىسسىق كەيپىياتلىق يېمەك - ئىچمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىپ بېرىشى كېرەك. ھاراق، پىۋا ۋە ھەر خىل سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئىستېمال قىلماسلىقى كېرەك. شۇنداقلا ھەددىدىن زىيادە تار كىيىملەرنى كىيىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئۆگىنىش، خىزمەت، دەم ئېلىش، مەدەنىي كۆڭۈل ئېچىش ۋە جىسمانىي جەھەتتىكى چېنىقىشلارنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇپ روھىي جەھەتتىكى چارچاش بىلەن غەم - ئەندىشىلەردىن مۇمكىن قەدەر ساقلىنىپ، خۇش خۇي ۋە ئۈمىدۋار بولۇشنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك. ئەگەر ئۇيقۇسىزلىق، ئىشتىھاسى كېمىيىش، ماغدۇرسىزلىق ۋە روھىي جەھەتتىن چۈشكۈنلىشىش ئەھۋاللىرى

ھەمدە تىل ئۈستىدە نورمال بولمىغان گەز باغلاش ۋە ئېغىز تەمى بىلەن چوڭ - تەرتىدە غەيرىلىك پەيدا بولۇشتەك مەجەز بۇزۇ - لۇش ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن ھامان دەرھال تېۋىپكە كۆرىنىپ مەجەزنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا قانداشلىقى يېقىن بولغانلار بىلەن ئاق كېسەللىك بىلەن ئاغرىغۇچىلار ئۆزئارا توي قىلماسلىقى لازىم. شۇنداق قىلغاندىلا ئاندىن ئاق كېسەللىكتىن ساقلانغىلى ياكى ئاق كېسەللىكنىڭ كىشىلەر توپىدا پەيدا بولۇشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. بېلىق بىلەن سۈت بىللە ئىستېمال قىلىنمايدۇ، ھاراق ئى - چىش، تاماكا چېكىش، سوغۇق سۇدا يۇيۇنۇش چەكلىنىدۇ. گاڭچىدىن، شىفەن، سوغۇق ئىچىملىك، خام سەي يېيىش ۋە ئى - چىش مەنئىي قىلىنىدۇ. غەم - ئەندىشە ۋە نازۇكلۇق بۇ كېسەل - لىكتە ئالاھىدە زىيان قىلىدۇ. قارا ئۈزۈم، بادام، ياڭاق ۋە ھەسەل ئىستېمال قىلىش ۋە مۇنتىزىم داۋالىنىش تەۋسىيە قىلى - نىدۇ.

داغ

يۈز ھەم قول تېرىلىرىدە پەيدا بولىدىغان كىچىك ياكى چوڭ دائىرىلىك بىرخىل قارا داغ بولۇپ، بەزىلىرى كۆكۈشكە ياكى قىزىلغا مايىل بولىدۇ. تېرىدىن كۆتىرىلىپ چىقمايدۇ، قويۇق تاماقلار ۋە تۇرۇپ قالغان تاماقلار چەكلىنىدۇ. قان قويۇقلىتىدىغان، يەل پەيدا قىلىدىغان يېمەكلىكلەر ئىستېمال قىلىنمايدۇ، ئاياللاردا قەۋزىيەت بولۇش ۋە ئادەت راۋان بولماس - لىق ئالاھىدە داۋالىنىلىدۇ. دادۇر، خام سەي، لەڭپۇڭ، ھاراق قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

سېغىلىق

بەدەننىڭ مەلۇم يېرىدە بىر دانە كىچىك مۇدۇر چاقا پەيدا بولۇپ، تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ يېرىلىپ زەخمىگە (جاراھەت-كە) ئايلىنىدۇ، ئەتراپتىكى تېرىلەر ئىششىيدۇ، جاراھەتنى باس-قاندا قاتتىق بىلىنىدۇ، ئاغرىمايدۇ، قاتتىق تۈگۈنچە ھاسىل بولىدۇ. بەزىدە ئۇ جاراھەتكە ئايلىنىدۇ. 7 - 5 كۈندىن كېيىن يېرىقتىكى بەزلەر يوغىناپ قاتتىقلىشىدۇ، كېيىن كېسەللىك يوشۇرۇن تەرەققىي قىلىپ بۇرۇنغا چۈشسە، بۇرۇن كۆمۈرچەك-لىرىنى بۇزۇپ تاشلايدۇ، تاڭلايغا چۈشسە تاڭلاينى زېدىلەپ تېشىدۇ، كىچىك تىلى چۈشۈپ كېتىدۇ. پاچاق سۆڭىكى، لىپەك ھۈررەك بولۇپ قايناپ چىقىدۇ، قاتتىق ئاغرىيدۇ. دېمەك، سېغىلىق بەدەندىكى گۆش، سۆڭەك، ئەسەبلەرنى بۇزۇپ ۋەيران قىلىدىغان دەھشەتلىك يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، خەلق ئاردا-سىدا قارا يەل، يامان يارا دەپ ئاتىلىدۇ.

داۋالىنىۋاتقان مەزگىلدە سوغۇق سۇ ئىچىشكە، سامساق، پىياز ۋە ھۆل مېۋە - چېۋىلەرنى ئىستېمال قىلىشقا ۋە يۇيۇنۇشقا بولمايدۇ. يۇيۇنۇشقا (باش يۇيۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) توغرا كەلسە ئىسسىقلىق دورا سېلىنغان سۇ بىلەن يۇيۇنسا بولىدۇ. جىنسىي ئالاقە قىلىش، تۇرمۇشقا ئىشلىتىلىدىغان نەرسىلەرنى ساق كىشىلەر ئىشلىتىلىدىغان نەرسىلەر بىلەن ئارىلاشتۇرۇش، ھاراق ئىچىش، تاماكا چېكىش، يالىڭاياق يەرگە دەسسەش ۋە سوغۇق ئۆتكۈزۈش چەكلىنىدۇ. يېمىكىگە قوي، كەكلىك ۋە كۆك كەپتەر گۆشى سېلىنغان مايلىق ۋە قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى يەيدۇ. ھاراق - تاماكا ۋە ئاچچىق نەرسىلەردىن پەرھىز تۇتۇلدۇ، شەخسىي تازىلىق ۋە كىيىم - كېچەك تازىلىقى ياخشى

قىلىنىدۇ. ۋاقتىنچە جىنسىي ئالاقە چەكلىنىپ، قان تازىلىنىدۇ
تامىقىغا ئاسان سىڭىدىغان غىزالار بېرىلىدۇ. كۈچلۈك ياللۇغ
قايتۇرۇش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ.

دائىرىلىك چاچ چۈشۈش

باشنىڭ تېرىسىدە بىر قاپارچۇق پەيدا بولۇپ، ئۈستىگە
كىچىك مۇدۇر چاقا پەيدا بولۇپ، كېيىن قۇرغاقلىشىپ كېپەك-
لىشىدۇ. كېسەللىك تەرەققىي قىلسا يومىلاق داغلار پەيدا بولۇپ
كېپەكلىشىدۇ ھەم چاچ شۇ جايدا سۈنۈپ چۈشۈپ كېتىدۇ. بەزىدە
قاش، كىرىپىك، قولتۇق، دوۋسۇن تۈكلىرى ھەتتا پۈتۈن بەدەن
تۈكلىرىمۇ چۈشۈپ كېتىدۇ. تۈك چۈشكەن جايىنى تۇتسا ناھايىتى
سىلىق، يۇمشاق بولىدۇ.
تۇرۇپ بۇزۇلغان يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.
شەخس ۋە ئومۇمنىڭ تازىلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش، ياللۇغ قايتۇ-
رۇشنى ئاساس قىلىپ داۋالانىش لازىم.

چاچ بالدۇر ئاقىرىپ كېتىش

بۇ ھەرخىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يېشىغا يەتمەي تۇرۇپ چاچ
- ساقاللىرى ئاقىرىپ كېتىشىنى كۆرسىتىدۇ.
ئارتۇقچە قايغۇ، گۇمانخورلۇق ۋە نازۇكلۇقتىن ساقلىنىلىد-
دۇ. مايلىق گۆش، ھاراق - شاراپ ۋە زىيادە جىنسىي ئالاقىدىن
پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ، مۇۋاپىق چېنىقىش ناھايىتى پايدىلىق.

چاچ چۈشۈش

بۇنىڭدا ھەرخىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن باشنىڭ مەلۇم قىس-

مىدىكى ياكى پۈتۈن باشتىكى چاچلار چۈشۈپ كېتىدۇ. چاچ چۈشۈشكە ئىشلىتىلىدىغان دورىلاردا باش تېرىسىنى چىڭىتىپ چاچنى تارتقۇچى ۋە تۇتۇپ تۇرغۇچى قۇۋۋەتنى كۈچەيتىدىغان، تېرىنىڭ ئوزۇقلىنىشىنى ياخشىلاپ چاچنى قۇۋۋەتلەيدىغان ۋە چاچنىڭ ئۆسۈشىنى تېزلىتىدىغان ھەمدە بەدەنگە گاز - تولا ھارارەت بېرىدىغان تۆت خىل خۇسۇسىيەتلەر بولۇشى كېرەك. بىمارنىڭ ئۆزىمۇ ھەددىدىن ئارتۇق جىسمانىي ۋە ئەقلىي ئەمگەكتىن ئۆزىنى تارتىشى، ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەردىن قول ئۈزۈشى ۋە تاماكا چەكمەسلىكى لازىم.

كۆزگە قاناتسىمان گۆش ئۆسۈپ قېلىش

دەسلەپكى مەزگىلدە كۆز بۇرجەكلىرىدە بولۇپمۇ ئىچكى بۇرجەككە داۋاملىق قىچىشىش بولىدۇ، تەدرىجىي كۆز بۇرجەكىدىن كۆز قارىچۇقىغا قاراپ قىزىل ھال رەڭلىك قاناتسىمان گۆش ئۈنۈپ ئاستا - ئاستا كۆز ئېقىنى قاپلاشقا باشلايدۇ، ھەتتا كۆز قارىچۇقىنى يېپىپ قويدۇ، ئۇ قاتتىق ياكى يۇمشاق بولىدۇ. كۆزنى مەجبۇرىي يۇمدۇرۇپ ھۆل كاسىن، ھۆل يۇمغاق - سۈت قاتارلىقلارنى سوقۇپ بىنەپشە يېغى، بادام يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قاپاق ئۈستىگە قويۇپ بىر نەچچە كۈن تېگىپ بېرىش كېرەك. ھەبىي قوقىيا، ئامىيە نۇشىدارى، مائۇل ھە - سەل قاتارلىقلارنى كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ ئىشلىتىش لازىم. ھەرخىل قۇرۇقلۇق نەرسە ۋە يېمەك - ئىچمەكلىكلەردىن ساقلىنىش، ھۆل ئىسسىق تەبىئەتلىك يېمەك - ئىچمەكلىكلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش لازىم.

كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللىغى

بۇ كۆز تۇتاشتۇرغۇچى پەردىسىنىڭ يەڭگىل دەرىجىدە ئىش-
شش ياكى يەللىك كۆپۈشۈپ قېلىشىدىن ئىبارەتتۇر.
ئېغىر نەرسىلەرنى كۆتۈرۈش، ئۇزۇن يول مېڭىش، كۈچەپ
ناخشا ئوقۇش، ۋارقىراش، قاتتىق قەي قىلىش، يۆتىلىش،
تاماق ئۈستىگە تاماق يەپ بەك تويۇنۇپ كېتىشتەك كۆز بېسىمنى
ئاشۇرغۇچى سەۋەبلەرنىڭ ھەممىسىدىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم.

كۆزگە قۇرۇقلۇق يېتىش

كۆزدىكى ھۆللۈك (سۇيۇقلۇق) يوقىلىپ، كۆزگە قۇرۇق-
لۇق يېتىدۇ ھەم كۆرۈش ئاجىزلىشىدۇ، ئويغانغاندىن كېيىن
كۆزنى ئېچىش قىيىن بولىدۇ.
كۆزنى دائىم يىلماي سۇدا بۇيۇش ياكى ھەر كۈنى ئەتىگەندە
مۇنچىغا چۈشۈش كېرەك. ئوزۇقلىنىشتا ئاشقازاننى كۈچلەندۈر-
دىغان، تەبىئەتنى يۇمشىتىدىغان سىڭىشلىك تاماقلارنى ئىستېمال
قىلىش، كالا گۆشى ۋە ھەرخىل پۇرچاق تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر،
كونا سۈت، قېتىق، قايماقلاردىن پەرھىز قىلىش، چاچنى پاكىز
تۇتۇش، كۆزنى سۈت بىلەن يۇيۇش لازىم.

كۈندۈزى كۆرمەسلىك

گەرچە كۆزدە غەيرىي نورمال ئۆزگىرىشلەر بولمىسىمۇ،
لېكىن كۈندۈزى بولۇپمۇ ھاۋا ئوچۇق كۈنلىرى كۆزى ئۆزلىك-
دىن پەردە تارتىپ قويغاندەك بولۇپ ھېچ نەرسىنى كۆرەلمەيدۇ،

ئەكسىچە ھاۋا تۇتۇق كۈنلەردە ۋە ھاۋا سالقىن چاغلاردا نەرسىلەر-
نى خېلى نورمال كۆرەلەيدۇ.

ئوزۇقلىنىش جەھەتتە، كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇ-
رىدىغان يېمەكلىكلەردىن قۇرداق، كالا - پاقالچەك، سېمىز
قوي گۆشى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. قۇۋۋىتى
تۆۋەن، تەستە سىڭىدىغان غەلىز تاماقلاردىن، تۇزلۇق، ئاچچىق
يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك.
ھاراق ئىچىش، تاماكا چېكىش، كۆپ جىنسىي ئالاقە قى-
لىش، غەم - قايغۇ ۋە باشقا روھىي ئامىللاردىن؛ كۈن نۇرى
ئاستىدا، ئىسسىق ھاۋالىق مۇھىتتا ئۇزاق تۇرۇش ۋە ئىشلەپ
چارچاشتىن ساقلىنىش لازىم.

كۆزنىڭ يۇرۇقلۇقتىن قېچىشى

كۆزنى سىرتتىن قاراپ تەكشۈرگەندە غەيرى ئۆزگىرىشلەر
بولمىسىمۇ، لېكىن بىمار كۈندۈزى كۈن نۇرىغا، ئاخشىمى چى-
راغقا قاراشتىن ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە قاچىدۇ، ھەمدە كۆز
چىمىلداپ كۆزنى چوڭ ئېچىپ قارىيالايدۇ، كۆز تورلىشىدۇ.
يەڭگىل دەرىجىدە ئېچىشىپ، قادىلىپ ئاغرىش، ياش ئېقىش
قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

مېڭىنى كۈچەيتكۈچى تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش، قاتتىق
ھەرىكەت ۋە زىيادە جىنسىي ئالاقە قىلىشتىن ساقلىنىش
كېرەك.

كۈچلۈك نۇر تەسىرىدىن كۆز تورلىشىش

بۇ كېسەل يېڭى ۋە يەڭگىل ۋاقىتدا كۆزىدە بىر ئاز قىزىد-
رىش، ئىشىشى ئېچىشىش، ياش ئېقىش، باش ئاغرىشتەك ئالا-

مەتلەر كۆرۈلىدۇ، كونا ۋە ئېغىرراق بولسا، كۆز تورلىشىپ پۈتۈنلەي كۆرمەسلىك ياكى رەڭلىك نەرسىلەرنى يىراقتىن ئاق كۆرۈشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

ياخشى ئوزۇق بولىدىغان نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش، بولۇپمۇ يېڭى كۆكتات، مېۋە - چېۋە، سۈيۈك - سەلەڭ قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى يېيىش لازىم، مەنزىرىلىك جايلاردا ساياھەت قىلىش ناھايىتى پايدىلىق.

ئۈزۈمسىمان پەردىنىڭ چىقىپ قېلىشى

ئۈزۈمسىمان پەردە پولىتىپ چىقىپ قالىدۇ، يېڭى ۋاقتىدا كۆزدە قىزىرىش، ئىششىش، ئاغىرىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، كونىرىغاندا بۇ ئالامەتلەر بولمايدۇ، لېكىن كۆزنىڭ قارشى بىر تەرەپكە مايىل بولۇپ قېلىپ، كۆز ھېچ نەرسىنى كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ.

بىمارنىڭ يېمەك - ئىچمىكىنى ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن بىرگە بىمارنى ئوخشىمىغا ياتقۇزۇپ ئارام ئالدۇرۇش، ئۇخلىتىش كېرەك. بەك تويۇنۇپ غىزالانماسلىق، يەللىك تاماقلار - دىن پەرھىز تۇتۇش، باشنى تۆۋەنگە ئېگىشتۈرۈش، يۆتىلىش، چۈشكۈرۈش ۋە قەي قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم. كۆز ئەتراپى مۇسكۇللىرى بوشىشىپ كەتكەندىن پەيدا بولغان ئايارەجلەر بىلەن تەتقىق قىلغاندىن كېيىن سېرىق ھەلىيلە ياكى پىياز سۈيدىگە ئوخشاش ياش ئاققۇزغۇچى دورىلارنى كۆزگە تارتىش كېرەك. شۇنىڭدەك كۈندۈش، جۈندى بىدەستۇر، قىچا، پىلىپىل، مەرزە - جۇش قاتارلىق ئۆتكۈر پۇراقلىق دورىلار پۇرتىلىدۇ. قاندىن بولغان بولسا ئالدى بىلەن مەتبۇخى شاھتەررەنى ئىستېمال قىلدۇرسا بولىدۇ.

كۆز قوتۇرى — تراخوما

بۇ قاپاق ئىچكى شىللىق پەردىسى يەنى كۆز تۇتاشتۇرغۇچى پەردىسىدە ئۇششاق مۇدۇرلارنىڭ پەيدا بولۇشى بىلەن جاراھەت شەكىللىنىپ كۆرۈشكە تەسىر كۆرسىتىدىغان، قىچشىدىغان بىرخىل يۇقۇملۇق كېسەللىكتۇر.

مەزكۇر كېسەللىك بىلەن كېسەللەنگەن كىشىلەر بىلەن لۆڭگىنى ئورتاق ئىشلىتىش، بىر داستا يۈز يۇيۇش، مۇنچا - سەرراپلارنىڭ لۆڭگىلىرىدىن ئورتاق پايدىلىنىش قاتارلىق سەۋەب-لەردىن ئۆزئارا يۇقۇپ پەيدا بولىدۇ. خۇسۇسەن، بۇ جەھەتتە ساتراشخاتىلارنىڭ ۋاستىچىلىك رولى چوڭ. شۇڭا، مۇھىت تازىلىقى ۋە شەخسىي تازىلىققا ئېتىبار بېرىش، ھەركىم ئۆز لۆڭگىسىنى ئىشلىتىش، ئامال بار يۈز ۋە قوللارنى چۆگۈن، ئىۋرىق قاتارلىقلاردا سۇ ئېقىتىپ يۇيۇش (داستا يۇيغاندا ئۆزىگە خاس داس بولۇش) نى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، ئاغرىقلار يۇيۇنۇش سايمانلىرىنى ساغلام كىشىلەردىن ئايرىپ تۇتۇش ھەمدە قاينىتىپ دېزىنېكسىيە قىلىش كېرەك. ئاممىۋى تازىلىق مۇلازىمەت ئورۇنلىرى يۇيۇنۇش سايمانلىرىنى دېزىنېكسىيە قىلغاندىن كېيىن ئىشلىتىشكە قاتتىق ئەمەل قىلىشى كېرەك. بۇ خىل تازىلىق ساۋاتلىرىنى تەشۋىق قىلىش ۋە ئۇنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش كۆز قۇتۇرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

كۆز ياشاڭغىراش

كۆزدىن ياش ئېقىپلا تۇرىدۇ. بەزىدە ياش ئىختىيارسىز چىقىپ كېتىدۇ ھەمدە خىلىتلارغا خاس ئالامەتلەر تېپىلىدۇ. مېڭە تومۇرلىرىنى ئېچىش، كۆز تومۇرلىرىنى راۋانلاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك ئەمما يەڭگىل تاماقلار بېرىلىدۇ. سامسا،

قېزا، پولۇنىڭ تېگى، پېتىر مانتا، تاۋا كاۋىپى، قوتۇرماچ
قاتارلىق تاماقلار يېيىلمەيدۇ، كۈچلۈك ھاراقلار ئىچىلمەيدۇ.

كۆزگە زەربە تېگىش

كۆزگە سىرتتىن ھەرخىل زەربىلەر تېگىش سەۋەبىدىن قاپاق
ۋە كۆزدە ئىششىق بولىدۇ، قاپاق كۆكىرىدۇ ھەم كۆز قىزىرىش،
قاناشمۇ روشەن بولىدۇ.

كۆزنى ئۇۋۇلماسلىق، قويۇق تاماقلارنى يېمەسلىك لازىم.
بىنەپشە ۋە نېلۇپەر سۈيىنى تېمىتىپ ياللۇغ قايتۇرۇش بىلەن بىر
ۋاقىتتا زەربىنىڭ دەرىجىسىگە ئاساسەن جىددىي قۇتقۇزۇش چارى-
لىرىنى ئويلىشىپ كۆرسىمۇ بولىدۇ.

نامازشام قارىغۇسى

بۇ كۈندۈزى نورمال كۆرەلىسىمۇ، ئەمما ھەر كۈنى ئولتۇ-
رۇپ قاراڭغۇ چۈشكەن مەزگىلدە ئادەتتىكى نەرسىلەرنى تولۇق
كۆرەلمەسلىك ياكى پۈتۈن كۆرەلمەسلىك بىلەن ئىپادىلىنىدىغان
بىرخىل كۆز كېسەللىكىدۇر.

سەۋزە، بېدىيان، جىگەر كاۋىپى، تاتلىق ئانار قاتارلىقلار
مەنپەئەت قىلىدۇ، ئاچچىق، قويۇق تاماقلار چەكلىنىدۇ. داۋالە-
نىش مەزگىلىدە ھاراق ئىچىش مەنئىي قىلىنىدۇ. تاماكا تەرك-
ئېتىلىدۇ. بىمارنىڭ پۇتى ئىلمان سۇدا يۇيۇلىدۇ.

ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ يېتىشمەسلىكى، بەدەننىڭ زەئىپلە-
كى، ياشانغانلىق ۋە جىگەرنىڭ ئاجىزلىقىدىن بولغانلىرىنى داۋالە-
لاشتا ئوزۇقلۇقنى كۈچەيتىش، بەدەننى كۈچلەندۈرۈش بىلەن
بىرگە ھايۋانلارنىڭ جىگىرىنى دائىم ئىستېمال قىلىش كېرەك.
ئۆچكە جىگىرىگە پىلىپىلنى سوقۇپ سېپىپ كاۋاپ قىلىپ جىگەر-

دىن ئېقىپ چىققان سۇنى ئېلىپ كۆزگە تامغۇزۇش بىلەن بىرگە جىگەرنى يېيىش لازىم. بادام يېغى، كۈنجۈت يېغى، نېلۇپەر ياغلىرىنى باشقا سۈركەپ بەرسە ناھايىتى پايدىلىق. كەپتەر قېنىدىكى كۆزگە تېمىتسا تېخىمۇ ياخشى.

ئالغايلىق

كۆز قارىچۇقى بىر تەرەپكە مايىل بولۇش ۋە بىر نەرسە كۆرۈنۈش بىلەن ئىپادىلىنىدىغان كېسەللىكتۇر. كۆز ئېقى ئادەتتە تىكىدىن چوڭراق بىلىنىدۇ. مېڭىنى تازىلاش تەدبىرلىرى قىلىنىدۇ. بىمارنى يەكلەش ۋە زاڭلىق قىلىشقا بولمايدۇ. دەسلەپكى ئالامەتلىرى بايقالغاندا ئالغايلىق تەرەپنىڭ قارشى تەرىپىگە قىزىل لاتا ئېسىلىپ، شۇ ياققا قاراش مەشىقى ئۆگىتىلىدۇ. يېڭى باشلانغان بولسا ئوپېراتسىيە قىلىسىمۇ بولىدۇ.

كۆرۈش ئاجىزلىشىش

ھەرخىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن، كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچى تەدرىجىي ئاجىزلاپ نورمال كۆرەلمەسلىكتىن ئىبارەت.

ئادەتتىكى ۋاقىتلاردا كۆزنى ياخشى ئاسراش ۋە مۇۋاپىق ئارام ئالدىرۇش، ھاراق، تاماكا، مەس قىلغۇچى دورا قاتارلىقلاردىن قاتتىق ساقلىنىش، ھەرخىل يەللىك، غەلىيز تاماقلاردىن پەرھىز قىلىپ، ئاسان ھەزىم بولىدىغان، ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى يېمەكلىكلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش كېرەك. قورساقنى توغۇزۇپلا ئوخلاش كۆزگە ناھايىتى زىيانلىق. جىگەر كاۋاپلىرى، بولۇپمۇ مۇزاي جىگىرى، قوي جىگىرىنى چالا كاۋاپ قىلىدۇ.

لىپ ئۇزۇن مۇددەت ئىستېمال قىلىش، بېلىق يېغى ئىچىش كۆرۈنەرلىك ئۈنۈمگە ئىگە.

قاپاق ساڭگىلاش

ئۈستۈنكى قاپاق ساڭگىلاپ يېپىلىپ قالىدۇ، قاپاقنى ئۈس-تىگە كۆتۈرۈش تەس بولىدۇ. مېڭىنى تازىلاش تەدبىرلىرى ئاساس قىلىنىدۇ. يۇمەزگىل-دە قاننى قويۇلدۇرىدىغان يەرلىك ۋە ئېغىر تاماقلار يېيىلمەيدۇ، يېڭى - يېڭى تاماق بېرىلىدۇ. لازا، قارىمۇچ قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

يېڭىئاسقۇ

بۇ قاپاق گىرۋەكلىرىنىڭ كۆپ ئۇچرايدىغان يىرىڭلىق ئىش-شىقىدىن ئىبارەت بولۇپ، دەسلەپتە دائىرىلىك كىچىك، قاتتىق مۇدۇر پەيدا بولۇپ، ئازراق قىچىشىدۇ، ئاغرىيدۇ. مۇدۇر دائى-رىسى تەدرىجىي قىزىرىپ ئاغرىق كۈچىيىپ، مۇدۇر ئۇچى ئاقى-رىپ، يىرىك يېغىلىدۇ.

قان تازىلاش ئاساس قىلىنىپ، يەرلىك ئورۇننىڭ تازىلىقى كاپالەتلەندۈرۈلىدۇ. ئاچچىق نەرسىلەرنىڭ پۇرتىدىن ساقلىنىد-دۇ، قويۇق تاماقلار چەكلىنىدۇ. مېڭە تومۇرلىرىنى ئاچىدىغان تەدبىرلەر قىلىنىدۇ.

قاندىن بولغان كۆز ياللۇغى

كۆزلىرى قىزىل، كۆز تومۇرلىرى كۆپكەن بولۇپ، باش چىڭقىلىپ لوقۇلداپ ئاغرىدۇ، كۆزدىن ياش ئاقىدۇ، تومۇرى

كۈچلۈك سالىدۇ، كۆزدىن يىرىك چىقىپ چاپاقلىشىدۇ، ئېغىز تەمى تاتلىق بولىدۇ.

قاننى سۇيۇلدۇرۇش تەدبىرلىرى بىلەن بىللە كۆز بېسىمىنى تۈۋەنلىتىش ئۈچۈن بىنەپشە سۈيى تېمىتىپ بېرىلىدۇ. كۆزنى ئۇۋۇلاش ۋە ئاغرىق توختىتىش دورىلىرى ئىچىش مەنىسى قىلدۇرىدۇ.

يۇقۇملۇق كۆز ياللۇغى

كۆز قارىچۇقى كېڭىيىپ، چېكە ۋە كۆز قاتتىق قانلىق ئاغرىدۇ، ئىششىيدۇ، كۆز قىزىرىدۇ. كۆيۈشۈش، قانلىق ئېغىرلىشىدۇ ھەم ئاسانلا يۇقۇپ تارقىلىدۇ.

شەخسى ۋە ئائىلە تازىلىقى ياخشى قىلىنىدۇ. بۇزۇلغان ماددىلارنى بەدەندىن چىقىرىش ئۈچۈن ئايارەج پەيغەرا بېرىلىدۇ. كۆزنى ئۇۋۇلاشقا، لوڭگە بىلەن سۈرتۈشكە بولمايدۇ. تامىقىغا يۇمىخاسۇت ۋە غورا سېلىپ بەرسىمۇ مەنپەئەتلىك.

قۇلاق ئاقىمىسى

قۇلاقنى يىرىك چىقىپ يەڭگىل ئاغرىدۇ، قىچىشىدۇ، قۇلاق ئېغىرلىشىپ ئاڭلاش كۈچىگە تەسىر يېتىدۇ. ئەگەر قۇلاق جاراھىتى قۇلاقنىڭ ئىچكى تەرىپىگە تەرەققىي قىلغان بولسا، باش قېيىپ يىرىك ئاقىدۇ. ئەگەر يىرىك مېڭە تەرەپكە مېڭىپ كەتسە سەرسامىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

قۇلاقنى قالايمىقان كولمىسلىق، قالايمىقان دورا تېمىتماسلىق، قۇلاققا سۇ، سۇت، قۇسۇق ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەرنىڭ كىرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش، قۇلاقنىڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلىش قاتارلىقلار سوزۇلما خاراكتېرلىك قۇلاق ئېقىش كېسەللىكى ۋە ئۇنىڭ قوشۇمچە كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىدۇ.

لىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

قۇلاق ئېغىرلىقى ۋە گاسلىق

قۇلاق ئېغىر بولسا بىمارغا يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلەشكە توغرا كېلىدۇ. نورمال ئاۋازنى ئېنىق ئاڭلىيالمىدۇ، بەزىدە بىمارغا خىلمۇ - خىل ئاۋازلار ئاڭلىنىدۇ. گاسلىقتا بولسا ئاڭلاش كۈچى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ ياكى يوقىلىدۇ.

قۇلاق ئاغرىش يۈز بەرگەندە قۇلاقنى قالايمىقان كولماسلىق كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن قۇلاق پەردىسى تېشىلىپ، قۇلاق ئاغرىش ۋە ئاڭلاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەشتەك ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا بۇنىڭغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. مېڭە تومۇرلىرىنى ئېچىش مەقسىتىدە يەڭگىل تاماقلار بېرىلىپ، ھەبىي قوقىيا ئىچكۈزۈلسە مۇۋاپىق.

قۇلاق غوغۇلداش

قۇلاققا خىلمۇ - خىل توم ۋە ئىنچىكە ئاۋازلار ئاڭلىنىپ، قۇلاق غوغۇلىدىغاندەك، قۇلاق قىچقارغاندەك سېزىم بولىدۇ. ئاڭلاش قۇۋۋىتىدە ئازراق پەرق (قالايمىقانچىلىق) كېلىپ چىقىدۇ. قاننى قويۇلدۇرۇپ تەستە سىڭىدىغان بارلىق تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش، قۇلاقنى كۈچىلىماسلىق لازىم. بىمارنى مۇۋاپىق تەنھەرىكەتكە دەۋەت قىلىش، ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەردىن پەرز تۇتۇش، ھەمىشە قۇرۇلغان تاماقلارنى يېيىشنى توختىتىش كېرەك.

قۇلاقتىن يىرىك ئېقىش

دەسلەپتە ئۆتكۈر قىزىتما بولىدۇ، قۇلاق ئاغرىيدۇ، ئۆي -

قۇسى كەلمەيدۇ، قۇلاق يولى ئىششىپ (ياللۇغلىنىپ) قىزىردۇ،
دۇ، 2 - 1 كۈندىن كېيىن سېرىق سۇ چىقىپ، كېيىن يېرىڭغا
ئۆزگىرىدۇ.

ئاچچىق ۋە ئىسپىرتلىق نەرسىلەر قەتئىي ئىستېمال قىلىندۇ.
مايدۇ. كونا گۆش، پەتىنگان، سامسا يېيىلمەيدۇ. ئۇزۇن مۇددەت
دەت ئاسما سالدۇرۇشمۇ ئاقىلانلىق ئەمەس.

ئىسسىقلىقتىن بولغان زۇكام ۋە نەزلە

باش ئىسسىق بىلىنىدۇ، كۆزى قىزىرىدۇ. بۇرۇن تۆشۈك.
لىرى ئېچىشىپ قىچىشىدۇ ھەم سۈزۈك سۇ ئاقىدۇ. نومۇرى
چوڭ، تېز، ئارقىمۇ ئارقا سوقىدۇ. سۈيۈكۈ سېرىق بولىدۇ.
ئەگەر كېسەل ئېغىر (ئۆتكۈر) بولسا يەڭگىل قىزىتما بولىدۇ.
كېسەللىك ئەھۋالى يەڭگىللىشىپ ساقىيىش دەۋرىگە كىرىدۇ.
گەندە چۈجە، پاققان گۆشلىرىنى سېلىپ شوۋىگۈرۈچ ياكى ئارپا
ئېشى قىلىپ بەرسە بولىدۇ. ماددىسى پىشىپ بولغاندىن كېيىن
چۈشكۈرتۈش پايدىلىق. شۇندىكىدەك مۇنچىغا كىرىشمۇ
پايدىلىق.

سوغۇقتىن بولغان زۇكام ۋە نەزلە

باشتا ئېغىرلىق بولىدۇ، سېزىم قالايمىقانلىشىدۇ، بەدەندە
بوشاڭلىق، ھورۇنلۇق كەيپىياتى بولىدۇ، بۇرۇن پۈتۈپ قالىدۇ
ھەم ئاق غەلىز (قويۇق) سۇيۇقلۇق چىقىدۇ.
يۇمشاق، ئاسان سىڭىدىغان، قۇۋۋىتى يۇقىرى تاماقلار،
جۈملىدىن ئىلىتىلغان تۇخۇم، پاققان گۆش، توخۇ كاۋىپى قاتار.
لىقلار مۇۋاپىق كېلىدۇ. جىنسىي ئالاقە، ئاچچىق نەرسىلەر ۋە
يەللىك نەرسىلەردىن ساقلىنىش، تەرلىگەندە، قىزىغاندا باش

ساھەسىگە سوغۇق ئۆتكۈزۈۋېلىشتىن ساقلىنىش، باشنى ئىسسىق ساقلاش لازىم.

بەزى ئىسسىق مىزاج ئادەملەر مېڭىسىنىڭ ئاجىزلىقى ياكى زۇكام ۋە نەزلىدىن شىكايەت قىلسا، بۇ كىشىلەرنى تەپسىلىي تەكشۈرۈپ سەۋەبىنى ئېنىقلىغاندا كۆپىنچە كىشىلەرنىڭ ھەزىم قىلىش خىزمىتى ناچار بولۇپلا قالماي، ھەممىسىدە دېگۈدەك قەۋزىيەت بارلىقى مەلۇم بولىدۇ. بەزىلەر دىماغنىڭ قۇرۇقلۇقى، گال قۇرۇش، ئۇيقۇسىزلىق، قەۋزىيەت، يۈرەك ھەرىكىتىنىڭ قالايماقانىلىقى قاتارلىقلاردىن شىكايەت قىلىدۇ. بۇنداق كىشىلەر- نىڭ ھەزىم قىلىش خىزمىتى ۋە رەئىس ئەزالىرىنى كۈچەيتىشكە چارە قىلىش لازىم. توخۇ تاشلىقى ئاساس قىلىنغان مۇرەككەپ دورا — مەئجۇنى سەڭگىدان ياكى ساددا نوشىدارۇ، نوشىدارۇ لولوۋ بېرىش پايدىلىق.

كىچىك بالىلاردىمۇ مېڭە ئاجىزلىشىش ياكى مېڭە ھۆلۈكى ئېشىپ كېتىش سەۋەبىدىن سوغۇق زۇكام ۋە نەزلى يۈز بېرىدۇ. يۇقىرىدا ئېيتىلغان سوغۇق زۇكام ۋە نەزلىدە كۆرسىتىلگەن ئالامەتلەردىن باشقا يەنە بالا يىغلاشغۇ، ياخشى ئەمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ. چوڭراق بالىلار بولسا بۇرنى پۈتۈپ، بۇرنىدىن ئاق سۇيۇقلۇق كۆپ كېلىدۇ. بەزىدە يۆتىلىپ قالىدۇ، بېشى ئاغرىيدۇ، ماغدۇرسىزلىنىدۇ. بەزىلىرى قىزىپ قالىدۇ. داۋالاشتا ئەگەر بىمار ئەمچەكتىكى بالا بولسا سوغۇق زۇكامدا كۆرسىتىلگەن چارىلەرنى ئانىسىغا قىلىش لازىم. قىزىتمىسى بولمىسا بالىنىڭ پېشانىسىگە ئىسسىق سۇ قويۇش ياكى لۆڭگىنى ئىسسىق سۇدا ھۆللەپ بېشىغا قويۇش، ئازراق ساپ ھەسەلنى ئەقىل تىلىغا سۇۋاپ قۇستۇرۇش، ئېمىتكۈچى ئانا بولسا سوغۇقلۇق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش، بالىنى سوغۇقتىن ساقلىشى لازىم.

پۇراش سېزىمى ئاجىزلىشىش ياكى پۈتۈنلەي يوقىلىش

بۇنىڭدا پۇراش سېزىم قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىپ قالىدۇ ياكى پۈتۈنلەي يوقىلىدۇ.

مېڭە تومۇرلىرىنى ئېچىش ۋە مېڭىنى كۈچەيتىش تەدبىرلىرى قىلىنىش جەريانىدا قويۇق، قىيمىلىق تاماقلاردىن ۋە ئاچچىق پۇراقلاردىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ، يېڭى سىرلانغان ئۆيدە ئولتۇرۇش مەنئىي قىلىنىدۇ.

بۇرۇن ياللۇغى

بۇرۇن ياللۇغى بولسا بۇرۇن شىللىق پەردىسىنىڭ ياللۇغلىرىنىڭ ئىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇرۇن ئىچى قىزىرىش، قىچىشىش، ئاغرىش، پۈتۈن بەدەن قىزىش، دىماغ پۈتۈش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئۇخلىغان چاغدا دىماغ پۈتۈش ئېغىرلىشىدۇ، قايسى تەرىپىنى بېسىپ ياتسا شۇ تەرەپ بۇرۇن پۈتۈپ قالىدۇ، باش چېڭقىدەلىپ ئاغرىيدۇ، چۈشكۈرىدۇ ھەم پۇراش قۇۋۋىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

بىمارنى ياخشى ئارام ئالدۇرۇپ، مېڭىنى كۈچەيتكۈچى دورا ۋە تاماقلار بېرىلىدۇ. كۆز، بۇرۇن قان تومۇرلىرىنى ئېچىش تەدبىرلىرى قىلىنغان شارائىتتا، سوغۇق ئىچىملىك، ئارتۇقچە جىم، ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەردىن قاتتىق پەرھىز قىلىنىدۇ، بۇرۇن ۋە باش ساھەسىگە سوغۇق تەككۈزۈۋېلىشتىن ئېھتىيات قىلىنىدۇ.

بۇرۇن ئىچىگە يىرىڭلىق چاقا چىقىش

بۇ بۇرۇن ئىچىگە چىققان يىرىڭلىق چاقىدىن ئىبارەت بولۇپ.

لۇپ، دەسلەپتە ئىششىش، ئاغرىش، قىزىرىش بولۇپ، كېيىن ئېغىرلىشىپ چاقا ئېغىز ئېلىپ يىرىك چىقىش قاتارلىق ئالامەت-لەر كۆرۈلىدۇ.

لۆڭگىنى قايناقسۇغا بېسىپ قىزىق پېتى بۇرۇنغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش، ئىسسىق سۇ بىلەن بۇرۇننى چايقاش لازىم. بۇرۇندىكى مۇدۇرلەرنى قول بىلەن ھەرگىزمۇ قالايمىقان سىقىمىسىلىق كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا جىراسىملار ئۇفۇنەتلىنىپ قان تومۇر-لار ئارقىلىق رەئىس ئەزا مېڭىگە تارقاپ ناھايىتى ئېغىر ئاقىۋەت-لەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

كۆپ چۈشكۈرۈش

بۇ ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئارقىمۇ - ئارقا توختىماي داۋاملىشىدىغان چۈشكۈرۈش ھالىتى بولۇپ، بەزىلەردە 2 ~ 1 ئاي، ھەتتا 6 ~ 5 ئاي داۋاملىشىدۇ. بۇنىڭدا بۇرۇن ئىچى قىچىشىپ داۋاملىق غىدىقلىنىپ ئارقا - ئارقىدىن چۈشكۈرۈك كېلىدۇ، بۇرۇندىن سۇ ئاقىدۇ، چۈشكۈرۈك سەل توختىغاندا بۇرۇن ئىچى قۇرۇپ قىزىرىپ ئېچىشىدۇ. ئالامەتلىرى زۇكامغا ئوخشاپ كەتسىمۇ قىزىش، باش ئاغرىش بولمايدۇ. مېڭىدە توسالغۇ بولۇش ۋە سېزىمى ئېشىپ كېتىش كۆرۈل-گەندىن كۆپرەك گۇمان قىلىپ، شۇ جەھەتتىن داۋالىنىۋاتقان شارائىتتا، خېمىيىلىك پۇراقلاردىن ۋە ئىسپىرتلىق ئىچىملىك-لەردىن پەرھىز قىلىشى لازىم.

بۇرۇن قۇرۇش

قۇرۇقلۇقتىن بولغان بۇرۇن قۇرۇشتا ئومۇمىي بەدەن ئۇ-رۇقلاش، ئۇيقۇسىزلىق، قۇرغاقلىشىش، چۈشتىن كېيىن ئىك-

كى مەڭىزى قىزىرىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، تومۇر ئىنچىكە تىز سالىدۇ.

قويۇق خىلىتلارنىڭ تەسىرى تۈپەيلىدىن ھاۋا يوللىرى، سۇيۇقلۇق ئالمىشىش يوللىرى توسۇلۇپ پەيدا بولغان بۇرۇن قۇرۇشنى داۋالاشتا، مىزاجنى ھۆللەشتۈرۈش، توسالغۇلارنى ئې-چىش كېرەك. ھەرخىل مېۋىلەر سۈيى، ئۈزۈم سۈيى، ئارپا، بۇغداي، گۈرۈچ، گۆش قاتارلىقلار بىلەن يارما ئاش قىلىپ بېرىش؛ پات - پات قىزىق سۇدا يۇيۇنۇش، بادام يېغى، گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى بىلەن بۇرۇن ۋە چېكىنى ياغلاش كېرەك.

بۇرۇن ئېچىش

بۇنىڭدا بۇرۇن دائىم ئېچىشىدۇ. ھەتتا كۆيۈشكەندەك بولىدۇ. كۆزىدىن ياش ئاقىدۇ، بۇرۇندا ئىششىق ۋە ياللۇغلىنىش بولىدۇ، زۇكامنىڭ ئالامەتلىرى بولىدۇ، بۇرۇنغا بۇرۇننى غىدىقلىغۇچى دورا تېمىتقان ۋە دائىم سوغۇق ھاۋاغا ئۇچراشقانلىق تارىخى بولىدۇ.

بۇرۇنغا بۇرۇننى غىدىقلىغۇچى دورىلارنى تېمىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. سوغۇق ھاۋانىڭ تەسىرىدىن بولغان بۇرۇن ئېچىشىنى داۋالاشتا يېمەك - ئىچمەك ئارقىلىق مىزاجنى تەڭشەش كېرەك. ئەگەر بەدەن بەرداشلىق بېرەلمىسە ئارتۇق ماددەلارنى تازىلاش ئۈچۈن ئىستىفراغ قىلىش كېرەك. ئەگەر بەدەن ئاجىز بولسا ياكى بەدەننى تازىلاشقا شارائىت بولمىسا ھەسەل سۈيىنى ئىچكۈزۈش ھەمدە ئۇنى تەدرىجىي ئاشۇرۇش كېرەك. بۇ مېڭە ۋە جىگەرنىڭ مىزاجىغىمۇ ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

بۇرۇن قورۇلۇش

مەزكۇر كېسەللەك چوڭلارغا قارىغاندا كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ گەرچە بۇرۇندا باشقا غەيرىلىك بولمىسىمۇ، نەپەس ئالغاندا بۇرۇن قاناتلىرى نەپەس بىلەن تەڭلا تارتىلىپ قۇرۇلۇپ قالىدۇ، گەرچە تۇنجۇقۇپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقارمىسىمۇ دىمىقتۇرۇپ بىمارنى بىئارام قىلىدۇ، نەپەس چىقارغاندا بۇرۇن يەنە ئەسلىگە كېلىپ قالىدۇ.

سۈت ئېمىۋاتقان بالا بولسا بېشىغا دائىم ئانىسىنىڭ سۈتىنى سېغىش كېرەك. يېڭى سېغىلغان سۈتنى ئۇيۇتۇپ بېشىغا چاپلاپ، ئۈستىگە ئىسبەغۇل يوپۇرمىقىنى يېپىپ قويۇش كېرەك. بۇرۇنغا بىنەپشە يېغى تېمىتىش، باش ساھەسىنى خەشخاش سۈيى بىلەن يۇيۇش كېرەك. ئانىسى ئىسسىقلىق پەيدا قىلغۇچى يېمەك - ئىچمەكلەردىن پەرھىز تۇتۇشى، بۇنىڭ ئۈچۈن ئارپا ئۇنىدىن قىلىنغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىشى لازىم.

بۇرۇن يولىغا توسالغۇ پەيدا بولۇش

بۇرۇندا توسالغۇ بارلىقى بىمارنىڭ ئۆزىگە خېلى رۇشەن ھالدا سېزىلىدۇ سۆزلىگەندە ئاۋاز ئېنىق چىقمايدۇ. توسالغۇ سەۋەبىدىن بۇرۇن چىقىرىدىنلىرى راۋان چىقمايدۇ، بەزىدە قۇلاق غۇڭۇلداشمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇرۇن بوشلۇقىدا قويۇق شىلىمىشلىق خىلىت، ئۆسكەن گۆش ۋە چاقىدىن پەيدا بولغان قاقچا-لارنىڭ بارلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ.

بۇرۇن يولىدىكى توسالغۇ تۇغما خاراكتېرلىك بولسا يەنى بۇرۇن يولى توغما تار بولسا، بۇرۇندىن چىقىپ تۇرۇشقا تېگىش-لىك سۇيۇقلۇقلار نورمال چىقىپ كېتەلمەيدۇ. ئۇنى داۋالاش

ئۈچۈن ئايارەج بىلەن مېڭىنى تازىلاپ تۇرۇش، ھەر دائىم قويۇق (غەلىز) تاماقلاردىن پەرھىز تۇتۇش، تاماقتىن كېيىنلا جىنسىي ئالاقە قىلىشتىن ھەزەر ئەيلەش كېرەك ھەمدە روھىي ھالەت كۆتىرەڭگۈ، تەبىئەت ياخشى ۋاقىتلاردا ئىستىفراغ قىلىش لازىم. ئەگەر مەزكۇر كېسەللىك كىچىك بالىلاردا يۈز بەرسە ئانا سۈتىنىڭ قويۇقلۇقىدىن پەيدا بولغان قويۇق ھۆللۈكتىن كېلىپ چىقىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن داۋالاشتا ئانا سۈتىنى ئىسلاھ قىلىش، ئانىنى قويۇق تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بالىنىڭ بېشىغا ئىسسىق سۇ قويماسلىق، بالىنىڭ بۇرىنى سۇنىڭ ھورىغا تۇتماسلىق لازىم. بۇلاردىن ئىلگىرى بالىنى چۈشكۈرتۈش، بالىنىڭ بېشىنى ياغلاش توغرا ئەمەس.

بۇرۇن قىچىشىش

بۇرۇن ئىچى ئۆزلۈكىدىن قىچىشىپ غىدىقلىنىپ، كۆزدىن ياش، بۇرۇندىن سۇ ئاقىدىغان كېسەللىكتۇر. پىياز، سامساق، ئاچچىقسۇ پۇراقلىرىدىن يىراق تۇتۇلىدۇ، لازا يېيىش مەنئىي قىلىنىدۇ. بۇرۇننى كولاشقا، سوغۇق سۇدا يۈز يۇيۇشقا بولمايدۇ، قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش ۋە ياللۇغ قايتۇرۇش تەدبىرلىرىنى تەڭپۇڭ ھالدا قوللىنىش لازىم.

كالىپۇك يېرىلىش

دەسلەپتە ئېغىز قۇرۇشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، بىمار ئىختىيارسىز ھالدا تىلى بىلەن كالىپۇكىنى يالاپ نەملەپ تۇرۇشقا مەجبۇر بولىدۇ، كېيىنچە كالىپۇك يېرىلىپ قانايىدۇ، قاسىراقلىد-شىپ سويۇلىدۇ، ئاغرىيدۇ.

ھەزىمىنى بۇزىدىغان ئېغىر تاماقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ،

تاماق تاللاش، دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى يېمەسلىك ۋە تاماققا قايتىدەن لازا سېلىش قاتارلىق يامان ئادەتلەردىن قول ئۈزۈش ھەمدە ھەر خىل ۋىتامىنلاردىن ئاز - تولا ئىستېمال قىلىش لازىم.

كالىپۇك ياللۇغى

كالىپۇك ئىششىقى (ياللۇغى) تۆت خىل خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان بولۇپ، قايىسى خىلىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا، شۇ خىلىتنىڭ خاس ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ ھەمدە كالىپۇك ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە ئىششىيدۇ.

لازا، ھاراق، تاماكدىن قاتتىق پەرھىز قىلىش كېرەك. مۇۋاپىق تەنتەربىيە بىلەن شۇغۇللىنىش، ئاكتىپ روھىي ھالەتنى ساقلاش لازىم. كالىپۇكنى سىقىشقا بولمايدۇ.

ئېغىزغا مۇدۇر چىقىش

ئېغىز ئېچىشىدۇ، قاتتىق ئاغرىيدۇ، تاماق يېيىش ھەم سۆزلەش قىيىن بولىدۇ، ئېغىزدىن سېسىق پۇراق كېلىدۇ. بالىلاردا بولسا يەڭگىل قىزىتما ۋە ئىچى سۈرۈش بولىدۇ، ئىسسىقلىقتىن (يەنى قان ۋە سەپرادىن) دىن بولغىنىدا، ئىششىق ۋە ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ، سوغۇقلىقتىن (بەلغەم، سەۋدا) دىن بولغىنىدا يەڭگىل بولىدۇ.

ئالدى بىلەن ھەزىم ئەزالىرىنى تەكشۈرۈپ سەۋەبىگە قارىتا داۋالاش ۋە پەرھىزنى بېكىتىش لازىم. شۇنداقتىمۇ ھاراق، گاڭگە، يەن، ئاچچىق يېمەك - ئىچمەكلەردىن ئالاھىدە پەرھىز قىلىنىدۇ. شەخسىي تازىلىققا ئەھمىيەت بېرىلىدۇ.

قان ۋە سەپرادىن بولغان ئېغىز پىشلاق بولۇش

بۇ بىر خىل ھۆل چاقا بولۇپ، ئېغىز ۋە تىلىنىڭ ئۈستىدە (شىللىق پەردىلىرىدە) پەيدا بولۇپ پىشلاق بولۇش بىلەن ئىپادەلىنىدىغان ھەم بارا - بارا تارقىلىپ پۈتۈن ئېغىز بوشلۇقىنىڭ ھەممە يېرىنى قاپلايدىغان كېسەللىكتۇر. بۇنىڭدا، ئېغىز شىللىق پەردىلىرى ئاقىرىپ ياپىلاق مۇدۇر پەيدا بولىدۇ، تەرەققىي قىلسا قىزىلئۆڭگەچ ھەتتا ئاشقازانغىچە تارقىلىپ كېڭىيىدۇ.

ئېغىز بوشلۇقى تازىلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش بىلەن بىرگە ھەزىم سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارى تەكشۈرۈلۈپ، ئاچچىق نەرسىدەلەردىن، ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەردىن پەرھىز تۇتقۇزۇلىدۇ.

شۆلگەي كۆپ ئېقىش

ئېغىزدىن كۆپ مىقداردا شۆلگەي ئاقىدۇ، بىمار ئارقىمۇ ئارقا تۈكۈرۈش سەۋەبىدىن سۆزلەش ۋە تاماق يېيىش قىيىنلىشىدۇ.

سۇيقاش، گاڭچىپەن ئىستېمال قىلىش چەكلىنىدۇ. قەۋزىيەتنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. ھەزىمنى ياخشىلاش تەدبىرلىرى بىلەن بىرگە پىۋا ئىچىش، گازىر چېقىش، نەم يەردە يېتىش، ئۇزۇنغىچە ئەقلىي ئەمگەك قىلىش ۋە قالايمىقان جىنسىي مۇناسىۋەتتە بولۇشتىن پەرھىز قىلىنىدۇ. يېلىڭ كىيىنىشكە بولمايدۇ.

ئېغىز پۇراش

ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بولۇپمۇ ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرى، ئاشقازان كېسەللىكلىرى، ئۆپكە، مېڭە، بالد-يانقۇ كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارنىڭ سەۋەبىدىن ئېغىزدىن سې-

سقى پۇراق كېلىدۇ.

ئېغىز پۇراشقا سەۋەبى بولغان ئەسلى كېسەللىكنى داۋالاشقا ئاكتىپ تەدبىر قىلىش لازىم. ئەسلى كېسەللىك ساقايىسا ئېغىز پۇراش شۇنىڭغا ئەگىشىپ ياخشىلىنىپ قالىدۇ.

ئېغىز بوشلۇقىنىڭ تازىلىقى ياخشى بولمىغانلىقتىن كېلىپ چىققان ئېغىز پۇراشنى داۋالاشتا ئالدىنى ئېلىشنى ئاساس قىلىش، ئېغىزنى دائىم تاماقتىن كېيىن، كەچتە ئۇخلاشتىن بۇرۇن ۋە ئۇخلاپ قوپقاندىن كېيىن يىلما سۇ بىلەن چوڭىلاپ يۇيۇش، تۈز سۈيى ياكى مۇناسىۋەتلىك دورا سۇلىرى بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم.

ئېغىز ۋەرمى

ئېغىز شىللىق پەردىلىرىگە ئاقۇش رەڭلىك پىشلاققا ئوخشاش ئۇششاق مۇدۈرلەر چىقىپ ئېغىز ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئاغرىيدۇ، ئېغىز شىللىق پەردىلىرى كۆپۈشكەنلىكتىن يەڭگىل دەرىجىدە ئىششىيدۇ. كىچىك بالىلار تۇلا يىغلاپ ئەمچەك ئەمەي بىئارام بولىدۇ.

يېمەك - ئىچمەك جەھەتتە بەك ئاچچىق - چۈچۈك، قىزىق، تۈزلۈك ۋە بەك تاتلىق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن پەرھىز قىلىش كېرەك. تاماكا چېكىشنى تاشلاش، ئوزۇقلۇقنى ياخشىلاش، يېڭى كۆكتاتلارنى ئىستېمال قىلىش، قان ئازلىقىنى داۋالاش لازىم.

ھۆل مېۋە - چېۋىلەرنىڭ سۈيىنى ئىستېمال قىلىش، ئۇسۇك، سېمىز ئوت، كۆك يۇمىقاسۇت، مارجان شوخلا، ئىسبە غۈل، بېھى ئۇرۇقلىرىنىڭ سۈيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم.

تىل ئېغىرلىقى ۋە كېكەچلىك

بۇ سۆزلەشتە قىيىنلىشىش، توغرا تەلەپپۇز قىلالماسلىقتىن ئىبارەت بىرخىل كېسەللىك.

بىمارنى كەمسىتمەستىن روھىنى ئۆستۈرۈپ تۇرۇش لازىم. مېڭىنى ۋە ھەزىم ئەزالىرىنى قۇۋۋەتلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئاچچىق نەرسىلەردىن، قويۇق ۋە مايلىق تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. سوغۇق ئىچىملىك، ھاراق ۋە دۇغاپتىن ساقلىنىدۇ.

تىل چوڭىيىپ قېلىش

بۇ كېسەلدە تىل چوڭىيىپ كېتىپ بىمارنىڭ ئاغزىغا پادە ماي، ئېغىزدىن سىرتقا چىقىپ قالىدۇ. چۈچۈمەل جۈيزە، ئانار، رېباس قاتارلىقلارنى داۋاملىق تىل ئۈستىگە قويۇپ بېرىش كېرەك، ئۈزۈم غورىسىغا ئازراق سىماق قوشۇپ ئىستېمال قىلىسىمۇ بولىدۇ. تامىقىغا ئېشەك سۈتىنى كېپەك ئۇمۇچى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بېرىش كېرەك.

تىل ياللۇغى

تىلدا ئېچىشىش ۋە ئاغرىش بولىدۇ، ئەگەر زىيادە ئىشىشىغان بولسا تىل ئېغىز سىرتىغا چىقىۋالىدۇ، نەپەس ئېلىش، سۆزلەش قىيىن بولىدۇ، شۆلگەي ئاقىدۇ، چىرايى قىزىل ۋە كۆكۈش بولىدۇ، بويۇن تومۇرلىرى كۆپىدۇ، بىئاراملىق، قىزىتما بولىدۇ، تاماق يېمەسلىك سەۋەبىدىن ئاجىزلاپ كېتىدۇ، بەزىدە تىل يىرىڭلايدۇ.

ھەسەل، لازا ۋە ھاراقىتىن پەرھىز قىلىنىدۇ. يېمەك -

ئىچمەك تەرتىپكە سېلىنىپ، ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك ياكى ئاي-
رىم ماددىلارنىڭ كەملىك غەھۋالى تۈزۈتىلىدۇ. قەۋزىيەتتىن
ساقلىنىلىدۇ.

تېتىش سېزىمىنىڭ بۇزۇلۇشى

بىرەر نەرسىنى تېتىغاندا شۇ نەرسىنىڭ ئەسلىدىكى تەمىنىڭ
ئەكسىچە باشقا تەمىنى سېزىدۇ، يەنى بىمار ئەگەر تاتلىق نەرسە
يېگەن بولسا، ئۇ ئاچچىق ياكى تۈزلۈك بىلىنىدۇ.
مېڭە تومۇرلىرىنى ئېچىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش بىلەن
بىر ۋاقىتتا نېرۋىنى زىيانغا ئۇچرىتىدىغان نەرسىلەردىن ئىس-
پىرتلىق ئىچىملىكلەر، تۈزلۈك ۋە ئېغىر تاماقلاردىن پەرھىز
قىلدۇرۇلىدۇ. ئەنەبەر ياكى ئىپارغا ئوخشاش دورىلار پۇرۇ-
تىلىدۇ.

تىل قۇرغاقلىشىش

بۇنىڭدا تىل تارتىشىپ (يىغىلىپ) كىچىكلەپ قالىدۇ ھەم
تەشەنۈچ كېسىلىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.
مېڭىگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش بىلەن
بىر ۋاقىتتا لازا ۋە ھاراقىتىن پەرھىز قىلىنىدۇ. قارامۇچ،
ئاقمۇچ سېلىنغان تاماقلار بېرىلمەيدۇ. بادام مېيى تېمىتىپ
بەرسە مەنپەئەتلىك.

تىل يېرىلىش

تىلنىڭ قۇرۇقلۇقى ھەدىدىن زىيادە ئېشىپ كېتىپ، يېرىد-
لىپ كېتىشىگە قارىتىلغان بولۇپ، تىل يېرىلغان بولىدۇ، سۆز-

لەش، تاماق يېيىش قىيىنلىشىدۇ، كېسەل تەرەققىي قىلسا تىل رايونىغا ئايلىنىشى مۇمكىن.

ئومۇمىي بەدەنگە بولۇپمۇ مېڭە ۋە ئاشقازانغا ھۆللۈك يەتكۈز-
گۈچى كۈچلۈك دورا ۋە يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قى-
لىش لازىم. بۇنىڭ بىلەن بىرگە كۆك ماش، بوغداي، ئارپا،
گۈرۈچلەر بىلەن يارما ئاش قىلىپ ئېچىش؛ ئاچچىق - چۈچۈك،
تۈزلۈك يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش؛ قۇرۇقلۇق يەتكۈزگۈ-
چى ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش كېرەك.

تىل قۇرۇش

بەدەندىكى ھارارەت ۋە قۇرۇقلۇقتىن كېلىپ چىققان بولسا
تىل سارغۇچ ۋە يىرىك بولىدۇ، سەپرا غالىبلىقنىڭ ئالامەتلىرى
كۆرۈلىدۇ، قويۇق خىلىت تىل ئۈستىگە چاپلىشىۋېلىشتىن بول-
غان بولسا شۆلگەي چاپلاشقاق بولىدۇ.
جىگەر ۋە ئۆت خىزمىتىنى ياخشىلاش بىلەن پەرھىز قىلىند-
ىدۇ. بىر قېتىمدا كۆپ تاماق يېيىلمەيدۇ. غەزەپلىنىش، گۇمان-
خورلۇقتىن ساقلىنىدۇ.

ئىسسىقلىقتىن بولغان چىش ئاغرىقى

ئاغرىق نىسبەتەن قاتتىق بولىدۇ. سوغۇق سۇ ئىچكەندە ياكى
ئېغىزنى سوغۇق سۇدا چايقىغاندا ئاغرىق يەڭگىلەيدۇ ياكى تۈخ-
تايدۇ. يەرلىك ئورۇندا قىزىقلىق بىلىنىدۇ، ئىسسىق يېمەك -
ئىچمەك، دورا - دەرەكلەرنى يېيىش قىيىن بولىدۇ.
ئىسسىقلىق دورىلار ۋە تاماقلار ۋاقىتىنچە چەكلىنىدۇ. چىش
تۈۋىنى كۈچىلاش ۋە چىشنى يۇلۇش مەنىسى قىلىنىدۇ.

سوغۇقتىن بولغان چىش ئاغرىقى

ئىسسىق ھاۋا، ئىسسىق سۇ ۋە ئىسسىق تەبىئەتلىك نەرسىدە - لەر تەسىر قىلسا ئاغرىق يەڭگىللەيدۇ، سوغۇق نەرسىلەر تەسىر قىلسا ئاغرىق كۈچىيىدۇ.

چىشنى كۈچەپ چوتكىلاش، سوغۇق ئىچىملىك ۋە ھاراق ئىچىش، گاڭگەن ۋە سۇيقاش ئىستېمال قىلىش ھەمدە گۇمانخور - لۇق، تېرىككەكلىك بۇ كېسەللىكتە ئالاھىدە چەكلىنىدۇ. مىددە - راپ قالغان چىشنى زورلاپ تارتىشقا بولمايدۇ.

چىش مىلىكى قاناش

چىش مىلىكى كۆپۈشۈپ قاناش بولۇپ، بىمار ناھايىتى ئا - جىزلاپ كېتىدۇ، چىشلار مىدىرلاپ قالىدۇ ھەم قاپىسى خىلىتتىن بولغان بولسا، ئۇنىڭ خاس ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئىچكى، تاش - قى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن چىش مىلىكلىرىنىڭ يەرلىك ئورۇندىكى تۆتىنچى ھەزىم قۇۋۋىتى (قوۋۋىتى غازىيە) ئاجىزلىشىپ، ئوشاق قىلغان تومۇرلار سۇسلىشىپ، شۇ ئورۇندىكى تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئۆزلۈكىدىن ئاجىزلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇخىل ئاجىزلىشىش تۈپەيلىدىن چىش مىلىكلىرى ئاسانلا قانايىدە - غان بولۇپ قالىدۇ.

قۇۋۋىتى غازىيەنىڭ سۇسلاشقانلىقىدىن بولسا، قىزىل - غۇ - زۇم شەرىپىتى، ئانار شەرىپىتى، ماددە تولھايات قاتارلىق دورىلارنى بېرىش لازىم. ئوزۇقلۇقنى كۈچلەندۈرۈش، قاننى كۆپەيتىش ئۈچۈن سۈت، تۇخۇم، گۆش ۋە كۆكتاتلاردىن سەۋزە قاتارلىق يېڭى كۆكتاتلارنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش كېرەك.

ئەگەر قاننىڭ كۆپلىكىدىن بولسا، مەتبۇخى شاھتەررە، تەم - رى ھىندى، پۇنۇس، چىلان قاتارلىق دورىلار بېرىلىدۇ. كۆك

ماش، گۈرۈچلەر بىلەن شوۋۇ گۈرۈچ قىلىپ ئىچىش، يەڭگىل تاماقلار بىلەن ئوزۇقلىنىش كېرەك. ئاچچىق - چۈچۈك، تۈز-لۇق، قاتتىق - قۇرۇق تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.

ئاۋاز پۈتۈش

سۈزلىگەندە خىقراپ ئاۋازى ئېنىق چىقمايدۇ ياكى كىسىل-داپ قالىدۇ، ئەگەر قۇرۇقلۇقتىن بولسا، قۇرۇقلۇقنىڭ ئېشى-شىغا ئەگىشىپ ئېغىرلىشىدۇ. گال ئاغرىش قۇشۇلۇپ كېلىدۇ. ھۆل نەرسىلەرنى يېسە بىر ئاز ئارام تاپىدۇ، ئەگەر ھۆللۈكتىن بولسا گال ئاغرىمايدۇ، ئېغىزدىن شالۋاق ئاقىدۇ، ھۆللۈك نەرسىلەرنى يېسە ئاۋاز پۈتۈش ئېغىرلىشىدۇ.

ئومۇمەن چاڭ - توزان سىردىن يىراق تۇتۇلىدۇ. ئاچچىق - چۈچۈك تاماقلار، ئۆتكۈر قىزىق ۋە سوغۇق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش، تاماكا چەكمەسلىك، قاتتىق ئاۋاز بىلەن توۋلاش، ئۇزۇن مۇددەت ۋارقىراپ يىغلاشلاردىن ساقلىنىش لازىم.

كۆپ تەرلەش

تەرلەشنىڭ دەرىجىسى ھەر خىل بولۇشى مۇمكىن. تەرلەش كۆپ بولغاندا ئىچكى كىيىم بىلەن يوتقان - كۆرپەلەرمۇ نەملىشىپ كېتىدۇ، كۆپ تەرلەشنىڭ بىمارنىڭ سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلەرگە كۆڭلى تارتىدۇ. بەدىنى ئاجىز، خام سىمىز بولۇپ كىچىك تەرتىمۇ كۆپ بولىدۇ. كۆپ تەرلەشتىن بەدەن كۈندىن - كۈنگە ماغدۇرسىزلىنىدۇ تەردىن كېيىن بۇ خىل ئەھۋال تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ.

قىزىتمىلىق كېسەللىكتىن پەيدا بولغان كۆپ تەرلەش بولسا

ئالدى بىلەن كۆپ تەرلەشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئەسلى (بىرلەمچى) كېسەلنى داۋالسا كۆپ تەرلەش ياخشىلىنىپ كېتىدۇ. ھۆل سوغۇقلۇقى ئېشىپ كېتىپ بەدەن ئاجىزلاشتىن پەيدا بولغان كۆپ تەرلەشتە قۇرۇق ئىسسىق كەيپىياتتىكى ئاۋاملارنى بېرىش، ھۆل سوغۇق كەيپىياتلىق يېمەك - ئىچمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇش ۋە جىسمانى ھەرىكەتلەر بىلەن مۇۋاپىق شۇ-غۇللاندۇرۇش ۋە يېمار بەك سېمىز بولمىسا بىر مەزگىل تۈزلۈك-راق ئاۋاملارنى بۇيرۇش يولى ئارقىلىق داۋالىنىدۇ. قىزىتمىلىق كېسەللىكتىن كۆپ تەرلىسە قۇۋۋەتلىك ئاۋاملارنى ئاز مىقداردىن كۆپ قېتىم يېيىش، تەرنى سۈرتۈپ تۇرۇش بىراق كۈچ بىلەن سۈرتىمەسلىك كېرەك. چۈنكى كۈچ بىلەن سۈرتكەندە بىرىنچىدىن تەر چىقىش كۆپىيىدۇ. ئىككىنچىدىن تېرە يۈزى ئاسانلا زەخمى-لىنىشى مۇمكىن. شۇنداقلا قىزىتمىلىق كېسەللىكتە يېمار كۆپ تەرلىگەندە ئۈستىگە يېپىنغان تۆشەكنى بىراقلا ئېچىۋەتمەي تەدرى-جىي نېپىزلاشتۇرۇش كېرەك. تەر توختىغاندىن كېيىن لۆڭگىنى ئىسسىق سۇغا چىلاپ بەدەننى يەڭگىل سۈرتۈپ تېرنى تازىلاش كېرەك. بولۇپمۇ ھاۋا سالقىن مەزگىللەردە يېمار ئېچىلىپ قې-لىپ ئۆپكەسىگە سوغۇق ئۆتۈشتىن قەتئىي ساقلىنىش كېرەك. كۆپ تەرلەۋاتقان يېمارلارغا سۇماق، قۇرۇق يۇمىغاقسۇت، ماش، چىلانلاردىن مۇۋاپىق ئېلىپ سۇغا سېلىپ ئازراقلا قاينىتىپ ئۈسسۈزلۈك ئۈچۈن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. شەربىتى خەشخاش ئوب-دان ئۈنۈم بېرىدۇ. ئىسكەنجىۋىل بېرىلىسمۇ بولىدۇ. يېمارغا بۇغداي يارمىسىغا قوي گۆشى، سېرىق ياغ، تۇز ۋە ئىسسىق تەبىئەتلىك خۇش پۇراق دورا - دەرەكلەر سېلىنغان تائام ئويدان مەنەپەت قىلىدۇ. قىزىتمىلىق كېسەللىكتە كۆپ تەرلەشنى داۋا-لاشتا يۇقىرىدىكى تەدبىرلەردىن باشقا ئاساسىي كېسەللىكنى داۋا-لاش مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ.

قوشۇمچە. خاسىيەتلىك ئەشيانلار

1. ھاۋالار

ئەتىياز ھاۋاسى (4 ~ 2 - ئاي)

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى بار.
مەنپەئەتى: ياخشى خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولۇشىغا ياردەم
بېرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قان ۋە سەپرا خىلىتلىق كىشىلەرنىڭ
كېسىلىنى قوزغايدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قان ئالدۇرۇش ۋە سوغۇق دورىلار ئىشلىتىش.

ياز ھاۋاسى (7 ~ 5 - ئاي)

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ھۆل مىزاجلىق كىشىلەرگە پايدا قىلىدۇ. زىيانلىق
تەسىرى: ھەزىم ئەزالىرىغا زىيىنى بار.
تۈزەتكۈچىسى: سوغۇق تەبىئەتلىك شەربەتلەر.

كۆز ھاۋاسى (10 ~ 8 - ئاي)

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: قان بېسىمىنى ۋە سەپرانى پەسەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سەۋدانى ئولغايتىدۇ، تېرىنى قۇرغاق.

لاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

قىش ھاۋاسى (1 ~ 11 - ئاي)

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ھەزىمنى ياخشىلايدۇ. قۇرۇقلۇقنى يوقىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: بەلغەمنى كۆپەيتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

2. سۇلار

بۇلاق سۈيى

تەبىئىتى: سوغۇق.

مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە جىگەرنى ياشتۇرىدۇ. ھەزىمنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سوغۇقلۇق كەلتۈرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: شەربەتلەر، بىدمىشكى شىرىسى.

ساپ سۇ

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: تاماقنىڭ پارچىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا سوغۇق كېلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئانار، سىركەنجىۋىل.

قار سۈيى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: جىگەرنى سوۋۇتىدۇ. ئىسسىق مىزاجلىقلارغا
مۇۋاپىق.
زىيانلىق تەسىرى: بەلنى ئاغرىتىدۇ. ئىچىنى سۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ، زىرە.

يامغۇر سۈيى

تەبىئىتى: ئازراق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: كۆكرەك ئاغرىش ۋە يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرگە زىيان-
لىق. ئومۇمەن ئىستېمال قىلىنمايدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل

كازىر سۈيى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: قۇلۇنجىغا پايدا قىلىدۇ. ئۇسسۇزلۇقنى باس-
ىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ھەزىمنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئوبدان قاينىتىش.

قۇدۇق سۈيى

تەبىئىتى: سوغۇق، بىر ئاز قويۇق.
مەنپەئەتى: ئۇسسۇزلۇقنى باسىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياخشى قاينىتىش.

قايناق سۇ

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى ئارتۇق.
مەنپەئەتى: زەھەر قايتۇرىدۇ، ئىچىنى يۇمشىتىدۇ، بەلغەم
چىقىرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سوۋۇتىدۇ ۋە ھەزىمنى ئا-
جىزلاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: چاي، بەدىيان.

شور سۈيى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق
مەنپەئەتى: ئىچىنى بوشىتىدۇ، قان توختىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قىچىشقاق ۋە بەھەق پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياغلىق، تاتلىق تاماق.

قاراماي (نېفىت) قۇدۇقى ئەتراپىدىكى سۇ

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
زىيانلىق تەسىرى: بەل ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ.

3. دانلىق زىرائەتلەر

بۇغداي

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، يىلىك كۆپەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى : تاتلىق يېمەكلىكلەر .

غاريا

تەبىئىتى : ھۆل سوغۇق .

مەنپەئەتى : ئېشەك يېمىنى قايتۇرىدۇ .

زىيانلىق تەسىرى : قورساق ئاغرىتىدۇ .

تۈزەتكۈچىسى: ئۆزىنى قۇرۇپ ئىستېمال قىلىش.

تبرق

تەبىئىتى : قۇرۇق سوغۇق .

مەنپەئەتى : ئۇستىخاننى چىڭىتىدۇ .

زيانلىق تەسرى: تەستە ھەزىم بولىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سۈت ياكى ياغ

گوروچ

تەبىئىتى : قۇرۇق سوغۇق .

مەنپەئەتى: ئوزۇق بولىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازان يارىسى ۋە قۇلۇنچى بىمارلىرىغا

زىيان قىلدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغ بىلەن ئىستېمال قىلىش.

ماش

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: قىزىتمىنى پەسەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: چىشقا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بادام يېغى.

باقىلە

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: يۆتەل ۋە قىزىتمىغا پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئادەمنى بوشاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: تۇز، ھايۋان ئۆتى.

لوبيا

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆزگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەيتۇن يېغى.

قوناق

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئوزۇق بولۇش.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياغ ياكى سۈت.

4. ياغلار

زاراخزا يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سۈيۈك ۋە ھەيز ماڭدۇرىدۇ. بەلغەم بو-
شتىدۇ.

زاغۇن يېغى

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يەل تارقىتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، بەدەننى
قىزىتىدۇ.

زىغىر يېغى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى كۈچەيتىدۇ، ئىششىق ياندۇرىدۇ.

زەيتۇن يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، يەل تارقىتىدۇ،
تېرىنى پارقىرىتىدۇ.

كۈنجۈت يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، تېرە ۋە چاچنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

بادام يېغى

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىقلىققا مايىل.
مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، پەينى چىڭىتىدۇ.

ئاپتاپپەرەس يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: ياللۇغ قايتۇرىدۇ، ئىچنى يۇمشىتىدۇ.

چىگىت يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەلغەم بوشىتىدۇ، قۇۋۋەتلەيدۇ.
ئەسكەرتىش: ياغ چىقىرىشتا دىققەت قىلىنىپلا، بەدەنگە زىيانلىق ماددىلار تازىلانماي قالىدۇ.

خاسىڭ يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، قىزىتىدۇ، تېرە ۋە چاچنى ئاسرايدۇ.

ياڭاق يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. باھنى كۈچەيتىدۇ، ئىش-
شىقنى قايتۇرىدۇ.

قىچا يېغى

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ماددا ئالمىشىشنى تېزلەشتۈرىدۇ. سوغۇقتىن
بولغان كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

بېلىق يېغى

تەبىئىتى: مۆتىدىل، سوغۇققا مايىل.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، قارشىلىق كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.

ئات يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، كىشىگە غەيرەت
بېغىشلايدۇ.

قوي يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى قىزىتىدۇ، پارقىرىتىدۇ، ئۇزۇق
بولىدۇ.

توخۇ يېغى

تەبىئىتى: ئىسسىق.
مەنپەئەتى: توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، ئىششىق قايتۇرىدۇ، تېز سىڭىدۇ.

كالا يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: زەھەر قايتۇرىدۇ، تېرىنى پارقىرىتىدۇ.

ئۆچكە يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئىچ ئۆتكۈنى توختىتىدۇ، جاراھەتنى پۈتتۈرىدۇ.

ئۆردەك يېغى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئىششىق قايتۇرىدۇ، تېرىنى ياخشىلايدۇ.

تۆگە يېغى

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يەل تارقىتىدۇ، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرىدۇ.

تۇخۇم يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىلىك ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: زەھەر قايتۇرىدۇ، چىرىشنى توسىدۇ، يەرلىك
ئورۇنغا ئوزۇق بولىدۇ.
ئومۇمىي ئەسكەرتىش: يۇقىرىدىكى ياغلار غىزايى مۇتلەق
ياكى غىزايى داۋايى بولغاچقا، مۇۋاپىقى ئىشلەتسە روشەن زىيان-
لىق تەسىرى بولمايدۇ.

5. گۆشلەر

قۇلان گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بوغۇم ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازان ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەنجۈل، دارچىن ۋە خولىنجان.

قوي گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زىرىق، ئاپپىلىسنى پوستى.

ئۆچكە گۆشى

تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: تېز ھەزىم بولىدۇ، سەمىرىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كاۋاپ قىلىپ يېسە، قۇلۇنجى پەيدا
قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: چامغۇر.

ئوغلاق گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى كۈچەيتىدۇ، تازىلايدۇ. ماغدۇرسىزلاندۇرغان بىمارلارغا خىل كېلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەر خىل دورىلىق خۇرۇچلار.

ئات گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ياخشى قان ھاسىل قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بوۋاسىر پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە مۇراپباسى

تۆگە گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يەل ھەيدەيدۇ ۋە يەلدىن بولغان ئاغرىقلارنى يوقىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قۇلۇنجى ۋە بۇزۇق سەۋدا پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەنجىۋىل مۇراپباسى.

كېيىك گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قۇلۇنجى، پالەچلەرگە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بەدەننى قىزىتىپ قاننى كۆيدۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئاق شېكەر.

ئورمان كەكلىكى گۆشى

تەبىئىتى: مۆتىدىل ۋە لەتىق.
مەنپەئەتى: ماغدۇر كىرگۈزىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سوغۇق تەبىئەتلىك ياغلار.

كەپتەر گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، چىرايلىق قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قۇلۇنجى پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: گۈل يېغى.

كەپتەر باچكىسىنىڭ گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرگە پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆزگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سامساق، ھەسەل.

خوراز گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قۇلۇنجىنى ئاچىدۇ. قان كۆپەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى ئېسىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: كونا شاراب.
ئەسكەرتىش: مىكيان گۆشى ۋە سۈنئىي يېتىشتۈرۈلگەن
توخۇلارنىڭ ئۇزۇقلۇقى خورازنىڭكىدىن تۆۋەن.

كەكلىك گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سوۋۇپ كەتكەن ئاشقازانغا ۋە قەۋزىيەتكە پايدا
قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

تۇرنا گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سوغۇق مىزاج كىشىلەرگە پايدىلىق.
زىيانلىق تەسىرى: تەستە ھەزىم بولىدۇ: قويۇلۇقى
يۇقىرى.
تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە.

بۆدۈنە گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بوغۇم ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلدۇ. باھنى قوزغاي-
دۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سەپرا خىلىتلىق كىشلەرنىڭ جىگرىگە
زىيان قىلدۇ.

ئۆردەك گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئورۇق كىشلەرنى سەمىرتىدۇ، چىرايلىق
قىلدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېسە، غەيرىي تەبىئى خىلىت پايدا
قىلدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: پىياز، سامساق.

توشقان گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، روھلاندۇرىدۇ.
ئەسكەرتىش: مۇۋاپىق يېيىلسە، مەنپەئەت زور.

6. ھايۋان ئەزالىرى

مېڭە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، سەمىرتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆڭۈلنى ئېلىشتۇرىدۇ. تەستە سى-
ڭىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: تۈز، قىچا.

كۆز

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: كۆزگە پايدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: كەترا.

قۇلاق

تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: كۆمۈرچەك تەركىبىدە مول مەدەن ماددىلار بو-

لۇپ، ئوزۇقلۇق تولۇقلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئېنىق ئەمەس.

تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

تىل

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەۋدا خىلىتلىق كىشىلەرنىڭ مېڭىسىگە پايدا

قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سۈيىدۈكى سېسىق كېلىدۇ. سېسىق كې-

كىرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: دارچىن، زىغىر.

ئاشقازان (قېرىن)

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ھەزىمنى ياخشىلايدۇ. دىئابىتقا پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قورساق ئاغرىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە بىلەن ئاقمۇچ.

ئۈچەي

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئۈچەينى كۈچەيتىدۇ، زەھەر قايتۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە

جىگەر

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: نامازشام قارىغۇسىغا پايدا قىلىدۇ. سەزگۈنى
ئاشۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: دارچىن بىلەن گۈل ئۇرۇقى.

يۈرەك

تەبىئىتى: ئىسسىق، ھۆللۈكى بار.
مەنپەئەتى: قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ، غەيرەتلىك قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تەستە ھەزىم بولىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: دارچىن، لاچىندانە.

بۆرەك

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنبەئەتى: يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى قوزغايدۇ، تەبىئىي كۈچنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تەستە ھەزىم بولىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: تۇز، زىرە.

ئۆپكە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق (قۇرۇق ئىسسىق ۋە ھۆل سوغۇق دېگۈچىلەرمۇ بار).
مەنبەئەتى: ئۆپكەنى ياخشىلايدۇ، گۆش چەكلەنگەن بىمارلارغا قۇۋۋەتلەش مەقسىتىدە بېرىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ھەزىم بولۇشى ئاستا.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

دۈمبە قوۋۇرغا

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل.
مەنبەئەتى: بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ.
شورپا قىلىپ ئىچىلسە ئىنتايىن پايدىسى بار.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سۇسلاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەنجۋىل، خولىنجان، زەپەر.

ئۈستىخان

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.

مەنپەئەتى: سۆڭەكنى كۈچەيتىدۇ، قۇۋۋەت تولۇقلايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سىڭىشى تەس.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ، بەدىيان

چۈيە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: باھنى كۈچەيتىدۇ، چاچ ئۆستۈرىدۇ، روھلاندۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سىڭىش تەس.
تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتاتلار، سىركە.

پاچاق

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: پۇت - قولغا ماغدۇر كىرگۈزىدۇ. ئاشقازان يارىسىغا پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ياخشى تازىلانمىغانلىرى ئادەمنى زەھەرلەيدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئەرەق، سۈت، قايناق سۇ.

تۇخۇم

تەبىئىتى: سېرىقى قۇرۇق ئىسسىق، ئېقى ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: مېڭىنى، ئۆپكەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سېرىقى جىگەر ۋە ئۆتكە ياقمايدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىك، سىركەنجىۋىل.

يىلىك

تەبىئىتى: مۆتىدىل.
مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، مەنىي كۆپەيتىدۇ، قان تولۇقلايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كېسەل ھايۋاننىڭ يىلىكى ئادەمگە خەتەرلىك.
تۈزەتكۈچىسى: كۈچلۈك جاراسىمغا قارشى دورىلار.

7. سۈتلەر

ئانا سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ماددىي ۋە روھىي جەھەتتە مەنپەئەتى زور.
زىيانلىق تەسىرى: قاتتىق تەرلىگەندە، ئىسسىق ئۆتۈپ كەتكەندە، ئاچ قالغاندا ئېمىتسە، بالىغا زىيان قىلىدۇ. ئىچىنى سۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئانىنى ئارام ئالدۇرۇپ، ئوزۇقنى ياخشىلاش.

كالا سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزىدۇ، ئوزۇقلاندۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: خاس ئىچىلسە، سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرگە سوغۇق كېلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: تۇخۇم، پوشكال، چاي.

ئۆچكە سۈتى

تەبىئىتى: ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سىل، ئورۇقلۇق ۋە ھەر خىل ئاجىزلىقلارغا پايدا قىلدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قىچىشقا زىيىنى بار.
تۈزەتكۈچىسى: چاي.

قوي سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بۇ كالا سۈتىدىن كۈچلۈك بولۇپ، ئادەمگە ماغدۇر كىرگۈزىدۇ. جىگەر ياللۇغىغا مەنپەئەتلىك.
زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى يوق.

تۆگە سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سىل، ئىششىق قاتارلىقلارغا ناھايىتى پايدىلىق.
زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى يوق.

ئات سۈتى

تەبىئىتى: يۇقىرى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سىل ۋە ماغدۇرسىزلىققا بەك پايدىلىق (مۇۋاپىق ئىچىلسە زىيىنى يوق).
پىق ئىچىلسە زىيىنى يوق.

ئېشەك سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سىل ۋە جىگەر قېتىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ (بى-
مارغا ئۇقتۇرماي ئىچكۈزۈلىدۇ)

8. مېۋىلەر ۋە مېغىزلار

ئاپتاپپەرەس ئۇرۇقى (گازىر)

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: تېرىنى سىلىقلاشتۇرىدۇ. ئىسسىقنى قايتۇ-
رىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇقچانلارنىڭ بۇرنىغا ۋە تېلىغا زىيان
قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، ناۋات.

ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۆتەل، زىققا، جاراھەت قاتارلىقلارغا پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: يەڭگىل دەرىجىدە زەھەرلەيدۇ، باشنى
ئاغرىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: تاتلىق نەرسىلەر.

ئارچا مېۋىسى

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ئىسسىق، 2 - دەرىجىدە قۇرۇق.
مەنپەئەتى: قىزىتىدۇ، پالەچ ۋە زىققىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: گال ۋە ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: كەتىرا.

ئالما

تەبىئىتى: تاتلىق ئالما ھۆل ئىسسىق، چۈچۈمەل ئالما قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، ئارتۇق خىيالىنى يوق قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: چۈچۈمەل ئالما ئۇنۇتقاق قىلىپ قويدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: گۈلقەنت، دارچىن ياكى ھەسەل.

ئامۇت

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقتىن بولغان خاپىغان، ھەزىم ناچارلىقى، قاننىڭ قويۇقلىشىپ كېتىشى قاتارلىقلارغا ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىقلارنىڭ ئاشقازان ۋە بۆرىكىگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان.

بادام

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل، 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كۆكرەك ۋە ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: مەستكى، شېكەر.

ئاچچىق بادام

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەلغەم بوشىتىدۇ، ئىششىق قايتۇرىدۇ، ھەيز ماڭدۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: شېكەر، تاتلىق بادام، ناۋات.

بېھى

تەبىئىتى: مۆتىلىگە يېقىن، بەزى كىتابلاردا سوغۇق دېيىلگەن.

مەنپەئەتى: ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ، سۈيدۈك ھەيدەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يۆتەل ۋە ھېق پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: رۇم بەدىيان، ھەسەل.

پىستە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: يۈرەك، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، مەنىي كۆپەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېسە تىلما پايدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە، ئاچچىق ئانار.

تاتلىق ئانار

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، جىگەرنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ. روشەن زىيىنى يوق.

تاۋۇز

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقنى قايتۇرىدۇ، مايىنى ئېرىتىدۇ، قاننى سۇيۇلدۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە باھنى ئاجىزلىتىدۇ، ئۇ-نۇتقاق قىلىپ قويدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، گۈلچەنت.

تاۋۇز ئۇرۇقى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەپرانى پەسەيتىدۇ، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، ئاق ناۋات.

جىگەر

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە سوغۇق، 2 - دەرىجىدە قۇرۇق.
مەنپەئەتى: تىنچلاندۇرىدۇ، ئىچ سۈرۈشنى توختىدۇ. مەنىي تۇتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قويۇق يەل پەيدا قىلىدۇ، كونىرىغانلىرى زىيانلىق.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل.

چىلان

تەبىئىتى: مۆتىدىل، سوغۇققا مايىل.
مەنپەئەتى: قويۇق ماددىلارنى تارقىتىدۇ، قاننى تازىلايدۇ.
ئىچىنى بۇمىشىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، گۈل ئەرقى، شېكەر.

يەر ياغىقى (خاسىك)

تەبىئىتى: قۇرۇق
مەنپەئەتى: ئۇزۇق بولىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى ئېسىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قۇرۇپ يېيىش.

خورما

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئۇزۇق بولىدۇ، پالەچ، بوغۇم ئاغرىقلىرىغا

پايدا قىلدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قورساقنى ئېسىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە، كۈنجۈت يېغى، بادام.

شايتۇل

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقنى قايتۇرىدۇ، ئاشقازان ۋە جىگەرنى
قۇۋۋەتلەيدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ھۆل سوغۇق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، زەنجىپىل.

قارا ئۆرۈك

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە سوغۇق، 2 - دەرىجىدە ھۆل.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقنى قايتۇرىدۇ، تىنچلاندۇرىدۇ، قەۋ-
زىيەتنى يوق قىلدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىقلارنىڭ مېڭە ۋە ئاشقا-
زىنىغا زىيان قىلدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: گۈلقەنت، مەستكى، كۈندۈر.

قوغۇن

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى بار.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، تېرىنى سىلىقلاشتۇرىدۇ. سۆز-
ئەك، ھەيز توسۇلۇش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە ئاشقازاننى سۇسلاشتۇر-
دۇ.

رىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئانار سۈيى، سىركە.

قوغۇن ئۇرۇقى مېغىزى

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ئىسسىق، 2 - دەرىجىدە ھۆل.
مەنپەئەتى: سۈيدۈك، ھەيز توسۇلۇش، يۆتەل قاتارلىقلارغا
مەنپەئەت قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بېنەپشە، ھەسەل.

كۆكسۇلتان (ئالۇچە)

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: قىزىتمىنى چۈشۈرىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ،
ئىسسىق يۆتەلنى پەسەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: گۈلقەنت.

كىشىمىش ئۈزۈم

تەبىئىتى: ياخشى پىشقىنى ھۆل ئىسسىق، قۇرۇتۇلغىنى
ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: يۈرەكنى، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. مەمرىتىدۇ، قۇ-
رۇتۇلغىنى بەلغەم بوشىتىدۇ، قەۋزىيەتنى يوق قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بەدەندە شىرسىمان توسالغۇ پەيدا قى-
لىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سىركە، چىلان.

قىزىل ئۈزۈم

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، يۈرەك ۋە مېڭىنى كۈچەيتىدۇ،
باھنى قوزغايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان، چىلان.

كۆك ئۈزۈم

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى بار.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: شىرلىك بەلغەم پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان، زىرە.

گىلاس

تەبىئىتى: ياخشى پىشقىنى ھۆل ئىسسىق، خامراقى قۇرۇق
ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەلغەم بوشىتىدۇ، بۆرەكتىكى تاشنى ھەيدەيدۇ.
تېرىنى پارقىرىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى كۆپتۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ.

لىمون

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: قىزىتما قايتۇرىدۇ، ئىسسىقلىق بولغان ھەزىم
ناچارلىشىش، خاپىغان ۋە باش ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: مېڭە، نېرۋىلارنىڭ خىزمىتىنى سۇسلا-
شتۇرىدۇ، باھنى ئاجىزلىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

نارجىل

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، ئىچكى جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈشتە
ياردەمچى بولىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھۆل سوغۇق مېۋىلەر.

ئاپىلسىن (جۈزە)

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: مايىنى پارچىلاپ، ئىسسىقنى قايتۇرىدۇ. تاماق
سىڭدۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ھۆل سوغۇق مىزاجلىقلارغا زىيان
قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ.

ئۈچمە (جۈجەم)

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق، قارىسىنىڭ ئىسسىقلىقى ئارتۇق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، ئۆپكىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ئىچىنى بوشتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە، ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زىرە.

شاتۇت

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ياللۇغ قايتۇرىدۇ، ئىسسىقنى قايتۇرىدۇ، گال ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىقلارنىڭ پېيىگە زىيان قىلىدۇ، باھنى ئاجىزلىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: رۇم بەدىيان.

ئۆرۈك

تەبىئىتى: مۆتىدىل. ئىسسىق دېگۈچىلەرمۇ بار.
مەنپەئەتى: ئوزۇق بولىدۇ. كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: يەل پايدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: پاكىز سوغۇق سۇ، شېكەر.

ئۆرۈك مېغىزى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، بەلغەم بوشىتىدۇ، يۆتەل پە-
سەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قورساقنى ئېسىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: رۇم بەدىيان.

ياخاق

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. ھۆل دېگۈچى-
لەرمۇ بار.
مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. باھنى كۈچەيتىدۇ. بەل-
غەم بوشىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارنىڭ بېشىنى ئاغرىد-
تىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئاۋاز سۈيى، نەشپۈت، شاپتۇل، ئاپ-
لىسىن.

9. كۆكتاتلار

تۇرۇپ (ئاق تۇرۇپ)

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئۆپكىنى تازىلايدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: يالغۇز ئىستېمال قىلىنسا، يۆتەل پەيدا
قىلىپ قويىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: شورپا، ياغ.

سامساق

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قان تازىلايدۇ. يەل ۋە ھۆللۈكنى تارقىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازان يارىسىنى قوزغايدۇ.

پىياز

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئىشتىھانى ئاچىدۇ، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ. ئۈنۈتقاق قىلىپ قويىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياڭاق، بەدىيان.

پالەك

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىچىنى يۇمشىتىدۇ. قىزىتما قايتۇرىدۇ. قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: باھنى تۆۋەنلىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ، بەدىيان.
ئەسكەرتىش: 1903 - يىلى ئامېرىكا ئالىملىرى پالەكنىڭ تەركىبىدىكى تۆمۈر مىقدارىنى ئۆلچىمىگەندە، بىر چېكىت خاتا ھالدا خا ئالدىغا قويۇلۇپ قېلىپ، بىر ئەسىرگە يېقىن «پالەكتە تۆمۈر ماددىسى كۆپ، بەدەننى كۈچەيتىدۇ» دېگەن قاراش ھۆكۈم سۈرگەن، بۇ ھەقتە ماقالىلار يېزىلغان، كارتۇن فىلىملەر ئىشلىگەن. تېخى يېقىندىلا بۇ ئەسىرلىك خاتالىق تۈزىتىلدى.

ياڭيۇ

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئوزۇق بولىدۇ. ئۈچەي خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئانچە روشەن ئەمەس.

كۈدە

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ. بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

سۇڭپىياز

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. جىراسىم (مىكروپ) ئۆلتۈرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆزگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زىرە.

پىننە

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۈرەكنى، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. يەل ھەيدەيدۇ.
ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئاپپىلىسىن، لىمون، يۇمىلاقسۈت.

قاياق

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقتىن بولغان قىزىتما ۋە ياللۇغلىنىشىنى قايتۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىقلارنى بوشاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

قىزىلچا

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، بەلغەم بوشىتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زىرە، دارچىن.

سەۋزە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەننى كۈچەيتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان.

كەرەپشە (چىڭسەي)

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ھارارەتنى پەسەيتىدۇ، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.
دۇ. ئىششىق ياندۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: باھنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ. سۈتنى كېمەيتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەنجىۋىل.

يۇمغاقسۈت

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: تاماق سىڭدۇرىدۇ. ياللۇغ قايتۇرىدۇ. ئىسسىق-نى ئالىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: باھنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ. سۈتنى كېمەيتىدۇ.

چامغۇر

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئىشتىھانى ئاچىدۇ، بەلغەم بوشتىدۇ، زەھەر قايتۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قورساقنى كۆپتۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زىرە، دارچىن.

كالىلەك بەسەي

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: قويۇق ماددىلارنى يوشىتىدۇ، مېڭىنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ.

كاۋا

تەبىئىتى مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل،
مەنپەئەتى: دىئابېت ۋە يۇقىرى قان بېسىمىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆرۈنەرلىك ئەمەس.

شوخلا

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ھەزىمنى ياخشىلايدۇ، قان كۆپەيتىدۇ. قىزىتما قايتۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى:
ئىسسىق خۇرۇچلار.

بېدە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، ئىچىنى بوشىتىدۇ، زەھەر قايتۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: يەل ۋە قۇلۇنچىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

تۈزەتكۈچىسى: دارچىن، زىرە، سۇ يېغى.

پېدىگەن

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئىششىق قايتۇرىدۇ، ئىچنى يۇمشىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سەۋدانى كۆپەيتىۋېتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە، لاچىندانە.

تەرخەمەك

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقنى ئالىدۇ، تېرىنى سىلىقلاشتۇرىدۇ.
سۈيدۈك ماڭدۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئورۇقلىتىۋېتىدۇ، سوغۇقچانلارغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياغلار.

يېسىۋىلەك (بەسەي)

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئاشقازان، ئۈچەينى تازىلاپ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ، كۆڭۈل ئېلىشىشنى باسىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقىنى ئېلىشلاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زىرە، بەدىيان.

جاغدۇ

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقنى ئالىدۇ، سۈيدۈك ھەيدەيتۇ.
زىيانلىق تەسىرى: مايسىز يېپىلسە ئورۇقلىتىۋېتىدۇ. تۈ-
زەتكۈچىسى: ياغلار.

موگۇ

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

10. شەربەتلەر

سىركەنجىۋىل

تەبىئىتى: سوغۇق.
مەنپەئەتى: زەھەر قايتۇرىدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى باسدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياغلىق ۋە تاتلىق تاماق.

ئەترگۈل شەربىتى

تەبىئىتى: مۆتىدىل.
مەنپەئەتى: روھلاندۇرىدۇ، ئاشقازاننى كۈچەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: گالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بادام يېغى، بانان.

تۇرۇنچى (جۈزە) شەرىپىتى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: يۈرەككە مەنپەئەت قىلدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: نېرۋىنى بوشاشتۇرىدۇ. سوغۇق مىزاج
كىشىلەرنىڭ بۆرىكىگە زىيان قىلدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە مۇراپپاسى.

بېھى شەرىپىتى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئاشقازاننى كۈچەيتىدۇ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ،
زىيانلىق تەسىرى: كۆكرەك ۋە گالىنى يىرىكلەشتۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، بادام يېغى.

ئالما شەرىپىتى

تەبىئىتى: مۆتىدىل، كۆپ قاينىغىنى ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ،
روھلاندۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سەپرانى ئۇلغايىتىدۇ.
تۈزۈتكۈچىسى: لىمون، ھېلىلە

ھەسەل شەرىپىتى (ئاددىي مائۇلھەسەل)

تەبىئىتى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرگە مەنپەئەت قىلدۇ،
بەلغەم بوشىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قان بېسىم بىمارلىرىغا زىيان قىلدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: چۈچۈمەل يېمەك - ئىچمەكلەر.

تاتلىق ئانار شەربىتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ، قان كۆپەيتىدۇ، باھنى قوزغايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سەپرانى ئۇلغايتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: لىمون.

ئاچچىق ئانار شەربىتى

مەنپەئەتى: ئىچ ئۆتكۈنى، قاننى توختىتىدۇ، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: گالىنى يىرىكلەشتۈرىدۇ، يۆتەل پەيدا قىلىدۇ. بەدەنگە سوغۇق كېلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، زەنجۈل

بېنەپشە شەربىتى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقتىن بولغان قىزىتما ۋە ياللۇغلارغا مەد-پەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرنى ئاسان مەست قىلىپ قويىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركەنجۈل، مۇرەككەپ ھەسەل شەربىتى.

نېلۇپەر شەرىپىتى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقتىن بولغان يۆتەلگە شىپا بولىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: كاۋاپ.

كۆكنار شەرىپىتى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقتىن بولغان يۆتەلگە شىپا بولىدۇ. ئاغ-
رىق پەسەيتىدۇ.
ئەسكەرتىش: كۆپ ئىچىلسە مەست قىلىدۇ. زەھەرلەيدۇ.
سۈت، قايماق، ھەسەل، كاۋاپ قاتارلىقلار ئۇنىڭ زەھىرىنى
قايتۇرىدۇ.

لىمون شەرىپىتى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: سەپرانى پەسەيتىدۇ. ئىشتىھانى ئاچىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: باھنى كېسىدۇ. قان بېسىمىنى تۆۋەنلى-
تىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەنجىۋىل مۇرابباسى.

سەندەل شەرىپىتى

تەبىئىتى: مۆتىدىل، سوغۇققا مايىل.

مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە جىگەرگە پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: گالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ناۋات.

جىگدە شەربىتى

تەبىئىتى: مېڭە ۋە يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئاچچىق - چۈچۈك يېمەكلىك.

چىلان شەربىتى

تەبىئىتى: قاننى نورماللاشتۇرىدۇ. ئوزۇقلۇق تولۇقلايدۇ.
ئەسكەرتىش: چىلان مۇرەككەپ تەبىئەتلىك بولغاچقا، ئىسسىق مىزاجلىقلارنىڭ قېنىنى سۈيۈلدۈرۈپ، سوغۇق مىزاجلىقلارنىڭ قېنىنى قويۇلدۇرىدۇ.

11. ۋاراقلار

ئالتۇن ۋاراق

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل.
مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە ئومۇمىي بەدەننى كۈچەيتىدۇ، ئەقىل-نى زىيادە قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: دوۋسۇنغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، كەتىرا.

كۆمۈش ۋاراق

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرىدۇ، كۆزنى رو-
شەنلەشتۈرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئۈچەيگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: كەترا، بادام مېغىزى، ھەسەل.
ئەسكەرتىش: بۇنىڭدىن بىر نەچچە ۋاراقنى تاماققا قوشۇپ
ئىستېمال قىلىشقا بولىدۇ.

12. شېكەرلەر

شېكەر قومۇچى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئۆپكەننى كۈچەيتىدۇ، دوۋساقنى تازىلايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق سۇدا يۇيۇش.

ئاق شېكەر

تەبىئىتى: ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە دوۋسۇنغا پايدا قىلىدۇ، مېڭىنى كۈ-
چەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بۇزۇق سەۋدا پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قىزىل سودا ئېرىتىپ ئىچىش.

قارا شېكەر

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق (قۇرۇق ئىسسىق دېگۈچىلەرمۇ بار).
مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىش، مېڭىنى كۈچەيتىشتە رولى چوڭ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ، توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

يانتاق شېكىرى

تەبىئىتى: مۆتىدىل.
مەنپەئەتى: ئۆپكە ۋە كۆكرەنى كۈچەيتىدۇ. سىلغا پەيدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئومۇمەن زىيىنى يوق.
ئەسكەرتىش: تۇرپاندا يانتاق شېكىرى مانتىسى ئېتىلىدۇ.
مەنپەئەتى زور.

ناۋات

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل.
مەنپەئەتى: مېڭە، يۈرەككە مەنپەئەت قىلىدۇ، روھلاندۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: دىئابېتقا زىيىنى بار دەپ قارالماقتا.
تۈزەتكۈچىسى: قۇرۇق مېۋىلەر.

قەنت

تەبىئىتى: مۆتىدىل، قىزىلچا قەنتى ئىسسىق.
مەنپەئەتى: جىگەر، دوۋساق ۋە بۆرەككە پەيدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئومۇمەن يوق. دىئابىت بىمارلىرى ئىكەنلىكىنى قىلىشى تەكىتلەنمەكتە.

13. خۇش پۇراقلار

ئۇد

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ مېڭىسىگە زىيان قىلىدۇ.
نۆزەتكۈچىسى: كاپۇر.

ئەنبەر

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق، كۈنسى قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ يۈرىكىگە ناھايىتى پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كاپۇر، لىمون.

ئىپار

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. باھنى كۈ-

چەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ مېڭىسىگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: كاپۇر.

سەندەل

تەبىئىتى: ئاق سەندەل قۇرۇق سوغۇق، قىزىل سەندەل مۆتىدىل.
مەنپەئەتى: قان تومۇر قېتىش، باش ئاغرىش، يۈرەك سېلىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: گالىنى يىرىكلەشتۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ناۋات ياكى گۇلاب.

كاپۇر

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: قان توختىتىدۇ، ئىسسىقلىقتىن بولغان يۈرەك ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ. قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بۆرەككە زىيان قىلىدۇ، بەلىنى ئاغرىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بېنەپشە، نېلۇپەر.

14. خۇرۇچلار

خۇرۇچلارنىڭ كۆپىنچىسى ئىسسىق تەبىئەتلىك بولۇپ، قارىمۇچ، ئاقمۇچ، قىزىلمۇچ، زەنجىۋىل، دارچىن، زىرە، بەددىيان، تۈز، پىياز قاتارلىقلارنى كۆرسىتىدۇ. بۇلار تاماقنىڭ

تەمىنى تەڭشەش، يەل ھەيدەش، ئاشقازاننى قىزىتىپ، ھەزىمنى ياخشىلاش، بەدەننى كۈچەيتىش رولىغا ئىگە. ئۇنىڭدىن باشقا، تېتىقۇ، ئېچىقۇ ۋە ئايرىم خۇرۇچلار بولۇپ، ھەر بىر كىشى ۋە مىللەتنىڭ تەن ئالاھىدىلىكى ۋە مىللىي ئادىتىگە ئاساسەن ئىشلىتىلىدۇ.

ئاخىرقى سۆز

گەدىنىمىزدىن ساقىت بولسۇن دەپ بىمار پەرھىزلىرىدىن مۇھىمراقلىرىنى سۆزلەپ ئۆتتۈم. ئەمەل قىلىش - قىلماسلىق ھەربىر ئادەمنىڭ شەخسىي ئىشى. ئەمما بۇ «شەخسىي ئىش» بىر ئائىلىنىڭ ۋە خەلقنىڭ تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا، ئۇنى ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك ئاتا سۆزلىرى قاتارىدا كۆرۈشنى ھەر كىمدىن ئۆتۈنمەن. بولۇپمۇ ھاراق - شاراب، زىنا - زالالەت، ئاچچىق ۋە چۈچۈمەل نەرسىلەر، ئۇقىماسلىق ياكى ئوقۇتماسلىق، ئورۇنسىز ئۇرۇش - جېدەللەر.....دىن قاتتىق پەرھىز تۇتۇش لازىم. چۈنكى كېسەللىك مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ ۋە پۈتۈن بەختسىزلىك مۇشۇ ئىشلاردىن شەكىللىنىدۇ. قالدى گەپ-لەرنى ئوقۇرمەنلەرگە قالدۇردۇم.

مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى
مەسئۇل كوررېكتورى: رەيھان نۇر

ئۇيغۇر تېبابىتىدە پەرھىز بۇيرۇش

ئەخمەتجان ئىسمائىل

*

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى نەشر قىلدى
(ئۈرۈمچى بۇلاقبېشى كوچىسى 66-قورۇ، پوچتا نومۇرى: 830001)

شىنجاڭ «نېفىت گىزىتى» باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى

شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى تارقاتتى

850×1168 م، 32 فورمات، 6.75 باسما تاۋاق

2003 - يىلى 12 - ئاي 1 - نەشرى، 1 - قېتىم بېسىلشى

تراژى: 1-4000

ISBN7-5372-3712-3

باھاسى: 12.00 يۈەن