

ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش



شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

مۇقۇمنى لايىھىلىگۈچى: ئاينىسا ئۇيۇل



نورۇز كىسەل داۋالاش




شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

ISBN 978-7-5372-3903-7

ISBN 978-7-5372-3903-7



9 787537 239035 >



ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كېسەل داۋالاشنىڭ يېڭى
تېخنىكىسى سىزنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك، ئەڭ ئاددىي،
ئەڭ كارغا يارايدىغان، ساقلىق ساقلاش ئۇسۇلىڭىزغا
ئايلانغۇسى!

شۈبھى، خاڭ شىۈڭ ۋىن

ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش

نەشرگە تەييارلىغۇچى: ئەزىز ئاتاۋۇللا سارتېكىن

تەرجىمە قىلغۇچى: ئوبۇلقاسىم نۇرى

ئابلەت رۇزىمۇھەممەت

سالامەت رۇزىمۇھەممەت

ئايگۈل روزى

شېنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

图书在版编目(CIP)数据

按摩疗法/杭雄文编: 乌布列卡斯木·阿布来提译.
乌鲁木齐:新疆人民卫生出版社,2005.4
ISBN 978-7-5372-3903-7

I. 按... II. ①杭... ②乌... ③阿... III. 按摩疗法(中医)-维吾尔语(中国少数民族语言)
IV. R244.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 037288 号


责任编辑: 迪力夏提·沙吾提
责任校对: 阿米娜·阿培志

按摩疗法 (维吾尔文)

乌布列卡斯木·努尔
阿布来提·肉孜穆罕默德 等译
沙拉买提·肉孜穆罕默德
阿依古丽·肉孜


* * *
新疆人民卫生出版社出版
(乌鲁木齐市龙泉街 66 号 邮政编码: 830001)
新疆新华印刷厂
新疆新华书店发行
850×1168 毫米 32 开本 11.75 印张
2005 年 4 月第 1 版 2011 年 5 月第 3 次印刷
印数: 10000—20000
* * *

ISBN 978-7-5372-3903-7 定价: 20.00 元




ئىچكى ئەزالاردا نورمالسىز ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى ئالدىن بايقىغاندىن كېيىن، دەرھال قوللىدىكى ھەرقايسى نۇقتا، يەنى ۋە رايونلار ئارقىلىق داۋالاش كېرەك.

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى



1. بۆرەك ئۈستى بېرى 2. بۆرەك 3. سۈندۈرلەك نە يېغىسى 4. دۈۋىساق 5. پىشانە، ماڭداي 6. مېڭە ئاستى ۋە مېڭە غولى 7. كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى
8. ئۇچ ئاچچاق نېرۋ 9. بۇرۇن 10. باش قىسمى 11. بويۇن 12. بويۇن ئۈمۈرتقىسى 13. قالغان بەز يان بېرى 14. قالغان بەز 15. كۆز 16. قۇلاق
17. قىيپاش چاسا موسكۇل 18. ئۆپكە ۋە كانايچە 19. بۆرەك 20. تال 21. ئاشقازان 22. ئاشقازان ئاستى بېرى 23. 12 بارماق ئۈچەي
24. كىچىك ئۈچەي 25. تۇغرا بوغىماق ئۈچەي 26. تۆۋەنلىگۈچى بوغىماق ئۈچەي 27. (S) شەكىللىك بوغىماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي
28. مەدەت 29. جىگەر 30. ئۈت 31. سۆتۈر ئۈچەي 32. قارىغۇ ئۈچەي 33. يانپاش قارىغۇ ئۈچەي كىلابانى 33. يىقىرى كۆتۈرۈلگۈچى بوغىماق ئۈچەي
34. قۇرساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى 35. جىنسى بەزلەر



پۇتنىڭ ئىچكى يان تەرىپى

پۇت دۈمبىسى

پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپى

36. كۆكرەك ئومۇرتقىسى 37. بەل ئومۇرتقىسى 38. توققۇز كۆز سۆڭىكى 39. قۇيرۇق سۆڭىكى
40. مەزى بەزى ياكى بالاياتقۇ 41. سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول 42. يانچاش بوغۇم
43. تۈز ئۇچاي ۋە مەقەت 44. يېرىق، چات ئېرىقچىسى 45. ئولتۇرغۇچى سۆڭەك نېرۋىسى
46. قۇيرۇق سۆڭىكى تاشقى يان تەرىپى 47. قۇرساقنىڭ تۆۋەن قىسمى 48. تىز 49. جەينەك
50. يەلكە (مۇرە) 51. تاغاق سۆڭىكى 52. ئېغىز بوشلۇقىنىڭ يۇقىرىقى قىسمى (ئۇستۇنكى ئېگەك)
53. ئېغىز بوشلۇقىنىڭ تۆۋەنكى قىسمى (تۆۋەنكى ئېگەك) 54. بادام بەزى 55. كېكرەك، كاناي ۋە قىزىل ئۇڭلۇج
56. كۆكرەك قىسمى لىمفا بەزىلىرى 57. ئىچكى قۇلاق ئېرىقچىسى يولى 58. كۆكرەك
59. دېئافراگما، (قۇرساق ياكى كۆكرەك بوشلۇقىنى ئايرىپ تۇرىدىغان ئات) 60. قوۋرۇغا سۆڭىكى
61. بەدەننىڭ يۇقىرىقى قىسمى لىمفا بەزىلىرى 62. بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى لىمفا بەزىلىرى

كىرىش سۆز

قول - پۈت قىسمىنى ئۇۋۇلاش — ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك-
نىڭ قىممەتلىك مىراسى. تېبابەتچىلىكىگە ئائىت قەدىمىي كىتاب-
لاردا: ئادەمنىڭ قول - پۈتى خۇددى دەرەخنىڭ يىلتىزىغا ئوخ-
شايدۇ، يىلتىز زەئىپلەشكەندە دەرەخ قۇرۇشقا باشلايدۇ، ئادەم
قېرىسا، قول - پۈتى ئاۋۋال ئاجىزلاشقان بولىدۇ، دەپ خاتىرى-
لەنگەن. شۇڭا قول - پۈتنى چېنىقتۇرۇش ۋە ئاسراشقا بەكمۇ
دېققەت قىلىش كېرەك. زامانىۋى ئىلىم - پەن تېخنىكىسى
ئارقىلىق ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىكنى تەتقىق قىلغاندا، قول - پۈتنى
ئادەم تېنىنىڭ ھەر قايسى رېفلىكس رايونلىرى (پەللىلەر) نىڭ
بارلىقى، ئوخشاشمىغان ماھارەت ئارقىلىق بۇ رېفلىكس رايونلى-
رىنى ئۇۋۇلىغاندا قان ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىچكى
ئاجراتما سىستېمىسىنى كۈچەيتىپ، ئادەم تېنىنىڭ ھەرقايسى
قىسىملىرىنىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەپ، كېسەللىكلەردىن مۇداپىئە
كۆرۈش ۋە ئۇنى داۋالاش، ئۆز - ئۆزىنىڭ ساقلىقىنى ساقلاش
ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقى ئىسپاتلانغان. بۇ ئۇسۇل ئاد-
دىي، ئۆگىنىۋېلىش ئوڭاي، يامان تەسىرى يوق ئۇسۇل بولۇپ،
ئامما ئارىسىدا كېڭەيتىشكە بەكمۇ باب كېلىدۇ. بولۇپمۇ ئوتتۇرا
ياش، ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا بىر خىل ئەڭ ياخشى
ساقلىقنى ساقلاش چارىسىدۇر. كۆپچىلىككە مەلۇمكى، تۇغۇ-
لۇش، كېسەل بولۇش، ئاخىرىدا ئۆلۈش - تەبىئىي قانۇنىيەت.
ھەرقانداق بىر جانلىق ياكى تۇغۇلۇش، ئۆسۈپ يېتىلىش، قې-

رىش، ئۆلۈشتىن ئىبارەت بۇ جەرياننى بېشىدىن كەچۈرىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدىكى يەككە تۈرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ھاياتلىق ھا- مان چەكلىك بولىدۇ، ئۇ قېرىش ۋە ئۆلۈشتىن ئىبارەت ئاقىۋەت- تىن قۇتۇلالمايدۇ. بىراق، پۈتكۈل تۈرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، قېرىغان تۈرنىڭ ئۆلۈشى، يېڭى تۈرنىڭ پەيدا بولۇشى تەدرىجىي تەرەققىياتنىڭ ئېھتىياجى ھەم قانۇنىيىتى. پەقەت ئۆزلۈكسىز ھالدا يېڭى - كونا ئالماشتۇرۇپ بىر ئەۋلادتىن ئىلغارلاشقاندىلا، ئاندىن بۇ تۈر مۇھىتقا تېخىمۇ ياخشى ماسلىشالايدۇ، مەۋجۇت بولالايدۇ ۋە تەرەققىي قىلالايدۇ. شۇڭلاشقا، يەككە تۈرنىڭ چەك- لىك ھاياتى ئەمەلىيەتتە پۈتكۈل تۈرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە داۋاملىشىشىنىڭ ئېھتىياجى.

ئەمما، ساغلام بەدەن بولمىسا، بۇ ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇ- رۇش تەس. شۇڭلاشقا، ساغلاملىقنى ساقلاش ئىنتايىن مۇھىم. پەقەت ساغلام بولغاندىلا ئاندىن ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگىلى، ئارزۇ - ئارمانلارغا يېتىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ۋاقىتقا ئېرىشكىلى بولىدۇ.

نېمىشقا ئادەم قېرىسا كېسەل بولىدۇ؟

چۈنكى، ئادەم قېرىغاندا، بەدەننىڭ ھەر قايسى قىسىملىرى- نىڭ ئىقتىدارى ئاستا - ئاستا چېكىنىدۇ. مىسال ئۈچۈن، ئادەم بەدىنىنى بىر ماشىنا دېسەك، ماشىنىنى ئۇزاق مۇددەت ئىشلەتسە ئۇپرايدۇ، ئۇنىڭ زاپچاسلىرىنى ئالماشتۇرۇش زۆرۈر بولىدۇ. ئۇنداق قىلمىسا ئۇ نورمال ئايلىنالمىدۇ، بىراق ئادەم بەدىنىدىكى «زاپچاسلار» نى خالىغانچە ئالماشتۇرغىلى بولمايدۇ. قېرىش تۈ- پەيلىدىن مەلۇم بىر ئىچكى ئەزانىڭ ئىقتىدارى تۆۋەنلىسە ياكى نورمال پائالىيەت قىلالمىسا، باشقا ئەزالارغا ھەتتا پۈتۈن بەدەن- نىڭ ماسلىشىپ پائالىيەت قىلىشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ئالدى بىلەن تەسىرى ئەڭ چوڭ بولىدىغىنى، نېرۋا سىستېمىسى. ئادەمنىڭ قېرىشىغا ئەگىشىپ، نېرۋا ھۈجەيرىلىرىنىڭ سانى ئازىيىدۇ، نېرۋىنىڭ ئۇچۇر يەتكۈزۈش سۈرئىتى ئاستىلايدۇ، نېرۋىنىڭ رېغلىپكىس پائالىيىتى ئاجىزلىشىدۇ، ئۆگىنىش، ئەستە قالدۇرۇش، تەپەككۇر قىلىش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ. نېرۋا سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارى پۈتۈن بەدەن فۇنكسىيىسىنى تەڭشەپ تۇرغاچقا، ئادەم بەدىنىنىڭ ئىچكى قىسمىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ۋە ئادەم بەدىنىنىڭ مۇھىت بىلەن ماسلىشىشىنى ساقلايدۇ. مېڭە بىلەن پۈتكۈل نېرۋا سىستېمىسىنىڭ قېرىپ چېكىنىشى جەزمەن پۈتۈن بەدەننىڭ ھەر خىل فىزىئولوگىيىلىك پائالىيەتلىرىنى تەڭشەشكە تەسىر قىلىدۇ. نورمال ئەھۋالدا ئادەم بەدىنى ئاپتوماتىك ھالدا ھەر خىل فىزىئولوگىيىلىك پائالىيەتلەرنى تەڭشەپ، ئىچكى مۇھىتنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلايدۇ. قېرىش سەۋەبىدىن، بۇ تەڭشەش سىستېمىلىرىنىڭ مۇھىم ھالقىسىدا نۇقسان كۆرۈلسە، مەلۇم فىزىئولوگىيىلىك پائالىيەتلەر تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىدۇ (ماسلىشالمايدۇ، قالايىمقانلىشىدۇ). بۇنىڭ بىلەن تەندە ئىقتىدار جەھەتتە توسالغۇ پەيدا بولىدۇ ھەمدە تەدرىجىي ئورگانلىق كېسەللىك ئۆزگىرىشىگە تەرەققىي قىلىدۇ.

ئادەم بەدىنىنىڭ قېرىشىغا ئەگىشىپ، ئىممۇنتېت ئىقتىدارىمۇ تەدرىجىي تۆۋەنلەيدۇ. شۇڭلاشقا، ياشانغانلار ئاسانلا باكتېرىيە ۋە ۋىرۇسلۇق يۇقۇملىنىشقا ئۇچرايدۇ ھەمدە ئاسان يامان سۈپەتلىك ئۆسمىسىگە گىرىپتار بولىدۇ. ياشانغانلارنىڭ يۈرەك ئىقتىدارىمۇ تەدرىجىي چېكىنىپ، چىقارغان قاننىڭ مىقدارى ئازىيىدۇ (ھەرقايسى ئەزا ۋە توقۇلمىلارغا يەتكۈزۈپ بېرىدىغان قۇۋۋەت ۋە ئوكسىگېن ئازىيىدۇ)، قان تومۇر دىۋارىنىڭ ئېلاستىكىلىقى ئاجىزلايدۇ، توسقۇنلۇق كۈچىيىدۇ (قان بېسىمى ئۆر-

لەيدۇ). ئۇنىڭدىن باشقا نەپەس، ھەزم قىلىش، ئىچكى ئاجراتما، ھەرىكەت سىستېمىلىرىغا تەۋە بىر قىسىم ئەزالار ۋە بەش ئەزا ئىقتىدارى (بولۇپمۇ كۆرۈش، ئاڭلاش ئىقتىدارى) تەدرىجىي چېكىنىدۇ. ئىچكى ئاجراتما بەزلەرنىڭ ئىقتىدارى قالايمىقانلىق شىپ، ئاجرالامىلار (ھورمۇنلار) ئازىيىپ كېتىدۇ. ئەڭ گەۋدەلىك ئىپادىلىنىدىغىنى جىنسىي ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى ئاجىز-لارپ، جىنسىي ھورمۇنلار ئازىيىپ كېتىدۇ.

قىسقىسى، ياشانغانلارنىڭ پۈتۈن بەدىنىدىكى ھەر قايسى سىستېمىلارنىڭ فۇنكسىيەسى مەيلى بالدۇر ياكى كېيىن بولسۇن، مەيلى تېز ياكى ئاستا بولسۇن ھەممىسىدە ئاجىزلىشىپ، چېكىنىش ئىپادىسى كۆرۈلىدۇ. ئۆز - ئۆزىنى تەڭشەش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ، ئىچكى مۇھىتنىڭ مۇقىملىقى ۋە تاشقى مۇھىت بىلەن ماسلىشىشنى ئاسان ساقلىيالمايدۇ. مېڭە ئىقتىدارى چېكىنىدۇ. جىسمانىي كۈچى تۆۋەنلەيدۇ. بولۇپمۇ كېسەل پەيدا قىلغۇچى ئامىللارغا بولغان قارشىلىق كۈچى ۋە ئۆز - ئۆزىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئىقتىدارىنىڭ ھەممىسى تۆۋەنلەيدۇ، مانا بۇلار ياشانغانلارنىڭ ئوڭاي كېسەلگە گىرىپتار بولۇشىنىڭ ئاساسلىق سەۋەبلىرى.

قول - پۇت قىسمى رېفلېكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى نېمە ئۈچۈن شۇنچىلىك قۇدرەتلىك؟ نېمىشقا سەھىيە مىنىستىرلىقىنىڭ ھۆججىتىدە: «پۇت قىسمى رېفلېكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بولۇپمۇ ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلارنىڭ ئۆز - ئۆزىنى ساغلاملاشتۇرۇشىدا تېخىمۇ رېئال رولى بار» دەپ كۆرسىتىلىدۇ؟

چۈنكى، بىزنىڭ قول - پۇتىمىزدا پۈتۈن بەدىنىمىزنىڭ ئۇچۇرلىرى ساقلانغان بولىدۇ. قول - پۇتنى داۋاملىق ئۇۋۇلاپ

بەرگەندە، ئىقتىدارىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلۈشكە باشلىغان ئىچى-
كى ئەزالارنى بالدۇرراق سېزىپ، ئۇۋۇلاش ئارقىلىق ئاپەتنى ئۆز
ۋاقتىدا چىقىرىپ تاشلاپ، شۇ ئىچكى ئەزانىڭ ئىقتىدارىنى ئەسلىدە
گە كەلتۈرگىلى بولىدۇ. بۇ خۇددى بىر ماشىنا ئۆز ۋاقتىدا
ئاسراغان ۋە رېمونت قىلىنغانغا ئوخشاش بولۇپ، «ماشىنا» نىڭ
ئۆمرىنى ئۇزارتىقلى، كونىرىشىنى كېچىكتۈرگىلى، كىچىك
نۇقساننىڭ بىلىپ - بىلمەي تەرەققىي قىلىپ چوڭ كېسەل بولۇپ
قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالغانغا ئوخشاش.

قول - پۇت قىسمى ئۇۋۇلاپ غىدىقلانسا، ئادەم بەدىنىنىڭ
ئىچكى قىسمى ئۆز - ئۆزىنى تەڭشەپ، بەدەن ئىچكى مۇھىتىنىڭ
مۇقىملىقى ۋە تەڭپۇڭلۇقى ئەسلىگە كېلىپ، ئادەم بەدىنىنىڭ
يوشۇرۇن ئۆز - ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىش ئىقتىدارىنى قوزغىدە-
تىپ، بەدەننىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى كۈچەيتىش
ئارقىلىق كېسەللىك ئۈستىدىن غەلبە قىلغىلى بولىدۇ. ئۇ ھەم
ساقلىقنى ساقلاش ھەم كېسەلنى داۋالاش تەدبىرىدۇر. بۇ ئۇسۇل
بىرلا ۋاقىتتا كۆپ خىل كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانلارغا
تېخىمۇ باب كېلىدۇ.

قول - پۇتنى ئۇۋۇلاش بىر خىل بىخەتەر، ئىشەنچلىك،
يارىلاندىرمايدىغان فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى بولۇپ، ئۇ بەدەن-
گە نىسبەتەن بىر خىل ياخشى سۈپەتلىك غىدىقلاش، ھېچقانداق
زەھەرلىك ۋە ناچار تەسىرى يوق. كىشىلەر قول - پۇت رېفلىكس
رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ كېسەلدىن مۇداپىئە كۆرۈپ، ساغلاملىقىنى
ساقلىسا، دورىنى ئاز ئىچسە ياكى ئىچمىسە بولىدۇ. بۇ ئارقىلىق
دورغا ھەددىدىن ئارتۇق يۆلۈنىۋېلىشتىن، ئۇزۇن مۇددەت كۆپ
مىقداردا دورا ئىچىشنىڭ ياشانغانلارغا كەلتۈرىدىغان زەھەرلىك
تەسىرىدىن ساقلانغىلى ۋە ئۇنى ئازايتقىلى بولىدۇ.

ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن، دىققىتىڭىزگە سۇنۇلۇۋاتقان «قول - پۇتنى ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش» ناملىق بۇ خەنزۇچە «قولنى ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش» (بۇ كىتابنى مۇتەخەسسس شۇسې ياپونىيىلىك داڭلىك دوختۇر تاكىنوئۇچى ماسائو قاتارلىقلار تەمىنلىگەن ماتېرىياللارغا ئاساسەن كلىنىكىلىق تەجرىبىلەر - گە بىرلەشتۈرۈپ يېزىپ چىققان) ۋە «پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىش قوللانمىسى» (بۇ كىتابنى جۇڭگو پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى خاڭ شيوڭ - ۋېن يازغان) دېگەن ئىككى كىتابنى بىرلەشتۈرۈش ئاساسىدا تەرجىمە قىلىپ تۈزۈلگەن. ھازىرغىچە نەشر قىلىنغان تۈرلۈك لۇغەتلەردە قول - پۇتلاردىكى پەللىلەرنىڭ نامى بىرلىككە كەلتۈرۈلمىگەن بولغاچقا، ئىلاجىسىز پەللىلەرنىڭ نامىنى خەنزۇچە ئاھاڭ تەرجىمىسى بويىچە ئېلىشقا مەجبۇر بولدۇق. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئەپۋى قىلىشىنى سورايمىز.

— ئېزىز ئاتاۋۇلا سارتېكىن

2005 - يىل 4 - ئاينىڭ 5 - كۈنى

مۇندەرىجە

بىرىنچى بۆلۈم

قولنى ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش

- 1 بىرىنچى باب قولغا قاراپ تۇرلۇك كېسەللىكلەرنى بىلىش ...
- 1 قول ئالىقىنى ئىچكى ئەزالارنى كۆزىتىدىغان كۆزنەك ...
- ئالىقاندىكى داغلار قان ئايلىنىشنىڭ قۇتقۇزۇش چاقىرىقى.
- 4 مەدۇر
- باش بارماق دۆڭچىسىنىڭ ئورۇقلىشى نەپەس ئەزالىرى
- ياكى ئاشقازان ئۈچەيدە نورمالسىزلىق كۆرۈلگەنلىكىنىڭ
- 5 ئالامىتى
- چىمچىلاق دۆڭچىسىنىڭ ئورۇقلىغانلىقى - زېھنى قۇۋۋىتىد.
- 7 نىڭ ئاجىزلىغانلىقىنىڭ بېشارىتىدۇر
- جىيەنلى سەنجىن رايونى ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى
- 9 ئەكس ئەتتۈرىدۇ
- ئالىقان قادىقى ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنىڭ ياخشى
- 11 ئەمەسلىكىنىڭ سىگنالى
- ئالىقان تەرلىسە ئاسانلا ئاشقازان يارىسىغا گىرىپتار
- 12 بولىدۇ
- باش بارماق تېرىسى نەپەسلىنىشنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىد.
- 13 غانلىقىنى ئالدىن سېزىدۇ
- كۆرسەتكۈچ بارماق ئاشقازان — ئۈچەي ئىقتىدارى بىلەن
- 14 باغلىنىشلىق

- 16 نامسىز بارماق جىگەر، ئۆت ئىقتىدارىنى بەلگىلەيدۇ ...
- چىمچىلاق دوۋساق ۋە يۈرەكنىڭ ئىقتىدارىنى ئىپادىلەيدۇ ...
- 18 چىمچىلاق سۆسۈن رەڭلىك كۆرۈنسە ئىنچىكە ئۈچەيدە مە-
- سىلە كۆرۈلگەن بولىدۇ ...
- 20 ئوتتۇرا بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماق ئارىسىدىكى تېرە - ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنىڭ ئاجىزلىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ ...
- 22 ئوتتۇرا بارماق بىلەن نامسىز بارماق ئارىسىدىكى تېرىدىن جىگەردىكى نورمالسىزلىققا ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ ...
- 23 ئىككىنچى باب تىرناق تىنىمۇ كېسەللىك ئەھۋالىنى بىلگىلى بولىدۇ ...
- 26 ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈش ...
- 26 باش بارماق تىرنىقى ھالەتنىڭ (ئاچ قىزىل) كۆرۈنسە مەسىلە كۆرۈلگەن بولىدۇ ...
- 27 كۆرسەتكۈچ بارماق تىرنىقى ئاچ قىزىل رەڭلىك بولۇپ قالسا نورمالسىزلىق كۆرۈلىدۇ ...
- 29 ئوتتۇرا بارماق تىرنىقىنىڭ رەڭگىدىن ئىچكى ئەزالار ئەھۋالىنى كۆرگىلى بولىدۇ ...
- 31 نامسىز بارماقنىڭ تىرنىقى فىزىئولوگىيەلىك ئىقتىدارنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئىپادىلەيدۇ ...
- 32 چىمچىلاق تىرنىقى ئارقىلىق يۈرەكتىكى نورمالسىزلىققا دىققەت قىلىش ...
- 34 تىرناق گۆشكە پىتىپ كېتىش - جىگەرنىڭ قۇتقۇزۇش سىگنالىدۇر ...
- 36 تىرناققا توغرا سىزىق پەيدا بولسا ئاشقازان ئۈچەيدە كېسەللىك بولغان بولىدۇ ...
- 37 تىرناققا تىك سىزىق پەيدا بولۇش، مېتابولىزم ياخشى بولماسلىقىدىكى ئاگاھلاندۇرۇش ...
- 39

- تىرناقتا داغ پەيدا بولۇش مېڭە قىسمىدىكى قان ئايلىنىشنىڭ
 ياخشى ئەمەسلىكىنىڭ ئىپادىسى 40
- ئۈچىنچى باب قولغا قاراپ كېسەل تەكشۈرۈش 42
- چوڭلار زۇكام بولغاندا باش بارماق دۆڭچىسى سۆسۈن كۆ-
 رۇنىدۇ 42
- بوۋاقلار زۇكام بولسا كۆرسەتكۈچ بارمىقىنىڭ ئىچكى تەرى-
 پى سىگىنال بېرىدۇ 44
- ئىچى قېتىپ قالسا كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ تۈۋى بەكرەك
 ئاغرىيدۇ 46
- سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغى بولغانلاردا ئوتتۇرا، كۆر-
 سەتكۈچ بارماق تۇتاشقان جاي قېتىشىدۇ 47
- ئۆپكە كېسەللىكلىرى بىلەن ئۈزۈلگەن ھاياتلىق
 سىزىقچىسى 49
- ئاشقازان - ئۈچەي كېسەللىكلىرى بىلەن تۇتۇقلاشقان
 ئەقىل - پاراسەت سىزىقچىسى 52
- ئىچكى ئەزالاردا نورمالسىزلىق كۆرۈلسە مۇھەببەت سىزىق-
 چىسىغا دىققەت قىلىش 53
- قول دۈمبىسىگە ئۇرۇپ ئاشقازان يارىسىغا دىئاگنوز قويغى-
 لى بولىدۇ 55
- قول ئالىقىنىنى بېسىش ئارقىلىق يۈرەك كېسىلىگە ھۆكۈم
 قىلىش 56
- قول دۈمبىسىنى بېسىش ئارقىلىق ئىككى پۇت ۋە بەل
 نېرۋىسى ئاغرىقىنى بىلگىلى بولىدۇ 57
- گال ياللۇغلىنىپ قالسا قول دۈمبىسىدىن ئوتتۇرا بارماق
 تۈۋىنى كۆزىتىش 58
- ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىدا ئوتتۇرا بارماق تۈۋى سۆسۈن رەڭ
 بىلەن سىگنال بېرىدۇ 60
- ئاللىقاندەك ياكى شى پەللىسى ئارقىلىق يۇقىرى قان بېسىمى-
 نى ئۆزى پەرەز قىلىش 61

ئاشقازان يالغۇغىدا كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمىنىڭ بىر نۇق.
 63 تىسى ئاغرىيدۇ
 جىگەر ۋە ئۆتكە تاش چۈشسە نامسىز بارماقنى ئۇۋۇلاش
 65
 ئۆت كېسەللىكلىرىنى نامسىز بارماق ئارقىلىق تەكشۈرۈش
 66
 جىنسىي ئەزالاردا نورمالسىزلىق كۆرۈلسە چىمچىلاقنىڭ
 68 ئىنكاسى سەزگۈرلىشىدۇ
 تۆتىنچى باب ئالغاننى غىدىقلاپ كېسەل داۋالاش 70
 كۈچ جاپىدا ئىشلىتىلسە ئاندىن ھەقىقىي ئۈنۈمنى كۆرگىلى
 بولىدۇ 70
 ئاشقازان ئاجىزلاشسا جىيەنلى سەنجىن رايونىنى ئۇۋۇلاش
 72
 يۈرەك سېلىپ دەم سىقىلسا يۈرەك قېپى رايونىنى يېنىك
 بېسىش 74
 ئىشتىھاسى ياخشى بولمىسا ئالغاننى يېنىك ئۇۋۇلاش 76
 مۈرە تېلىپ ئاغرىسا خې گۈ پەللىسىنى ئۇۋۇلاش ... 78
 نەپەس سىقىلىش ئاشقازان - ئۈچەي ئىقتىدارى بىلەن مۇنا.
 سىۋەتلىك 79
 ئىچى سۈرۈشكە سۈرگۈ نۇقتىسى ئالاھىدە شىپالىق ... 81
 ئۇخلىيالمىدىغانلار ئالغان رايونىنى نۇقتىلىق ئۇۋۇلاش
 لازىم 83
 ئوغرى تەر بارلار جۇڭ جۇ پەللىسىنى ئۇۋۇلسا ئۈنۈمى
 ياخشى بولىدۇ 85
 باش ئاغرىسا يۈرەك پەللىسى بىلەن دالىڭ پەللىسىنى ئۇۋۇ-
 لاش 87
 بىئارام بولغاندا جۇڭ چوڭ ، شۇۋچوڭ پەللىلىرىنى ئۇۋۇ-
 لاش لازىم 89
 قان بېسىمى تۆۋەن بولسا قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش مۇھىم

- 91
 92 توڭلىسا ياك چى پەللىسىنى ئۇۋۇلاش لازىم
 قول ، پۇت توڭلاشنىڭ كۈشەندىسى ياك چى پەللىسى
 94
 96 دانخورەكنى يوقىتىش چارىسى
 كۆز چارچاشنىڭ سەۋەبى روھىي جەھەتتىن چارچاشتۇر
 98
 چىش ئاغرىسا بۆرەك پەللىسىنى غىدىقلاشنىڭ ئۈنۈمى
 100 ياخشى
 بويۇنغا يەل تۇرۇپ قالسا گۈرۈچ بىلەن غىدىقلاش ئۇسۇلى
 101
 كۆڭۈل ئاينىسا شېن مېن ، گۈەن چۇڭ پەللىلىرى ۋە ئالدى-
 103 قان مەركىزىنى ئۇۋۇلاش لازىم
 چاچ ئاقارسا ئالدى بىلەن بۆرەكنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش
 105 لازىم
 كۆز تورلاشسا ياك لاۋ پەللىسىنى ئۇۋۇلاش لازىم ...
 107 ھەيز كېسىلگەن دەۋردە ئېرىنىڭ غەمخورلۇقى بولمىسا بول-
 109 مايدۇ
 قورساق كۆپسە ھەزىم قىلىشتا مەسىلە كۆرۈلگەن بولىدۇ
 110
 يەلتاشىدا قان سىزغىپ چىقسا كېرەك يوق
 112 بۇۋاسىرنى داۋالاشتا خۇي يىن نۇقتىسىنى ئۇۋۇلاش لازىم
 114
 بوغۇم سىرقىراپ ئاغرىسا غىدىقلاشتىن سىرت يەنە كۈچلۈك
 115 ئىرادە بولۇشى كېرەك
 يەلكە بوغۇم ياللۇغىنى داۋالاشتا ئۈنۈملۈك سەككىز پەللىنى
 117 غىدىقلاش
 بەل ئاغرىسا ئالامىتىگە ئاساسەن ئىككى نۇقتىنى ئۇۋۇلاش
 121 لازىم

- سېمىزلىر ئورۇقلايمەن دېسە ئاغرىقتىن قورقماسلىق كې-
 123 رەك
 يىرىك يىغىلىپ قېلىش كېسىلىنى داۋالاشتا يەنىلا كۈچلۈك
 125 غىدىقلاش لازىم
 سوزۇلما بۇرۇن ياللۇغىنى جۇڭىيچە داۋالاپ ساقايتىش نىس-
 127 بىتى يۇقىرى
 ئاشقازان ئاغرىسا ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى غىدىقلاش
 129 لازىم
 ئاشقازان يارىسىنى داۋالاشتا يەنىلا ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتى-
 130 سىنى ئۇۋۇلاش لازىم
 باش قېيىش قۇلاق بىلەن مۇناسىۋەتلىك 132
 قۇلاق غوغۇلىدىسا ئىشنى بۆرەك پەللىسىدىن باشلاش لازىم
 133
 دېمى سىقىلسا يۆتەل - زىققە نۇقتىسىنى داغلاپ داۋالاش
 135
 مۇسكۇل ۋە تېرە قېرىسا بۆرەك پەللىسىنى داغلاش لازىم
 136
 چاچقا زەخمە يەتسە بۆرەك پەللىسى بىلەن ياك چى پەللىسىنى
 138 ئۇۋۇلاش لازىم
 ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى داۋالاشتا لاۋ گۇڭ پەللىسى-
 139 نى يېنىك ئۇۋۇلاش لازىم
 قان ئازلىقنى داۋالاشتا ھەزىم قىلىش بىلەن قوبۇل قىلىش
 140 ئىقتىدارىنى ياخشىلاش لازىم
 كېكىرىك كۆپ بولسا شاڭ ياك پەللىسى بىلەن چوڭ ئۈچەي
 142 پەللىسىنى بەكرەك ئۇۋۇلاش لازىم
 كۆزگە نەرسە كىرىپ كەتسە داگۇ كۇڭ پەللىسىنى كۈچلۈك
 143 غىدىقلاش لازىم
 بەشىنچى باب پەللىلەرنى غىدىقلاپ كېسەل داۋالاش 146
 ئالىقانى ئۇۋۇلاپ ئاجرىتىپ چىقىرىشنى ئىلگىرى

- 146 سۈرۈش
- 148 خې گۇ ھەممىگە قادىر پەللە
- باش ئاغرىسا خې گۇ پەللىسى بىلەن چۈچى پەللىسىنى قو-
- 151 شۈپ ئۇۋۇلاش لازىم
- يۇقىرى قان بېسىمىنى چۈشۈرۈشتە قولىنى ئۇۋۇلاش ئەڭ
- 152 ئۈنۈملۈك
- قان بېسىمىنى تۇراقلاشتۇرۇشتا بارماق ئۈچىنى دائىم ئۇ-
- 155 ۋۇلاش لازىم
- دىئابېت كېسىلىنى داۋالاشتا كورال يىڭىسىنى سىناپ
- 157 كۆرسە بولىدۇ
- ئاشقازان ئۈچەي كېسەللىكلىرىگە ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتى-
- 160 سىنىڭ ئۈنۈمى ياخشى
- گال ئاغرىسا كۆڭ زۈي پەللىسىنى ئايلاندۇرۇپ ئۇۋۇلاش
- 163 لازىم
- دولا تېلىپ ئاغرىسا ئوتتۇرا بارماقنىڭ ئىككى تەرىپىنى
- 165 بېسىش لازىم
- يۈرەك كېسىلىنى داۋالاشتا چې مېن پەللىسىنىڭ ئاجايىپ
- 166 ئۈنۈمى بار

ئىككىنچى بۆلۈم

پۇتنى ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش

- 171 بىرىنچى ئومۇمىي بايان
1. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش
- 171 دېگەن نېمە؟
2. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇ-
- 173 رۇشنىڭ ئۈنۈمى

3. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى ھالىتى..... 175
- ئىككىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ۋە ئۇۋۇلاش ماھارىتى..... 179
1. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ئورنى ۋە ئورۇنلىدىشىش قانۇنىيىتى..... 179
2. ئۇۋۇلاش تەرتىپى..... 183
3. پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش ماھارىتى..... 185
- ئۈچىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى (1)..... 188
- I گۇرۇپپا پۇت مەركىزى..... 188
1. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونى..... 189
2. قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېگىشى رېفلىكس رايونى..... 192
3. بۆرەك رېفلىكس رايونى..... 193
4. سۈيدۈك نەيچىسى رېفلىكس رايونى..... 195
5. دۈۋساق رېفلىكس رايونى..... 196
- II گۇرۇپپا پۇت بارماقلىرى..... 198
1. پېشانە كاۋىكى رېفلىكس رايونى..... 199
2. مېڭە ئاستى بېزى (ھىپوفىز) رېفلىكس رايونى... 200
3. كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلىكس رايونى... 202
4. ئۈچلۈك نېرۋا رېفلىكس رايونى..... 203
5. بۇرۇن رېفلىكس رايونى..... 205
6. باش (چوڭ مېڭە) رېفلىكس رايونى..... 206
7. بويۇن رېفلىكس رايونى..... 208
8. كۆز رېفلىكس رايونى..... 209
9. قۇلاق رېفلىكس رايونى..... 210
- تۆتىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى (2)..... 212
- III گۇرۇپپا سول پۇت تاپىنىڭ ئالدىنقى يېرىمى... 212
1. قالقان يان بەزى رېفلىكس رايونى..... 212

- 214 2. قالقانبەز رېفلىكس رايونى
- 215 3. قىياش چاسا مۇسكۇل رېفلىكس رايونى
- 216 4. ئۆپكە ۋە كانايچە رېفلىكس رايونى
- 218 5. يۈرەك رېفلىكس رايونى
- 220 IV گۈرۈپپا سول پۇت تاپان ئوتتۇرسى
- 220 1. ئاشقازان رېفلىكس رايونى
- 221 2. ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونى
- 223 3. 12 بارماق ئۈچەي رېفلىكس رايونى
- 224 4. كۆندىلەك بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونى
- 225 5. تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونى
- 226 6. «S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونى
- 227 7. ئىنچىك ئۈچەي رېفلىكس رايونى
- 228 8. مەقئەت رېفلىكس رايونى
- 230 9. تال رېفلىكس رايونى
- 231 بەشەنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى (3)
- 233 V گۈرۈپپا پۇتنىڭ ئىچكى يان تەرىپى
- 233 1. بويۇن ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونى
- 235 2. كۆكرەك ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونى
- 236 3. بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونى
- 237 4. توققۇز كۆز سۆڭىكى رېفلىكس رايونى
- 238 5. قۇيرۇق سۆڭىكى ۋە كاسا رېفلىكس رايونى
- 239 6. مەزى بېزى ۋە بالىياتقۇ رېفلىكس رايونى
- 240 7. سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول رېفلىكس رايونى
- 240 8. يانپاش بوغۇم (ئىچكى يان تەرىپى) رېفلىكس رايونى
- 241 9. تۈز ئۈچەي ۋە مەقئەت رېفلىكس رايونى
- 242 10. چات (چات ئېرىقچىسى) رېفلىكس رايونى
- 243 VI گۈرۈپپا پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپى
- 245 VI

1. جنسي بەز رېفلىكس رايونى 245
2. يانپاش بوغۇم (تاشقى يان تەرىپى) رېفلىكس رايونى 247
3. قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمى رېفلىكس رايونى ... 248
4. تىز رېفلىكس رايونى 248
5. جەينەك رېفلىكس رايونى 249
6. يەلكە رېفلىكس رايونى 250
7. تاغاق سۆڭىكى رېفلىكس رايونى 251
- ئالتىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى (4) 253
- VII گۈرۈپپا پۇت دۈمبىسى 253
1. يۇقىرىقى ئېڭەك رېفلىكس رايونى 253
2. تۆۋەنكى ئېڭەك رېفلىكس رايونى 254
3. بادام بەز رېفلىكس رايونى 255
4. كېكىردەك، كاناي ۋە قىزىئۆڭگەچ رېفلىكس رايونى 257
5. كۆكرەك قىسمى لىمفا بەزلىرى رېفلىكس رايونى 257
6. ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى رېفلىكس رايونى ... 258
7. كۆكرەك رېفلىكس رايونى 260
8. دىئافراگما (كۆندىلەك پاسىل) رېفلىكس رايونى ... 260
9. قوۋۇرغا رېفلىكس رايونى 262
10. بەدەننىڭ يۇقىرىقى قىسمى لىمفا بەزلىرى رېفلىكس رايونى 263
11. بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى لىمفا بەزلىرى رېفلىكس رايونى 264
- VIII گۈرۈپپا ئوڭ پۈتتىڭ ئاستى تەرىپى 266
1. جىگەر رېفلىكس رايونى 266
2. ئۆت رېفلىكس رايونى 267
3. قارىغۇ ئۈچەي ۋە سازاڭسىمان ئۆسۈك رېفلىكس رايونى

269

4. يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي كىلاپانى رېفلىكس رايونى

270

5. يۇقىرى كۆتۈرۈلگۈچى بوماق ئۈچەي رېفلىكس رايونى

271

يەتتىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلام-
لاشتۇرۇش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كېسەل تەكشۈرۈش ۋە

273 ساقلىقنى ساقلاش

1. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇ-
رۇش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كېسەل تەكشۈرۈش ۋە دىئاگنوز
273 قويۇش

2. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇ-
رۇش ئۇسۇلى بىلەن ئۆز ئۆزىنى ساغلاملاشتۇرۇش 278
سەككىزىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلام-

لاشتۇرۇش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كېسەل داۋالاش ... 282
توققۇزىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلام-
لاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان

كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش (1) ... 288
ياشانغانلار يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى 288
1. تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى - قان يېتىش-

مەسلىكتىن بولغان يۈرەك كېسىلى (يۈرەك مۇسۇلىغا قان يې-
تىشمەسلىك) 289



2. يۇقىرى قان بېسىم 297
ئونىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلام-
لاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان

كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش (2) ... 302
ئون بىرىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق
ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدى-

نى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش (3) 312
ئون ئىككىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق

- ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللەكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش (4) 324
1. قەۋزىيەت 324
 2. ئىچى سۈرۈش 329
 3. سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى 332
- ئون ئۈچىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللەكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش (5) ... 334
1. ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى يىغىندى ئالامىتى 334
 2. مەزى بېزى يوغىناش (ئۆسۈش) 338
- ئون تۆتىنچى پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللەكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش (6) ... 343
1. ئۇيقۇسىزلىق 343
 2. پاركىنسون كېسىلى 347

قولنى ئوۋۇلاپ كېسەل داۋالاش



بىرىنچى بۆلۈم بىرىنچى باب قولغا قاراپ تۇرلۇك كېسەللەكلەرنى بىلىش

قول ئالىقنى ئىچكى ئەزالارنى كۆزىتىدىغان كۆز نەك

«ئىچكى ئەزالار تەكشۈرۈلمىسە قول ئالىقنى دەرھال خەتەرلىك سىگ-
نال بېرىدۇ!»

ھەر قېتىم ماڭا كېسەل كۆرسەتكىلى كەلگەنلەرگە بۇ گەپنى دېگە-
نىمىدە، ئۇلار ھەمىشە دەرگۇمان بولۇپ: «راستمۇ؟» دەپ سورايدۇ.
مېنىڭ بىر كېسىلىمدىمۇ مۇشۇنداق گۇمان بولغان. ئۇ دەل ئوتتۇرا
ياش بولۇپ، سۆڭەك - مۇسكۇللىرى مەزمۇت، كەيپىياتى كۆتۈرەڭگۈ،
كۈچ - قۇۋۋىتى ئۇرغۇپ تۇراتتى. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئۇ ئەزەلدىن دوخ-
تۇرخاندا بىر كۈنمۇ يېتىپ باقمىغان بولۇپ، ئىدارە بىر تۇتاش ئورۇنلاش-
تۇرۇغانلىقتىن ئاندىن مەن تۇرىۋاتقان دوختۇرخانىغا رەسمىيەت ئۈچۈنلا
بەدەن تەكشۈرتۈشكە كەلگەن ئىكەن. مەن ئۇنىڭغا قولنى ئاچقۇزۇپ قا-
راپ، ناھايىتى تېزلا ئۇنىڭ چىمچىلىقى بىلەن باشقا تۆت بارمىقىنى
سېلىشتۇرغاندا، سەل - پەل ئىششىق بارلىقىنى بايقىدىم. مەن ئۇنىڭ
چىمچىلىقىنى يېنىككەنە بېسىۋىدىم، ئۇ ئاغرىققا چىدىماي دەرھال قو-
لىنى تارتىۋالدى.

مەن دىئاگنوز قويۇپ: «سىزنىڭ بېلىڭىز ئاغرىيدىكەن، سەۋەبى
بۆرىكىڭىز ئانچە ياخشى ئەمەسكەن» دېدىم. ئۇ بېلىنىڭ ئازراق

ئاغرىيدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلدى، ئەمما بۆرىكىدە مەسىلە بارلىقىنى ئېتىراپ قىلمىدى. بەدەن تەكشۈرتۈپ بولغاندىن كېيىن، ئۇ مېنى يەنە ئىزدەپ كەلدى، چۈنكى ئاپپارات بىلەن تەكشۈرگەندە ئۇنىڭ بۆرىكىدە تاش بارلىقى بايقىلىپتۇ.

ئۇ مېنى ئەۋلىيا دوختۇر ئىكەنسز دېدى. ئەمەلىيەتتە ئەۋلىيا ئەمەس، قەدىمكى دوختۇرلار كېسەل كۆرگەندە ھەمىشە ئاللىقان سىزىقلىرىغا قارىغان. يەنى قول ئاللىقىنىدىكى ئۆزگىرىش ئارقىلىق كېسەل بار ئورۇن ۋە كېسەللىك ئەھۋالىغا ھۆكۈم قىلغان. ئەمما ئۇلار كۆپىنچە بۇنى ئاش-كارىلىمىغان. ئۇنىڭ بىلەن كىشىلەر بۇنداق دوختۇرلارنى پال باقالايدىدەكەن دېيىشكەن. ئاللىقان سىزىقلىرىغا ئاساسەن ئادەمنىڭ ئۆمۈرلۈك تەقدىرى، ياخشىلىق ۋە يامانلىق، بالا - قازا ۋە بەخت سائەدەتنى مۆلچەرلەش ھەقىقەتەن يالغان - ياۋىدەك گەپ بولىدۇ، ئەمما مۇشۇنىڭ بىلەن كىشىلەرنىڭ تەن سالامەتلىك ئەھۋالىنى ھەقىقەتەن ئالدىن مۆلچەرلەش گىلى بولىدۇ. بىز رەمچىلەرنىڭ ئاللىقان سىزىقلىرىغا قاراپ پال سالىدىغانلىقىنى بىلىمىز، ئەمەسلىكەتتە ئۇلارنىڭ ھەقىقىي كۆرەلەيدىغانى پەقەت ئادەمنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى، ئەمما ئادەمنى ئىشەندۈرۈش ئۈچۈن تەبىئىي ھالدا قەستەن سىرلىق تۈس قوشىدۇ.



مېڭ مېڭ بۆرەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك،
ئەگەر بۇ يەر ئاغرىسا بۆرەكتە مەسىلە بار.
لىقىنى بىلدۈرىدۇ.

يەنە ھېلىقى ئوتتۇرا ياشلىق كىشىگە كېلەيلى، مەن ئۇنىڭ بۆرىكىنىڭ ئانچە ياخشى ئەمەسلىكىنى شۇنىڭدىن بىلىدىمكى، مەن ئۇنىڭ چىمچىلىقىدىكى مېڭ مېڭ پەللىسىنى باسقاندىم (رەسمىگە قارال). بۇ پەللى بۆرەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇ يەر ئاغرىسا بۆرەكتە مەسىلە بارلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.

يەنە بىر مىسال، ئادەم بەدىنىدىكى تۈرلۈك ئەھۋاللارنىڭ قول ئالدى-قىنىدا ئەكس ئېتىدىغانلىقىنى ئىسپاتلايدۇ. كۆپچىلىكتە مۇنداق بىر تەسىرات بار. كىنو ياكى تۈرلۈك تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرىنى كۆرۈپ بەك جىددىيلەشكەندە ياكى ھاياجانلانغاندا ئاللىقان تەرلەيدۇ. نېمە ئۈچۈن مۇ-شۇنداق بولىدۇ؟ ئادەم ھاياجانلانغاندا ياكى جىددىيلەشكەندە يۈرەكنىڭ سوقۇشى تېزلىشىپ، نېرۋىلار غىدىقلىنىدۇ، بۇ خىل جىددىيلىك ئىچكى ئەزالارنى غىدىقلاپ، زەنجىرسىمان ئىنكاس پەيدا قىلىدۇ. ئاللىقان تەرلەش بۇنىڭ سىرتقى ئىپادىسىدۇر. پاتومېتىر مۇشۇ پرىنسىپتىن پايدىلىنىپ ياسالغان.


ئادەم ئورگانىزمى بىر تۇتاش بولۇپ، ئۆزئارا زىچ باغلىنىشلىق، مۇ-شۇنىڭدىنمۇ ئىچكى ئەزالار بىلەن قولىنىڭ مۇناۋىسۋىتىنى توغرا چۈش-نىۋېلىشقا بولىدۇ. شۇنداق بولغانىكەن قول ئىچكى ئەزالارغا ئەلۋەتتە تە-سىر كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن: بىر ئادەم قورسىقى ئاغرىغانلىقى ياكى كۆك-رىكنىڭ بىئارام بولغانلىقىنى ھېس قىلغاندا، ئىختىيارسىز قولى بىلەن سىيلايدۇ. بۇ بىر ئاڭسىز ھەرىكەتمۇ؟ ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس. ئىچكى ئەزالاردا ماسلىشالماسلىق كۆرۈلگەندىن كېيىن، ئالدى بىلەن بۇ ئۇچۇر چوڭ مېڭىگە يەتكۈزۈلىدۇ، چوڭ مېڭە دەرھال بۇ ئۇچۇرنى پائالىيەتچان-لىققا ئىگە ھەم ئىنتايىن سەرگۈر بولغان قولغا ئۇقتۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن قول «بۇيرۇققا بىنائەن» ئاغرىغان جاينى سىيلايدۇ.

شۈبھىسىزكى، قول ئاللىقىنى ئىچكى ئەزالاردىكى تۈرلۈك مۇناسى-ۋەتلىك ئۆزگىرىشلەرنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ. ھالبۇكى قول ئاللىقىدىكى تۈرلۈك ئۆزگىرىشلەرنى كۆزىتىش ئارقىلىق ئادەم بەدىنى ئىچكى قىسمى-نىڭ ئەھۋالى ۋە ئۇنىڭ پائالىيىتىنى بىلگىلى بولىدۇ.

سىز بۇ خىل كۆز قاراشنى قوبۇل قىلىشقا بولامدۇ؟ - يوق، دەپ قارامسىز؟ سىز بۇنىڭدىن گۇمانلانسىڭىزمۇ، كىتابنىڭ داۋامىنى ئەستايى-دىللىق بىلەن ئوقۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن. چۈنكى مەن تۆۋەندە سۆزلىمەكچى بولغان بەزى كونكرېت مىساللار بەلكىم سىزدە يۈز بېرىشى (كۆرۈلۈشى) مۇمكىن.

ئالغاندىكى داغلار قان ئايلىنىشنىڭ قۇتقۇزۇش چاقىرىقىدۇر

بىر قېتىم مەن تەكلىپكە بىنائەن گىمناستىكا تەنھەرىكەتچىلىرىدە نىڭ سالامەتلىك تەكشۈرۈشىگە چىقىپ ئۇلارنىڭ قول ئاللىقىنى كۆردۈم. ھەربىرىنىڭ قول ئاللىقىنىڭ رەڭگى، ئېلاستىكىلىقىنىڭ ناھايىتى ياخشى ئىكەنلىكىنى بايقىدىم.



ئويلسام بۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس. كەن. چۈنكى بۇ ئۇلارنىڭ مۇسابىقە تۈرلىرىنىڭ ھەممىسىنى قول بىلەن ئىشلىگەنلىكتىن بولغان.

قول ھەرىكىتى بىلەن پۈتۈن بەدەن ھەرىكىتى ئىككى ئىش، ئەمما نەتىجىسى ئوخشاش، يەنى ئادەمگە ساغلام تەن ئاتا قىلىدۇ.

ئالغاندا داغ پەيدا بولسا قان ئايلىنىشنىڭ ناچارلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.

ئۇنداقتا پەقەت ھەرىكەت قىلدۇرمايدىغان ياكى تولۇق ھەرىكەت قىلدۇرمايدىغان

مايدىغانلارنىڭ قول ئاللىقىنى قانداق بولىدۇ؟ تەجرىبەمگە ئاساسلانغاندا بۇ خىل كىشىلەرنىڭ ئاللىقى مەيلى قىزارغان قىسمى بولسۇن، ياكى تالارغان قىسمى بولسۇن، ئادەتتە داغ بىلەن قاپلانغان بولىدۇ. قول ئاللىقىدىن كۆرۈشكە بولىدۇكى، بۇنداق كىشىلەرنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنىڭ قان ئايلىنىشى ياخشى ئەمەس، يېتەرلىك قان ئايلىنىش كەمچىل، بەزى كىشىلەرنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنىڭ قان ئايلىنىشى توسالغۇغا ئۇچراش گىرىزدا بولغاچقا بېرىپ قالغان، يەنە داۋالىمىسا، ئىچكى ئەزالىرىنىڭ فۇنكسىيىسى زىيانغا ئۇچرىسا ئۇچقۇن يانغىنىغا ئايلىنىپ، بىر پارتىلىسا يىغىشتۇردۇ. ۋاللىلى بولمايدۇ (5 - بەتتىكى رەسىمگە قاراڭ).

قول ئاللىقىدا داغ پەيدا بولغانلىقىنى بايقىغاندا قانداق قىلىش

كېرەك؟ بۇنىڭ جاۋابى ناھايىتى ئاددى بولۇپ، پەقەت ئالىقان كۆپرەك ھەرىكەت قىلسىلا بولىدۇ. گىمناستىكا تەنھەرىكەتچىلىرىدەك كۈنبويى قول بىلەن ھەرىكەت قىلىمىسمۇ، بىكار ۋاقىتلاردا يەر بېغىرلاش ھەردە كىتى ئىشلەش، ئەڭ ئەمەلىي غىدىقلاش ئۇسۇلىدۇر. يەر بېغىرلاش ھەردە

كىتى ئىشلىگەندە، پۈتۈن قول ئالقىنىغا ئېتىبار بېرىش كېرەك. بۇنىڭ بىر تەرەپتىن ھەرىكەت تولۇق بولماسلىق ئەھۋالىنى ياخىلاشتۇرۇشقا ياردىمى بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. بۇ بىر چالامىدا ئىككى پاخىتەك سوققانغا باراۋەر.

ئالغانى غىدىقلاش ھەرىكىتى ئىشلىسە ئىچكى ئەزالارنىڭ قان ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرغىلى بولىدۇ.

قول ئالقىنىڭىزنى كۆزىتىشكە دىققەت قىلىڭ. مۇبادا داغ ئىزىنى بايقىسىڭىز ئىككىلەنمەستىن دەرھال يەر بېغىرلاش ھەرىكىتى ئىشلەڭ.



باش بارماق دۆڭچىسىنىڭ ئورۇقلىشى نەپەس ئەزالىرى ياكى ئاشقازان ئۈچەيدە نورمالسىزلىق كۆرۈلگەنلىكىنىڭ ئالامىتى

مېنىڭ تەكلىپىم بىلەن بىر نەپەر كېسەل ئۆزىنىڭ ئالقىنىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى كۆزىتىشكە بەك دىققەت قىلىدىغان بولدى. ئەلۋەتتە، ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى دەسلەپتە مېنىڭ دوختۇرلۇق ماھارىتىمگە قايىل بولغانلىقىدىن بولغان، كېيىنكى كۈنلەردە ئۆزىگە زور پايدا ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئويلىمىغان ئىدى.

بىر قېتىم ئۇ مېنى ئىزدەپ كېلىپ، ئۆزىنىڭ باش بارماق دۆڭچىسىنىڭ ئورۇقلىغانلىقىنى، ئىلگىرىكىدەك تومپىيىپ تۇرمايدىغانلىقىنى، رەڭگىنىڭمۇ خىرەلىشىپ كەتكەنلىكىنى بايقىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ سۆزلىگەچ ئالقىنىنى چىقىرىپ ماڭا كۆرسەتتى.

مەن قاراپلا ئۇنىڭدىن: «يېقىندىن بۇيان ئىشتىھايڭىز ئانچە ياخشى ئەمەسكەن - ھە!» دەپ سورىدىم. ئۇ بىر ئاز ھەيران بولغان ھالدا: «شۇنداق! سىز قانداق بىلىدىڭىز؟» دەپ سورىدى.

ئەمەلىيەتتە، جۇڭگو تېبابىتىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا بۇ بىر ساۋات خاراكتېرلىك مەسىلە. ئادەمنىڭ باش بارماق دۆڭچىسى نەپەسلىنىش ئە-



شاۋشاڭ پەللىسىنى غىدىقلىسا، نەپەسلىنىش، ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ئەزالارنىڭ قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.

زالىرى ۋە ئاشقازان، چوڭ ئۈچەي، ئاشقا-زان ئاستى بېزى قاتارلىق ئەزالار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. شۇڭا، باش بارماق مۇسكۇلى تەرەققىي قىلغان ئادەمنىڭ قان ئايلىنىشى جەزمەن ياخشى بولىدۇ. بەلكى ئۆپكەننىڭ نەپەس ئېلىش-سىغىمچانلىقى ناھايىتى چوڭ، ئاشقازان-ئۈچەي تېخىمۇ ساغلام بولىدۇ. ئەكسىچە باش بارماق دۆڭچىسى قورۇلۇپ، سۆسۈن رەڭگە ئوخشاش قان يىغىلىپ قېلىشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلسە، چوقۇم نەپەسلىنىش ياكى ئاشقازان، ئۈچەيدە مەسىلە بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ھازىرچە غەيرىي ئەھۋال كۆرۈلمىسىمۇ، ئەمما نەپەسلىنىش، ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى تەدرىجىي ناچارلىشىدۇ. ئەگەر قول ئالدىقىندىكى ئۆزگىرىشلەر بىلەن كارى بولماي، ئاشقازان يارىسى قاتارلىق كېسەللىكلەر قوزغىلىپ قالسا، ئۇ چاغدا


پۇشايمان بىلەن كېچىككەن بولىدۇ.

قانداق قىلغاندا خەتەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ؟ باش بارماق دۆڭچىسىنى نورمال ھالەتكە قايتۇرۇشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى باش

بارماق تىرىقنىڭ بىر تەرىپىدىكى شاۋشاڭ (商 少) پەللىسىنى غىدىقلاشتۇر. جۇڭگو تىبابىتى ئاتالغۇسى بويىچە ئېيتقاندا، ئادەم بەدىنىدە ئۆپكە جىڭلوسى (肺经) بار بولۇپ، بۇ جىڭلونىڭ باشلىنىش نۇقتىسى شاۋشاڭ (商 少) پەللىسىدۇر. بۇ خىل پەللە «قۇدۇق پەللىسى» دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ مەنىسى «ئېنېرگىيە مەنبە قۇدۇقى» دېگەنلىكتۇر. ئادەم بەدىنىدىكى ئېنېرگىيە مەنبەسىنىڭ باش مەنبىسى دەپ چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ. بۇنىڭدىن ئۇنىڭ مۇھىملىقىنى ئويلاپ يەتكىلى بولىدۇ. بۇ يەرنى باسقاندا ئاجىزلاشقان نەپەسلىنىش ئەزالىرىنى بىۋاسىتە غىدىقلاپ، ساءلاملاشتۇرغىلى ياكى ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ئەزالارنىڭ قان ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرغىلى بولىدۇ. باش بارماق دۆڭچىڭىزنىڭ قايتىسىدىن تومپىيىپ چىققانلىقىنى، رەڭگىڭىزگىمۇ بالدۇرقىدەك قىزارغانلىقىنى بايقىسىڭىز، بەدىنىڭىزدىكى كېسەللىك ياكى يوشۇرۇن كېسەللىك خەۋىرلىرىنىڭ يوقالغانلىقىنى ئىسپاتلايدۇ.

چىمچىلاق دۆڭچىسىنىڭ ئورۇقلىغانلىقى زېھنى قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىغانلىقىنىڭ بېشارىتىدۇر.


نۇرغۇن كىشىلەردە ماھىيەتلىك كېسەل بولمىسىمۇ، لېكىن روھىز،



كۈن بويى ئۇيقۇسىرىغاندەك ھېس قىلىدۇ. بۇ خىل كىشىلەرنىڭ چىمچىلاق دۆڭچىسى ئورۇقراق بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە دائىم قان يىغىلىپ قالغاندەك سۆسۈن رەڭ پەيدا بولىدۇ. ئەكسىچە، چىمچىلاق دۆڭچىسى تومپىيىپ چىققان، رەڭگى قىپقىزىل بولغانلارنىڭ زېھنى قۇۋۋىتى ئادەتتە ناھايىتى ئۇرغۇپ تۇرغان بولىدۇ.

بۇنىڭ داۋىلىسى نېمە؟ سۆزلەپ كەلسەك بەك ئاددىي، چىمچىلاق

دۆڭچىسى يۈرەك، ئىنچىكە ئۈچەي، بولۇپمۇ ئاياللارنىڭ بالىياتقۇ، ئەرلەر-
نىڭ ئۇرۇقىدىن، ئەر - ئاياللارنىڭ بۆرىكى، دوۋىسى بىلەن مۇناسىۋەت-
لىك. جىنسىي ئەزا سىستېمىسىغا تەۋە



ئەزالارنىڭ ھەممىسى جىنسىي ھورمون
ئاجرىتىپ چىقىرىش بىلەن. مۇنا-
سىۋەتلىك. شۇڭا، بۇ ئەزالار ساغلام بولسا
جىنسىي ھورمون كۆپ ئاجرىتىپ چى-
قىرىلىدۇ. ئادەمنىڭ كۈچ - قۇۋۋىتىمۇ
ئۇرغۇپ تۇرىدۇ. ئەكسىچە بولغاندا ئۇ-
داق بولمايدۇ. كۈچ - قۇۋۋىتى ئۇرغۇپ
تۇرمىسا كېسەل بار دېگىلىمۇ بولمايدۇ.

ئەمما بالدۇرراق ئۆيلىمىسا، كېيىن تۈرلۈك كېسەل بىرلا ۋاقىتتا پەيدا
بولۇشى مۇمكىن.

چىمچىلاق دۆڭچىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىچكى ئەزالار-
نىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى - نامىز بارماق
تىرنىقى ئاستىدىكى گۈەن چۈك (关冲) پەللىسى ھەم چىمچىلاق تىر-



قول ئېلىش چىمچىلاق دۆڭچىسىنى
چىنقتۇرۇشنىڭ ياخشى پۇرسىتى.

نقى تۆۋىنىدىكى شاۋچۈك
(关冲)، شاۋزې (少泽)
قاتارلىق پەللىلەرنى بى-
سىشتىن ئىبارەت. بۇ پەل-
لىلەرنى توختىماستىن
يېنىك باسقاندا، ئىچكى
ئەزالارنىڭ قان ئايلىنىشى
تەبىئىي ھالدا ئىلگىرى
سۈرۈلىدۇ. مەسىلەن: ئەگەر
ئۆزىڭىزنىڭ جىنسىي

ئىقتىدارىڭىزنى كۈچەيتىمەكچى بولسىڭىز، چىمچىلاق دۆڭچىسىنى بى-

ۋاستە غىدىقلاش ناھايىتى ئۈنۈملۈك چارىدۇر. كۈندىلىك تۇرمۇشتا چىمچىلاق دۆڭچىسىنى چېنىقتۇرۇشنىڭ پۇرسىتى ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن: قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش، چىمچىلاق دۆڭچىسىنى چىڭ سىقىپ كۆرۈشىشىڭىزلا، مۇناسىۋەتلىك پەللىلەر شۇن ئاغىدىقلىنىدۇ. مۇشۇنداق داۋاملىشىۋېرىدىغان بولسا، ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارى كۈچىيىدۇ. كۈچ - قۇۋۋەتمۇ تولۇپ تاشىدۇ.

جىيەنلى سەنجىن رايونى ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ




بىر قېتىم بىر قەدىناس دوستۇم ئۆيۈمگە مېھمان بولۇپ كەلدى، ئۇزاق مۇددەت ئايرىلىپ قايتا كۆرۈشكەنلىككىمىز ئۈچۈن تەبىئىي ھالدا ئۆتمۈشىنى ئەسلەپ قالدۇق. ئەينى ۋاقىتتا ئۇ ھاراق ئىچىشتە نام چىقارغان ئىدى، ئەمما ھازىر ئالدىدىكى رومكەننى قولغا ئېلىپمۇ قويىمىدى. مەن ئۇنى ھاراق ئىچىشكە قايتا - قايتا

زورلىغان بولساممۇ، ئەمما ئۇ باشتىن ئاخىرى ھاراقنى ئېغىزىغا ئالمىدى. مەن ئازراق ھەيران بولغان ھالدا: «نېمە بولدى، مېجەزىڭ يوقمۇ؟» دەپ سورىدىم. دوستۇم: «ياق، ئۇنداق ئەمەس، ھاراق ئىچسەملا بىئاراملىق ھېس قىلىدىغان بولۇپ قالىدىم.» دەپ جاۋاب بەردى. بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مەن ئىختىيارسىز ئەنسىرەپ قالىدىم ۋە دەرھال ئۇنىڭ قولىنى تارتىپ ئالغىنىغا قارىدىم. مەن قاراپلا ئۇنىڭ ئالغىنىدىكى جىيەنلى سەنجىن را-يونىدا روشەن نورمالسىزلىق پەيدا بولغانلىقىنى بايقىدىم. ساغلام كىشىلەرنىڭ جىيەنلى سەنجىن رايونى ئېلاستىكىلىققا ئىگە. قول بىلەن بېسىپ قويىۋەتسە دەرھال ئەسلى ھالىتىگە قايتىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ جىيەنلى

سەنجىن رايونىنى باسقاندا مۇسكۇللىرى ئۇيۇلۇپ (ئويمان بولۇپ)، خېلى ۋاقىت ئۆتكەن بولسىمۇ يەنىلا ئەسلىگە قايتىدى. رەڭگىگە كەلسەك، نورمال ئادەملەرنىڭ بۇ يېرىنىڭ رەڭگى سۈزۈك قىزىل بولاتتى. ئەمما ئۇنىڭكىدە قان يىغىلىپ قالغاندەك سۆسۈن رەڭ كۆرۈنىدى. بۇنىڭدىن مەن ئۇنىڭ ئىچكى ئەزالىرىدا ماسلىشالماسلىق كۆرۈلگەنلىكىگە ھۆكۈم قىلدىم.

جىيەنلى سەنجىن رايونى ئالىقانىنىڭ سەل ئاستى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، ئىچكى ئەزالارنىڭ ساغلاملىق دەرىجىسىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ. بولۇپمۇ يۈرەك، جىگەر، ئۆپكە، ئاشقازان ئاستى بېزى، بۆرەك، ئاشقازان، ئىنچىكە ئۈچەي قاتار.



جىيەنلى سەنجىن رايونىنى ئۇۋۇلسىما،
زەئىپلەشكەن ئىچكى ئەزالارنى جانلاندۇر-
غىلى بولىدۇ.

لىق ئەزالاردا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە دەرھال مۇشۇ رايوندا ئىپادىلىنىدۇ. ئەڭ قورقۇنچىلىق بولغىنى بۇ ئەزالاردا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە شۇ ئادەم قىلچە سەز-مەسلىكى مۇمكىن. ئەگەر ئىچكى ئەزالار تارقاتقان قۇتقۇزۇش سىگ-نالغا دىققەت قىلمىغاندا، ئاقىۋەت-تىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ. مەن ئۆزۈمنىڭ ئەمەلىي ئويلىغانلىرىمنى دوستۇمغا دېدىم. ئۇ مەندىن قانداق قىلسا ياخشى

بولدىغىنلىقىنى سورىدى.

مەن نەق مەيداندا ئۇنىڭغا بىر يۈرۈش ئاددىي ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى ئۆگەتتىم. يەنى ئالىقانىدىكى جىيەنلى سەنجىن رايونىنى ھەر كۈنى ئۇۋۇلاپ بېرىش، ئۇۋۇلاش سالىمىنى چوڭراق بولۇش، قېتىم سانى قانچە كۆپ بولسا، ۋاقىت قانچە ئۇزۇن بولسا شۇنچە ياخشى، تاكى ئىككى قولىدىكى جىيەنلى سەنجىن رايونىنىڭ رەڭگى ۋە ئېلاستىكىلىقى ئۆز ئەسلىگە كەلگەنگە قەدەر داۋاملاشتۇرۇش كېرەك.

ئۇ ئۆيىگە قايتقاندىن كېيىن مەن ئۆگەتكەن ئۇسۇل بويىچە ئىشلەپ، ئۇزۇن ئۆتمەي زور ئۈنۈم قازىنىپتۇ.

ئالماقان قادىقى ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنىڭ سىگنالى

ئاسادىيىي بىر پۇرسەتتە مەن بىر كالتەك توپ تەنھەرىكەتچىسى بىلەن ئۇچرىشىپ قالدىم. ئۇ قولنى چىقىرىپ مېنى قاراپ بېقىپ دېدى. ئۇ توپ ئاتقۇچى بولۇپ، ھەر كۈنى بىرەر يۈز قېتىم توپ ئېتىش مەشىقى قىلىشى تەبىئىي ئىش. شۇڭا، ئۇنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقى ۋە ئوتتۇرا



بارمىقىدا قاقداق ئۆسۈشنى پەرەز قىلغىلى بولىدۇ. ئەمما مېنى ئە- جەبلەندۈرگىنى ئۇنىڭ چىمچى- لىقىدىمۇ قاقداق ئۆسۈپتۇ. مەن باشقا ماھىرلاردىن سۈرۈشتۈرسەم ئۇلارنىڭ چىمچىلىقىدا قاقداق يوقكەن.



-يېقىندىن بېرى سىز كۆپ مەشىق قىلغانىدىڭىز؟ سىناپ بېقىش ئۈچۈن شۇنداق دەپ سورىدىم.

ئۇ: «بەلكىم شۇنداق تۇ! يې- قىندىن بېرى ھەر قېتىملىق مە- شىقتىن كېيىن قاتتىق چارچى- غاندەك تۇيغۇدا بولىمەن.» دەپ جاۋاب بەردى.

قولدىكى يۈرەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئورۇندا قاقداق پەيدا بولسا شاۋچۇك پەللىسىنى غىدىقلىسا بولىدۇ.

ھەرىكەت ياكى خىزمەتتىن كېيىن بەدەن بەك چارچىغاندەك ھېس قىلسا، بۇ كۆپىنچە يۈرەك

ئىقتىدارى ئاجىزلاشقانلىقىنىڭ بېشارىتى. بۇنىڭ چىمچىلاقتا قاداق پەيدا بولۇشى بىلەن قانداق مۇناسىۋىتى بار؟ ئەسلىدە جىڭلۇدا چىمچىلاق ئىدە چىدە ئايلىنىپ يۈرىدىغان يۈرەك جىڭلوسى بولغاچقا، يۈرەك ئىقتىدارى ئاجىزلاشقاندا چىمچىلاق تېرىسى قاتىدۇ. شۇڭا، بىر ئادەم قولىغا چىقە-ماسلىققا تېگىشلىك قانداقنى بايقىغاندا، بولۇپمۇ چىقماسلىققا تېگىشلىك جايغا چىققاندا، ئۆزىنىڭ سالامەتلىكىنى نەزەردە تۇتۇپ، يەنىلا دوختۇر-خانغا بېرىپ تەكشۈرتۈپ باققىنى ياخشى.


ئەگەر سىز قولىڭىزدا قاداق پەيدا بولغانلىقىنى بايقىسىڭىز، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنىڭ ناچارلىشىشى بىلەن مۇناسى-ۋەتلىك بولسا، ئۇنداقتا چىمچىلاقتىكى شاۋچۇڭ (痧) پەللىسىنى دائىم غىدىقلاش كېرەك.

ئالغان تەرلىسە ئاسانلا ئاشقازان يارىسىغا گىرىپتار بولىدۇ

مەن ھەدىسىلا ئالغىنى تەرلەيدىغان كىشىلەرنىڭ ناھايىتى ئاسانلا ئاشقازان يارىسىغا گىرىپتار بولىدىغانلىقىنى بايقىدىم. مېنىڭ قېشىمغا كېسەل كۆرسەتكىلى كەلگەنلەر ئىچىدە ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى بىر قەدەر كۆپ بولۇپ، ئۇلارنىڭ يې-



مەك - ئىچىمكى قانۇنىيەتسىز بول-مىسىمۇ، ئەمما يەنىلا ئاشقازان كې-سىلىگە گىرىپتار بولغان. يەنە چوڭ شىركەتلەردە ئىشلەيدىغان بەزى خىزمەتچىلەرنىڭمۇ ئاشقازان يارىسىغا گىرىپتار بولغانلىقى ئەقىل يەتمەيدى-خان ئىش. مېنىڭچە ئالدىنقىسىنىڭ كېسەللىك يىلتىزى ئۆرلەپ ئوقۇش



بېسىمىدىن بولغان بولسا، كېيىنكىدە -
لەرنىڭ كېسەللىك يىلتىزى، ئالدىراش
جىددىي خىزمەتتىن بولغان. ئېغىر
بېسىم ئۇلارنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنىڭ
ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسەتكەن. ھە
دېسلا ئالىقنى تەرلەش بۇنىڭ ئىندە -
كاسىدۇر.

كۆپ تەرلەش نۇقتىسىنى غىدىقلىغاندا ھەم
تەرلەشنى توختاتقىلى ھەم جىددىيلىكنى
يوقاتقىلى بولىدۇ.


بۇ كىشىلەرگە مېنىڭ مۇنداق
ئىككى تەكلىپىم بار. بىرىنچىسى، ئا -
لىقانىڭ قۇرغاقلىقىنى ساقلاشقا دىقە -
قەت قىلىش. ئىككىنچىسى، قولىدىكى

كۆپ تەرلەيدىغان نۇقتىلارنى دائىم غىدىقلاش، كۆپ تەرلەيدىغان نۇقتىدە -
نىڭ ئورنى ئالىقانىڭ دەل ئوتتۇرىسىدا، تەخمىنەن نامىز بارماق ئۇدۇ -
لىدىكى جاي كۆپ تەرلەيدىغان نۇقتىنىڭ ئورنىدۇر.

بۇ نۇقتىنى ئۇزۇلدۇرمەي، ئىنچىكىلىك بىلەن ئۇۋۇلىغاندا، تەر -
لەشنى ئازايتىپلا قالماستىن، يەنە جىددىي كەيپىياتنى يوقاتقىلى بولىدۇ.
دائىم قولىنى سۈرتۈش ئالىقانىڭ قۇرغاقلىقىنى ساقلاشقا پايدىلىق.
ئەگەر بۇ كار قىلىمىسا، ئۇنداقتا قۇرغاقلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە پاراشۇكلار -
نىڭ ياردىمىگە تايىنىشقا توغرا كېلىدۇ.

باش بارماق تېرىسى نەپەسلىنىشنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىغانلىقىنى ئالدىن سېزىدۇ

يېقىندا تولۇق 2 - يىللىقنىڭ بىر ئوقۇغۇچىسى كېسەل كۆرسەتە -
كىلى كەپتۇ. مەن ئۇنىڭ ئالىقنىنى تەپسىلىي كۆزىتىپ، ئۇنىڭ باش
بارمىقىنىڭ قېتىپ قالغانلىقىنى، رەڭگىنىڭ سۆسۈن رەڭگە مايىل بولۇپ
قالغانلىقىنى بايقىدىم. ئۇنىڭ باش بارمىقىدىكى شاۋشاڭ پەللىسىنى بې -
سىۋىدىم ئۇ ۋايىجانلاپ كەتتى. بۇنىڭدىن مەن ئۇنىڭ نەپەسلىنىش ئىقە -



شاۋشاڭ پەللىسى دائىم ئۇۋۇلاشنىڭ نە-
پەسلىنىش ئەزالىرىغا زور پايدىسى بار.

تىدارىنىڭ ناچارلاشقانلىقىغا ھۆ-
كۈم قىلدىم. ئۇ يېقىنقى بىر مەز-
گىلدىن بۇيان دائىم كۆكسىنىڭ
سىقىلىدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى
ئېيتتى.

ئاللىقاندىن قارىغاندا، نەپەس-
لىنىش ئىقتىدارى ئاجىزلاشقانلى-
قىنىڭ ئالامىتى باش بارماقنىڭ
تېرىسى قېتىپ قالغاندىن سىرت،

ئاللىقان يۇمشاپ، ئولتۇرۇشۇپ، قۇرغاق يېرىكلىشىپ كېتىشى ياكى سۆ-
سۈن رەڭلىك ھالەتكە كېلىپ قېلىشى مۇمكىن. بۇ كېسەللىك ئالامەت-
لىرى بىر ئادەمنىڭ نەپەسلىنىش ئىقتىدارىدا مەسىلە كۆرۈلۈشكە باشلى-
غانلىقىنى، ئېغىر توسالغۇ پەيدا بولۇشتىن بۇرۇن ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە
تېزراق ئۇۋۇلاش كېرەكلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.

قولنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، نەپەسلىنىش
ئىقتىدارىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى باش بارماق
تىرىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاۋشاڭ (商少) پەللىسىنى غىدىقلاش-
تىن ئىبارەت. بۇ پەللە ئۆپكە تومۇرىنىڭ باشلىنىدىغان جايى بولۇپ، بۇ
پەللىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە نەپەسلىنىش سىستېمىسى كېسەللىك-
نىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

كۆرسەتكۈچ بارماق ئاشقازان - ئۆچەي ئىقتىدارى بىلەن باغلىنىشلىق


بىر قېتىم بىر تونۇشۇم مېنى ئۆيىگە مېھمان بولۇشقا تەكلىپ
قىلدى. بەھۇزۇر پاراڭلىشىۋاتقان ئارىلىقتا ئۇنىڭ ئىستاكى كۆتۈرگەن
قىياپىتى مېنىڭ دىققىتىمنى تارتتى. ئادەتتىكى ئادەملەر قولغا ئىستاكى
ئالغاندا باش بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماقنى ئىشلىتىدۇ. ئەمما ئۇ

باش بارمىقى بىلەن ئوتتۇرا بارمىقىنى ئىشلەتتى. كۆرسەتكۈچ بارمىقى دىگىگىنىپ تۇراتتى.

مەن ھەيران بولۇپ ئۇنىڭدىن سەۋەبىنى سورىدىم. ئۇ: «ھېچ گەپ يوق، يېقىندىن بۇيان كۆرسەتكۈچ بارمىقىم ئازراق ئاغرىيدىغان بولۇپ قالدى، شۇڭا ئىستاكىنى مۇشۇنداق تۇتۇم» دېدى. مەن ئىشنىڭ بۇنداق



چىۋىلا ئاددىي ئەمەسلىكىنى ھېس قىلىدىم. شۇئان ئۇنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقىنى كۆرسەم، بارمىقىنىڭ مۇسكۇللىرى بوشىشىپ، ئولتۇرۇپ شۇپ كېتىپلا قالماي، بەلكى قان يىغىلىپ سۆسۈن. رەڭگە كىرىپ قالغانلىقىنى بايقىدىم. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭغا: «بۇ ئاشقازان، ئۈچەينىڭ ئاجىزلاشقانلىقىنىڭ بىر شارىتى، دىققەت قىلىڭ» دېدىم.



مېنىڭ تەجرىبەمگە ئاساسلانغاندا، بىر ئادەمنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقىدا ئاغرىش، قېتىش، يۇمشاپ ئولتۇرۇش، رەڭگى سۆسۈنگە مايىل بولۇش ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، ئۇنىڭ ئۈچەي قاتارلىق ھەزىم قىلىش ئەزا-لىرىنىڭ ئىقتىدارى ناچارلاشقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئۇ بەلكىم بىر مەزگىل ئىچىدە ئاشقازان، ئۈچەيلىرىدە ھېچقانداق بىئاراملىقنى سەزمەسلىكى مۇمكىن. ئەمما ئۇنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقىدىكى ئۆزگىرىش ھەزىم قىلىش ئەزالىرىدا مەسىلە

كىيىم قىسقۇچ بىلەن شاڭ ياك پەللىسىنى غىدىقلىسا ئۇنۇ مۇ ياخشى.

بارلىقىدىن دېرەك بېرىپ تۇرىدۇ. بۇنىڭدىكى سەۋەب، كۆرسەتكۈچ بارماق-
تىكى ئۈچەي جىڭلوسى بىلەن چوڭ ئۈچەي زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان-
لىقىدا. شۇڭا، ھەزىم قىلىش ئەزالىرىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە، كۆر-
سەتكۈچ بارماقتا ئالدىن ئىنكاس پەيدا بولىدۇ.

كۆرسەتكۈچ بارماقتا كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە، چوڭ ئۈ-
چەي قاتارلىق ھەزىم قىلىش ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدارىنى ئىلگىرى سۈرۈش-
نىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى شۇكى، كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىقىنىڭ تۆۋەن
تەرىپىدىكى شاڭ ياك (商阳) پەللىسىنى غىدىقلاش.



شاڭ ياك (商阳) پەللىسى چوڭ ئۈچەي جىڭلوسىنىڭ باشلىنىش
نۇقتىسى بولۇپ، چوڭ ئۈچەي ئىقتىدارىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە،
مۇشۇ يەرنى باسسا ئاغرىيدۇ. شۇڭا، ئاغرىمىغانغا قەدەر بېسىش كېرەك.
كۆرسەتكۈچ بارماقتىكى ئىششىق، ئاغرىق ياكى قان يىغىلىپ قېلىشتەك
ئالامەتلەر پۈتۈنلەي يوقالغاندىن كېيىن، چوڭ ئۈچەي ئىقتىدارى نورمال-
لاشقان بولىدۇ.

ئەگەر بارماق بىلەن بېسىشنى بەك ئاۋازچىلىق دەپ ھېس قىلسە-
ڭىز، كىيىم قىسقۇچتىن پايدىلانسىڭىزمۇ ئوخشاشلا ئۈنۈمگە ئېرىشەلەيسىز.

نامسىز بارماق جىگەر، ئۆت ئىقتىدارىنى بەلگىلەيدۇ

ئىككى ئاچا - سىڭىل بار بولۇپ، ئاچىسى پىئانىنو چالدىكەن.
سىڭىلىسى ئىسكىرىپكا چالدىكەن. ئۇلارنىڭ ئىككىلىسى ئورۇق بولسى-
مۇ، ئەمما ئىشتىھاسى ئوغۇل بالىنىڭكىدىنمۇ ياخشى ئىكەن. مەلۇم بىرسى
ئۇ ئىككىسىگە مېنى ئىزدەشنى تەۋسىيە قىپتۇ. مەن دەسلەپتە ھەيرانلىق
ھېس قىلدىم. چوڭقۇر سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ئوركىستىرىدا
ئىشتىھاسى ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدىغىنى ئۇلار ئىككىسىلا ئەمەسلىكىنى
بىلدىم. ئەسلىدە مۇنداقكەن - دە! ئۇلارنىڭ ئاللىقىنى ئىنچىكىلىك

بىلەن كۈزەتكەندىن كېيىن ئاندىن چۈشەندىم.
بۇ ئاچا - سىڭىل ئىككەيلەننىڭ ئالدىنقىدا بىر ئورتاق ئالاھىدىلىك




دائىم ساز چالدىغانلارنىڭ نامىسىز
بارمىقى ئادەتتىكى ئادەملەرنىڭكىدىن
تەرەققىي قىلغان بولىدۇ.

بار بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ ئۇلارنىڭ
نامىسىز بارمىقى ئالاھىدە تەرەققىي
قىلغان. ئادەتتىكى ئادەملەرنىڭ
بەش بارمىقى ئىچىدە نامىسىز بار -
مىقىنىڭ ئىنكاسى قاشاڭ، ئەمما
ئۇلار پىئانىنو، ئىسكىرىپكا چالدى -
دىغان بولغاچقا، مۇزىكا ئورۇندى -
غاندا بەش بارمىقىنىڭ ھەممىسى -
سىنى ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ.
ئۇلار نامىسىز بارمىقىنى چاققان،
ئەپلىك قىلىپ چېنىقتۇرغان.
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇلارنىڭ نامىسىز
بارمىقى دائىم ھەرىكەت قىلىپ
تۇرغاچقا، قان ئايلىنىش راۋانلىقى -
شىپ، مۇسكۇللىرى ئېلاستىك -
لىققا ئىگە بولغان. نامىسىز بارماق
جىگەر، ئۆت قاتارلىق ئەزالار بىلەن
جىگەر، ئۆت قاتارلىق ئەزالار بىلەن
لىق بار بولۇپ، جىگەر، ئۆتتىن

ئىبارەت بۇ ئىككى ئىچكى ئەزا ھەزم قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالدى -
غان. جىگەر، ئۆتنىڭ قان ئايلىنىشى راۋان بولسا، ئىقتىدارى تەبىئىي
ھالدا يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ. نېمە يېيىشتىن قەتئىينەزەر ئوڭۇشلۇق ھەزم
بولىدۇ. ئەكسىچە جىگەر، ئۆتنىڭ قان ئايلىنىشى ناچار بولسا ئىقتىدارى
ئاجىزلاشقا يۈزلىنىپ، يېگەن نەرسىلىرى تەستە ھەزم بولىدۇ. ئىشتىھا -

سىمۇ زور دەرىجىدە تۇتۇلۇپ قالدۇ.

جىگەر، ئۆتنىڭ قان ئايلىنىشى ناچار بولغانلارنىڭ نامىزى بارمىقى



مۇقەررەر ئىنچىكە ئورۇق بولىدۇ.

ھەرىكىتىمۇ قاشاڭ بولىدۇ. شۇڭا

ئەگەر نامىزى بارمىقىڭىزنىڭ

ھەرىكىتىنىڭ ئەپچىل ئەمەسلە-

كىنى ياكى ئىنچىكە، ئورۇق،

رەڭگىنىڭ نورمالسىزلىقىنى باي-

قىغاندا، جىگەر ياكى ئۆتنى مە-

سلە بار - يوقلۇقىنى ئويلاش

كېرەك.

گۈەن چۇڭ پەللىسىنى باسقاندا ئاغرىسا

جىگەر، ئۆت ئىقتىدارىنىڭ نورمالسىزلى-

قىنى بىلدۈرىدۇ.

ئەگەر جىگەر، ئۆتتە مە-

سلە بارلىقى بېكىتىلسە نامىزى

بارماق تىرىقچىنىڭ تۆۋەن تەرد-

پىدىكى گۈەن چۇڭ (关冲) پەللىسىنى بېسىش كېرەك. دەسلەپتە

باسقاندا ئاغرىيدۇ. بۇ داۋالاشنىڭ دەل جايىغا چۈشكەنلىكىنى چۈشەندۈ-

رىدۇ. شۇڭا ئاغرىمايدىغان بولغىچە ئۈزۈلدۈرمەي بېسىش كېرەك. ئاغرد-

مايدىغان بولغاندا جىگەر، ئۆت ئىقتىدارىڭىزنىڭ نورماللاشقانلىقىنى ئى-

پادىلەيدۇ.

چىمچىلاق دوۋساق ۋە يۈرەكنىڭ ئىقتىدارىنى ئىپادىلەيدۇ

بالىلار نېمىلەرنىدۇ كېلىشكەندە، قەتئىي يانماسلىقىنى بىلدۈرۈش


ئۈچۈن «چىمچىلاق بارمىقىنى گىرەلەشتۈرۈپ كېلىشىدۇ». شۇنىڭغا ئى-

شىنمەنكى، ھەممە ئادەمنىڭ مۇشۇنداق تارىخى بولغان بولۇشى مۇمكىن.

بىر قېتىم بىر دوستۇمنى يوقلاپ بارسام ئۇنىڭ ئالتە ياشلىق ئوغلى ماڭا


كونا ئىشنى ئەسلەتتى. خوشلىشىدىغان ۋاقىتتا ئۇ بالا يۈگۈرۈپ كېلىپ

بىزگە: «كېيىن چوقۇم كېلىڭلار!» دەپ تاپىلىدى. ئارقىدىنلا ھەربىر ئادەم بىلەن بارمىقىنى گىرەلەشتۈرۈپ كېلىشتى. دوستۇم چىمچىلىقنى چە-
قارغاندا، مەن ئۇنىڭ چىمچىلىقىدا روشەن سۆسۈن رەڭنى بايقىدىم. شۇ-
نىڭ بىلەن ئۇنىڭدىن: «يېقىندىن بۇيان بىئاراملىق ھېس قىلىدىغان



بولۇپ قالدىڭىزمۇ؟» دەپ سورىدىم.
دوستۇم ئويلىنىۋېلىپ: «بىئاراملىق
بار دېسەم، كىچىك تەرىتىم ئىلگى-
رىكىدىن قىيىنلاشقاندىكە» دەپ جا-
ۋاب بەردى.

مەن بۇنىڭ سىيىش توسقۇن-
لۇققا ئۇچرىغانلىقىنىڭ بېشارىتى
ئىكەنلىكىگە پۈتۈنلەي ھۆكۈم قىلا-
لايمەن. چۈنكى چىمچىلاق دوۋساق،
باليئاتقۇ، ئۇرۇقدان، بۆرەك قاتارلىق
ئەزالار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك
بولۇپ، بۇ ئەزالاردا نورمالسىزلىق
كۆرۈلگەندە، چىمچىلاقتا شۇنىڭغا
ماس ھالدا ئۆزگىرىش پەيدا بولىدۇ.
مەسىلەن: سۆسۈن رەڭگە ئۆزگىرىش،
قېتىش دېگەندەك. بۇلارنىڭ ھەم-
مىسى ئىچكى ئەزالار چىقارغان ئا-
گاھلاندىرۇش سىگنالى بولۇپ، دەر-
ھال داۋالىتىش كېرەك.



شاۋچۇك، شاۋزى پەللىلىرىنى ھەر كۈنى
غىدىقلىسا يۈرەك، سۈيدۈك ئاجرىتىپ
چىقىرىش ئەزالىرىنىڭ ئىقتىسادىنى
كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

قوللىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق دا-
ۋالاش نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا
دا، بۇ ۋاقىتتىكى ئەڭ ياخشى چارە

چىمچىلاق تىرىنىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاۋچۇك (中少) پەللىسى
بىلەن شاۋزى (泽少) پەللىسىنى بېسىشتۇر. شاۋچۇك، شاۋزى پەللىلىرى-
دا،

رى ئايرىم - ئايرىم ھالدا يۈرەك ۋە ئىنچىكە ئۈچەي جىگىلوسىنىڭ مەنبە - سى. بۇ يەرنى ئۈزلۈكسىز غىدىقلاش يۈرەك ۋە سۈيۈك ئاجرىتىش ئەزا - لىرىنىڭ قان ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق.

مېنىڭ تونۇشتۇرۇشۇمنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئۇ دوستۇم بۇ ئىككى پەللىنى ئۇۋۇلاشنى ھەركۈنى داۋاملاشتۇرغان. كېيىنكى قېتىم كۆرۈش - كەندە ئۇنىڭ چىمچىلىقىدىكى سۆسۈن رەڭ پۈتۈنلەي يوقىلىپتۇ. ئۇ خۇشاللىقىدىن ماڭا كىچىك تەرەت قىلىشتىكى ئاۋارىچىلىقنىڭ ھەل بولغانلىقىنى ئېيتتى.


چىمچىلاق سۆسۈن رەڭلىك كۆرۈنسە ئىنچىكە ئۈچەيدە مەسىلە كۆرۈلگەن بولىدۇ

بۇ بىر نەچچە يىلنىڭ ئالدىدىكى ئىش، بىر باسما زاۋۇت سېتىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ئۇزۇن يىل بېلى تېلىپ ئاغرىغاچقا مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ بەك ھاراق كۆتۈرىدىغانلىقىنى، دائىم رىقابەت - چى تاپالمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. قائىدە بويىچە ئېيتقاندا ھاراق كۆتۈرەلەيدىغان ئادەملەرنىڭ ئاش - قازان ئۈچىيى ئىنتايىن ياخشى بولۇشقا تېگىشلىك ئىدى. ئەمما ئۇ بۇنىڭ سىرتىدا بولۇپ، كۆپرەك



ھاراق ئىچكەن كۈننىڭ ئەتىسى ئىچى سۈرۈپ كېتىدىكەن. ئۇ ئۆز - ئۆزىگە چۈشەندۈرۈپ، بۇ ئىچ سۈرۈش ئارقىلىق بەدەندىكى قالدۇق ئىسپرىتنى ھەيدەپ چىقارغانلىق دېدى.

ئۇنىڭ بۇ خىل چۈشەندۈرۈشى دوختۇرنىڭ ئالدىدا ئاقمايدۇ. ئاسان ئىچى سۈرىدىغان ئادەملەرنىڭ ئاساسلىق ھەزم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىنچىكە ئۈچىيىنىڭ قان ئايلىنىشىنىڭ ناچارلاشقانلىقىدىن بولغان. بۇ



چىمچىلاقتىكى شاۋچۇك پەللىسىنى ئۇۋۇلسا،
ئىنچىكە ئۈچەي ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلىشى-
شىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ.

خىل ئىنچىكە ئۈچەي ئىقتىدارى
ناچارلاشقان ئەھۋالدا، چىمچىلاقتى-
كى ئىپادىسى ئىنتايىن روشەن بو-
لىدۇ. مەن ئۇنىڭغا چىمچىلىق-
گىزنى چىقىرىڭ دېدىم. قارىسام
بىرىنچى بوغۇمىدا قان يىغىلىپ
قالغاندەك تۇتۇق سۆسۈن رەڭلىك
كۆرۈندى. ئۇنىڭ چىمچىلاق تىر-
نىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاۋ-
چۇك (蚱蜢) پەللىسىنى باسقاندا

دەرۋەقە ئاغرىش تۇيغۇسى پەيدا بولدى.

بۇ دەل ئىنچىكە ئۈچەي ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلاشقانلىقىنىڭ بېشا-
رىتى. دىئاگنوز قويۇپ بولغاندىن كېيىن مەن ئۇنىڭغا: «مېنىڭ بىر ئاد-
دىي چارەم بار، ئەگەر مەن دېگەندەك قىلالىسىڭىزلا، ھاراق ئىچكەندىن
كېيىن ئىككىنچى كۈنى ئىچىڭىز سۈرمەسلىككە كاپالەتلىك قىلالايمەن»
دېدىم. مېنىڭ ئۇنىڭغا ئۆگەتكەن چارەم - چىمچىلاقنى تولۇق ئۇۋۇلاش،
تاكى سۆسۈن رەڭ يوقالغىچە، يەنە ئاغرىمايدىغان بولغۇچە شاۋچۇك (蚱蜢)
پەللىسىنى توختىماي تەكرار بېسىشتىن ئىبارەت. بۇ ۋاقىتتا ئىند-
چىكە ئۈچەينىڭ قان ئايلىنىشى ئەسلىگە كەلگەنلىكى، ھەزىم قىلىش
ئىقتىدارىنىڭ تەبىئىي نورماللاشقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.


بۇ بۆلۈم باشلىقى مېنىڭ گېپىمگە ئىشىنىپ، ئىككىنچى كۈندىن
باشلاپ شۇ بويىچە ئىش كۆرگەن. ھازىر ھاراق ئىچىپ غەرق مەست بول-
سىمۇ، ئىككىنچى كۈنى يەنىلا ناھايىتى بىئارام بولىدىكەن. ئەمما ھەرگىز
ئىچى سۈرمەيدىكەن.

ئوتتۇرا بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماق ئارىسىدىكى تېرە ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنىڭ ئاجىزلىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ

كېسەل كۆرۈش ئۆيىدە ئوتتۇرا ياشلىق بىر ئەر كىشى بىر ياش بىلەن ساغلاملىق ھەققىدە پاراڭلىشىۋاتقان ئىكەن.

ھېلىقى ئوتتۇرا ياشلىق كىشىنىڭ: «يېقىندىن بۇيان ھەمىشە بىر-شەم قاينىدىغان، پۈتۈن بەدىنىم ماغدۇرسىز، ئەستە تۇتۇش ۋە ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىم ئىلگىرىكىگە يەتمەيدىغان بولۇپ قالدى، تۈنۈگۈن بىر تونۇشۇم بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىۋىدىم، خېلى ئۇزاق ئويلايمۇ ئۇنىڭ ئىسمىنى ئېسىمگە ئالالەيدىم، قارىغاندا قېرىغان ئوخشايمەن! ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارىنى داۋالايدىغان شىپالىق دورىنىڭ بار - يوقلۇقىنى بىلىمىدىم». دېگەنلىكىنى ئاڭلاپ قالدۇم.

ئۇلارنىڭ پارىقىنى ئاڭلاپ قالغانلىقىم ئۈچۈن ئۇنىڭ كېسەللىكىنى كۆرۈش نۆۋىتى كەلگەندە، مەن ئالاھىدە ئۇنىڭ ئالدىنقى تەكشۈرۈم. ئوتتۇرا بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماق ئارىسىدىكى تېرىنى بېسىپ بېقىپ، بۇ يەرنىڭ يىرىك ھەم قاتتىقلىقىنى بايقىدىم. بۇنىڭدىن ئۇنىڭ يۈرەك قېپى جىگىلوسىنىڭ خەتەرلىك ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغانلىقىغا ھۆكۈم قىلدىم.



ئىككى قولىنى ئۆزئارا سۈركەيدىغان يۈرەك قېپى رايونىنى غىدىقلاپ، مېڭىنى سەگەكلەشتۈرىدۇ.

يۈرەك قېپى جىڭلوسى ئوتتۇرا بارماقتىن ئايلىنىپ قايتىدۇ، ھەمدە ئۇ يۈرەك ھەرىكىتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، مېڭە ۋە ئۈچەينى ئىدارە قىلىپ تۇرىدۇ. كىشىلەر ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئىنكاسى كېچىكىش، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى تۆۋەنلەش ياكى ئويقۇسىزلىق قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى ياشنىڭ چوڭايغانلىقىغا ئارتىپ قويدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۇنداق ئەمەس، بۇ خىل ئالامەتلەرنىڭ كۆپ قىسمىنى روھىي جەھەتتىكى جىددىيلىك كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. روھىي جىددىيلىك تۈپەيلىدىن، يۈرەك قېپى جىڭلوسىنىڭ ھەرىكەت ئىقتىدارى ئاجىزلايدۇ. ئۇنىڭ ئالتىقاندېكى ئالامىتى بولسا يۈرەك قېپى رايونىدىكى تېرىدە نورمالسىزلىق كۆرۈلىدۇ. يۈرەك قېپى جىڭلوسىنى كۈچەيتىش ۋە روھىي جەھەتتە جىددىيلىشىش كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىنكاسى كېچىكىش، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى ئاجىزلاش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئەڭ ئۈنۈملۈك چارە - ئالتىقاندېكى يۈرەك قېپى رايونى (ئا-لىقان مەركىزىي) نى بېسىشتىن ئىبارەت. بىر قول بىلەن ئۆزئارا ئالماشتۇرۇپ غىدىقلىسىمۇ، ئىككى قولنى ئۆزئارا كۈچەپ سۈركىسىمۇ بولىدۇ. بۇنداق قىلغاندا ئوڭ، سول يۈرەك قېپى رايونىنى بىرلا ۋاقىتتا غىدىقلىغىلى بولىدۇ. بۇ ھەرىكەتنىڭ مېڭىنى سەگەكلەشتۈرۈش رولى بار، شۇڭا ئەتىگەندە بۇ ھەرىكەتنى ئىشلەش ئەڭ مۇۋاپىق.


ئوتتۇرا بارماق بىلەن نامسىز بارماق ئارىسىدىكى تېرىدىن جې-گەردىكى نورمالسىزلىققا ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ

ئىلگىرى بىر چېلىشىش تەنھەرىكەتچىسى مېنى ئىزدەپ كېلىپ، ئاللىقىنىمنى كۆرۈپ بېقىڭ دېدى. ئەينى ۋاقىتتا ئۇ ئىنتايىن پەخىرلەنگەن ھالدا: «قانداق؟ مېنىڭ ئاللىقىنىم ھەم يىرىك ھەم چوڭ، قالتىسىم-كەن» دەپ ماختانغان. قارىماققا ھەقىقەتەن ئۇ دېگەندەك بولسىمۇ، ئەمما مەن ئۇنىڭ ئاللىقىنىدا بىر داغ بارلىقىنى بايقىدىم. بۇ داغ دەل ئۇنىڭ ئوتتۇرا بارماقى بىلەن نامسىز بارماقنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولۇپ، خۇددى

سىياھدەك قارا ھەم ئازراق قاتتىق ئىدى.

مېنىڭ قارشىچە بۇ جىگەردە نورمال سىزلىق كۆرۈلگەنلىكىنىڭ بەلگىسى ئىدى.

ئادەمنىڭ ئوتتۇرا بارماقنىڭ جىگەر ئىقتىدارى بىلەن مۇناسىۋىتى ئىنتايىن قويۇق. شۇڭا، جىگەردە




ئۆزگىرىش بولغان ھامان ئوتتۇرا بارماق بىلەن نامسىز بارماق ئارىسىدىكى ئوتتۇرا بارماقنىڭ جىگەر ئىقتىدارى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئىنتايىن زىچ.

تېرە ئەڭ ئاۋۋال ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى بېرىدۇ. دەسلەپتە بۇ ئەتراپتىكى تېرە يىرىك ۋە قاتتىقلىشىدۇ، بۇ جىگەر قان ئايلىنىشىنىڭ ياخشى ئەمەلىيىتىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا يول قويغاندا، ئوتتۇرا بارماق بىلەن نامسىز بارماق ئارىسىدا قانداق ئوخشاش قاتتىق تېرە پەيدا بولىدۇ، ھالبۇكى بۇ جىگەرنىڭ قاتقانلىقى ياكى جىگەر قېتىش گىردابىغا بېرىپ قالغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. مېنىڭ بۇ سۆزلىرىمنى ئاڭلاپ، ئۇ تەنھەرىكەتچى توغرا تاپمىدى. بەلكىم مېنى ۋەھىملىك سۆزلەر بىلەن قورقۇتۇۋاتىدۇ دەپ قارىغان بولۇشى مۇمكىن. ئەپسۇس، كېيىن ئۇ دەرۋەقە جىگەر قېتىش كېسىد.



لىگە گىرىپتار بولۇپ، جىسىمى نىي كۈچى زور دەرىجىدە ئاجىزلاپ، يەنە بىر مەزگىلدىن كېيىن تۆۋەنكى يېرىم بەدىنى دېگۈدەك پالەچ بولۇپ قاپتۇ.

ئوتتۇرا بارماق بىلەن نامسىز بارماق ئارىسىدىكى تېرىنىڭ قېتىشىنى يوقىتىپ،



جىگەرنى نورمال ھالەتكە قايتۇ-
رۇشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى
ئالقاننىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى
جىيەنلىسەنجىن (三 理 健
针 区) رايونىنى دائىم غىدىق-
لاشتىن ئىبارەت. بۇ رايونىنى
غىدىقلاش جىگەرگە پايدىلىق
بولۇپلا قالماي، يۈرەك، ئاشقازان،
ئۈچەي قاتارلىق ئەزالاردىكى
كېسەللىكلەرنىمۇ داۋالاش رو-
لىغا ئىگە. جىيەنلى سەنجىن
رايونىنى دائىم ئۇۋۇلغاندا يۇ-


چوتكىنى جىيەنلى سەنجىن رايونىغا سۈركەپ
جىگەر ئىقتىدارىنى جانلاندۇرغىلى بولىدۇ.
قىرىقى ئەزالارنىڭ قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىچكى ئەزالار
ئىقتىدارىنى جانلاندۇرىدۇ. ئەگەر جىگىرىڭىزنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىدىن
ئەندىشە قىلىشىڭىز سىناپ باقىشىڭىز بولىدۇ.

ئىككىنچى باب تىرناقنىمۇ كېسەللىك ئەھۋالىنى بىلگىلى بولىدۇ

ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈش

بۇ بابىنى باشلاشتىن بۇرۇن، مەن ئالدى بىلەن ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈش ۋە ئۆلچەشنىڭ ھەم ئاددىي ھەم ئۈنۈملۈك بىر ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتەي:

ئالدى بىلەن بەش بارماقنى چىقىرىپ، تەرتىپ بويىچە ھەربىر بارماقنى باسىمىز. ئەگەر بېسىش بىلەن تەڭلا دەرھال سۇس قىزىل رەڭلىك ئۆزگىرىش پەيدا بولۇپ، قولنى كۆ-تۈرۈشمىزگە ئەسلى رەڭگىگە قايتسا، قان ئايلىنىش راۋان، ئىچكى



ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى ياخشى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر بىر بارماق قىڭىزدا سۇس قىزىل رەڭ پەيدا بولمىسا، بۇ بارماقنىڭ

تۈرلۈك پەللىلەرنى ئۇۋۇلاشنىڭ ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنىڭ ساقلىقنى ساقلاش رولى بار.

لەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىچكى ئەزالاردا مەسىلە بارلىقىنى، قان ئايلى-
نىشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

قىسقىسى، باش بارماق ئاساسلىقى نەپەسلىنىش ئەزالىرى، كۆكرەك
قىسمى بىلەن، كۆرسەتكۈچ بارماق ئاشقازان، ئۈچەي بىلەن، ئوتتۇرا بارماق
يۈرەك بىلەن، نامىز بارماق جىگەر، ئوت بىلەن، چىمچىلاق بارماق يۈرەك
ۋە جىنسىي ئەزالار بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

ئەگەر بارماقنى دەرھال ئۆز رەڭگىگە قايتسۇن دېسەك، بۇنىڭ ئەڭ
ياخشى چارىسى پەللىلەرنى بېسىشتۇر.


باش بارماقتىكى شاۋشاڭ (商 头) پەللىسى، كۆرسەتكۈچ بارماقتى-
كى شاڭ ياك (商 阳) پەللىسى، ئوتتۇرا بارماقتىكى جۇڭ چۇڭ (中 冲)
پەللىسى، نامىز بارماقتىكى گۈەن چۇڭ (关 冲) پەللىسى، چىمچىلاق-
تىكى شاۋزې (泽 头) پەللىسىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسە، قان ئايلى-
نىشنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى ئاسرايدۇ.

بۇ چارە ۋاقىت، ئورۇننىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرىمايدۇ. مەيلى قەيەردە
بولمىسۇن، ئېسىگە كەلسىلا ئۇۋۇلسا بولىۋېرىدۇ.

ئەمەلىيەتتە، بارماقلا ئەمەس، تىرناقنىڭ رەڭگى ياكى شەكىل ئۆز-
گىرىشىگە ئاساسەن ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىغا ھۆكۈم قىلغىلىمۇ
بولىدۇ. شۇڭا، تىرناقنى دائىم كۆزىتىش ئادىتى يېتىلدۈرۈلسە تەن ساغلا-
ملىققا چوڭ پايدىسى بار.

باش بارماق تىرنىقى ھالەك (ئاچ قىزىل) كۆرۈنمە مەسىلە كۆرۈلگەن بولىدۇ

بىر قېتىم بىر قىزچاق ئالدىراپ - تېنەپ مېنىڭ قېشىمغا كېسەل
كۆرسەتكىلى كەپتۇ. ئۇ تىرنىقىنى ماڭا كۆرسىتىپ: «تىرنىقىمنىڭ
رەڭگى نورمال ئەمەستەك تۇرىدۇ. خېنىنى كۆپرەك سۈركىدىمۇ - نې-
مە؟» دېدى. راستىنلا شۇنداقمۇ؟ مېنىڭ قايتا - قايتا سۈرۈشتۈرۈشۈم
بىلەن ئۇ ئەسەپ: «ئىلگىرى خېنىنى قانچە كۆپ سۈركىسەممۇ تىرنىقىمنىڭ



شاۋشاڭ پەلسىنى غىدىقلىغاندا ئەڭ ياخشى-
سى باش بارماق بىرىنچى بوغۇمى بىلەن
قوشۇپ بىرلا ۋاقىتتا ئۇۋۇلاش كېرەك.

رەڭگىنى ئۆزگەرتىمەيتتى. يېقىندى-
دا خېنىنى چىقىرىۋېتىدىغان
ماي بىلەن سۈرتىۋېدىم، باشقا
تىرناقلىرىمنىڭ رەڭگى ئاق، پە-
قەت باش بارمىقىمنىڭ تىرىنقى
ئاچ قىزىل ئىكەنلىكىنى بايقىد-
ىم. نېمە ئىش ئىكەنلىكىنى
بىلەلمەي، سەۋەبىنى سورىغىلى
كەلدىم» دېدى.

ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ،
مەن ھەممىنى چۈشەندىم. شۇ-
نىڭ بىلەن ئۇنىڭغا «تىرناقنىڭ
ئاچ قىزىل رەڭدە بولۇشى بىر

خىل نورمالسىز ئەھۋال، بۇ ئىچكى ئەزالىرىڭىزنىڭ خەتەرلىك سىگنال
بەرگەنلىكى، خېنە بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق» دېدىم.
ئادەتتە باش بارماق تىرىنقىنىڭ ئاچ قىزىل رەڭدە كۆرۈنۈشى ئاشقا-
زان ئاستى بېزى ئىقتىدارىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئۇنىڭ
جىگىلوسىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى پۇتنىڭ باش بارمىقىدا بولۇپ، قوا-
نىڭ باش بارمىقى ماس ھالدا ئۇنىڭ بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ئاشقازان
ئاستى بېزى ئاجرىتىپ چىقارغان ئىنسۇلىن بەدەندىكى قەنتنى پارچىلاپ،
قەنت مېتابولىزىمىنى ياخشىلايدۇ. ھالبۇكى ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئىق-
تىدارى ئاجىزلاشسا، ئادەم ھارغىنلىق ھېس قىلىدۇ. ئېغىر بولغاندا ھەتتا
دىئابېت كېسەللىگە گىرىپتار بولىدۇ. ئادەمنىڭ ئاشقازان ئاستى بېزىدە
نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە ئۆزى دەرھاللا ھېس قىلالايدۇ. بۇ ۋاقىتتا باش
بارماق تىرىنقى ئاچ قىزىل رەڭ بىلەن ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى يېرىدۇ.
ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنىڭ ئەڭ
ئۈنۈملۈك چارىسى باش بارماق تىرىنقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاۋشاڭ

(少商) پەللىسىنى غىدىقلاشتۇر. ئەڭ ياخشىسى باش بارماقنىڭ بىر-
رىنچى بوغۇمى بىلەن قوشۇپ ئۇۋۇلسا قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ،
ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

كۆرسەتكۈچ بارماق تىرنىقى ئاچ قىزىل رەڭلىك بولۇپ قالسا نورمالسىزلىق كۆرۈلىدۇ

بىر يىلى مەن تەكلىپكە ئاساسەن چاغانلىق بىرلەشمە كۆڭۈل ئې-
چىشقا قاتناشتىم. ئاخىرلاشاي دېگەندە، رىياسەتچى تۇيۇقسىز ئىسمىمنى
چاقىرىپ، بىر كۆڭۈل ئېچىش نومۇرى ئورۇنداپ بېرىشىمنى تەلەپ قىل-
دى. ئەينى ۋاقىتتا مېنىڭ ھېچقانداق




ئىشتىيا تۇتۇلغاندا كۆرسەتكۈچ
بارماق تىرنىقىنىڭ رەڭگىدە
نورمالسىزلىق پەيدا بولىدۇ.

تەييارلىقىم بولمىغاچقا: «ئالغان سە-
زىنقىلىرىغا قاراش» ماھارىتىمنى ئىشقا
سېلىشقا مەجبۇر بولدۇم. مەن بىر مېھ-
مانغا قوللىڭىزنىڭ كەينىنى چىقىرىڭ
دېدىم. مەن قاراپلا ئۇنىڭغا: «يېقىندىن
بۇيان ئىشتىياڭىز ياخشى ئەمەستەك
تۇرىدۇ. ئېھتىمال زۇكامدىن بولغان بو-
لۇشى مۇمكىن!» دېدىم. - «شۇنداق!
سىز قانداق بىلىدىڭىز؟» دېدى قارشى
تەرەپ ئىشەنمىگەن، گاڭگىرىغان قىيا-
پەتتە.

شۇندىن بېرى، مەن «سېھىرگەر»
دېگەن لەقەملىك بولۇپ قالدىم. ئەمەل-
يەتتە مېنىڭ سېھىرگەرلىكتىن ھېچقانداق خەۋىرىم يوق. ھېلىقى ئادەم-

نىڭ كېسەللىك ئەھۋالى پۈتۈنلەي ئۇنىڭ قولىدا ئىپادىلىنىپ تۇراتتى. ئۇ
قولىنىڭ كەينىنى چىقىرىپ ماڭا كۆرسەتكەندە، مەن ئۇنىڭ كۆرسەتكۈچ
ۋە باش بارمىقى تىرنىقىنىڭ ئاچ قىزىل رەڭلىك بولۇپ قالغانلىقىنى



شاڭ ياك پەللىسىنى چىش كولىغۇچ بىلەن غىدىقلىغاندا ئاشقازان ۋە ئۈچەي ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

بايقىغان ئىدىم.

ئالدىدا دېيىلگەندەك، كۆرسەتكۈچ بارماق ئاشقازان، ئۈچەي بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئاشقازان، ئۈچەي ئىقتىدارىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە، باش بارماق تىرىنىقىنىڭ رەڭگى ئۆزگىرىدۇ، يەنى ئادەتتىكى ئاق رەڭلىكتىن ئاچ قىزىل رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. تەتۈرسى بويىچە ئېيتقاندا، كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىنىقى ئاچ قىزىل رەڭلىك كۆرۈنسە ئاشقازان، ئۈچەي يېنىنىڭ قان ئايلىنىشىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ھالبۇكى ئاشقازان، ئۈچەي يېنىنىڭ قان ئايلىنىشى ياخشى بولمىسا مۇقەررەر ئىشتىھاسى ئازىيىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۆپكە جىگلووسى (肺经) باش بارماقتىن ئايلىنىپ قايتىدۇ. باش بارماق تىرىنىقى ئاچ قىزىل رەڭلىك كۆرۈنگەندە، ئادەتتە نەپەسلىنىش ئەزالىرىنىڭ زىيانغا ئۇچرىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ زۇكام بولغانلىقىنىڭ بېشارىتى. زۇكام - ئاشقازان، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق ھەزىم قىلىش ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدارىنى ئاجارلاشتۇرىدۇ. شۇڭا، باش بارماق ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىنىقى بىرلا ۋاقىتتا ئاچ قىزىل رەڭلىك كۆرۈنىدۇ. ئاشقازان، ئۈچەي ئىقتىدارىنىڭ نورماللىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش- سىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىنىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپى- دىكى شاڭ ياك (商阳) پەللىسىنى غىدىقلاش. ئەگەر باش بارماقنىڭ

۱- بوغۇمنى قوشۇپ ئۇۋۇلسا، ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. شاڭ ياك (商阳) پەللىسى چوڭ ئۈچەي جىڭلوسىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى، بولۇپ، چىش كولغۇچ ياكى چاچ قىسقۇچ بىلەن كۆڭۈل قويۇپ غىدىق-لىغاندا ھەزىم قىلىشنى ياخشىلاپ ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

ئوتتۇرا بارماق تىرنىقىنىڭ رەڭگىدىن ئىچكى ئەزالار ئەھۋالىنى كۆرگىلى بولىدۇ

شۇنىڭغا ئىشىنىشكە بولىدۇكى، نۇرغۇن كىشىلەر ئۇخلىغاندا چۈش كۆرىدۇ. ئەلۋەتتە چۈش كۆرمەيدىغان ئادەملەرمۇ بار. ئەمما بۇ يەردە شۇنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك، بىر ئادەمنىڭ روھىي ھالىتى مۇقىم بولمىغاندا ياكى ھەددىدىن زىيادە جىددىيلەشكەن، ھېرىپ - چارچىغاندا ھەر ۋاقىت چۈش كۆرىدۇ.

دائىم چۈش كۆرىدىغان ئادەم جەزمەن بېشى قېيىپ، كۆزى تورلاش-قانلىقنى، تەپەككۈرنىڭ غۇۋا ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ. مۇبادا سىزدە مۇشۇنداق ئەھۋال كۆرۈلسە، ئوتتۇرا بارمىقىڭىزنىڭ تىرنىقىغا قاراپ باق-سىڭىز بولىدۇ. ئوتتۇرا بارماقتا «يۈرەك كېسەللىكلىرى» بىلەن مۇناسى-ۋىتى ئىنتايىن چوڭقۇر بولغان يۈرەك قېپى جىڭلوسى ئايلىنىپ ئۆتىدۇ. بىر ئادەمنىڭ نېرۋىسى ئاجىزلاشقان ياكى جىددىيلەشكەندە، بۇ جىڭلو-سىدا ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇ. بۇنىڭغا ئەگىشىپ ئوتتۇرا بارماق تىرنىقىمۇ ئاچ قىزىل رەڭلىك بولۇپ قالىدۇ.

بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى، باشقا ئۆلكىگە يۆتكىلىپ كەتكىلى ئانچە ئۇزۇن بولمىغان بىر دوستۇم ماڭا كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ. پاراڭلى-شىش داۋامىدا ئۇ: «يېقىندىن بۇيان دائىم چۈش كۆرىدىغان، ھاراقىمۇ ئىچەلمەيدىغان بولۇپ قالدىم» دېدى. مەن ئۇنىڭغا بارمىقىڭىزنى چىقى-رىك دېدىم. مەن قاراپلا ئۇنىڭ ئوتتۇرا بارمىقىنىڭ تىرنىقىنىڭ ئاچ قىزىل رەڭلىك ئىكەنلىكىنى بايقىدىم. مەن بۇنىڭدىن يېڭى مۇھىت ئالماشقان-لىقتىن ئۇنىڭغا ماسلىشالماي، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئالدىراشچىلىق سەۋەبى-

دىن كېلىپ چىققان دەپ ھۆكۈم قىلدىم. روھىي جەھەتتە ھەددىدىن زىيادە جىددىيلىشىش يەنە مېڭە قىسمىدىكى قان ئايلىنىشنىڭ ياخشى بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شۇنىڭ بىلەن ئىچكى ئە- زالار ئىقتىدارى ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ. ھېلىقى دوستۇمنىڭ ھاراققا بەر-



داشلىق بېرەلمەسلىكىدىكى تۈپ سەۋەب، جىگەر ئىقتىدارىنىڭ نا- چارلاشقانلىقىدا.

مەن ئۇ دوستۇمغا ھەر كۈنى ئوتتۇرا بارماق تىرىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى جۇڭ چۇڭ (中冲) پەللىسىنى بېسىشنى، شۇنداقلا ئوتتۇرا بارماق بىرىنچى بوغۇمىنى ئۇۋۇلاشنى داۋاملاشتۇرۇش توغرىدا-

سىدا تەكلىپ بەردىم. بۇ ئىككى جايىنى غىدىقلىغاندا روھىي جىددىيلىكىنى تۈگەتكىلى بولىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا، جىگەر ئىقتىدارى ناچارلىشىشنىڭ ئالدىنى ئې- لىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلىمۇ ئوتتۇرا بارماقتىكى جۇڭ چۇڭ پەللىسىنى غىدىقلاش بىلەن ئوتتۇرا بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىنى ئۇۋۇلاشتۇر، ھەم قول بىلەن جۇڭ چۇڭ پەللىسىنى بېسىپ ھەم ئۇنىڭ ئۈستىگە تەتۈر يۈزىنى چىمىدىپ يېنىك ئۇۋۇلىسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر ئۇ مەن ئۆگەتكەن ئۇسۇل بويىچە قىلىشنى داۋاملاشتۇرسا، ئىشنىمەنكى، ئۇ چوقۇم چۈش كۆرۈش قېتىم سانىنى ئازايتالايدۇ. يەنە ئىلگىرىكىدەك ھاراق ئىچەلەيدۇ.

نامىز بارماقنىڭ تىرىقى فىزىئولوگىيىلىك ئىقتىدارىنىڭ تەڭپۇڭلىقىنى ئىپادىلەيدۇ

ئىككى يىل ئاۋالقى بىر ياز كۈنى، مەن پويىزغا ئولتۇرۇپ يۈرتۈمغا

تۇغقان يوقلاشقا ماڭىدىم. خوشنا ئورۇندۇقتىكىلەر شىرىن ئاي ئۆتكۈزۈۋات-
قان يېڭى توي قىلغان ئەر - خوتۇن ئىكەن. پاراڭلىشىش داۋامىدا ئۇلار
مېنىڭ شۇغۇللىنىۋاتقان كەسپىمنى بىلىۋاپتۇ. ئۇ يېڭى كېلىن ماڭا ھال
ئېيتىپ: «ئىككى ئايدىن كۆپرەك بولدى، ھەيز ئىزچىل تەرتىپسىز، ئۇنىڭ
ئۈستىگە فىزىئولوگىيىلىك ئاغرىق ئىلگىرىكىگە قارىغاندا يامانلىشىپ
كەتتى. توي قىلغان كۈنى ئۆرە تۇرغان ۋاقىتم ئۇزۇنراق بولغاچقا بەرداش-
لىق بېرەلمىدىم!» دېدى.



ئۇنىڭ دەردىنى ئاڭلاپ بو-
لۇپ، ئۇنىڭ تىرىقنىنى كۈزەت-
تىم. ئۇنىڭ نامسىز بارماق تىر-
نىقىنىڭ ئاچ قىزىل رەڭلىك بو-
لۇپ قالغانلىقىنى بايقىدىم. بۇ-
نىڭدىن مەن ئۇنىڭ فىزىئولوگى-
يىلىك تەرتىپسىزلىكىنىڭ سو-
غۇق كېسەللىكىگە كىرىدىغانلى-
قىغا ھۆكۈم قىلدىم.

گۈن چۆك پەللىسى سەنجىياۋ جىڭ جىڭلو-
سىدىكى «پەللە مەنبەسى» دائىم بۇ يەرنى بې-
سىپ بەرسە ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى جان-
لاندۇرغىلى بولىدۇ.


نامسىز بارماقتا سەنجىياۋ
جىڭ (三焦经) جىڭلوسى
بولۇپ، ئۇ بەدەن ئېنېرگىيە مەد-

بەسىگە تۇتىشىدىغان جىڭلو، ئادەمنىڭ فىزىئولوگىيىلىك فۇنكسىيىسى
بىلەن زىچ باغلىنىشلىق. سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىدا نورمالسىزلىق كۆ-
رۈلگەندە، نامسىز بارماق تىرىقنى ئاچ قىزىل رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. ھالبۇكى بۇ
ھادىسە بەدەندىكى ئېنېرگىيە مەنبەسىدە تەڭپۇڭسىزلىق كۆرۈلگەنلىكىنى،
ھەددىدىن زىيادە سوغۇق ياكى ھەددىدىن زىيادە ئىسسىق تۈپەيلىدىن قان
ئايلىنىشنىڭ ياخشى بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى چۈ-
شەندۈرىدۇ. بۇ جىسمانىي كۈچ ۋە ئىقتىدارىنىڭ زەئىپلەشكەنلىكىنىڭ
بېشارىتى. ھېلىقى يېڭى كېلىن بۇنىڭ تىپىك مىسالى. ئۇنىڭ دەرت -

ئەلىسى بەختلىك نىكاھ تۇرمۇشىدىكى بىر سابىگە ئايلىنىپ قالغان. سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىنىڭ ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، بەدەن ئېنېرگىيە مەنبەسىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى نامىز بارماق تىرنىقىنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى گۈەن چۈڭ (关冲) پەل-لىسىنى غىدىقلاش بىلەن بىللە نامىز بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىنى ئۇۋۇلاشتۇر. گۈەن چۈڭ پەللىسى سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىنىڭ مەنبە-سىدۇر. بۇ يەرنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسە، ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى جان-لاندىرغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئادەم ئايروپىلانغا ئولتۇرغاندا نەپەس ئالالمىسا، ئۇنىڭ ھاۋا ئۆزگىرىشىگە ماسلىشىش ئىقتىدارىنىڭ ئاجىز ئى-كەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنداقلا سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىنىڭ زەئىپ-لەشكەنلىكىنىڭ بەلگىسى. بۇ خىل كىشىلەرمۇ گۈەن چۈڭ (关冲) پەللىسى ھەم نامىز بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىنى ئۇۋۇلسا بولىدۇ.

چىمچىلاق تىرنىقى ئارقىلىق يۈرەكتىكى نورمالسىزلىققا دىققەت قىلىش

تۆيۈمگە ھەركۈنى نۇرغۇن مېھمان كېلىدۇ. مەن كەلگەن ھەر بىر مېھماننى بىر - بىرلەپ ئىنچىكە كۆزىتىمەن. ئۇلارنىڭ كىيىم - كېچەك، روھىي ھالىتىنى ئەمەس بەلكى ئاينىغىدىن بېشىغىچە ئۇلار-نىڭ بەدىنىنى كۆزىتىمەن. بۇمۇ بەلكىم بىر خىل «كەسپىي كېسەل» بولۇشى مۇمكىن.



چىمچىلاق تىرنىقىنىڭ رەڭگى نورمال-سىز بولسا يۈرەكتە ئۆزگىرىش بار - يوقلىقىغا دىققەت قىلىش كېرەك.

بىر كۈنى، مەن بىر مېھماننىڭ چىرايىنىڭ سەل قىزىرىپ قالغانلى-قىنى كۆزىتىۋېتىپ، ئۇنىڭ يۈرە-كىدە ئازراق مەسىلە بولۇشى مۇمكىن

دەپ ھۆكۈم قىلدىم. ھەم ئۇدۇللا ئۇنىڭدىن سورىدىم. ئويلىمىغان يەردىن ئۇ ئىنكار قىلىپ: «ياق! مېنىڭ يۈرىكىم ئەزەلدىن ناھايىتى ساغلام!» دېدى. راستىنلا شۇنداقمۇ؟ مەن ئىشەنمەي، ئۇنىڭ قولىنى تارتىپ يەنە كۆزەتتىم. باشقا تۆت بارمىقىغا سېلىشتۇرغاندا ئۇنىڭ چىمچىلىقنىڭ تىرىقچىلىقنىڭ بەك قىزىل كۆرۈنىدىغانلىقىنى بايقىدىم. قارىغاندا مېنىڭ ھۆكۈمۈم توغرا، چىمچىلاق تىرىقچىلىقنىڭ قىزىرىپ قېلىشى يۈرەك قان ئايلىنىشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنىڭ بېشارىتى.

ئادەتتە، ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە مەلۇم كېسەللىك ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ. ئەمما يۈرەك كېسەللىكلىرىنىڭ ئادەتتە ھېچقانداق ئالامىتى بولمايدۇ. شۇڭا، يۈرەك كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغان كۆپ ساندىكى كېسەللەر ئالدىنقى مەزگىلدە ئۆزى بىلمەيدۇ. تاكى كېسەللىك ئەھۋالى يامانلاشقاندا ھەتتا جان تۇتۇقۇغا كەلگەندە ئادەتتىن ئۈستۈمۈت بايقايدۇ. شۇڭا، ئادەتتە بەزى ئادەملەر تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىدۇ.

بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، يۈرەكنىڭ ئەھۋالىنى ئې-

گەللەش ئىنتايىن مۇھىم ئىشقا ئايلىنىپ قالدى. يۈرەك ئىقتىدارىنى ئۆلچەش ۋە تەكشۈرۈشنىڭ ئەڭ ئاددىي ئۇسۇلى - چىمچىلاق بارمىقىنى كۆزىتىشكە دىققەت قىلىش لازىم.



شاۋ چۈك، شاۋزې پەللىلىرىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسە، يۈرەكنىڭ قان ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرغىلى بولىدۇ.

چىمچىلاق بارماقتىن يۈرەك بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان جىڭلو (قولىدىكى يۈرەك جىڭلوسى) ئېۋتسىدۇ. يۈرەك ئىقتىدارىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە، بۇ جىڭلودا


ئىنكاس پەيدا بولىدۇ. ئەگەر چىمچىلاق تىرنىقى نورمال ئاق رەڭدىن ئاچ قىزىل رەڭگە ئۆزگەرگەندە، يۈرەك جىگىلوسىنىڭ ئايلىنىشى تەرتىپسىز، يۈرەك ئىقتىدارىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

بۇ خىل ئەھۋال كۆرۈلگەندىن كېيىن، ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل شاۋ-چۈڭ (少冲) ۋە شاۋزې (少泽) پەللىسىنى غىدىقلاشتىن ئىبارەت. بۇ ئىككىسى مۇھىم پەللە، دائىم غىدىقلىغاندا، يۈرەك قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاپ، يۈرەك ئىقتىدارىنى جانلاندۇرىدۇ.


يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ھېلىقى مېھمان بىر نەچچە ئايدىن كېيىن ئاندىن ئۆزىدە يۈرەك كېسىلى بارلىقىنى بايقىغان. داۋالاش ۋاقتىغا دەخلى يەتمىگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇ ئىنتايىن پۇشايمان قىلغان ھالدا ماڭا: «ئەگەر مەن ئۆز ۋاقتىدا سىزنىڭ گېيىڭىزگە ئىشىنىپ، بالدۇرراق ئامالنى قىلغان بولسام بەلكىم يۈرەك كېسىلىگە گىرىپتار بولمىغان، گىرىپتار بولغاندىمۇ يېنىكرەك بولغان بولاتتىم!» دېدى.

تىرناق گۆشكە پىتىپ كېتىش جىگەرنىڭ قۇتقۇزۇش سىگنالىدۇر

ھەممىمىزگە مەلۇم، ئادەم بەدىنى ئاجىز ئىشقارلىققا ئىگە بولسا ئادەتتىن سىڭىرەك بولىدۇ. لېكىن كىشىلەر گۆش تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى كۆپ مىقداردا ئىستېمال قىلغاندا، ئاجىز ئىشقارلىق ھالەتنى ئېلىپ چىقىرىپ، شۇنىڭغا ئەگىشىپ زەھەر قايتۇرۇش رولىغا ئىگە بولغان جىگەرمۇ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، ئىچكى



جىگەر پەللىسى



جىگەر پەللىسىنى داۋاملىق بېسىپ بەر-
سە، جىگەر ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى
بولىدۇ.

ئەزالار فۇنكسىيىسىنىڭ ئاجىزلى-
شىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا،
ئادەملەر ئاسانلا ھارغىنلىق ھېس قى-
لىدۇ.


گۆش تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر-
نى ھەددىدىن زىيادە ئىستېمال قى-
لىش سەۋەبىدىن جىگەر فۇنكسىيى-
سىنىڭ ئاجىزلىشىشىنى كەلتۈرۈپ
چىقارغانلىقىنىڭ روشەن ئىنكاسى
-تىرناق گۆشكە چوڭقۇر پېتىپ
قېلىشتۇر.

ئۆزىدە بۇ خىل ئەھۋالنىڭ كۆرۈلگەنلىكىنى بايقىغانلار ئىمكان-
يەتنىڭ بارىچە گۆش تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى ئاز، ئۆسۈملۈك تۈرىدىكى
يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش كېرەك.
جىگەرنىڭ نورمال ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنىڭ ئەڭ ئۇ-
نۇملۇك ئۇسۇلى نامسىز بارماق ئىككىنچى بوغۇمىنىڭ دەل ئوتتۇرىسىدىكى
جىگەر پەللىسىنى غىدىقلاشتۇر. بۇ پەللىنى ئۇۋۇلاشنى ھەر كۈنى داۋام-
لاشتۇرغاندا جىگەرنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ. تىرناقمۇ تەبى-
ئىي ھالىتىگە قايتىدۇ.

تىرناقتا توغرا سىزىق پەيدا بولسا ئاشقازان - ئۈچەيدە كېسەللىك بولغان بولىدۇ

بىر نەچچە يىل ئىلگىرى، بىر ژۇرنالنىڭ مۇھەررىرى مېنى يىڭنە
سانجىپ دۋالاشقا ئائىت بىر پارچە ماقالە يېزىپ بېرىشكە تەكلىپ قىلدى.
مەن ئۇنىڭ جۇڭگو تېبابىتىگە بىر تەرەپلىمە قارايدىغانلىقىنى بىلەتتىم.
شۇڭا، پۇرسەت تېپىپ ئۇنىڭغا پەللە ئارقىلىق داۋالاشنىڭ ئۈنۈمىنى
ئىسپاتلاپ بېرىشنى ئويلاپ يۈرەتتىم. مەن ئۇنىڭ باش بىرىمىنىڭ تۆۋەن

تەرىپىدە روشەن بىر توغرا سىزىق بارلىقىنى بايقاپ، دەرھال ئۇنىڭدىن: «ئۈچ ئاي ئىلگىرى سىز ئاشقازان يارىسى ئوپىراتسىيىسى قىلدۇرغانىمىز. تىڭىز؟» دەپ سورىدىم.



ئۇ ھاڭ - تاڭ قىلىپ دەررۇ: «ئاشقازان ئەمەس، دەل ئۈچ ئاي ئىلگىرى 12 بارماق ئۈچ چەي يارىسى ئوپىراتسىيىسى قىلدۇرغانىدىم.» دەپ جاۋاب بەردى. شۇنىڭدىن كېيىن، ئۈچرە-خانلا ئادەمگە ئۇ مېنىڭ قورسۇ-قۇمىدىكىنى تاپتى دەپتۇ. شۇنىڭ بىلەن جۇڭگو تېبابىتىگە بولغان كۆز قارىشىمۇ ئۆزگىرىپتۇ.

شاۋشاڭ باش بارماقتىكى بۇلاق (مەنبە) پەلەلە بولۇپ، ئۆپكە جىگىلىنىڭ (肺经) باشلىنىدىغان جايى.

ئەمەلىيەتتە، مەن ئۇنىڭ تېنىدىكى كېسەلنى داۋالاپ سا-

قايتالماسلىقىم مۇمكىن. ئەمما مەن ئۇنىڭ باش بارماق تىرىنىقىدىكى توغرا سىزىق ئارقىلىق، ئۇنىڭ ئاشقازان ياكى 12 بارماق ئۈچىنىدە چاتاق بارلىقىنى بىلەلەيمەن.

تىرناق ئادەتتە ئالتە ئايدا يېڭىلىنىدۇ. بۇ جەرياندا ئەگەر ھەزىم قىلىش سىستېمىسى كېسەللىكىگە گىرىپتار بولسا، بۇ مەزگىلدە تىرناقتا توغرا سىزىق پەيدا بولىدۇ. ئەگەر تىرناقنىڭ ئوتتۇرىسىدا توغرا سىزىق پەيدا بولسا، ئۇ ئادەمنىڭ تەخمىنەن ئۈچ ئاينىڭ ئالدىدا ئاشقازان، ئۈچەي سىستېمىسىدا كېسەل بولغان بولىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال باش بارماق بىلەنلا چەكلىنىپ قالماي، باشقا تۆت بارماقتىمۇ ئوخشاشلا كۆرۈلىدۇ.

ئىلگىرى ئاشقازان، ئۈچەي سىستېمىسى كېسەللىكىگە گىرىپتار بولمىغان ئادەمنىڭ تىرىنىقىدا توغرا سىزىق پەيدا بولسا، ئاشقازان، ئۈچەيدە كېسەللىك يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى بارلىقىدىن بېشارەت بېرىدۇ. شۇڭا، سىز مۇشۇنداق ئەھۋالنى بايقىغاندا، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە بالدۇرراق چارە

قىلىشىڭىز كېرەك.

ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى - تىرىنقىدا توغرا سىزىق پەيدا بولغان بارماقتىكى پەللىلەرنى ئۇۋۇلاشتۇر. مەسىلەن: باش بارماقتا توغرا سىزىق پەيدا بولسا شاۋ شاڭ (少商) پەللىسىنى غىدىقلىسا بولىدۇ. قىسقىسى، پەقەت ئېھتىيات قىلغاندىلا، ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

تىرىنقا تىك سىزىق پەيدا بولۇش، مېتابولىزم ياخشى بولماسلىقىدىكى ئاگاھلاندۇرۇش

تىرىنقا دائىم تىك سىزىقنىڭ پەيدا بولۇشى ھەممە ئادەم بىلىدىغان ھادىسە، شۇڭا ئەنسىرەشنىڭ ھاجىتى يوق. ئەمما ئەگەر تىرىنقا ئىچىدىكى گۆشتە ئېرىقچە پەيدا بولسا، ئۇ -

نىڭغا ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك.

تىرىنقا ئىچىدىكى تېرە بە - لەن گۆش «تىرىنقا قېنى» دېيىد - لىدۇ. بۇ يەردە تىك سىزىقنىڭ جىگەر، بۆرەك قاتارلىق ئەزالار ئىقتىدارىنىڭ زەئىپلەشكەنلىكى - نىڭ بېشارىتى.

جىگەر، بۆرەك قاتارلىق ئەزا - لارنىڭ بەدەندىكى كېرەكسىز ماد - دىلارنى چىقىرىۋېتىش، زەھەر قاچ - تۇرۇش رولى بار. جىگەر، بۆرەك -

جۈڭ چۈڭ ئوتتۇرا بارماقتىكى بۇلاق (مەنبە) پەللە بولۇپ، بۆرەك قېچى جىگۈسىنىڭ باشلىنىدىغان يېرى.


نىڭ ئىقتىدارى پاسسىپلىشىپ كەتكەندە، بەدەندىكى كېرەكسىز ماددىلار بەدەن سىرتىغا چىقىرىۋېتىلمەيدۇ. يەنى مېتابولىزم (ماددا ئالماشتۇرۇش) ناچارلىشىدۇ. جىگەر، بۆرەك ئىقتىدارى ماسلاشمىغاندا، بەزىدە «ئىششىش»

مۇمكىن.

تىرناقتا ئېرىقچە پەيدا بولغاندا، ئۆز ۋاقتىدا پەللىنى ئۇۋۇلاش كېرەك. مەسىلەن: ئوتتۇرا بارماقتا ئېرىقچە پەيدا بولسا جۇڭ چۇڭ (中冲) پەللىسىنى ئۇۋۇلاش كېرەك.


تىرناقتا داغ پەيدا بولۇش مېڭە قىسمىدىكى قان ئايلىنىشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنىڭ ئىپادىسى

تىرناقتا قىزىل ياكى قارا رەڭلىك داغ پەيدا بولسا، مېڭە قىسمىدىكى قان ئايلىنىشتا توسالغۇ پەيدا بولغانلىقىنىڭ بېشارىتى. ئەگەر تىرناقتىكى داغنىڭ رەڭگى روشەن بولسا، بۇ قان ئايلىنىشنىڭ نورمالسىزلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بۇنىڭغا ئەگىشىپ مېڭە قىسمىدا توسالغۇ پەيدا بولىدۇ. ئوڭ قول تىرنىقىدا داغ پەيدا بولسا، سول مېڭىدە مەسىلە بارلىقىنى، سول قول تىرنىقىدا داغ پەيدا بولسا ئوڭ مېڭىدە توسالغۇ پەيدا بولۇش ئېھتىماللىقى بارلىقىنىڭ بېشارىتى. شۇڭا، تىرناقتا داغ بارلىقى بايقالسا، ئالدى بىلەن مېڭە قان ئايلىنىشنىڭ راۋان ئەمەسلىك ئېھتىماللىقى بارلىقىنى ئويلاش كېرەك.



تىرنىقىدا ئاسانلا داغ پەيدا بولىدىغان كىشىلەر مېڭە قىسمىدىكى قان ئايلىنىشنىڭ نورمال بولۇشى ئۈچۈن، بۇ خىل ھادىسە يۈز بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. قولىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كېسەل داۋالاش نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، تىرناقتا داغ پەيدا بولۇشقا تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ماس ئورۇندىكى پەللىنى ئۇۋۇلاشتۇر (غىدىقلاش).

شاڭ ياك كۆرسەتكۈچ بارماقتىكى بۇلاق (مەنبە) پەللە بولۇپ، چوڭ ئۈچەي جىڭلوسىنىڭ باشلىنىدىغان جايى.



خېنە سۈركەش ئەلۋەتتە ئاياللارغا گۈزەللىك
ئېلىپ كېلىدۇ. ئەمما تىرنىقنى كۆزىتىشكە
تەسىر يەتكۈزىدۇ.


تۇر). مەسىلەن: كۆرسەت-
كۈچ بارماقتا داغ پەيدا
بولسا كۆرسەتكۈچ بارماق
تىرنىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپى-
پىدىكى شاڭ ياك (商阳)
(پەللىسىنى ئىنچىكىلىك
بىلەن ئۇۋۇلاش كېرەك.
بۇنداق قىلغاندا مېڭە
قىسمىدىكى قان ئايلى-
نىشىنى راۋانلاشتۇرغىلى
بولىدۇ. ساقايغان - ساقاي-
مىغانلىقىنىمۇ داغقا قاراپ
بىلگىلى بولىدۇ. داغ يو-
قالغان بولسا مېڭە قىسمى-
نىڭ قان ئايلىنىشى راۋانلاشقان بولىدۇ.

تىرنىققا خېنە سۈرتۈشنى ياخشى كۆرىدىغان ئاياللار، مېڭە ياكى
ئىچكى ئەزالىرىڭلاردا توسالغۇ پەيدا بولغان - بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈش
ئۈچۈن، قەرەللىك تۈردە خېنەنى چىقىرىۋېتىپ، ئىنچىكىلىك بىلەن
كۆزىتىشىڭلارنى، شۇ ئارقىلىق تەن سالامەتلىكىڭلارغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.

ئۈچىنچى باب قولغا قاراپ كېسەل تەكشۈرۈش

چوڭلار زۇكام بولغاندا باش بارماق دۆڭچىسى سۆسۈن رەڭدە كۆرۈنىدۇ


ئومۇمەن «ساغلام» دېيىلگەن ئادەملەرنىڭ ئەڭ چوڭ بىر ئالاھىدىسىكى بولىدۇ، ئۇ بولسىمۇ قول ئالىقنى مەزمۇت، كۈچلۈك، قان ئايلىنىشى راۋان بولىدۇ، بولۇپمۇ باش بارماق دۆڭچىسى قىزىل، سەل — پەل تومپىيىپ تۇرىدۇ. بۇنىڭ ئەكسىچە تېنى ئاجىز، ئاسان زۇكام بولىدىغان ئادەملەرنىڭ باش بارماق دۆڭچىسى ئادەتتە ئورۇق ھەم ياپىلاق بولۇپ، رەڭگى قىزىل بولمايدۇ.



باش بارماق دۆڭچىسى باش بارماق تۆۋەن تەرىپىدىن قول بېغىشىغىچە بولغان ئارىلىقتىكى تومپىيىپ چىققان قىسىم بولۇپ، ئۇنىڭ ئارىسىدا (肺经) ئۆپكە جىڭلوسى ئايلىنىپ تۇرىدۇ. شۇڭا، يەنە «كۆكرەك بوشلۇقى. نەپەسلىنىش ئوراللىرى رايونى» دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ يەنە نەپەسلىنىش سىستېمىسى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتتى.

تى بار. يەنى باش بارماق دۆڭچىسى تومپىيىپ تۇرسا نەپەسلىنىش

سىستېمىسىنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ؛ ئەگەر باش بارماق دۆڭچىسىنىڭ رەڭگى ئۆزگەرسە ياكى ياپىلاق بولۇپ قالسا، نەپەسلىنىش سىستېمىسى ئىقتىدارىدا نورمالسىزلىق پەيدا بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. كۆتۈرەڭگۈ روھلۇق، ئىنتايىن ساغلام بىر ئادەم ئەگەر باش بارماق دۆڭچىسىنىڭ ئورۇقلىغان ياكى سۆسۈن رەڭگە ئۆزگەرگەنلىكىنى بايقىسا،



باش بارماق دۆڭچىسى بىلەن تەي يۈەن پەللىسىنى غىدىقلىسا، كۆكرەك بوش-لۇقى، نەپەسلىنىش ئەزالىرى رايونىنىڭ تومپىيىپ چىقىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

بۇ زۇكام بولغانلىقىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى بېشارىتى بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا، «كۆكرەك بوشلۇقى. نەپەسلىنىش ئەزالىرى رايونى» نىڭ تومپىيىپ چىقىش ھالىتىنى ساقلاش، قان ئايلىنىشنىڭ راۋانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش بىر مەنۇتۇمۇ كېچىكتۈرگىلى بولمايدىغان چوڭ ئىش. غىدىقلاش ئۇسۇلى — ئوڭ — سول ئىككى قولىنىڭ باش بارماق دۆڭچىسىنى ئۇۋۇلاش، ئۇۋۇلىغاندا ئازىراق ئاغرىغاندەك ھېس قىلسا ئاندىن بو-


لىدۇ. بىردەم ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن باش بارماق دۆڭچىسى دەرھال قىزىل رەڭلىك كۆرۈنىدۇ. بەلكى يەنە ئەسلى ھالىتىگە قايتىشى مۇمكىن. ئەگەر يېنىكرەك زۇكام بولسا مۇشۇ بويىچە داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدۇ.

باش بارماق دۆڭچىسىنى ئۇۋۇلاش بىلەن بىللە، ئەگەر قول بېغىش ئىچىدىكى (肺经) ئۆپكە جىڭلوسى تەي يۈەن (太渊) پەللىسىنى غىدىقلىيالىسا، تېخىمۇ ئالاھىدە ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. يەنى چۈشكۈرۈش، يۆتىلىش، ماڭقىسى ئېقىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلەر-نىڭ پەيدا بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ئەگەر ھەر كۈنى ياندۇرۇلغان ئىسرىق بىلەن تەي يۈەن (太渊) پەللىسىنى داغلاپ داۋالاشنى

داۋاملاشتۇرسىڭىز، زۇكامنىڭ نېمىلىكىنى بىلمەيدىغان ھەقىقىي ساغلام كىشىگە ئايلىنالايسىز.

بوۋاقلار زۇكام بولسا كۆرسەتكۈچ بارمىقىنىڭ ئىچكى تەرىپى سىگىنال بېرىدۇ


ئادەم بەدىنىدىكى جىڭلولار تەخمىنەن 7 ياش ۋاقتىدا پۈتۈنلەي شەكىللىنىپ بولىدۇ. ئۇنداقتا جىڭلولرى تولۇق شەكىللىنىپ بولالمىغان بوۋاقلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇنىڭ زۇكام بولغان — بولمىغانلىقىغا قانداق ھۆكۈم قىلىغىلى بولىدۇ؟



بايا دەپ ئۆتتۇق، ئەگەر چوڭ-لار زۇكام بولغاندا (肺经) ئۆپكە جىڭلوسىنىڭ ئايلىنىش لىنىيەسىدىكى باش بارماق دۆڭچىسى ياكى قول بېغىشىدىكى تەي يۈەن (太渊) پەللىسىنى غىدىقلاش ئارقىلىق ساقايتقىلى بولىدۇ. ئۇنداقتا قائىدە بويىچە ئېيتقاندا بوۋاقلارنىڭ شۇ قىسمىنى غىدىقلىسا ئۈنۈمى بولۇشى كېرەك. ئەمما بوۋاقلارنىڭ قارشىلىق كۈچى ئاجىزراق بولغاچقا، زۇكام بولغان — بولمىغانلىقىنى تەكشۈرگەندىن كۆرە، ئالدىنى ئالغان تۈزۈك.

بوۋاقلارنىڭ زۇكام بولغان — بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈشنىڭ مۇھىم نوقتىسى كۆرسەتكۈچ بارمىقىدا. كۆرسەتكۈچ بارماق جەمئىي ئۈچ بوغۇمغا ئايرىلىدۇ، ئەڭ تۆۋەنكى قەۋىتى نېگىز بوغۇم فېڭ گۈەن (风关)، ئىككىنچى بوغۇمى جى گۈەن (气关)، ئۈچىنچى بوغۇمى مىڭ گۈەن (命关) دەپ ئاتىلىدۇ. بوۋاقلارنىڭ زۇكام بولغانلىقىنىڭ ئەڭ چوڭ

بېشارتى - نېگىز بوغۇم فېڭ گۈەن بىلەن ئىككىنچى بوغۇم چى گۈەن ئوتتۇرىسىدىكى باش بارماققا يېقىن تەرىپىدىكى قىسمىدا پەيدا بولىدۇ، ئەگەر بۇ يەردە قان يىغىلىپ قالغاندەك سۆسۈن رەڭ كۆرۈنسە، بوۋاقنىڭ



شاڭ ياك ۋاڭ پەللىسىنى ئاغرىق يوقال-
غىچە باسسا، بوۋاقلاردىكى زۇكامنى
ساقايتقىلى بولىدۇ.

زۇكام بولغانلىقى ياكى زۇكام بو-
لۇش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى
چۈشەندۈرىدۇ. كېسەللىك ئالامە-
تىنىڭ ئېغىر - يېنىكىلىكىگە
ئاساسەن، رەڭگى ئۆزگەرگەن قە-
سىم تەرتىپ بويىچە يۇقىرىغا
يۆتكىلىدۇ. ئەگەر سۆسۈن رەڭ
فېڭ گۈەن (凤关) بىلەن چى
گۈەن (气关) ئوتتۇرىسىدا
پەيدا بولسا، زۇكام بولۇش خەتەر-
رى بارلىقىنى، پائال تەدبىر قول-
لىنىش كېرەكلىكىنى چۈشەن-
دۈرىدۇ؛ ئەگەر سۆسۈن رەڭ چى

گۈەن (气关) بىلەن مىڭ گۈەن (命关) ئارىلىقىدا پەيدا بولسا، راس-
تىنلا زۇكام بولغانلىقىنى، دەرھال داۋالاش كېرەكلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ؛
ئەگەر (命关) سۆسۈن رەڭلىك كۆرۈنسە، زۇكامنىڭ ناھايىتى ئېغىر
ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.


بوۋاقلارنىڭ زۇكام بولۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئەڭ ئۈ-
نۈملۈك ئۇسۇلى كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىقىنىڭ تۆۋىنىدىكى شاڭ ياك
(商阳) پەللىسىنى ئۇۋۇلاشتۇر. بوۋاقلار زۇكام بولغان دەسلەپكى مەز-
گىلدە بۇ پەللىنى ئۇۋۇلىغاندا ئاغرىيدۇ، ئاغرىق يوقالغانغا قەدەر ئۇۋۇلاشنى
داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. بوۋاق يەنە ئاغرىش ھېس قىلمىسا، سۆسۈن رەڭمۇ
يوقالسا زۇكامنىڭ ساقايغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.

بوۋاقلار سۆزلىيەلمىگەچكە، يۇقىرىقى ئۇسۇلنى قوللىنىش بالىلار-
نىڭ زۇكام بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئەڭ ئۈنۈملۈك چارە ھېسابلىنىدۇ.

شۇنى دەپ ئۆتۈش كېرەككى، قان يىغىلىپ قالغاندەك سۆسۈن رەڭ ئوغۇل بوۋاقتىڭ سول قولىدا، قىز بوۋاقتىڭ ئوڭ قولىدا كۆپ پەيدا بولىدۇ.

ئىچى قېتىپ قالسا كۆرسەتكۈچ بارماقتىڭ تۈۋى بەكرەك ئاغرىيدۇ

تەن ساغلاملىقىنىڭ ئۈچ چوڭ پرىنسىپى بار: يەنى ئوبدان يېيىش، قېنىپ ئۇخلاش، تەرتىپ راۋان بولۇش. بۇ ئۈچ چوڭ شەرت تەن ساغلاملىقىنى ئاسراشتا كەم بولسا بولمايدىغان مۇھىم ئامىل ھېسابلىنىدۇ. ھازىرقى زامان كىشىلىرىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا «تەرتىپ راۋان بولۇش» تېخىمۇ مۇھىم. چۈنكى ھازىرقى زامان كىشىلىرىنىڭ تۇرمۇشى ناھايىتى قانۇنىيەتسىز بولۇپ، ئۇلارنىڭ پىسخىكا ھالىتى كۆپىنچە فىزىئولوگىيەلىك ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا، ئىچى قېتىپ قېلىش ھازىرقى زامان كىشىلىرىدىكى بىر خىل كېسەلگە ئايلىنىپ قالغان. ئىچى قېتىپ قېلىش ئۈچەينىڭ يېمەكلىكتىكى سۇ تەركىبىنى قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى يوقاتقانلىقتىن بولىدۇ. ئۇزۇنغىچە داۋاملاشسا چىقىرىندىلار ئۈچەيدە يىغىلىپ قېلىپ، توكسىن (زەھەر) قانغا كىرىپ، ئىچكى ئەزالاردىكى تۈرلۈك توسالغۇلارنى پەيدا قىلىدۇ. ئىچى قېتىپ قېلىش



ئىككىنچى ئېرىيەننى ئۇۋۇلاش، قەۋزىيەتنى يوقىتىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى


قورقۇنچلۇق ئەمەس، قورقۇنچلۇق بولغىنى ئۇ تۈرلۈك كېسەللىكلەرنىڭ بىرلا ۋاقىتتا پەيدا بولۇشىنىڭ باشلىنىشى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. شۇڭا، بالدۇرراق داۋالاش ئىنتايىن مۇھىم.

بەش بارماقنى ئاچقاندا ئىچى قېتىپ قېلىشنىڭ بېشارەتلىرىنى دەرھال كۆزەتكىلى بولىدۇ. ئەگەر ئەرەك ئاچقىلى بولمىسا، كۆرسەتكۈچ بارماق تۆۋەن تەرىپىنىڭ ئوتتۇرا بارماققا يېقىن تەرىپى سىر قىراپ ئاغرىسا چوڭ تەرەتنىڭ راۋان ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى ئوتتۇرا بارماققا يېقىن بولغان ئىچكى تەرەپ يىلتىز قىسمى ئىككىنچى ئېرجىيەن پەللىسى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ يىڭنە سانجىپ داۋالاش دوختۇرلىرىنىڭ ئۆزگىچە بايقىشى بولۇپ، ئىچى قېتىپ قېلىش ھادىسىسىنى تەكشۈرگىلى بولغاندىن سىرت، بۇ ئورۇننى ئىنچىكىلىك بىلەن ئۇۋۇلاشنى ئۇزۇنغىچە داۋاملاشتۇرالسا، تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئىچى قېتىشنى داۋالىغىلى بولىدۇ. سول قولدىكى ئىككىنچى ئېرجىيەن پەللىسىنى ئۇۋۇلغاندا ئاغرىسا، بېلىق، گۆش قاتارلىق يېمەكلىكلەرنى كۆپ يېگەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ؛ ئوڭ قولدىكى ئىككىنچى ئېرجىيەن پەللىسىنى ئۇۋۇلغاندا ئاغرىسا، ھاراقنى بەك كۆپ ئىچكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ ياكى ئۇسۇملۇك تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى بەك كۆپ يېگەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ناچار يېمەك — ئىچمەك ئادىتىنى ئۆزگەرتىش ئەڭ ئاقىلانە ئۇسۇلدۇر.

سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغى بولغانلاردا ئوتتۇرا، كۆرسەتكۈچ بارماق تۇتاشقان جاي قېتىشىدۇ

سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغى ئەگەر جىددىي قوزغالسا، پەقەت ئو- ئېراتسىيە قىلىشتىن باشقا چارە يوق. ئەمما ئوپېراتسىيەنىڭ قانچىلىك ئاددىي بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ناھايىتى ئاز ساندىكى ئادەملەرلا قورسىد- قىنى يېرىشنى، پىچاق ئازابى تارتىشنى خالايدۇ. سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغى سەۋەبىدىن ئوپېراتسىيە قىلدۇرۇشنى خالىمىسا، ئۇنداقتا كېسەل-



شاڭ ياك پەللىسى بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماقنى ئۇۋۇلىغاندا سازاڭسىمان ئۇ-
سۈكچە ياللۇغنىڭ قوزغىلىشىنى تىزگىنلىگىلى بولىدۇ.

لىك ئالامىتى ناھايىتى يېنىك، ھەتتا كېسەللىك ئالامىتى بولمىغان مەز-
گىلدىن باشلاپ، بالدۇر بايقاپ، ئۆز ۋاقتىدا تىزگىنلەش كېرەك. غەرب تې-
بابىتىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا بۇنى قىلماق تەس. چۈنكى ياللۇغ مەلۇم
دەرىجىگە يەتمەسە، قان تەركىبلىرى ئۆزگىرىپ مەلۇم دەرىجىگە يەتمەسە،
ئۇلار كېسەلنىڭ سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغىغا گىرىپتار بولغانلىقىنى
بېكىتەلمەيدۇ. ئەمما جۇڭگو تېبابىتىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ئىش ئۇند-
چىۋالا مۇرەككەپ ئەمەس.


سازاڭسىمان ئۆسۈكچە چوڭ ئۈچەي بىلەن ئىنچىكە ئۈچەي ئوتتۇ-
رىسىدا پولىتىيىپ چىققان بىر بۆلەك ئۈچەي. ئەگەر بۇ پولىتىيىپ چىققان
قىسمىنىڭ قان ئايلىنىشى راۋان بولمىسا ياكى ھەزىم قىلىنغان نەرسىلەر
كىرىپ كەتسە، بولۇپمۇ يېمەكلىك توشۇلغاندا ئۇزۇن ئۆتمەي ئېچىش،
چىرىش پەيدا بولۇپ، سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغلىنىشىنى كەلتۈرۈپ
چىقىرىدۇ.

سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغنىڭ قوزغىلىشى يېنىكلىكتىن ئې-
غىرلىققا قاراپ تەرەققىي قىلىدىغان جەريان. سازاڭسىمان ئۆسۈكچە يال-
لۇغى قوزغالغان دەسلەپكى مەزگىلدە ياكى قوزغىلىشتىن بۇرۇن، ئەگەر
سىز كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارمىقىڭىز تۇتاشقان جاينى ئەس-

تايىدىل كۆزەتسىڭىز، بۇ يەردىكى تېرىنىڭ قېتىشقانلىقىنى بايقايسىز، ئۇنىڭ ئۈستىگە كۆرسەتكۈچ بارماق ئىختىيارىي ھەرىكەت قىلالايدۇ. مانا بۇ سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغنىڭ ئالدىدىكى سىگنالى. ئەگەر سىز كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمەسكە سالسىڭىز، سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغى شۇ ھامان قوزغىلىدۇ.


سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغى قوزغىلىشنىڭ ئالدىدا بەزى ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىشقا بولىدۇ. داۋالاشنىڭ بىرىنچى قەدىمى پۈتۈن كۆرسەتكۈچ بارماقنى ئۇۋۇلاش، ئارقىدىنلا كۆرسەتكۈچ بارماق تۆۋەن تەرىپىدىكى شاڭ ياك (商阳) پەللىسىنى تاكى كۆرسەتكۈچ بارماق باشقا تۆت بارماققا ئوخشاش ئەركىن ھەرىكەت قىلالايدىغان بولغىچە ئۇۋۇلسا بولىدۇ. كۆرسەتكۈچ بارماق، ئوتتۇرا بارماق تۇتاشقان جايدىكى تېرە يۈە- شىسا سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغىنىڭ يامىرىشى تېزگىنلەنگەن بولىدۇ. ئەگەر سىز سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان بولسىڭىز، بۇ ئۆسۈلنى سىناپ بېقىشقا ئەرزىيدۇ، ئۇنىڭ ئاغىرىق پەسەيتىشتىكى ئۈنۈ- مى ياخشى.

ئۆپكە كېسەللىكلىرى بىلەن ئۈزۈلگەن ھاياتلىق سىزىقچىسى



«ئاللىقان سىزىقچىلىرىغا قا- راپ، ئۆتكەن كۈنلەرنى پەرەز قى- لىش» — كۈچلاردىكى ئاللىقان سىزىقچىلىرىغا قاراپ پال ئاچىد- غان پالچىلار دائىم مۇشۇنداق ھۈ- نىرىنى كۆرسىتىپ خېرىدارلارنى جەلپ قىلىدۇ. بەزىلەر بۇنىڭدىن ئاسانلا تەسىرلىنىپ، «ئاللىقان سى- زىقچىلىرىغا قاراپ پال بېقىش» قا

بەك ئىشىنىپ كېتىدۇ. بەزىلەر بىر ئىشىنىپ بىر ئىشەنمەي مەندىن: «ئالىقان سىزىقچىلىرىغا قاراپ ئاچقان پال زادى توغرا چىقامدۇ — يوق؟» دەپ دائىم سورايدۇ. مېنىڭ جاۋابىم باشتىن — ئاخىرى بىر خىل بولۇپ كەلدى، يەنى «ئالىقان سىزىقچىلىرىغا قاراپ پال بېقىشقا يېنىكلىك بىلەن ئىشىنىپ كېتىشكە بولمايدۇ، ئەمما ئالىقان سىزىقچىلىرىغا قاراپ تىلغا ئېلىنىدىغان ھاياتلىق سىزىقچىسى، ئەقىل — پاراسەت سىزىقچىسى، مۇھەببەت سىزىقچىسى دەپ-



گەنلەرنى يېنىكلىك بىلەن ئىند-
كار قىلىشقا بولمايدۇ، ئۇلارنىڭ
ھەممىسى جىڭلونى (经络)
ئاساس قىلغان بولۇپ، بۇنىڭغا
ئاساسەن بىر ئادەمنىڭ ئىچكى
ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدارىنى تەك-
شۈرگىلى ۋە ئۆلچىگىلى بولىدۇ.
بۇنداق دېيىش مېنىڭ
قىياسىم ئەمەس، ھاياتلىق سىزىقچىسى، مۇھەببەت سىزىقچىسى،

سى دېگەنلەر ھەقىقەتەن جىڭلو (经络) بىلەن ئىنتايىن زىچ مۇناسىۋەتلىك. مەسىلەن: ھاياتلىق سىزىقچىسى باش بارماق ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق ئارىسىدىكى چوڭقۇر ئېرىقچىنى تىك كېسىپ ئۆتىدۇ. ئۆپكە جىڭلوسى (肺经) نىڭ كۆپ قىسمى مۇشۇ يەردىن ئۆتىدۇ. ئەگەر بۇ جىڭلو (经络) بىر ئۇزۇلۇپ بىر داۋام قىلىپ رەڭگى ئۆزگەرسە، نەپەسلىنىش، قان ئايلىنىش سىستېمىسىنىڭ راۋان ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ، بۇ ئەزالاردا توسالغۇ پەيدا بولۇش ئېھتىماللىقىمۇ بار.

نەپەسلىنىش ئادەم ھاياتىنىڭ مۇھىم بەلگىلىرىنىڭ بىرى. بۇ مەندىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھاياتلىق سىزىقچىسى ئادەمنىڭ ھاياتى بىلەن



مۇناسىۋەتلىك، ئۇنداق بولغانىكەن بۇنى ئەقىلگە مۇۋاپىق ئەمەس دېگىلى بولمايدۇ.

ئىلگىرى 50 ياش ئۆپچۆرسىدە بىر ئالىم قىزىقارلىق بىر تۈرلۈك تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان. ئۇنىڭ تەكشۈرگىنى ئالىقان سىزىقچىلىرىغا قاراپ پال بېقىشنى ستاتىستىكا قىلغان. نەتىجىدە كېسەللىك جەھەتتە ئۆپكە كېسەلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولۇپ، تەخمىنەن 80% تىن كۆپرەكىنى ئىگىلىگەن. بۇنىڭدىن شۇنى ئويلاپ يەتەكلى بولىدۇكى، ھاياتلىق سىزىقچىسى ئارقىلىق تەن سالامەتلىك ئەھۋالى، ھەتتا ئۆمۈرنى ئالدىن پەرەز قىلىش، ئەمەلىيەتتە جۇڭگو تېبابىتىدە ئۆپكە جىڭلوسى (肺经) ئارقىلىق كېسەللىكلەرگە ھۆكۈم قىلىش بىلەن باراۋەر. ئۆپكە قىسمىدىكى كېسەللىكلەر توغرىسىدىكى پەرەزنىڭ توغرا چىقىش نىسبىتىنىڭ بۇنداق يۇقىرى بولۇشى، جۇڭگو تېبابىتى نۇقتىسىدىن قارىغاندا مۇقەررەر ئىش.

ھاياتلىق سىزىقچىسىنىڭ بىر ئۈزۈلۈپ بىر داۋام قىلىش ھالىتىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، نەپەسلىنىش ئەزالىرىدا توسالغۇ پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئەڭ ياخشى ئۇسۇل باش بارماق تىرىقچىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاۋشاڭ (少商) پەللىسىنى دائىم ئۇۋۇلاشتۇرۇش. شۇنداقلا باش بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىنى ئىنچىكىلىك بىلەن ئۇۋۇلسا، ئالدىن بەلگىلەنگەن ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. شاۋشاڭ (少商) پەللىسى ئۆپكە جىڭلوسىنىڭ پەللىسى بولۇپ، غىدىقلاپ بەرسىلا تەبىئىي ھالدا ئۆپكە جىڭلوسىنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇپ، نەپەسلىنىش ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدارىنى يەنىمۇ جانلاندۇرىدۇ. ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن، كۆڭۈلدە سان بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، دەرھال ھاياتلىق سىزىقچىڭىزنى تەكشۈرۈپ بېقىڭ.

ئاشقازان - ئۈچەي كېسەللىكلىرى بىلەن تۇتۇقلاشقان ئەقىل - پاراسەت سىزىقچىسى

ئەقىل - پاراسەت سىزىقچىسى تۇتۇق، ئۇنىڭ ئۈستىگە بىر ئۈزۈلۈپ بىر داۋام قىلىش ئەھۋالى بولسا، بۇ ئاشقازان ياكى ئۈچەي قاتارلىق ھەزىم قىلىش ئەزالىرى ئىقتىدارىنىڭ ياخشى بولمىغانلىقىدىكى خەتەرلىك سىگنال.




ئەقىل - پاراسەت سىزىقى - چىسى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدە بولۇپ، ئالقاند - نى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتدۇ. بۇ سىزىقچىدا ئايلىنىدىغان جىڭلو (经络) ئۈچەي جىڭ - لوسى، دېمەك ئەقىل - پاراسەت سىزىقچىسى چوڭ ئۈچەي بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ھەزىم قىلىش ئەزالىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ئاشقازان، ئۈ - چەيلەرنىڭ ئاجرىتىپ چىقىرد - شى راۋان بولمىغاندا، قاننىڭ رەڭگى تەبىئىي ھالدا ناچارلى - شىدۇ. يۇقىرىقى ئالامەتلەر كۆ - رۈلگەن كىشىلەر ناھايىتى ئا - سانلا ھەزىم قىلىش ئەزالىرى كېسەللىكىگە گىرىپتار بولىدۇ ياكى توسالغۇ پەيدا بولىدۇ.

ئەقىل - پاراسەت سىزىقچىسى تۇتۇقلاشقاندا، ئۆز ۋاقتىدا شاڭ ياكى پەللىسى ھەم كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىنى ئۇۋۇلاش كېرەك.

ئەقىل - پاراسەت سىزىقچىسىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە، ئالدى بىلەن ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكى پەيدا بولۇشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەڭ ياخشى ئۇسۇل كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاڭ ياك (商阳) پەللىسىنىڭ ئىككى تەرىپىنى ھەم كۆرسەتكۈچ بار - ماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىنى ئۇۋۇلاش. مۇشۇنداق تەكرار غىدىقلىغاندا بەدەننىڭ ئىچكى قىسمىدىكى قان ئايلىنىشى تەبىئىي راۋانلاشتۇرغىلى، ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى جانلاندۇرغىلى، يېنىڭ دەرىجىدىكى كېسەللەرنى تېزلىكتە ساقايتقىلى بولىدۇ.

ئىچكى ئەزالاردا نورمالسىزلىق كۆرۈلسە مۇھەببەت سىزىقچىسىغا دىققەت قىلىش

يىڭنە سانجىپ داۋالاش دوختۇرلىرى پالچى ئەمەس، شۇڭا ئالىقان سىزىقچىلىرىغا قاراپ بىر ئادەمنىڭ ئۆتمۈشى، بۈگۈنى ياكى كەلگۈسى تەقدىرىنى ئالدىن پەرەز قىلالايدۇ. ئەمما، ساغلاملىق جەھەتتە ئالىقان سىزىقچىلىرىدىكى ئۆزگىرىشتىن توغرا ھۆكۈم چىقىرالايدۇ. مەسىلەن: مۇھەببەت سىزىقچىسىنى، كۆپچىلىكنىڭ بىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن، ئۇ چىمچىلاق يېنىدىن باشلىنىدۇ. بۇ يەردە ئارتۇقچە سۆزلەش ھاجەتسىز. ئەمەلىيەتتە چىمچىلاق بىلەن مۇھەببەت سىزىقچىسىنىڭ مۇناسىپ قىسمى قول ئالىقىنىنى ئۇۋۇلاش بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك.



جۇڭگو تېبابىتىدە دېيىلىدىغان جىڭلو (经络) لار ئارىسىدا چىمچىلاق ئايلىنىدىغانلىرىدىن يۈرەك ۋە ئىنچىكە ئۈچەي جىڭلوسى بار. بۇ نىڭدىن كۆرۈشكە بولىدۇكى، مۇھەببەت سىزىقچىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى قويۇق. شۇڭا، مۇھەببەت



مۇھەببەت سىزىقچىسىدا نورمالسىزلىق كۆرۈل-
گەندە شاۋ چۆك، شاۋزې پەللىلىرىنى ئۆز ۋاق-
تىدا بېسىش ھەم چىمچىلاق بىرىنچى بوغۇ-
منى ئۇۋۇلاش كېرەك.

سىزىقچىسىدا نورمالسىزلىق كۆ-
رۈلگەندە، يۇقىرىقى جىڭلولاردا
تەبىئىي ھالدا ئەگەشمە نورمال-
سىزلىق پەيدا بولىدۇ.

ئېغىر يۇقىرى قان بېسىم
كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىر
كېسەل، كېسەل كۆرسىتىش ئۇ-
چۇن مېنى ئىزدەپ كەپتۇ، مەن
ئۇنىڭ مۇھەببەت سىزىقچىسى-
نىڭ رەڭگى ناچارلىشىپلا قالماي،
بىر ئۇزۇلۇپ، بىر داۋام قىلغان
ھالەتتە ئىكەنلىكىنى بايقىدىم.

يۇقىرى قان بېسىمى يۈرەك جىڭلوسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان
بىر خىل يۈرەك كېسەللىكى. بۇنىڭدىن كۆرۈشكە بولىدۇكى، چىمچىلاق
جىڭلوسى بىلەن مۇھەببەت سىزىقچىسى ئايرىلالمايدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا، مۇھەببەت سىزىقچىسىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلسە،
چىمچىلاق جىڭلوسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىچكى ئەزالاردا قان
ئايلىنىش ياخشى ئەمەسلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. مەسىلەن: ئىنچىكە ئۇ-
چەي، ئاشقازان، دوۋساق قاتارلىق ئەزالارنىڭ قان ئايلىنىشىدا توسالغۇ بار
دېگەن گەپ. شۇڭا، مۇھەببەت سىزىقچىسىنىڭ رەڭگى ئەقىل — پاراسەت
سىزىقچىسى ۋە ھاياتلىق سىزىقچىسى بىلەن ئوخشىمىسا ياكى بىر ئۇ-
زۇلۇپ بىر داۋام قىلىش ھادىسىسى كۆرۈلسە، كېسەللىك ئالامىتى بار—
يوق بولۇشتىن قەتئىينەزەر دەرھال داۋالاش تەدبىرى قوللىنىش كېرەك.


ئالدى بىلەن چىمچىلاق تىرىقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاۋچۆك
(中) پەللىسى بىلەن شاۋزې (泽) پەللىسىنى ئۇۋۇلاش، ئاندىن
چىمچىلاقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىنى پۈتۈنلەي ئۇۋۇلاش كېرەك. ئەگەر
شاۋزې پەللىسىنى باسقاندا ئاغرىسا، ئىچكى ئەزالاردا قان ئايلىنىشنىڭ
ياخشى ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ، بۇ ۋاقىتتا قايتا ئاغرىمايدىغان بولغىچە

كۈچەپ بېسىپ ئۇۋۇلاش كېرەك.

قول دۈمبىسىگە ئۇرۇپ ئاشقازان يارىسىغا دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ

بىر جۈگىيى دوختۇرى مۇنداق بىر تەجىربىە ئىشلىگەن: بىر تال بامبۇك تاياق بىلەن كېسەلنىڭ قول دۈمبىسىگە ئۇرغان، ئوخشاش كۈچ بىلەن ئۇرغاندا بەزىلەر ئاغرىقتىن ۋايىجانلاپ كەتكەن، بەزىلەر ھېچ ئىش بولمىغاندەك تۇرغان. بۇ نېمە ئۈچۈن؟

جۇڭگو تېبابەت نەزەرىيىسى بىزگە شۇنى ئېيتىدۇكى، ئاشقازان يارىسى بار كىشىلەرنىڭ قول دۈمبىسى يېنىك دەرىجىدىكى غىدىقلاشقا ئۇچرىسا ئادەتتىكى ئادەملەرگە قارىغاندا قاتتىقراق ئاغرىق ھېس قىلىدۇ. بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، قول دۈمبىسىنىڭ دەل ئوتتۇرىسى «كۆكرەك — قورساق رايونى» دەپ ئاتالغاچقا، بۇ جاي قان يىغىلىپ قالغاندەك سۆسۈن ياكى قاتتىق كۆرۈنسە ياكى باسقاندا بەزىدە قاتتىق ئاغرىسا، بۇ ئالامەتلەر بۇ ئا-



دەمنىڭ پات ئارىدا ئاشقازان يارىسىغا گىرىپتار بولىدىغان. لىقىنى بىلدۈرىدۇ، كېسەللىك ئەھۋالىنى تىزگىنلەش ئۈچۈن دەرھال ئۇۋۇلاش كېرەك.

دائىم «كۆكرەك — قورساق رايونى» نى غىدىقلاش ھەم ئۇۋۇلاش بۇ رايوندىكى نورمالسىز رەڭ ياكى قېتىش-مىلارنى يوقىتىپلا قالماي، يەنە ئاشقازان دىۋارىنى قېلىنلاش-تۈرۈپ، ئاشقازان يارىسىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

كۆكرەك - قورساق رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسە ئاشقازان يارىسى قوزغىلىشتىن ساق-لانغىلى بولىدۇ.

قول ئالقىنى بېسىش ئارقىلىق يۈرەك كېسىلىگە ھۆكۈم قىلىش

ئالقان مەركىزىنىڭ كەسپىي نامى «يۈرەك قېپى رايونى». بۇ رايون ئوتتۇرا بارماقتىن باشلانغان يۈرەك قېپى جىگىلوسى بىلەن بىۋاسىتە تۇتىشىدۇ. يۈرەك قېپى جىگىلوسى يۈرەك پائالىيىتىنىڭ ياردەمچى جىگىلوسى (经络)، يۈرەك قېپى رايونىغا تۇتاشقاچقا، «يۈرەك سالىدۇ». گەرچە كۆزگە چېلىقمىسىمۇ، ئەڭ كۈچلۈك جىگىللارنىڭ بىرىدۇر. جىددىيلەشكەندە، ئالقانى بېسىپ بەرسە جىددىيلىكنى تۈگەتكىلى بولىدۇ.

يۈرەك قېپى رايونى يۈرەكتىكى نورمالسىزلىقنى ئالدىن بىلگىلى بولىدىغان بىر مۇھىم رايون. ئەگەر يۈرەك قېپى رايونى باسقاندا قاتتىق ئاغرىسا ياكى باشقا جايغا قا-



رغاندا قاتتىق، بەك يۇمشاق، بەك سوغۇق ياكى بەك ئىسسىق بولۇشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلسە، دىققەت قىلىڭكى، سىزنىڭ يۈرىكىڭىزدە نورمالسىزلىق كۆرۈلگەن بولۇشى مۇمكىن. گەرچە «ئىشتىن ئاۋۋال ئوبدان تەييارلىق كۆرۈش» دېگىلى بولمىسىمۇ،

ئەمما يۇقىرىقى ئالامەتلەر بايقالغان ھامان تېزىدىن يۈرەك قېپى رايونىنى ئۇۋۇلاش بىلەن بىللە ئىككى قولىنى سۈركەپ غىدىقلىغاندا، كۆپ ۋاقىت سەرپ قىلمايلا نورمال ھالەتنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

يۈرەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان يەنە بىر رايون «ئىخلاس رايونى» نى (精心区) بولۇپ، ئۇ نامسىز بارماق بىلەن چىمچىلاق ئارىسىدىكى بارماق تۈۋى قىسمىغا جايلاشقان. ئىخلاس رايونى چىمچىلاقتا ئايلىنىپ

تورىدىغان يۈرەك جىڭلوسى بىلەن ئۆزئارا جىپسىلاشقان بولۇپ، يۈرەك ئىقتىدارىنى مەلۇم دەرىجىدە تىزگىنلەش رولى بار. ئۇنىڭ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى، ئۆزگىرىش ھالىتى، داۋالاش ئۇسۇلى قاتارلىقلار يۈرەك قېپى را-يونى بىلەن ئوخشاش.

قول دۈمبىسىنى بېسىش ئارقىلىق ئىككى پۇت ۋە بەل نېرۋىسى ئاغرىقىنى بىلگىلى بولىدۇ

بىر كۈنى ئۆيۈمگە بىر مېھمان كەلدى. ئۇ ئىستاكىنى كۆتۈرۈپ چاي ئىچمەكچى بولىۋىدى، تۇيۇقسىز قاتتىق يۆتىلىپ كېتىپ، بەدىنى قاتتىق ئاغرىغاندەك تەۋرىنىپ كەتتى. يۆتەل توختىشىغا ئۇ بەدىنىنى رۇسلاپلا «ۋايىجان» دەپ قاتتىق تۈۋلۈۋەتتى.

مەن قىياسەن: «نېرۋا ئاغرىقىمۇ» دەپ سورىدىم، شۇنداقلا بۇنى توغرا تاپمىغان ھالدا: «بۇنىچىلىك ياش تۇرۇپ قانداقسىگە نېرۋا ئاغرىقىغا گى-رىپتار بولۇپ قالغانسىز؟» دەپ بولۇپ، «قوللىڭىزنى بېرىڭە كۆرەي» دېدىم. بارمىقىمنىڭ ئۇچى بىلەن ئۇنىڭ قول دۈمبىسىنى كۈچەپ بېسىۋىدىم، ئۇ



نېرۋىتى، بەل، پۇت رايونى

تەبىئىي ھالدا يەنە «ۋايىجان» دەپ ۋارقىراپ كەتتى. مەن باسقان ئورۇن «ئومۇرتقا، بەل، پۇت رايونى» بولۇپ، بۇ يەر بەل ۋە ئىككى پۇت نېرۋا ئاغرىقىغا ئەڭ سەزگۈر رايون.

ئادەتتە، بەلدىن پۇتقىچە نېرۋا ئاغرىقىنى ئومۇرتقا تۈۋرۈ-كى ياكى بۇلۇننىڭ قېرىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ ئوت-

تۇرا ياشتىن كېيىن بولىدىغان كېسەللىك ئىدى. ئەمما ياش ئادەمدە كۆ-رۈلۈشى پەقەت قىسقا ۋاقىتلىق چارچاش ياكى سوغۇق، نەملىك قاتارلىقلار



كەلتۈرۈپ چىقارغان كېسەللىك ھېسابلىنىدۇ. لېكىن بۇ خىل كېسەللىك ئالامىتىنى كۈچلۈك ھەرىكەت قىلمىسىلا سەزگىلى بولمايدۇ. شۇڭا، دەسلەپكى مەزگىلدە ئاسانلا سەل قارىلىدۇ. ھالبۇكى، كېسەللىك يامراشقا باشلىغاندا مەدەنىيەت قورساق، كاسسىدىن يوتا كەينى تەرىپىگىچە چېتىپ قويغاندەك نېرۋا ئۇيۇشۇپ ئاغرىيدۇ.

نېرۋا ئاغرىقىنى تەكشۈرۈش ۋە ئالدىنى ئېلىش ئورنى «ئومۇرتقا. بەل. پۇت رايونى» دۇر. مەسىلەن: سىز سوغۇقتا توڭلىغان ياكى بەدىنىڭىزنىڭ چارچىغانلىقىنى سەزگىنىڭىزدە، بۇ رايوننى كۆزەتسىڭىز بولىدۇ. ئەگەر نورمال بولمىغان سۆسۈن رەڭ پەيدا بولغانلىقى بايقالسا ياكى باس-قاندا ئاغرىسا پۇت قىسمىدىن بەل قىسمىگىچە بولغان نېرۋىلاردا ئاغرىق پەيدا بولۇش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئەڭ ياخشى غىدىقلاش ئۇسۇلى — چىش كولىغۇچىنى دەستلەپ بوغۇپ ياكى ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈجە ئارقىلىق داڭلاپ داۋالاشتۇر. شامالدىرغۇچىنىڭ ئىسسىق شامىلىدىن پايدىلانسىمۇ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. بۇ رايون قايتا ئاغرىمىسا نېرۋا ئاغرىقى ئازابىنىڭ ئازايغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

گال ياللۇغلىنىپ قالسا قول دۈمبىسىدىن ئوتتۇرا بارماق تۈۋىنى كۆزىتىش

بىر رادىئو ئاڭلاتقۇچى ئاشقازان كېسىلى سەۋەبىدىن كېسەل كۆر-سەتكىلى كەپتۇ، ئۇ ئاشقازان كېسىلى بولۇپ قېلىشنىڭ سەۋەبىنى سۆزلىگەندە چىرايىدىن بىر خىل ئەنسىزلىك چىقىپ تۇراتتى، چۈنكى كەسپىي خىزمەت تۈپەيلىدىن ئۇنىڭ كېڭىيىدىكى ئاسانلا ياللۇغلىنىپ قالىدىكەن. شۇڭا، ھەر قېتىم پروگراممىغا رىياسەتچىلىك قىلىشتىن ئىلگىرى ئاۋازى پۈتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، چوقۇم دورا يېمىسە بولمايدىكەن. كۈنلەر، ئايلار ئۆتكەنسېرى دورا مىقدارى ئۈزلۈكسىز كۆپىيىپ ئاخىرى ئاشقازاننى بۇزۇپتۇ.

ئۇنىڭ يامان خاراكتېرلىك ئايلىنىش جەريانىنى ئاڭلاپ بولۇپ، ئۇ-



گۈرۈچنى بويۇن، يۇتقۇنچاق رايونغا پلاستىر بىلەن چاپلىسا، كېكرىدەك ياللۇغ-
لىنىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

نىڭغا كېكرىدىكىنىڭ ياللۇغلانغانلىقىنى ئالدىن بىلىش ۋە ئالدىنى ئې-
لىش ئۇسۇلىنى ئۆگىتىپ قويدۇم.

كېكرىدەكنىڭ ياللۇغلانغان ياكى ياللۇغلانمىغانلىقىنى بىلمەكچى
بولسا، قول دۈمبىسىدىكى ئوتتۇرا بارماق تۈۋىدىكى «بويۇن. يۇتقۇنچاق
رايونى» نى كۆزەتسە بولىدۇ. ئەگەر قان يىغىلىپ قالغاندەك سۆسۈن رەڭ
بولسا ياكى باسقاندا ئاغرىسا، كېكرىدەكنىڭ ياللۇغلىنىش ئالدىدا تۇرغان-
لىقىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا بۇ رايوننى تاكى ئاغرىق يوقالغىچە ئۈز-
لۈكسىز غىدىقلاش كېرەك. ئەگەر ئاغرىق يوقالسا كېكرىدەكنىڭ ياخشى
بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

كېكرىدەكنىڭ ياللۇغلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر
ناھايىتى كۆپ. مەسلەن: ھاراقنى ھەددىدىن زىيادە كۆپ ئىچىش، تاماكنى
ھەددىدىن زىيادە كۆپ چېكىش، كىلىماتنىڭ نورمالسىزلىقى ياكى زۇكام-
دىن بولغان بادام بەز ياللۇغى قاتارلىقلار. ئالدىدا تىلغا ئېلىنغان ھېلىقى
رادىئو ئاڭلاتقۇچىنىڭ كەسپىي ئامىل سەۋەبىدىن دائىم كېكرىدىكى يال-
لۇغلىنىپ قالغان، بەزىلەرنىڭ بەدەن ساپاسى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك.
مەيلى قانداق سەۋەبتىن قوزغالغان كېكرىدەك ياللۇغى بولۇشتىن قەتئ-
ئىينەزەر، بىر نەچچە تال گۈرۈچنى «بويۇن. يۇتقۇنچاق رايونى» غا قويۇپ،
ئاندىن پلاستىر بىلەن مەزمۇت چاپلىسا بولىدۇ. بۇ ئۇسۇلنىڭ كېكرىدەك

ياللۇغى پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئۈنۈمى بەك ياخشى. ئۇنىڭدىن باشقا، «بويۇن. يۇتقۇنچاق رايونى» نى ئۇۋۇلاش بويۇن، مۇرە ياكى ئۈي-قۇسزلىقتىن كېلىپ چىققان سىر قىراپ ئاغرىشلارغا ئالاھىدە ئۈنۈمى بار. بىر نەچچە تال گۈرۈچنى ئېلىپ بۇ رايوننى تەكرار ئۇۋۇلاپ، پلاستىر بىلەن مەزمۇت قىلىپ چاپلاپ قويسا، ئاغرىقنى تېز سۈرئەتتە يوقاتقىلى بولىدۇ.

ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىدا ئوتتۇرا بارماق تۈۋى سۆسۈن رەڭ بىلەن سىگنال بېرىدۇ

بىر قېتىم بىر ئائىلە باشلىقى باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ 4 - يىللىقىدا ئوقۇيدىغان ئوغلىنى ئېلىپ كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ. ئۇ ماڭا: «دوخ-تۇر، بۇ بالىنىڭ ھەمىشە توختىماي ماڭقىسى ئاقىدۇ، نېمە ئۈچۈنكىن ھەر قانچە داۋالاتساقمۇ ساقايىدى» دېدى. بۇ بالىنىڭ تومۇرىنى تۇتقاچ ئۇنىڭ ئاللىقىنى كۆزىتىپ، ئۇنىڭ ئوتتۇرا بارماق تۈۋىدە قان يىغىلىپ قالغاندەك سۆسۈن رەڭ بارلىقىنى بايقىدىم.

ئوتتۇرا بارماق تۈۋى دەل «قۇلاق. يۇتقۇنچاق رايونى» بولۇپ، بۇ رايون قۇلاق بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ئۇ بالا ئەگەر يېنىك زۇكام بولغان بولسا، قول ئاللىقىنىدا ئىنكاس روشەن بولغان سۆسۈن رەڭ بولمىغان بو-

لاتتى. دەرۋەقە ئۇنىڭ زۇكىمى يې-نىك ئەمەس ئىدى. سۆسۈن رەڭ بەك قېنىق بولسا، باسقاندا جەزمەن قات-تىق ئاغرىيدۇ. مەن سىناپ بېقىش ئۈچۈن ئۇنىڭ سۆسۈن رەڭلىك «-قۇلاق. يۇتقۇنچاق رايونى» نى ئۇۋۇ-لىدىم. بالا دەرۋەقە ۋايىجانلاپ كەتتى. مېنىڭ دىئاگنوزۇمغا ئاساسلا-



نغاندا بۇ بالا چوقۇم ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان. گەرچە ئەينى ۋاقىتتا ئۇ ئۆزى ھەر قانداق كېسەللىك ئالامىتىنى سەزمىگەن، ئەمما زۇكام بولغان ۋاقىتى بەك ئۇزۇن بولغاچقا، ئۇنىڭ ئاڭلاش سېزىمىغا تەسىر يەتكۈزگەن.



ھەر جەھەتتىن كۆزىتىش ئارقىلىق مەن بۇ بالغا بەزى ئادەتلىك دىي داۋالاش ئۇسۇلىنى ئۆگەتتىم. ئالدى بىلەن «قۇلاق» يۇرتقۇنچاق رايونى «نى ئۇۋۇلاش ھەم ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈجە بىلەن

7 قېتىمدىن 10 قېتىمغىچە داغلاپ داۋالاش (ھەر قېتىملىق داغلاپ داۋالاش قېتىم سانى ۋە ۋاقىتنىڭ ئۇزۇن — قىسقىلىقى ئۇ كىشىنىڭ قوبۇل قىلىش دەرىجىسىگە قاراپ بولىدۇ)، ئارقىدىنلا ئوتتۇرا بارماق تىرىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى جۈڭ چۈڭ (中冲) پەللىسىنى ئۇۋۇلاش. ئىككى — ئۈچ كۈن مۇشۇنداق تەكرار داۋاملاشتۇرسا سۆسۈن رەڭ ئاستا — ئاستا يوقىلىدۇ. بىر نەچچە كۈندىن كېيىن ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىمۇ ساقىيىدۇ.

ئاللىقاندىكى (ياڭ شى) پەللىسى ئارقىلىق يۇقىرى قان بېسىمىنى ئۆزى پەرەز قىلىش

— «دوختۇر، قاراڭ، مېنىڭ بۇ يېرىمدە قانداقسىگە تومۇر سوقىدۇ؟، بىرەر مەسىلە بارمۇ — نېمە؟».

ئىككى يىل ئىلگىرى بىر كېسەل چىرايى ئالاقىزادە ھالدا مەندىن مۇشۇنداق بىر سوئالنى سورىۋىدى، دەماللىققا ھاڭۋېقىپلا قالدىم. سوراڭ ئارقىلىق ئاندىن ئەسلىدە ئىنتايىن ئاددىي بىر ئىش ئىكەنلىكىنى ئايدىڭلاشتۇردۇم. ئۇ مېنىڭ چۈشەندۈرۈشۈمنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئىختىدار بىلەن كۈلۈپ كەتتى.

ئادەتتە ھەممە ئادەم قول بېغىشىنىڭ ئىككى تەرىپىدە چوڭ تومۇر-
نىڭ بارلىقىنى بىلىدۇ.

ئەمەلىيەتتە، ئادەم بەدىنىدىكى چوڭ تومۇلار بۇ يەردىن باشقا يەنە
نۇرغۇن يەردە بار. مەسىلەن: ھې-




لىقى كېسەل تومۇر سوققان جاي-
نى چۈشەنەلمىگەن، ئەمەلىيەتتە بۇ
قول دۈمبىسىدىكى ياڭ شى (阳
溪) پەللىسىدۇر.

ياڭ شى پەللىسى قول دۈم-
بىسىدە بولۇپ، «قان بېسىمى
ئىنكاس رايونى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
بۇ پەللە يۇقىرى قان بېسىمىنىڭ
دەسلەپكى مەزگىلىدىكى ئالامەت-
لىرىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بەرگەچ-
كە، ئىنتايىن مۇھىم پەللە ھې-

سابلىنىدۇ. ياڭ شى پەللىسىنى غىدىقلىغاندا قاتتىق ئاغرىسا، ئۇنداقتا قان
بېسىمىڭىز 180mmHg ~ 160mmHg غا ئۆرلىگەن بولىدۇ. يۇقىرىدا تىلغا
ئالغان ھېلىقى كېسەلنىڭ قان بېسىمىنى ئۆلچەۋىدىم، دەرۋەقە
160mmHg دىن ئېشىپ كېتىپتۇ. ھالبۇكى، ئۇ پەقەت ياڭ شى پەللى-
سىدىكى تومۇر سوقۇشقا دىققەت قىلىپ، باشقا نورمالسىزلىقنى قىلچە
سەزمىگەندەك تۇرىدۇ. تەكشۈرۈش نەتىجىسى ئۇنىڭ ئېغىر قان بېسىمىغا
گىرىپتار بولغانلىقىنى ئىسپاتلىدى،

بۇ نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، داۋالاش ئۇسۇلى ياڭ شى پەللىسىنى
غىدىقلاش، بەلكى چوقۇم كۈچلۈك غىدىقلىغاندىلا داۋالاش ئۈنۈمىگە ئې-
رىشكىلى بولىدۇ. بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، كېرەكسىز نەرسىلەر قان تومۇر-
لاردا يىغىلىپ قېلىپ، قان ئايلىنىش توسالغۇغا ئۇچراشنى كەلتۈرۈپ
چىقارغاچقا، ئۇۋۇلاش ئانچە چوڭ رول ئوينىيالمىدۇ. ئەڭ ياخشى ئۇسۇل
ئون نەچچە تال چىش كولىغۇچىنى باغلاپ، ياڭ شى پەللىسىنى كۈچلۈك

غىدىقلاشتۇر.




بىر باغلام چىش كولىغۇچ بىلەن ياك شى
پەللىسىنى غىدىقلىسا، يۇقىرى قان بېسىمى
مىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

قان بېسىم ئىنكاس
رايونىدا ياك شى پەللىسىدە
دىن سىرت، يەنە خې گۇ
(合谷) ۋە لولىڭ ۋۇ (落
零五) پەللىسى بار. قان
بېسىمى $180 \sim 200 \text{ mmHg}$
بولسا، خې گۇ پەللىسىنى
ئۇۋۇلاش، ئەگەر 200 mmHg
دىن ئېشىپ كەتسە، لولىڭ
ۋۇ پەللىسىنى ئۇۋۇلاش كېرەك.
ئىككى پەللىنى تەرەپ-
تىپ بويىچە ئۇۋۇلىسىمۇ
بولىدۇ.

ئاشقازان يالۇغىدا كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمىنىڭ بىر نۇقتىسى ئاغرىيدۇ

مېنىڭ بىر دوستۇم بار بولۇپ، ئۇ قارىغا ئېتىش تەنھەرىكەتچىسى
ئىدى. بىر كۈنى مەن ئۇنى يوقلاپ بېرىپ، دەل قارىغا ئېتىش مەشىق
مەيدانىدا ئۇنىڭ بىلەن ئۇچراشتىم. ئۇ مېنىڭ كەلگىنىمنى كۆرۈپ خۇش-
شال كەيپىياتتا ماڭا قارىغا ئېتىش ماھارىتىنى كۆرسەتتى. ئۇنىڭ قارىغا
ئېتىش ماھارىتىنى خېلى يامان ئەمەس دېيىشكە بولاتتى، ئەمما مەن بەزى
چايلارنىڭ ئانچە قولايلىقىنى ھېس قىلىپ قالدىم. ئۇ كۆر-
سەتكۈچ بارمىقىدا ئەمەس ئوتتۇرا بارمىقىدا تەپكىنى باستى. تەبىئىي
بولمىغان بۇ ھەرىكەت مېنى ئەجەپلەندۈردى. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭدىن
سەۋەبىنى سورىدۇم. ئۇ: «نېمە بولىدىكەن كۆرسەتكۈچ بارمىقىمنىڭ بو-
غۇمى بىر ئاز ئاغرىيدۇ، ئوتتۇرا بارمىقىمنى ئىشلەتمەي بولىمىدى» دەپ



جاۋاپ بەردى. ئۇنىڭ گېپى-
نى ئاڭلاپلا مەن ئۇنىڭ
ئاشقازان ياللۇغىغا گىرىپتار
بولغانلىقىنى بىلىدىم.


كۆرسەتكۈچ بارماق-
نىڭ قول دۈمبىسىگە يېقىن
2 - بوغۇمىدا بىر پەللە بو-
لۇپ، ئالدى تەرەپ نۇقتىسى
چىيەن تۇۋىدىيەن (前头)

(点) دېيىلىدۇ. بۇ نۇقتا ئاشقازان ياللۇغىنىڭ ئىنكاس نۇقتىسى بولۇپ،
تۆت ئەتراپىنىڭ رەڭگى سۆسۈن رەڭگە كىرسە ياكى باسقاندا ئاغرىسا، بۇ
ئاشقازان ياللۇغىنىڭ بەلگىسى بولىدۇ.

ئاشقازان ياللۇغىنى قوزغايدىغان سەۋەبلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ،
سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغىنىڭ كۆپىنچىسى يېمەك — ئىچمەك تەڭشەل-
مەسلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بايا تىلغا ئالغان قارىغا ئېتىش تەنھەرد-
كەتچىسىنىڭ يېمەك — ئىچمەك ناھايىتى قانۇنىيەتسىز، ئۇنىڭ ئۈس-
تىگە تاماقنى تېز يەيدۇ، ھەر كۈنى يەنە ئون نەچچە تال تاماكا چېكىدۇ.
شۇنداقلا ئالاھىدە كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغاچقا، كۈن بويى جىددىيچى-
لىكتە ئۆتىدۇ. مۇشۇنداق ئەھۋالدا ئاسانلا ئاشقازان ياللۇغىغا گىرىپتار بولىدۇ.
ئاسانلا ئاشقازان ياللۇغىغا گىرىپتار بولىدىغانلار ئادەتتە ئالدى تەرەپ
نۇقتىسى (前头点) دىكى ئۆزگىرىشكە كۆپرەك دىققەت قىلىش كېرەك.
ئەگەر رەڭگى ئۆزگىرىش، ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈل-
سە، ئۆز ۋاقتىدا غىدىقلاش كېرەك. غىدىقلاش ئۇسۇلىدا چىش كولغۇچ
بىلەن داغلىسىمۇ، ئوت يېقىلغان يىپسىمان كۈچە بىلەن داغلاپ داۋال-
سىمۇ بولىدۇ.

جىگەر ۋە ئۆتكە تاش چۈشسە نامىزىز بارماقنى ئۇۋۇلاش

بۇ يىل باھار بايرىمىدا، مەن بىر دوستۇمنىڭ تويىغا قاتناشتىم. زد-
ياپەتتە يېنىمدا 40 نەچچە ياشلىق بىر ئايال ئولتۇرغان ئىدى. ئۇنىڭ يۈ-
رۈش - تۇرۇشى ئالاھىدىرەك بولغاچقا، دىققىتىمنى تارتتى. دەسلەپتە ئۇ
ئىزچىل قوشۇمىسىنى تۈرۈپ، بىر قولىدا كۆكسىنى باساتتى، بەزىدە يەنە
كۆرسەتكۈچ بارمىقىنىڭ ئۈچى بىلەن بېشىغا ئۇرۇپ ئارامىدا ئولتۇرالمىدى.
ۋاتاتتى. مەن ياخشى نىيەت بىلەن ئۇنىڭدىن : «بىئارام بولىۋاتامسىز؟»
دەپ سورىدۇم. ئۇ: «ھېچقىسى يوق، بېشىمنىڭ يېرىمى ئاغرىۋاتىدۇ،
مەيدەمدە ئازىراق بىئاراملىق بار» دەپ جاۋاب بەردى. ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭ-
لاپ بولۇپ: «قوللىرىڭنى كۆرۈپ باقسام بولامدۇ» دېدىم ۋە ئۇنىڭ نامىزىز
بارمىقىنىڭ ئىككىنچى بوغۇمىنى ئۇۋۇلىدىم. قولىمنى ئاپىرىشىمغا، ئۇ



شەققە نۇقتىسى

ھېچنېمىنى چۈشەنمىگەن ھالدا
ۋارقىراپ: «بۇ يەر نېمىشقا بۇد-
چىلىك قاتتىق ئاغرىيدىغاندۇ؟»
دېدى. بۇ ئايالنىڭ بېشىنىڭ
يېرىمى ۋە كۆكرىكىنىڭ ئاغرىد-
شى ئەمەلىيەتتە سەنجىياۋ جىڭ
جىڭلوسى (三焦经) تەڭ-
پۇڭلۇقىنى يوقاتقانلىقتىن كې-
لىپ چىققان. سەنجىياۋ جىڭ

جىڭلوسى نامىزىز بارماق ئۈچىدىن باشلىنىدىغان جىڭلو (经络) بو-
لۇپ، ئادەم بەدىنى ھاياتلىق ئېنېرگىيىسىنىڭ مەنبەسى، يەنى ئورگانىزم-
نىڭ فېزىئولوگىيىلىك ئىقتىدارى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. سەنجىياۋ
جىڭ جىڭلوسىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلسە، ئاياللاردا دائىم بېشىنىڭ يې-
رىمى ئاغرىش، مۇرىسى ئاغرىش، كۆكرىكى مۇجۇپ ئاغرىش قاتارلىق ئالا-


مەتلەر كۆرۈلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا جىگەر ۋە ئۆتتە كېسەللىك بار — يوقلۇقىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك.

ئادەمنىڭ نامسىز بارمىقىنىڭ قول دۈمبە تەرىپىدىكى ئىككىنچى بوغۇمدا پىيەن تۇۋىدىيەن نۇقتىسى (偏头点) بار بولۇپ، بۇ نۇقتىدىن سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىدا نورمالسىزلىقنىڭ بار — يوقلۇقىنى ئالدىن بىلگىلى بولىدۇ. پىيەن تۇۋىدىيەن نۇقتىسىدىكى تېرە قېتىپ، نورمالسىز سۆسۈن رەڭلىك كۆرۈنسە ياكى باسقاندا ئاغرىسا، سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىنىڭ نورمال ئەمەسلىكىنى، ئۆز ۋاقتىدا پىيەن تۇۋىدىيەن نۇقتىسىنى ئۇۋۇلاپ، ئىچكى ئاجرىتىشنى راۋانلاشتۇرۇش كېرەكلىكىنى چۈشەندۈردى. پىيەن تۇۋىدىيەن نۇقتىسىنى بىر مەزگىل ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندىن كېيىن يەنە ئاغرىمىسا، ئۇنداقتا سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىنىڭ نورمال ھالەتكە يەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

بايا تىلغا ئالغان ھېلىقى ئايالنىڭ قولىدىكى پىيەن تۇۋىدىيەن نۇقتىسىنى ئۇدا كۈچلۈك غىدىقلىغاندىن كېيىن، زىياپەت ئاخىرلاشقاندا پۈتۈنلەي ئەسلىدىكى روھىي ھالەتكە قايتتى.

ئۆت كېسەللىكلىرىنى نامسىز بارماق ئارقىلىق تەكشۈرۈش

بىر كۈنى كەچلىك تاماقتىن كېيىن مەن ئايالىم بىلەن بىرلىكتە



جىگەر پەللىسىنى كۈچەپ بېسىشنىڭ ئۆت كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ئۇنۋىمى بار.

تېلېۋىزور كۆرۈپ ئولتۇراتتۇق، ئېكراندا بىر ئارتىسنىڭ زىيارەتىنى قوبۇل قىلىۋاتقان كۆرۈنۈشى چىقىپ تۇراتتى، ئايالىم تۇيۇقسىز «ئۇنىڭ ئاۋازى ئۆزگىرىپ كەتكەندەك قىلىدۇ» دېدى.

مەن ۋە ئايالىم بۇ ئارتىسنى تونۇيتۇق، بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى ئۇنىڭ ئويۇنىنى كۆرگەندە ئاۋازى يۇقىرى، سۈزۈك ئىدى، ئەمما ھازىر گەپ — سۆزلىرى ئېنىق ئەمەس ئىدى. مەن ئۇنىڭ چىرايىنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ، ئايالىمغا: «ئۇنىڭ ئۆتىدە ئازراق مەسىلە كۆرۈلگەن بو- لۇشى مۇمكىن، نامىزى بارمىقىنى كۆپرەك چېنىقتۇرۇشى كېرەك ئىدى» دېدىم. ئايالىم مېنى چاقچاق قىلىۋاتىدۇ دەپ قاراپ، مېنى تېخى كەسپىي كېسەلگە گىرىپتار بولۇپسىز دېدى. چىرايىدا توغرا تاپماسلىق ئىپادىسى روشەن بىلىنىپ تۇراتتى.


بۇ ئىش ئۆتۈپ يېرىم ئايدىن كېيىن، بىر كۈنى كەچتە ئۆيگە قايمى- تىپ كېلىشىمگە ئايالىم تەقەززالىق بىلەن ماڭا ھېلىقى ئارتىسنىڭ ئۆت ياللۇغىغا گىرىپتار بولۇپ دوختۇرخانىدا يېتىپ قالغانلىقىنى ئېيتتى. مېنىڭ ئالدىن بىلىش ئىقتىدارىم بولمىسىمۇ، ئەمما مەن ئۇنىڭ زەھەر قايتۇرۇش رولى بولغان جىگەر بىلەن ئۆزئارا تۇتاش ئىكەنلىكىنى بىلىمەن. بىر ئادەمنىڭ ئۆتىدە نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە، يۈز قىسمى ۋە تېرىسى مەينەتلىشىپ كەتكەندەك تۇيغۇ پەيدا بولۇپ، ئادەم روھسىز كۆ- رۈنىدۇ. ئايالىم پەقەت ئۇ ئارتىسنىڭ گەپ قىلغاندىكى ئاۋازىنىڭ بىر ئاز بۇزۇلغانلىقىنى سەزگەن، ئەمما ئۇ بەدەندىكى تەڭپۇڭسىزلىقنىڭ نەتى- جىسى ئىكەنلىكىنى بىلمىگەن.

ئۆتتە مەسىلە كۆرۈلسە ئاساسلىقى نامىزى بارماقتا ئەكس ئېتىدۇ. جىگەر پەللىسى دەل نامىزى بارماقنىڭ ئىككىنچى بوغۇمىغا جايلاشقان. جىگەر پەللىسى سۆسۈن رەڭدە كۆرۈنسە ياكى باسقاندا ئاغرىسا، ئۆتتە مەسىلە كۆرۈلگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا جىگەر پەللىسىنى توخ- تىماي ئۇۋۇلاش ياكى ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن داغلاش كې- رەك. نورمالسىزلىق يوقالغاندىن كېيىن كېسەللىك تىزگىنلەنگەن بولىدۇ. جىگەر پەللىسىنى ئۇۋۇلاشنىڭ ئۆت كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا ئۇ-

نۇمى بولۇپلا قالماستىن، يەنە كۆكرەك ئاغرىش، باش ئاغرىش، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش، بويۇن ئاغرىش قاتارلىقلارنى داۋالاشتىمۇ مەلۇم ئۇنۇمى بار.

جىنسىي ئەزالاردا نورمالسىزلىق كۆرۈلسە، چىمچىلاقنىڭ ئىنكاسى سەزگۈرلىشىدۇ

توي قىلىش ئالدىدا تۇرغان بىر ئايال ماڭا خەت يېزىپ، مەندىن قانداق قىلغاندا جىنسىي ئەزالاردا نورمالسىزلىق بار - يوقلۇقىنى تەك-شۈرۈپ چىققىلى بولىدىغانلىقىنى سورايتۇ. ئۇ خېتىدە يەنە مۇنۇلارنى دەپتۇ: ئىككى يىل ئىلگىرى ئۇ بالىياتقۇ ئوپىراتسىيىسى قىلدۇرغان بو-لۇپ، پۈتۈن بالىياتقۇسىنى ئېلىۋەتكىلى تاسلا قالغانىكەن. تويىدىن كېيىن




ساغلام ئانا بولۇش ئۈچۈن، ئۇ مەندىن جىنسىي ئەزالاردا نورمالسىزلىق بار - يوقلۇقىنى ئالدىن بىلىش ئۈسۈلىغا ئېرىشىشنى ئىنتايىن ئو-مد قىلىدىكەن.

شۇنداق، جىنسىي ئەزا سى-تېمىسى كېسەللىكلەرنىڭ دەس-لەپكى مەزگىلىدە روشەن بەلگىسى (ئالامىتى) بولمايدۇ، كىشىلەر كۆ-

پىنچە ئاغرىق چىدىغىلى بولمايدىغان دەرىجىگە يەتكەندە ئاندىن دوخ-تۇرغا كۆرۈنىدۇ. بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا، جىنسىي ئەزالاردا نورمالسىز-لىقنىڭ بار - يوقلۇقىنى ئۆزى تەكشۈرۈش ۋە ئالدىن بىلىش ئۈسۈلىنى بىلىش ناھايىتى مۇھىم.

جىنسىي ئەزالاردا نورمالسىز ئۆزگىرىشنىڭ بار - يوقلۇقىنى بىل-مەكچى بولسىڭىز، چىمچىلاقنىڭ ئىككىنچى بوغۇمىنى باسسىڭىزلا شۇ ئان بىلەلەيسىز. باسقاندا ئاغرىمىسا ئىقتىدارىنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر ئاغرىسا بۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەك.



قەلەم ئۇچى بىلەن مىڭ مېن پەللىسىنى غە-
دىقلاشنىڭ جىنسىي ئەزا كېسەللىكلىرىنى دا-
ۋالاشقا ياردىمى بار.

چىمچىلاقنىڭ ئىككىنچى
بوغۇمىدا مىڭ مېن (命门) پە-
لىسى دەپ ئاتىلىدىغان بىر پەللە
بار. ئۇ ئۇرۇقدان، دوۋساق، بالياتقۇ
قاتارلىق ئەزالارنىڭ ئىنكاس نۇق-
تىسى بولۇپ، بۇ ئەزالاردا نورمال-
سىزلىق كۆرۈلسە، مىڭ مېن پە-
لىسىدە شۇئان سەزگۈر ئىنكاس
پەيدا بولىدۇ.

شۇنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭكى،
مىڭ مېن پەللىڭىز ئاغرىسا، جىد-
سىي ئەزالار ئىقتىدارىدا توسالغۇ
پەيدا بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
قەلەمنىڭ ئۇچى بىلەن ياكى

ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈجە بىلەن داغلىسا بولىدۇ. ئەلۋەتتە، ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلى بىلەنمۇ ئەمەلىي ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. مىڭ مېن
پەللىسىدىكى ئاغرىق يوقالسا، جىنسىي ئەزالىرىدىكى توسالغۇ يوقالغان
بولىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا، مىڭ مېن پەللىسى پەرزەنت كۆرۈش بىلەن مۇنا-
سۋەتلىك. بۇ يەرنى غەدىقلاشنىڭ بوۋاقلاردىكى كېچىدە سېيىپ قو-
يۇشنى داۋالاشتىكى ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى. ئەگەر سىز ھەر كۈنى چىم-
چىلاقنى ئۇۋۇلاش ئادىتىنى يېتىلدۈرسىڭىز، سىزنىڭ جىنسىي ئەزا
سىستېمىڭىزغا زور پايدىسى بار.

مەن مۇشۇلارنى يېزىپ بايا تىلغا ئالغان ھېلىقى خانىمغا ئەۋەتتىم.
بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنىڭدىن ماڭا يەنە بىر پارچە خەت كەلدى،
ئۇ خېتىدە مېنىڭ دېگىنىم بويىچە قىلغانلىقىمنى، يېقىنقى ئەھۋالنىڭ
ياخشى ئىكەنلىكىنى، قەلبىنىڭ مەنەندارلىققا تولغانلىقىنى ئېيتىپتۇ.

تۆتىنچى باب ئالىقانى غىدىقلاپ كېسەل داۋالاش

كۈچ جايدا ئىشلىتىلسە ئاندىن ھەقىقىي ئۈنۈمنى
كۆرگىلى بولىدۇ

نوپۇزلۇق تەكشۈرۈش ماتېرىياللىرىنىڭ ئىسپاتلىشىچە، چوڭلارنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى سوزۇلما خاراكتېرلىك مۇرە تېلىپ ئاغرىشنىڭ ئازا-بىنى تارتىدىكەن. 70% تىن كۆپرەك ئوتتۇرا ياشلىق كىشىلەرنىڭ سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاغرىش كېسەللىك تارىخى بار ئىكەن. تۇرمۇش تەجرىبىسىمۇ بىزگە شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇكى، نۇرغۇن كىشىلەر ئۆمۈر بويى ئېغىر كېسەلگە گىرىپتار بولمايدۇ، ئەمما ئۇششاق كېسەللىك-لەر دائىم كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ. ساقلىق ساقلاش نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھەقىقىي دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك بولغىنى يەنىلا ئاشۇ دائىم كۆرۈلىدىغان ئۇششاق كېسەللىكلەردۇر. ئۇششاق كېسەللىكلەر گەرچە ئا-دەمنىڭ جېنىنى ئالمىسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا يول قوي-غاندا، بىرىنچىدىن تۇرمۇش سۈپىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ، ئىككىنچىدىن، ئېغىر كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، دورا ئى-چىش، ئوكۇل سالدۇرۇشتىن كۆرە، ئالىقانى غىدىقلاش كۆپ قۇلايلىق، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۈنۈمىمۇ كۆرۈنەرلىك. سىز ئۆزىڭىزنىڭ دائىم كۆرۈل-دىغان مەلۇم بىر خىل كېسەللىككە گىرىپتار بولغانلىقىڭىزنى بايقىغى-

نىڭىزدا، شۇئان «ئىچكى قوماندانلىق شىتابى» بولغان ئالىقانىنىڭ ماس ئورنىنى غىدىقلىسىڭىز، پەقەت ئۇسۇلىڭىز توغرا بولسىلا، ئالدىن كۆزلى- گەن ئۈنۈمگە ئېرىشەلەيسىز.

كونكرېت كېسەللىك ئالامىتىگە قارىتا ئالىقانى غىدىقلاش تېخنى- كىسىنى تونۇشتۇرۇشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەن كۈچلۈك، ئاجىز غىدىقلاش مەسىلىسىنى سۆزلىمەكچى. بەزى كېسەللىكلەرگە قارىتا كۈچلۈك غىدىق- لاشقا، يەنە بەزى كېسەللىكلەرگە قارىتا ئاجىز غىدىقلاشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ ئۆزئارا ئالماشتۇرۇۋېتىلسە، ئۇسۇلىڭىز ھەر قانچە توغرا بولغان تەقدىردىمۇ، ئەكسىچە ئۈنۈم پەيدا قىلىشى مۇمكىن. ئادەتتە ئالىقانى غىدىقلاش تېخنىكىسىنى كۈچلۈك، ئاجىز، ئاستا غىدىقلاش دەپ ئۈچ دەرىجىگە ئاي- رىشقا بولىدۇ.

1. كۈچلۈك غىدىقلاش: ناھايىتى قىسقا ۋاقىتتا، ئاخىرغىچە كۈچلۈك غىدىقلىنىدۇ. مەسىلەن: چىش كولىغۇچنى سانجىش ياكى بارماق بىلەن چىمىدىش قاتارلىقلار.

2. ئاجىز غىدىقلاش: ۋاقىت ئۇزۇنراق، كۈچ يېنىكرەك بولىدۇ، لېكىن مۇھىمى غىدىقلاشنىڭ تەسىرى بولغان - بولمىغاننىڭ ئارىلىقىدا توخ- تىلىدۇ. مەسىلەن: بارماق بىلەن توختىماي يېنىك بېسىش.

3. ئاستا غىدىقلاش: ئۇزۇنلاش ئارىلىقى بىر قەدەر ئۇزۇن، مۇھىم نۇقتىسى: غىدىقلاشنى باشلىغاندا ھەرگىزمۇ ئالدىرىماسلىق، سەۋرچانلىق بىلەن داۋاملىق غىدىقلاش كېرەك.

يۇقىرىقى ئۈچ خىل غىدىقلاش ئۇسۇلىنى بارماق بىلەن ئىشلەشتىن سىرت، يەنە چىش كولىغۇچ، چاچ قىسقۇچ، ھەتتا ئوت يېقىلغان يىپسىمان كۈچنى ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. بۇنى كونكرېت ئەھۋالغا قاراپ بېكىتىش كېرەك.

ئاشقازان ئاجىزلاشسا جىيەنلى سەنجىن رايونىنى ئۇۋۇلاش

«ساغلام ئادەملەر ئاشقازاننىڭ ئورنىنى بىلمەيدۇ» دېگەن سۆزگە ئىشىنەمسىز. ھەقىقەتەن شۇنداق، ئاشقازان كېسىلى بولمىغانلارنىڭ ئاشقازاننىڭ ئورنىنى بىلمەسلىكى تەبىئىي. ۋەھالەنكى، ئاشقازاننىڭ ئورنىنى توغرا كۆرسىتىپ بېرەلەيدىغانلار ئەگەر ئۇ كەسپىي خادىم بولمىسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاغرىقىنىڭ ئازابىنى تارتقانلىقى ئېھتىمالغا بەك يېقىن.

ئاشقازان ئاجىزلىقى ئاشقازان ياكى ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىشى ياخشى بولماسلىقتىن كېلىپ چىققان كېسەللىك ئالامىتىنىڭ ئومۇملاشتۇرۇلۇشى. ئۇ ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش، نېرۋا خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان سپازمىلىنىش، 12 بارماق ئۈچەي يارىسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاشقازان ئاجىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.



جىيەنلى سەنجىن رايونىنى دائىم غەدىقلىغاندا ئاشقازان ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆسۈتۈرگىلى بولىدۇ.

خان سەۋەبلەرنى تەھلىل قىلغاندا «تاماقنى بەك تېز يېيىش» تىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ. ئاشقا-زان - ئۈچەي يېمەكلىكلەرنى



ئوبدان بىر تەرەپ قىلالىغاننىڭ ئۈستىگە يەنە توختىماي يېسە، ھەزىم قىلىش ناچارلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزىلەر ئاشقازان ئاجىزلىقىغا گىرىپتار بولغان ئادەملەر ئۈستىدە تەكشۈرۈش قىلىپ، ئۇلارنىڭ ئومۇمىي يۈزلۈك تاماقنى تېز يەيدىغانلىقىنى، تاماق يېيىشكە كەتكەن ۋاقىتنىڭ ناھايىتى قىسقا ئىكەنلىكىنى، ئەڭ كۆپ بولغاندا بەش مىنۇتتىن ئېشىپ كەتمەيدىغانلىقىنى بايقىغان.

بۇ كىشىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، داۋالاشنى باشلاشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەن يېمەك - ئىچمەك ئادىتىنى ئۆزگەرتىش كېرەك. يەنى ھەر بىر كاپام تاماقنى 50 قېتىم چاپىنسا، تاماق يېيىش ۋاقتىنى مەجبۇرىي ئۇزارت-قىلى بولىدۇ.

ئاشقازان ئاجىزلىقىنى ياخشىلىماقچى بولسا، ئالىقان دەل ئوتتۇر-سىنىڭ سەل تۆۋەنكى تەرىپىدىكى جىيەنلى سەنجىن رايونى (健理三 区) نى ئوۋۇلسا بولىدۇ. بۇ ئاشقازان، ئۈچەي ۋە ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى جانلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىغان ئالاھىدە ئۈنۈملۈك رايون. ئەگەر دائىم غىدىقلاپ بەرسە، ئاشقازان، ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ، ھەمدە ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كۈندە ئۈچ ۋاخ تاماقنى تەملىك، يېيىشلىك قىلىدۇ. غىدىقلاش دەرىجىسىگە كەلسەك، ئاستا ئوۋۇلاش كېرەك.

جىيەنلى سەنجىن رايونىنى غىدىقلاش بىلەن بىللە، ئالىقاندىكى چوڭ ئۈچەي، قول دۈمبىسىدىكى سەن جىيەن (三间)، خې گۇ (合谷) قاتارلىق پەللىلەرنى غىدىقلىسا، تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

سىز «ئاشقازىنىڭ ئورنىنى ئۇنتۇپ قالغان ئادەم» گە ئايلى-نىشنى خالامسىز؟ ئەگەر خالىسىڭىز، ئۇنداقتا مەن ئۆگەتكەن ئۇسۇل بو-يىچە قىلىڭ.

يۈرەك سېلىپ دەم سىقىلسا يۈرەك قېپى رايونىنى يېنىك بېسىش

سىزدە مۇنداق سېزىم بولغانمۇ - يوق؟ قاتتىق ھەرىكەت قىلمىسىمۇ يۈرەك سوقۇشى تېزلىشىش، بىئاراملىق ھېس قىلىش، بىردەمدىن كېيىن تومۇر سوقۇشنىڭ تېزلەشكەنلىكىنى ھېس قىلىش، يۈرەك خۇددى مۇ-جۇلغاندەك سانجىپ ئاغرىش، ھەتتا تىترەك ئۆلىشىش، تەرلەش، دەم ئالالا-ماي قېلىش، نەپىسى قىسىلىش قاتارلىقلار. بۇلار جىسمانىي ۋە روھىي كېسەللىك ئالامەتلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان يۈرەك تېز سوقۇش ۋە دەم سىقىلىشتۇر. بۇ خىل كېسەللىكلەرنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبى ئالاھىدە ئەمەس. ئەگەر يېنىك دەرىجىدە بولسا، كۆپىنچىسىدە ئۇزۇن مەزگىلگىچە داۋاملىشىدىغان تىت - تىت بولۇش سېزىمى بولىدۇ، بۇ روھىي كېسەللىك ئالامىتىگە كىرىدۇ. روھىي كېسەللىكنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان دەۋردە، بۇنىمۇ بىر خىل «مەدەنىي كېسەل» دېيىشكە بولىدۇ.

نېرۋا خاراكتېرلىك يۈرەك تېز سوقۇش ۋە دەم سىقىلىشنى داۋال-غاندا، يۈرەك جىگىلوسى (心经) ۋە يۈرەك قېپى جىگىلوسى (心包经) بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان پەللە، رايونلارنى غىدىقلاش ئەڭ ئۈنۈملۈك.




ئالغان مەركىزىدىكى يۈرەك قېپى رايونى (心包区) نى ئۇزۇن ۋاقىت يېنىك بېسىپ بەرسە، بىئاراملىق، ئاچچىقلىنىش ۋە قىزىققانلىقنى يوقاتقىلى بو-لۇپلا قالماي، يۈرەك تېز سوقۇش ۋە دەم سىقىلىشنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ. دىققەت قىلىشقا تېگىش-لىك بولغىنى شۇكى، يۇقىرىقى

مەشغۇلاتنى ئىشلىگەندە، سەۋرچانلىق بىلەن ئاستا غىدىقلاش كېرەك. ھەرگىزمۇ كۈچلۈك غىدىقلاشقا بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن ئەكسىنچە، بىئاراملىق ۋە قىزىققانلىقنى كۈچەيتىۋېتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، يۈرەك قېپى رايونىنى غىدىقلاش بىلەن بىللە يەنە ئوتتۇرا بارماقتىكى جۇڭ چۇڭ (中冲)، چىمچىلاق بارماقتىكى شاۋ چۇڭ (中冲)، قول بېغىشىدىكى شېن مېن (神门) قاتارلىق پەللىلەرنى بىرلا ۋاقىتتا غىدىقلىسا، يۈرەك سېلىشنى تىنچلاندۇرۇش، دەم سىقىلىشنى ئازايتىشتا ناھايىتى ئۈنۈمى بار.

مەن بىر ئەمەلىي مىسالنى سۆزلەپ بېرىم: بانكىدا ئىشلەيدىغان بىر خىزمەتچى يۈرەك سېلىش، دەم سىقىلىش سەۋەبىدىن مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ياش ۋاقتىدا بۇ ئەھۋاللار يوقكەن، يېقىنقى 3-2 يىلدىن بۇيان ھەر قېتىم پۇل سانغاندا كۆڭلىدە ھەمىشە ئاجايىپ بىئاراملىق ھېس قىلىدىكەن، كەيپىياتى خېلىغىچە تىنچلانمايدىكەن، سەۋەبىسىز ئولتۇرالماس بولۇپ قېلىپ، خىزمەت جەريانىدا نۇرغۇن خاتالىقلارنى سادىر قىلىپتۇ. ئۇ بۇنداق كېتىۋەرسە بىرەر چوڭ چاتاق چىقىرىپ قويۇشتىن ئەنسىرەپ، مېنىڭ قېشىمغا داۋالانغىلى كەپتۇ. مەن ئۇنى بىر كۈرس يىڭىگە سانجىپ داۋالىۋېتىم، ئۇنىڭ سەزگۈسى خېلى ياخشىلاندى، شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭغا: «ھەر كۈنى ئاللىقاننى ئۇۋۇلاش، خىزمەتتىن سىرتقى چاغلاردا ئۆزى ھوزۇر تاپالايدىغان ئىشلار بىلەن شۇغۇللىنىش»

توغرىسىدا تەكلىپ بەردىم. ئالا- ھازەل بىرەر ئايدىن كېيىن، ئۇ شاد- خۇراملىق بىلەن مېنى كۆرگىلى كېلىپ، ئىلگىرىكى كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ پۈ- تۈنلەي يوقالغانلىقىنى ئېيتتى. مەن ئۇنىڭدىن قانداق قىلغان- لىقىنى سورىدىم. ئۇ ئاللىقىنىنى ئۇۋۇلغاندىن سىرت، يەنە ئېغىز



گارىمۇنى چېلىشنى ئۆگىنىۋالغانلىقىنى، شۇنداق قىلىپ ھەم ھۇرۇر ئال-
غانلىقىنى ھەم ئاللىقىنى غىدىقلىغانلىقىنى، بىر چالامدا ئىككى پاختەك
سوققانلىقىنى ئېيتتى.

ئىشتىھاسى ياخشى بولمىسا ئاللىقنى يېنىك ئۇۋۇلاش

نۇرغۇن كىشىلەر تاماق يېيىش تىلغا ئېلىنىشى بىلەن ئازابلىنىدۇ،
مانا بۇ بىز دائىم دەيدىغان ئىشتىھاسى ياخشى بولماسلىقتۇر.
ئىشتىھاسى ياخشى بولماسلىقنىڭ سەۋەبى ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:
بىرسى، ئۈچەي ۋە ئاشقازاننىڭ ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارى
بىر قەدەر ئاجىز بولۇش؛ ئىككىنچىسى، ئۇزاق مەزگىل جىددىيلىشىش
روھىي جەھەتتىن چارچاشنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقتىن بولىدۇ. يېقىندىن
بۇيان كۆپلىگەن ياش ئاياللار، بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەر بۇ خىل كېسەلگە
گىرىپتار بولغان ھەمدە تەدرىجىي كۆپىيىشكە يۈزلەنگەن. بۇنى نېرۋا خا-
راكتېرلىك ئىشتىھاسى ياخشى بولماسلىق دېيىشكە، شۇنداقلا «ئىشتىھا-
سىزلىق كېسەلى» دېيىشكىمۇ بولىدۇ.



سوزۇلما خاراكتېرلىك مۇرە تېلىپ ئاغ-
رىشقا نىسبەتەن كۈچلۈك غىدىقلاش
كېرەك.

بىر قېتىم بىر ئانا تولۇق
2- يىللىقتا ئوقۇيدىغان قىزد-
نى ئېلىپ مېنىڭ قېشىمغا
كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ. بۇ
قىز تىپىك «ئىشتىھاسىزلىق
كېسەلى» ئىكەن. چۈنكى سى-
نىپىدىكى ئوغۇل ساۋاقداشلىرى
ئۇنى بەك سېمىز دەپ مەسخىرە
قىلغاچقا يېمەكلىكىنى زور دە-
رىجىدە قىسقان. نەتىجىدە بە-
دەن ئېغىرلىقى 50 كىلوگرامدىن

بىراقلا 40 كىلوگرامغا چۈشۈپ قالغان. مەن مۇشۇ ئەھۋاللارنى ئىگىلىدىغانىدىن كېيىن، بىر تەرەپتىن ئۇنىڭ ئالىقنىنى ئۇۋۇلىغاچ، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنىڭغا قايسى بىر مىللەتنىڭ لايىق تاللاشنىڭ ئالدىنقى شەرتى سېمىز بولۇش كېرەكلىكىنى، ئۇلارنىڭ ئاياللار سېمىز بولمىسا ئانا بولۇش سالاھىيىتىگە ئىگە بولالمايدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى سۆزلەپ بەردىم. مۇ. شۇنداق چاقچاق پاراڭلار بىلەن ئۇنىڭدىكى جىددىيلىك كەيپىياتى پە. سەيدى. ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇنىڭ ئانىسى ماڭا تېلېفون بېرىپ قىزىنىڭ يېمەك - ئىچمىكىنىڭ ئەسلىگە كەلگەنلىكىنى، بەدەن ئېغىرلىقىنىڭمۇ 50 كىلوگرامغا يېقىنلاشقانلىقىنى ئېيتتى.

بۇ نەتىجە مېنىڭ پەرەز قىلغىنىمدەك چىقتى. روھىي جىددىيلىك كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىشتىھاسىزلىقنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن كېسەلنىڭ پىسخىك جەھەتتىكى جىددىيلىكىنى يوقىتىش، ئەڭ ياخشىسى ئۇنىڭ «قەلبىدىكى كېسەل» نى داۋالاش كېرەك.


روھىي جىددىيلىك پەسەيسە، ئىشتىھائىي ياخشىلىنىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئالىقنى ئۇۋۇلاشنى قوشۇمچە قىلىپ بەرسە، ئەڭ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

ئادەم ئالىقنىنىڭ ئوتتۇرىسى «ئالىقان مەركىزىي رايونى» بولۇپ، بۇ رايون يۈرەكنىڭ سوقۇشى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. بۇ رايوننى سىلىق ئۇۋۇلاپ بەرسە، يۈرەك سىقىلىشنى ئۈنۈملۈك يوقاتقىلى بولىدۇ ھەم روھىي ھالەتنى بوشاشتۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ.

ئەگەر ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ھەزم قىلىش ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدارى ياخشى بولماسلىقتىن كېلىپ چىققان ئىشتىھاسىزلىق بولسا، ئۇنداقتا ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى «ئاشقازان. تال. چوڭ ئۈچەي رايونى» نى ئۇۋۇلاشتۇر. بۇ رايون بىلەن ئاشقازان، ئۈچەينىڭ ناھايىتى زىچ مۇناسىۋىتى بار. ئاجىز غىدىقلاش ئۇ. سۇلىنى قوللانغاندا ھەزم قىلىش ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدارىنى جانلاندۇرۇپ، ئىشتىھائىي ياخشىلىغىلى بولىدۇ.

مۈرە تېلىپ ئاغرىسا خې گۇ پەللىسىنى ئۇۋۇلاش

مۈرە تېلىپ ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر ناھايىتى كۆپ، مەسىلەن: قول بېغىشى ۋە مۈرە ھەرىكىتى ھەددىدىن زىيادە بولۇش، روھىي ھالىتى تۇراقلىق بولماسلىق (جىددىيلىشىش) قاتارلىقلار. ئەمما، مۈرە تېلىپ ئاغرىشىنىڭ ئارقىسىغا ئاشقازان، ئۈچەي، جىگەر ۋە ئۆت قاتارلىق ئىچكى ئەزالار



مۈرە دائىم تېلىپ ئاغرىسا، خې گۇ پەللىسىنى كۈچلۈك ئۇۋۇلاش.

كېسەللىكلەرنى يوشۇرۇد-
غان بولۇشى مۇمكىن.
شۇڭا، بىر ئادەمدە سەۋەبى
ئېنىق بولمىغان، ئۇزاق
مەزگىللىك مۈرە تېلىپ
ئاغرىش كۆرۈلگەندە ئۇ-
مۇمىيۈزلۈك بەدەن تەك-
شۈرتۈش كېرەك.

مۈرە تېلىپ ئاغ-
رىشىنى يوقىتىدىغان ئەڭ
ئۈنۈملۈك ئۇسۇل باش

بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماق تۈۋىگە جايلاشقان خې گۇ (合谷)
پەللىسىنى ئۇۋۇلاش. بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ئادەتتىكى مۈرە تېلىپ ئاغرىشىنى
تېزلا يوقاتقىلى بولىدۇ. لېكىن كۈچلۈك غىدىقلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ،
كۈچەپ چىمداش ياكى بېسىش كېرەك. ئەگەر سوزۇلما خاراكتېرلىك مۈرە
تېلىپ ئاغرىسا، ئوت يېقىلغان يېسىمان كۈچە بىلەن داغلاپ داۋالسىمۇ
ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

خې گۇ (合谷) پەللىسىنىڭ ھەددىدىن زىيادە ھەرىكەت قىلىش-
تىن بولغان مۈرە تېلىپ ئاغرىشىنى داۋالاشتا ئاجايىپ ئۈنۈمى بار. ئەگەر



ئىچكى ئەزالار كېسەللىكلىرى
كەلتۈرۈپ چىقارغان مۇرە تېلىپ
ئاغرىش بولسا، باشقا ئورۇندىكى
پەللىنى قوشۇپ غىدىقلىسا بو-
لىدۇ. مەسىلەن: دەم سىقىلىش،
يۈرەك ئاجىزلىقتىن بولغان مۇرە
ئاغرىقىغا قارىتا كۆرسەتكۈچ بار-
ماق بىلەن ئوتتۇرا بارماق تۈۋى
ئارىلىقىدىكى يۆتەل - زىققە
نۇقتىسىنى؛ جىنسىي ئەزالاردە-
كى نورمالسىزلىقتىن بولغان مۇرە

تېلىپ ئاغرىشقا قارىتا نامسىز بارماق بىلەن چىمچىلاق تۈۋى ئارىلىقىدە-
كى يۈرەك سېلىش نۇقتىسىنى قوشۇپ غىدىقلىسا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا
ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن بۇ پەللىنى داغلاپ، كۈچلۈك غە-
دىقلىغاندا، مۇرە ئاغرىقىنى يوقىتىپلا قالماي، ئادەمنىڭ كەيپىياتىنى تې-
تىكلەشتۈرگىلى بولىدۇ.

نەپەس سىقىلىش ئاشقازان - ئۈچەي ئىقتىدارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك

بىر قېتىم 40 نەچچە ياشلىق بىر ئايال كېسەل كۆرسىتىش ئۈچۈن
مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. ئۇنىڭ كېسىلى ئۇزۇن بولغان سوزۇلما خاراكتېرلىك
نەپەس سىقىلىش ئىكەن. ھەر قېتىم ئەتىگەلىك تاماقنى يەپ بولۇپ 1-2 سا-
ئەتتىن كېيىن، يەنى قورساق ئاچقاندا، قىزىلئۆڭگىچى كۈيۈشۈپ ئاغرىد-
غاندەك سېزىم بولىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە كېكىرگەندە ئاشقازان سۇ-
يۇقلۇقى ياندۇرىدىكەن.

كېسەلدىكى نەپەس سىقىلىش كەلتۈرۈپ چىقارغان تۈرلۈك كې-

سەللىك ئازابىنى تەھلىل قىلغاندا، ئۇنى بىر خىل ئېغىر ئاشقازان كې-
سەللىكىگە گىرىپتار بولغان دەپ دىئاگنوز قويۇشقا بولدۇ. بۇنداق كىش-
لەردە قىزىلئۆڭگەچ كۆيگەندەك سېزىم بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى كۆپىنچە
ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىرىلىشى كۆپ بولغانلىقىدىندۇر.
بۇ ئايالدىكى ئاشقازان كىسلاتاسى ئېشىپ كېتىشنىڭ ھەقىقىي
سەۋەبىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن، مەن ئۇنىڭ يېمەك - ئىچمەك ئەھۋال-
لىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ سۈرۈشتۈردۈم. ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلاپلا، كاشلى-
نىڭ نەدىلىكىنى تاپتىم. ئەسلىدە ئۇ پىچىنە - پىرەنىك، تورت دېگەندەك
تاتلىك يېمەكلىكلەرنى يېيىشنى بەك ياخشى كۆرىدىكەن. بولۇپمۇ كەچتە
تېلېۋىزور كۆرگەندە توختىماي تاتلىق - تۈرۈملەرنى يەيدىكەن.

ئۇنىڭ ئەھۋالىنى ئېنىق ئىگىلىگەندىن كېيىن، مەن ئۇنىڭغا تات-
لىق يېمەكلىكلەر بىلەن ھەددىدىن زىيادە ئوزۇقلىنىش ئاشقازان شىللىق
پەردىسىنى غىدىقلاپ، تېخىمۇ كۆپ ئاشقازان كىسلاتاسى ئاجرىتىپ چى-
قىرىدىغانلىقىنى، بۇ خىل يېمەك - ئىچمەك ئادىتىنىڭ تەبىئىي ھالدا
نەپەس سىقىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى سۆزلەپ بەردىم. ئار-
قىدىنلا مەن يەنە ئۇنىڭغا نەپەس سىقىلىشنىڭ ئالدىنى ئالدىغان ئالاقان
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى يەنى ئالاقان مەركىزىنىڭ سەل تۆۋەن تەرىپىدىكى ئاش-



ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسى دەل جىيەنلى
سەنچىن رايونىنىڭ مەركىزىدە.

قازان - ئۈچەي نۇقتىسى ۋە
قول دۈمبىسى مەركىزىدىكى
«كۆكرەك - قورساق رايونى»
نى ئۇۋۇلاشنى ئۆگىتىپ قويدۇم.

ئاشقازان - ئۈچەي نۇق-
تىسى ئاشقازان ئۈچەيىنىڭ
ئىقتىدارى بىلەن مۇناسىۋەت-
لىك پەللە. چىش كولىغۇچ
ياكى چاچ قىسقۇچ قاتارلىق
ئۇچلۇق نەرسىلەر بىلەن بۇ

يەرنى غىدىقلىغاندا، ئاشقازان ئىقە-
تىدارىنى تورمۇزلاپ، ئاشقازان
كىسلاتاسى ئاجرىتىپ چىقىرىشنى
ئازايتقىلى بولىدۇ.



«كۆكرەك - قورساق رايونى»
سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسى (三焦)
(经)، ئۆت جىڭلوسى (胆经) ۋە
يۈرەك قېپى جىڭلوسى (心包经)
بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇ را-

يونى كۈچلۈك غىدىقلىغاندا بۇ ئۈچ جىڭلو (经络) نى راۋانلاشتۇرۇپ،
ئۇنىڭ ئاشقازان كىسلاتاسى ئاجرىتىپ چىقىرىش ئىقتىدارىنى تورمۇزلى-
غىلى بولىدۇ.

نەپەس سىقىلىش كېسەللىك ئالامىتى بار كېسەللەر مەن ئۆگەتكەن
ئۇسۇلنى سىناپ باقسا پۈتۈن بەدىنى ئازادلىشىپ، روھىي كەيپىياتى
خۇشاللىققا چۆمدۇ. ئەمما، شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى، ئاشقا-
زان - ئۈچەي نۇقتىسى ۋە «كۆكرەك - قورساق رايونى» نى چوقۇم غە-
دىقلاش كېرەك. ئەگەر يېنىك ئۇۋۇلسا، ئەكسىچە ئاشقازان كىسلاتاسى
ئاجرىتىپ چىقىرىشنى كۈچەيتىۋېتىدۇ.


ئىچى سۈرۈشكە سۈرگۈ نۇقتىسى ئالاھىدە شىپالىق

بىر قېتىم، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشكە گىرىپتار بولغان
بىر كېسەل كېسەل كۆرسەتكىلى مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. ئۇنىڭ دېيىشىچە،
ھازىرقى كۆپ ئىچىشتىن بۇ چاتاقنى تاپقانىكەن. ئۇ ھەر قېتىم سىرتقا
چىققاندا ياكى ناتونۇش جايغا بارغاندا، بىرىنچى قىلىدىغىنى ھاجەتخانا
ئىزدەش ئىكەن.

تەرەت قىستىغاندا ئەلۋەتتە ھاجەتخانا تېپىش كېرەك. ئەمما بۇ پە-
قەت جىددىي تاقابىل تۇرۇش تەدبىرى، ئەڭ ياخشى چارە ئىچى سۈرۈشنى


ئۈزۈل - كېسىل ساقايتىش ياكى دەرھال ئىچى سۈرۈشنى توختىتىشتۇر. ئادەتتىكى ئىچى سۈرۈشنىڭ ھەممىسى ئۈچەينىڭ ھەزىم ۋە قوبۇل قىلىشنىڭ ياخشى بولماسلىقى ياكى يېمەكلىكلەرنىڭ سۈپىتى ئۆزگەرگەندەكلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

شۇڭا نېگىزىدىن ئېيتقاندا ئىچى سۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئۈچەينىڭ ھەزىم ۋە قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك. قولىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالاش نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ئىچى



سۈرۈشنى تېزگىنلەشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى قول دۈمبىسىدىكى «كۆكرەك - قورساق رايونى» نى ئۇۋۇلاشتۇر. چۈنكى بۇ رايوننىڭ دەل مەركىزىدە سۈرگۈ نۇقتىسى (下痢点) دەپ ئاتىلىدىغان بىر پەللە بار.

ئادەتتىكى ئىچى سۈرۈشكە نىسبەتەن ئېيتقاندا، سۈرگۈ نۇقتىسى ئالاھىدە ئۈنۈم بېرىدىغان ئالاھىدە شىپالىق نۇقتا.



تەرتىبىگىز كەلگەندە - لىكىنى ھېس قىلغىنىدەكلىرىڭىزدا، دەرھال قوللىڭىز بىلەن بۇ نۇقتىنى توختىماي، ئۇۋۇلىسىڭىز شۇ ئان تەرەتنى تېزگىنلىگەنلى بولىدۇ. ئەگەر تەرەت قىستاشقا يەنە چىدىغىلى بولىدىغان ئەھۋالدىمۇ بۇ نۇقتىنى غىدىقلىسىڭىز،

ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئەگەر ھازاق ئىچىشتىن كېلىپ چىققان ئېغىر دەرىجىدىكى ئىچ سۈرۈش بولسا، بۇ ئۇسۇلنى قوللانسىڭىز، دەرھال يېنىكلەپ قالسىز. قىسقىسى، بۇ نۇقتىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇۋالسىڭىزلا ئاچقۇچلۇق پەيتتە جەزمەن ئاجايىپ ئۈنۈمنى كۆرسىز.

ئۇنىڭدىن باشقا، كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىدىكى چوڭ ئۈچەي پەللىسى بىلەن چىمچىلاقتىكى بۆرەك پەللىسى ئوخشاشلا داۋالاش ئۈنۈمىگە ئىگە.

چوڭ ئۈچەي پەللىسى چوڭ ئۈچەي جىڭلوسىدا (经络) بولۇپ، چوڭ ئۈچەينىڭ ئىقتىدارى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. بۆرەك پەللىسى ئىنچىكە ئۈچەي جىڭلوسىدا (经络) بولۇپ، ئىنچىكە ئۈچەينىڭ قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۇنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ. غىدىق-لىغاندا، قول بىلەن باسسۇ، ئوت يېقىلغان يىپسىمان كۈچە بىلەن داغلىسىمۇ بولىدۇ.

ئاللىقان ئىچىدىكى جىيەنلى سەنجىن (健理三针区) رايونى-نىڭمۇ ئىچى سۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئۈنۈمى ياخشى بولۇپ، دائىم بۇ رايوننى ئۇۋۇلاپ بەرسە، چوڭ ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ.

ئۇخلىيالمىدىغانلار ئاللىقان رايونىنى نۇقتىلىق ئۇۋۇلاش لازىم


ئاڭلىشىمىزچە تۈرلۈك تەن جازاسى ئىچىدە ئادەمنى ئۇخلىغىلى قويماسلىق ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىكەن. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈشكە بولىدۇكى، ئۇخلىيالماسلىق ئادەمنى ئەڭ ئازابلايدىغان ئىشلارنىڭ بىرى. ھالبۇكى، بەزىلەر ئويلىمايلا ئۆزىگە زىيانكەشلىك قىلماقتا.

بىر قېتىم قاۋاقخاندا ئىشلەيدىغان بىر قىز تەكشۈرتكىلى مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. مەن ئۇنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدارى ئاجىز ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭ سەۋەبى «ئۇيقۇسىزلىق» ئىكەنلىكىنى بايقىدىم.

خىزمەت مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇ يىل بويى كېچە - كۈندۈز ئالدىم - شىپ تۇرىدىغان مۇھىتتا ياشايدىكەن. ياز كۈنى ھاۋا تەڭشىگۈچنى ئې- چېپ سۈۋۈتۈش، قىش كۈنلىرى ئىسسىقلىق قويۇپ بېرىش، تەبىئەتنىڭ قانۇنىيىتىگە خىلاپ بولغان بۇ خىل مۇھىتنىڭ ئادەم بەدىنىگە بولغان ناچار تەسىرى ناھايىتى چوڭ بولۇپ، نەتىجىدە ئۇ ئۇيقۇسىزلىق كېسىد- لىگە گىرىپتار بولغان. ھازىر تىنچلاندۇرۇش دورىسىغا تايىنىپلا ئۇخلايدىكەن، بولمىسا ئۇخلىيالمايدىكەن.

ئادەم بەدىنىنىڭ ئۆزىنى تىزگىنلەيدىغان نېرۋا پائالىيىتى ئەسلىدە - دىنلا كۈن چىققاندا مەشغۇلات قىلىش، كۈن ئولتۇرغاندا توختاش قانۇ- نىيىتىگە ئەمەل قىلىدۇ. يەنى، كۈندۈزى سىمپاتىك نېرۋا ئاشقازان، ئۇ- چەي قاتارلىق ئىچكى ئەزالارنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، پائالىيىتىنى باشلايدۇ. كېچىسى ئېنېرگىيىنى ساقلاش ئۈچۈن پاراسىمپاتىك نېرۋا بەدەننى تىزگىنلەيدۇ.

ئەسلىدە كېچىدە دەم ئېلىشقا تېگىشلىك بولغاندا جىسمانىي قۇۋۋەتنى ھەددىدىن زىيادە سەرپ قىلىۋېتىش، پائالىيەت قىلىشقا تې- گىشلىك بولغاندا بەدەن دەم ئېلىش ھالىتىدە تۇرۇشتەك بۇ خىل ئەھۋال داۋاملىشىۋېرىپ، سىمپاتىك نېرۋا بىلەن پاراسىمپاتىك نېرۋا ئۆزئارا ئال- مىشىپ كەتسە، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى بەدەن ئەلۋەتتە قوبۇل قىلالمايدۇ، ھەمدە ئىچكى تەڭپۇڭسىزلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا، ئۇيقۇسىز- لىق ئەمەلىيەتتە سىمپاتىك نېرۋا بىلەن پاراسىمپاتىك نېرۋا ئۆزئارا ئورۇن




ئالمىشىپ كەتكەنلىكتىن بولغان كېسەللىكتۇر.

نېرۋا ئاجىزلىقىمۇ ئۇيقۇسىزلىقنىڭ بىر چوڭ سەۋەبى. بايا تىلغا ئالغان قىز يېتەرلىك ئارام ئالالمىغانلىقتىن، نېرۋىسى چارچاپ، نېرۋا ئا-جىزلىق پەيدا بولۇپ، ئاخىرىدا ئۇيقۇسىزلىق كېلىپ چىققان. ئۇيقۇسىزلىق كېسەللىگە گىرىپتار بولغانلار نۇقتىلىق قىلىپ، ئۆت-تۇرا بارماقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى «ئالىقان رايونى» نى غىدىقلاش كېرەك. بۇ رايون ئوتتۇرا بارماق ئىچىدىكى يۈرەك قېپى جىڭلوسى (心包经) دىن تىك ئۆتكەن جىڭلۇغا جايلاشقان. ئۇنىڭدىن سىرت، ئوتتۇرا بارماق تىرنىقى تۆۋەن تەرىپىدىكى جۇڭ چۇڭ (中冲) پەللىسىنى بارماق بىلەن يېنىك ئۇۋۇلاپ بەرسىمۇ ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ.

ئوغرى تەر بارلار جۇڭ جۇ پەللىسىنى ئۇۋۇلسا ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ


ئۆتكەن يىلى قىشتا بىر ياش كېسەل كۆرسەتكىلى مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. تەقى - تۇرقىدىن قارىغاندا تېخى 30 ياشقا كىرمىگەندەك، كۈچ - قۇۋۋىتى راسا ئۇرغۇپ تۇرىدىغان ياشتا ئىدى. ئەمما سىرتقى قىياپىتىگە قارىسا ئادەمگە ئىنتايىن ھارغىن تۇيقۇسى بېرەتتى. سۆھبەتتىن كېيىن، مەن ئۇنىڭ شەھەر ئەتراپىدا ئۇششاق يېمەكلىكلەر دۇكىنى ئاچقانلىقىنى، مال كىرگۈزۈش، سېتىشنىڭ ھەممىسى شۇنىڭغا قاراشلىق بولغاچقا ھەر كۈنى ئەتىگەندىن كەچكىچە ئالدىراش بولۇپ، ئىنتايىن جاپا چېكىدىغان-لىقىنى، ئارام ئېلىش ۋاقتىنىڭ ناھايىت ئاز ئىكەنلىكىنى بىلىدىم. ئۇ يەنە ماڭا ئىلگىرى ئۆزىنىڭ سالامەتلىكىنىڭ ناھايىتى ياخشى ئىكەنلىكىنى، ياستۇققا بېشىنى قويسلا تاڭ ئاتقۇچە ئۇخلايدىغانلىقىنى، ئەمما يېقىنقى بىر مەزگىلدىن بۇيان كېچىسى پۈتۈن بەدىنى تەرلەپ چۆچۈپ ئويغىنىپ كېتىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭ بەدىنىدە ئىپادىلەنگىنى يۈكنىڭ ئېغىرلىقى-دىن كېلىپ چىققان تىپىك كېسەللىك ئالامىتى، يەنى پۈتۈن بەدىنى چارچاشتىن كېلىپ چىققان تەرلەشتۈر. تەجىربىلىك كىشىلەرگە مەلۇم-كى، تۈبىر كۈلۈزدىن باشقا پەقەت ھەددىدىن زىيادە چارچىغاندىلا ئاندىن ئوغرى تەر چىقىش ئەھۋالى كۆرۈلۈپ، ياخشى ئۇخلىغىلى بولمايدۇ.



ئوغرى تەر ۋە پۈتۈن بە-
دەن چارچاش ئەھۋالى كۆرۈل-
گەندە، ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل
ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە
بىلەن قول دۈمبىسىدىكى جۇڭ
جۇ (中渚) پەللىسىنى غى-
دىقلاشتۇر. ئۇخلاشتىن بۇرۇن
8-7 قېتىم ئاستا غىدىقلاش،
ھەر قېتىملىق ئارىلىق ئوخ-
شاش بولۇش كېرەك.

بۇنداق قىلغاندا ئوغرى
تەرلەش ھادىسىسىنى يوقىتىپ،
ياخشى ئۇخلىيالايسىز.



جىسمانىي ۋە روھىي
جەھەتتىكى چارچاش كەلتۈرۈپ
چىقىرىدىغان ھارغىنلىقمۇ دا-
ئم كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ. بۇ خىل
روھىي ئاجىزلىق بىر تەرەپتىن
«روھ» تا ئەكس ئەتسە، يەنە بىر
تەرەپتىن «تەن» دە ئەكس ئې-
تىدۇ. شۇڭا، ئالىقانى غىدىق-
لىغاندا، تۆۋەندىكى ئۈچ رايون-
نى تەكرار ئۇۋۇلاش كېرەك. بۇ
ئۈچ رايون نېرۋىنى يېنىكلى-

تىشكە ياردىمى بار بولغان «ئاللىقان مەركىزى»، ئىچكى ئەزالار ئىقتىدا-
رىنى كۈچەيتىدىغان «ئاشقازان، تال، چوڭ ئۈچەي رايونى» ۋە «جىيەنلى
سەنچىن رايونى» (健理三针区) دىن ئىبارەت.

باش ئاغرىسا يۈرەك پەللىسى بىلەن داللىك پەللىسىنى ئۇۋۇلاش

بىر داڭلىق يازغۇچى ئۇزاق مەزگىللىك نامراتلىق تۇرمۇشتىن مۇنداق بىر ھېكمەتنى تونۇپ يەتكەن: «دۇنيادا باش ئاغرىش ۋە پۇل ئۆتنە ئېلىشنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان قىيىن ئىش يوق». مېنىڭ كېسەللىرىم ئارىسىدا قانچىلىك ئادەمنىڭ پۇلغا قىسلىدىغانلىقىنى بىلمەيمەن، ئەمما


نۇرغۇن ئادەمنىڭ ئۇزۇن مۇددەت باش ئاغرىقىنىڭ ئازابىغا ئۇچرىد-
غانلىقىنى بىلىمەن. 62 ياشلىق
بىر ئايال سوزۇلما خاراكتېرلىك
باش ئاغرىقىنىڭ ئازابىنى تارتقىد-
لى ئون يىلدەك بوپتۇ. بۇ ئارد-
لىقتا كۆپلىگەن دوختۇرخانىغا
بېرىپ كۆرۈنگەن بولسىمۇ ساقاي-
ماپتۇ. ئاخىرىدا ئۇ سىناپ بېقىش
نىيىتىدە مېنىڭ قېشىمغا كەپتۇ.
مەن بىۋاسىتە ئۇنىڭ ئال-



قىنىنىڭ مەركىزى قىسمىدىن باشلاپ داۋالدىم. بىر نەچچە كۈرس داۋا-
لىغاندىن كېيىن، ئۇنى ئازابلان كېلىۋاتقان باش ئاغرىقى يوقالدى.
مەن داۋالىغان ئۇرۇن ئوتتۇرا بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىدىكى يۈ-
رەك پەللىسى (大陵) بىلەن قول بېغىشنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى داللىك
(大陵) پەللىسى بولۇپ، بۇ ئىككى پەللە يۈرەك قېپى جىڭلوسى (心经)
دا.

باش ئاغرىشنىڭ قان تومۇرلار قىسقىراش بىلەن بىۋاسىتە مۇناسى-
ۋىتى بولغاچقا، قان تومۇرلارنى ئىدارە قىلىدىغان يۈرەك ئىقتىدارىدا

نورمالسىزلىق پەيدا بولغاندا
 شۇئان ئىپادىسىنى كۆرسىتىدۇ.
 شۇڭا، يۈرەك بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋىتى بولغان يۈرەك قېپى جىڭلوسىدىكى پەللىنى غىدىقلىغاندا، يۈرەك ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپلا قالماي، باش ئاغرىشىنى تېزگىنلىگىلى بولىدۇ.



يۈرەك پەللىسى (心穴) بىلەن داللىك (大陵) پەللىسىنىڭ تۈرلۈك باش ئاغرىقىنى داۋالاشقا ئاجايىپ ئۈنۈمى بار بولۇپ، غىدىقلىغاندا، يېڭى، چاچ قىسقۇچ ياكى چىش كولىغۇچ ئىشلەتسە بولىدۇ. غىدىقلاش ئۇسۇلى يۇقىرىقى نەرسىلەرنىڭ ئۇچى بىلەن كۈچلۈك، تەكرار غىدىقلاشتۇر. بۇ باش ئاغرىقىنى تېزگىنلەپلا قالماي، يەنە مېڭىنىڭ سەگەك ھالىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا باش ئاغرىيدىغان ئورۇنغا ئاساسەن ئوخشىمىغان پەللىنى غىدىقلاش كېرەك. باشنىڭ ھەممە يېرى ئاغرىسا چىيەن توۋدىيەن نۇقتىسىنى (前头点)، باشنىڭ چوققىسى ئاغرىسا، توۋدىڭ دىيەن نۇقتىسىنى (头顶点)، ئارقا مېڭە ئاغرىسا، خوۋ توۋدىيەن نۇقتىسىنى (后头点)، باشنىڭ ئىككى تەرىپى ئاغرىسا پىيەن توۋدىيەن نۇقتىسىنى (偏头点)، ئەگەر ئويقان (يەپ تويماسلىق) ياكى مەستلىكتىن بولغان باش ئاغرىقى بولسا، چىيەن توۋدىيەن نۇقتىسىنى غىدىقلىسا بولىدۇ. يۈ-قىزىقى ئۇسۇل بىلەن يۇقىرىقى پەللىلەرنى غىدىقلىغاندا ئادەتتە باش ئاغرىقى يوقايدۇ. ئەگەر ئۈنۈمى كۆرۈلمىسە، ئۇنداقتا مېڭە قىسمىدا باشقا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەن بولۇشى مۇمكىن. بۇنداق بولغاندا ئۆز ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا بېرىپ تەكشۈرتۈپ بېقىش كېرەك.

بىئارام بولغاندا جۇڭ چۇڭ ، شاۋچۇڭ پەللىلىرىنى ئۇۋۇلاش لازىم


مېنىڭ بىر ئارتىس ئاغىنەم بار بولۇپ، ئەسلىدە مىجەزى ئانچە ئوسال ئەمەس ئىدى. ئەمما كېيىن خىزمەتتىكى بېسىم ئېغىرلىشىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە يېتەرلىك ئۇخلىيالماي، ئىچى تىتىلدايدىغان، كۈن بويى بىئارام بولىدىغان بولۇپ قېلىپ، كىچىككىنە ئەرزىمەس ئىشلار ئۈچۈن باشقىلار بىلەن دائىم جىدەللىشىپ، بىر ئېغىز گەپ ياقمىسىلا ئۆزئارا ئۇرۇشۇپ كېتىدىغان دەرىجىگە يېتىپتۇ.

بۇ تىپىك بىئاراملىقنىڭ ئەمەلىي مىسالى.

ئەمەلىيەتتە بىئاراملىق بىر خىل روھىي جىددىيلىكتۇر. بۇ خىل ئەھۋال داۋاملىشىۋەرسە روھىي جەھەتتە زەئىپلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىدۇ. رېپلا قالماي، يەنە ئاشقازان يارىسى، يۈرەك كېسىلى، يۇقىرى قان بېسىم قاتارلىق كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا، تەن ساغلاملىقىنى ساقلاشتا ھەددىدىن زىيادە تىت - تىت بولۇشتىن ساقلىنىپ، كەيپىياتنى ئازادە تۇتۇش كېرەك.

بىئاراملىقنى داۋالايدىغان ئەڭ ئۈنۈملۈك پەللە ئوتتۇرا بارماق تىرىقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى جۇڭ چۇڭ (中冲) پەللىسى بىلەن چىمچىلاق تىرىقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاۋچۇڭ (少冲) پەللىسىدۇر. بۇ ئىككى پەللە يۈرەك قېپى جىڭلوسى بىلەن (心包经)، يۈرەك جىڭلو (心经) سىدا. بۇ ئىككىسى يۈرەك ئىقتىدارىنى تىزگىنلەيدىغان جىڭلودۇر.





شۇڭا سىز جۇڭ چۇڭ،
شاۋچۇڭدىن ئىبارەت بۇ ئىككى
پەللىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسىز.
ئىز، بىئاراملىق تەبىئىي يوقى.
لىپ، ياخشى كەيپىياتنى ئەس.
لىگە كەلتۈرەلەيسىز.

غىدىقلاش ئۇسۇلى يۇقىرى.
رىقى پەللىلەرنىڭ ئىككى تەرىپى.
پىنى بارماق بىلەن داۋاملىق
ئۇۋۇلاشتۇر. ئەگەر ئوڭ، سول
ئىككى قول تەڭلا ئاغرىسا، قاتە.
تىقراق ئاغرىغان قولىنى ئاۋۋال

ئوتتۇرا بارماق بىلەن چىمچىلاقنى كۈ.
چەپ ئۇۋۇلسا، كەيپىياتنى تۇراقلاشتۇر.
غىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش كېرەك. جۇڭ چۇڭ (中冲)، شاۋچۇڭ (少冲) پەللىلىرىنى
ئۇۋۇلغاندىن سىرت، يەنە خۇبىيەن (虎边) پەللىسى ياكى ياكى شى
(阳溪) پەللىسىنى ئۇۋۇلسىمۇ بولىدۇ. (虎边) پەللىسى تۇتقاقلق
كېسەللىكنى داۋالاشتا ئالاھىدە ئۈنۈملۈك پەللە بولۇپ، باشقا پەللىلەرنى
غىدىقلاشقا بىرلەشتۈرۈپ بۇ پەللىنى (ئۇۋۇلاپ) غىدىقلاپ بەرسە ئۈنۈمى
تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

مېنىڭ ئۆگەتكىنىمنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، ھېلىقى ئارتىس
باشقىلار بىلەن توقۇنۇشۇپ قالغاندا، دەرھال ئادەم يوق جايغا بېرىپ،
ئوتتۇرا بارماق ۋە چىمچىلىقنى كۈچەپ ئۇۋۇلايدىكەن. ئۇ ماڭا بۇ ئۇ.
سۇلنىڭ ھەقىقەتەن ئۈنۈملۈك ئىكەنلىكىنى، ئۇزۇنغا بارمايلا بىئاراملىق
كەيپىياتىنىڭ تېزگىنلەنگەنلىكىنى ئېيتتى.

شۇنىڭدىن كېيىن، ئۇ تەبىئىي ھالدا باشقىلارغا ئېغىر - بېسىق
مۇئامىلە قىلىدىغان بوپتۇ.

ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن، بىئارام بولغان چېغىڭىزدا يۇقىرىقى ئۇ.
سۇلنى سىناپ باقىڭىز بولىدۇ.

قان بېسىمى تۆۋەن بولسا قان ئايلىنىشى ياخشىلاش مۇھىم

تۆۋەن قان بېسىم كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ قان تومۇرى ھەددىدىن زىيادە ئاجىز بولۇپ، قىسقىرىشى ۋە قان ئايلىنىشى ئاستا بو-
لىدۇ. شۇڭا، قان قىلدام تومۇرلارغا بارالماي قول، پۇت سوۋۇپ كېتىش ئا-
لامەتلىرى كېلىپ چىقىدۇ.

قان بېسىمى تۆۋەنلەپ كەتسە قول، پۇت سوۋۇپ كەتكەندىن سىرت،
مېڭە ۋە باشقا ئىچكى ئەزالارغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. يۈرەكنىڭ رولى تەر-
كىبىدە ئوكسىگېن بولغان قاننى پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزۈپ بېرىشتىن
ئىبارەت. ۋەھالەنكى، قان بېسىمى تۆۋەن ئادەملەرنىڭ ئىچكى ئەزالىرى
ئىزچىل ئوكسىگېن يېتىشمەسلىك ھالىتىدە تۇرىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال
مۇقەررەر ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىغا زىيان يەتكۈزىدۇ. شۇڭا، قاتتىق چار-
چاش تۆۋەن قان بېسىم كېسەللىرىنىڭ تىپىك كېسەللىك ئالامىتى ھې-
سابلىنىدۇ.

مېڭىنىڭ ئەھۋالىمۇ شۇنداق. مەسىلەن: تۆۋەن قان بېسىم كېسە-
لىگە گىرىپتار بولغانلار تۇيۇقسىز ئورنىدىن تۇرغاندا بېشى قايدۇ. بۇ



مېڭىگە ئوكسىگېن يېتىشمەسلىكنىڭ ئالامىتىدۇر.

يۇقىرىقى ئەھۋالدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، تۆۋەن قان بېسىمى بىمارلىرىنىڭ جىددىي ئورۇنلاشقا تېگىشلىك ۋەزىپىسى قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش. بۈرەك قان ئايلىنىشتەك مۇھىم ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان. شۇڭا، ئالىقانى غىدىقلىغاندا، تۆۋەندىكى پەللىلەرنى يەنى ئالىقان ئىچى قول بېغىشىدىكى شېن مېن (神门)، دالىڭ (大陵) (پەللىسىنى، قول دۈمبىسى قول بېغىشىدىكى يانچى (阳池) پەللىسىنى، نامسىز بارماق ۋە چىمچىلاق كەينىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى جۇڭ جۇ (中渚) پەللىسىنى مەركەز قىلىش كېرەك.

توڭلىسا يانچى پەللىسىنى ئۇۋۇلاش لازىم

مېدىتسىنا ئالىملىرىنىڭ تونۇشتۇرىشىچە، 54% ئاياللاردا يەنى ھەر ئىككى ئايالنىڭ بىرىدە توڭلاش كېسىلى بار ئىكەن. بۇنىڭدىن بۇ خىل كېسەللىك نىسبىتىنىڭ قانچىلىك يۇقىرىلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە ھەر قېتىم كۆز، قىش پەسلى كىرگەن مەزگىلدە ھەممىشە زور تۈركۈمدىكى ئاياللار قول، پۇت ۋە بەل توڭلاش قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن دوختۇرغا كۆرۈنگىلى كېلىدۇ.



ئۆتكەن يىلى كۈزدە 50 نەچچە ياشلىق بىر ئايال مېنىڭ قېشىمغا كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ. ئۇ تىپىك «توڭلاش كېسىلى» گە گىرىپتار بولغان ئىكەن. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئۇ كىيىم - كېچەك ساتىدىغان يەككە تىجارەتچى بولۇپ، بىر يىلدىكى تۆت پەسلىنىڭ ھەممىسىدە سىرتتا مال ساتىدىكەن. ئۆتكەن يىلىدىن باشلاپ، كۈز كىرىشى بىلەنلا، بولۇپمۇ قىشتا

پۇتىنىڭ ئاستى توڭلايدىغان بولۇپ قاپتۇ. قانچە قېلىن ئاياق كىيىمۇ ئىسسىمىغاچقا مال سېتىشقا چىدالماپتۇ. «نۇرغۇن خېرىدارلار يېشىڭىز چوڭ كۆرۈنمەيدىكەنسىز دېدى، ئەمما ھازىرقى ئەھۋالىمدىن قارىغاندا بۇ يىل قىشنى ئۆتكۈزەلەيمەيدىغاندەك قىلىمەن، تىجارەت قىلىسام بولىغىدەك!» سۆزلەپ مۇ.



شۇ يەرگە كەلگەندە، ئۇ ئازابلىنىپ كۆز يېشى قىلدى.

مەن ئۇنىڭغا بۇ ئىشنى دەپ ئازابلىنىشىڭىزمۇ بولىدۇ. چۈنكى پۇت، قول توڭلاشنى داۋاملىق ياخشى چارسى بار دېدىم. قولىڭ كەينى بىلەن غىشىدا چىمچىلاقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدە ياكى (阳池) دەيدىغان پەللە بار. ياكى چى پەللىسى پۈتۈن بەدەندىكى قان ئايلىنىشى، ھورمون ئاجرىتىشنى باشقۇرىدىغان مۇھىم پەللە. بۇ پەللىنى غىدىقلىغاندىلا، قان ئايلىنىشى تېز سۈرئەتتە راۋانلاشتۇرۇپ، ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىشنى تەڭپۇڭلاشتۇرغىلى، بەدەننى ئىسسىتىپ، توڭلاش كېسەللىكىنى يوقاتقىلى بولىدۇ.


ياڭ چى پەللىسىنى غىدىقلىغاندا، ئەڭ ياخشىسى ئاستا-ئاستا غىدىقلاش، ۋاقتى ئۇزۇنراق، كۈچ بوش بولۇشى كېرەك. ئەڭ ياخشىسى ئىككى قولىنى تەڭ ئىشقا سېلىش كېرەك. ئالدى بىلەن بىر قولىنىڭ ئوتتۇرا بارمىقى بىلەن يەنە بىر قولىنىڭ ياكى چى پەللىسىنى بېسىش، ئاندىن ئالماشتۇرۇپ، يەنە بىر قولىدىكى ياكى چى پەللىسىنى بېسىش كېرەك. مۇشۇنداق ئۇۋۇلىغاندا كۈچ تەبىئىي ھالدا ئوتتۇرا بارماقتىن ياكى چى پەللىسىگە تەسىر قىلىدۇ. باشقىلارنى ياردەملەشتۈرۈش ھاجەتسىز.

توڭلاش كېسەللىكىنى يوقىتىشتا ياكى چى (阳池) پەللىسىنى ئۇۋۇلاشتىن سىرت، يەنە گۈەن چۈڭ (关冲)، مىڭ مېن (命门) دىن ئىبارەت ئىككى پەللە بىلەن «ئالاقىلىق مەركىزى» نى ماسلاشتۇرۇپ غى-

دېقلىسا، تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.
پۇت، قولى توغلايدىغان ئاياللار ئادەتتە پەقەت ياك چى (阳池)
پەللىسىنى ئوۋۇلاشنى داۋاملاشتۇرسلا قىش كېلىشتىن غەم قىلمىسىمۇ
بولىدۇ.

قول، پۇت توغلاشنىڭ كۈشەندىسى ياك چى پەللىسى

قول، پۇت مۇزلاش كېسەلى سوغۇقتىن قورقۇش كېسىلىمۇ دېيىد-
لىپ، ئاياللاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. ئەمما نۇرغۇن ئەرلەرمۇ بۇ كېسەلنىڭ ئازا-
بىنى تارتىدۇ.




بىر قېتىم 24 ياش-
لىق بىر ياش يىگىت
كېسەل كۆرسەتكىلى مە-
نى ئىزدەپ كەپتۇ. ئۇ دەل
سوغۇقتىن قورقۇش كې-
سەلى بولۇپ، ئېغىرلە-
شىپ كېچىدە تۆۋەنكى
يېرىم بەدىنى قاتتىق

مۇزلىغانلىقتىن ئۇخلىيالمايدىغان دەرىجىگە يېتىپتۇ. كۈندۈزدىكى ئەھ-
ۋالى بىر ئاز ياخشى بولسىمۇ، ئەمما يەنىلا مۇزلايدىكەن. ئەگەر باشقىلار-
نىڭ زاڭلىق قىلىشىدىن قورقمىسا، ئۇنىڭ ياشانغانلار كىيىدىغان كىچىك
پاختىلىق چاپان كىيگۈسى بار ئىكەن.

مەن ئۇنىڭغا تەكلىپ بېرىپ، بۇنىڭدىن كېيىن پۇت، قولڭىز يەنە
مۇزلىسا ئىككى قولڭىزنىڭ دۈمبىسىنى ئۆزئارا سۈركىسىڭىز بەدىنى-
ڭىزنى ئىسسىتالايسىز دېدىم.

ئۇ بىر ئاز ئىشەنمىگەن ھالدا: «بۇنىڭ داۋلىسى نېمە؟» دەپ سورىدى.
مەن ئۇنىڭغا چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدىم. قول دۈمبىسىدە ياك چى
(阳池) دەيدىغان بىر پەللە بار بولۇپ، ئۇ سەنچىياۋ جىڭ جىڭلوسى



(三焦经) دىكى مۇھىم پەللە
 ھېسابلىنىدۇ. سەنجىياۋ جىڭ
 جىڭلوسى مەخسۇس شاڭ جىياۋ
 (上焦)، جۇڭ جىياۋ (中焦)،
 شىياجىياۋ (下焦) دىن ئىبارەت
 ئادەم بەدىنىدىكى ئۈچ گۇرۇپپا قىم-
 زىتىما سىستېمىسىنى باشقۇرىدۇ.
 بۇنىڭ ئىچىدە شاڭ جىياۋ يۈرەك ۋە
 ئۆپكەننىڭ ئىقتىدارىنى، جۇڭ جى-
 ياۋ ھەزىم قىلىش ئەزالىرىنى، شى-
 ياجىياۋ سۈيىدۈك ئاجرىتىپ چىقىم-
 ىش ئەزالىرىنى باشقۇرىدۇ.

ئىككى قولى ئۆزئارا سۈركىگەندە ياك
 چى پەللىسىنى غىدىقلىغىلى بولىدۇ.

ھەربىر ئادەمدە مۇنداق تەسىرات بولىدۇ. ھەرىكەت قىلغاندىن كېيىن
 ياكى تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ. بۇ نېمە
 ئۈچۈن؟ بۇ شاڭ جىياۋ (上焦) بىلەن جۇڭ جىياۋ (中焦) ئۆز رولىنى
 جارى قىلدۇرغانلىقتىن شۇنداق بولىدۇ. سىيگەندىن كېيىن نېمە ئۈچۈن
 ئىختىيارسىز يېنىك تىترەيدۇ؟ بۇ شىياجىياۋ (下焦) نىڭ ئىسسىقلىق
 ئېنېرگىيىسى قويۇپ بەرگەنلىكىدىن بولىدۇ.

سەنجىياۋ جىڭ (三焦经) جىڭلوسىنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىغا
 نىسبەتەن ياك چى پەللىسى ئاجايىپ رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ. ياك چى
 (阳池) دېگەن بۇ نام قۇياشنىڭ ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسىنى توپلاش
 دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ پەللىنى غىدىقلىغاندا سەنجىياۋ جىڭ
 جىڭلوسىنىڭ ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، ئىسسىقلىق ئېنېرگىيە-
 سىنى پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزگىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇ جىڭلودد-
 كى مۇھىم ئىچكى ئەزالار بىلەن ماس بولغان پەللەلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ
 تۇرىدۇ.

جۇڭگو تېبابىتىنىڭ پەللە ئارقىلىق داۋالاشتىكى سېھرىي كۈچى شۇ
 يەردىكى، بىر پەللىنى غىدىقلىسا، بۇ غىدىقلاش جىڭلو (经络) ئار-

قىلىق مۇناسىۋەتلىك ئىچكى ئەزالارغا يەتكۈزۈلىدۇ.

ياڭ چى پەللىسى سوغۇقتىن قورقۇش كېسىلىنى داۋالاپلا قالماي، يەنە ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنى تەڭشەيدۇ. شۇڭا زۇكام، دەم سىقىلىش، ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكلىرى، بۆرەك ئىقتىدارى تەڭپۇڭسىزلىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە پايدىسى بار. خې گۇ (合谷) پەللىسى بىلەن بىرلىكتە «ھەممىگە قادىر پەللە» دېيىشكە بولىدۇ. كۆپچىلىكنىڭ ئېسىدە چىڭ تۇتۇشىغا ئەرزىيدۇ.

ياڭ چى (阳池) پەللىسىنىڭ ئورنى دەل قول دۈمبىسى ئارىلىق سۆڭىكى توپلاشقان جايدا. ئىزدەپ تېپىش ئۇسۇلى - ئالدى بىلەن قول دۈمبىسىنى كۆتۈرسە، قول بېغىشىدا بىر نەچچە يول قاتلاق پەيدا بولىدۇ. قول دۈمبىسىگە يېقىن تەرەپتىكى قاتلاقنى بېسىپ، مەركىزىي قىسمىنى باسسا ئاغرىيدىغان بىر نۇقتا بار. بۇ نۇقتا دەل ياڭ چى پەللىسىدۇر. غىدىقلاش ئۇسۇلى ناھايىتى ئاددىي. مۇشۇ پەللىنى مەركەز قىلىپ، قول دۈمبىسىنى ئۇۋۇلسا بولىدۇ. قول دۈمبىسىنى سۈركەپ بەرسە، ياڭ چى (阳池) پەللىسىمۇ تولۇق غىدىقلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن پۈتۈن بەدەننى ئىسسىتىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.



سوغۇقتىن قورقۇش كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ ئۇخلىيالمىغانلار ئۇخلاشتىن بۇرۇن، يۇقىرىقى ئۇسۇلنى قوللانسا، بەدەننى دەرھال ئىسسىيىدۇ.

دانىخورەكنى يۇقىتىش چارىسى

دانىخورەكنى بەزىلەر «ياشلىقنىڭ سىمۋولى» دېسە، يەنە بەزىلەر چاقچاق قىلىپ «كېچىكىپ كەلگەن ياشلىق» دەيدۇ. بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى ياش بىر قىز قېشىمغا كېسەل كۆرسەتەتتى. كىلى كەپتۇ. ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە كۆڭلۈمدە ھەيران قالدىم. ئۇنىڭ يۈزىگە چىققان دانىخورەك ھەقىقەتەن كۆپ ئىدى. ئۇنىڭ يۈزىنى دانىخورەك قاپلاپ كېتىپتۇ دېگەندىن كۆرە دانىخورەكتىن ھاسىل بولغان يۈز

دېگەن تۈزۈك ئىدى. ئۇ تۇنجى مۇھەببەتلىشىش سەۋەبىدىن دانخورەكنى تېز داۋالاشقا ئالدىرىغان ئىكەن. ئۇ ھەر كۈنى كۆڭلىدىكى ئادىمى بىلەن بىللە ئىشقا بېرىپ كېلىشنى ئۈمىد قىلىدىكەن. ئەمما ئۇ يۈزى سەۋەبىدىن ئۆزىنىڭ تەلىپى توغۇرلۇق ئېغىز ئاچالماپتۇ. ئۇ سۆزلەۋېتىپ كۆز يېشى قىلدى.

مەن دەرھال ئۇنىڭغا تەسەللى بەردىم ھەم مۇنداق ئۇسۇلنى ئۆگىتىپ قويدۇم. ھەر كۈنى يۈزىڭىزنى بىر نەچچە قېتىم پاكىز يۇيۇپ، ئوت يېقىلغان يىپسىمان كۈچە ياكى چاچ قىسقۇچ بىلەن باش بارماق تۈۋىنىڭ سەل تۈۋەن تەرىپىدىكى خې گۇ (合谷) پەللىسىنى ئۇۋۇلاڭ دېدىم. ئۇ قايتقاندىن كېيىن مەن دېگەن بويىچە قىپتۇ. بىر نەچچە ھەپتىدىن كېيىن يۈزىدىكى دانخورەكلەر زور دەرىجىدە ئازىيىپتۇ. بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى ئۇ خۇشال كەيپىياتتا مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ، كۆڭلىدەكى ئادىمىنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇچرىشىش تەلىپىنى قوبۇل قىلغانلىقىنى ئېيتتى.



دانخورەك تېرىگە چىقىدىغان ئارتۇقچە نەرسە بولۇپ، پەيدا بولۇش سەۋەبى يېمەك - ئىچمەكتىن بولىدۇ. شۇڭا، دانخورەكنى يوقىتىشتا ھەزىم قىلىش ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، بەدەندىكى كېرەكسىز

ماددىلارنى ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە كۆپرەك چىقىرىۋېتىش كېرەك. ھەر كۈنى ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈجە ياكى ئۇچلۇق نەرسىلەر بىلەن خې گۇ (合谷) پەللىسىنى غىدىقلىسا، بەدەندىكى كېرەكسىز ماددىلارنىڭ پەيدا بولۇشىنى تېزگىنلەپ، دانىخورەكنى ئازايتىش مەقسىد- تىگە يەتكىلى، شۇنداقلا قەۋزىيەتنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا، شېن مېن (神门)، ئېرجىيەن (第二间)، ياكى «ئاشقازان. تال. چوڭ ئۈچەي رايونى» نى غىدىقلىسىمۇ، ئوخشاشلا ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئەگەر ماسلاشتۇرۇپ بىرلىكتە غىدىقلىسا، ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. يۈزىگە دانىخورەك چىقىپ، بىئارام بول- ۋاتقان ياشلار بۇ ئۇسۇلنى سىناپ باقسا بولىدۇ. ئىشىنىمەنكى چىرايىڭىز يېڭى تۈسكە كىرىپ، تېتىك ۋە روھلۇق بولۇپ قالسىز.

كۆز چارچاشنىڭ سەۋەبى روھىي جەھەتتىن چارچاشتۇر

نۇرغۇن كىشىلەر كىتاب ئوقۇشقا ئامراق بولۇپ، ھەر كۈنى ئۇخلاشتىن بۇرۇن بىردەم كىتاب ئوقۇيدۇ، بەزىدە ھەتتا تاڭ ئاتقۇچە كىتاب ئوقۇيدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت كىتاب ئوقۇشنىڭ ئاسارىتى - كۆز ئاغرىش، چار- چاشتۇر. «كۆز چارچاش» تىلغا ئېلىنسا ئالدى بىلەن ئادەمگە چوقۇم كۆزنى ھەددىدىن زىيادە ئىشلەتكەن دېگەننى ئەسلىتىدۇ. ئەمما، نۇرغۇن

ئادەملەر كۆزنى ھەددىدىن زىيادە ئىشلەتكەندىن كېيىن كۆزنى يۇمۇپ بىردەم ئارام ئالسىلا ئەس- لىگە كېلىدۇ. ۋەھالەنكى بەزىلەر كۆزنى ھەددىدىن زىيادە كۆپ ئىشلەتمىسىمۇ دائىم كۆزىنىڭ پىچاق تىققاندەك ئاغرىيدىغانلىق- قىنى، ھەتتا باسقاندەك سېپىزىم بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ.



بىر دېرىكتور مۇشۇ خىل كۆز چارچاش كېسىلىگە گىرىپتار بوپتۇ. دەسلەپتە كۆزىنىڭ سانجىلىپ ئاغرىغانلىقى ۋە باسقانداك تۇيغۇ پەيدا بولغانلىقىنى ھېس قىلىپتۇ. ئۇ كۆزىنى ھەددىدىن زىيادە ئىشلەتكەن. لىكتىن دەپ ئويلاپتۇ، ئەمما ئارام ئالسىمۇ بۇ خىل ئەھۋال داۋاملىشىۋېرىپتۇ. كۆز بۆلۈمىگە تەكشۈرتسە، ھېچقانداق كېسەل چىقماپتۇ. دوختۇر ئۇنىڭغا ئېھتىمال كۆز ئەينىكىڭىز ماس كەلمىگەن ئوخشايدۇ دەپتۇ. ئەمما ئۇ ھازىر تاقىۋالغان كۆزەينىكىنى يېقىندىلا ياساتقان ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. مەن كۆز بۆلۈمى مۇتەخەسسسى بولمىساممۇ، ئەمما ئۇنىڭ كۆزىنىڭ چارچىشىنىڭ سەۋەبىنى تەكشۈرۈپ بولغاندىن كېيىن مەسىلىنىڭ كۆزدە ئەمەس، بەلكى ھەددىدىن زىيادە جىددىيلىكتىن بولغان ئاشقازان، ئۈچەي چارچاش كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى بايقىدىم.

چوڭ ئۈچەي جىڭلوسى، ئىنچىكە ئۈچەي جىڭلوسى، ئاشقازان جىڭلوسى، يۈرەك قېپى جىڭلوسىدىن ئىبارەت تۆت جىڭلو كۆزدىن ئۆتىدۇ. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، كۆز ئاسانلا ئاشقازان، ئۈچەي ياكى نېرۋىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. شۇڭا، مەن ئۇنىڭ كېسىلىگە روھىي جەھەتتىن چارچاش كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىچكى ئەزالار نورمال-سىزلىقىدىن بولغان دەپ ھۆكۈم قىلدىم.

روھىي ئاجىزلىقتىن بولغان كۆز چارچاش شۈبھىسىزكى جىڭلو (经路) بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئۇنى داۋالاش ئۇسۇلىمۇ ئەلۋەتتە جىڭلودىن ئايرىلالمايدۇ. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، ئالىقانىدىكى «يۈرەك قېپى رايونى»، كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى چوڭ ئۈچەي جىڭلوسىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولغان شاڭ ياك (商阳) پەللىسى بىلەن ئىنچىكە ئۈچەي جىڭلوسىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولغان چىمچىلاق تىرىقى تۆۋەن تەرىپىدىكى شاۋزې (少泽) پەللىسىنى ئۇۋۇلاشتىن ئىبارەت.

بۇ يەرلەرنى كۈچەپ غىدىقلىسا، ئاشقازان، ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ. غىدىقلىغاندا چاچ قىسقۇچنىڭ ئۇچى بىلەن كۈچلۈك غىدىقلىنىدۇ.

ھېلىقى دېرىكتور مېنىڭ ئۇسۇلۇم بويىچە داۋالغاندىن كېيىن، كۆز چارچاش ئەھۋالىدىن ئۈزۈل - كېسىل خالى بولپتۇ.


چىش ئاغرىسا بۆرەك پەللىسىنى غىدىقلاشنىڭ ئۈنۈمى ياخشى

ئاغرىغان ئورۇننىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن چىش ئاغرىقىنى بىر نەچچە خىلغا ئايرىشقا بولىدۇ.

بىرىنچى، چىشنى قۇرت يېيىش، بۇ ئادەتتە چىرىگەن چىش دېيىمىز. ئۇ ئېغىر دەرىجىدە چىش يىلىكى ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چىش يىلىكى ياللۇغى دېگەن -


ئىمىز: چىشتىكى ئېمال ماددىسى باكتېرىيىنىڭ چىرىتىشىگە ئۇچراپ پەيدا بولغان نېرۋا ياللۇغىنى كۆرسىتىدۇ.

چىش يىلىكى ياللۇغى قوزغالغاندا ئۇنى داۋالاشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى، ئالقان ئىچى تەرىپىدىكى چىمچىلاق - نىڭ بىرىنچى بوغۇمىدىكى



بۆرەك پەللىسى (肾穴) نى غىدىقلاشتۇر. يېرىم كېچىدە جىددىي قوزغالغاندا، چىش كولىغۇچ بىلەن بۆرەك پەللىسىنى غىدىقلىسا، ئاغرىقىنى پەسەيتكىلى بولىدۇ.

ئىككىنچى، چىش شىللىق پەردىسى ئاغرىش. بۇ خىل ئەھۋالغا ئۇچرىغاندا ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل - قول دۈمبىسىنىڭ باش بارماق تۈۋى بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماق تۈۋى كېسىشكەن جايدىكى خې گۇ (合谷) پەللىسىنى غىدىقلاشتۇر. ئۇنىڭدىن باشقا، «چىش ئاغرىق نۇقتىسى» نى غىدىقلاشنىڭمۇ ئۈنۈمى ياخشى. چىش ئاغرىش نۇقتىسى ئوتتۇرا بارماق بىلەن نامىز بارماق كېسىشكەن جايدا، مۇھەببەت سىزىقچىسىنىڭ دەل



ئۈستىدە. يۇقىرىقى ئىككى پەللىنى غىدىقلاشنىڭ چىش يىلىكى ياللىغى ئاغرىقىنى داۋالاشتىكى ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى.

ئۈچىنچى، چىش دوختۇرلىرىنىڭمۇ بېشىنى ئاغرىتىدىغىنى چىش يۈزى ئاغرىقى. بۇ خىل ئاغرىقنىڭ سەۋەبى ھازىرغىدەك

چە ئېنىق ئەمەس. قىش كۈنلىرى كېسەللىك ئالامىتى ئەڭ روشەن، سوغۇقنى توسۇۋالغىلى بولمىغاچقا، كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە قاتتىق ئاغرىپ كېتىدۇ. بىراق، ئاللىقاننى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى ياخشى. يەنى ئاللىقان ئىچى تەرىپىدىكى نامسىز بارماقنىڭ ئىككىنچى بوغۇمىدىكى جىگەر پەللىسىنى (肝穴) ئۇۋۇلسا بولىدۇ.

جۇڭگوچە تېبابەت ئىلمىي بۆرەك تەڭپۇڭسىزلىقىنى چىش ئاغرىدەك قىشنىڭ سەۋەبلىرىنىڭ بىرى دەپ قارايدۇ. شۇڭا، چىش ئاغرىغاندا، بۆرەك بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان (肾穴) بۆرەك پەللىسىنى غىدىقلاش كېرەك.

كىشىلەر دائىم گىرىپتار بولىدىغان چىش ئوقۇرى يىرىڭدىشىنىمۇ بۆرەك پەللىسىنى (肾穴) ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالغىلى بولىدۇ.


بويۇنغا يەل تۇرۇپ قالسا گۈرۈچ بىلەن غىدىقلاش ئۇسۇلى

ئەتىگەندە ئاممىۋىي ئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇپ ئىشقا ماڭغاندا بەزىلەرنىڭ قىياپىنىڭ غەلىتە بولۇپ قالغانلىقىنى، مەسلەن: بىر يۆنىلىشكە قاراپ تۇرسا مىدىر - سىدىر قىلمايدىغانلىقىنى ياكى ئارقا مېڭىسىدىن مۇرد - سىڭىچە چىڭ تارتىشىپ قالغانلىقىنى بايقايمىز. ئۇلارنىڭ تۈنۈگۈن كې-

چىدىكى ئۇخلاش قىياپىتى توغرا بولماي بويۇن پېيى تولغىنىپ كەتكەن بولۇشى ئېھتىمالغا بەك يېقىن.

بويۇن پېيىنىڭ تولغىنىپ كېتىشى كۆپىنچە ئۇخلىغان ۋاقىتتىكى قىياپىتىنىڭ تەبىئىي بولمىغانلىقىدىن، بەزىدە كۈچلۈك سوغۇق شامال-نىڭ غىدىقلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ ئىختىيارغا قويۇپ-ۋەتسە، مۇسكۇل قېتىپ قېلىپ ئىختىيارىي ھەرىكەت قىلغىلى بولمايدۇ. شۇڭا، بۇنداق ئەھۋالغا يولۇققاندا ئىمكانىيەتنىڭ بىرپىچە تېز داۋالاش كېرەك.

ئەڭ ئۈنۈملۈك چارە - چىمچىلاق بارماق تىرىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپى -



چىدىكى شاۋزى (泽) پەللىسى بىلەن قول دۈمبىسى ئوتتۇرا بارماق تۈۋىدىكى «بويۇن. يۈت» قۇنچاق رايونى» دىكى بويۇن چوققا نۇقتىسىنى غىدىقلاشتۇر. چۈنكى ئىنچىكە ئۇچەي جىگە-لوسى بويۇندىن مۇرە قىسمىغى-چە بولغان ئارىلىقتا ئايلىنىدۇ. شۇڭا، شاۋزى پەللىسىنى غىدىق-لىغاندا، بويۇن مۇسكۇللىرىنىڭ نورمالسىز چىڭ تارتىشىشىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ-دىن باشقا، «بويۇن. يۈتقۇنچاق رايونى» نىڭ ھەر خىل بويۇن تېلىپ ئاغرىشىنى داۋالاشتا ياخ-شى ئۈنۈمى بار.

غىدىقلاش ئۇسۇلىدا ئەڭ ياخشىسى چاچ قىسقۇچ ياكى چىش كولىغۇچ قاتارلىق نەرسى-

لەر بىلەن كۈچلۈك غىدىقلىسا بولىدۇ. «بويۇن. يۇتقۇنچاق رايونى» غا گۈرۈچ دېنى قويۇپ پلاستىر بىلەن چىڭ چاپلاپ غىدىقلىسا بولىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى يېنىك بولسا سەنجىياۋ جىڭ (三焦经) جىڭلوسىدىكى ئۆپكە پەللىسى بىلەن جىگەر پەللىسىنى غىدىقلىسا بولىدۇ. چاچ قىسقۇچ قاتارلىق ئۇچلۇق نەرسىلەر بىلەن غىدىقلىسا ياكى ئوت يېقىلغان يىپسىمان كۈجە بىلەن ئۈچ قېتىمدىن يەتتە قېتىمغىچە داغلىسا بويۇن ئاغرىقى يوقىلىدۇ.


بويۇننى ئەسلىدە كەينىگە بۇراش تەس، ئەمما مۇشۇنداق كېسەل-لەرمۇ بار، چۈنكى ئۇخلىغان ۋاقىتتىكى قىياپىتى تەبىئىي بولمىسا، بىر-دەملىك قاتتىق ئاغرىق بويۇننى ئېغىر دەرىجىدە قايرىۋېتىپ، كەينى تەرەپكە يانتۇ قىلىپ قويىدۇ. ماڭا مۇشۇنداق بىر كېسەل ئۇچرىغان. مەن ئەينى ۋاقىتتىلا ئۇنىڭغا «بويۇن. يۇتقۇنچاق رايونى» نى گۈرۈچ بىلەن غىدىقلاشنى ئۆگىتىپ قويغان ئىدىم. بىر نەچچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ بويىنىدىكى قايرىلىپ كەتكەن پەي ئوڭشىلىپتۇ ھەتتا ھەددىدىن ئارتۇق تاماكا چېكىشتىن بولغان يۇتقۇنچاق ياللۇغمۇ پۈتۈنلەي ساقىيىپتۇ. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بويۇن، يۇتقۇنچاق يال-لۇغىنىڭمۇ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

كۆڭۈل ئاينىسا شېن مېن، گۈەن چۇڭ پەللىلىرى ۋە ئالىقان مەركىزىنى ئۇۋۇلاش لازىم

باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، مەكتەپ تەشكىللىگەن تۈرلۈك پائالىيەتلەر ئىچىدە سەھرا سەيلىسى ئادەمنى ئەڭ خۇشال قىلىدۇ. ئەمما كۆڭلى ئاينىيدىغان كىچىك دوستلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، خۇشال سەھرا سەيلىسى كۆپىنچە ئازابلىق كەچۈرمىشكە ئاي-لىنىپ قالىدۇ.

باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ بەشىنچى يىللىقىدا ئوقۇيدىغان بىر قىز-چاقنىڭ ئاشقازىنى خېلىلا ئاجىز بولغانلىقتىن، ماشىنىدا ئولتۇرۇپ تەۋ-


رەنسە كۆڭلى ئاينىپ قۇسىدىكەن. شۇڭا، باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ 2 - يىللىقىدىن كېيىن بىر قېتىم سەھرا سەيلىسىگە چىقماپتۇ. مەن بۇ ئىشنى بىلىپ، مەلۇم بىر قېتىملىق سەھرا سەيلىسىگە چىقىشتىن بىر كۈن بۇرۇن بۇ قىزچاقنى تېپىپ، ئۇ- نىڭغا ئالقان غىدىقلاشنىڭ بەزى ئۇ- سۇلىنى ئۆگىتىپ قويدۇم. ئىككىنچى كۈنى كەچتە ئۇ قىزچاق ماڭا رەھمەت ئېيتقىلى كەپتۇ. چۈنكى بۇ قېتىملىق سەھرا سەيلىسىدە ئۇنىڭدا ئىلگىردە- كىدەك كۆڭلى ئاينىش ئەھۋالى كۆ- رۈلمەپتۇ.



مېنىڭ بۇ قىزچاققا ئۆگەتكەن ئۇسۇلۇم چىمچىلاقنىڭ يان تەرىپىدە-

كىي يەنى قول بېغىشىنىڭ ئۈستىدىكى شېن مېن (神门) پەللىسى، نامىز بارماق تىرىقنىڭ ئۈۋەن تەرىپىدىكى گۈەن چۇڭ (关冲) پەل- لىسى ۋە ئالقان ئوتتۇرىسىدىكى «ئالقان مەركىزى» نى توختىماي غە- دىقلاش ئىدى.

كۆڭۈل ئاينىش ئاشقازان - ئۈچەي، ئىچكى قۇلاق، يۈرەك قاتارلىق



ئۈچ چوڭ ئەزادا بىرلا ۋاقىتتا ئۆز- گىرىش يۈز بېرىشتىن پەيدا بولىدۇ. يۇقىرىقى ئەھۋاللارنىڭ پەيدا بو- لۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، يۇقىرىقى ئۈچ چوڭ ئەزا بىلەن مۇ- ناسىۋەتلىك بولغان پەللىلەرنى تو- لۇق غىدىقلاش كېرەك، يەنى ئىند- چىكە ئۈچەي شېن مېن پەللىسى، قۇلاقنى ئۇنىدىغان سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىدىكى گۈەن چۇڭ (关冲)

(پەللىسى ۋە يۈرەك قىپى ئالىقان مەركىزىي ئۈچ ئورۇندىن ئىبارەت. غە-
دىقلاش ئۇسۇلى - ئۇزۇن ۋاقىت ئاستا غەدىقلاشتۇر.

مەن ئۇ قىزچاققا باشقا بىر چارىنىمۇ ئۆگىتىپ قويدۇم: يەنى ئىككى
قول ئالغىنىدىكى مۇناسىپ پەللىلەرگە بىر نەچچە ئال يېرىمى كېسىۋې-
تىلگەن گۈرۈچنى قويۇپ پلاستىر بىلەن چىڭ چاپلاپ، ماشىنىدا ئولتۇر-
غاندا قاتتىق گۈرۈچ ئارقىلىق شېن مېن ۋە گۈەن چۈڭ پەللىلىرىنى ئاستا
غەدىقلىسا، كۆڭۈل ئاينىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.


مېنىڭ بۇ ئۇسۇلۇم قەدىمدىن بۈگۈنگىچە تارقىلىپ كەلگەن بىر
قەدىمىي ئۇسۇلدىن ئۆزگەرتىلگەن. ئىلگىرىكى كىشىلەر يىراق سەپەرگە
چىقماقچى بولغاندا، كېمىلەردە كۆڭلى ئاينىپ قېلىشتىن ساقلىنىش
ئۈچۈن، ئالدى بىلەن تۆت دانە مىس پۇل تەييارلاپ قويۇپ، ئالغىنىغا
توختماي سۈركەپ ئولتۇرسا سەپىرى كۆڭۈللۈك بولىدىكەن. ئەمەلىيەتتە
بۇنىڭ قائىدىسى يەنىلا ئالىقاننى ئۇۋۇلاش (غەدىقلاش). قەدىمكىلەر پە-
قەت قايسى پەللىنى غەدىقلايدىغانلىقىنى ئېنىق دەپ بېرەلمەيتتى. ھال-
بۇكى، مەن بولسام غەدىقلايدىغان پەللىنى كۆرسىتىپ بەردىم. بۇنداق
غەدىقلىغاندا نىشان تېخىمۇ ئايدىڭ، ئۈنۈمى تەبىئىي ھالدا تېخىمۇ
ياخشى بولىدۇ.

چاچ ئاقارسا ئالدى بىلەن بۆرەكنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش لازىم

چېچى كۈمۈشتەك ئاقارغان مويسىپىتلار ئەلۋەتتە ھۆرمەتكە سازاۋەر
بولىدۇ، ئەمما چاچ تەدرىجىي ئاقىرىپ قارا چاچ بىلەن ئالماشقاندا، ئادەم-
نىڭ قېرىشقا باشلىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ، بۇ ئادەمنىڭ كۆڭلىنى ھەمىشە
غەش قىلىدۇ.

بۆرەك ئىقتىدارىنىڭ زەئىپلىشىشى چاچ ئاقىرىشنىڭ ئاساسىي سە-
ۋەبى. ياش ۋاقتىدا بۆرەكنىڭ ئىقتىدارى ساغلام بولسا چاچ ھەم قارا ھەم
پارقىراق ۋە ئېلاستىكىلىقى كۈچلۈك بولىدۇ. ياش چوڭايسا، بۆرەك ئىق-

تىدارى ئاجىزلىشىپ، ئاق چاچ تەبىئىي كۆپىيىدۇ ھەمدە چاچ چۈشىدۇ. شۇڭا، ئاق چاچ پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، قارا چاچنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئالدى بىلەن بۆرەك ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك. ئالغاندىكى پەللىلەر ئىچىدە بۆرەك بىلەن مۇناسىۋىتى ئەڭ زىچ بولغىنى - چىمچىلاق بىرىنچى بوغۇمىدىكى بۆرەك پەللىسى (肾穴) بىلەن چىمچىلاق ئىككىنچى بوغۇمىدىكى مىڭ مېن (命门) پەللىسى، بۇ ئىككى پەللە ئوڭ، سول ئىككى بۆرەكنى بىلدۈرىدۇ. ئۇ چاچ بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك، ئەگەر سەۋرچانلىق بىلەن توختىماي غىدىقلىسا، بۆرەك ئىقتىدارىنى ياخشىلاپ چاچنىڭ ھاياتى كۈچىنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ.



ئۇنىڭدىن باشقا، ئالغان ئوتتۇرىسىدىكى «ئالغان مەركىزى»، ئوتتۇرا بارماق تىرىنقى - نىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى گۈەن چۈك (关冲) پەللىسى ۋە قول بېغىشى ئوتتۇرىسىدىكى ياك چى (阳池) پەللىسىنى غىدىلاشتىڭمۇ چاچ ئا - قىرىشنىڭ ئالدىنى ئې - لىشتىكى ئۈنۈمى ياخ -

بۆرەك پەللىسى بىلەن مىڭ مېن پەللىسىنى ئۇۋۇلغاندا، كۈچ يېنىكرەك، ۋاقىت ئۇزاقراق بولۇشى كېرەك.

شى. ئەگەر بۆرەك پەللىسى (肾穴) بىلەن مىڭ مېن (命门) پەللە - سىنى ماسلاشتۇرۇپ بىرگە غىدىقلىسا ئۈنۈمنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈر - گىلى بولىدۇ. ئەمما غىدىقلاش ئۇسۇلىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەگەر بەك كۈچ ئېغىر كەلسە ئەكسىچە چاچ ئاقىرىشىنى تېزلىتىۋېتىدۇ.

توغرا ئۇسۇلى پەللىلەرنى يېنىك بېسىش، ھەر كۈنى تەخمىنەن 50 مىنۇت ئەتراپىدا ئۇۋۇللىسا بولىدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت داۋاملاشتۇرسا چاچ قارا،

پارقراقلىشىپ، ئاق چاچ يوقلىدۇ.

ئىلگىرى بىرسى مېنىڭ قېشىغا كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتىكەن. بېشىدىكى ئاق چاچنى كۆرسىتىپ: «بەدەن ھەر قانچە ساغلام بولسىمۇ، چاچتىن قېرىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدىكەن!» دېدى. مەن يۇقىرىقى ئۇسۇلنى ئۇنىڭغا ئۆگىتىپ قويدۇم، ئۇ ئىشەنچ قىلالماسلىق پوزىتسىيەسى بىلەن «سىناپ باقىدىغانلىقى» نى بىلدۈردى. تەخمىنەن بىر ئايدىن كېيىن، ئۇ يەنە مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. ئىشخانىغا كىرىپلا بېشىنى تۆۋەن قىلىپ: «دوختۇر، قارىڭا» دېدى، بېشىمنى كۆتۈرۈپ قارىسام ئۇنىڭ چېچى ھەقىقەتەن ئىلگىرىكىدىن كۆپ قارىداپتۇ.

كۆز تورلاشسا ياڭ لاۋ پەللىسىنى ئۇۋۇلاش لازىم

ئادەمنىڭ قېرىشى ئادەتتە پۇت بىلەن كۆزدىن باشلىنىدۇ. ھازىر تۈرلۈك ياشانغانلار كېسەللىكلىرى ئىچىدە كۆز قېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىنتايىن مۇھىم مەسىلە بولۇپ قالدى. لېكىن مۇناسىۋەتلىك پەللە ۋە ئۇ-رۇنلارنى مۇۋاپىق ئۇۋۇلاپ بەرگەندە كۆز تورلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولۇپلا قالماي، يەنە 50 ياشتىن كېيىن قېرىلىقتىن بولىدىغان كۆز گۆھ-رىگە ئاق چۈشۈش كېسىلىگە ئاسان گىرىپتار بولۇشنى تىزگىنلىگىلى بولىدۇ.

بۇ يەردە مەن ئەمەلىي بىر مىسال كەلتۈرەي: 85 ياشلىق بىر ئايال



قېرىلىقتىن بولىدىغان كۆز گۆھرىگە ئاق چۈ-شۈش كېسىلىگە گىرىپ-تار بولغان ئىكەن. ئۇ 70 يېشىدا بۇ كېسەلگە گى-رىپتار بولغاندىن كېيىن، كۆزەينەكنى ئىزچىل يې-نىدىن ئايرىماپتۇ. مەن



ئۇنى ھەپتىدە بىر قېتىم داۋالسىدىم. يەنى يىگنە بىلەن ئۇنىڭ قول بېغىشىدىكى پەللىنى غىدىقلىدىم. پەقەت ئۈچ قېتىمدىلا ئۇ-نۇمى ئىنتايىن ياخشى بولۇپ، كۆزەينەك تا-قىمايمۇ گېزىت ئوقۇيالايدىغان بولدى.

مېنىڭ قوللانغان ئۇسۇلۇم يىگنە بىلەن ئۇنىڭ قول دۈمبىسى چىمچىلاق تەرىپىنىڭ بېغىشىدىكى ياڭ لاۋ پەللىسى (养老穴) نى غىدىقلاش. بۇ پەللىنىڭ ياشانغاندا بول-

دىغان كۆز تورلىشىش ۋە كۆز چارچاشنى داۋالاشتىكى ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى. ئەلۋەتتە، ئادەتتىكى ئادەملەرنىڭ كۆزىگە قان تولۇش، كۆزى چارچاش قاتارلىق كېسەللەرگىمۇ ئۈنۈمى ياخشى. ئەمما ياڭ لاۋ پەللىسى-نىڭ ئالاھىدىلىكى ياش قانچە چوڭ بولغانسېرى ئۈنۈمى شۇنچە ياخشى، بۇ بەلكىم ئاتالمىش ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈش تېخنىكىسى بولۇشى مۇمكىن! ياڭ لاۋ پەللىسى (养老穴) بىلەن ئوخشاش ئۈنۈمگە ئىگە بول-غىنى ياڭ لاۋ نۇقتىسى (养老点) بولۇپ، ئۇ چىمچىلاق بارماق تۈۋىگە جايلاشقان، 40 ياشتىن كىچىكلەرگە ئۈنۈمى ياخشى. ئۇنىڭ رولى ياڭ لاۋ پەللىسى بىلەن ئوخشاش. ياڭ لاۋ پەللىسى نۇقتىسىنى غىدىقلاشنى ئۆيدە قىلىشىمۇ بولىدۇ. ھەر كۈنى ئەتىگەن، كەچتە 10 قېتىمدىن 20 قېتىمغىچە ئۇۋۇلسا كۇپايە.


مۇشۇنداق تەكرار ئۇۋۇلاشنىڭ ئەڭ ئۇزۇن ۋاقتى ئۈچ ئاي، مۇشۇ ۋاقىت ئىچىدە پەللىدىكى ئاغرىق پۈتۈنلەي يوقىلىدۇ، كۆزدىكى كېسەل-لىكىمۇ ئاستا-ئاستا يوقىلىدۇ. ئەگەر ئۇۋۇلاشقا قوشۇپ چاچ قىسقۇچ، ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن داغلىسا ياكى ئەمەن ئوتى بىلەن داغلىسا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

ھەيز كېسىلگەن دەۋردە ئېرىنىڭ غەمخورلۇقى بولمىسا بولمايدۇ

بىر نەچچە ئاي ئىلگىرى 40 ياشتىن ھالقىغان بىر چۆپ ئەر - خو - تۇن مېنىڭ قېشىمغا كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ. ئېرى ئايالىنىڭ ئىلگىرى ئىشچان، مۇلايىم ئايال ئىكەنلىكىنى، يېقىندىن بۇيان يۈرۈش - تۇرۇشنىڭ غەلىتە بولۇپ قېلىپ، كېچىدە دا - ئىم ئۇخلىيالمايدىغانلىقىنى، سەل - پەل كۆڭلىگە ياقمايدىغان ئىش بو - لۇپ قالسا ئاچچىقلىنىپ كېتىدىغانلىقىنى، بەزىدە بېشىنى قۇچاقلاپ، نېمىلەرگىدۇر قايغۇرغاندەك قىلىدىغانلىقىنى، بەزىدە تۇيۇقسىز ۋارقىراپ كېتىدىغانلىقىنى، تېخىمۇ يامان بولغىنى ئېرىگە نەرسە - كېرەك ئاتىدە - غان بولۇپ قالغانلىقىنى ئېيتتى.


روشەنكى، بۇ ئايالنىڭ نورمالسىز يۈرۈش - تۇرۇشى ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى توسالغۇنىڭ ئالامىتى. ئوتتۇرا ياشلىق ئاياللارنىڭ ھەممىسىدە مۇشۇنداق ئەھۋال كۆرۈلىدۇ، پەقەت دەرىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ. ئەينى ۋاقىتتا مەن ئۇ ئايالنى يىڭنە سانجىپ داۋالدىم ھەم ئېرىگە: «خوتۇن - گىزنى ساقايسۇن دېسىڭىز ئۇنى يالغۇز قويماڭ، بولمىسا كېسىلى تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ كۆڭلىنى چۈشىنىپ، ئۇنىڭغا ياردەم بېرىد - شىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن» دەپ تاپلىدىم.

ئوتتۇرا ياشلىق ئاياللار ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى توسالغۇغا دۇچ



كەلگەندە تۈرلۈك ئازابلارغا دۇ - چار بولىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلاشقاندا دەرھال داۋالاپ ئورۇنسز دەرت - ئەلەمدىن ساقلىنىش كېرەك.

داۋالاشنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى - پەللىنى غىدىقلاش - تۇر. ھەيز كېسىلىش دەۋرىدە -




كى توسالغۇ نېرۋىنىڭ ئۆزى-
نى تىزگىنلىشىنى ۋە بەدەن-
دىكى ھورمون تەڭپۇڭلۇقى-
نى يوقىتىشتىن بولىدۇ.
شۇڭا، ھورمون ئاجرىتىپ
چىقىرىش بىلەن مۇناسىۋەت-
لىك بولغان پەللىنى (چىم-
چىلاق دۆڭچىسىدىكى بۆرەك
پەللىسى (肾穴) نى غە-

دىقلاش، شۇنىڭغا ماسلاشتۇرۇپ جىنسىي ئەزالار ئىقتىدارى بىلەن مۇنا-
سىۋەتلىك بولغان رايون چىمچىلاق يان تەرەپتىكى «جىنسىي رايونى»
نى ۋە نېرۋىنى تىنچلاندۇرغۇچى پەللە (ئاللىقان ئوتتۇرىسىدىكى «يۈرەك
قېپى رايونى» نى ئۇۋۇلاش ئىنتايىن مۇھىم. پەقەت ئۇسۇل مۇۋاپىق بول-
سىلا ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى كېسەللىك ئالامەتلىرىنى يەڭگىلەت-
كىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا قول دۈمبىسىدىكى ياڭ چى (阳池)،
ئېرجىيەن (二间)، گۈەن چۈڭ (关冲) قاتارلىق پەللىلەرنى ماسلاش-
تۇرۇپ بىرلىكتە غىدىقلىسا، كېسەللىك ئالامىتىنى يەڭگىلەتتىكە زور
ياردىمى بولىدۇ.

بايا تىلغا ئېلىنغان ھېلىقى بىر جۈپ ئەر-خوتۇن مەن ئۆگەتكەن
ئۇسۇل بويىچە قىلىپ زور ئۈنۈمگە ئېرىشكەن. يېقىندا مەن ئۇلارنىڭ
سىرتتىن ئەۋەتكەن ئانكىرىتىكىسىنى تاپشۇرۇپ ئالدىم، ئۇلار ساياھەت قى-
لمىۋېتىپتۇ. قارىغاندا ئىككىسىنىڭ كەيپىياتى ياخشىدەك تۇرىدۇ. ئەمەل-
يەتتە، ئاياللارنىڭ ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى ئازابلىرىنى يوقىتىشتا ئې-
رنىڭ غەمخورلۇقى ۋە ئىلھام بېرىشى كەم بولسا بولمايدۇ.

قورساق كۆپسە ھەزىم قىلىشتا مەسىلە كۆرۈلگەن بولىدۇ

بىر قېتىم بىرسى ئىنتايىن خىجالەت بولغان ھالدا ماڭا ئايالىنىڭ



ئەدەبلىك، چىرايلىق، ئەخلاىلىق ئىكەنلىكىنى، ئەمما باشقىلارغا دې- گىلى بولمايدىغان، يەنى كۆپ ئو- سۇرىدىغان ئەيىبى بارلىقىنى، بىر نەچچە قېتىم ھەر قانچە تىرىشىمۇ توسۇۋالالماي خەلقى ئالەم ئالدىدا ئۇياتقا قالغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ تونۇشتۇرۇشىنى ئاڭ- لىغاندىن كېيىن، مەن بۇنىڭدا يەنە

باشقا مەسىلىنىڭ بارلىقىنى ھېس قىلىپ، ئۇنىڭغا تېزراق ئايالنى ئېلىپ كېلىپ تەكشۈرتۈش توغرىسىدا تەكلىپ بەردىم. بىرقانچە كۈندىن كېيىن ئەر - خوتۇن بىللە كەلدى. ئۇ ئايال ماڭا بىر نەچچە ئاي ئىلگىرى قورساق كۆپۈش ئالامىتى بولغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ سۆزى مېنىڭ قىياسىمنىڭ دەرۋەقە خاتا ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلى- دى، ئۇنىڭدىكى مەسىلە قورساق كۆپۈشتە، ئوسۇرۇش پەقەت سىرتقى ئىپادىسى خالاس.

قورساق كۆپۈش «ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش» مۇ دېيىلىدۇ. ئاشقا- زان، ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى ئاجىزلاشسا نورمالسىز گاز ئې-



چىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قور- ساقتا گاز كۆپىيىدۇ. بۇنى مۇقەررەر سىرتقا چىقىرىۋېتىش كېرەك. مانا بۇ بىز دائىم دەيدىغان ئوسۇرۇشتۇر. بۇ- نى ئۆز ئىرادىمىز بويىچە تىزگىنلە- گىلى بولمايدۇ.

ئۇ ئايالنىڭ قورساق كۆپۈشتىن باشقا يەنە سوغۇقتىن قورقۇش كې- سىلى، يەنى مۇزلاش كېسىلى بار ئىكەن. بۇمۇ ھەزىم قىلىش ناچار-

لىشىشتىن بولغان. يېيىلگەن يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلىش ئۈچۈن مېڭە كۆپ مىقداردىكى قاننى ئاشقازان، ئۈچەيگە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. بۇنداق بولغاندا قول، پۇت قاتارلىق ئاخىرقى ئورۇنلارغا قان يېتىشمەي بەدەن مۇزلايدۇ.

قورساق كۆپۈشنى يوقىتىشتا ئالدى بىلەن ئاشقازان، ئۈچەينىڭ نورمال ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرەك. بۇنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى، چوڭ ئۈچەي، ئېرجىيەن (二|回) پەللىلىرى ۋە «ئاشقازان. تال. چوڭ ئۈچەي رايونى» نى غىدىقلاشتۇر. چوڭ ئۈچەي پەللىسى ئالغان ئىچى تەرىپىدىكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىدا، ئېرجىيەن (二|回) پەللىسى قول دۈمبىسى كۆرسەتكۈچ بارماق تۈۋىدە، بۇ ئىككى پەللە چوڭ ئۈچەي جىگىلوسىدا.

«ئاشقازان. تال. چوڭ ئۈچەي رايونى» دەپ ئاتىلىشىدىكى سەۋەب، ئۇنىڭ ئاشقازان، ئۈچەي بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقىدا. غىدىقلىغاندا بەلگىلىك كۈچ دەرىجىسى بولۇش كېرەك. ئەمما ھەددىدىن زىيادە كۈچلۈك بولۇشقىمۇ بولمايدۇ. چاچ قىسقۇچنىڭ كەينى تەرىپىدىن پايدىلىنىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ.

يەلتاشمىدا قان سىرغىپ چىقسا كېرەك يوق

يازنىڭ ئاخىرلىرىدىكى بىر كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بىر ياش ئايال قېشىمغا كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ. دەسلەپتە مەن قانچە ياشقا كىرگەنلىكىمنى پەرەز قىلالىدىم. چۈنكى ئۇ غەلىتە ياسىنىۋالغان ئىكەن. گەرچە كۈز پەسلى يېقىنلاشقان بولسىمۇ، ئەمما ھاۋا يەنىلا ئىسسىق ئىدى. ئۇ بولسا ئۇزۇن يەڭلىك كۆينەك كىيىۋالغان، بوينىنى شارپا بىلەن ئورنىۋالغان ئىدى. ئۇنىڭ گېپىدىن قارىغاندا زۇكاممۇ ئەمەس ئىدى. ئەمما چوڭ چىغ شىلەپسى يۈزىنىڭ يېرىمىنى توسىۋالغان، شىلەپسىنىڭ يان تەرىپىدىن قارا رەڭلىك كۆزەينىكى بىلەنەر - بىلىنمەس كۆرۈنۈپ تۇراتتى. بۇ خىل ياسىنىشتىن ھەر قانداق ئادەم ئۇنىڭ قانچە ياش ئىكەنلىكىنى

پەرەز قىلالمايتتى.

ئەمما مەن ئۇنىڭ ياسىنىشىدىن بىردەمدىلا سەۋەبىنى چۈشەندىم. گەرچە شىلەپە، شارپا، كۆزەينەك بىلەن قەۋەت - قەۋەت ئورالغان بولسىمۇ، ئەمما يۈزىدە نورۇز گۈلىگە ئوخشايدىغان يەلتاشما كۆرۈنۈپ تۇراتتى. مەن شۇ مەيداندىلا يېگنە سانجىپ داۋالىدىم. بىر ھەپتىگە قالمايلا تولۇق سا- قايدى.


يەلتاشىمنىڭ بىۋاسىتە سەۋەبى ھازىرغىچە تەكشۈرۈپ ئېنىقلانغىنى يوق، ئەمما جەزمەن چىقىرىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

ئادەملەر يېمەكلىكلەرنى يېگەندىن كېيىن ئاشقازان، ئۈچەي ئارقى- لىق ھەزىم بولۇپ قوبۇل قىلىنىدۇ. ئاندىن جىگەرگە يەتكۈزۈلىدۇ. جىگەر زەھەر قايتۇرۇش رولىغا ئىگە بولۇپ، ناچار ماددىلارنى پارچىلايدۇ. زەھىرى

قايتۇرۇلغاندىن كېيىنكى ماددىلار يەنە بۆرەككە يەتكۈزۈلىدۇ. كېرەكسىز ماددىلار ئەڭ ئاخىرىدا سۈيۈك بىلەن بەدەن سىرتىغا چىقىرىۋېتىلىدۇ.

مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئادەم- نىڭ جىگەر، بۆرەك ئىقتىدارى ئاجىز- لايدۇ. نەتىجىدە جىگەر، بۆرەك قاتارلىق ئەزالار ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالمىي، كېرەكسىز ماددىلار بەدەندە يىغىلىپ قا- لىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇنىڭغا ماس ھالدا تەر بەزلىرىمۇ تەدرىجىي رولىنى يوقى- تىپ، بەدەندە كېسەللىك ئالامەتلىرى ئىپادىلىنىدۇ. بۇ خىل كېسەللىك يە- لتاشما دېيىلىدۇ.

يەلتاشىمنى داۋالاشنىڭ ئەڭ ئۈ- نۈملۈك ئۇسۇلى جىگەر، بۆرەك ئىقتىدا- رى بىلەن ئىنتايىن مۇناسىۋەتلىك



بولغان جىگەر پەللىسى، بۆرەك پەللىسى، ئۆپكە پەللىسى ۋە نېرۋا بىلەن باغلىنىشلىق بولغان يۈرەك پەللىسى، ياكى چى (肝胆) پەللىسى قاتارلىق پەللىلەرنى غىدىقلاشتۇر.

يەلتاشمىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن كېرەكسىز ماددىلارنىڭ بەدەندىن ھەيدىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. شۇڭا جىگەر، بۆرەك بىلەن مۇ-ناسىۋەتلىك بولغان پەللىلەرنى غىدىقلىغاندا، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە كۈچ سالىمىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ئازدۇر كۆپتۇر قان سرغىپ چىقىسمۇ كېرەك يوق.

بوۋاسىرنى داۋالاشتا خۇي يىن نۇقتىسىنى ئۇۋۇلاش لازىم

«10 ئۇرنىڭ توققۇزىدا بوۋاسىر بار» دەيدىغان گەپ بار. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بوۋاسىرغا گىرىپتار بولغانلار ناھايىتى كۆپ. سە-ۋەبى يېمەك - ئىچمەك ئادىتى، تۇرمۇش ئادىتىدە بولۇشى مۇمكىن. لېكىن ھەقىقىي سەۋەبى ھازىرغىچە تېپىلغىنى يوق. ئادەتتىكى ئادەملەرنىڭ بى-لىدىغىنى ۋېنادىكى قان تەتۈر ئايلىنىپ يۈرەككە قايتىدۇ. پەقەت بوۋاسىر پەيدا بولغاندىلا ئاندىن تەتۈر يۆنىلىش بويىچە ئاقىدۇ. قان بىر ئوڭ، بىر



تەتۈر ئايلىنىپ ئاخىرىدا تىنما پەيدا قىلىدۇ. ئېغىر بولغاندا تىنما ئىششىيدۇ. ئىششىپ مەلۇم دەرىجىگە يەتكەندە يې-رىلىپ قانايىدۇ.

بوۋاسىرنىڭ ئازابىنى ئۆزى تارتمىغۇچە ئۇنى چۈ-شىنىش قېيىن بولۇشى مۇم-كىن. ئەمما مەن ئۆزۈم بوۋا-سىر بولغان. بىرىنچىدىن دورا يېمەي، ئىككىنچىدىن ئۆپ-راتسىيە قىلدۇرماي، پۈتۈنلەي

ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن خۇي يىن نۇقتىسىنى داغلاشنىڭ بوۋا-سىرغا ئاجايىپ ئۈنۈمى بار.

ئالقانى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى بىلەن ساقايدىم. كېسەل ساقايغاندىن كېيىن ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان يەڭگىللىكنى ھېس قىلدىم. شۇنىڭ بىلەن ئۇسۇلۇمنى بەزى دوستلىرىم ۋە تونۇشلۇرۇمغا ئۆگىتىپ قويدۇم. ئۇزۇن ئۆتمەي مەن كۆپ مىقداردا مىننەتدارلىق خېتىنى تاپشۇرۇۋالدىم. نۇرغۇن كىشىلەر مەن ئۆگەتكەن ئۇسۇل بويىچە ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن، نەچچە يىل ھەتتا ئون نەچچە يىل تارتقان بوۋاسىرنىڭ ئازابىدىن بىراقلا قۇتۇلۇپتۇ. ئەمەلىيەتتە مېنىڭ ئۆگەتكەن ئۇسۇلۇم ئانچە مۇرەككەپ ئەمەس، پەقەت خۇي يىن (会阴点) نۇقتىسىنى غىدىقلىسا بولىدۇ خالاس. خۇي يىن نۇقتىسىنىڭ ئورنى قول دۈمبىسى چىمچىلاقنىڭ ئىككىنچى بوغۇ-مىدا، مېنىڭ داۋالاش تەجرىبەمگە ئاساسلانغاندا بۇ پەللىنىڭ بوۋاسىرنى داۋاشتىكى ئۈنۈمى ئاجايىپ يۇقىرى.

غىدىقلاشتا پەقەت ئوت يېقىلغان يېسىمان كۈچە بىلەن داغلاش بىلەنلا چەكلىنىدۇ. خۇي يىن نۇقتىسىنى تەكرار غىدىقلىسا مەقۇت قا-ناشنى تېزلىكتە تېزگىنلىگىلى بولىدۇ.

ئادەتتىكى بوۋاسىرنى ئوت يېقىلغان يېسىمان كۈچە بىلەن يەتتە قېتىمدىن ئون قېتىمغىچە داغلىسا ساقايتقىلى بولىدۇ. ئەگەر مەقۇتنىڭ قورۇغۇچى مۇسكۇلى قورۇلۇپ ۋېنا قانغان بولسا 20 قېتىمدىن 30 قېتىم-غىچە غىدىقلاش كېرەك.

ئۇنىڭدىن باشقا خۇي يىن (会阴点) نۇقتىسىدىن سىرت، قول دۈمبىسىدىكى خې گۇ (合谷) پەللىسى ۋە كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بى-رىنچى بوغۇمىدىكى چوڭ ئۈچەي پەللىسىنى غىدىقلىسىمۇ بوۋاسىرنى داۋالىغىلى بولىدۇ.


بوغۇم سىرقىراپ ئاغرىسا غىدىقلاشتىن سىرت يەنە كۈچلۈك ئىرادە بولۇش كېرەك

ئەتىگەندە ئورنىدىن تۇرغاندا، تۇيۇقسىز پۇت، قول بوغۇملىرى سىرقىراپ ئاغرىپ، ئىختىيارىي پائالىيەت قىلغىلى بولمايدۇ. ئىشنىشكە

بولدۇكى، نۇرغۇن كىشىلەردە مۇشۇنداق تەسىرات بولغان. پەسىل ئالا-
ماشقان ياكى تېمپېراتۇرا ئۆزگەرگەندە، بەدەن سەزگۈرلۈك بىلەن سىرقىراپ
ئاغرىيدۇ. مانا بۇ بوغۇملارنىڭ سىرقىراپ ئاغرىشىنىڭ دەسلەپكى ئالامىتى.
بوغۇمنىڭ سىرقىراپ ئاغرىشى ئالدى بىلەن بارماق قاتارلىق كىچىك
بوغۇملاردىن باشلىنىدۇ. ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ئاندىن چوڭ بوغۇملارغا
كېڭىيىدۇ. ئارقىدىنلا بوغۇملار قېتىپ قولى، پۇتى خۇددى ئۆزىنىڭ ئە-
مەستەك بىلىنىدۇ. بۇنداق سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنى يىلتىز-
زىدىن ساقايتىش قىيىن. ئادەمنى قىيىن ئەھۋالدا قويىدىغان بىر خىل
كېسەللىك.

بوغۇم ئاغرىقى ئازابىنى تارتىدىغانلارنىڭ كۆپىنچىسى ئوتتۇرا ياش-
تىن ئاشقان ئادەملەر بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئورتاق ئالاھىدىلىكى شۇكى پۈتۈن
بەدەننىڭ قان ئايلىنىشى راۋان بولماسلىق، ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىش
تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىشتىن ئىبارەت.

شۇڭا، بوغۇم سىرقىراپ ئاغرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشتا،
ئالدى بىلەن پۈتۈن بەدەندىكى قان ئايلىنىشى راۋانلاشتۇرۇپ، ھورمون
تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرەك. بەش بارماق ئۈچىدىكى پەل-
لىلەردىن شاۋشاڭ (商少)، شاڭ ياك (商阳)، جۇڭ چۇڭ (中冲)،
گۈەن چۇڭ (关冲)، شاۋزې (少泽) قاتارلىقلارنى غىدىقلاپ بارماق
ئۈچىنى ئىنچىكىلىك بىلەن ئۇۋۇلغاندا، مۇناسىۋەتلىك ئىچكى ئەزالار-



دىكى قان ئايلىنىشى راۋانلاشتۇرۇپ، قاننى بوغۇملارغىچە، ئاخىرقى ئۇ-
چىغىچە ئايلاندۇرغىلى بولىدۇ.

ئۇنىڭدىن سىرت، قول دۈمبىسىدىكى خۇجىن سۈن (虎金寸)،
ياڭ چى (阳池) پەللىلىرىنى ھەر كۈنى غىدىقلاشنى داۋاملاشتۇرسىمۇ،
بوغۇم سىرقىراپ ئاغرىشىنى يەڭگىللەتكىلى بولىدۇ.


بىر قېتىم بىر ئويمىكار مەن بىلەن ئۇزاق پاراڭلاشتى. ئۇ ماڭا بىر
نەچچە يىل ئىلگىرى بوغۇم ئاغرىش كېسەلىگە گىرىپتار بولۇپ، بارماق-
لىرىنىڭ پۈتۈنلەي دېگۈدەك قېتىپ قالغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ بىر ئوي-
مىكارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ھەقىقەتەن قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان-
لىق بولىدۇ. ۋەھالەنكى ئۇ قەتئىي تىز پۈكمەس روھىي بىلەن ھەر كۈنى
بارمىقىنى توختىماي ئۇۋۇلاپتۇ. بىر يىلدىن كېيىن، ئۇنىڭ بارماقلىرى
يەنە ئىلگىرىكىدەكلا ئەپچىل بولۇپ كېتىپتۇ.

مەن بۇ ھېكايىنى سۆزلەپ بېرىش ئارقىلىق ئوقۇرمەنلەرگە شۇنى
دەپ قويماقچىكى، مەيلى قانچىلىك ئېغىر دەرىجىدىكى بوغۇم ياللۇغى
بولۇشتىن قەتئىينەزەر پەقەت كۈچلۈك ئىرادە بولسلا، ئاغرىقنى يېڭىپ
ئەسلى ھالىتىگە قايتقىلى بولىدۇ.

يەلكە بوغۇم ياللۇغىنى دۋالاشتا ئۈنۈملۈك سەككىز پەللىنى غىدىقلاش

ئىلگىرى بىر مەھەل «يەلكە بوغۇم ئەتراپى ياللۇغى» تارقالغان، ھازىر
بۇ خىل كېسەللىك يوقالغاندەك. ئەمەلىيەتتە ئۇ ھازىر 50 ياشلىقلار (چوڭ-
لار) كېسەلى 50 ياشنىڭ ئالدى كەينىدە گىرىپتار بولىدىغان كېسەللىك دەپ ئاتى-
لىۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە بۇ خىل كېسەللىك 20، 30 ياشلىق ياشلاردىمۇ كۆرۈلىدۇ.
يېقىندا 20 نەچچە ياشلىق بىر ياش بۇ خىل كېسەلگە گىرىپتار بولۇپ،
مېنىڭ قېشىمغا كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ.


ئۇ مەلۇم مەكتەپنىڭ ئېغىرلىق كۆتۈرۈش تەنھەرىكەتچىسى ئىكەن.
مەشىقتىن ئاۋالقى تەييارلىق ھەرىكىتى ئىشلىگەندە، يەلكىسىنىڭ قاتتىق
ئاغرىغانلىقىنى ھېس قىپتۇ. ھەرىكەتتىن كېيىن ئېغىرلىق دەستىدىن
يەلكىسىنى كۆتۈرەلمەپتۇ. بىر نەچچە مىنۇت جۇڭگىيە داۋالاش ئارقىلىق



ئۇ ئەركىن ھالدا قولىنى
كۆتۈرەلەيدىغان بوپتۇ.
ئىشىنىمەنكى، ئۇنىڭ-
دىن باشقا نۇرغۇن ئا-
دەملەرمۇ مۇشۇنداق ئا-
زاب تارتقان. ئەمەلىيەتتە
بۇ ئوتتۇرا ياشلىقلاردا
كۆپ كۆرۈلىدىغان كې-
سەللىك بولۇپ، تىپىك


ئالامىتى مۇرە ئەتراپى سىر قىراپ ئاغرىدۇ. ساتراشخانىدا ئىشلەيدىغان بىر خانىم بولۇپ، مۇرە سۆڭىكى ئاغرىغاچقا قولىنىمۇ كۆتۈرەلمەيدىكەن. بە-زىدە ھەتتا ئاغرىق سەۋەبىدىن ئۇخلىيالمايدىكەن. ئەلۋەتتە خىزمەتمۇ قىلالمايدىكەن. شۇنىڭ بىلەن جۇڭگىي دوختۇرخانا كۆرۈنۈشكە مەجبۇر بوپتۇ. دەسلەپتە ئۇ پەللە ئارقىلىق داۋالاشقا بىر ئىشىنىپ، بىر ئىشەنمىدى. تەخمىنەن يېرىم يىل ئۆتكەندىن كېيىن ئاندىن بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇ-لىغا ئىشەندى.

ئەمەلىيەتتە مەن ئۇنى پەقەت ئۈچ قېتىم داۋالىدىم. بىرىنچى قېتىم داۋالغاندىن كېيىن ئۇنى ئۇخلاتمايدىغان ئاغرىق يوقالدى. بىلىكىنىمۇ سەل - پەل مىدىرلىتالايدىغان بولدى. ئىككىنچى قېتىم داۋالغاندىن كېيىن، بىلىكىنى خالىغانچە



ھەرىكەتلەندۈرەلەيدىغان بول-دى. ئۈچىنچى قېتىملىق دا-ۋالاش ئارقىلىق ئۇنىڭ بىلىكى ئەسلىدىكىدەك ساقايدى. بۇ ئىش تارقالغاندىن كېيىن نۇر-غۇن ئادەملەر داۋالانىشنى تەلەپ قىلدى. كۆپ قىسمى ئىككى، ئۈچ قېتىم داۋالاش ئارقىلىق ساقايدى. چوڭلاردا بولىدىغان مۇ-


شۇنداق يەلكە كېسىلى ياللۇغ-
لىنىشتىن كېلىپ چىقىدىغان
بوغۇم سىرقىراپ ئاغرىش ۋە
ماغدۇرسىزلىق بولۇپ، ئادەتتە
داۋالىمىسىمۇ ئۆزلۈكىدىن سا-
قىيىدىغان ئەھۋال بار. بەزىلەر
خاتا ھالدا داۋالىغىلى بولمايدۇ
دەپ قاراپ، ئىختىيارغا قويىۋې-
تىدۇ. بۇ خىل ئادەملەر پەللى-
بىلەن داۋالاشنىڭ سىرىنى چو-
قۇم بىلىمەيدۇ. ئەگەر چۈشەنسە-
دى، بۇ خىل يەلكە كېسەللىك-




بارماق ئۇچى بىلەن نامىز بارماق تۈۋد-
نى باسقاندا ئاغرىغان جاي پەللىنىڭ
ئورنىدۇر.

نىڭ تەرەققىي قىلىشىنى تىزگىنلىيەلگەن بولاتتى.

بىلەك بىلەن تۇتىشىدىغان پەللى نامىز بارماقتا، لېكىن يەلكە بو-
غۇمنىڭ ئورنى دەل بىلەكنىڭ ئايغىدا قولىدىكى پەللىلەرگە ماسلاشتۇ-
رۇپ ئېيتقاندا، نامىز بارماقنىڭ ئاساسىي بوغۇمىنىڭ تۈۋىدە. بۇ يەردىكى
ئاساسىي پەللى جىيەن جۇڭ (肩中) پەللىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئەتراپىغا
جىيەن ياك (肩阳)، چى خې (气合)، جىيەن يې (肩腋)، جىيەن
بى (肩臂) قاتارلىق پەللىلەر جايلاشقان. ئۇلارنى ماسلاشتۇرۇپ غىدىق-
لىغاندا، چوڭلاردىكى يەلكە كېسەللىنى داۋالاشتا ئۈنۈمى بىر قەدەر ياخشى.



جىيەن جۇڭ (肩中)
پەللىسىنىڭ كونكرېت ئورنى-
نى بېكىتىشتە، ئالدى بىلەن
مۇشتىمنى تۈگۈپ، ئاندىن
بەنە بىر قولىنىڭ كۆرسەتكۈچ
بارماق ئۇچى بىلەن نامىز
بارماق ئەتراپىنى بىر بىرلەپ
سانجىپ، قاتتىق ئاغرىغان ئا-
رىمىغانلىقىغا قارايمىز. قە-



يەردە قاتتىق ئاغرىغان سېزىم بولسا، شۇ يەر پەللە ئورنى بولىدۇ.

پەللىنى تاپقاندىن كېيىن، داۋالغاندا كۆڭۈلدە سان بولسۇن ئۈچۈن قەلەم بىلەن بەلگە قويىۋالسىز. غىدىقلاشتا يەنىلا داغلاپ داۋالاش بىر قەدەر مۇۋاپىق. بىر پەللىنى تەخ-
مىنەن 10 قېتىم داغلاپ، ھەر كۈنى 2-3 قې-
تىم، ئەڭ ياخشىسى ئۇخلاشتىن بۇرۇن، ئو-
رۇندىن تۇرغاندا ۋە چۈشتە داۋالغان تۈزۈك.
داغلاپ داۋالاشنى باشلىغان دەسلەپكى ئىككى
كۈندە ئەڭ ياخشىسى ئىسسىق سۇدا بۇيۇند-
ماسلىق كېرەك. بۇنىڭ سەۋەبى ئېنىق ئەمەس،
ئەمما كۆپ بېلىق كلىنىكىلىق تەجرىبىلەر-
دىن قارىغاندا داۋالغاندىن كېيىن شۇ كۈنى
ئىسسىق سۇدا بۇيۇنغانلارنىڭ كېسىلى كۆ-

پىنچە كېچىسى قايتا قوزغىلىدۇ. بىراق ئىككى، ئۈچ كۈن ئۆتكەندىن
كېيىن يۇيۇنسا ھېچقانداق تەسىرى بولمايدۇ. ھەر قېتىملىق داغلاپ دا-
ۋالاشتىن كېيىن، ئەڭ ياخشىسى بىلەكنى كۆتۈرۈپ، يەلكە بوغۇملىرىنى
ھەرىكەتلەندۈرۈش، ئاندىن تەرتىپ بويىچە ھەرىكەت قېتىم سانىنى كۆ-
پەيتىش كېرەك. چوڭلاردىكى يەلكە كېسىلىنى داۋالاشنىڭ سىرى - ھە-
رىكەت قىلىشتا. يەلكە بوغۇمى ھەرىكىتى پەللە ئارقىلىق داۋالاشنىڭ ئو-
نۇمىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. ئەلۋەتتە مىقدارنى ئاشۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ.

داغلاپ داۋالاش ئۇسۇلى بىلەن چوڭلاردا يەلكە كېسىلىنى داۋالاش
تەخمىنەن بىر ھەپتە ئەتراپىدا بولسلا ساقىيىدۇ.

شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، بۇ خىل كېسەل قوزغىلىشتىن
بۇرۇن كېسەلدە مۇرىسى ئېغىرلاشقاندا سېزىم بولىدۇ. بەزىدە سوغۇقتىن
قورقۇش كەيپىياتىمۇ بولىدۇ. يەلكە بوغۇمىدا توختاپ قالغان كېرەكسىز
ماددىلارنى يوقىتىش ئۈچۈن، بۇ ۋاقىتتا كۆپرەك ھەرىكەت قىلىش كېرەك.
گانتېلدىن پايدىلىنىپ مۇرنى ھەرىكەتلەندۈرۈشمۇ بىر خىل ياخشى ئۇسۇل.

چوڭلاردا بولىدىغان يەلكە كېسەلنى داۋالايدىغان ئۈنۈملۈك پەللىلە جەمئىي سەككىز يەردە بولۇپ، ئۇلار: تەي يۈەن (太渊) پەللىسى، ئالتىن بېغىشنىڭ يان تەرپىدىكى ئۆپكە جىڭلوسىدا (肺经)؛ خې گۇ (合谷) پەللىسى، قول دۈمبىسىنىڭ يان تەرپىدە؛ ياكى شى (阳溪) پەللىسى، قول دۈمبىسىدىكى چوڭ ئۈچەي جىڭلوسىدا (大肠经)؛ شېن مېن (神门) پەللىسى، ئالتىن بېغىشنىڭ يان تەرپىدىكى يۈرەك جىڭلوسىدا (心经)؛ يې مېن (液门) پەللىسى، قول دۈمبىسى نامسىز بارماق بىلەن چىمچىلاق بارماق كېسىشكەن جايدىكى سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىدا (三焦经)؛ دالىڭ (大陵) پەللىسى، ئالتىن بېغىشىدا؛ جۇڭ چۇڭ (中冲) پەللىسى، ئوتتۇرا بارماق تىرىقنىڭ تۆۋەن تەرپىدىكى يۈرەك قېپى جىڭلوسىدا (心包经)؛ خۇۋ شى (后溪) پەللىسى، قول دۈمبىسى چىمچىلاق ئۈچەي دىكى ئىنچىكە ئۈچەي جىڭلوسىدا (小肠经). ئەگەر مۇرىنى كۆتۈرگىلى بولماي، ئايلاندۇرماق تەس بولغاندا، يۇقىرىقى پەللىلەرنى غىدىقلىسا بولىدۇ.

بۇ پەللىلەرنى ئۇۋۇلىغاندا ئەسلىدە ئاغرىمايدۇ، ئەگەر ئوت يېقىلغان يېپىسىمان كۈچە بىلەن داغلىغاندا ياكى چىش كولىغۇچ بىلەن غىدىقلىغاندا، تېزلا ئاغرىشى مۇمكىن، بۇ نورمال ئەھۋال.

بەل ئاغرىسا ئالامىتىگە ئاساسەن ئىككى نۇقتىنى ئۇۋۇلاش لازىم

بەل ئاغرىقىنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ، كۆپىنچىسى پەي، سۆڭەك ياكى مۇسكۇلنىڭ ياللۇغلىنىشىدىن بولىدۇ. ھالبۇكى بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان بەل ئاغرىقى ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىشتۇر. بەل ئاغرىقىغا گىرىپتار بولغانلارنىڭ ھەممىسىدە مۇنداق نەسىرات بولىدۇ: مەيلى قانداق ئۇرۇش، مۇجۇشتىن قەتئىينەزەر ئاغرىق ئىلگىرىكىدەك بولۇپ، قىلچە يېنىكلىمەيدۇ، داۋالاش ھەقىقەتەن قېيىن.

بەل ئاغرىشىنى داۋالاشتا، جۇڭگىيى تېبابىتىدە ئىشنى ئادەم بەدىنىدە-
دىكى كۆچمە ئىنېرگىيىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى تەڭشەپ، بەدەننىڭ ئۆزىدە-
كى تەبىئىي ساقايتىش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، بەل ئاغرىقىنى ئىچكى قە-
سىمىدىن باشلاپ يىلتىزىدىن داۋالاشنى مەقسەت قىلىدۇ.

بىر كېسەلنىڭ تۇيۇقسىز بەل ئاغرىقى قوزغىلىپ، پۇتىنى بىر قە-
دەمۇ ئالالمىغاچقا، باشقىلار نوسىلكا



بىلەن مېنىڭ قېشىمغا ئېلىپ كەپتۇ. دوختۇرخانىدىن چىققاندا ئۇ ئۆزى مېڭىپ چىقىپ كەتتى. بۇ ئىشتىن كېيىن، نۇرغۇن بەل ئاغرىقى كېسەل-لىرى ئۆيۈمگە كېلىپ، ئۆزلىرىنى ئازابىتىن قۇتۇلدۇرۇشۇمنى ئۆتۈندى.

بىمارلارغا نىسبەتەن مەن كەل-گەن كېسەللەرنى رەت قىلمايمەن، ئەمما مېنىڭ «مەخپىي ماھارىتىم»

ئۇلارنى كۆپىنچە ئۈمىدسىزلەندۈرۈپ قويىدۇ. چۈنكى ئۇلار مەن قوللانغان چارىدە مۇتەخەسسسلەرگە تايانماي، ئۆزى قىلىسلا بولىدىغانلىقىغا ئى-شەنمەيدۇ.

ئۇسۇل مۇنداق: ئالدى بىلەن

قول دۈمبىسىدىكى «ئومۇرتقا. بەل. پۇت رايونى» نى تېپىش كېرەك. بۇ يەرگە ئىككى پەللە قاتار تىزىلغان بولۇپ، ئىككىلىسى بەل ئاغرىق نۇقتىسى دېيىلىدۇ. كۆرسەتكۈچ بار-ماقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى بەل ئاغ-رىقى نۇقتىسى ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىش قاتارلىق ئادەتتىكى بەل ئاغرىشلارغا ناھايىتى ئۈنۈمى بار؛



يەنە بىر بەل ئاغرىقى نۇقتىسى نامىز بارماق تەرىپىدە بولۇپ، بەل سۆ-
گىكىنىڭ قايرىلىپ كېتىشىگە ئالاھىدە ئۈنۈمى بار.

غىدىقلاشتا ئەڭ ياخشىسى يېنىك ئۇۋۇلاش، ئاستا بېسىش كېرەك.
ئەگەر بارماق بىلەن ئۇۋۇلغاندا، بىردەم ئاستا ئۇۋۇلغاندىن كېيىن بىردەم
توختاپ ئاندىن داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. ئىككى قېتىملىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش
ئارىلىقىدىكى ۋاقىت بەك قىسقا بولسا بولمايدۇ.

نامىز بارماق بىلەن چىمچىلاق كېسىشكەن جاينىڭ يېقىن ئەترا-
پىدا بىر ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋا نۇقتىسى بار بولۇپ، ئولتۇرغۇچ سۆڭەك
نېرۋا ئاغرىقىغا گىرېتار بولغانلار چىش كولغۇچ ياكى چاچ قىسقىچ بىلەن
بۇ نۇقتىنى غىدىقلىسا، ئۈنۈمى خېلى ياخشى بولىدۇ.

ئالقاننىڭ تۆۋەن تەرىپى قول بېغىشىغا يېقىن يەردە «پۇت رايونى»
بار بولۇپ، مەخسۇس بەل ئاغرىقىنى داۋالايدۇ. بىراق ئۇنى بىر قۇشۇمچە
نۇقتا ھېسابلاشقا بولىدۇ. بەل قاتتىق ئاغرىغاندا بۇ يەرنى ئۇۋۇلاشنىڭ
ئۈنۈمى ئانچە كۆرۈنەرلىك ئەمەس؛ سوزۇلما خاراكتېرلىك بەل ئاغرىقى
بارلار ئەگەر بەل ئاغرىق نۇقتىسى بىلەن قوشۇپ بۇ يەرنى غىدىقلاشنى
داۋاملاشتۇرسا ئۈنۈمى يەنىلا ياخشى.

سېمىز لەر ئورۇقلايمەن دېسە ئاغرىقتىن قورقماسلىق كېرەك

ئامېرىكىلىق بىر قىزىقچى مۇنداق دېگەن: «ئاياللار ئۆزىنىڭ بەدەن
ئېغىرلىقى بىلەن ھەمىيىنى مەڭگۈ ئۇنتىمايدۇ». ھەقىقەتەن شۇنداق،
نۇرغۇن ئاياللار دائىم بەدەن ئېغىرلىقىنى ئۆلچەپ، قانچە جىڭ يېنىكلە-
گەن ياكى قانچە جىڭ ئېغىرلىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇشقا بەكمۇ قىزىقىدۇ.
لېكىن ئاياللار ئۆزىنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىغا بولغان زىيادە سەزگۈرلۈكىنى
چۈشىنىدىغان ئەرلەر كۆپ بولمىسا كېرەك.

نېمىلا دېگەن بىلەن مەيلى ئەرلەر ياكى ئاياللارغا نىسبەتەن ئېيت-
قاندا، مۇۋاپىق بەدەن ئېغىرلىقىنى ساقلاش دۇرۇس ئىش. سېمىزلىك ئەر،
ئاياللارنىڭ ئورتاق دۈشمىنى، ئۇ ئىچكى ئەزالارنى بېسىپلا قالماي، تۈرلۈك



كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىدۇ. يەنە بەدەن ۋە تىزنىڭ بۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، ئادەمنىڭ جىسمانىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپتۇ. شۇڭا، بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەنلەر ئورۇقلاشنىڭ چارىسىنى قىلىش كېرەك. قولىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالاش نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇ-

رۇقلاشتىكى ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى « ئاشقازان، تال، چوڭ ئۈچەي رايونى » نى غىدىقلاشنىڭ ئالدىغا ئۆتەلمەيدۇ. غىدىقلاشتا كۈچ سالىمىنى ئاشۇرۇپ، ئاغرىققا چىدىيالمىغۇ. دەك دەرىجىگە يەتكۈچە كۈچەپ تولغاش ياكى چىش كولىغۇچ قاتارلىق ئۇچلۇق نەرسىلەر بىلەن سانجىش كېرەك. مۇشۇنداق غىدىقلاش ئارقىلىق ئاشقازان، ئۈچەينىڭ لۆمۈلدېشىنى ئاستىلىتىپ، ئىشتىھانى تەبىئىي ئازايتىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

بىر خانىم مەن ئۆگەتكەن مۇشۇ ئۇسۇل بويىچە قىلغان، ئەمما بىر ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنىڭ ئىشتىھاسى ئەكسىچە بارغانسېرى ياخشىلىنىپ كەتكەن، بەدەن ئېغىر-

لىقىنى ئۆلچىسە بىر كىلوگرام سەمىرىپتۇ. ئۇ خاپا بولۇپ، مېنى سوراققا تارتقىلى كەپتۇ. ئىنچىكە سۈرۈشتۈرگەندىن كېيىن مەن ئاندىن ئۇنىڭ ئاغرىقتىن قورقۇپ «ئاشقازان، تال، چوڭ ئۈچەي رايونى» نى كۈچەپ غىدىقلىماي، يېنىنىڭ ئۇۋۇلغانلىقىنى، ھالبۇكى بۇ خىل كۈچ سالىمىنى ئاشقازان، ئۇ



چەي لۆمۈلدېشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىشتىھاسى ئېچىلىپ، ئەكسىچە ئۈنۈم پەيدا قىلغانلىقىنى بىلدىم.

ئالىقانى غىدىقلاش ئارقىلىق ئورۇقلىتىدىغان يەنە بىر رايون بار، ئۇ بولسىمۇ قول دۈمبىسى مەركىزىدىكى «كۆكرەك. قورساق رايونى». بۇ را-يوننى كۈچلۈك غىدىقلىسا، ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىشنى تىزگىنلەپ، ھەددىدىن زىيادە سېمىزلىكنى ياخشىلايدۇ.

ئېغىرلىقىڭىزنىڭ قانچىلىك ئېشىپ كېتىشىدىن قەتئىينەزەر «ئاشقازان. تال. چوڭ ئۈچەي رايونى» ۋە «كۆكرەك - قورساق رايونى» نى كۈچلۈك غىدىقلىسىڭىز بەدەن ئېغىرلىقىڭىزنىڭ كېمىيىشىدىن ئۈمىد بار. ئەمما بۇ يەردە شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، بەدەن ئېغىرلىقىنى ھەددىدىن زىيادە كېمەيتىۋېتىشكە بولمايدۇ، بولمىسا ئوزۇقلىنىش ناچار-لىشىش قاتارلىق بىر قاتار مەسىلىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. مېنىڭچە كۆڭۈلدىكىدەك بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچەملىك بەدەن ئېغىرلىقىدىن 2 - 3kg - يېنىك بولۇشى كېرەك. ئۆلچەملىك بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ فورمۇلىسى: 100×0.9 بەدەن ئېگىزلىكى، بۇنىڭدىن چىققان نە-تىجىدىن 2 - 3kg نى ئېلىۋەتسەك، مانا بۇ مەن دېگەن كۆڭۈلدىكى بەدەن ئېغىرلىقىدۇر. مۇشۇ كۆڭۈلدىكىدەك بەدەن ئېغىرلىقىنى نىشان قىلىپ، ئالىقانى غىدىقلىغاندا ئۆزى ئىگىلىۋالسا بولىدۇ.

يىرنىڭ يىغىلىپ قېلىش كېسىلىنى داۋالاشتا يەنىلا


كۈچلۈك غىدىقلاش لازىم

ساغلاملىققا نىسبەتەن ئېيتقاندا «سېمىزلىك كېسەللىكنىڭ مەنبە-سى». گەرچە پۈتۈنلەي شۇنداق بولمىسىمۇ، ئەمما سېمىزلىك كېسەلگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. يىرنىڭ يىغىلىپ قېلىش كېسىلى بۇنىڭغا ئەڭ ياخشى مىسال.

بەلكىم ئاز ساندىكى كىشىلەر دىققەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن. يىرنىڭ يىغىلىپ قېلىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ كۆپىنچىسى

سېمىزغا تەۋە. سېمىز ئادەم كۆپ يەپلا قالماي، بەلكى يېيىشكە ماھىر كېلىدۇ. ھەددىدىن زىيادە كۆپ يېگەچكە تەبىئىي ھالدا سەمىرىپ كېتىدۇ. كۆپ يېگەچكە ئۇلارنىڭ ئىچكى ئەزالىرى ياخشى ئارام ئالالمايدۇ. ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش توختىماي دېگۈدەك داۋاملىشىدۇ، بۇ ئىچكى ئەزالارغا نىسبەتەن ئىنتايىن چوڭ يۈك.

يىرىڭ يىغىلىپ قېلىش كېسىلى دېگەنىمىز: بۇرۇن بوشلۇقىنىڭ ئىچىدىكى شىللىق پەردىدە نور-



مالسىزلىق كۆرۈلگەندە، كۆپ مىقداردا بۇرۇن سۇيۇقلۇقى، ماڭقا چىقىدۇ. بۇ خىل نور-مالسىزلىق ئاشقازان ئاستى بېزى تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتاتتى. قانلىقتىن بولۇشى مۇمكىن. ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئىقتىدارىنى ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدىغان ئامىللار كۆپ بولسىمۇ، ئەمما سېمىزلىك ھەمىمە ئادەم بىلىدىغان بىر تۈرلۈك سەۋەب. يەنى، يىرىڭ يىغىلىپ قېلىش كېسىلى بىلەن سېمىزلىك زىچ باغلىنىشلىق، بۇ خىل كېسەلگە گىرىپتار بولۇشتىن ئىلگىرى ھېچكىمىمۇ بۇنى ئويلىمايدۇ، شۇنداقلا تەبىئىي ھالدا ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنىمۇ قوللانمايدۇ.

ئاشقازان، تال، چوڭ ئۈچەي رايونىنى غىدىقلىغاندا كۈچ سالمىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك.

يېرىڭ يىغىلىپ قېلىش كېسەلى بىلەن سېمىزلىكنىڭ سەۋەب - نەتىجە مۇناسىۋىتىدىن داۋالاشقا كىرىشكەندە مۇھىم نۇقتىنى ئاشقازان، ئۈچەي ۋە ئاشقازان ئاستى بېزىگە قويۇش كېرەك. ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارى ھەددىدىن زىيادە جانلىنىپ كەتسە ئىشتىھا ئېچىلىدۇ، بەدەن ئېغىرلىقى شىددەت بىلەن ئاشىدۇ. شۇڭا، داۋالغاندا باش بارماق دۆڭچىسىدىكى «ئاشقازان. تال. چوڭ ئۈچەي رايونى» نى ئۇچلۇق نەر- سىلەر بىلەن، مەسىلەن: 100 نەچچە تال چىش كولغۇچىنى بىر باغلام قىلىپ غىدىقلاش كېرەك. ھەر كۈنى تەكرار غىدىقلىغاندا ئىشتىھا تەبىئىي ئازىد- يىپ، ئىچكى ئەزالاردىكى ئورۇنسز يۈك يېنىكلىەيدۇ.

يۇقىرىقى غىدىقلاش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، ئارقىدىنلا بۇرۇن بوشلۇقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك پەللىلەرنى، مەسىلەن: خې گۇ (合谷)، جۇڭ چوڭ (中冲)، بى توڭ دىيەن نۇقتىسى (鼻痛点) قاتارلىقلارنى غىدىقلاش كېرەك. غىدىقلاش ئۇسۇلى «ئاشقازان. تال. چوڭ ئۈچەي رايونى» نى غىدىقلاش ئۇسۇلى بىلەن ئوخشاش، كۈچ سالمىقى چوڭراق بو- لۇشى كېرەك. بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، بۇرۇن بوشلۇقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان پەللىلەر غىدىقلانغاندا، بۇرۇنغا يىغىلىپ قالغان يىرىڭلار چىقىد- رىۋېتىلىدۇ. ئىشتىھا تىزگىنلىنىپ، بۇرۇن بوشلۇقى پاكىزلانسا، يېرىڭ يىغىلىپ قېلىشتىن بولغان ئازابمۇ شۇنىڭ بىلەن بىرگە يوقىلىدۇ.


سوزۇلما بۇرۇن ياللۇغىنى جۇڭگىيە داۋالاپ

ساقايتىش نىسبىتى يۇقىرى

يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، سوزۇلما خاراكىتلىك بۇرۇن ياللۇغىغا كىرىپتار بولغانلار كۆپەيمەكتە. غەرب تېبابىتىدە گەرچە ھەر خىل داۋالاش ئۇسۇلى بولسىمۇ، پۈتۈنلەي يىلتىزىدىن ساقايتالمىغانلار كۆپ. جۇڭگىيە داۋالاشتا بولسا ساقىيىش نىسبىتى %99 تىن يۇقىرى.

جۇڭگىيە سوزۇلما خاراكىتلىك بۇرۇن ياللۇغىنى داۋالاش ئۇسۇلى ناھايىتى كۆپ، بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ ئۈنۈملۈك بولغىنى قول دۈمبىسىدىكى

خې گۇ (合谷) پەللىسىنى غىدىقلاشتۇر. خې گۇ پەللىسى چوڭ ئۈچەي جىڭلوسىدا (大肠经). چوڭ ئۈچەي جىڭلوسى بۇرۇن بوشلۇقى ۋە نەپەسلىنىش ئەزالىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك، شۇڭا بۇ يەرنى غىدىقلاشنىڭ ئۈنۈمى ئالاھىدە ياخشى.




سوزۇلما خاراكتېرلىك بۇرۇن ياللۇغىغا قارىتا خې گۇ پەللىسىنى غىدىقلىغاندا كۈچلۈك غىدىقلاش كېرەك. يەنى بىر كۈندە ئوت يېقەلىغان يېپسىمان كۈچە بىلەن 10 قېتىمدىن 20 قېتىمغىچە داغلاش، ئەگەر چۈشكۈرۈش، بۇرۇندىن ماڭقا ئېقىش ئەھۋاللىرى يىلتىزىدىن

ساقايىمسا، چوقۇم پۈتۈن ساقايىغىچە غىدىقلاش كېرەك. خې گۇ پەللىسى بىلەن ئوخشاش ئالاھىدە ئۈنۈملۈك بولغىنى كۆر-سەتكۈچ بارماق بىرىنچى بوغۇمى چوڭ ئۈچەي جىڭلوسى (大肠经) دىكى چوڭ ئۈچەي پەللىسىدۇر.

ئۇنىڭدىن باشقا، ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن ئوتتۇرا بارماقتىكى بۇرۇن بوشلۇقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان جۇڭ چوڭ پەللىسى، چىمچىلاقنىڭ بىرىنچى بوغۇمىدىكى ئۆپكە پەللىسى، ئاللىقان

بېغىشىدىكى تەي يۈن (太渊) پەللىسى، قول دۈمبىسىدىكى خې گۇ پەللىسى بىلەن قول بېغىش ئارىسىدىكى بى توك دىيەن نۇقتىسىنى داغلاپ داۋالسا، چۈشكۈرۈش، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش ئەھۋاللىرىنى تېزلاپ سەپەيتكىلى بولىدۇ.



ئاشقازان ئاغرىسا، ئاشقازان ئۈچەي نۇقتىسىنى غىدىقلاش لازىم

تۈرلۈك ئىچكى ئەزا كېسەللىكلىرى ئىچىدە ئاشقازان ئاغرىش ۋە ئاشقازان سپازمىسى كۆپ ئۇچرايدۇ. ئاشقازان سپازمىسى سوغۇق، چىرىد-گەن ياكى ئاسان ھەزىم بولمايدىغان يېمەكلىكلەرنى يېيىشتىن كېلىپ چىقىدۇ، ھەمدە روھىي جەھەتتە ئەنسىزلىك پەيدا بولۇشتىنمۇ بولىدۇ، بۇ نېرۋا خاراكتېرلىك ئاشقازان سپازمىسى دەپ ئاتىلىدۇ. كۆپىنچە قورساق ئاچقاندا قوزغىلىدۇ.



ئاشقازان - ئۈچەي
نۇقتىسى

ئاشقازان ئاغرىقى تۇيۇقسىز قوزغالغاندا، كۆپىنچە ئادەم نېمە قىلارنى بىلەلمەي قالىدۇ، مۇشۇ ۋاقىتتا پەللىنى ئۇۋۇلاشنىڭ ئال-دىغا ئۆتىدىغان جىددىي تاقابىل تۇرۇش چارىسى يوق.

بىر نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا، مەن سىرتقا كاماندېرۈپكىغا چىققاندا پويىزدا تۇيۇقسىز ئاش-

قازان ئاغرىقى قوزغالغان 40 نەچچە ياشلىق بىر ئايالنى ئۇچرىتىپ قالدىم. ئۇنىڭ ئېرى چۈشەندۈرۈپ: «ئۇ تۈنۈگۈن كەچتە ياخشى ئۇخلىيالمىغاچقا، بۈگۈن ئەتىگەن تاماق يېمىگەن، شۇنىڭ بىلەن كونا كېسىلى قوزغىلىپ قالدى» دېدى.

مەن ئۇنىڭ ئازابلانغان ھالىتىنى كۆرۈپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇنىڭ كېسىلىنى داۋالاپ قويىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم. ئەينى ۋاقىتتا مەن يىگنە سانجىپ داۋالاش سايمانلىرىنى ئېلىۋالمىغاچقا، ئامالسىز بىر نەچچە تال چىش كولىغۇچنى باغلاپ، ئۇنىڭ ئاللىقىنىغا سانجىدىم، بىردەم ئۆتكەندىن

كېيىن ئۇنىڭ چىرايى تەدرىجىي ياخشىلاندى. يەنە بىردەمدىن كېيىن ئۇ خۇشاللىقىدىن: «ئاغرىق يوقالدى» دەپ ۋارقىراپ كەتتى.

ئاپالار ئادەتتە كۆپ گىرىپتار بولىدىغان ئاشقازان ئاغرىقىنى ئالىقاندا، دىكى ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسى (胃肠点) نى غىدىقلاش ئارقىلىق داۋالىغىلى بولىدۇ. ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسى ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ھەزىم قىلىش ئەزالىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ئەگەر ئۈچلۈك نەرسىلەر بىلەن كۈچلۈك غىدىقلىسا، غىدىقلاش مېڭىگە يەتكۈزۈلۈپ، ئاشقازان ۋە ئۈچەي ئىقتىدارىنى تىزگىنلەپ ئاغرىقنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ، بۇ خىل كۈچلۈك غىدىقلاشنى غىدىقلانغان پەللە تۇرۇشلۇق ئورۇن ئاغرىغىچە بىر مەزگىل داۋاملاشتۇرۇش كېرەك.


ئۇنىڭدىن باشقا، قول دۈمبىسى باش بارماق تۈۋىنىڭ سەل تۆۋەن تەرىپىدىكى لولىك ۋۇ (落零五) پەللىسىمۇ ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىغا ئوخشاش ئۈنۈمگە ئىگە.

ئاشقازان ئاغرىقى بىلەن ئاشقازان سىپازمىسى كۆپىنچە تۇيۇقسىز ھەم قاتتىق ئاغرىپ باشلىنىدۇ. شۇڭا، قوزغالغاندا دەرھال قوللىنىشقا ئاسان بولسۇن ئۈچۈن، يۇقىرىقى پەللىلەرنى ئەستە چىڭ تۇتۇۋېلىش كېرەك.

ئاشقازان يارىسىنى داۋالاشتا يەنىلا ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى ئۇۋۇلاش لازىم

ئاشقازان يارىسى «كېسەل تەگكەن ئاشقازان» نىڭ بىر خىل تىپىك مىسالى. ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن كارى بولمىغاندا، ئاشقازان كونتروللۇقىنى يوقىتىپ، يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلالمايدۇ. شۇڭا، ئاشقازان كېسىلى قوزغىلىشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

دەسلەپكى مەزگىلدىكى ئاشقازان يارىسىغا تاقابىل تۇرۇشتىكى ئۈنۈملۈك چارە ئالىقان مەركىزىنىڭ سەل تۆۋىنىدىكى ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى (胃肠点) غىدىقلاشتۇر. غىدىقلاش ئۇسۇلى: چىش كولد-خۇچ، چاچ قىسقىچ بىلەن كۈچلۈك غىدىقلاش ياكى ئوت يېقىلغان



يېپسىمان كۈچە بىلەن داغلاشتىن ئىبارەت. ئاشقازان يارىسى ئاشقازان كىسلاتاسى ئاجرىتىپ چىقىرىش ھەددىدىن زىيادە كۆپ بولۇپ كەت- كەنلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا، ئاشقازان يارىسىنىڭ ئالدىنى ئې- لىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى - ئاشقا- زاننىڭ فۇنكسىيىسىنى تىزگىن- لەشتۇر. چىش كولغۇچ ياكى چاچ

قىسقۇچ قاتارلىق ئۇچلۇق نەرسىلەر بىلەن ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى غىدىقلىغاندا ياكى ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن داغلاپ داۋال- خاندا، ئاشقازان كىسلاتاسى ئاجرىتىپ چىقىرىشنى ئازايتقىلى بولىدۇ.


بىر نەچچە كۈن ئىلگىرى ئوتتۇرا ياشلىق بىر ئەر مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. ئۇ يېنىك دەرىجىدىكى ئاشقازان يارىسى بولۇپ قالغان ئىكەن، بالىنىسىدا ياتقۇسى يوق ئىكەن. پەقەت مەندىن ئۆزى قىلالايدىغان ئاددىي داۋالاش ئۇسۇلىنى ئۆگەنمەكچى ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن مەن ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى غىدىقلاش ئۇسۇلىنى ئۇنىڭغا ئۆگىتىپ قويدۇم.

مېنىڭ ئۆگەتكىنىم بويىچە ئىككىنچى كۈنى ئىشقا بارغاندا ئاپتۇ- بۇستا ئولتۇرغاندىن باشلاپ، ئۆزى ئالدىن تەييارلاپ قويغان دېزىفېكسىيە قىلىنغان يېڭى ياكى چىش كولغۇچنى ئېلىپ، يېڭىنىڭ ئۈچىنى ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىغا توغرىلاپ سانجىپتۇ. مۇشۇنداق قىلىپ بىر ئاي داۋاملاشتۇرغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئاشقازان يارىسى پۈتۈنلەي ساق- يىپ، ئىلگىرىكىدىن نەچچە ھەسسە روھلۇق ھالدا خىزمەتكە كىرىشپتۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، قول دۈمبە مەركىزىدىكى «كۆكرەك، قورساق رايو- نى» ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق ئىككىنچى بوغۇمىدىكى چيەن توۋ دىيەن نۇقتىسى (前头点) نى غىدىقلاشنىڭمۇ ئاشقازان يارىسىنى داۋالاشتا بەلگىلىك ئۈنۈمى بار. ئەگەر ئۇنى ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسى بىلەن ماسلاشتۇرۇپ غىدىقلىغاندا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

باش قېيىش قۇلاق بىلەن مۇناسىۋەتلىك

باش قېيىش بەدەن ئىچكى تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن كېلىپ چىقىدىغان كېسەللىك. ئۇنىڭ سەۋەبلىرىدىن قان ئازلىق، ھەيز كېسىد-لىش دەۋرىدىكى توسالغۇ، ئاشقازان - ئۈچەي ئىقتىدارى ناچارلىشىش قا-تارلىقلار بار.

باش قېيىش كېسەللىگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ كۆپىنچىسى ئۇنىڭغا سەل قارايدۇ، ئەمما كىشىنى بىزار قىلىدىغىنى بۇ كېسەل قوزغالغاندا ئالدىن بىلگىلى بولمايدۇ. بىر نەچچە كۈننىڭ ئالدىدا 23 ياشلىق بىر قىزچاق قېشىمغا كېسەل كۆرسەت-كىلى كەپتۇ.



ئۇ دەل باش قېيىش كېسەللىگە گىرىپتار بولغان كېسەل بولۇپ، بې-كەتتە ئاپتوبۇس ساقلاۋاتقاندا تۇيۇق-سىز بېشى قېيىپ يول بويىغا يى-قىلىپ چۈشۈپتۇ.

باش قېيىشنى داۋالاشتىكى ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى نامسىز بارماق تىرىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى گۈەن چۈڭ (关冲) پەللىسىنى غىدىقلاشتۇر. گۈەن چۈڭ پەللىسى سەنجىياۋ جىڭ (三焦经) جىڭ-لوسىدىكى پەللە بولۇپ، بۇ جىڭلو-دىكى تارماق تومۇرلار قۇلاققا تۇت-شىدۇ. بىز باش قېيىش بەدەن ئىچ-كى تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن



قۇلاق - يۇتقۇنچاق رايونى

كېلىپ چىقىدۇ دېدۇق، ئەمەلىيەتتە ئىچكى قۇلاق يېرىم ئايلا نەپچىسى كونتروللۇقىنى يوقاتقانلىقتىن بولىدۇ. شۇڭا، سەنچىياۋ جىڭ جىڭلوسىدە دىكى گۇەن چۇڭ پەللىسىنى ئەستايىدىل غىدىقلىغاندا، سەنچىياۋ جىڭ جىڭلوسىدىكى نورمالسىزلىقنى ئوڭشىغىلى، باش قېيىشنى توختاتقىلى بولىدۇ.


باش قېيىش قۇلاق بىلەن ئۆزئارا باغلىنىشلىق بولغان ئىكەن، ئۇنداقتا قۇلاق بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان «قۇلاق» يۇتقۇنچاق را-يونى» نى غىدىقلاشنىڭ ئۈنۈمى تەبئىي ھالدا ناھايىتى ياخشى بولىدۇ. «قۇلاق» يۇتقۇنچاق رايونى» ئوتتۇرا بارماق تۈۋىگە جايلاشقان بولۇپ، ئۇنى ئۇزۇن ۋاقىت ئاستا غىدىقلىغاندا، ئاندىن يېرىم ئايلا نەپچىسىنىڭ نورمال ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

بۇنىڭدىن سىرت، باش قېيىشنى داۋالايدىغان پەللىلەردىن يەنە چىمچىلاق تۈۋىدىكى يې مېن (液门) پەللىسى، جۇڭ جۇ (渚中) پەللىسى ۋە چىمچىلاق تەرەپ قول بېغىشىدىكى ياك گۇ (阳谷) پەللىسى بار.

قۇلاق غوڭغۇلىدىسا ئىشنى بۆرەك پەللىسىدىن باشلاش لازىم

ھېرون كېلىپ باشقىلارنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر زات. ئۇ كۆرەلمەسلىك، ئاڭلىيالماسلىق، سۆزلىيەلمەسلىكتەك ئۈچ قات توسالغۇنى يېڭىپ، ئۇلۇغ مائارىپچىلارنىڭ بىرىگە ئايلانغان. بىراق ھېرون كېلىپ قانداقلا بولمىسۇن بىر ئالاھىدە مىسال. ئادەتتىكى ئادەملەرنى ئۇنىڭغا ئوخشىتىش ئۇياقتا تۇرسۇن، يېنىك دەرىجىدە قۇلقى غوڭغۇلىدىسىمۇ، شۇ ھامان ھېچنېمىنى ئاڭلىيالايدۇ، گويا چوڭقۇر جىلغىغا بەنت قىلىپ قويغاندەك ئازاب دەرياسىغا غەرق بولىدۇ.

يېقىندا ئوتتۇرا ياشلىق بىر ئايال قېشىمغا كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ. ئۇ بىر تىپىك بولغان قۇلاق غوڭغۇلداش كېسىلى ئىدى. يېقىنقى




يىللاردىن بۇيان ئۇ ئىزچىل قۇلاق
غوغۇلداشنىڭ ئازابىنى تارتىپ، يې-
نىڭ دەرىجىدىكى نېرۋا كېسىلى
پەيدا بولۇشقا يۈزلىنىپتۇ.

ئۇنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى
توغرىسىدىكى تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلاپ
بولغاندىن كېيىن، مەن ئۇنىڭ قو-
لىدىكى بىر نەچچە پەللىنى يىڭنە
سانىچىپ داۋالىدىم، بىردەمدىن
كېيىن ئۇ خۇشال ھالدا قۇلقىنىڭ

غوغۇلدېشى ئىلگىرىكىگە قارىغاندا خېلى يېنىكلىگەنلىكىنى ئېيتتى.
جۇڭگىيى تېبابىتىدە قۇلاق غوغۇلدېشى بۆرەك جىڭلوسى ئاجىزلى-
شىش مەنبەلىك ۋە يۈرەك مەنبەلىك ئىككى خىل بولىدۇ دەپ قارايدۇ.
قۇلاقنىڭ تاشقى دۇنيادىكى ئاۋازلارنى ئاڭلىيالىشىدىكى ئاساسىي
سەۋەب ناغرا پەردىسى سىلىكىنىشىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، سىگنالنى
مېڭىگە يەتكۈزىدۇ. بۇ خىل سىگنالنىڭ يەتكۈزۈلۈشى بۆرەك فۇنكسىيى-
سىگە تايىنىلىدۇ، شۇڭا بۆرەك ئىقتىدارى ئاجىزلىسا، ئادەمنىڭ قۇلقىدا
نورمالسىزلىق پەيدا بولىدۇ. يۈرەك مەنبەلىك قۇلاق غوغۇلدېشقا كەلسەك، بۇ
نېرۋا جىددىيلىشىپ يۇقىرى پەللىگە
يېتىشتىن پەيدا بولىدۇ.

ئادەمنى ئازابلايدىغان قۇلاق غو-
غۇلدېشى يوقىتىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇ-
سۇلى بۆرەك پەللىسى (肾穴)، مەن
(命门) پەللىسى، ياكى گۇ (阳谷)
پەللىسى ۋە گۈەن چۈڭ (关冲) پەللى-
سىنى غىدىقلاشتۇر. ئالدىنقى ئۈچ پەللى
ئىنچىكە ئۈچەي جىڭلوسىدا؛ گۈەن چۈڭ
پەللىسى سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسىدا؛




(三焦经) سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسى بىلەن ئىنچىكە ئۈچەي جىڭلو- سى ئاللىقاندىكى نامسىز بارماق بىلەن چىمچىلاقنى ئاساسىي نۇقتا قىلىپ، قۇلاق ئىچىگىچە ئايلىنىدۇ؛ سەنجىياۋ جىڭ جىڭلوسى يەنە يۈرەك قېپى جىڭلوسى (心包经) بىلەن تۇتىشىدۇ. شۇڭا، بۇ تۆت پەللىنىڭ قۇلاق غوڭۇلدىشىنى داۋالاشتىكى ئۈنۈمى ئۆزگىچە.

دېمى سىقىلسا يۆتەل - زىققە نۇقتىسىنى داغلاپ داۋالاش

يېقىندا بىر ئاتا ئوغلىنى ئېلىپ قېشىمغا كەپتۇ، ئۇ ماڭا: «دوختۇر، مېنىڭ بالامنى قۇتقۇزۇۋېلىڭ!» دېدى. ئىنچىكە سۈرۈشتۈرگەندىن كې-

يىن، بىرىنچى پىللىقتا ئوقۇۋاتقان بۇ ئوغۇل بالىنىڭ بالىلار دەم سىقىلىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلىقىنى، ئېغىرلاشقاندا بىر كېچىدە بىر نەچچە قېتىم قوزغىلىدىغانلىقىنى بىلىدىم. بالىنىڭ ئازابلانغان قىياپىتىنى كۆرۈپ ئاتا بولغۇچىنىڭ كۆڭلىدە قانچىلىك ئازابلانغانلىقىنى بىلگىلى بولمايتتى. ئۇنىڭ بالىسىنى ئەگەشتۈرۈپ مېنى ئىزدەپ كېلىشى مەندىن بۇنىڭ چارىسىنى ئۆگىنىپ، كېسەل قوزغالغاندا بالىنىڭ ئازابىنى ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ئازايتىش ئىكەن. بۇنداق تەلەپنى مەن رەت قىلالايمەن - دە، مەن نەق مەيداندىلا دەم سىقىلىشنى داۋالاشتا ئاجايىپ ئۈنۈمگە ئىگە ۋە ئۇنى غىدىقلاش ئۇسۇلىنى ئۇلارغا ئېيتىپ بەردىم ھەم كۆرسىتىپ قويدۇم.



ئالاقاندا دەم سىقىلىشىنى داۋالايدىغان ئەڭ ئۈنۈملۈك پەللە ئۈچ يەردە بولۇپ، بىرىنچىسى يۆتەل - زىققە نۇقتىسى. بۇ ئالاقاندىكى كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارماق كېسىشكەن جايدا. ئۇ يۆتىلىش، دەم سىقىد-لىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئالاھىدە ئۈنۈملۈك نۇقتا. دەم سىقىلىش كې-سىلى قوزغالغاندا، ئالدى بىلەن مۇشۇ نۇقتىنى غىدىقلاش كېرەك.


غىدىقلىغاندا ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن داغلاش ئۇسۇ-لىنى قوللانسا بولىدۇ. مۇھىمى قول كۆيگەندەك سېزىم پەيدا بولغاندا يىڭىنى تارتىۋېتىپ، بىردەم ئۆتكەندىن كېيىن يەنە داۋاملىق داۋالاش كېرەك. تەخمىنەن ئۈچ مىنۇتتىن بەش مىنۇتقىچە داۋاملاشتۇرسا، كې-سەللىك ئەھۋالىنى تىزگىنلىگىلى بولىدۇ.

ئىككىنچىسى، قول دۈمبىسى كۆرسەتكۈچ بارماق تۈۋىدىكى سەن جىيەن (三间) پەللىسى، ئۇنىڭ رولى دەم سىقىلىش قوزغالغاندىكى كۈچلۈك يۆتەلنى تىزگىنلەش، دەم سىقىلىش كېسىلىنىڭ قوزغىلىشىنى توسۇشتىن ئىبارەت. غىدىقلاش ئۇسۇلى يۆتەل - زىققا نۇقتىسى بىلەن ئوخشاش. يەنى ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن داغلاش.

ئۈچىنچىسى، «كۆكرەك بوشلۇقى. نەپەسلىنىش ئەزالىرى رايونى». غىدىقلاش ئۇسۇلى پۈتۈن رايوننى سىلىق ئۇۋۇلاشتۇر. ئەگەر ئادەتتە بۇ رايوننى ئۈزۈلدۈرمەي ئۇۋۇلاپ بەرسە، نەپەسلىنىش ئەزالىرىنىڭ ئىقتىدا-رىنى كۈچەيتىپلا قالماي، يەنە نەپەس يوللىرىدىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش رولىنى ئوينايدۇ. تەخمىنەن بىر ئايدىن كېيىن، ھېلىقى ئاتا مېنىڭ قېشىمغا يەنە كېلىپ مېنىڭ ئۆگەتكىنىم بويىچە داۋاملاش-تۇرغاندىن كېيىن ئوغلنىڭ دەم سىقىلىش كېسىلىنىڭ خېلىلا يېنىك-لىگەنلىكىنى خۇشاللىق بىلەن ئېيتىپ بەردى .

مۇسكۇل ۋە تېرە قېرىسا بۆرەك پەللىسىنى داغلاش لازىم

مۇسكۇل ۋە تېرە قېرىشنىڭ سەۋەبى ئىككى تۈرلۈك بول-دۇ. بىرى، ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىش تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىش؛



يەنە بىرى، تېرىدىكى قان ئايلاندۇرۇش تۈزۈمىنى تۈزۈش، شۇڭا، مۇسكۇل ۋە تېرە قېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا بىرىنچىدىن، ھور-مون ئاجرىتىپ چىقىرىشنى تەڭ-شەش كېرەك. كونكرېت ۋە ئۈ-نۇملۇك ئۇسۇل: ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن چىمچىد-لاق بىرىنچى بوغۇمىدىكى بۆرەك پەللىسىنى (腎穴) داغلاش، قول كۆيگەندەك سېزىم پەيدا بول-

غاندا يىگىننى تارتىۋېتىپ، بىردەمدىن كېيىن يەنە داۋاملاشتۇرۇش، 10 قېتىمدىن 15 قېتىمغىچە تەكرار ئىشلەشتىن ئىبارەت.

ئىككىنچىدىن، قان ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈش. قولىدىكى تېرە مېتابولىزىمى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئۈچ پەللىنىڭ ھەممىسى سەند-جىياۋ جىڭ (三焦经) جىڭلوسىدا، ئۇنىڭ بىرىنچىسى قول بېغىشىد-دىكى ياكى چى (阳池) پەللىسى بولۇپ، بۇ يەرنى غىدىقلىغاندا، مىكرو قان ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ. ئىككىنچىسى نامسىز بارماق بىرىنچى بوغۇمىدىكى ئۆپكە پەللىسىنى (肺穴) غىدىقلىغاندا، تېرىنىڭ ئېلاستىكىلىقىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. ئۈچىنچىسى نامسىز بارماق تىرىد-قىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى (关冲) پەللىسىنى غىدىقلىغاندا، تېرىنى سىلىقلاشتۇرىدۇ. يۇقىرىقى ئۈچ پەللىنى غىدىقلاش ئۇسۇلى ئوت يېقىل-غان يېپسىمان كۈچە بىلەن داغلاشتىن ئىبارەت.

چاچقا زەخمە يەتسە بۆرەك پەللىسى بىلەن ياك چى پەللىسىنى ئۇۋۇلاش لازىم

چاچقا تەسىر يەتكۈزىدىغان ئامىللارنىڭ كۆپىنچىسى كەيپىيات بىلەن مۇناسىۋەتلىك. مەسىلەن: روھىي بېسىم ھەددىدىن زىيادە ئېغىر-لاشقاندا، بەدەندىكى ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىش بۇزۇلۇپ، چاچقا ئو-زۇقلۇق يېتىشمەي تەدبىرىجىي قۇرغاقلىد.



شىپ، چۈشۈپ شالاڭلىشىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارىنىڭ ئا-جىزلىشىشىمۇ چاچقا تەسىر كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن: ئىچكى ئەزالار ئىقتىدارى تۆ-ۋەنلىگەندە، بەدەندە قان بىلەن تەمىنلى-نىش يېتىشمەسلىك پەيدا بولۇپ، چاچتا ئوزۇقلۇق كەمچىل بولۇپ چۈشۈپ كېتىدۇ. جۇڭگىيى تېبابەت نەزەرىيىسىدىن ئېيتقاندا، چاچ زەخمىلىنىشنى داۋالاشتا پەقەت چاچنىلا ئېسىلىۋېلىشقا بولمايدۇ.

ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىشنى تەڭشەش ۋە بەدەن ئىچى تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى كۆزدە تۇتۇش كېرەك. چىمچىلاق بىرىنچى بوغۇ-مىدىكى بۆرەك پەللىسى (肾穴) بىلەن قول بېغىشىدىكى ياك چى (阳池) پەللىسىنى ھەر كۈنى ئۈزۈلدۈرمەي غىدىقلىسا ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىش رولىنى ئويناپ، قارا چاچ چىقىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا، ئوتتۇرا بارماقتىكى يۈرەك پەللىسى، قول بېغىشى-نىڭ مەركىزىدىكى دالىڭ (大陵) پەللىسىنىڭ ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىشنى تەڭشەشتە ئۈنۈمى ياخشى. ئەگەر بۆرەك پەللىسى بىلەن ياك چى (阳池) پەللىسىنى بىرلىكتە غىدىقلىغاندا، ئۈنۈمى خېلى روشەن بولىدۇ. ئاياللارغا ھەر كۈنى ئۆزىنى تۈزەشتۈرۈپ گىرىم قىلغاندا شامال-دۇرغۇچ بىلەن مۇشۇ پەللىلەرنى ھاۋا ئېقىمى ئارقىلىق غىدىقلاش توغرىسىدا تەكلىپ بېرىمەن. ئادەتتە ئۈچ ئايدىن ئېشىپ كەتمەيدۇ. شۇنداق بولغاندا چېچىڭىزنىڭ تېخىمۇ پارقراقلىشىپ كەتكەنلىكىنى بايقايسىز.

ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى داۋالاشتا لاۋگۇڭ پەللىسىنى يېنىك ئۇۋۇلاش لازىم

كىتابىنى ھەددىدىن زىيادە كۆپ ئوقۇش سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىك دەپ ئاتاشقا بولىدۇ. نامىدىلا مەنىسى چىقىپ تۇرىدۇكى، ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىك ھەقىقىي يىراقنى كۆرەلمەسلىكتىن تەبىئىي پەرقلىنىدۇ. ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىك پەيدا بولغان دەسلەپكى مەزگىلدە ئەگەر ئالغاننى ئۇۋۇلاش


ئارقىلىق ئۆز ۋاقتىدا داۋالسا كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىدىن ئۈمىد بار.

مەن گېزىتخانىدا ئىش-لەيدىغان بىر مۇھەررىرنى تو-نۇيمەن. ئىلگىرى ئۇنىڭ كۆزى ناھايىتى ياخشى ئىدى، ئەمما بىر مەزگىل خەرىتە كوررېك-تورلۇقىنى قىلىش بىلەن كۆ-رۈش قۇۋۋىتى تېز تۆۋەنلەپ، كۆزەينەك تاقىمىسا بولمايدىغان



ھالەتكە چۈشۈپ قاپتۇ. كېيىن ئۇ مېنىڭ ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى داۋالاش چارەمنىڭ بارلىقىنى ئاڭلاپ، سىناپ بېقىش ئۈچۈن مېنى ئىزدەپ كەپتۇ.

سۆھبەتلىشىش داۋامىدا بىلدىمكى، ئۇنىڭ كۆزەينەك تاقىغىنىغا ئاران ئۈچ ئايدەك بوپتۇ. بۇ ئۇنىڭ يەنىلا ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىك باسقۇچىدا تۇرىۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭغا ئۆزى قىلالايدىغان غىدىقلاش ئۇسۇلىنى ئۆگىتىپ قويدۇم. ئادەمنىڭ قولىدا ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى داۋالايدىغان ئۈچ



پەللە بار، بۇنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ
ئۈنۈملۈك بولغىنى ئالىقان مەر-
كىزى ئەتراپى يۈرەك قېپى رايونى
(心包区) دىكى لاۋگۇڭ
(劳宫) پەللىسىدۇر. مۇشۇ
پەللىنى ئۇزۇن ۋاقىت يېنىك
ئۇۋۇلاپ بەرسە، كۆرۈش قۇۋۋىتى
ئاستا - ئاستا ئەسلىگە كېلىدۇ.
قول دۈمبىسى چىمچىلاق
تەرەپتىكى قول بېغىشىغا يېقىن

ۋەن گۇ (腕骨) پەللىسىمۇ ساختا يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى داۋالايدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا، جىگەر جىڭلوسى بۇزۇلۇشمۇ كۆز كېسەللىكلىرىنى پەيدا
قىلىدۇ. شۇڭا، لاۋگۇڭ، ۋەن گۇ پەللىلىرىگە ماسلاشتۇرۇپ، نامسىز بارماق
ئىككىنچى بوغۇمىدىكى جىگەر پەللىسىنى بىرلا ۋاقىتتا غىدىقلىسا، دا-
ۋالاش ئۈنۈمى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ.



ھېلىقى مۇھەررىر مەن ئۆگەتكەن ئۇسۇل بويىچە قىلىۋىدى، ھازىر
ئۇنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتى 1.0 گە چىقىپ، كۆزەينەك تاقىمىسىمۇ بولىدىغان
بولدى.

قان ئازلىقنى داۋالاشتا ھەزىم قىلىش بىلەن قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ياخشىلاش لازىم

مەن سەيلە قىلىشنى ئىنتايىن ياخشى كۆرىمەن، ھەر كۈنى ئەتە-
گەندە سەيلە قىلغاندا تەبىئىي ھالدا بىر تەرەپتىن ماڭغاچ بىر تەرەپتىن
ئاللىقىنىمىنى ئۇۋۇلايمەن.

بىر قېتىم ئەتىگەن تەخمىنەن سائەت ئالتىلەردە بولسا كېرەك، مەن
ئادەتتىكىدەك باغچىدا سەيلە قىلىۋېتىپ، بىر توپ ئوتتۇرا مەكتەپ ئو-
قۇغۇچىلىرىنىڭ ئۇدۇل تەرەپتىن يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم،

بېھتىمال قايسدۇر تەنھەرىكەت ئەترىتى ئەتىگەنلىك مەشىق قىلىۋاتسا كېرەك. ئۇلار مېنىڭ يېنىمدىن ماڭا سۈركىلىپ دېگۈدەك ئۆتكەندە، ئەڭ ئاخىرىدا يۈگۈرۈۋاتقان قىزچاق تۇيۇقسىز يولنىڭ ياقىسىدا يىقىلىپ چۈشتى. ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بۇ ئەھۋالنى كۆرۈپ دەرھال ئەتراپىغا ئولاشتى، ئەمما ھېچقايسىسى ئامال قىلالىمىدى. ئۇلارنىڭ ھودۇققان قىياپىتىنى كۆرۈپ، مەن ئادەملەر توپىنى يېرىپ ئۇ قىزچاقنىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنى تەكشۈرۈپ، يۈزىنىڭ سارغىيىپ كەتكەنلىكىنى، دۈمبىسىنىڭ نەم، سوغۇق ئىكەنلىكىنى بايقىدىم. ئەينى ۋاقىتتا مەن بۇ بالىدا قان ئاز ئىكەن دەپ مۇشۇ ۋاقىتتىلا ئۇنىڭ ئالقىنىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاپ قويدۇم. بىردەم-دىن كېيىن ئۇنىڭ يۈزىدە ئاستا - ئاستا قىزىللىق پەيدا بولدى. ئۆزدە-




دىمۇ تەدرىجىي سېزىم پەيدا بولدى. ئۇ ئاخىرى ھوشىغا كەلگەندە، ئۇنىڭ ھەمراھلىرىغا ئۇنى ئۆيىگە ئاپىرىپ قويۇڭلار دېدىم. ئىككىنچى كۈنى مەن يەنە كونا جايدا سەيلە قىلىۋاتسام، تاسادىپىي ھېلىقى قىزچاق بىلەن ئۇنىڭ ئانىسىنى ئۇچرىتىپ قال-دىم. ئۇلار بىرىنچىدىن ماڭا رەھمەت ئېيتقىلى، ئىككىنچىدىن مېنىڭ قانداق ئۇسۇل بىلەن ئۇنى ھوشىغا كەلتۈرگەنلىكىمنى بىلگەنلىكىنى كەپتۇ.

مەن ئانا - بالا ئىككىسىگە قان ئاز ئادەملەرنىڭ ئۈچەي ئىقتىدارىدا كۆپىنچە توسالغۇ بولىدىغانلىقىنى، قاندىكى ئوزۇقلۇق تەركىبلىرى يې-تىشمەي كۆپ ھاللاردا سىرتقا چىقىرىۋېتىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردىم. بۇنىڭغا نىسبەتەن بارماق تىرنىقلىرىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى پەللە-لەرنى يەنى، بېغىشتىكى شېن مېن (神门) پەللىسى، دالىڭ (大陵) پەللىسى، چىمچىلاق بىرىنچى بوغۇمىدىكى بۆرەك پەللىسى، يەنە ئالغان مەركىزىنى غىدىقلاش كېرەك. بەك كۈچىمەي ئۇزاقراق يەڭگىل ئۇۋۇلاپ بەرسە، قان ئايلىنىشى راۋانلاشتۇرۇپ، ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ياخشىلايدۇ، شۇ ئارقىلىق قان ئازلىقىنى داۋالاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

كېكىرىك كۆپ بولسا شاڭ ياكى پەللىسى بىلەن چوڭ ئۈچەي پەللىسىنى بەكرەك ئۇۋۇلاش لازىم

ئادەم بەدىنىدىكى توقۇلمىلار ناھايىتى پۇختا بولۇپ، زىيانلىق ماد-دىلار بەدەنگە كىرسە ياكى كېرەكسىز قالدۇق ماددىلار بەدەندە ساقلىنىپ قالسا، بىر - بىرلەپ بەدەن سىرتىغا ھەيدەپ چىقىرىۋېتىلىدۇ. چىقىرىۋې-تىش رولىنى ئوينايدىغىنى يەنىلا چوڭ - كىچىك تەرەت. ئۇنىڭدىن باشقا كېكىرىشمۇ بىر خىل چى-قىرىۋېتىش ۋاسىتىسى دەپ قارىلىدۇ.



كېكىرىك ئاشقازان، ئۈچەيدىكى كېرەكسىز ماد-دىلارنىڭ سىرتقا چىقىرىل-ماسلىقىدىن پەيدا بولىدۇ. ئەكسىچە بولغاندا، ئاشقا-زان، ئۈچەينىڭ ئىقتىدا-رىنى كۈچەيتىپ، ئۇنىڭ

ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، شۇڭا چىقىرىۋېتىش راۋانلاشسا كېكىرىشنى داۋالىمىسىمۇ ساقىيىدۇ. ئادەمنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقىدا چوڭ ئۈچەي ئىقتىدارىنى تەڭشەيدىغان بىر جىڭلو بار، ئاشقازان ئىقتىدارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئاشقازان جىڭلوسىمۇ (胃经) كۆرسەتكۈچ بارماقتا ئايلىنىدۇ. شۇڭا، كۆرسەتكۈچ بارماقتىكى مۇناسىۋەتلىك پەللىلەرنى غىدىقلىغاندا، ئاشقازان، ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، چىقىرىۋېتىشنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ.


قىسقىسى ھەددىدىن زىيادە كۆپ يەۋالغاندا، كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىقنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى شاڭ ياك (商阳) پەللىسى بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماق بىرىنچى بوغۇمىدىكى چوڭ ئۈچەي پەللىسىنى چوڭ-قۇر ھەم يەڭگىل بېسىپ بەرسە بولىدۇ. باسقاندا ئاغرىسا بۇ نورمال ئەھۋال. ئاغرىق يوقالغىچە باسقاندا گازنىڭ شۇنىڭغا ئەگىشىپ يوقالغانلىقىنى بايقايسىز.

شاڭ ياك، چوڭ ئۈچەيدىن ئىبارەت ئىككى پەللىدىن باشقا، نامسىز بارماق ئىككىنچى بوغۇمى ئەتراپىدىكى جىگەر پەللىسىنىڭ (肝穴) ئۈ-نومۇمۇ ياخشى، غىدىقلاش ئۇسۇلى يەنىلا چوڭقۇر ھەم يەڭگىل بېسىشتۇر.

كۆزگە نەرسە كىرىپ كەتسە داڭگۇڭ پەللىسىنى كۈچلۈك غىدىقلاش لازىم

ئۇ خېلى بۇرۇنقى ئىش بولۇپ قالدى. بىر تاشچى مېنى ئىزدەپ كەپتۇ، ئۇ كۆزىنىڭ ھەمىشە بىئارام بولىدىغانلىقىنى، قاراپ بېقىشىمنى ئېيتتى. كەسىپ مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇ كۈن بويى بولسا، سۈمبە ئارقىلىق تاش بىلەن ھەپىلىشىدىغان بولغاچقا، دىققەت قىلمىسىلا تاش ئۇۋاقلرى كۆزىگە كىرىپ كېتىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئېيتقاندا راست. تىنلا ئادەتتىكى ئىش بولۇپ، ھەر قېتىم كۆزىنى ئۇۋۇلاپلا قويسا بولىدىكەن.

ئۇنىڭ تونۇشتۇرۇشىنى
ئاڭلىغاندىن كېيىن، مەن
ئۇنىڭ قول دۈمبىسى باش
بارماق بىرىنچى بوغۇمىدىكى
داگۇكۇڭ (大骨空) پەل-
لىسىنى يىڭنە سانجىپ دا-
ۋالدىم. بىردەمدىن كېيىن
ئۇ تۇيۇقسىز: «هە، چۈشتى!»
دەپ ۋارقىرىدى. مەن ئۇنىڭ-



دىن نېمىنىڭ چۈشكەنلىكىنى سورىدۇم. ئۇ كۆزىدىن قانداقتۇر بىر نەر-
سىنىڭ چۈشكەندەك سېزىم بولغانلىقىنى ئېيتتى.

بۇ ئۇنىڭ شەخسىي سېزىمى بولۇشى مۇمكىن. ئەمما مەن ئىشىنىد-
مەنكى، داگۇكۇڭ (大骨空) پەللىسىنى غىدىقلىسا كۆزىدىكى غەيرىي
ماددىلارنى ئۇپچىللىك بىلەن ئېلىۋەتكىلى بولىدۇ. غەيرىي ماددىلارنىڭ
ئادەمنىڭ كۆزىگە كىرىپ كېتىشى ھەقىقەتەن ئادەمنى بىئارام قىلىدىغان
ئىش، بۇ ۋاقىتتا سىز داگۇكۇڭ پەللىسىنى كۈچلۈك غىدىقلىسىڭىز بو-
لىدۇ. كاپالەت بېرەلەيمەنكى چوقۇم ئۈنۈم بېرىدۇ.

داگۇكۇڭ پەللىسىنى غىدىقلاشنىڭ كۆزگە قاتتىق نەرسىلەرنىڭ
تېگىشىدىن بولغان ياللۇغلىنىشنى داۋالاشتىمۇ مەلۇم ئۈنۈمى بار. ئويۇن-
ئويناش داۋامىدا باشقىلار بىر بالىنىڭ كۆزىگە ئۇرۇپتۇ، كۆز بۆلۈمى دوخ-
تۇرغا بىر ئايدىن كۆپرەك داۋالاتقان بولسىمۇ ساقايىمىغاچقا، ئۇنىڭ ئانىسى
بالىسىنى مېنىڭ قېشىمغا ئېلىپ كەپتۇ. مەن بۇ بالىنىڭ داگۇكۇڭ پەل-
لىسىگە يىڭنە سانجىپ داۋالدىم، بىر ھەپتىدىلا ساقايدى.

بۇنىڭدىن سىرت، بۇ ئۇسۇل بىلەن قاپاق بېزى ياللۇغىنىمۇ داۋال-
غىلى بولىدۇ. قاپاق بېزى ياللۇغى بەدەندىكى كېرەكسىز ماددىلارنى چى-
قىرىۋېتىش ناچارلىشىشتىن پەيدا بولىدۇ. يەنى، ئۈچەي ئىقتىدارىنىڭ
ئاجىزلاشقانلىقىنىڭ ئىپادىسى.

قاپاق بېزى ياللۇغنى داۋالاشتىكى ئەڭ ئۈنۈملۈك پەللە چوڭ ئۇ-
چەي جىڭلوسىدا يەنى كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپى،
چوڭ ئۈچەي جىڭلوسىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسىدىكى شاڭ ياك (商阳)
پەللىسى، شاڭ ياك پەللىسىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى ئېرجىيەن (二间)
پەللىسى، كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن باش بارماق تۈۋى كېسىشكەن جاي-
دىكى خې گۇ (合谷) پەللىلىرىنىڭ قاپاق بېزى ياللۇغنى داۋالاشتا
ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى.

كۆز كېسەللىكلىرىگە قارىتا غىدىقلاشتا چوقۇم كۈچلۈك غىدىقلاش
كېرەك، بولۇپمۇ قاپاق بېزى ياللۇغنى داۋالغاندا كېرەكسىز ماددىلارنى
تېزلىكتە چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن، ئەڭ ياخشىسى ئوت يېقىلغان يېسىمان
كۈچە بىلەن داغلاپ داۋالاش ياكى چىش كولىغۇچنى بىر باغلام قىلىپ
باغلاپ كۈچلۈك غىدىقلاش كېرەك.

بەشىنچى باب پەللىلەرنى غىدىقلاپ كېسەل داۋالاش

ئالمقانى ئۇۋۇلاپ ئاجرىتىپ چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈش

قول ئادەم بەدىنىدىكى ھەرىكىتى ھەم چاققان ھەم سەزگۈر بولغان قىسمىدۇر.

كىشىلەر ھەددىدىن زىيادە كۆچۈرۈش خىزمىتى بىلەن شوغۇللانغاندا، قول چارچىغانلىقتىن سىرقىراپ ئاغرىيدۇ. بارماق، قول بېغىشىنى تەبىئىي ھالدا ئۇۋۇلاپ بەرسە چارچاش، سىرقىراپ ئاغرىش ئۇن - تىنسىز يوقاپ كېتىدۇ. بۇ نېمە ئۈچۈن؟ ئەسلىدە، ئۇۋۇلغاندىن كېيىن قول مۇسكۇللىرىدا توختاپ قالغان كېرەكسىز ماددىلار چىقىرىۋېتىلىدۇ، ئەسلىدىكى چارچاپ ئاغرىپ كەتكەن قىسىملارنىڭ قان ئايلىنىشى راۋانلىشىپ ھاياتى كۈچى ئەسلىگە كېلىدۇ.



بۇ تېخى ئادەتتىكى ئۇۋۇلاش ھېسابلىنىدۇ، ئەگەر پەللىنى جايىدا تاپالسا ئۇنىڭ رولى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ. ھەممىمىزگە مەلۇمكى، ئادەم - نىڭ قولىدا نەچچە ئون پەللە ۋە غىدىقلاش نۇقتىسى بار. بىر نەچچە يىل ئىلگىرى مەخسۇس يىگنە سانجىپ داۋالاشنى تەتقىق قىلىدىغان جۇڭگىيى دوختۇرلىرى قولدىكى پەللىگە يىگنە سانجىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ چىش تارتتى. چىش تارتقاندا ناركوز قىلىشقا تېگىشلىك جاي چىشنىڭ ئەتراپى بولۇشى كېرەك، لېكىن يىگنە چىش بىلەن مۇناسىۋىتى يوق

جاياغا سانجىلسا، ئونىڭ ھېچقانداق رولى بولمايدۇ. ئەمما مەن كېسەلنىڭ قولىغا يىڭنە سانجىپ، ناركوز دورىسى ئىشلەتمەي چىش تارتقان ئەھۋالنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم.

كۆپ يىل ئىزدىنىش، تەتقىق قىلىش ئارقىلىق يىڭنە سانجىپ ناركوز قىلىشنىڭ سىرى ئېچىلدى. ئادەمنىڭ ئاغرىق سەزگۈسى ئادەم بەدىنىدىكى ئاغرىغان جاي چىقارغان ئۇچۇر بولۇپ، جىڭلو نېرۋا تاللىرى ئارقىلىق بۇ ئۇچۇرنى چوڭ مېڭىگە يەتكۈزىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاغرىغان-لىقىنى بىلىمىز. ھالبۇكى، قولىدىكى بەزى پەللىلەر (مەسلەن: خې گۇ 合谷) پەللىسى غىدىقلانغاندىن كېيىن، چوڭ مېڭىنىڭ « β ئىنتېر-فېرون» دەيدىغان بىر خىل ماددىنى ئىشلەپچىقىرىشنى ئىلگىرى سۈ-

رىدۇ. بۇ خىل ماددا نېرۋا ھۈ-جەرىلەرنىڭ ئاغرىق ئۇچۇرلىرىنى يەتكۈزۈشىنى تىزگىنلەش رولىنى ئوينايدۇ.

پەللىلەرنى غىدىقلىغاندا جىڭلو ئۇچۇرىنى زادى قايسى لىنىيە ئارقىلىق چوڭ مېڭىگە يەتكۈزىدۇ؟ « β ئىنتېر-فېرون» دىن سىرت، قولى غىدىقلاش ئارقىلىق چوڭ مېڭىنىڭ يەنە قانداق ماددا ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ؟ بۇ يەنىلا تەدرىجىي ئې-چىشقا تېگىشلىك سىر. ئەمما بىر نۇقتىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇكى، ئالمىقانى ئۇ-ۋۇلاش مېڭىنىڭ ماددا ئاجرىتىپ چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈش-



ئىككى قولىنى دائىم ئۆزئارا سۈركەش ساقلىق ساقلاشنىڭ ئالاھىدە بىر خىل ئۇسۇلى


كە پايدىلىق. دەل مۇشۇ مەنىدىن ئېيتقاندا «ئاللىقانى ئۇۋۇلاپ ساقلىقنى ساقلاش» دېگەن سۆز ئادەتتىن تاشقىرى مەنىگە ئىگە.

خىلمۇ - خىل ساقلىق ساقلاش ئۇسۇللىرى ئىچىدە ئەڭ ئاددىي ھەم ئۈنۈملۈك بىر خىلى كۈندىلىك تۇرمۇشتا دائىم ئىككى قولىنى ئۆزئارا سۈركەش ياكى قولىنى خالىغانچە ھەرىكەتلەندۈرۈش، ياشلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا بەدەننى كۈچلەندۈرىدۇ، ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا مېڭە - نىڭ قېرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. پايدىلىق تەرەپلىرىنى بىر ئېغىز گەپ بىلەن تۈگەتكىلى بولمايدۇ.

خې گۇ ھەممىگە قادىر بەللە

قولدىكى پەللىلەر ئىچىدە خې گۇ (合谷) پەللىسىنى ئەڭ مەشھۇر پەللە دېيىشكە بولىدۇ.

مەيلى قانداق سەۋەبتىن بولغان چىش ئاغرىقى بولسۇن ئالدى بىلەن خې گۇ پەللىسىنى ئۇۋۇلاش كېرەك. بىر قېتىم، سۈرەتچىلىك قىلىدىغان بىر ئاغىنەم غەمكىن ھالدا مېنى ئىزدەپ كەپتۇ. بىر تەرەپتىن قولى بىلەن مەڭزىنى تۇتۇۋېلىپ، بىر تەرەپتىن ئېگىرايتتى. ئۇنىڭ بۇ ھالىتىنى كۆ -



رۇپلا ئۇنىڭ جەزمەن چىشى ئاغرىغانلىقىنى قىياس قىلدىم. سورىۋىدىم، دەرۋەقە شۇنداقكەن. ئۇ «تۈنۈگۈن ئاغرىقتىن بىر كېچە ئۇخلىيالمىدىم، «چىش ئاغرىقى ئاغرىق ئەمەس، ئاغرىپ كەتسە ئادەم ئۆلمەس» دېگەن تەمسىل ناھايىتى جايىدا دېيىلگەن گەپ ئۇ - كەن دېدى».

خې گۇ پەللىسىنى بېسىپ تۇرسا ئاغرىيدۇ.

مەن ئۇنى ئۆلتۈرغۇزۇپ، ئۇنىڭ قولدىكى خې گۇ پەل -

لسىگە بىر نەچچە يىگنە سانجىدىم. بىردەمدىن كېيىن ئۇنىڭ چىش ئاغرىقى يېنىكلىپ قالدى. ئارقىدىنلا مەن يەنە ئۇنىڭغا چىش ئاغرىقىنى داۋالاشنىڭ ئاددىي چارىسىنى ئۆگىتىپ قويدۇم؛ ئەگەر چىش ئاغرىغان ۋاقت كېچىگە توغرا كېلىپ دوختۇر تاپالمىسا ھەم دوختۇرخانىغا بېرىشقا قۇلايسىز بولسا، چىش ئاغرىغان تەرەپنىڭ قول دۈمبىسىدىكى خې گۇ پەللىسىنى باش بارماق بىلەن كۈچەپ باسسا بولىدۇ. ئەگەر يەنە ئۈنۈمى

بولمىسا، ئۇنداقتا ئوت يېقىلغان

يىپسىمان كۈچە ياكى چىش كو-

لىغۇچ بىلەن خې گۇ پەللىسىنى

غىدىقلىسا بولىدۇ.

بۇ ئاغىنەنىڭ خې گۇ پەل-

لىسىنى غىدىقلاشتىن ئانچە -


مۇنچە خەۋىرى بار ئىكەن. ئاغرىد-

غاندا بۇ پەللىنى ئۇۋۇلاپ سىناپ

بېقىپتۇ، ئەمما ئۈنۈمى كۆرۈنەر-

لىك بولماپتۇ. مېنىڭ تەجرىبەمگە

ئاساسلانغاندا بۇ خىل ئەھۋالنىڭ



يۈز بېرىشى پەللە ئورنىنى دەل جايىدا تاپالمىغانلىقتىن بولغان. جۇڭيى

دەرسلىك كىتابلىرىدىكى كۆز قاراشلارغا ئاساسلانغاندا، خې گۇ (合谷)

پەللىسىنىڭ ئورنى باش بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماق Ⅶ شەكلىدە

ئېچىلغاندىكى Ⅶ نىڭ تېگىدە، ئەمما بەزىدە ھەممە ئادەمنىڭ ئوخشاش

بولمايدۇ. ھەتتا بىر ئادەمنىڭمۇ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. خې گۇ پەللىسىنىڭ

ئورنىنى بېكىكتىشنىڭ توغرا ئۇسۇلى باسقاندا ئاغرىغان نۇقتىنى تپ-

پىش. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا باسقۇچ مۇنداق: ئالدى بىلەن كۆرسەت-

كۈچ بارماقنىڭ ئاساسىي بوغۇمىدىن باشلاپ، باش بارماقنىڭ تۈۋى قىس-

مىغىچە باسمىز. خې گۇ پەللىسى بېسىلغان ھامان ئاغرىش سېزىمى

بولىدۇ. مانا بۇ باسقاندا ئاغرىش نۇقتىسى.

توغرا ئوروننى تاپقاندىن كېيىن، ئۇنى ئۈنۈملۈك غىدىقلاش كېرەك.

بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلى ئادەتتە «بېسىش» دەپ ئاتىلىدۇ. شۇڭا، نۇرغۇن كىشىلەر خاتا ھالدا بارماق ئۇچى ياكى بارماق بىلەن پەللىنى باسىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇنداق كۈچ بىلەن باسقاندا كۆزلىگەن ئۈنۈمگە ھەرگىز يەتكىلى بولمايدۇ.

ئەڭ ئۈنۈملۈك چارە يەنىلا يىڭنە سانجىشتۇر. ئەمما ئادەتتىكى كىشىلەر يىڭنە سانجىشنى بىلمەيدۇ. ئۆيىدىمۇ كۆپىنچە شەرت ھازىرلانمىغان بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋال ئاستىدا مەن «بارماق ئۇچى بىلەن ئوۋۇلاش ئۇسۇلى» نى تەۋسىيە قىلىمەن، يەنى بارماقنى ئېگىپ بارماق ئۇچى ياكى تىرناق بىلەن كۈچەپ بېسىش. بۇ ئۇسۇلنىڭ مۇھىم ئامىلى پەللە ئۈچ-رىغان كۆلەم قانچە كىچىك بولسا، ئۇچرايدىغان بېسىم شۇنچە چوڭ، ئۈنۈمى شۇنچە ياخشى بولىدۇ. ۋاقتى ھەر قېتىم ئۈچ سېكۇنتتىن بەش سېكۇنتقىچە بولۇپ، ئارىلىقتا بىر - ئىككى سېكۇنت دەم ئالغاندىن كېيىن، ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە تەكرار ئىشلىنىدۇ.

بۇ يەردە ئەسكەرتىشكە تېگىشلىك بولغىنى شۇكى، باسقان ۋاقىت قانچە ئۇزۇن بولسا ئۈنۈمى شۇنچە ياخشى بولىمايدۇ، ئارىلىقتا دەم ئېلىپ قاندىلىك غىدىقلاش كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا ئەڭ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

خې گۇ پەللىسىدىن سىرت، چىش قاتتىق ئاغرىپ كەتكەندە، يەنە بىر ئاددىي ئۇسۇل بار. ئۇ بولسىمۇ ئاغرىغان تەرەپتىكى ئوتتۇرا بارماقنى غىدىقلاشتۇر. بۇ ئورۇن خېلى كىچىك بولغاچقا پەللىنى ئىزدىگەندە ئوتتۇرا بارماقنى بىۋاسىتە ئېگىپ، باش بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارماقنىڭ قورساق قىسمىنى سەل ئاغرىغان جايغىچە كۈچەپ باسىمىز. ئاغرىغان جاي دەل مۇشۇ پەللىنىڭ ئورنى بولىدۇ ياكى ئوتتۇرا بارماقنى ئوتتۇرىدىن بۆلۈپ، ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئوڭ تەرەپ ياكى سول تەرەپ ئۈستىدىن تەرتىپ بويىچە باسقاندا، ئاغرىغان جاي مۇشۇ پەللىنىڭ توغرا ئورنى بولىدۇ. باسقاندا ئاغرىغان نۇقتىنى تاپقاندىن كېيىن، ئوت يېقىلغان كۈچە ياكى چىش كولىغۇچ بىلەن غىدىقلىسا بولىدۇ، ئادەتتە تەكرار بەش قېتىمدىن ئالتە قېتىمغىچە غىدىقلىسا چىش ئاغرىقىنى يەڭگىللەتكىلى بولىدۇ. ئەگەر

پەللىسى بىلەن ماسلاشتۇرۇپ غىدىقلىسا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئادەتتە ئاغرىشنى تېزلا زور دەرىجىدە پەسەيتكىلى بولىدۇ.


باش ئاغرىسا خې گۇ پەللىسى بىلەن چۈچى پەللىسىنى قوشۇپ ئۇۋۇلاش لازىم

خې گۇ پەللىسىنى «پەللىلەرنىڭ پەللىسى» دەپ ئاتاشقا بولىدۇ. ئۇ چىش ئاغرىقىنى داۋالىغاندىن سىرت، باش ئاغرىقى، تولغاق، قەۋزىيەت، ئىشتىھاسىزلىق قاتارلىق ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتىمۇ ئۈنۈمى ياخشى. تۇرمۇش ئادىتى نورمال بولماسلىق تۈپەيلىدىن ئاشقازاندا دائىم يېمەكلىك يىغىلىپ قېلىپ، ئاشقازان كۆپىدىغان، ئاغرىدىغان كىشىلەر ماشىنىدا ئولتۇرغاندا ياكى باشقا بوش ۋاقىتتا، خې گۇ پەللىسىنى بېسىپ بەرسە، ئاشقازان

كۆپ ياخشىلىنىدۇ.

خې گۇ پەللىسىنىڭ نېمە ئۈچۈن شۇنداق كۆپ رولى بار؟

جۇڭگىيى تېبابەت نەزەرىيىسى بىلەن چۈشەندۈرگەندە بۇ قىلچىمۇ ھەيران قالارلىق ئەمەس.



خې گۇ پەللىسى بىلەن تۇتىشىدىغان جىڭلو (经络) لارنىڭ بەزدىلىرى ئادەمنىڭ يۈز قىسمى بىلەن، بەزىلىرى دۈمبە تەرەپ ئارقىلىق باش قىسمى بىلەن تۇتىشىدۇ. يەنە بەزىلىرى ئاشقازانغىچە تۇتىشىدۇ. شۇڭا، خې گۇ پەللىسىنى غىدىقلىغاندا ئۇنىڭ تەسىرى ئوخشىمىغان يول ئارقىلىق ئوخشىمىغان ئورۇنغا يېتىپ بارىدۇ.

بىلەكتە چۈچى (曲池) پەللىسى دەپ ئاتىلىدىغان بىر پەللە بو-لۇپ، ئۇ خې گۇ (合谷) پەللىسىنىڭ جىڭلوسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

شۇڭا، بۇ پەللىنى بېسىشنىڭ باش ئاغرىقىغا ئۈنۈمى بار. چۈنچى پەللى-
سىنى تېپىشتا ئالدى بىلەن بىلەنكى ئېگىمىز، بۇ ۋاقىتتا جەينەكتە بىر
قاتتىق سۆڭەك كۆتۈرۈلۈپ چىقىدۇ. باش بارماق بىلەن كۆتۈرۈلۈپ چىققان
سۆڭەك سىرتىدىن ئىچى تەرەپكە باسىمىز، باسقاندا ئاغرىغان جاي چۈنچى
(曲池) پەللىسىنىڭ ئورنى بولىدۇ.

غىدىقلاش ئۇسۇلى ئوتتۇرا بارماقنى (باشقا بارماق بولسىمۇ بولىدۇ)
ئېگىپ، باش بارماق تىرىقچىنىڭ ئۇچى بىلەن تۆۋەنگە كۈچەپ باسسا
بولىدۇ.

يۇقىرى قان بېسىمنى چۈشۈرۈشتە قولنى ئۇۋۇلاش ئەڭ ئۈنۈملۈك

ھازىر يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلار ئىنتايىن
كۆپ. بۇنىڭ ئىچىدە 90% تى بىرلەمچى يۇقىرى قان بېسىمى بولۇپ،
سەۋەبى ئېنىق ئەمەس. قوزغىلىشتىن بۇرۇن گەرچە باش ئاغرىش، مۈرە
تېلىپ ئاغرىش، قۇلاق غوغۇلداش قاتارلىق ئالامەتلەر بولسىمۇ، ئەمما بۇلار
يۇقىرى قان بېسىمىنىڭ ئۆزىگە خاس ئالامەتلىرى ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستى-
تىگە قوزغىلىشتىن بۇرۇن قىلچىمۇ بېشارەت بولمايدىغان ئەھۋاللارمۇ
كۆپ.

نۇرغۇن كىشىلەر سالامەتلىك تەكشۈرتىشتە ئاندىن يۇقىرى قان
بېسىم كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلىقىنى بايقايدۇ. شۇنى ئىنكار قىلىشقا
بولمايدۇكى، بۇ كىشىلەرنى يەنىلا تەلەپلىك دېيىشكە بولىدۇ. يەنە نۇرغۇن
كىشىلەر ھەمىشە كېسەللىك ئەھۋالى يامانلاشقاندىلا ئاندىن ئۆزىنىڭ
خېلى بۇرۇنلا يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلىقىنى
بايقايدۇ.

ئەگەر ئادەم بەدىنىدىكى قايسى ئورۇن يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىگە
گىرىپتار بولغانلىقىدىن بەلگە بېرىدۇ دېسە، ئۇ بولسىمۇ قول.
ھەممەيلەنگە مەلۇمكى، بىز بېغىشىمىزنى تۇتقاندا تومۇرنىڭ سوق-

قانلىقنى ھېس قىلىمىز. ئۇنىڭدىن باشقا مۈرە، قۇلاقنىڭ كەينىدىمۇ تومۇرنىڭ سوققانلىقنى ھېس قىلالايمىز. يۈرەكنىڭ قىسقىرىشىغا ئەگىشىپ، پۈتۈن بەدەندىكى ئارتېرىيەلەر تەڭ سوقىدۇ، بۇ ئىنتايىن تەبئىي ئەھۋال. ئەمما ئوخشىمىغان ئورۇندىكى تومۇرنىڭ سوقۇشى ئوخشاش بولمايدۇ. مەسىلەن: قان بېسىمى $160 \sim 180$ mmHg گە يەتكەندە بېغىشتىكى ياكى شى (阳溪) پەللىسىنىڭ بېسىمى $180 \sim 200$ mmHg گە يېتىدۇ، قول دۈمبىسى ئارىلىق سۆڭەكتىكى لولىك ۋۇ (落零五) دىمۇ كۈچلۈك سىلكىنىش سېلىنىدۇ.



زىمى پەيدا بولىدۇ. قول دۈمبىسىدە قان بېسىمى ئىنكاس پەللىسىدىن ئۈچى بار، بىرى ياكى شى (阳溪) پەللىسى، يەنە بىرى لولىك ۋۇ (落零五) پەللىسى، ئۈچىندىكى خې گۇ (合谷) پەللىسى.

ياكى شى (阳溪) پەللىسىنىڭ ئورنىنى بېكىتىشنىڭ ئۇسۇلى بولسا، بەش بارماقنى

ئۇچقاندا باش بارماق تۆۋەن تەرىپىدىكى قول دۈمبىسىدە بىر ئويما جاي پەيدا بولىدۇ، ئويما جايىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن بېغىشقا يېقىن جايدا باسسا ئاغرىيدىغان بىر نۇقتا بار، مانا مۇشۇ ياكى شى پەللىسىدۇر. لولىك ۋۇ (落零五) پەللىسى بولسا، كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارماق تۈۋى كېسىشكەن جايىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى قول دۈمبىسى ئارىلىقىدىكى ئويما يەرنى باسسا قاتتىق ئاغرىيدۇ، بۇ نۇقتا لولىك ۋۇ نىڭ توغرا ئورنىدۇر. بۇ پەللىنى تاپقاندىن كېيىن، باش بارماق قورساق قىسمى بىلەن مۇشۇ يەرنى بېسىپ، تومۇرنىڭ سوقۇش ئەھۋالىغا دىققەت قىلىش كېرەك.

ئەگەر كۈچلۈك ھەم تېز سوقسا، ئۇنداقتا دوختۇرخانىغا بېرىپ يۈرەكنى تەكشۈرۈپ بېقىشنىڭ زۆرۈرىتى بار.

بىر قېتىم بىر قىزچاق قېشىغا كېسەل كۆرسەتكىلى كەپتۇ. ئۇ مېنىڭ قېشىغا كېلىشتىن بۇرۇن دوختۇرخانىغا بېرىپ قان بېسىمىنى ئۆلچىتىپتەكەن، يۇقىرىسى 180 mmHg ، تۆۋىنى 120 mmHg چىقىپتۇ. سانلىق قىممەتتىن قارىغاندا، شۈبھىسىزكى، قان بېسىمى يۇقىرى، ئەمما ئۇ ئۆزى ھېچقانداق كېسەللىك ئالامىتى سەزمىگەن، شۇڭا جۇڭگىيى دوختۇرخانىغا كۆرسەتكىلى كەپتۇ.

مەن ئۇنىڭ قول دۈمبىسىدىكى يۇقىرى قان بېسىم ئىنكاس رايونىنى تەكشۈرۈپ، ئۇنىڭ خې گۇ پەللىسىدىكى تومۇرنىڭ ئىنتايىن قاتتىق سوقۇۋاتقانلىقىنى بايقىدىم. شۇنىڭ بىلەن ھەپتىدە بىر قېتىم يىڭنە سانجىپ داۋالىدىم. بىر يىلدىن كېيىن ئۇ قان بېسىمىنى چۈشۈرىدىغان دورا ئىچمىگەن ئەھۋالدا قان بېسىمى $140 \sim 120 \text{ mmHg}$ گە چۈشتى.

مېنىڭ خې گۇ پەللىسىگە يىڭنە سانجىپ داۋالىشىمىدىكى سەۋەب، كېسەللىك سەۋەبى مۇشۇ يەردە بولغاچقا بۇ يەردە كۈچلۈك ئىنكاس پەيدا بولغان. ئەگەر كۈچلۈك ئىنكاس پەيدا بولغىنى ياكى پەللىسى ياكى لولىڭ ۋۇ پەللىسى بولغان بولسا، مۇشۇ پەللىلەرگە يىڭنە سانجىپ داۋالايتۇق. بىراق، خې گۇ پەللىسىنىڭ مۇھىملىقىغا يەنىلا سەل قاراشقا بولمايدۇ. ئۇ نېرۋىنى تېنچلاندۇرۇش رولىغا ئىگە. ھالبۇكى يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىرى ئارىسىدا روھىي جىددىيلىكتىن پەيدا بولىدىغانلار خېلى كۆپ. شۇڭا، ياكى شى پەللىسى بىلەن لولىڭ ۋۇ پەللىسىنى غەدىقلىغاندا خې گۇ پەللىسى بىلەن ماسلاشتۇرسا ئۈنۈمى ئادەتتىن تاشقىرى ياخشى بولىدۇ.


قول دۈمبىسى ئادەتتە كۆپرەك غىدىقلاشقا ئۇچرايدۇ، شۇڭا داۋالىغاندا كۈچ سالىمىنى سەل - پەل ئاشۇرۇش كېرەك. ئون نەچچە تال چىش كولىغۇچنى باغلاپ، ئۇنىڭ ئۇچى بىلەن قول دۈمبىسىدىكى پەللىنى تاكى قىزارغىچە كۈندە ئىككى قېتىم غىدىقلىسا بولىدۇ.

شۇنىڭ بىلەن بىللە، قان بېسىم كېسەللىرى كۈندىلىك تۇرمۇشتا

قان بېسىمىنى قەرەللىك ئۆلچەپ تۇرۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈپ، ئۆزىنىڭ قان بېسىمىغا قارىتا كۆڭلىدە سان بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بۇ- نىڭ داۋالاشقا نىسبەتەن زور پايدىسى بار.

قان بېسىمىنى تۇراقلاشتۇرۇشتا بارماق ئۇچىنى دائىم ئۇۋۇلاش لازىم

يىراق قەدىمكى زاماندا كىشىلەر كۈن چىقىش بىلەن ئىشلىسە، كۈن پېتىش بىلەن دەم ئېلىپ تۇرمۇش كەچۈرگەن. قان بېسىمىنى چۈشۈرۈ- دىغان دورىلارنى ئىچىشنى ھەرگىز بىلمەيتتى. پەقەت ئاندا - ساندا بەزى يېمەكلىكلەر بىلەن كۈتۈنۈش ياكى يىگنە سانجىش قاتارلىق ئاددىي دا- ۋالاش ئۇسۇلى ئارقىلىق نورمال قان بېسىمىنى ساقلايتتى. ھازىر تۇرمۇش



ۋە خىزمەتتىكى بېسىم بىر قىسىم كىشىلەرنى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇ- زىدىغان، ئالدىراپ - تېنەپ يۈرد- دىغان، ھەتتا تاماق يېيىشكە ۋا- قت چىقىرالمىدىغان قىلىپ قويدى، تۇرمۇشى ناھايىتى قانۇ- نىيەتسىز.

شۇنداق بولغاچقا، ھازىرقى زامان كىشىلىرى «مەدەنىيەت كېسلى» نىڭ ئازابىدىن ساقلى- نالمىدۇ. ئادەم مۇ ھايۋان. شۇڭا، يەر شارىنىڭ ئۆز ئوقىدا ئۆرپ- تىلىق ئايلىنىش قانۇنىيىتىگە


باش قېيىپ كۆز قاراڭغۇلاشقا قىل قان تومۇرلاردىكى قان ئايلىنىشنىڭ ناچار- لاشقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.

بويىسۇنۇش كېرەك. شۇنداقلا، ئادەم بەدىنىنىڭ ئۆزىگە خاس قانۇنىيىتىدە- گىمۇ بويىسۇنۇش كېرەك. ئادەم بەدىنىنىڭ قانۇنىيىتى بولسا تاڭ ئاتقاندا بەدەندىكى ئۆزىنى تىزگىنلەيدىغان سىمپاتىك نېرۋا ئۆز پائالىيىتىنى باش-

لاپ، بەدەن پائالىيىتىگە تۈرتكە بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۈرەك قاتارلىق ئىچكى ئەزالارنىڭ رولىمۇ كۈچىيىدۇ. كەچ كىرگەندە پاراسىمپاتىك نېرۋا ھەرىكەتلىنىشكە باشلاپ، بىر كۈنلۈك چارچاشنى يوقىتىش ئۈچۈن، بەدەندىكى بارلىق ئەزالار دەم ئېلىش ھالىتىگە كىرىدۇ. بەزى كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشى قانۇنىيەتسىز، بەدەننى ئارام ئالدىرۇشقا تېگىشلىك بولغاندا ئارام ئالدىرمايدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئۆزىنى تىزگىنلەيدىغان نېرۋا سىستېمىسىدا مۇقەررەر مەسىلە كۆرۈلىدۇ. يۈرەك كېسىلى، ئاشقازان كېسىلى قاتارلىق كېسەللىكلەر مۇشۇ سەۋەبتىن پەيدا بولىدۇ. شۇڭا، كىشىلەر بۇنى «كېچىلىك چارچاش كېسىلى» دەپ ئاتايدۇ.

ھازىرقى زاماندا كەڭ ئىشلىتىلىۋاتقان قان بېسىمىنى چۈشۈرگۈچى دورىلار قاننىڭ ئېقىشىنى تېزگىنلىيەلمەيدۇ، بەلكى يۈرەكنىڭ يۈكىنى يەڭگىلەشتۈرۈش ئۈچۈن، پۈتۈن بەدەندىكى قان تومۇرلارنى كېڭەيتىپ، قان تومۇرلاردىكى بېسىمنى تۆۋەنلىتىدۇ. ھالبۇكى، يىڭنە سانجىپ داۋالاش قان بېسىمىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئۈنۈمىنى قولغا كەلتۈرۈش مەقسىتىدە قان تومۇر ۋە قان تومۇر ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان سىمپاتىك نېرۋىنى بىۋاسىتە غىدىقلايدۇ.

بۇ ئىككى خىل ئۇسۇلنى بىرلەشتۈرگەندە كۆپ ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. يۇقىرى قان بېسىم ياكى تۆۋەن قان بېسىمى بولۇپ شىددىن قەتئىيەنەزەر، ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك بولغىنى قىل قان تومۇرلاردىكى قان ئايلىنىش مەسىلىسى.



باش قىيىپ، كۆز قاراڭغۇلۇپ شىش، باش ئېغىرلىشىش، مۈرىسى تېلىپ ئاغرىش، يۈرەك سېلىش، قول، پۇت مۇزلاش، ئۇيقۇسىزلىق، قەۋزىيەت قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى قىل قان تومۇرلاردىكى قان ئايلىنىشنىڭ ياخشى بولماسلىقى كەل-

تۇرۇپ چىقارغان كېسەللىك ئالامەتلىرى ھېسابلىنىدۇ. يۇقىرى قان بېسىم - قان تومۇرلارنىڭ تارىيىپ، قان ئايلىنىش بېسىمىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، قىل قان تومۇرلاردىكى قان ئايلىنىشنىڭ راۋان بولماسلىقىدىن بولىدۇ؛ تۆۋەن قان بېسىم بولسا قان ئايلىنىش بېسىمىنىڭ ئاجىزلىقىدىن، قىل قان تومۇرلاردىكى قان ئايلىنىشنىڭ داۋاملاشماسلىقىدىن بولىدۇ.

قول قىل تومۇرلار تارقالغان جاي بولۇپلا قالماي، يەنە قان بېسىمىنى مۇقىملاشتۇرىدىغان مۇھىم پەللىلەر بىلەن قاپلانغان. مەسىلەن: بەش بارماق ئۇچىدىكى شاۋشاڭ (商少)، شاڭياڭ (商阳)، جۇڭچۇڭ (中冲)، شاۋزې (泽少) قاتارلىق پەللىلەر. مۇشۇ يەرلەرنى غىدىقلىغاندىلا قان تومۇرلارنى كېڭەيتىش، قان ئايلىنىشنى راۋانلاشتۇرۇش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.


بارماق ئۇچىدىكى پەللىلەرنىڭ توغرا ئورنىنى ئاسانلىقچە تاپقىلى بولىمايدۇ، بىراق بارماق ئۇچىنى تولۇق ئۇۋۇلغاندا ئوخشاشلا ياخشى ئۇ-نۈمگە ئېرىشەلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە دائىم بېغىشنى ئايلاندۇرغاندىمۇ قان ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بوش ۋاقىتتا ئىككى قولىنى ئۆزئارا سۈركەپ بەرسە، بۇ پايدىلىقكى ھەرگىز زىيانلىق ئىش ئەمەس. ئىمكانىيەت بولسا، ھەر قېتىم يۇيۇنۇشتىن بۇرۇن پۇت ئۇچىدىن ئۇشۇققىچە بولغان قىسمىنى ئۇۋۇلسا ھەم مۇۋاپىق غىدىقلىسا، ئۇ يەردە يۈرەككە ئەڭ يىراق بولغان قان تومۇرلار جايلاشقان بولۇپ، ئۇلارنى غىدىقلاش ئومۇمىي بەدەننىڭ ساغلاملىقىغا پايدىلىق.

دەئابىت كېسىلىنى داۋالاشتا كورال يىغىنىنى سېناپ كۆرسە بولىدۇ

پەللە ئارقىلىق كېسەل داۋالاش تىلغا ئېلىنسا كۆپ قىسىم كىشىلەرنىڭ مېڭىسىدە جەزمەن جۇڭگونىڭ نەچچە مىڭ يىللىق تارىخى پەيدا بولىدۇ. شۇنداقتىمۇ يېقىنقى يىللاردا ئارقا - ئارقىدىن قېزىپ چىقىلغان ماتېرىياللار پەللە ئارقىلىق كېسەل داۋالاشنىڭ جۇڭگوغا مەنسۇپ ئىكەن-

لىكىنى يەنىمۇ ئىسپاتلىدى. مەسىلەن: چاۋشيەن يېرىم ئارىلىدىكى خەلق ئارىسىدا تارقالغان، «كورال يىگىنىسى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى» مەخسۇس قولدىكى پەللىلەر ئارقىلىق پۈتۈن بەدەندىكى كېسەللىكلەرنى داۋالايدۇ. خان بىر خىل ئۆزگىچە داۋالاش ئۇسۇلىدۇر.

«كورال يىگىنىسى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى» قولدا پۈتۈن بەدەندىكى جىگلو (经络) لار بىلەن تۇتىشىدىغان پەللىلەر تارقالغان، پەقەت قولدىكى پەللىلەرنى غىدىقلىغاندىلا پۈتۈن بەدەندىكى بىئاراملىقنى ساقايتىدۇ. قىلى بولىدۇ دەپ قارايدۇ. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، ئوتتۇرا بارماق باش، بويۇن قىسمىغا، نامسىز بارماق، كۆرسەتكۈچ بارماق ئىككى بىلەككە، باش بارماق، چىمچىلاق ئىككى پۇتقا، قالغانلىرى پۈتۈن بەدەنگە باب كېلىدۇ. شۇڭا، بىر ئادەمنىڭ بېشى ئاغرىسا «كورال يىگىنىسى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى» نى قوللانغاندا، ئۇنىڭ ئوتتۇرا بارماق ئۇچىنى غىدىقلاش كېرەك. مېنىڭ بىر ئايال كېسەلىم بار بولۇپ، ئۆسمۈر چېغىدىن باشلاپلا دىئابت كېسەلىنىڭ ئازابىنى تارتىپ، 20 يىلدىن بۇيان ئىزچىل تۈرلۈك ئۇسۇلدا داۋالىنىپ كەلگەن. ئۇنىڭ ئەھۋالى كۆپ ساندىكى بەدەننى سېمىز دىئابت كېسەللىرىگە ئوخشەدۇ.



جايدۇ. قان شېكېرىنى تەكشۈش ناھايىتى قېيىن. ئىلگىرى كېسەللى ئېغىرلىشىپ بىر نەچچە قېتىم دوختۇرخانىدا ياتقان. ئۆتكەن يىلى 6 - ئاي ئارىلىقىدا ئۇ يەنە بالىنىتىسىغا كىرىپ قاپتۇ. تەكشۈرۈشتە قاندىكى شېكەر قىممىتى يۇقىرىدۇر. لاپ 330 mg/dl غا يەتكەن. ھالبۇكى، نورمال قان شېكېرىنىڭ قىممىتى $90 \sim 70 \text{ mg/dl}$ گىچە. بۇنىڭدىن ئۇنىڭ كېسەلىنىڭ

قانچىلىك دەرىجىدە ئېغىرلاشقانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. بۇ قېتىم بالىنىڭ ياتقان مەزگىلدە، مەن ئۇنىڭغا «كورال يىگىنى» سى ئارقىلىق داۋالاش ئۇسۇلى» نى قوللاندىم. بىر نەچچە قېتىم داۋالدىغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ قان شېكېرى قىممىتى $229 \text{ mg} / \text{dl}$ غا چۈشتى. ئۇ ئىنتايىن خۇشال بولۇپ، خۇشاللىقىدىن قېنى - قېنىغا پاتماي ساياھەتكە چىقىپ كەتتى. سەپەردە تاماقنى بولۇشىغا يېگەچكە، قان شېكېرى يەنە ئۆرلەپ كېتىپتۇ. ئۇ قورقۇپ كېتىپ، دەرھال قايتىپ كېلىپ، بىر تەرەپ - تىن ئۇزۇقلۇقنى تىزگىنلەپ، بىر تەرەپتىن ھەپتىدە بىر قېتىم «كورال يىگىنى» بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى» نى قوبۇل قىلىپ، قان شېكېرى يەنە چۈشتى. ھازىر ئۇنىڭ قان شېكېرى ئىزچىل $160 \text{ mg} / \text{dl}$ ئەتراپىدا ساقلىنىۋاتىدۇ.

«كورال يىگىنى» بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى» دا قوللىنىلىدىغان دېتائىت كېسىلىگە ئۈنۈمى بار پەللىدىن بەش ئورۇندا بار، بۇ پەللىلەرنىڭ ئورنىنى بېكىتكەندە ئالدى بىلەن ئوتتۇرا بارماق تۈۋى توغرا قېتىمىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىنى تېپىپ، يەنە ئالدىنقى بىلەن بېغىش تۇتاشقان جايدىكى بىرىنچى توغرا قات ئوتتۇرا نۇقتىسىنى تېپىپ، ئاندىن قەلەم بىلەن بۇ ئىككى نۇقتىنى تۇتاشتۇرۇش كېرەك. بېغىشتىكى توغرا قاتتىن باشلاپ، ھەر بەش مىللىمېتىر ئارىلىقنى تەڭ 16 گە بۆلىمىز، ھەر بىر بۆلەكتىكى نۇقتا پۈتۈن بەدەنگە تۇتىشىدىغان پەللىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ.

دېتائىت كېسىلىنى داۋالايدىغان پەللى ئايرىم - ئايرىم ھالدا 1، 2، 3، 12، 16 - ئورۇنلاردۇر. «كورال يىگىنى» بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى» بويىچە ئاتىغاندا 1 - نۇقتا شيايىن (下阴)، 2 - نۇقتا «سۈيدۈك يولى» (尿道)، 3 - نۇقتا «دوۋساق» (膀胱)، 12 - نۇقتا «ئاشقازان» (胃中)، 16 - نۇقتا «يۈرەك دىئافراگمىسى» (心膈) دېيىلىدۇ. يۇقىرىقى نۇقتىلارنى تەرتىپ بويىچە غىدىقلىغاندا قان شېكېرىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ.

غىدىقلاش ئۇسۇلى: ئەڭ ياخشىسى يىگىنە سانجىش، ئەگەر ئاغرىق يىگىنە سانجىشتىن قورقسا، داغلاپ داۋالسىمۇ بولىدۇ. بۇنداقلا ئۆيىدىمۇ ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. بۇ نۇقتىلارنىڭ دائىرىسى كىچىكرەك بولغاچقا،

يېسىمان كۈچىدىن ئىبارەت كىچىك ھەم ئوت كۈچى مەركەزلەشكەن نەرسىنىڭ ئۈنۈمى بىر قەدەر ياخشى بولىدۇ. داۋالغاندا، ئالدىن تەييارلاپ قويۇلغان يېسىمان كۈچىنى پەللىگە يېقىنلاشتۇرۇپ، قىزىغان سېزىم پەيدا بولغان ھامان سەل - پەل يىراقلاشتۇرۇش، بەش قېتىمدىن يەتتە قېتىمغىچە تەكرار ئىشلىگەندە ئۇنىڭ داۋالاش ئۈنۈمى گەرچە باش ئاغ - رىقى ۋە مۈرە تېلىپ ئاغرىشنى داۋالغاندەك تېز بولمىسىمۇ، ئەمما ھەر كۈنى ئەتىگەن، كەچتە بىر قېتىمدىن ئىشلىگەندە كېسەلگە زور ياردىمى بولىدۇ. ئەلۋەتتە، پەقەت پەللىلەرنى داغلاپ داۋالاش بىلەنلا دىئاپىت كې - سىلىنى يىلتىزىدىن ساقايتقىلى بولمايدۇ، باشقا داۋالاشنىمۇ قىلىش كېرەك.

بۇ يەردە شۇنى ئەسكەرتىپ قويۇشقا تېگىشلىكى، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە بۇيۇنۇپ بىر سائەت ئىچىدە داۋالاش قىلماسلىق كېرەك. سەۋەبى، يۇيۇنغاندا بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئىسسىقلىق كۈچى غىدىقلانغان داغلاپ داۋالاش ئۈنۈمىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ.


ئاشقازان ئۈچەي كېسەللىكلىرىگە ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنىڭ ئۈنۈمى ياخشى

ئالاقاننىڭ باش بارماق تۆۋەن تەرىپىدىكى تومپىيىپ چىققان قىس - مى يىگنە سانجىپ داۋالاش ئىلمى ئاتالغۇسى بويىچە ئېيتقاندا باش بارماق دۆڭچىسى دېيىلىدۇ. ئۇنىڭ سىرتقى يېرىم تەرىپى كۆكرەك بوش - لۇقى بىلەن نەپەسلىنىش ئەزالىرىنىڭ ئىنكاس رايونى؛ ئىچكى يېرىم تەرىپى ئاشقازان. تال. چوڭ ئۈچەينىڭ ئىنكاس رايونى. بىر ئادەمنىڭ ئاشقازان ۋە ئۈچەيىدە ھېچقانداق بىئاراملىق بولمىغان ئەھۋالدا، ئەگەر باش بارماق دۆڭچىسىنىڭ سۆسۈن رەڭلىك ئىكەنلىكى بايقالسا ياكى زۇ - كامنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە بۇ يەردىكى كۆپۈپ چىققان مۇسكۇل تۇ - يۇقسىز ئولتۇرۇشۇپ كەتسە ھەم ئاغرىق سېزىمى پەيدا بولسا، ئۇنداقتا ھوشيارلىقىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. سىزنىڭ ئاشقازان ياكى ئۈچەيىڭىزدە

مەسىلە بارلىقى ئېھتىمالغا بەك يېقىن.


ئاشقازان - ئۈچەي كېسىلى بىر ئومۇمىي نام. ئەمەلىيەتتە ئۇ ئاشقازان ئاجىزلىق، ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان يارىسى، قەۋزىيەت، تولغاق قا- تارلىق كېسەللىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ كېسەللىكلەرگە ئۇنۇمى بار پەللە ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىدىن ئىبارەت. قايسى خىل ئاشقازان - ئۈچەي كېسىلى بولۇشتىن قەتئىينەزەر مۇشۇ نۇقتىنى باسقاندا ئاغرىقنى يوقاتقىلى بولىدۇ.

ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسى جىيەنلى سەنجىن (健理三针区) رايونىنىڭ مەركىزىدە بولۇپ، ئۇنىڭغا ۋەكىللىك قىلىدىغان نۇقتىدۇر.



ئەگەر سىز جىيەنلى سەنجىن رايونىنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلمىسىڭىز، ئوتتۇرا بارماقنىڭ ئوتتۇرىسىنى بويلاپ تۆۋەنگە ھاياتلىق سىزىقىسى بىلەن كېسىشىدىغان جايغا سىزىڭىز، بۇ ئاشقازان، ئۈچەي نۇقتىسى- نىڭ ئورنى بولىدۇ.

ئاشقازان - ئۈچەي كىسەل- لىكىگە گىرىپتار بولغانلار دائىم ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى مەركەز قىلىپ، پۈتكۈل جىيەن- لى سەنجىن رايونىنى بارماق ئۇچى بىلەن ئۇۋۇلسا بولىدۇ. بۇ رايون ئاشقازان ۋە ئۈچەينىڭ رولى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بو- لۇپلا قالماي، باشقا ئىچكى ئەزالار بىلەنمۇ زىچ مۇناسىۋەتلىك. شۇڭا، «ئىچكى ئەزالار ساغلاملىق



ئاشقازان سىزىملىغاندا بىر باغلام چىش كو- لىغۇچ بىلەن ئاشقازان، ئۈچەي نۇقتىسىنى كۈچلۈك غىدىقلاش كېرەك.

دەرىجىسىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان ئەينەك» دەپ ئاتىلىدۇ. جىيەنلى سەد-
جېن رايونىنى ئۇۋۇلاش ئاشقازان - ئۈچەي ئىقتىدارىنى ياخشىلاپلا قالماي،
باشقا ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنىمۇ ياخشىلايدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسى
ئىشتىھانى ئېچىشتۇر.

ھەددىدىن زىيادە تاماق يېيىش ياكى سوغۇق يېمەكلىكلەرنى يې-
يىشتىن ئاشقازان ئاغرىغاندا ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى مۇۋاپىق غە-
دىقلاش كېرەك. باش بارماق بىلەن داۋاملىق ۋە رېتىملىق ھالدا تاكى
ئاشقازان ئاغرىقى يېنىكلىگەنگە قەدەر ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى ئۇ-
ۋۇلاش كېرەك.

ئەگەر ئاشقازان يارىسىدەك ئېغىر كېسەللەكلەرگە دۇچ كەلگەندە،
يالغۇز ئۇۋۇلاشقا تايىنىپ ئاغرىقنى پەسەيتكىلى بولمايدۇ، بۇ ۋاقىتتا بىر
باغلام چىش كولىغۇچ بىلەن ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى غىدىقلاش
كېرەك. ئادەتتە ئالىقانىنىڭ سىرتىدىن كەلگەن غىدىقلاشقا بولغان ئىنكاسى
ناھايىتى ئاجىز بولىدۇ، شۇڭا ئاسان زەخمىلىنىدۇ. ھالبۇكى، ئالىقان
زەخمىلەنسە كۆپىنچە تېز ساقايىمايدۇ، شۇڭا باغلام چىش كولىغۇچنى
ئەھۋال جىددىي بولغاندىلا ئىشلىتىش لازىم. ئەمما بۇنداق كۈچلۈك غە-
دىقلاشتىن كېيىن، قاتتىق ئاغرىق بولغان تەقدىردىمۇ پەسەيتكىلى بولىدۇ.
ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىنى غىدىقلاشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە-
كى ئاشقازان يارىسىغىمۇ ئوخشاشلا ئۈنۈمى بار. ئاشقازان يارىسى پەيدا
بولۇشنىڭ سەۋەبى ئاشقازان كىسلاتاسى ھەددىدىن كۆپ ئاجرىتىپ چى-
قىرىلغانلىقىدا. ئاشقازان كىسلاتاسى زىيادە كۆپىيىپ كەتسە ھەزىم قى-
لىشقا تېگىشلىك يېمەكلىكلەر ھەزىم قىلىنپلا قالماي، ئاشقازان دىۋاردە-
نىمۇ چىرىتىپ، ئاشقازان شەلۋەرەشنى پەيدا قىلىدۇ.


چىش كولىغۇچ ياكى ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن ئاشقا-
زان - ئۈچەي نۇقتىسىنى داغلىسا ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ھەددىدىن زى-
يادە ئاجرىتىلىپ چىقىرىلىشىنى تېزگىنلىگىلى بولىدۇ. شۇڭا، ئاشقازان
يارىسىنىڭ ئېغىرلىشىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش رولى بار.
يۇقىرىدا دېيىلگەندەك، ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسى ئاشقازان ئاغ-

رىقى، ئاشقازان يارىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا ئالاھىدە ئۈنۈمى بار پەللە. قانداق ۋاقىت بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئاشقازان، ئۈچچىڭىزدە- كى بىئاراملىقنى سەزىڭىز دەرھال ئاشقازان - ئۈچەي نۇقتىسىدىن پايدىلانىڭىز بولىدۇ.

گال ئاغرىسا كۆڭ زۇي پەللىسىنى ئايلاندۇرۇپ ئۇۋۇلاش لازىم

پەللە ھەم سىرلىق ھەم قىزىقارلىق نەرسە. ھازىرقى زامان تېببىي ئىلمى ئاتالغۇسىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ ئېيتقاندا، پەللە ئاسانلا توك ئۆت- كۈزىدىغان ئورۇن، باشقا ئورۇنلار بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئۇنىڭ سىرتقى يۈزىنىڭ تېمپېراتۇرىسى سەل يۇقىراق. پەللە نېمە ئۈچۈن باشقا ئورۇن- لاردىن سەزگۈر كېلىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن پەللىنىڭ كېسەل داۋالاشتەك ئاجا- يىپ ئۈنۈمى بولىدۇ؟ ھازىرغىچە بۇ سىرنى ھېچكىم ئاچالمىدى. ئادەم ئۆلۈشنىڭ ئالدىدىكى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە بولغان ئارىلىقتا پەللىنىڭ ئۆزىگە خاس تەبىئىي ھادىسىسى پۈتۈنلەي يوقىلىدۇ. شۇڭا، جەسەتنى يارغاندىمۇ (ئاناتومىيە قىلغاندىمۇ) پەللىنىڭ ھەقىقىي سىرنى يەشكىلى بولمايدۇ.

بەختكە يارىشا قەدىمكىلەر يىڭنە سانجىش، داغلاش، بېسىش (ئۇ-



ۋۇلاش) قاتارلىق جەھەتلەردە كۆپ- لىگەن تەجرىبە- لەرنى توپلىغان ئىكەن، بىز پەقەت رېتىپ بويىچە دورا قىلساقلا، چەكسىز ئۈنۈمگە ئېرىشەلەيمىز. قەدىمكىلەر

گال ۋە نەپەسلىنىش ئەزالىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان قولدىكى پەللىلەر باش بارماقتىكى شاۋشاڭ (商 / 𠂇) پەللىسى ئارقىلىق ئاللىقاچان دىكى يۈجى (鱼际) پەللىسىگە، ئاندىن بېغىشنىڭ ئۈستى تەرىپىدىكى كۆڭ زۈي (孔最) پەللىسىگە بارىدۇ. بۇ جىڭلۇ (经络) لار بەدەندە گال، ئۆپكە ئاندىن ئاشقازان، ئۈچەيگە يېتىپ بارىدۇ دەپ قارايدۇ.

جۇڭخېي نەزەرىيىسىگە ئاساسلانغاندا، گال ئاغرىش، بۇرۇن توسۇلۇش، يۆتىلىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىدىغان زۇكام ۋە رۇسلىرى ئاساسلىقى كۆڭ زۈي پەللىسىگە مەركەزلەشكەن بولىدۇ، شۇڭا بۇ پەللىلەرنى غىدىقلىغاندا گال ئاغرىقى، يۆتەل قاتارلىق كېسەللىك ئالا-مەتلىرىنى يېنىكلىگەن بولىدۇ.

كۆڭ زۈي (孔最) پەللىسىنى تېپىشنىڭ ئۇسۇلى بېغىش بىلەن جەينەكنى ئېگىپ، بېغىش ۋە جەينەكنىڭ قاتلانغان يېرىنى ئۆلچەم قىلىپ، بىلەكنى تەڭ ئۈچ بۆلەككە بۆلگەندە، جەينەك تەرەپتىكى $1/3$ قىسمى كۆڭ زۈي پەللىسىنىڭ ئورنىدۇر. يەنە بىر ئۇسۇلى بېغىشنى كۈچ بىلەن ئەگەندە بېغىشنىڭ ئىچكى تەرىپىدە ئىككى پەي كۆپۈپ چىقىدۇ. بارماق بىلەن ئارىلىقتىكى ئويماق جايدىن تۆۋەنگە قاراپ يۆتكەسە تەخ-مىنەن جەينەككە يېقىن بولغان $1/3$ قىسمىدىكى جايدا باسقاندا ئاغرىي-دىغان بىر نۇقتا بار، مانا بۇ كۆڭ زۈي پەللىسىدۇر.

داۋالاشتا قول بىلەن كۆڭ زۈي پەللىسىنى كۈچەپ بېسىپ، ئاندىن ئەسلىدىكى قىياپىتى بىلەن تەخمىنەن ئۈچ سېكۇنتتىن بەش سېكۇنت-قىچە ئايلاندۇرۇپ، بىر سېكۇنتتىن ئىككى سېكۇنتقىچە توختاپ يەنە دا-ۋاملاشتۇرۇش. مۇشۇ ئۇسۇل بويىچە ئۆك - سول ئىككى بىلەكتىكى كۆڭ زۈي پەللىسىنى تەكرار بەش قېتىم ئەتراپىدا ئوۋۇلسا بولىدۇ.


زۇكام بولغاندا ئەگەر قىزىش بولسا، ئىككى بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارماق ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق تىرىقچىنىڭ ئىككى تەرىپىنى كۈچەپ باس-قاندا ئاغرىق سېزىمى پەيدا بولىدۇ. پەقەت داۋاملاشتۇرۇۋەرگەندىلا قىزىت-مىنى ياندۇرۇش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىش جەريانىدا، ئاغرىشتىن ساقلانغىلى بولمايدۇ. پەقەت ئاغرىغاندىلا سىمپاتىك

نېرۋىنى جىددىيەلەشتۈرۈپ، قان تومۇرلارنى يەنىمۇ قىسقارتقىلى بولىدۇ، قان ئايلىنىش مىقدارى تەبئىي ئازىيىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسىمۇ شۇ-نىڭغا ئەگىشىپ چۈشىدۇ. بۇ ئۇسۇلنىڭ يېنىك دەرىجىدىكى زۇكام، قىزىمىغا ناھايىتى ئۈنۈمى بار، ئەگەر داۋاملىق قىزىپ 39°C قا يەتسە، دەر-ھال دوختۇرخانىغا بېرىش كېرەك.

زۇكام ئادەتتە ئۈچ كۈن ئىچىدە دورا يېمىسىمۇ ساقىيىدۇ، ئەمما «-زۇكام تۈرلۈك كېسەللىكنىڭ مەنبەسى». شۇڭا، زۇكام پەيدا قىلىدىغان ئەگەشمە كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، زۇكامنى يەنىلا بالدۇر داۋالىغان تۈزۈك. پەللە ئارقىلىق داۋالاش ئادەم بەدىنىنىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدۇ، ھېچقانداق ئەكس تەسىرىمۇ يوق، شۇڭا قوللانماسلىققا سەۋەب يوق.

دولا تېلىپ ئاغرىسا ئوتتۇرا بارماقنىڭ ئىككى تەرەپنى بېسىش لازىم

دولا تېلىپ ئاغرىش بەزىدە بىر تەرەپتە، بەزىدە ئىككى تەرەپتە كۆرۈلىدۇ. ئەمما ئىككىلا تەرەپ ئاغرىغاندىمۇ بىر تەرەپ يەنە بىر تەرەپكە قارىغاندا بەكرەك تېلىپ ئاغرىيدۇ.



دولسى (مۇرىسى) تېلىپ ئاغ-رىش ئازابىنى تارتقان كىشىلەرگە نىسبەتەن مەن ئۇلارغا «كورال يىڭ-نىسى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى» نى تەۋسىيە قىلىشنى خالايمەن. بۇ خىل ئاددىي ئۇسۇل ئادەتتە دولا ئاغرىقىغا نىسبەتەن ئاجايىپ ئۈنۈملۈك، بۇ مې-نى بەكمۇ قايىل قىلىدۇ.


«كورال يىڭنىسى بىلەن داۋا-لاش ئۇسۇلى» دا، ئوتتۇرا بارماقنىڭ

ئاساسىي بوغۇمىدىن ئوتتۇرا بوغۇمىغىچە بولغان ئىككى تەرەپ بىلەن مۇرە قىسمى ئۆزئارا ماس كېلىدۇ. داۋالىغاندا ئالدى بىلەن دولانغان ياكى بەكرەك تېلىپ ئاغرىغان تەرەپتىكى ئوتتۇرا بارماقنى چىقىرىپ، ئاندىن يەنە بىر قولىنىڭ باش بارمىقى بىلەن ئوتتۇرا بارمىقى ھەم ئوتتۇرا بارماقنىڭ ئىككى تەرىپىنى قىسىپ، ئاساسىي بوغۇمدىن باشلاپ يۇقىرىغا باسىمىز. بېسىش جەريانىدا ئاغرىيدىغان بىر نۇقتا ئۇچرايدۇ، بۇ نۇقتا دەل پەللىدۇر. ئاندىن بۇ پەللىنى بارماق ئۇچى بىلەن داۋاملىق باسسا ياكى ئوت يېقىلغان يېپسىمان كۈچە بىلەن داغلىسىمۇ بولىدۇ. بەش قېتىمدىن ئالتە قېتىمغىچە تەكرار ئىشلىسىلا بولىدۇ.

يۈرەك كېسىلىنى داۋالاشتا چېمىن پەللىسىنىڭ ئاجايىپ ئۈنۈمى بار

يۈرەك كېسىلىگە سەل قاراشقا بولمايدىغان كېسەللىك. ئەھۋال سەل يامانلاشسا دەرھال دوختۇرخانىغا بېرىپ تەكشۈرتۈش ۋە داۋالىنىش كېرەك. ئەگەر كېسەل يېنىكرەك بولسا، ئالدى بىلەن پەللى ئارقىلىق داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللانسا بولىدۇ.

بەزى كىشىلەر يۈرەكتە بىئاراملىق ھېس قىلغاندا دوختۇرخانىغا



بېرىپ ئېلېكتروكاردىئوگراممىدا تەكشۈرتىدۇ، ئەمما ھېچقانداق نورمالسىزلىق كۆرۈلمەيدۇ. دوختۇرمۇ: «ھەممىسى نورمال، يۈرەك كېسىلىدىن ئەندىشە قىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق» دەيدۇ. ئەمەلىيەتتە سىزدە «يۈرەك مۇددەتتىن تاشقىرى قىسقىرىش» ئالامىتى بولۇش مۇمكىن.

ھەددىدىن زىيادە چارچاش، يېتەرلىك ئۇخلىماسلىق، روھىي جىد-
دىيلىك، تاماكا، ھاراقىنى ھەددىدىن زىيادە چېكىش ۋە ئىچىش كەلتۈرۈپ
چىقارغان يۈرەك سوقۇشنىڭ ۋاقىتلىق نورمالسىزلىقىنى، بەزىلەر «يۈرەك
قۇرۇق ئايلىنىش» دەپ ئاتايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئىچكى كېسەللىكلەر
دوختۇرلىرى دائىم باشقىلارنىڭ: «يۈرىكىم قاتتىق سوقىدۇ»، «تۇيۇقسىز
ئاغرىيدۇ»، «كۆكسۈمنى باسساملا ئاغرىيدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلاپ تۇرىدۇ.
مۇشۇلاردىن يۈرەكتە ئاللىبۇرۇن مەسىلە كۆرۈلگەن، دەپ قاراشقا بولىدۇ.
روشن كېسەللىك ئالامىتى بولمىغاچقا، مۇناسىۋەتسىز ئاغرىش دەپ خاتا
دىئاگنوز قويۇلۇشى ئېھتىمالغا بەك يېقىن.

يۈرەك قان تومۇرلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان قان ئايلىنىش
سىستېمىسىنىڭ كېسەللىكلىرىگە قارىتا بىلەك ئىچى تەرىپىدىكى چې
مېن (肺门) پەللىسىنى غىدىقلىسا، ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.
چې مېن (肺门) پەللىسىنى تېپىش سەل ئاۋازچىلىق. بۇنىڭ
ئۈچۈن ئالدى بىلەن بېغىش بىلەن جەينەكنى ئەگگەندە بىلەكتە بەزى
ئېگىز - پەس سىزىقچىلار كۆرۈلىدۇ. ئاندىن بېغىش مەركىزىدىكى ئويما
رايونىدىن باشلاپ، بارماق بىلەن تەدرىجىي جەينەك تەرەپكە باسقاندا، تەخ-
مىنەن بېغىش بىلەن جەينەك ئوتتۇرىسىدىكى جايدا باسسا ئاغرىيدىغان
بىر نۇقتا ئۇچرايدۇ. بۇ دەل چې مېن پەللىسىنىڭ ئورنىدۇر.



سىز يۈرەك ئىقتىدارىڭىزنىڭ نورمالسىزلىقىنى سەزگەندە، بارماق
ئۈچى بىلەن چې مېن پەللىسىنى كۈچەپ باسسڭىز بولىدۇ. ھەر ئۈچ
سېكۇنتتىن بەش سېكۇنتقىچە ئارىلىقتا بىر سېكۇنتتىن ئىككى سې-
كۇنتقىچە ئارام ئېلىپ، ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە تەكرار غىدىقلىسا
بولىدۇ. بىر تەرەپتىن باسقاندا بېغىشنى بىر تەرەپتىن ئىچىگە ئايلاندۇ-
رۇش كېرەك. شۇنداق قىلغاندا داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى بو-
لىدۇ، شۇنداقلا كېسەللىك ئەھۋالىنى مۇقىملاشتۇرغىلى ھەم بىئاراملىقنى
تۈگەتكىلى بولىدۇ.

چې مېن پەللىسى قان ئايلىنىش ناچارلىشىشنى تەڭشەش رولىغا
ئىگە. شۇڭا، يۈرەك ئىقتىدارى تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىش قاتارلىق كې-

سەللىكلەرگە نىسبەتەن ئويلاپ يەتمىگەن ئۈنۈمى بار. ئۈنىڭدىن باشقا، سەۋەبلەردىن بولغان قان ئايلىنىش نورمالسىزلىقىمۇ ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى، مەسىلەن: باشقىلار بىلەن جىدەللىشىپ قالغاندا، دائىم ئادەمنىڭ يۈزى قىزىرىپ، بويىنى يوغاناپ كېتىدۇ ياكى بەزى كۆڭۈلنى غەش قىلىدىغان ئىشلار تۈپەيلى جۇدۇنى تۇتقاندا، قان يۇقىرىغا ئېتىلىپ چىقىدۇ. قاندىن سىزىم بولىدۇ، ئەمەلىيەتتە بۇ چاغدا چوڭ مېڭىگە كۆپ مىقداردا قان كىرگۈزۈلىدۇ. بۇ چاغدا چېمپىن پەللىسىنى ئۇۋۇلسا چېمپىن پەللىسى بۇ خىل ئەھۋالنى تەڭشەيدۇ.

يۈرەك سېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يەنە بىر سەۋەب سەپرا مىجەزدۇر. سەپرا مىجەزلىك كىشىلەر ئۆزىنىڭ تومۇرىغا نىسبەتەن ھەددىدىن زىيادە سەزگۈر بولغاچقا، ئاسانلا يۈرەك سېلىش پەيدا بولىدۇ. يۈرەك ۋە قان تومۇرلار ئۆزىنى تىزگىنلەيدىغان نېرۋىلارنىڭ تىزگىنلىشىدە بولىدۇ، ئەمما ئەگەر نېرۋىسى ھەددىدىن زىيادە سەزگۈر بولسا ھەممەي ئۆزىنىڭ يۈرىكىدىن ئەندىشە قىلىپ، ئۆزىمۇ چۈشەلمىگەن ھالدا نېرۋا جىددىيلىك پەيدا بولىدۇ، ئۆزىنى تىزگىنلەيدىغان نېرۋا سىستېمىسىمۇ جىددىيلىشىپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۈرەك سوقۇش ۋە قان تومۇر تارىيىش تېزلىشىپ، نورمالسىز ئەھۋاللار پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىك ئادەتتە «ئۆزىنى تىزگىنلەيدىغان نېرۋا بۇزۇلۇش كېسەلى» دەپ ئاتىلىدۇ. ھازىر سىز چېمپىن پەللىسىنىڭ قىزىقارلىق يېرىنى بىلىۋالدىڭىز. بۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىڭىزنىڭ يۈرىكىدىن بەك ئەندىشە قىلىشىڭىزنىڭمۇ ھاجىتى قالمايدۇ. بىئاراملىق ھېس قىلىشىڭىزلا چېمپىن پەللىسىنى غىدىقلىشىڭىز بولىدۇ.

پوتى ئوۋۇلاپ كېسەل ماۋالاش



ئىككىنچى بۆلۈم بىرىنچى ئومۇمىي بايان

1. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش دېگەن نېمە؟

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش دېگەننى چۈشىنىشلىك قىلىپ ئېيتقاندا، ئۇ پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاشنىڭ بىر تۈر-لۈك ئۇسۇلى. يەنى، پۇت قىسمىدىكى بەزى ئالاھىدە رايونلارنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق ساغلاملىقنى ساقلاش ۋە داۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشىش دېگەن-لىكتۇر. بۇ ئالاھىدە رايونلارنى بىز ئومۇملاشتۇرۇپ «رېفلىكس رايونى» دەپ ئاتايمىز.

ھەر بىر رېفلىكس رايونى ئادەم بەدىنىنىڭ ھەر بىر ئىچكى ئەزاسى بىلەن ماس كەلگەن بولىدۇ. ھەر بىر ئىچكى ئەزا كېسەللىك ئۆزگىرىش بولغاندا ياكى پائالىيىتى نورمال بولمىغاندا، پۇت قىسمىنىڭ شۇ ئىچكى ئەزاغا ماس بولغان رېفلىكس (قايتۇرۇش) رايونىدا بېسىش، ئاغرىشقا سەزگۈرلۈك پەيدا بولىدۇ ياكى رەڭگى ۋە سىرتقى قىياپىتىدە ئۆزگىرىش بولىدۇ ۋە ياكى باشقا كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. مۇنداقچە ئېيت-قاندا، بىزنىڭ ئىككى پۇتىمىزدا، پۈتۈن بەدىنىمىزنىڭ ئۇچۇرلىرى ساق-لانغان بولىدۇ. ئۇ خۇددى ئادەم بەدىنىنىڭ بىر ئەڭ «تاۋۋالقى سىگنال بىر-رىش سىستېمىسى» گە ئوخشاش دائىم ئۆزىنىڭ ئالاھىدە «تىلى» ئار-قىلىق بىزگە ئۆز تېنىمىزنىڭ قايسى قىسمىدا مەسىلە بارلىقىنى ئېيتىپ بېرىپ، بىزنىڭ كېسەللىكلەرنى سېزىش ۋە ئۇنىڭغا دىئاگنوز قويۇشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ. يەنە بىر جەھەتتىن، بىزنىڭ ئىككى پۇتىمىز خۇددى بىر داۋالاش ماشىنىسىنىڭ چىقىرىش قىسمىغا ئوخشاش بولۇپ، بىز پۇتنىڭ مەلۇم بىر رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغىنىمىزدا، ئۇۋۇلاشتىن ھاسىل بولغان

كۈچلۈك غىدىقلاش نېرۋىنىڭ ئەكس قايتۇرۇش رولى ئارقىلىق مۇشۇ رېفلىكس رايونىغا ماس بولغان ئىچكى ئەزالارنىڭ رولىنى تەڭشەپ، تەڭپۇڭسىزلىقنى تەڭپۇڭلاشتۇرىدۇ، نورمالسىزلىقنى نورماللاشتۇرىدۇ. شۇ ئارقىلىق، ساغلاملىقنى ساقلاش ۋە كېسەلنى داۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. مەسىلەن: پۈتۈننىڭ باش بارمىقى بېشىمىز (چوڭ مېڭىمىز) نىڭ رېفلىكس رايونى بولغان بولىدۇ. بۇ رېفلىكس رايوننىڭ تېرىسىنىڭ رەڭگىدە نورمالسىزلىق كۆرۈلۈپ، نورمال بولغان ئاق رەڭگىدە بولماي، بەلكى قېنىق سۆسۈن ياكى قارا سۆسۈن رەڭدە بولۇپ قالسا، بۇ بىزگە ئۇنىڭغا ماس ئەزا - مېڭە قان تومۇرلىرىدا مەسىلە بارلىقىنى ئېيتىپ بېرىدۇ. بۇ - مېڭە سەكتىسى ئاسارىتى بولۇشى مۇمكىن. مېڭە قاناش ياكى مېڭە قان ئۆكچىسى شەكىللىنىشنىڭ ئالامىتى بولۇشىمۇ مۇمكىن. ئەگەر يەنە يۇقىرى قان بېسىم ياكى قاننىڭ ماي تەركىبىي ئۆرلەپ كېتىش قان تارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، ئۆز ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا بېرىپ تەكشۈرتۈپ تاسادىپىي ئىش يۈز بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. ئەگەر بىز بۇ رېفلىكس رايونىنى داۋاملىق ئۇۋۇلاپ بەرسەك، مېڭە قان تومۇرلىرىنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىلاپ، مېڭە قان تومۇرلىرىدا كېسەللىك ئۆزگىرىشى بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ياردىمى بولىدۇ، ھەمدە بۇنىڭغا ماسلاشتۇرۇپ مېڭە سەكتىسى ئاسارەتلىرىنى داۋالاشقا بولىدۇ. يەنە مەسىلەن: ئۆتكۈر خاراكتېرلىك بەل چىم بولۇش ياكى سوزۇلما خاراكتېرلىك بەل ئاغرىقى كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغۇچىلارنىڭ پۇت قىسمىدىكى بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونى بېسىلىپ ئاغرىشقا بەك سەزگۈر كېلىدۇ. بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلاپ بەرسە، بەل ئاغرىقى كۆرۈنەرلىك يېنىكلەيدۇ. ئەگەر ئۆتكۈر خاراكتېرلىك بەل چىم بولغان بولسا، ئادەتتە كېسەللىك تۈپ يىلتىزىدىن ساقىيىدۇ. ئۈنۈمى ناھايىتى تېز كۆرۈلىدۇ. سوزۇلما خاراكتېرلىك بەل ئاغرىقى بولسا، كۆپ قېتىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە ئاندىن تۈپتىن ساقايىتقىلى بولىدۇ.

2. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنىڭ ئۈنۈمى

قەدىمكىلەردە: «باش ئاغرىسا باشنى، پۇت ئاغرىسا پۇتنى داۋالاش لا-زىم» دېگەن تەمسىل بار. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغ-لاملاشتۇرۇشقا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئىككى پۇتىمىزدا پۈتۈن بەدىنىمىز-نىڭ ھەر قايسى ئىچكى ئەزالىرىغا ماس بولغان رېفلىكس رايونلىرى بول-غاچقا، مەيلى باش، پۇت، بەل ئاغرىش بولسۇن ياكى باشقا ئەزالاردىكى مەسىلىلەر بولسۇن، ھەممىسىگە «پۇتنى داۋالاش ئۇسۇلى» يەنى، پۇت قىسمىدىكى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ.

نېمىشقا پۇت قىسمى ئۇۋۇلانسىلا پۈتۈن بەدەنگە تەسىر كۆرسىتەلەيدۇ؟ پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاشنىڭ پۈتۈن بەدەنگە بولغان تەسىرى ئاساس-لىق تۆۋەندىكى بىر نەچچە جەھەتلەردە ئىپادىلىنىدۇ:

1) قان ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

ئىككى پۇت، پۈتۈن بەدەننىڭ ئەڭ تۆۋەن تەرىپىگە جايلاشقان بو-لۇپ، يۈرەك بىلەن ئارىلىقى ئەڭ يىراق، مىكرو قان ئايلىنىشتا ناھايىتى ئاسانلا توسالغۇ پەيدا بولۇپ، قان بىلەن تەمىنلەش يېتەرلىك بولماسلىق، ۋىنا قان تومۇرلىرىدىكى قاننىڭ قايتىشى راۋان بولماسلىق تۈپەيلىدىن، مېتابولىزم داۋامىدىكى بەزى كېرەكسىز ماددىلار پۇت قىسمىغا توپلىنىپ، مەلۇم زەھەرلىك ماددىلارنى پەيدا قىلىپ، بەدەننىڭ ھەر قايسى بوغۇم ۋە ئەزالىرىغا دەخلى يەتكۈزۈپ، رېماتىزمنى ۋە بىر قىسىم ئەزالارنىڭ كې-سەللىك ئۆزگىرىشلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلىساق، پۇت قىسمىنىڭ قان ئايلىنىشى راۋانلاشتۇرۇپ، پۇت قىس-مىغا يىغىلىپ قالغان ماددىلارنى بۆرەكنىڭ بىر تەرەپ قىلىپ، بەدەن سىرتىغا چىقىرىشىغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن يۈرەكتىن ئەڭ

يىراقتا تۇرغان ئىككى پۇتنىڭ قان ئايلىنىشىمۇ ياخشى ھالەتنى ساقلىيالايدۇ.

2) ھەر قايسى ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەيدۇ

پۇت قىسمى رېڧلېكس رايونىغا قىلىنغان ئۇۋۇلاش نېرۋىنىڭ رېڧ-
لېكس رولى ئارقىلىق، ماس بولغان ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى
تەڭشەپ، قالايمىقانلىشىپ تەڭپۇڭلۇقىنى يوقاتقان ئىچكى ئەزالارنىڭ
ئىقتىدارىنى نورماللاشتۇرىدۇ، مەسىلەن: بىز پۇت قىسمىدىكى يۈرەك
رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلساق، يۈرەكنىڭ ئىقتىدارىنى ياخشىلايدۇ. يۈرەك
ھەرىكىتى ھەددىدىن ئارتۇق تېزلىشىپ كەتكەن ياكى ئاستىلاپ كەتكەن ۋە
يۈرەك رېتىمى قالايمىقانلاشقانلارنىڭ پۇتىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق، يۈرەك
رېتىمىنى نورماللاشتۇرغىلى بولىدۇ. دورا ئىشلەتكەنگە قارىغاندا بۇ تې-
خىمۇ بىخەتەر ۋە ئىشەنچلىك.

3) ئىچكى ئاجرىتىش سىستېمىسىنى كۈچەيتىدۇ

پۇت قىسمىدىكى ھەر قايسى بەز رېڧلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ
غىدىقلاش، ھەر قايسى ئىچكى ئاجراتما بەزلەرنىڭ ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك
كۈچەيتىدۇ. ئىچكى ئاجراتما بەزلەر ئاجرىتىپ چىقارغان ھورمونلار قان
ئايلىنىش بىلەن ئادەم بەدىنىنىڭ ھەر قايسى قىسىملىرىغا يېتىپ بارال-
غاچقا، پۈتۈن بەدەن ھالىتىگە كەڭ ۋە ئۇزاققىچە تەسىر كۆرسىتەلەيدۇ،
مەسىلەن: پۇت قىسمىدىكى مېڭە ئاستى بېزى (ھىپوفىز) رېڧلېكس را-
يونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلاش مېڭە ئاستى بېزىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ،
مېڭە ئاستى بېزى ئۆستۈرۈش ھورمونى ئاجرىتىپ چىقىرىلغاچقا، مۇس-
كۇلنىڭ ئۆسۈشىگە تۈرتكە بولالايدۇ، ھەمدە باشقا ئىچكى ئاجراتما بەز-
لەرنىڭ ئادەم بەدىنىنىڭ ئىقتىدارىغا مۇھىم تەسىر كۆرسىتىدىغان خىل-
مۇ - خىل ھورمونلارنى ئاجرىتىپ چىقىرىشقا تۈرتكە بولىدۇ. مېڭە ئاستى
بېزى رېڧلېكس رايونىنى داۋاملىق ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ئادەم بەدىنىنىڭ
سالامەتلىكىنى ساقلاشقا، بولۇپمۇ ياش - ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىل-
شىگە ياخشى رول ئوينايدۇ.

4) ئادەم بەدىنىنىڭ ئۆز - ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىش ئىقتىدارىنى

ئۆستۈرىدۇ

پۇت قىسمىدىكى تال رېفلىكس رايونى ۋە لىمفا سىستېمىسى رېف - لېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلاش، ئادەم بەدىنىنىڭ ئىممۇنىت (كې - سەلگە قارشى كۈچى) ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ. ئادەم بەدىنىنىڭ ئەسلىدىنلا مەلۇم ئۆز - ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىش ئىقتىدارى بولىدۇ. بىراق، ئەگەر ئىممۇنىت سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارىدا نوقسان كۆرۈلسە، بەدىنىنىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى ئاجىزلىشىپ، ئاسانلا كېسەل بولىدۇ. پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلغاندا ئىممۇنىت ئىقتىدارى تۆۋەنلىگەن ياكى ھالەت ئۆزگىرىش كېسىلى، مەسىلەن: زىققا، زىيادە سەزگۈرلۈك بۇرۇن ياللۇغى، يەل تاشما قاتارلىقلارغا نىسبەتەن ياخشى داۋالاش ئۈنۈمى بولىدۇ.

5) جىددىيلىشىشنى تۈگىتىپ، خاتىرجەملىكنى ئەسلىگە

كەلتۈرىدۇ

بىر نەچچە ئون مىنوتلۇق پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش، ئۇۋۇلانغۇچىنى جىددىيلىشىشتىن ياكى كېسەل ئازابىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، خاتىرجەم دەم ئېلىش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئۇۋۇلغاندىن كېيىن ئادەتتە ئۇيقۇسى ياخشى بولىدۇ. ئىشتىھاسى ئېچىلىدۇ. چوڭ - كىچىك تەرىتى راۋانلىشىدۇ، نۇرغۇن كېسەللىك ئالامەتلىرى ئازىيىدۇ. روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىكى ئازابى يېنىكلىەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن كىشىنىڭ روھىي كۈتۈ - رۇلۇپ، ئۆزىنى ھەر جەھەتتىن ياخشى سېزىدىغان بولىدۇ، پۈتۈن بەدىنى يېنىكلىەپ، سالامەتلىكىنى ساقلاش ياكى دەم ئېلىپ داۋالانىشقا ياردىمى بولىدۇ.


3. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇ -

رۇشنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى ھالىتى

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ھەم قەدىمكى ھەم ھازىرقى ياش پەن. قەدىمكى دېيىشىمىزدىكى سەۋەب، بۇ پەن

قەدىمكى زاماندىكى پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش تېخنىكىسىدىن ئۆزگىرىپ كەلگەن. سىماچىيەن يازغان «تارىخىي خاتىرىلەر» دېگەن كىتابتا: «قەدىمكى زاماندا كېسەلنى پۇت ئارقىلىق داۋالىغان، دورا قاينىتىپ داۋالىماي، يىگنە سانجىپ، ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كېسەلنى ساقايتقان»... دەپ تىلغا ئالغان. ئاڭلاشلارغا قارىغاندا مىسىردىكى ئېھرام ئىچىدە تام رەسىملىرى بايقالغان. بۇ رەسىملەردە مىلادىيىدىن بۇرۇنقى 2500 يىل، يەنى ھازىرقىدىن 4500 يىل ئىلگىرىلا، مىسىردا قول ۋە پۇتنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كېسەلنى داۋالىغانلىقى ئىسپاتلانغان. بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلى مىسىردىن ياۋروپاغا تارقىلىپ، يېقىنقى زامانغىچە داۋاملىشىپ كەلگەن. بۇنىڭدىن باشقا، ھىندىستاندىمۇ بۇ ھەقتە ئوخشاپ كېتىدىغان خاتىرىلەر ساقلانغان. قارىغاندا، پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش تېخنىكىسى ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىدىن كەلگەن، ئىنسانىيەتنىڭ قەدىمكى مەدەنىيىتىنىڭ بۆشۈكى بولغان جاپلار (جۈڭگو، مىسىر، ھىندىستان قاتارلىق) دا ئۇنىڭ ئىزلىرىنى تاپقىنىلى بولىدۇ.

مۇشۇ ئەسىرنىڭ باشلىرىغا كەلگەندە، ياۋرۇپا، ئامېرىكا دوختۇرلىرى ھازىرقى زامان ئىلىم - پېنى ئارقىلىق بۇ خىل قەدىمدىن تارقىلىپ كەلگەن پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش تېخنىكىسىنى رەتلەپ ۋە تەتقىق قىلىپ، تەدرىجىي ھالدا ئۇنى مۇستەقىل بىر پەن قىلىپ تەرەققىي قىلدۇردى. ئۇلار بۇ پەننى نېرۋا رېفلىكس نەزەرىيىسى ئاساسىغا قۇرۇپ، ئۇنىڭغا «رېفلىكس ئىلمى» دەپ نام بەردى. يېقىنقى يىللاردىن بېرى، غەرب دۆلەتلىرى خىمىيىلىك بىرىكمە دورىلارغا ئادەتتىن تاشقىرى يۇلۇنۇۋېلىشنىڭ نوقسانلىرىنى كۈندىن - كۈنگە تونۇپ يەتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئەيدىز كېسەللىكىنىڭ ئەشەددىيلىشىشى، ھەر خىل تىبابەت خاراكتېرىدىكى كېسەللىكلەر ۋە دورا مەنبەلىك كېسەللىكلەر نىسبىتىنىڭ ئۆرلىشى تەدرىجىي ھالدا كېشىلەرنى مەلۇم ئورۇننى ياشىدىغان داۋالاش ئۇسۇلى ياكى تولۇقلىما داۋالاش ئۇسۇلى ئۈستىدە، بولۇپمۇ خىمىيىلىك بىرىكمە دورىلارنى ئىشلەتمەيدىغان ۋە يارا پەيدا قىلمايدىغان تەبىئىي داۋالاش ئۇسۇلى ئۈستىدە ئىزدەندۈردى. بۇنداق ۋەزىيەتتە پۇت قىسمى رېفلىكس ئىلمىنى




1- رەسىم. مىسىر ئېھرامىدا ساقلانغان پۈت - قول ئۇزۇلاشقا ئائىت تام رەسىم.

تەتقىق قىلىش ۋە ئۇنى ئىشلىتىش بارغانسېرى كىشىلەرنىڭ دىققەت ئېتىبارىنى قوزغىدى. ئەنئەنىۋى داۋالاش ئۇسۇلى بىلەن زامانىۋى مېدىتسىنا ئىلمى بىرلەشتۈرۈلسە، پۇت قىسمى رېفلىكس ئىلمى چوقۇم ئىنتايىن كەڭ ئىستىقبالغا ئىگە بولىدۇ. شۇڭا، بىز ئۇنى بىر ياش پەن دەپمىز. ئېلىمىزدە قەدىمدىلا بار بولغان پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش تېخنىكىسى ئۆتمۈشتىكى فېئودال ئەكسىيەتچىلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى تۈپەيلىدىن ئاساسەن ئوتتۇرلۇپ كەتكەن. ئىسلاھات - ئېچىۋېتىش مابەينىدە، ئاندىن چەت ئەللەردىن تەدبىرىجىي قايتا تارقىلىپ كىرگەن، ئۇ غەرب پەنلىرىنىڭ يېڭىلىنىشىگە ئەگىشىپ يېڭىلانغان. شۇنداقلا ئېلىمىزنىڭ دۆلەت ئەھۋالىغا بەكمۇ باب كېلىدۇ. شۇڭا، قىسقىغىنا بىر نەچچە يىلدىلا ناھايىتى زور تەرەققىياتلارغا ئېرىشتى. ئېلىمىز سەھىيە ۋە خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقلىرىنىڭ تەستىقلىشى ئارقىلىق، مەملىكەت خاراكتېرلىك تەشكىلات - جۇڭگو پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش تەتقىقات جەمئىيىتى 1991 - يىلى 7 - ئايدا قۇرۇلدى. ھازىرغىچە بولغان 10 يىل مابەينىدە، تەتقىقات جەمئىيىتى 108 قارار تەرىپىلەش كۇرسى ئېچىپ، 10 مىڭدىن ئارتۇق جەمئىيەت ئەزالىرىنى تەربىيەلەپ چىقتى. تەتقىقات جەمئىيىتىنىڭ ئەزالىرى پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ئارقالدى. بىز ئىشىنىمىزكى، جەمئىيەتتىكى ھەر قايسى ساھەلەرنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا جۇڭگو پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش تەتقىقات جەمئىيىتىنىڭ خىزمەتلىرى چوقۇم ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ، پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش تېخنىكىسىدىن ئىبارەت جۇڭخۇا تېبابەتچىلىك ئىلىمىنىڭ قىممەتلىك مىراسىنى كەڭ تۈردە جارى قىلدۇرۇپ، ئۇنى مىڭلىغان ئائىلىلەرگە كىرگۈزۈپ، ئېلىمىزنىڭ ساغلاملىق سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش، ئىنسانىيەتكە بەخت يارىتىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تېگىشلىك تۆھپىسىنى قوشىدۇ.

ئىككىنچى پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونى ۋە ئۇۋۇلاش ماھارىتى

1. پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونلىرىنىڭ ئورنى ۋە ئورۇنلىشىش قانۇنىيىتى



2 - رەسىم.

ھەممىگە باب كېلىدىغان رېفلىپكس را-
يونى 60 نەچچە بولۇپ، بۇ رېفلىپكس رايونلىرى
مۇھىم ئىچكى ئەزالارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونلىرى ئارقىلىق
ساغلاملاشتۇرۇشنى ئىگىلەش ئۈچۈن، ئالدى
بىلەن بۇ رېفلىپكس رايونلىرىنىڭ ئورنىنى
بېكىتىش ۋە ئۇۋۇلاش ماھارىتىنى بىلىۋېلىش
لازم.

پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونلىرىنىڭ
ئورۇنلىشىشى مەلۇم قانۇنىيەتكە ئىگە. تۆۋەن-
دىكى رەسىم بىزنىڭ ئەستە تۇتۇۋېلىشىمىزغا


ياردەم بېرىدۇ (2 - ، 3 - ، 4 - رەسىمگە قاراڭ). رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك
ئىككى پۇتنى بىر يەرگە جۈپلىساق، ئولتۇرغان ئادەم شەكلىگە ئوخشايدۇ.
رېفلىپكس رايونلىرىنىڭ ئورۇنلىشىش قانۇنىيىتى:

1) سول پۇت بەدەننىڭ سول يېرىم قىسمىغا، ئوڭ پۇت ئوڭ
يېرىم قىسمىغا ماس كېلىدۇ


بۇنداق دېگەنلىك، ئادەم بەدەننىڭ مەركىزىي سىزىقىنىڭ سول
تەرىپىگە جايلاشقان ئەزالار (يۈرەك، ئال) نىڭ رېفلىپكس رايونلىرى سول
پۇتتا بولىدۇ. مەركىزىي سىزىقىنىڭ ئوڭ تەرىپىگە جايلاشقان ئەزالار (ئۆت،

جىگەر، سازاڭسىمان ئۆسۈك) لەرنىڭ رېفلىپكىس رايونلىرى ئوڭ پۇتتا بو-
 لىدۇ. دەل مەركىزىي سىزىق ئۈستىگە جايلاشقان ئەزالار (ئاشقازان، ئاش-
 قازان ئاستى بەزى، 12 بارماق ئۈچەي، دوۋساق قاتارلىقلار) ئوڭ، سول تە-
 رەپتە تەڭ بولغاچقا، ئۇلارنىڭ ئوڭ ۋە سول پۇتنىڭ ھەر ئىككىلىسىدە
 رېفلىپكىس رايونلىرى بولىدۇ. مەركىزىي سىزىقنىڭ ھەر ئىككى تەرەپىدە
 بولغان ئەزالار (ئوڭ، سول ئۆپكە، ئوڭ، سول بۆرەك) نىڭ تەبىئىيىكى ئوڭ
 ۋە سول پۇتنىڭ ھەر ئىككىلىسىدە بىردىن رېفلىپكىس رايونلىرى بولىدۇ.
 بىراق، ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك بىر نوقتىدا باركى، ئادەم نېر-
 ۋىسى بويۇندا «ئومۇرتقىلارنىڭ ئۆزئارا گىرەلىشىشى» نى شەكىللەندۈر-
 ۋەتەنچە، بەدەننىڭ سول يېرىم تەرەپىدىكى نېرۋىلار ئوڭ مېڭە بىلەن مۇ-
 ناسىۋەتلىك بولىدۇ. بەدەننىڭ ئوڭ يېرىم تەرەپىدىكى نېرۋىلار سول مېڭە
 بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. شۇڭا، باشنىڭ ئوڭ تەرەپىدىكى ھەر قايسى
 ئەزالارنىڭ رېفلىپكىس رايونلىرى سول پۇتتا، باشنىڭ سول تەرەپىدىكى
 ھەر قايسى ئەزالارنىڭ رېفلىپكىس رايونلىرى ئوڭ پۇتتا بولىدۇ. مەسىلەن:
 ئادەمنىڭ كۆزى ئادەم بەدىنى مەركىزىي سىزىقنىڭ يان تەرەپىدە بول-
 غاچقا، سول كۆزنىڭ رېفلىپكىس رايونى ئوڭ پۇتنىڭ 2 - ، 3 - بارمىقىدا،
 ئوڭ كۆزنىڭ رېفلىپكىس رايونى سول پۇتنىڭ 2 - ، 3 - بارمىقىدا بولىدۇ.
 قۇلاق ئادەم بەدىنىنىڭ مەركىزىي سىزىقىغا ئەڭ سىرتىغا جايلاشقان بول-
 غاچقا، سول قۇلاقنىڭ رېفلىپكىس رايونى ئوڭ پۇتنىڭ 4 - ، 5 - بارمىقىدا،
 ئوڭ قۇلاقنىڭ رېفلىپكىس رايونى سول پۇتنىڭ 4 - ، 5 - بارمىقىدا بولىدۇ.
 2) باش پۇت بارماقلىرىغا، كۆكرەك تاپاننىڭ ئالدىنقى يېرىم-
 مىغا، قورساق تاپاننىڭ ئوتتۇرىسىغا، داس بوشلۇقى ئۆكچىگە ماس
 كېلىدۇ

باش قىسمىدىكى ھەر قايسى ئەزالارنىڭ رېفلىپكىس رايونلىرىنىڭ
 ھەممىسى پۇتنىڭ بارماقلىرىدا بولىدۇ. پېشانىسىنىڭ رېفلىپكىس رايونى
 ھەر قايسى پۇت بارماقلىرىنىڭ ئۈچىدا بولىدۇ. ئالدىدا ئوتتۇرىغا قويۇپ
 ئۆتكەن كۆز، قۇلاقتىن باشقا باش قىسمىدىكى ئەزالار (چوڭ مېڭە، مېڭە
 ئاستى بەزى، كىچىك مېڭە، مېڭە غولى، ئۈچ ئاچىماق نېرۋا ۋە بۇرۇن



3 - رەسىم.



ئوڭ پۇت

سول پۇت

4 - رەسىم.

قاتارلىقلار) نىڭ رېفلىپىكس رايونلىرىنىڭ ھەممىسى پۇتنىڭ باش بارمى - قىدا بولىدۇ. بويۇننىڭ رېفلىپىكس رايونى پۇت باش بارمىنىڭ تېگىدە بولىدۇ. باشنىڭ سول قىسمىدىكى ئەزالارنىڭ رېفلىپىكس رايونلىرى ئوڭ پۇتتا، باشنىڭ ئوڭ قىسمىدىكى ئەزالارنىڭ رېفلىپىكس رايونلىرى سول پۇتتا بولىدۇ. كۆكرەك قىسمىدىكى ھەر قايسى ئەزالارنىڭ رېفلىپىكس رايونلىرى تاپاننىڭ ئالدىنقى يېرىم قىسمىدا (ئۆپكە سول قانتىنىڭ رېفلىپىكس را- يونى سول پۇتتا، ئوڭ قانتىنىڭ رېفلىپىكس رايونى ئوڭ پۇتتا، يۈرەكنىڭ رېفلىپىكس رايونى سول پۇتتا) بولىدۇ. قورساق قىسمىدىكى ھەر قايسى ئەزالارنىڭ رېفلىپىكس رايونلىرى تاپاننىڭ ئوتتۇرىسىدا بولىدۇ. دەل مەر- كىزى سىزىققا جايلاشقان ئاشقازان، ئاشقازان ئاستى بېزى، 12 بارماق ئۈ- چەي، ئىنچىكە ئۈچەي قاتارلىق ئەزالارنىڭ ئوڭ، سول پۇتنىڭ ھەر ئىككىسىدە رېفلىپىكس رايونلىرى بولىدۇ. لېكىن سول بۆرەك ۋە تالنىڭ رېفلىپىكس رايونلىرى سول پۇتتا، ئوڭ بۆرەك ۋە جىگەر، ئۇنىڭ رېفلىپىكس رايونلىرى ئوڭ پۇتتا بولىدۇ. داس بوشلۇقىدىكى ھەر قايسى ئەزالارنىڭ رېفلىپىكس رايونلىرى ئۆكچىدە بو- لىدۇ. بۇ جىنسىي ئەزالار (بالىياتقۇ، تۇخۇمدان، ئۇرۇقدان، مەزى بېزى) دوۋساق، سۈيدۈك يولى (جىنسىي يول، مەقئەت) قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

3) پۇتلارنىڭ ئىچكى يان تەرىپى ئادەم بەدىنىنىڭ مەركىزىي سىزىقىغا ماس كېلىدۇ، يەنى ئادەم بەدىنىنىڭ ئومۇرتقىسى
شۇڭا، بويۇن، كۆكرەك، بەل، توققۇز كۆز ئومۇرتقىلىرىنىڭ رېف- لېپىكس رايونلىرى ئىككى پۇتنىڭ ئىچكى يان تەرىپىدە بولىدۇ. پۇتنىڭ سىرتقى يان تەرىپى ئادەم تېنىنىڭ سىرتقى يان تەرىپى بىلەن ماس. شۇڭا، يۇقىرىدىن تۆۋەنگە مۇرە، جەينەك، تىز قاتارلىقلارنىڭ رېفلىپىكس رايونلىرى شۇ يەردە بولىدۇ.

(4) پۇتنىڭ دۇمبىسى ئادەم تېنىنىڭ ئالدى يۈزىگە ماس كېلىدۇ
 ئۇنىڭدا بۇرۇن، ئۈستۈنكى ئېگەك، ئاستىنقى ئېگەك، بادام بەز،
 كاناي، قىزىلئۆڭگەچ، كۆكرەك (ئەمچەك)، قورساق پەردىسى قاتارلىق ئە-
 زالارنىڭ رېفلىكس رايونى بولىدۇ.
 يۇقىرىقى بىر قانچە قانۇنىيەت ئىگىلىۋېلىنسا، رېفلىكس رايونلى-
 رىغا نىسبەتەن كۆڭۈلدە سان شەكىللىنىدۇ. بىر مەزگىللىك ئەمەلىيەت
 داۋامىدا ئۇنى تولۇق ئەستە تۇتقىلى بولىدۇ.

2. ئۇۋۇلاش تەرتىپى

ئاساسەن تۆۋەندىكى تۆت جۈملە سۆز بۇيىچە بولىدۇ: سولدىن ئوڭغا؛
 يۇقىرىدىن تۆۋەنگە؛ ئىچىدىن سىرتىغا؛ پۇت ئاستىدىن دۇمبىسىگە قارىتا
 ئۇۋۇلىنىدۇ.

سولدىن ئوڭغا: بۇ دېگەنلىك ئالدى بىلەن سول پۇتنى ئۇۋۇلىغاندا -
 دىن كېيىن ئاندىن ئوڭ پۇتنى ئۇۋۇلاش - دېگەنلىك. چۈنكى سول پۇتتا
 يۈرەك، تال قاتارلىق مۇھىم ئەزالارنىڭ رېفلىكس رايونلىرى بار، بولۇپمۇ
 يۈرەك. چۈنكى، ئېغىر يۈرەك كېسىلى بارلار كۈچلۈك ئۇۋۇلاپ غىدىقلاشنى
 كۆتۈرەلمەيدۇ. شۇڭا، بىز سول پۇتتىكى يۈرەك رېفلىكس رايونىنى دەس-
 لەپتە يېنىك، تەدرىجىي كۈچەيتىپ، ئاستا - ئاستا ئۇۋۇلاش كۈچىنى
 ئاشۇرۇپ، يۈرەكنىڭ بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىغا قارىساق، ئەگەر يېنىك
 ئۇۋۇلاپ غىدىقلاشقىمۇ بەرداشلىق بېرەلمىسە، تاسادىپىي ھادىسىدىن
 ساقلىنىش ئۈچۈن، باشقا رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشتا يېنىك ئۇۋۇ-
 لاش لازىم. تال - مۇھىم ئىممۇنىت ئەزا، ئەگەر تالنىڭ رېفلىكس رايونىنى
 ئۇۋۇلىغاندا كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، بۇ ئادەتتە بىزگە بەدەننىڭ
 باشقا ئەزالىرىدا مەلۇم مەسىلە بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇنداق ئەھ-
 ۋالدا باشقا رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندا، دىققەت قىلىشىمىزغا توغرا
 كېلىدۇ.

يۇقىرىدىن تۆۋەنگە: يەنى باش قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇ-
ۋۇلاشتىن باشلاپ، كۆكرەك، قورساق قىسمىنى، ئاندىن داس بوشلۇقى
رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش لازىم. يەنى ئالدى بىلەن پۇت بارماقلىرى-
رىنى (ئالدى بىلەن باش بارماقنى، كېيىن قالغان تۆت بارماقنى)، ئاندىن
كېيىن تاپاننىڭ ئالدىنقى يېرىمىنى، ئوتتۇرا قىسمىنى، ئەڭ ئاخىرىدا
ئۆكچىنى ئۇۋۇلاش لازىم.

ئىچىدىن سىرتقا، پۇت ئاستىدىن دۈمبىسىگە: بۇ ئالدى بىلەن
تاپاننى، ئاندىن پۇت دۈمبىسىنى ئۇۋۇلاش دېگەنلىك. ئالدى بىلەن پۇتنىڭ
ئىچكى يان تەرىپىنى، كېيىن تاشقى يان تەرىپىنى، ئەڭ ئاخىرىدا پۇت
دۈمبىسىدىكى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش دېگەنلىك.

ئۇۋۇلاش تەرتىپىدە يۇقىرىقى تۆت جۈملە سۆزدىن باشقا، يەنە بىر
جۈملە ئىنتايىن مۇھىم سۆز بار: ئۇ بولسىمۇ چىقىرىش ئۈچ رايونى چىڭ
باغلانغان، باشتا، ئاخىرىدا ئۈچ قېتىمدىن ئۇۋۇلاش دېگەن سۆز. چىقىرىش
بۆرەك، سۈيىدۈك نەيچىسى، دۈۋىساقىتىن ئىبارەت چىقىرىش ئەزالىرىنى
كۆرسىتىدۇ. بۇ ئۈچ ئەزانىڭ رېفلىكس رايونلىرى خۇددى گىر (تەڭپۇڭ-
لۇق ئارقىلىق ئۆلچەيدىغان ئېغىرلىق ئۆلچەش ئەسۋابى) غا ئوخشاش
بىر- بىرىگە چىڭ باغلانغان، ئۇۋۇلاشنى باشلاش - ئاخىرلاشتۇرۇشتا قايتا-
قايتا ئۇۋۇلاش، ھەر قايسىسىنى كەم دېگەندە ئۈچ قېتىمدىن ئۇۋۇلاش
لازم. چۈنكى، پۇت قىسمى ئۇۋۇلانسا، قان ئايلىنىشى راۋانلاشتۇرۇپ،
پۇتتا ۋە پۈتۈن بەدەندە ساقلىنىپ قالغان مېتابولىزم داۋامىدىكى كېرەك-
سىز، زىيانلىق ماددىلارنى سۈيىدۈك ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن
بۆرەككە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. شۇڭا، چىقىرىش ئەزالىرىنىڭ رېفلىكس را-
يونلىرىنى كۆپرەك ئۇۋۇلاش ئارقىلىق چىقىرىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش
زۆرۈر.

خۇلاسلىغاندا، پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاشنىڭ ئاساسىي تەرتىپى
مۇنداق:

ئالدى بىلەن سول پۇتتىكى بۆرەك، سۈيىدۈك نەيچىسى، دۈۋىساق
رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش، ئاندىن تاپان (پۇت بارماقلىرىدىن پۇت

ئۆكچىلىرىغىچە) — پۇتنىڭ ئىچكى يان تەرىپى — پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپى — پۇت دۈمبىسى — بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق رېف-لىپكس رايونلىرى ئۇۋۇلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن يوقىرىقى تەرتىپ بويىچە ئوڭ پۇت ئۇۋۇلىنىدۇ.

يۇقىرىقىلار پەقەت ئومۇمىي جەھەتتىكى تەرتىپتىنلا ئىبارەت. ئالدىدا ئوتتۇرغا قويۇلغان بەزى پرىنسىپلارغا ئەمەل قىلساقلا ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆزى ئادەتلەنگەن ئۇۋۇلاش تەرتىپى بولۇشىغا يول قويۇلىدۇ. ھەممىنى ئوخشاش قىلىش تەلەپ قىلىنمايدۇ. «ئادەت — تەبىئىيلىكنى شەكىللەندۈرىدۇ». پەقەت ئۆزىمىز بىر يۈرۈش ئادەتلەنگەن تەرتىپنى شەكىللەندۈرسەكلا، ئاسان ئۇنتۇلمايمىز، ھەمدە ئۇۋۇلاش داۋامىدا بەزى مۇھىم رېف-لىپكس رايونلىرى ئۇۋۇلانماي قالمايدۇ.

3. پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش ماھارىتى

قول بىلەن ئۇۋۇلغاندا كۈچ بېرىشتە ئادەتتە ئەڭ كۆپ قوللىنىدۇ-غانلىرى:

- (1) باش بارماقنىڭ يۈزى؛
 - (2) باش بارماقنىڭ ئۈچى؛
 - (3) كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئۈچى؛
 - (4) باش بارماقنىڭ 1 — بوغۇم يان تەرىپى؛
 - (5) كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ 1 — بوغۇم ئۈچى؛
- قىسقىسى، ئالدىنقى ئۈچ تۈرلۈكى يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىدە غەدىقلاشقا، كېيىنكى ئىككىسى كۈچلۈك غەدىقلاش ماھارىتىگە كىرىدۇ. ھەر بىر خىل ماھارەتتە يەنە يېنىك، كۈچلۈكلۈك دەرىجىسى ئوخشىمىغان كۈچ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

ماھارەت، كۈچ ئىشلىتىش دەرىجىسىنى قوللىنىشتا، مۇھىمى مەلۇم غەدىقلاش كۈچلۈكلۈك دەرىجىسىگە يېتىش مەقسەت قىلىنىدۇ. غەدىقلاشنىڭ كۈچلۈك ياكى ئاجىز بولۇشىنى كونكرېت ئەھۋاللارغا ئاساسەن

بېكىتىش كېرەك. ھەممىنى ئوخشاش قىلىۋېتىشقا ياكى كۈچلۈك غەدىقلاشنىلا قوغلىشىپ، خاتا ھالدا غەدىقلاش قانچە كۈچلۈك بولسا ئۈنۈمى شۇنچە ياخشى بولىدۇ دەپ قاراشقا بولمايدۇ.

ئالدى بىلەن ئوخشاشمىغان تىپتىكى ئۇۋۇلاشتا، ئوخشاشمىغان غەدىقلاش دەرىجىسىنى قوللىنىش تەلەپ قىلىنىدۇ.

(1 دىئاگنوز قويۇش ئۈچۈن ئۇۋۇلاش: كېسەلنى تەكشۈرۈپ تېپىشنى مەقسەت قىلىپ، كېسەللىك ئىنكاسى بولغان رېفلىكس رايونلىرىنى تېپىپ چىقىش زۆرۈر. شۇڭا، ئاساسىي جەھەتتىن يېنىك ئۇۋۇلاش ماھارىتىنى قوللىنىش لازىم. ئاساسلىقى، باش بارماقنىڭ يۈزى ئارقىلىق (چۈنكى بۇ يەرنىڭ سىزىمچانلىقى ئەڭ سەزگۈر، بىراق تېرە قاتلىمى قېلىنراق جايغا باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بارماق ئوتتۇرىسى بوغۇمىنى ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ) قايتا - قايتا ئىتتىرىپ ئۇۋۇلاپ، رېفلىكس رايونىنىڭ تېرە ئاستىدىكى غەيرىي نورمال ئىپادىسى ئىزدىلىدۇ (كۆپۈك - سىمان، دانچىسىمان، يېپسىمان تۈگۈنچە، ئىششىق قاتارلىق «مۇسبەت رېئاكسىيەلىك ماددىلار»). ئادەتتە، «مۇسبەت ماددىلار» غا تەگكەندە، ئۇۋۇلانغۇچىدا ئېچىشىپ ئاغرىش تۇيغۇسى بولىدۇ. ئۇۋۇلغۇچىنىڭ قولى سەزگەن تۇيغۇ بىلەن ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ ئاغرىش تۇيغۇسىنىڭ ئۆزئارا ئىسپاتلىنىشىنى دىئاگنوز قويۇشتا پايدىلىنىشقا بولىدۇ. ئەگەر دىئاگنوز قويۇش ئۈچۈن ئۇۋۇلغاندا كۈچلۈك ئۇۋۇلاش ماھارىتىنى ئىشلەتكەندە، ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ كۆپ قىسىم رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ھەممىسى قاتتىق ئاغرىيدۇ. بۇنىڭ بىلەن مەسىلەن بار رېفلىكس رايونلىرى بىلەن مەسىلە يوق رېفلىكس رايونلىرىنى پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ.

(2 سالامەتلىكنى ساقلاش ئۈچۈن ئۇۋۇلاش: بۇنىڭدا ئادەتتە ئوتتۇرا دەرىجىدىكى غەدىقلاش ماھارىتىنى قوللانغان تۈزۈك. چۈنكى سالامەتلىكنى ساقلاش ئۈچۈن ئۇۋۇلانغۇچىلارنىڭ كۆپ قىسمى ئوتتۇر ياش، ياشانغانلار ۋە تېنى ئاجىز، كېسەلمەنلەر بولغاچقا، غەدىقلاش بەك كۈچلۈك بولۇپ كەتسە چىدىيالمايدۇ، بەك ئاغرىپ كېتىپ داۋاملاشتۇرۇش تەس بولىدۇ. شۇڭا، ئۆزۈلدۈرمەي داۋاملاشتۇرۇپ، ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ بەدەن

ئىقتىدارىنى تەدبىرىجىي تەكشۈپ ئۇۋۇلسا، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ئۈنۈمنى كۆرسىتىدۇ.

(3) داۋالاش ئۈچۈن ئۇۋۇلاش: بۇنىڭدا، نوقتىلىق رېفلىكس را-
يونلىرىنى كۈچلۈكرەك غىدىقلاش، باشقا رېفلىكس رايونلىرىنى ئوتتۇرا
ھال غىدىقلاش ئۇسۇلىنى قوللانسا بولىدۇ.

**بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئوخشاشمىغان ئوبېيكت، ئوخشاشمىغان
كېسەل، ئوخشاشمىغان رېفلىكس رايونلىرىغا ئوخشاشمىغان ئۇۋۇ-
لاش ماھارىتىنى قوللىنىش لازىم**

پۇت تېرىسى ناھايىتى قېلىن، ئىنكاسى ئاستا بولغانلارغا كۈچلۈك-
رەك ئۇۋۇلاش، ئىنكاسى ناھايىتى سەزگۈر بولغانلارنى يېنىكرەك ئۇۋۇلاش
لازم، بولۇپمۇ يېشى چوڭ، تېنى ئاجىزلار ۋە بالىلارغا يېنىك ئۇۋۇلاش
ماھارىتىنى قوللىنىش لازىم. جىددىي كېسەللەرنى، جۇڭگو تېبابىتىدە
«ئەمەلىي كېسەل» دەپ ئاتىلىدىغانلارنى كۈچلۈكرەك غىدىقلاش، سوزۇلما
كېسەللەر، جۇڭگو تېبابىتىدە «بوشۇرۇن كېسەل» دەپ ئاتىلىدىغان كې-
سەللەرنى ئاجىزراق غىدىقلاش لازىم. بىر كېسەل كىشىگە قارىتا، تېرە
قاتلىمى نېپىزرەك رېفلىكس رايونلىرىنى يېنىكرەك، تېرە قاتلىمى
قېلىنراق رېفلىكس رايونلىرىنى كۈچلۈكرەك ماھارەت بىلەن ئۇۋۇلاش
لازم.

قىسقىسى، ئۇۋۇلاش ماھارىتى ۋە كۈچ ئىشلىتىش دەرىجىسىنى
ئىشلىتىشتە، كۈچلۈكرەك بولۇشقا تېگىشلىكلىرىنى كۈچلۈك، يېنىكرەك
بولۇشقا تېگىشلىكلىرىنى يېنىكرەك ئۇۋۇلاش لازىم. ئاچقۇچلۇق مەسىلە،
نۇرغۇن رېفلىكس رايونلىرى ئىچىدىن مەسىلە بارلىرىنى تېپىپ چىقىپ،
ئاندىن شۇ رېفلىكس رايونىدىكى ئىنكاسى ئەڭ سەزگۈر نوقتىنى تېپىش،
ئۇنى ئۇۋۇلاشتىكى ئاساسىي نوقتا قىلىش، شۇنداق قىلغاندىلا ئەڭ ياخشى
ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. سەزگۈر نوقتىنى ئىزدەشتە يېنىك ئۇۋۇلاش،
تەپسىلى ئىزدەش، سەزگۈر نوقتىنى تاپقاندىن كېيىن، سەزگۈر نوقتىنى
ئۇۋۇلاش، كۈچنى ئاشۇرۇپ قايتا - قايتا ئۇۋۇلاش لازىم.

* ئالدى بىلەن يېنىك، ئاندىن كۈچلۈك ئۇۋۇلاش، ئومۇمىي دائىرىدە
دىن نوقتىنى ئىزدەش، ئاغرىغان جايىنى ئۇۋۇلاپ تېپىپ، ئاز كۈچ بىلەن
كۆپ ئىش قىلىش. بۇ ئۇۋۇلاش ماھارىتىنىڭ يېنىك ياكى كۈچلۈك بو-
لۇشىنى ئىگىلەشتىكى مۇھىم نوقتا.

ئۈچىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى (1)

ھازىر دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئومۇميۈزلۈك قوللىنىۋاتقان پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى تەخمىنەن 60 نەچچە بولۇپ، ئۆگىنىشكە قولايلىق بولۇشى ئۈچۈن رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ئورنى ۋە ئۇۋۇلاش تەرتىپىگە ئاساسەن بۇلارنى سەككىز گۇرۇپپىغا بۆلۈپ، بىر گۇرۇپپا - بىر گۇرۇپپىدىن ئۆگىنىمىز:

I گۇرۇپپا پۇت مەركىزى

بۇ گۇرۇپپا بۆرەك ئۈستى بېزى، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى، بۆرەك، سۈيۈك نەيچىسى، دوۋىساقىتىن ئىبارەت بەش رېفلىكس رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇلار قەدىمدىن ھازىرغىچە، جۇڭگودىن چەت ئەلگىچە مېدىتسىنا ئالىملىرى يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ كەلگەن ئۇۋۇلاش ئورۇنىدۇر. ئېلىمىزنىڭ كۆپلىگەن قەدىمكى زاماندىكى مېدىتسىنا كىتابلىرىنىڭ ھەممىسىدە پۇت مەركىزى يۇڭچۈەن پەللىسى (تاپاننىڭ ئال-دىنقى 3/1 نىڭ مەركىزىدىكى ئويمانلىقتا) نى ئۇۋۇلاش توغرىسىدا خا-تىرىلەر يېزىلغان. رۇڭچۈەن پەللىسى زۇشاۋيىن شىن جىڭلوسىغا (پۇت كىچىك بارمىقىنىڭ ئاستىدىن باشلىنىپ، قىيپاش مېڭىپ، پۇتنىڭ ئىچكى ئارقا يۈزىنى بويلاپ كۆكرەك قىسمىدىكى «شۇفۇ» پەللىسىدە توختاپ «شۈجۈەيىن شىن باۋجىڭ» جىڭلوسى بىلەن تۇتىشىدىغان بىر جىڭلو) تەۋە بولۇپ، تاپاننىڭ مەركىزىگە جايلاشقان. يەنى ھازىرقى زاماندا دېيىلىۋاتقان بۆرەك ئۈستى بېزى، بۆرەك ۋە قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ئورنى بىلەن ئوخشاش. يې-


قىنقى زاماندىكى پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش توغرىسىدىكى ئەسەرلەردە، بەزىلىرىدە ئالدى بىلەن بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋىساقىتىن ئىبارەت ئۈچ رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش لازىم دەپ قارىسا، بەزىلىرىدە ئالدى بىلەن قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېكىشى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش لازىم دەپ قارايدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇلارنىڭ ھەممىسى ئاساسەن ئوخشاش ئورۇنغا جايلاشقان. شۇڭا، بىز بۇ بەش رېفلىكس رايونلىرىنى بىر گۇرۇپپىغا يىغىپ، پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشتىكى ئەڭ ئاۋۋال ئۇۋۇلىنىدغان ئورۇن قىلىمىز.

1. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونى

بۆرەك ئۈستى بېزى بۆرەكنىڭ يۇقىرى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، ئوڭ، سول بۆرەكنىڭ ئىككىلىسىدە بىردىن بولىدۇ. بۆرەك ئۈستى بېزى ناھايىتى مۇھىم ئىچكى ئاجرىتىش بېزى بولۇپ، كۆپ خىل مۇھىم ھورمونلارنى ئاجرىتىپ چىقىدۇ. مەسىلەن: بۆرەك ئۈستى بەز پوستانلاق ماددىسى ئاجرىتىپ چىقىرىدىغان گلو كورتىكوئىد، مىنېرالو كورتىكوئىد، بۆرەك ئۈستى بېزى يىلىك ماددىسى ئىشلەپچىقىرىدىغان ئادرېنالىن، نورئادرېنالىن قاتارلىقلار. بۇ ھورمونلار ئادەم بەدىنىنىڭ شېكەر، ئاقسىل، سۇ ۋە تۇز مېتابولىزىمىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ، شۇنداقلا قان تومۇرلارنى قىسقارتىپ، قان بېسىمىنى ئۆرلىتىدۇ، ھەمدە يۈرەك ھەرىكىتىنى كۈچەيتىپ ۋە تېزلىتىپ، بەدەنگە نىسبەتەن جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ. كىلىنىكىدا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان پرىدىنزون قاتارلىق دورىلار بۆرەك ئۈستى بەز پوستانلاق ماددىسى ھورمونى تۈرىگە مەنسۇپ بولۇپ، ئۇنىڭ ئىشلىتىش مىقدارى ناھايىتى ئاز بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ياللۇغ قايتۇرۇش، زەھەرگە، زىيادە سەزگۈرلۈككە ۋە شوڭقا قارشى تۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە ياخشى رول ئوينايدۇ. بىراق، ھورمونلارنى ئىشلەتكەندە يەنە ئاز بولمىغان ناچار ئەسىرلەرنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇزاق


مۇددەت ئىشلىتىلسە دورىغا خۇمارلىق پەيدا قىلىدۇ. دورىنىڭ ئازايىتىلىشى ۋە توختىتىلىشى بەك تېز بولۇپ كەتسە، كېسەللىك ئەھۋالىدا تەكرارلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا، بۆرەك ئۈستى بېزىنىڭ رولىنى كۈچەيتىپ، ئۇنىڭ ھورمون ئاجرىتىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق ھورمون تۈرىدىكى دورىلارنى ئىچكەنگە ئوخشاش رول ئوينايدۇ، بۇنىڭدا ھورمون تۈرىدىكى دورىلارنى

سول پۇت



5- رەسىم. بۆرەك ئۈستى بېزى، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىش، شى، بۆرەك، سۈيۈك نەيچىسى، دوۋساق قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ئورنى ۋە ئۇۋۇلاش يۆنىلىشى.

ئىچكەندە پەيدا بولىدىغان ناچار تەسىرلەر بولمايدۇ. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى تايپان مەركىزىدىكى «人» شەكىللىك گىرەلەشكەن جايىنىڭ بىر ئاز سىرتقى يان تەرىپىدە (5-، 6- رەسىمگە قاراڭ).



6- رەسىم. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



7- رەسىم. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇ- سۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

يېنىك ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: (يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېنىك ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى كېسەلنى تەكشۈرۈشتىكى ۋە قېرىلار، بالىلار، ئېغىر كېسەللەر، تېنى ئاجىزلار ھەمدە تېنى يۇقىرى سەزگۈر- لۈككە ئىگە بولغان كىشىلەرگە قارىد- تىلغان ئۇسۇلنى كۆرسىتىدۇ. تۆۋەندە بىر- بىرلەپ ئەسكەرتىلمەيدۇ) باش بارماقنىڭ ئۇچى ئارقىلىق كۈچ ئىشلى- تىلىدۇ. (7- رەسىمگە قاراڭ)


كۈچلۈك ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: كۆر- سەتكۈچ بارماقنىڭ بارماق بوغۇمىنىڭ ئۇچى ئارقىلىق كۈچ ئىشلىتىلىدۇ (8- رەسىمگە قاراڭ). ئادەتتە نوقتىنى بېكىتىپ چوڭقۇر ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاش ئۈچۈن ئۇۋۇلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاش ئۈچۈن ئۇۋۇلاشتا، ئېھتىياجىغا ئاساسەن قېتىم سانى چەكلەنمەيدۇ.

بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونى ئادەتتە ياللۇغ قايتۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، قىزىتما ياندۇرۇش، دەم سىقىلىشنى توختىتىش، زىيادە سەز- گۈرلۈككە ۋە شوڭقا قارشىلىق پەيدا قىلىش، رېماتىزملىق بوغۇم ياللۇغى، يۈرەك رېتىمى قالايمىقانلىشىش، بۆرەك ئۈستى بېزىنىڭ ئىقتىدارى كۈچىيىپ



8 - رەسىم. بۆرەك ئۇستى بېزى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).



9 - رەسىم. قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېكىش رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

كېنىش، بۆرەك ئۇستى بېزىنىڭ ئىقتىدارى ئاجىزلىشىش ۋە باشقا ئىچكى ئاجراتما كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

2. قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېكىشى رېفلىكس رايونى

قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېكىشى ئادەم بەدىنىنىڭ قورساق بوشلۇقىدىكى ھەر قايسى ئەزالارنىڭ ئەتراپىغا جايلاشقان بولۇپ، ئىچكى ئەزالارنىڭ ھەرىكىتىنى باشقۇرىدىغان ئەڭ چوڭ نېرۋا چېكىشىدۇر. ئۇ ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى تەدۈشەيدۇ.

قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېكىشىنىڭ رېفلىكس رايونى ئىككى پۇت تايپىنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان بولۇپ، تەخمىنەن بىر يۈمىلاق شەكىللىك دائىرىدە (5 - ، 9 - رەسىملەرگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۈچىنىڭ يۇمشىق ياكى ئۈچى ئارقىلىق كۈچ ئىشلىتىلدۇ (10 - رەسىمگە قاراڭ).

كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇمىنىڭ ئۈچى ئارقىلىق كۈچ بېرىلدۇ (11 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاش ئۈچۈن ئۇۋۇلاشتا ئۈچ قېتىم.



10 - رەسىم . قورساق بوشلۇقى نېرۋا
چىگىشى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).




11 - رەسىم . قورساق بوشلۇقى نېرۋا چى-
گىشى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇ-
سۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

دىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاش
ئۈچۈن ئۇۋۇلاشتا ئېھتىياجىغا ئا-
ساسەن ئۇۋۇلاش قېتىم سانى كۆ-
پەيتىلىدۇ.


قورساق بوشلۇقى نېرۋا چى-
گىشى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇل-
سا، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگى-
شىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ،
قورساق بوشلۇقىدىكى ئەزالارنىڭ
فۇنكسىيەسىنى تەڭشەپ، ھەزىم
قىلىش سىستېمىسىدىكى نېرۋا
فۇنكسىيەسى بۇزۇلۇش كېسەل-
لىكلىرى مەسىلەن: قورساق ئې-
سىلىش، ئىچى سۈرۈش، ئاشقازان،
ئۈچەي سپازمىلىنىش، ھىق تۇ-
تۇش قاتارلىقلارنى داۋالاشتا ئۈنۈمى
بار.

3. بۆرەك رېفلىكس رايونى

بۆرەك بەدەننىڭ مۇھىم بول-
غان چىقىرىش ئەزاسىدۇر. ئادەم
بەدىنىدە مېتابولىزم جەريانىدا شە-
كىللەنگەن ماددىلار، ھەمدە ئادەم
تېنىگە كىرگەن يات جىسىملارنىڭ
كۆپ قىسمى بۆرەكنىڭ پارچىلاپ
سۈيىدۈككە ئايلاندۇرۇشى ئارقىلىق
تەن سىرتىغا چىقىرىلىدۇ، بۆرەك-
نىڭ سۈيىدۈك چىقىرىش پائالىيىتى
ئادەم بەدىنىدىكى ناتىرىي، كالىي،
ھىدروگېن ئىئونى قاتارلىق مۇھىم



12 - رەسىم. بۆرەك رېفلىكسى رايونىنىڭ ئورنى.



13 - رەسىم. بۆرەك رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

ئېلېكترونلارنىڭ قويۇقلۇق دە-
رىجىسىنى تەڭشەپ ۋە تىزگىنلەپ،
سۇ - تۇز مېتابولىزمى ۋە كىسلا-
تا - ئىشقارلىق دەرىجىسىنى تەڭ-
شەپ، ئادەم بەدىنىنىڭ ئىچكى مۇ-
ھىتىنىڭ نىسپىي مۇقىملىقىنى
ساقلاپ، ئادەم بەدىنىنىڭ فىزىئولو-
گىيەلىك پائالىيىتىنى نورمال ئې-
لىپ بېرىشتا ئىنتايىن مۇھىم.
بۆرەك رېفلىكسى رايونىنىڭ
ئورنى: ئىككى پۇت تاپان مەركە-
زىدىكى ئوپىمانلىقتا (5 - ، 12 -
رەسىملەرگە قاراڭ).


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك
ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ يۇمشى-
قى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىد-
لىدۇ (13 - رەسىمگە قاراڭ). كۈچ-
لۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بار-
ماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇمىنىڭ ئۇچى
ئارقىلىق كۈچ بېرىلىدۇ. ئالدىدا
چوڭقۇر ئۇۋۇلاپ قولىنى كۆتۈرمەي،
پۇت مەركىزىنى بويلاپ ئۆتكۈچە
تەرەپكە قاراپ ئىتتىرىپ ئۇۋۇلىنىد-
ۇ. قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاش
ئۈچۈن ئۇۋۇلىغاندا ئۈچ قېتىمدىن
بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتى-
ياجىغا ئاساسەن قېتىم سانى كۆ-
پەيتىلىدۇ.



بۆرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، بۆرەك ۋە پۈتكۈل ئاچ-رىتىش سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدا-رىنى كۈچەيتىپ، بۆرەكنىڭ ھەر خىل كېسەللىكلىرى ۋە ئاجرىتىش سىستېمىسىنىڭ كېسەللىكلىرى، شۇنداقلا سۇلۇق ئىششىق، رېماتىزم خاراكتېرلىك بوغۇم ياللۇغى، بۆرەك مەنبەلىك يۇقىرى قان بېسىم قا-تارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاشقا ياردىمى بولىدۇ.

14 - رەسىم. بۆرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

4. سۈيدۈك نەيچىسى رېفلىكس رايونى



سۈيدۈك نەيچىسى بۆرەك ئاجرىتىپ چىقارغان سۈيدۈكنى دوۋساققا يەتكۈزۈپ بېرىدىغان تۇ-رۇبا بولۇپ، ئوزۇنلۇقى تەخمىنەن 25 - 30 cm كېلىدۇ.

سۈيدۈك يولى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: بۆرەك ۋە دوۋساق رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولۇپ، بىر يانتۇ سىزىقنى شەكىللەندۈرگەن (5 - ، 15 - رەسىملەرگە قاراڭ).

15 - رەسىم. سۈيدۈك نەيچىسى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ يۈمشە-



16 - رەسىم. سۈيدۈك نەيچىسى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



17 - رەسىم. سۈيدۈك نەيچىسى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

قى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىد-لىدۇ (16 - رەسىمگە قاراڭ): كۈچ-لىك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بار-ماقنىڭ بارماق ئوتتۇرىسى بوغۇمى-نىڭ ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. ئالدىدا چوڭقۇر ئۇۋۇلاپ، قولىنى كۆتۈرمەي، بۆرەك رېفلىكس رايونى-نىدىن دوۋساق رېفلىكس رايونى تەرەپكە ئاستا - ئاستا ئۇۋۇلىنىدۇ (17 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاش ئۈچۈن ئۇۋۇلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن قېتىم سانى كۆپەيتىلسە بولىدۇ.

سۈيدۈك نەيچىسى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاشنىڭ رولى: سۈيە-دۈك يولىنىڭ ئۆزىدىكى كېسەل-لىكلەر (ياللۇغ، تاش قاتارلىقلار) ھەمدە ئىچكى ئاجرىتىش سىستېمىسىنىڭ كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاشقا ياردىمى بولىدۇ.

5. دوۋساق رېفلىكس رايونى

دوۋساق قورساقنىڭ تۆۋەنكى قىسمىغا جايلاشقان بولۇپ، سۈيە-دۈكنى ۋاقىتنىچە ساقلايدىغان ئە-

زادۇر. ئۇنىڭ سىغىمى 500 ml – 300 بولىدۇ.

دوۋساق رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تاپىنىنىڭ ئىچكى يان تەرىپىگە، ئۆكچىنىڭ ئالدى يان تەرىپىگە جايلاشقان (5 – ، 18 – رەسىملەرگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىنىڭ ئۇۋۇلاش – باش بارماقنىڭ ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (19 – رەسىمگە قاراڭ). كۈچلۈك ئۇۋۇلاش – باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بارماق ئوتتۇرىسى بوغۇ – مىنىڭ ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ، نوقتىنى بېكىتىپ چوڭقۇرلۇق تەرەپكە بېسىپ ئۇۋۇلىنىدۇ، ھەمدە بېكىتىلگەن نوقتىدا ئەتراپى ئۇۋۇلىنىدۇ (20 – رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەكلىمەنمەيدۇ.


رولى: دوۋساق كېسەللىكلىرى (ياللۇغ، تاش، ئۆسمە قاتارلىقلار)، ئىچكى ئاجرىتىش سىستېمىسىنىڭ كېسەللىكلىرى، مەزى بەزى كېسەللىكلىرىنى داۋالايدۇ ۋە ساقلىقنى ساقلايدۇ.



18 – رەسىم. دوۋساق رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



19 – رەسىم. دوۋساق رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



20 - رەسىم. دوۋساق رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

يۇقىرىقىلار پۇت مەركىزىدە- كى رېفلىكس رايونى، ئۇۋۇلغاندا بۇلارنى تۇتاشتۇرۇپ ئۇۋۇلسا، ھەم- دە تۆۋەندىكى تەرتىپ بويىچە ئەس- كە ئېلىنسا، ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. يەنى:

بىر نوقتا (بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونى)، بىر چوڭ دائىرە (بۆرەك ۋە قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىش رېفلىكس رايونى)، بىر سىزىق (سۈيۈك نەيچىسى رېف- لېكس رايونى)، بىر كىچىك دائىرە (دوۋساق رېفلىكس رايونى).

II گۇرۇپپا پۇت بارماقلىرى

بۇ گۇرۇپپا پېشانە كاۋىكى، مېڭە ئاستى بېزى، كىچىك مېڭە، مېڭە غۇلى، باش (چوڭ مېڭە)، ئۈچلۈك نېرۋا، بۇرۇن، بويۇن، كۆز، قۇلاق قا-



21 - رەسىم. پېشانە كاۋىكى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

تارلىق توققۇز رېفلىكس رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئادەم بەدىنى باش قىسمىدىكى ھەر قايسى ئەزالار بىلەن ماس كېلىدۇ. باش قىسمى ئادەم تېنىنىڭ نېرۋا تۈگۈنى ۋە يۈز قىسمىدىكى بەش ئەزا جايلاشقان جاي بولۇپ، ناھايىتى مۇھىم ئورۇن ھېسابلىنىدۇ. يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغىنىدەك، نېرۋىلارنىڭ گىرە- لىشىپ مېڭىشى تۈپەيلىدىن، باش- نىڭ سول قىسمىغا جايلاشقان ئەزالارنىڭ رېفلىكس رايونلىرى ئوڭ پۇتتا، ئوڭ قىسمىغا جايلاشقان

ئەزالارنىڭ رېفلېكس رايونلىرى
سول پۇتتا بولىدۇ. بۇنى تۆۋەندە
قايتا تەكرارلىمايمىز.


1. پېشانە كاۋىكى رېفلېكس را- يونى

پېشانە كاۋىكى بۇرۇن بوش-
لۇقى بىلەن ئۆزئارا تۇتاشقان ھاۋا
يۈرۈشلەشتۈرۈش كاۋىكىدۇر.


پېشانە كاۋىكى رېفلېكس را-
يونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تېرە
ئاستى تەرىپىدىكى پۇت بارماقلىرى-
رىنىڭ ئۈچىدا (21 - رەسىمگە قا-
راڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك
ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ ئۈچى
بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (22 - رە-
سىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلا-
ش - باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ
بارماقنىڭ بارماق ئوتتۇرىسى بوغۇم
ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (23 -
رەسىمگە قاراڭ).

يۆنلۈشى: پۇت بارماقلىرىد-
نىڭ ئۇچلىرىنى بويلاپ توغرىسىغا
ئۇۋۇلسا ياكى پۇت بارماقلىرىنىڭ



22 - رەسىم. پېشانە كاۋىكى رېفلېكس
رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇ-
ۋۇلاش).



23 - رەسىم. پېشانە كاۋىكى رېفلېكس
رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
(كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).



24 - رەسىم. مېڭە ئاستى بېزى (ھىپوفىز) رېڧلىكسى رايونىنىڭ ئورنى.

ئۇچى تەرىپىدىن ئۆكچە تەرىپىگە قارىتىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەكلىنمەيدۇ.

رولى: باش ئاغرىقى، باش قېيىش، ئويغۇسىزلىق، مېڭە قىسمى ۋە بۇرۇن، كۆز، قۇلاق، ئېغىز بوشلۇقى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

2. مېڭە ئاستى بېزى (ھىپوفىز) رېڧلىكسى رايونى

مېڭە ئاستى بېزى چوڭ مېڭىنىڭ تۆۋەن تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، ناھايىتى مۇھىم ئىچكى ئاجراتما بېزىدۇر. ئۇ ئۆستۈرۈش ھورمونى، تىروتروپىن ھورمونى (قالقانېز خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرگۈچى ھورمون)، ئادېرنوكورتىكوتروپىك ھورمون (ACTH) قاتارلىقلارنى ئاچىرىتىپ چىقىرىپ، بەدەننىڭ ئۆسۈش ۋە باشقا ئىچكى ئاجراتما بەزىلىرىنىڭ پائالىيىتىگە ناھايىتى چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ.

مېڭە ئاستى بېزى رېڧلىكسى رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت باش بارماقلىرى يۇمشىقىنىڭ مەركىزىدە (24 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (25 - رەسىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق ئارىسى بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. ئۇۋۇلاشتا



25 - رەسىم. مېڭە ئاستى بېزى رېف-
لېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
(يېنىك ئۇۋۇلاش).




26 - رەسىم. مېڭە ئاستى بېزى رېف-
لېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
(كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

نوقتىنى بېكىتىپ چوڭقۇر ئۇۋۇ-
لىنىدۇ (26 - رەسىمگە قاراڭ). ئە-
گەر كۈچ يېتەرلىك چىقمىسا، ئۇ-
ۋۇلاش ئاياقچىسىنىڭ ئۇچى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساق-
لاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم-
غىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەك-
لەنمەيدۇ.

رولى: مېڭە ئاستى بېزىنىڭ
ئۆز ئىقتىدارىنىڭ بۇزۇلۇشى تۈ-
پەيلىدىن كېلىپ چىققان كېسەل-
لىكلەر (پاكىنەكلىك كېسەلى،
سىمىزلىك كېسەلى، سۈيدۈك تۈ-
تۈلۈش قاتارلىقلار)، شۇنداقلا ئىچ-
كى ئاجرىتىش سىستېمىسىنىڭ
كېسەللىكلىرى، بالىلار تېنىنىڭ
يېتىلىشى نورمال بولماسلىق،
ئەقلىي ئىقتىدارى تۆۋەن بولۇش ۋە
ھەيز كېسىلىش دەۋرى يىغىندى
ئالامىتى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە
ساقلىقنى ساقلاش.

3. كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلىكس رايونى



27 - رەسىم. كىچىك مېڭە ۋە مېڭە
غولى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



28 - رەسىم. كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى
رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
(يېنىك ئۇۋۇلاش).

كىچىك مېڭە چوڭ مېڭىنىڭ ئاستى تەرىپىگە جايلاشقان. مېڭە غولى، ئوتتۇرا مېڭە، مېڭە تۈۋرۈكى، ئۈزۈنچاق مېڭە قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇ چوڭ مېڭە بىلەن يولۇن ئوتتۇرىسىدا.


كىچىك مېڭىنىڭ ئىقتىدا-رى: بەدەننىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاپ، مۇسكۇللارنىڭ كېڭىيىش كۈچىنى تەڭشەش ۋە مۇسكۇللار ھەرىكىتىنى ماسلاشتۇرۇش، مېڭە غولى نېرۋا ئىمپۇلسىنى (نېرۋا دولقۇنى) ئۆتكۈزۈپ، يۇقىرى ۋە تۆۋەنگە يەتكۈزىدىغان مۇھىم ئۆتۈش يولىدۇر. ئۇنىڭدا يۈرەك قان تومۇر تۈگۈنى، نەپەسلىنىش تۈگۈنى، ياندۇرۇش (قۇسۇش) تۈگۈنى قاتارلىق مۇھىم نېرۋا تۈگۈنلىرى بار.

كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۈتتىن ئاستى تەرىپىدە، باش بارمىقى قورساق قىسىم تۆۋەن تەرىپىنىڭ 2 - بارماققا يېقىنلاشقان يېرىدە (27 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (28 - رەسىمگە قاراڭ). كۈچلۈك ئۇۋۇلا-



29 - رەسىم. كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).



30 - رەسىم. ئۈچلۈك نېرۋا رېف- لېكس رايونىنىڭ ئورنى.


ش - باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. ئۇۋۇلاشتا نوقتىنى بېكىتىپ چوڭقۇر ئۇۋۇ- لىنىدۇ (29 - رەسىمگە قاراڭ). ئە- گەر كۈچ يېتىشمەسە، ئۇۋۇلاش تا- پقىنىڭ ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىد- لىدۇ.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساق- لاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم- خىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەك- لەنمەيدۇ.

كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاشنىڭ رولى: كىچىك مېڭىنىڭ يىگلەپ كېتىشى، كىچىك مېڭە ياكى مېڭە غولى ئىقتىدارىنىڭ نورمالسىزلىقى تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان كې- سەللىكلەر، مۇسكۇل، پەي، بوغۇم كېسەللىكلىرى، تەڭپۇڭلاشتۇرغۇ- چى ئەزالار كېسەللىكلىرى، ھەرد- كەت تەكشىلىكىنىڭ بۇزۇلۇشى، قان بېسىمىنىڭ نورمالسىزلىقى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

4. ئۈچلۈك نېرۋا رېفلىكس را- يونى

ئۈچلۈك نېرۋا باشنىڭ ئىك- كى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، كۆز نېرۋىسى، ئېغىز بوشلۇقىنىڭ



31 - رەسىم. ئۈچلۈك نېرۋا رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش (يېنىك ئۇۋۇلاش).



32 - رەسىم. ئۈچلۈك نېرۋا رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

يۇقىرىقى قىسمى نېرۋىسى، ئېغىز بوشلۇقىنىڭ ئۆۋەنكى قىسمى نېرۋىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇ كۆز، ئېغىز بوشلۇقىنىڭ يۇقىرى قىسمى، تۆۋەن قىسمى، ئېغىز بوشلۇقى ھەر قايسى ئەزالىرى، ھەمدە يۈز قىسمى تېرە - مۇسكۇللىرىنىڭ ھەرىكىتىنى ۋە سېزىمىنى ئىدارە قىلىدۇ.

ئۈچلۈك نېرۋا رېفلىكس را- يونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت باش بارماقلىرىنىڭ 2 - بارماققا يېقىن تەرىپىدە (30 - رەسىمگە قاراڭ); ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (31 - رەسىمگە قاراڭ).

كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. پۇت باش بارماقنىڭ ئۈچى تەرىپىدىن بارماق يىلتىزى تەرىپىگە قارىتىپ ئىتتىرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (32 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەكلەنمەيدۇ.



33- رەسىم. بۇرۇن رېفلېكس رايونىنىڭ ئورنى.




34- رەسىم. بۇرۇن رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).


ئۈچلۈك نېرۋا رېفلېكس را-
يونىنى ئۇۋۇلاشنىڭ رولى: باشنىڭ
بىر تەرىپى ئاغرىش، ئۈچلۈك نېرۋا
ئاغرىش، يۈز قىسمى نېرۋىلىرى
پالەچلىشىش ياكى تارتىشىپ قې-
لىش، گۈرەن بەز ياللۇغى ۋە
باش- يۈز قىسمىنىڭ باشقا كې-
سەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلى-
قنى ساقلاش.

5. بۇرۇن رېفلېكس رايونى

بۇرۇن رېفلېكس رايونىنىڭ
ئورنى: ئىككى پۇت باش بارماقلى-
رىنىڭ ئىچكى يان تەرىپىدىن باش
بارماق تىرناقلىرىنىڭ يىلتىزىغى-
چە سوزۇلىدۇ (33- رەسىمگە قا-
راڭ). ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك
ئۇۋۇلاش- باش بارماق ئۇچى بى-
لەن كۈچ بېرىلىدۇ (34- رەسىمگە
قاراڭ)؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش- باش
بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ
ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ
بېرىلىدۇ (35- رەسىمگە قاراڭ).
قېتىم سانى: ساقلىقنى ساق-



35 - رەسىم. بۇرۇن رېفلىكس رايونى-
نى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇ-
لاش).



36 - رەسىم. باش قىسمى (چوڭ مېڭە)
رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى .

لاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم-
غىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەك-
لەنمەيدۇ.


رولى: بۇرۇن قىسمىنىڭ ھەر
خىل كېسەللىكلىرى ۋە يۇقىرى
نەپەس يولىنىڭ يۇقۇملىنىشىنى
داۋالاش ۋە ساقلىقىنى ساقلاش.

6. باش (چوڭ مېڭە) رېفلىكس رايونى


چوڭ مېڭە ئىنتايىن مۇھىم
ئەزا بولۇپ، ئۇ باش بوشلۇقى ئوت-
تۇرسىغا جايلاشقان. ئۇ سىزىم
تەھلىل ئىقتىدارى، بەدەن ھەرىد-
كىتىنى ۋە ئىچكى ئەزالار ھەرىكىد-
تىنى تەڭشەش ئىقتىدارىغا، شۇنداقلا
سۆزلەش، ئۈگىنىش، ئەستە
تۇتۇش ۋە تەپەككۇر قىلىش قاتار-
لىق يۇقىرى ئىقتىدارغا ئىگە.

باش (چوڭ مېڭە) رېفلىكس
رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت باش
بارماقلىرىنىڭ يۇمشىقىنىڭ ھەم-
مىسى (36 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىنىڭ



37- رەسىم. باش قىسمى (چوڭ مېڭە) رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).




38- رەسىم. باش قىسمى (چوڭ مېڭە) رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (37 - رەسىمگە قاراڭ)؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. پۇت بارماق ئۇچىدىن باش بارماق يىلتىزى تەرىپىگە قارىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (38 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەكلەنمەيدۇ.

رولى: مېڭە قاناش، مېڭە قان ئۆتكۈچىسى ۋە ئۇنىڭ ئاساسىي مېڭە سىلىكىنىش، باش ئاغرىش، باش قېيىش، ئۇيقۇسىزلىق، نېرۋا ئاجىزلىقى، ئەس - ھوشنى يوقىتىش، چوڭ مېڭە يىگىلەش ۋە چوڭ مېڭە ئىقتىدارى نورمالسىزلىنىش - تىن بولغان ھەر خىل كېسەللەك - لەر، مەسىلەن: مېڭە مەنبەلىك پالەچلىنىش، پاركىنسون كېسەللىكى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

7. بويۇن رېفلېكس رايونى




39 - رەسىم. بويۇن رېفلېكس رايونى.
يونىڭ ئورنى.

بويۇن رېفلېكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت باش بارماقلىرىنىڭ يىلتىز قىسمىدىكى توغرا سىزىقچىدا (39 - رەسىمگە قاراڭ). ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماقنىڭ ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىپ، لىدۇ (ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشىمىغان دەرىجىدە يېرىنىڭ ۋە كۈچلۈك ئۇۋۇلىنىدۇ). پۇت باش بارماقلىرىنىڭ يىلتىزىنى بويلاپ ئۇۋۇلىنىدۇ (40 - رەسىمگە قاراڭ).


قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەكلەنمەيدۇ.

رولى: بويۇن ئومۇرتقىسى كېسىلى، بويۇن قىسمىنىڭ يۈمىشاق توقۇلمىلىرى زەخمىلىنىش قاتارلىق بويۇن قىسمى كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.




40 - رەسىم. بويۇن رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

8. كۆز رېفلىكس رايونى



41 - رەسىم. كۆز رېفلىكس رايونى -
نىڭ ئورنى.



42 - رەسىم. كۆز رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

كۆز رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇتنىڭ 2 - ، 3 - بارماقلىرىدا (41 - رەسىمگە قاراڭ). ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماقنىڭ ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىدۇ، پۇت باش بارماق ئۇچى تەرىپىدىن يىلتىزى تەرىپىگە قاراپ تىپ ئۇۋۇلىنىدۇ. ئاۋۋال بارماقنىڭ ئاستى تەرىپى، كېيىن ئىككى تەرىپى، ئۇنىڭدىن كېيىن باش بارماقنىڭ ئۇچى ياكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىپ، 2 - ، 3 - بارماق ئاستى يىلتىز قىسمىنىڭ ئىچكى يان تەرىپى ۋە تاشقى يان تەرىپى ئايرىم - ئايرىم نوقتىلارغا بىرلەشتۈرۈلۈپ چوڭقۇر ئۇۋۇلىنىدۇ (بۇ قىزىق ئۇۋۇلاشلار ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن يېنىك ياكى كۈچلۈك ئۇۋۇلىنىدۇ). (42 - رەسىمگە قاراڭ).

43 - رەسىم سانى: ساقلىقنى ساق.



43 - رەسىم. كۆز رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.



44 - رەسىم. قۇلاق رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى

لاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم -
خىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەك -
لەنمەيدۇ.

رولى: كۆز قىسمىنىڭ ھەر
خىل كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە
ساقلىقنى ساقلاش.

9. قۇلاق رېفلىكس رايونى

قۇلاق رېفلىكس رايونىنىڭ
ئورنى: ئىككى پۇتنىڭ 4 - ، 5 -
بارماقلىرىدا (44 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بار -
ماقنىڭ ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىد -
لىدۇ. پۇت بارماقلىرىنىڭ ئۇچىدىن
يىلتىزى تەرىپىگە قارىتىپ ئۇۋۇ -
لىنىدۇ. ئۇۋۇال بارماق ئاستى، ئان -
دىن بارماقنىڭ ئىككى يان تەرى -
پى، ئۇنىڭدىن كېيىن باش بارماق
ياكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوت -
تۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بې -
رىپ، 4 - ، 5 - بارماقنىڭ بارماق
ئاستى يىلتىز قىسمىنىڭ ئىچكى
يان تەرىپى ۋە تاشقى يان تەرىپى -
دىن ئايرىم - ئايرىم نوقتىدا بەلگە -
لەپ چوڭقۇر ئۇۋۇلىنىدۇ. يۇقىرىد -
قىلارنى ئۇۋۇلاشنىڭ ئېھتىياجىغا

ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە يېنىك ياكى كۈچلۈك ئۇۋۇلىنىدۇ. قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا قېتىم سانى چەكلىنمەيدۇ.

يۇقىرىقىلار پۇت بارماقلىرىدىكى توققۇز رېفلىكس رايونلىرى. ئۇۋۇلاشتا، بىرلەشتۈرۈپ ئۇۋۇلسا ياكى تۆۋەندىكى تەرتىپ بويىچە ئەستە قالدۇرۇپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ. يەنى:

(پۇت باش بارماقنى): بىر ئۈچ (پۇت بارماق ئۈچى، پېشانە رېفلىكس رايونى)، ئىككى نوقتا (مېڭە ئاستى بېزى رېفلىكس رايونى، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلىكس رايونى)، ئۈچ تەرەپ (پۇت باش بارماق يۇمشىق چوڭ مېڭە رېفلىكس رايونى، ئىككى يان تەرىپى ئۈچلۈك نېرۋا رېفلىكس رايونى ۋە بورۇن رېفلىكس رايونى)، بېرىم چەمبەر ئايلاندۇرۇش (بويۇن رېفلىكس رايونى): (پۇتنىڭ باشقا بارماقلىرى):

بىر ئۈچ (بارماق ئۈچى، پېشانە رېفلىكس رايونى)، ئۈچ تەرەپ (ئاستى تەرىپى ۋە ئىككى يان تەرىپى)، ئىككى نوقتا (بارماق يىلى تىزىنىڭ ئىچكى يان تەرىپى ۋە تاشقى يان تەرىپى).



45 - رەسىم. قۇلاق رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.



46 - رەسىم. قۇلاق رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

تۆتىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى (2)

III گۇرۇپپا سول پۇت تاپىنىڭ ئالدىنقى يېرىمى

بۇ گۇرۇپپا قالقان يان بەز، قالقانبەز، قىيپاش چاسا مۇسكۇل، ئۆپكە، كانايچە، يۈرەك قاتارلىق بەش رېفلىكس رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئا- ساسەن ئادەم تېنىنىڭ سول تەرەپ كۆكرەك ۋە ئارقا تەرىپى بىلەن ماس كېلىدۇ.

1. قالقان يان بەز رېفلىكس رايونى


قالقان يان بەز قالقانبەزنىڭ كەينى تەرىپىگە جايلاشقان. ئادەتتە يۇقىرى - تۆۋەن ئىككى جۈپ بولۇپ، ھەر بىرىنىڭ ئېغىرلىقى تەخمىنەن $0.05 \sim 0.3g$ كېلىدۇ.



47 - رەسىم. قالقان يان بەز رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

قالقان يان بەز بىر خىل ئىچكى ئاجراتما بەز بولۇپ، ئۇ ئاجرىتىپ چىقارغان ھورمونلارنىڭ بەدەندىكى كالتسىي، فوسفورنى تەڭشەش رولى بار. ئەگەر قالقان يان بەز ئېلىۋېتىلسە، قاندىكى كالتسىي مىقدارى تۆۋەنلەپ، قول - پۇت تارتىشىپ قېلىپ، ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

قالقان يان بەز رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تاپىنىڭ نىڭ ئىچكى يان تەرىپىدىكى پۇت



48 - رەسىم. قالقان يان بەز رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).




49 - رەسىم. قالقان يان بەز رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

باش بارمىقى يىلتىزىنىڭ كەينى تەرىپىدە (47 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (48 - رەسىمگە قاراڭ)؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ، ئوتتۇرا بارماقلارنى ئامبۇر شەكلىدە ئېگىپ ئۇۋۇلاتقۇچىنىڭ پۇت بارمىقىنى قىسىپ، كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ يان تەرىپى بىلەن رېڧلېكس رايونىغا كۈچ بېرىلىدۇ. زۆرۈر تەبىئىيلىغاندا باش بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماقنى بېسىپ كۈچ بېرىش كۈچەيتىلىدۇ (49 - رەسىمگە قاراڭ). قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: قالقان يان بەز ئىقتىدا- رىنىڭ تۆۋەنلىشىدىن كېلىپ چىققان كالتىسى كەم بولۇش كېسەللىك ئالامەتلىرى مەسىلەن: پەي - مۇس - كۇللار تېلىپ ئاغرىش، پەي تارتىش، شىپ قېلىش، قول - پۇتلار پالەچلىنىش ياكى سىپازمىلىنىش، تىرناقچىلار چۈرۈكلىشىش، سۆڭەك شالاڭلىشىش، كۆزگە ئاق چۈشۈش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش، ئاشقازان - ئۈچەينىڭ لۇمۇلىدەش ھەرىكىتىنى كۈچەيتىش، تۇتقاقلىق كېسىلى تۇتقاندا جىددىي قۇتقۇرۇش

قاتارلىقلار (بۇنداق ۋاقىتتا كۈچلۈك ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كۈچلۈك غىدىقلىنىدۇ).



50 - رەسىم. قالقانبەز رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى .



51 - رەسىم. قالقانبەز رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

2. قالقانبەز رېفلىكس رايونى


قالقانبەز بويۇننىڭ ئالدى تەرىپىگە جايلاشقان، ئىككى يان ياپراق ۋە بىر قالقانبەز بوغۇزىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ئېغىرلىقى تەخمىنەن 40 ~ 20 گىرام كېلىدۇ. سېرىق ئەت ئارقىلىق كېڭىرىدەك يۇمشاق سۆڭىكى ئۈستىگە ئورۇنلاشقان.

قالقانبەز مۇھىم ئىچكى ئاجزاتىمىز بۇ ئۆزىدە يودنى ساقلايدۇ، ھەمدە قالقانبەز ھورمونى ئاجزاتىنى چىقىرىدۇ. ئۇنىڭ مۇھىم رولى - بەدەننىڭ مېتابولىزىمىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەننىڭ نورمال ئۆسۈپ يېتىلىشىنى، بولۇپمۇ بەدەن سۆڭەك ۋە نېرۋا سىستېمىسىنىڭ يېتىلىشىنى قامدايدۇ.

قالقانبەز رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تاپىنىنىڭ ئاستى تەرىپى، پۇت 1 - ، 2 - بارماقلىرى ئارىلىقىدىكى يۈچۈقتىن ئارقا تەرەپكە سوزۇلۇپ، ئاندىن ئىچكى يان تەرەپكە قايرىلىپ ياي شەكلىدە 1 - تاپان سۆڭەكلىرىنىڭ كىچىك بېشىنى ئوراپ تۇرىدۇ (50 - رەسىمگە قاراڭ). ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ يان تەرىپى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (51 - رەسىمگە قاراڭ)؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلا -



52 - رەسىم. قالدانبەز رېفلىپكىس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).



53 - رەسىم. قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېفلىپكىس رايونىنىڭ ئورنى.

ش - باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇمى ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ، رېفلىپكىس رايونىنى بويلاپ ئۇۋۇلىنىدۇ (52 - رەسىمگە قاراڭ).


قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: قالدانبەز رولىنىڭ كۈچەيتىلىشى ياكى تۆۋەنلەپ كېتىشى، قالدانبەز ياللۇغى، قالدانبەز ئىششىقى، ھەمدە سېمىزلىك كېسىلى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

3. قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېفلىپكىس رايونى

قىيپاش چاسا مۇسكۇل گەجگە قىسمى ۋە مۇرە قىسمىغا جايلاشقان، سول - ئوڭ ئىككى مۇسكۇل بىرلەشىپ بىر قىيپاش چاسا شەكىلىنى ھاسىل قىلغان بولغاچقا، «قىيپاش چاسا مۇسكۇل» دەپ ئاتىلىدۇ.

قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېفلىپكىس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇتنىڭ ئاستى يۈزى، 2 - ، 3 - ، 4 - ، 5 - بارماقلارنىڭ كەينى تەرىپىدە بولۇپ، بىر توغرا بەلباغنى ھاسىل قىلغان (53 - رەسىمگە قاراڭ).



54 - رەسىم. قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



55 - رەسىم. قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (54 - رەسىمگە قاراڭ)؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش: كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىپ، رېفلېكس رايونىنى بويلاپ ئۇۋۇلىنىدۇ (55 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن بېكىتىلىدۇ.


رولى: بويۇن ۋە مۇرە قىسمىنىڭ ئېچىشىپ ئاغرىشى، بەدەننىڭ يۇقىرى قىسمى ماغدۇرسىزلىنىش، ئېچىشىپ ئاغرىش ۋە پالەچلىنىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

4. ئۆپكە ۋە كانايچە رېفلېكس رايونى

ئۆپكە مۇھىم نەپەسلىنىش ئەزاسى. ئۇ بەدەننىڭ مېتابولىزىمىنى ۋە نورمال فىزىئولوگىيەلىك پائالىيەتلىرىنى قامداش ئۈچۈن، سىرتتىن ئۆزلۈكسىز ئوكسىگېن قوبۇل قىلىپ، كاربون تۆت ئوكسىدنى بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تۇرىدۇ، ھاۋا ئالماشتۇرغان مۇھىم سورۇن. كا-



56 - رەسىم. ئۆپكە ۋە كانايچە رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.




57 - رەسىم. ئۆپكە ۋە كانايچە رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

ناي - ھاۋا كىرىپ چىقىدىغان يول. كانايچىلار ئۆپكەدە نۇرغۇن تارماقلارغا بۆلۈنۈپ، بۆلۈنگەنسېرى تېخىمۇ ئىنچىكىلىشىپ كانايچە دەرىخىنى ھاسىل قىلىدۇ.


ئۆپكە ۋە كانايچە رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇتنىڭ ئاستى، قىپپاش چاسا مۇسكۇلىنىڭ رېفلىكس رايونى كەينىدىكى بىر توغرا بەلباغسىمان دائىردە، ئۇ توغرا بەلباغنىڭ ئوتتۇرىسىدىن پۇتنىڭ 3 - بارمىقىغىچە سوزۇلۇپ، بىر تىك شەكىلنى ئالغان دائىرنى شەكىللەندۈرگەن. كانايچە ياللۇغ كېسەللىكلىرى، زىققە (نەپەس قىيىنلىشىش)، ئۆسمە كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولغانلاردا مۇشۇ جايلاردا مۇسبەت بەدەن بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ (56 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. (57 - رەسىمگە قاراڭ). رېفلىكس رايونىدا تىك ياكى توغرىسىغا ئۇۋۇلىنىدۇ (58 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم.



58 - رەسىم. ئۆپكە ۋە كانايچە رېف-
لىكىس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
(كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).



59 - رەسىم. يۈرەك رېفلىكىس
رايونىنىڭ ئورنى.

غىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن
ئۇۋۇلىنىدۇ.


رولى: ئۆپكە ۋە كانايچە كې-
سەللىكلىرى مەسلەن: ئۆپكە ياللۇ-
غى، كانايچە ياللۇغى، زىققە، ئۆپكە
بەل ئىششىقى قاتارلىقلارنى داۋالاش
ياكى ساقلىقنى ساقلاش.

5. يۈرەك رېفلىكىس رايونى


يۈرەك مۇھىم قان ئايلىندۇرۇش
ئەزاسىدۇر. ئۇ ئۈزۈلدۈرمەي تەرتىپ-
لىك سوقۇپ، قاننى نورمال ئايلىندۇ-
رىدۇ.

يۈرەك رېفلىكىس رايونىنىڭ
ئورنى: سول پۇتنىڭ تېگىدە، يەنى
پۇتنىڭ 4 - ، 5 - بارماقلىرى ئارى-
سىدىكى تىك سوزۇلغان سىزىق بى-
لەن 5 - بارماق ئاچان سۆڭىكى كى-
چىك بېشى تەكشىلىك سىزىقى
كېسىشكەن جايىدا (59 - رەسىمگە
قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇ-
ۋۇلاش - باش بارماق يۇمشىقى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ (60 - رەسىمگە قاراڭ)؛
ئوتتۇرا دەرىجىدە ئۇۋۇلاش - باش
بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ؛
كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - باش بارماق
ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بى-
رىلىدۇ. ئاۋۋال يېنىك ئۇۋۇلاپ ئاندىن



60 - رەسىم. يۈرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



61 - رەسىم. يۈرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

كۈچلۈك ئۇۋۇلاش، كېسەلنىڭ چىداشلىق بېرىش ئەھۋالىغا قاراپ تەدرىجىي كۈچەيتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ. يۈرەك رېفلىكس رايونى بار ئورۇندا قېلىندىراق تېرە ياغ قاتلىمى بولغاچقا، بارماق كۈچىنىڭ تېرە ئاستىغا تەسىر قىلىشى ئۈچۈن، كۈچ بېرىشتە پۈتۈن مەركىزىدىن پۈتۈن بارماقلىرى تەرىپىگە قارىتىپ ئۇۋۇلىغاندا، ئاندىن يۈرەك رېفلىكس رايونىدىكى مۇسبەت بەلگىلەرنى بايقىغىلى ۋە قاراتمىلىقى بولغان ھالدا ئۇۋۇلاپ، كېسەلنى دەل جايدا داۋالىغىلى ۋە ساقلىقنى ساقلىغىلى بولىدۇ (61 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: يۈرەك ۋە قان ئايلىنىش سىستېمىسىنىڭ كېسەللىكلىرى مەسىلەن: يۈرەك رېتىمى تەكشى بولماسلىق، يۈرەك رايونى ئاغرىش، يۈرەك مۇسكۇل ياللۇغى، تاجسىمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسىلى، قاندىكى ماي تەركىبىي يۇقىرى بولۇش، قان تومۇر قېتىش، قان بېسىمى ئۆرلەپ كېتىش، قان بېسىمى تۆۋەنلەپ كېتىش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش. يۇقىرىقى بەش رېفلىكس رايونىنى ئەگەر بىرلەشتۈرۈپ ئۇۋۇلى-



ساق، تۆۋەندىكى تەرتىپ بويىچە
ئەستە تۇتساق بولىدۇ يەنى: بىر نوقتا
(قالقان يان بەز رېفلېكس رايونى)،
بىر ھالقا (قالقانبەز رېفلېكس رايونى).
ئىككى توغرا بىر تىك (قىيپاش
چاسا مۇسكۇل رېفلېكس رايونى،
ئۆپكە ۋە كانايچە رېفلېكس رايونى)
يۈرەك سول تەرەپ چوڭقۇر بېرىدە.

IV گۇرۇپپا سول پۇت تاپان ئوتتۇرىسى

بۇ گۇرۇپپا ئاشقازان، ئاشقازان ئاستى بېزى، 12 بارماق ئۈچەي،
كۆندىلەك بوغماق ئۈچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، «S» شەكىللىك

62 - رەسىم. ئاشقازان رېفلېكس
رايونىنىڭ ئورنى.



بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي، ئىند-
چىك ئۈچەي، مەقەت، تال قاتارلىق
توققۇز رېفلېكس رايونىنى ئۆز ئىچىد-
گە ئالغان بولۇپ، ئاساسىي جەھەتتىن
قورساقنىڭ سول تەرىپىگە ماس كې-
لىدۇ.

1. ئاشقازان رېفلېكس رايونى

ئاشقازان مۇھىم ھەزىم قىلىش
ئەزاسى بولۇپ، يېمەكلىكلەرنى قو-
بۇل قىلىش، ئاشقازان سۇيۇقلۇقى
ئاجرىتىپ چىقىرىش، يېمەكلىكلەر-
نى دەسلەپكى قەدەملىك ھەزىم قى-
لىش ئىقتىدارىغا ئىگە.

ئاشقازان رېفلېكس رايونىنىڭ
ئورنى: ئىككى پۇت ئاستى ئىچكى
يان تەرەپ 1 - تاپان سۆڭەك كىچىك
بېشىنىڭ كەينى تەرىپىدە (62 - رە-
سىمگە قاراڭ).

63 - رەسىم. ئاشقازان رېفلېكس رايونى-
نىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋ-
لاش).



ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (63 - رەسىمگە قاراڭ)؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش: كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (64 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى : ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.


64 - رەسىم. ئاشقازان رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

رولى: ئاشقازان ۋە ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنىڭ كېسەللىكلىرى مەسىلەن: كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق ئېسىلىش، ئاشقازان ئاغرىش، ئاشقازان كىسلاتاسى ئېشىپ كېتىش، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان، ئۈچەي ياللۇغى، ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

2. ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونى

ئاشقازان ئاستى بېزى ئاشقازاننىڭ ئارقا تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، تار ئۇزۇنچاق كېلىدۇ. ئېغىرلىقى تەخمىنەن 70 g كېلىدۇ. ئۇ ئاشقازان ئاستى بەز سۇيۇقلۇقى ئاجرىتىپ چىقىرىپ، يېمەكلىكلەر، بولۇپمۇ ئاقسىل ۋە مايىنى ھەزىم قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ. ئۇ يەنە ئىنسۇلىن ئاجرىتىپ چىقىرىپ، ئادەم بەدىنىنىڭ شېكەر، ئاقسىل ۋە ماي مېتابولىزىمدا مۇھىم تەڭشەش رولىنى ئوينايدۇ.

ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تالپىنىڭ ئاستى تەرەپ ياندا، ئاشقازان رېفلىكس رايونىنىڭ كەينى تەرىپىدە.



65 - رەسىم. ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



66 - رەسىم. ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

پىدە (65 - رەسىمگە قاراڭ).


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ بارماق يۇمشىقى ياكى بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (66 - رەسىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (67 - رەسىمگە قاراڭ). قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئۆزىدىكى كېسەللىكلەر (ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى قاتارلىقلار) ۋە ئاشقازان ئاستى بېزى ئىقتىدارىنىڭ ياخشى بولماسلىقى كەلتۈرۈپ چىقارغان كېسەللىكلەر مەسىلەن: دىئابېت، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.




67 - رەسىم. ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

3. 12 بارماق ئۈچەي رېفلىكس رايونى



68 - رەسىم. 12 بارماق ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



69 - رەسىم. 12 بارماق ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).


12 بارماق ئۈچەي ئىنچىك ئۇ- چەينىڭ باشلىنىش قىسمى بولۇپ، يۇقىرى تەرىپى ئاشقازاننىڭ چىقىش ئېغىزى بىلەن تۇتىشىدۇ، ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 30 ~ 25 كېلىدۇ. C شە- كىلدە ئاشقازان ئاستى بېزىنى ئوراپ تۇرىدۇ.

12 بارماق ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تاپىنى ئاستى يان تەرىپىدە، ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونىنىڭ كەينى تەرىپىدە (68 - رەسىمگە قاراڭ).


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇ- لاش - باش بارماق يۇمشىقى ياكى باش بارماق ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىد- لىدۇ (69 - رەسىمگە قاراڭ)؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچىدا كۈچ بېرىلىدۇ (70 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، دا- ۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇلد- نىدۇ.

رولى: ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۇ-



70 - رەسىم. 12 بارماق ئۈچەي رېف-
لىپكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
(كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).




71 - رەسىم. كۆندىلەك بوغماق ئۇ-
چەي رېفلىپكس رايونىنىڭ ئورنى.

چەي كېسەللىكلىرى، مەسىلەن: قور-
ساق ئېسىلىش، قورساق ئاغرىش، ھە-
زىم قىلىش ناچارلىشىش، ئىشتىھاسى
تۈتۈلۈش، يېمەكلىك بىلەن زەھەرلە-
نىش، ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۈچەي
ياريىسى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساق-
لىقنى ساقلاش.


4. كۆندىلەك بوغماق ئۈچەي رېف- لىپكس رايونى

كۆندىلەك بوغماق ئۈچەي قور-
ساق قىسمىغا جايلاشقان، ئۇ قورساق-
نىڭ ئوڭ تەرەپ يۇقىرى قىسمىدا
باشلىنىپ، بېشى يۇقىرى كۆتۈرۈل-
گۈچى بوغماق ئۈچەيگە تۇتىشىدۇ،
ھەمدە قورساق قىسمىنى توغرىسىغا
كېسىپ ئۆتۈپ قورساقنىڭ سول تە-
رەپ يۇقىرى قىسمىدا تالغا يېقىن
جايدا تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەيگە
تۇتىشىدۇ. كۆندىلەك بوغماق ئۈچەي
چوڭ ئۈچەينىڭ بىر قىسمى بولۇپ،
ئۇنىڭ رولى ئوزۇقلۇق ماددىلارنى قو-
بۇل قىلىپ، كېرەكسىز نەرسىلەرنى
يۆتكەپ بېرىش.

كۆندىلەك بوغماق ئۈچەي رېف-
لىپكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت
تاپان يۈزى ئوتتۇرىسىغا جايلاشقان،
تاپاننى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتۈپ بىر
توغرا بەلباغنى ھاسىل قىلغان (71 -
رەسىمگە قاراڭ).



72 - رەسىم. كۆندىلەك بوغماق
ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇ-
لاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



73 - رەسىم. كۆندىلەك بوغماق ئۇ-
چەي رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇ-
لاش - باش بارماقنىڭ بۇمىشى ياكى
ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (72 - رە-
سىمگە قاراڭ)؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش -
كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئوتتۇرىسى
بوغۇم ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ
(73 - رەسىمگە قاراڭ). سول پۇتنى
پۇتنىڭ ئىچكى يان تەرىپىدىن تاشقى
يان تەرىپىگە قارىتىپ، ئوڭ پۇتنى
پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپىدىن ئىچكى
يان تەرىپىگە قارىتىپ رېفلىكس را-
يونىنى بويلاپ ئۇۋۇلاش لازىم.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا
ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، دا-
ۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇل-
ىندۇ.

رولى: ھەزىم قىلىش سىستېمى-
سىنىڭ كېسەللىكلىرى مەسىلەن:
قورساق ئاغرىش، ئىچى سۈرۈش، ئۇ-
چەي ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە
ساقلىقنى ساقلاش.

5. تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونى

تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي
قورساقنىڭ سول تەرەپ يۇقىرى
قىسمىدىن باشلىنىپ، كۆندىلەك
بوغماق ئۈچەي بىلەن تۇتىشىپ،
قورساقنىڭ سول يان تەرىپىدىن تۆ-



74 - رەسىم. تۆۋەنلىگۈچى بوغماق
ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



75 - رەسىم. تۆۋەنلىگۈچى بوغماق
ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلى.

ۋەنلەپ، سول تەرەپ قورساق ئاستى
«S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەي بى-
لەن تۇتىشىدۇ. تۆۋەنلىگۈچى بوغماق
ئۈچەي چوڭ ئۈچەينىڭ بىر قىسمى
بولۇپ، ئۇنىڭ رولى ئوزۇقلۇق ماددى-
لارنى قوبۇل قىلىپ، كېرەكسىز ماد-
دىلارنى يۆتكەپ بېرىش.

تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي
رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: سول
پۇت تاپان يۈزىنىڭ سىرتقى يان تە-
رىپىگە جايلاشقان. يۇقىرىدىن كۆند-
دىلەك بوغماق ئۈچەي رېفلىكس را-
يونىغا تۇتىشىپ، پۇت تاشقى يان تە-
رەپ بىلەن پاراللېللىشىپ تىك شە-
كىلدە ئالدى تەرىپىدە توختايدۇ (74 -
رەسىمگە قاراڭ).


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇ-
لاش - باش بارماق ئۈچى بىلەن كۈچ
بېرىلىدۇ؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆر-
سەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى
بىلەن كۈچ بېرىپ تەرەپ يۆنىلىشىگە
قارىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ.

ئۇۋۇلاش قېتىم سانى: ساقلىقنى
ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم-
غىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن
ئۇۋۇلىنىدۇ (75 - رەسىمگە قاراڭ).

رولى: ھەزىم قىلىش سىستېمى-
سىنىڭ كېسەللىكلىرى مەسىلەن:

قورساق ئاغرىش، ئىچى سۈرۈش، ئۇ-
چەي ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە
ساقلىقنى ساقلاش.

6. «S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونى



76 - رەسىم. «S» شەكىللىك
بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي
رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.




77 - رەسىم. «S» شەكىللىك بوغماق
ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېفلىكس
رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك
ئۇۋۇلاش).


«S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەي
قورساقنىڭ سول تەرەپ تۆۋەنكى
قىسمىغا جايلاشقان. ئۇ «S» شەكىلدە
ئىگىلىپ يۇقىرى تەرىپى تۆۋەنلىگۈ-
چى بوغماق ئۈچەي بىلەن، تۆۋەن تە-
رىپى تۈز ئۈچەي بىلەن تۇتىشىدۇ.
تۈز ئۈچەي قورساقنىڭ سول تەرەپ
تۆۋەنكى بوشلۇقىغا جايلاشقان. ئۇ-
زۇنلۇقى 12 ~ 15cm كېلىدۇ. يۇقىرى
تەرىپى «S» شەكىللىك بوغماق ئۇ-
چەي بىلەن، تۆۋەن تەرىپى مەقئەت
بىلەن تۇتىشىدۇ. ئۇنىڭ رولى چوڭ
تەرەتنى يۆتكەپ چىقىرىپ تاشلاش.

«S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەي
ۋە تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ
ئورنى: سول پۇت ئاستى تەرەپ ئۆكچە
ئالدىدا بىر توغرا بەلباغنى ھاسىل
قىلغان (76 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇ-
لاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ
بېرىلىدۇ (77 - رەسىمگە قاراڭ);



78 - رەسىم. «S» شەكىللىك بوغماق
ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېفلىكس را-
يونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك
ئۇۋۇلاش).



79 - رەسىم. ئىنچىك ئۈچەي
رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بار-
ماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ
بېرىلىدۇ. پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپىدە-
دىن ئىچكى يان تەرىپىگە قارىتىپ
ئۇۋۇلىنىدۇ (78 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا
ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، دا-
ۋالاشتا قېتىم سانى چەكلەنمەيدۇ.


رولى: «S» شەكىللىك بوغماق
ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي كېسەللىكلىرى
مەسىلەن: ياللۇغلىنىش، قەۋزىيەت
بولۇپ قېلىش، مۇنچاق گۆش ئۆسۈپ
قېلىش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساق-
لىقنى ساقلاش.

7. ئىنچىك ئۈچەي رېفلىكس رايونى

ئىنچىك ئۈچەي قورساق بوش-
لۇقىغا جايلاشقان. يۇقىرىسى ئاشقا-
زاننىڭ چىقىش ئېغىزىدىن باشلى-
نىپ، تۆۋەن تەرىپى چوڭ ئۈچەي بى-
لەن تۇتىشىدۇ. ئىنچىك ئۈچەي يې-
مەكلىك ھەزىم قىلىپ، ئوزۇقلۇق
قوبۇل قىلىدىغان مۇھىم سورۇن.
ئىنچىك ئۈچەي ئۆزلۈكسىز لۆمۈلدەپ
ھەرىكەتلىنىپ ئىچىگە كىرگەن ماد-
دىلارنى ئالدىغا ھەرىكەتلەندۈرۈپ تۇ-



80 - رەسىم. ئىنچىك ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).




81 - رەسىم. ئىنچىك ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

رۇش بىلەن بىرگە، ئۈچەي سۇيۇقلۇق قىنى ئاجرىتىپ چىقىرىپ ھەزىم قىلىدۇ، ھەمدە ئۇزۇقلۇق تەركىبىنى ئۆزىگە قوبۇل قىلىدۇ. ئىنچىك ئۈچەيدە يەنە لىمفا توقۇلمىلىرى بولۇپ، زىيانلىق مىكروبلارنى يوقىتالايدۇ.

ئىنچىك ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تاپان ئاستى تەرىپى ئوتتۇرا قىسمىدىكى ئويما دائىرىدە بولۇپ، يۇقىرى كۆتۈرۈلگۈچى بوغماق ئۈچەي، كۆندىلەك بوغماق ئۈچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، «S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرى ئوراپ تۇرىدۇ (79 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (80 - رەسىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماق ۋە ئوتتۇرا بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بىلەن پۇت مەركىزىدىن ئۆتكۈچە تەرىپىگە قارىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (81 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.



82 - رەسىم. مەقئەت رېفلىپكىس رايونىنىڭ ئورنى.



83 - رەسىم. مەقئەت رېفلىپكىس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

رولى: ئىنچىك ئۈچەي ۋە ھەزىم قىلىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى مەسىلەن: ئاشقازان - ئۈچەي كۆپۈش، قورساق ئاغرىش، ئىچى سۈرۈش، ئۆت-كۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك ئۈچەي ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

8. مەقئەت رېفلىپكىس رايونى

مەقئەت رېفلىپكىس رايونىنىڭ ئورنى: سول پۇت ئاستى يان تەرىپى، ئۆكچىنىڭ ئالدى يان تەرىپىدە (82 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بىلەن ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (83 - رەسىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بار - ماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ، رېفلىپكىس رايونىدا نوقتىا بەلگىلەپ ئۇۋۇلىنىدۇ (84 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: مەقئەت كېسەللىكلىرى مەسىلەن: قەۋزىيەت، بوۋاسىر، ئاقما،

سۇڭى چىقىپ قېلىش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.




9. تال رېفلىكس رايونى

تال قورساقنىڭ سول تەرەپ يۈ- قىرى قىسمىغا جايلاشقان بولۇپ، زا- پاس قان ساقلاش ئىقتىدارىغا ئىگە. تەخمىنەن 30% قان پلاستىنكىلىرى ساقلىنىدۇ، ھەمدە لىمفا ھۈجەيرىلىرى ۋە ئانتىبىلا ھاسىل قىلىپ، بەدەننىڭ ئىممۇنىت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشكە قاتنىشىدۇ. تال باكتېرىيە يوقىتىپ، قاندىكى بەزى غەيرىي نەرسىلەرنى تازىلايدۇ. ئۇ مۇھىم ئىممۇنىت ئەزادۇر.

84 - رەسىم. مەقەت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

تال رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: سول پۇت تاپاننىڭ 4 - ، 5 - پۇت بارماقلىرى ئوتتۇرىسىدىكى تىك سو- زۇلغان سىزىق ئۈستىدە، يەنى يۈرەك رېفلىكس رايونى ئۆكچە تەرىپىگە قا- رىغان بىر توغرا سىزىق ئۈستىدە (85 - رەسىمگە قاراڭ).




ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇ- لاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (86 - رەسىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - رېفلىكس رايونىدا نوقتىا بەلگىلەپ ئۇۋۇلىنىدۇ

85 - رەسىم. تال رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

(87 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا
ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، دا-
ۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇل-
نىدۇ.

رولى: تالنىڭ ئۆزىدىكى كې-
سەللىكلەردىن باشقا، ئادەتتە قان ئاز-
لىق، تېرە كېسەللىكلىرى، ئىشتىھا-
سىزلىق، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش،
قىزىش، ياللۇغلىنىش قاتارلىق كې-
سەللەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساق-
لاش ئارقىلىق بەدەننىڭ ئىممۇنىت
ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش.




86 - رەسىم. تال رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

يۇقىرىقى توققۇز رېفلىكس را-
يونى ساقلىقنى ساقلاش ئۈچۈن پۈ-
تۈن پۇتنى ئۇۋۇلاشتا بىرلەشتۈرۈپ
ئۇۋۇلسا ۋە تۆۋەندىكى تەرتىپ بويىچە
ئەستە تۇتسا بولىدۇ:

ئۈچ نوقتىدا بىر سىزىق: (ئاشقا-
زان، ئاشقازان ئاستى بېزى، 12 بارماق
ئۈچەي ئۈچ رېفلىكس رايونى).

ئۈچ سىزىق بىر يۈز (تۈز بوغ-
ماق ئۈچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق
ئۈچەي، «S» شەكىللىك بوغماق ئۈ-
چەي ۋە تۈز ئۈچەيدىن ئىبارەت ئۈچ
رېفلىكس رايونى ئىنچىك ئۈچەي
رېفلىكس رايونى ئوراپ تۇرىدۇ).
بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئىككى قارىمۇ
قارشى بۇلۇڭ نوقتىلىرى (سول تەرەپ
يۇقىرى بۇلۇڭى تال رېفلىكس رايونى،
ئوڭ تەرەپ تۆۋەنكى بۇلۇڭى مەقئەت
رېفلىكس رايونى) قوشۇلىدۇ.



87 - رەسىم. تال رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).


بەشىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى (3)

V گۇرۇپپا پۇتنىڭ ئىچكى يان تەرىپى

بۇ گۇرۇپپا بويۇن ئومۇرتقىسى، كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، قىسى، توققۇز كۆز سۆڭىكى، قۇيرۇق سۆڭىكى، مەزى يېزى، بالىياتقۇ، سۈيۈك يولى، جىنسىي يول، يانپاش بوغۇم، تۈز ئۈچەي، مەقەت ۋە چات ئېرىقچىسى قاتارلىق 10 رېفلىكس رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاساسىي جەھەتتىن ئادەم تېنىنىڭ مەركىزىي سىزىقى (يۇلۇن ئومۇرتقىسى) ۋە مەركىزىي سىزىق ئەتراپى داس بوشلۇقىدىكى ئەزالار بىلەن ماس كېلىدۇ.

1. بويۇن ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونى

بويۇن ئومۇرتقىسى يولۇن ئومۇرتقىسىنىڭ ئەڭ يۇقىرى تەرىپىگە




جايلاشقان. يەتتە بوغۇم بويۇن ئومۇرتقىسىدىن تەشكىل تاپقان. يۇقىرى رىسى باش سۆڭىكى بىلەن تۇتۇشۇپ باش قىسمىنىڭ ھەر خىل ھەرىكەتلىرىنى ئىشلىتىشكە تىرەك بولىدۇ.

بويۇن ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت باش بارماقلىرى يىلتىز قىسمى ئىچكى يان تەرەپ توغرا سىزىقىنىڭ ئاخىرقى ئۇچىدا (88 - رەسىمگە قاراڭ).

88 - رەسىم. بويۇن ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



89 - رەسىم. بويۇن ئومۇرتقىسى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى



90 - رەسىم. بويۇن ئومۇرتقىسى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماقنىڭ ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارماقنى ئامبۇر شەكلىدە ئېگىپ ئۇ- ۋۇلاتقۇچىنىڭ پۇت باش بارماقنى قىسىپ، كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ يان گىرۋىكى بىلەن رېفلېكس رايونىغا كۈچ بېرىلىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا يەنە باش بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بار- ماقنى بېسىپ كۈچەيتىسە بولىدۇ.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، دا- ۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇل- ىندۇ (89 - ، 90 - رەسىمگە قاراڭ).

رولى: بويۇن ئېچىشىپ ئاغرىش، بويۇن قېتىش، بويۇننىڭ ھەر خىل كېسەللىكلىرى (سۆڭەك ئۆسۈپ قې- لىش ۋە بويۇن ئومۇرتقىسى كېسىلى كەلتۈرۈپ چىقارغان قول سىرقىراش، قول ئاغرىش قاتارلىقلار) نى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

2. كۆكرەك ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونى

كۆكرەك ئومۇرتقىسى يولۇن ئومۇرتقىسىنىڭ يۇقىرى بۆلىكىگە جايلاشقان. يۇقىرىسى بويۇن ئومۇرتقىسى بىلەن، تۆۋەندىن بەل ئومۇرتقىسى بىلەن تۇتىشىدۇ. ئۇ 12 بوغۇم كۆكرەك ئومۇرتقا سۆڭىكىدىن تەشكىل تاپقان. كۆكرەك ئومۇرتقىسى يولۇن ئومۇرتقىسىنىڭ بىر بۆلىكى بولۇپ، ھەرىكەت قىلغاندا پۈتۈن بەدەننىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلايدۇ.



91 - رەسىم. كۆكرەك ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

كۆكرەك ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت ئىچكى يان گىرۋەك 1 - تا. پان سۆڭىكى كىچىك بېشىدىن 1 - تاپان سۆڭىكى تومپايمىسىدە - غىچە (91 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلدۇ. كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - ئۇۋۇلاشنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىلدۇ.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: مۇرە ئېچىشىپ ئاغرىش ۋە كۆكرەك ئومۇرتقىسىنىڭ ھەر خىل كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.




92 - رەسىم. كۆكرەك ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش.

3. بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونى

بەل ئومۇرتقىسى ئومۇرتقىنىڭ ئوتتۇرا بۆلىكىگە جايلاشقان بولۇپ، يۇقىرىسى كۆكرەك ئومۇرتقىسى بىلەن، تۆۋەن تەرىپى توققۇز كۆز سۆڭىكى بىلەن تۇتىشىدۇ. ئۇ بەش بوغۇم بەل ئومۇرتقا سۆڭىكىدىن تەشكىل تاپقان. بەل ئومۇرتقىسى ئومۇرتقىنىڭ بىر بۆلىكى، ئومۇرتقا ئادەم تېنىنىڭ تۈۋرۈكى بولۇپ، بەدەن ھەرىكەتلەنگەندە تەننىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلايدۇ.

بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت ئىچكى يان گرۇپكىدىكى شىنسىمان سۆڭەك بىلەن قىيىقسىمان سۆڭەكنىڭ تۆۋەن تەرىپىگىچە، ئالدى تەرىپى كۆكرەك ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونى بىلەن، ئارقا تەرىپى توققۇز كۆز




93 - رەسىم. بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

رېفلىكس رايونى بىلەن تۇتىشىدۇ (93 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بار-ماقنىڭ يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (ئۇۋۇلاشنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىلىدۇ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ (94 - رەسىمگە قاراڭ).




94 - رەسىم. بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

رولى: ئۆتكۈر خاراكتېرلىك بەل چىم بولۇش، بەل ئېچىشىپ ئاغرىش، بەل ئومۇرتقا تەخسىسى چوقچىيىش، سۆڭەك ئۆسۈپ قېلىش ۋە باشقا بەل ئومۇرتقا كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

4. توققۇز كۆز سۆڭىكى رېفلىكسى رايونى

توققۇز كۆز سۆڭىكى ئومۇرتقىنىڭ ئاخىرقى بۆلىكىگە جايلاشقان. يۇقىرىسى بەل ئومۇرتقىسى بىلەن، تۆۋەن تەرىپى قۇيرۇق سۆڭىكى بىلەن تۇتىشىدۇ. ئۇ بەش پارچە توققۇز كۆز ئومۇرتقا سۆڭىكىنىڭ چېتىلىشىدىن تەركىب تاپقان.




95 - رەسىم. توققۇز كۆز سۆڭىكى رېفلىكسى رايونىنىڭ ئورنى.

توققۇز كۆز سۆڭىكى رېف-لىكسى رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت ئىچكى يان گىرۋەك ئوشۇق ئاستىدىن ئۆكچە سۆڭىكىگىچە، ئالدى بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكسى رايونىغا، كەينى قۇيرۇق سۆڭىكى رېفلىكسى رايونىغا تۇتىشىدۇ (95 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە يېنىك ۋە كۈچلۈك ئۇۋۇلىنىدۇ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.


رولى: توققۇز كۆز سۆڭىكى ئۆسۈش، توققۇز كۆز ئومۇرتقىسى زەخىملىنىش، ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.



96 - رەسىم. توققۇز كۆز سۆڭىكى رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلاش.

5. قۇيرۇق سۆڭىكى ۋە كاسا رېفلىكسى رايونى

قۇيرۇق سۆڭىكى ئومۇرتقىنىڭ قۇيرۇق قىسمى بولۇپ، 5 - 4 تال چېكىنگەن قۇيرۇق ئومۇرتقىسىنىڭ بىرىكىشىدىن ھاسىل بولغان، يۈ-قىرىسى توققۇز كۆز سۆڭىكى بىلەن تۇتىشىدۇ، ئاستى ئۈچى ئاجرىلىپ تۇرىدۇ.




97 - رەسىم. قۇيرۇق سۆڭىكى ۋە كاسا رېفلىكسى رايونىنىڭ ئورنى.

قۇيرۇق سۆڭىكى ۋە كاسا رېف-لىكسى رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۈت ئۆكچە كەينى گىرۋىكىدىن ئىچكى يان گىرۋەك بەلباغسىمان دائىرىدە (97 - رەسىمگە قاراڭ).
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق-نى تاپاننىڭ ئۆكچە قىسمىدا تۇر-غۇزۇپ، كۆرسەتكۈچ بارماقنى ئورغاق شەكلىدە ئېگىپ، كۆرسەتكۈچ بار-ماق يان گىرۋىكى بىلەن كۈچ بې-

رىپ ئۆكچىنى بويلاپ، ئۈستىدىن ئاستىغا قارىتىپ ئۆكچە ئىچكى يان گىرۋىكىگىچە ئۇۋۇلىنىدۇ (ئۇۋۇ-لاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخ-شاشمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.


رولى: ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىش، قۇيرۇق سۆڭەك زەخمە ئاسارىتى قاتارلىقلارنى دا-ۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.



98 - رەسىم. قۇيرۇق سۆڭىكى ۋە كاسا رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

6. مەزى بەزى ۋە بالياتقۇ رېفلىكس رايونى

ئەرلەردە: مەزى بەزى دوۋساقنىڭ ئاستى تەرىپىگە جايلاشقان، دوۋساق بويىنى ۋە سۈيدۈك يولىنىڭ باشلىنىش قىسمىنى ئوراپ تۇرىدۇ. مەزى بەزى ئاق سۈت رەڭگىدە ئاجىز ئىشقارلىق سويۇقلۇق ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ، بۇ ئىسپىرىمنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. ياشانغانلارنىڭ مەزى بەزى قوشقۇچى توقۇلمىلىرى ئۆسۈپ مەزى بەزى يوغاناپ كەتسە، سۈيە-دۈك يولىنى بېسىپ سېيىش قىيىنلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاياللاردا: بالياتقۇ داس بوشلۇقىنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان، ئۇ ئۇ-



99 - رەسىم. مەزى بەزى ۋە بالياتقۇ رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.




100 - رەسىم. مەزى بەزى ۋە بالياتقۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (1).

رۇقنى قوبۇل قىلىپ يېتىلدۈرۈپ تۆرەلمە قىلىدىغان سورۇن.

مەزى بەزى ۋە بالياتقۇ رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت ئۆكچىسىنىڭ يان تەرىپىدە، يەنى ئىچكى ئوشۇق ئارقا ئاستى تەرىپىدىكى ئۈچ بۇرجەك دائىرىدە (99 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق يۇمشىقى ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق يان گىرۈكى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. ئۇۋۇلاشنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشىمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (100 - ، 101 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم.



101 - رەسىم. مەزى بېزى ۋە
بالياتقۇ رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (2).

غىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن
ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: ئەزلەردە مەزى بېزى يو-
غىناپ كېتىش، مەزى بېزى ياللۇغى
قاتارلىقلار كەلتۈرۈپ چىقارغان
پات- پات سۈيدۈك قىستاش، سە-
يىش قىيىنلىشىش قاتارلىق مەزى
بېزى كېسەللىكلىرىنى؛ ئاياللاردا
بالياتقۇ مۇسكۇل ئۆسمىسى، بالد-
ياتقۇ ئىچكى پەردىسى ئورۇن يۆت-
كەش، بالياتقۇ بېشى ياللۇغى، بالد-
ياتقۇ تۆۋەنلەپ كېتىش ۋە ھەيز
ئاغرىتىپ كېلىش، ھەيز قالايمىقان-


لىشىش قاتارلىق ئاياللار كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

7. سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول رېفلىكس رايونى


ئەزلەرنىڭ سۈيدۈك يولى دوۋساقىتىن باشلىنىپ، زەكەر بېشىدا
توختايدۇ. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 20 - 16 كېلىدۇ. قوشۇمچە سۈيدۈك
چىقىرىش، ئۇرۇق يوللاش ئىقتىدارىغا ئىگە.

ئاياللارنىڭ سۈيدۈك يولى دوۋساقىتىن جىنسىي يولغىچە ئومۇمىي
ئۇزۇنلۇقى 5cm ~ 3 ئەتراپىدا كېلىدۇ. پەقەتلا سۈيدۈك چىقىرىش ئىقتى-
دارىغا ئىگە. ئاياللارنىڭ جىنسىي يولى بالياتقۇ بىلەن تۇتىشىدۇ، ئۇ ئا-
ياللارنىڭ جىنسىي ئالاقە قىلىدىغان ئەزاسى بولۇپ، ئىسپىرما قوبۇل قى-
لىپ، ھەيز چىقىرىدىغان، شۇنداقلا بالا تۇغۇلىدىغان يول.


سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى
پۇت ئۆكچىسى ئىچكى يان تەرىپىدە، يەنى دوۋساق رېفلىكس رايونىنىڭ
يانتۇ ئارقا تەرەپ يۇقىرىسىدىكى بەلباغسىمان دائىرىدە (102 - رەسىمگە
قاراڭ).



102 - رەسىم. سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول رېفلىكس رايونى.



103 - رەسىم. سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.



104 - رەسىم. يانپاش بوغۇم (ئىچكى يان تەرىپى) رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ. (103 - رەسىمگە قاراڭ).

رولى: سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يولدىكى ھەر خىل كېسەللەكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

8. يانپاش بوغۇم (ئىچكى يان تەرىپى) رېفلىكس رايونى


يانپاش بوغۇمى بىر پۈتۈن ئادەم بەدىنىنىڭ يۇقىرى تەرىپى بىلەن ئاياغ تەرەپنى داس قىسمىدا توتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان مۇھىم پائالىيەت بوغۇمدۇر.

يانپاش بوغۇم رېفلىكس رايونىنىڭ (ئىچكى يان تەرىپى) ئورنى: ئىككى پۇت ئىچكى يان تەرىپىنىڭ ئىچكى ئوشۇق تۆۋەندىكى تەرىپىدە (104 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن ئۇۋۇلىنىدۇ (ئېھتىياجىغا ئاساسەن



105 - رەسىم. يانپاش بوغۇم (ئىچكى يان تەرىپى) رېفلىكس رايونىنى ئۇ-ۋۇلاش ئۇسۇلى.



106 - رەسىم. تۈز ئۈچەي ۋە مەقەت رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

ئوخشاشمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ). ئىچكى ئۇشۇق تۆۋەندىكى تەرىپىنى بويلاپ ئىتتىرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ (105 - رەسىمگە قاراڭ).
رولى: يانپاش سۆڭەك ئاغرىش، ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىش، بەل، مۇرە ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

9. تۈز ئۈچەي ۋە مەقەت رېفلىكس رايونى

تۈز ئۈچەي چوڭ ئۈچەينىڭ ئاخىرقى بۆلىكى بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 15 ~ 12 كېلىدۇ. يۇقىرىسى «S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەيگە، تۆۋەن مەقەتكە تۇتىشىدۇ. ئۇ چوڭ تەبىئىي ۋاقىتلىق ساقلايدىغان ۋە سىرتقا چىقىرىدىغان ئەزادۇر. تۈز ئۈچەي ۋە مەقەت رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت ئىچكى يان تەرىپى، ئىچكى ئۇشۇق كەينى تەرىپىدىن ئۈستىگە سوزۇلغان بەلباغسىمان دائىردە (106 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە كۈچ

بېرىلىدۇ (107 - ، 108 - رەسىملەرگە قاراڭ).



قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: بوۋاسىر، قەۋزىيەت، سوۋى چىقىش، تۈز ئۈچەي ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

107 - رەسىم . تۈز ئۈچەي ۋە مەقئەت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى

10. چات (چات ئېرىقچىسى) رېفلىكس رايونى



چات دېگەنىمىز - قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمى ئىككى تەرىپىدىكى ئۈچ بۈرجەك دائىرىنى كۆرسىتىدۇ. ئەرلەرنىڭ ئۇرۇقدان بېغى، ئاياللارنىڭ بالىپاتقۇ يۇمىلاق تارتمۇشى چات ئېرىقچە كانىلىدىن ئۆتۈپ، قورساق دىۋارىدا بىر يېرىق ھاسىل قىلىدۇ. شۇڭا، چۇقۇق (گىرىز) كۆپىنچە شۇ دائىرىدە پەيدا بولىدۇ.

چات رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت ئىچكى يان تەرىپى، ئىچكى ئۇشۇق چوققىسىنىڭ تۆپىسىدىكى ئىككى تۈز ترناقچىلىك ئويما جايىدا (109 - رەسىمگە قاراڭ).

108 - رەسىم . تۈز ئۈچەي ۋە مەقئەت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى



109 - رەسىم. چات (چات ئېرىقىچە -
سى) رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



110 - رەسىم. چات (چات ئېرىقىچىسى)
رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

سوزۇق (يانتۇ سوزۇق - سۈيدۈك يولى ۋە جىنسى يول رېفلىكس رايونى، يانپاش بوغۇم رېفلىكس رايونى، سوزۇلما سوزۇق - تۈز ئۇچەي ۋە مەقئەت رېفلىكس رايونى).
ئىچكى ئۇشۇق يۇقىرىسىدا چىكىتچە (چات رېفلىكس رايونى).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق -
نىڭ يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ، ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا
ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە
كۈچ بېرىلىدۇ. (110 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا
ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم -
غىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن
ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: چات چۇقۇقى ۋە جىندە -
سى ئەزا كېسەللىكلىرىنى داۋالاش
ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

يۇقىرىقى 10 رېفلىكس رايونى -
نى ئۇۋۇلاشتا ئۇنتۇپ قېلىشتىن
ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۆۋەندىكى تەرەپ -
تەپ بويىچە ئەستە تۇتسا بولىدۇ.
يەنى:

پۇت ئەگمىسى بىر سىزىقتا (-)
پۇتنىڭ ئىچكى يان گىرۋىكى، بو -
يۇن ئومۇرتقىسى، كۆكرەك ئومۇرتقىسى،
قەيسى، بەل ئومۇرتقىسى، توققۇز كۆز
سۆڭىكى، قۇيرۇق سۆڭىكى قاتارلىق
بەش رېفلىكس رايونى بىر سىزىقتا
تۇتاشقان بولۇپ، ئادەتتە پۇت ئەگ -
مىسى دەپ ئاتىلىدۇ، ئادەم تېنىنىڭ
ئومۇرتقىسىغا ماس كېلىدۇ).

ئىچكى ئۇشۇق تۆۋىنى بىر
تۇتاش (مەزى بەزى ۋە بالىياتقىۋ
رېفلىكس رايونى).


يانتۇ سوزۇق، ياي سوزۇلما
سوزۇق (يانتۇ سوزۇق - سۈيدۈك يولى ۋە جىنسى يول رېفلىكس رايونى، يانپاش بوغۇم رېفلىكس رايونى، سوزۇلما سوزۇق - تۈز ئۇچەي ۋە مەقئەت رېفلىكس رايونى).

VI گۇرۇپپا پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپى

بۇ گۇرۇپپا جىنسىي بەز، يانپاش بوغۇم (تاشقى يان تەرىپى)، قور-
ساقنىڭ تۆۋەن تەرىپى، تىز، جەينەك، يەلكە (مۈرە)، تاغاق سۆڭىكى قا-
تارلىق يەتتە رېفلىپكس رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئادەم تېنىنىڭ تاشقى
يان تەرىپىدىكى (ئادەم تېنى مەركىزىي سىزىقىنىڭ چەترەك تەرىپى) ئە-
زالارغا ماس كېلىدۇ.

1. جىنسىي بەز رېفلىپكس رايونى

ئەرلەرنىڭ جىنسىي بەزى ئۇرۇقداندۇر. ئۇرۇقدان - ئۇرۇقدان خال-
تىسى ئىچىگە جايلاشقان بولۇپ، ئوڭ - سول تەرەپتە بىردىن بولىدۇ. ئۇ
ئۇرۇق (ئىسپېرما) ئىشلەپچىقىرىدىغان ۋە ئەرلىك ھورمون ئاجرىتىپ
چىقىرىدىغان ئەزادۇر.



III - رەسىم. جىنسىي بەز
رېفلىپكس رايونىنىڭ ئورنى (1).


ئاياللارنىڭ جىنسىي بەزى تۈ-
خۇمداندۇر. تۇخۇمدان داس سۆڭىكى
ئىچىگە جايلاشقان بولۇپ، ئوڭ - سول
تەرەپتە بىردىن بولىدۇ. ئۇ تۇخۇم
ئىشلەپچىقىرىدىغان ۋە ئاياللىق ھور-
مون ئاجرىتىپ چىقىرىدىغان ئەزادۇر.
جىنسىي بەز رېفلىپكس رايونى-
نىڭ ئورنى: ① ئىككى پۇت تاپان
ئاستى ئۆكچە مەركىزىدە (III - رەسىم-
گە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلا-
ش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ



بېرىلىدۇ (112 - رەسىمگە قاراڭ)؛
كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ
بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ. كۈچ يېتىشمىگەندە
ئۇۋۇلاش تاياقچىسى قاتارلىق ئەسۋاب-
لار بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (113 - رە-
سىمگە قاراڭ).


ئۇۋۇلاش قېتىم سانى: ساقلىق-
نى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش
قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا
ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.



② پۈت ئارقا ئۆكچە تاشقى
يان تەرىپىدە، يەنى تاشقى ئوشۇق
كەينى تۆۋەن تەرىپىدىكى ئۈچ بۇر-
جەك دائىرىدە (114 - رەسىمگە قاراڭ).
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق
بۇمىشى ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق
يان گىرۈكى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ.
ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخ-
شاشمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىلىدۇ
(115 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساق-
لاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغى-
چە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن
ئۇۋۇلىنىدۇ.

112 - ، 113 - رەسىم. جىنسىي بەز
رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلىرىنىڭ بىرى.




114 - رەسىم. جىنسىي بەز
لېكس رايونىنىڭ ئورنى (2).

رولى: جىنسىي ئىقتىدارى تۆ-
ۋەنلەپ كېتىش، تۇغماسلىق كېس-
لى، ھەيز كېسىلىش دەۋرى يىغىندى
ئالامىتى، ھەيز قالايمىقانلىشىش،
ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش قاتارلىق
جىنسىي ئەزالاردىكى كېسەللىكلەر-
نى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

2. يانپاش بوغۇم (تاشقى يان تە- رپى) رېفلىكس رايونى



115 - رەسىم. جىنسىي بەز رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (2).



116 - رەسىم. يانپاش بوغۇم رېفلىكس رايونىنىڭ (تاشقى يان تەرىپى) ئورنى.



117 - رەسىم. يانپاش بوغۇم (تاشقى يان تەرىپى) رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

يانپاش بوغۇم گەۋدە بىلەن ئاياغ تەرەپنى نۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان مۇ-ھىم ھەرىكەتچان بوغۇمدۇر.

يانپاش بوغۇم رېفلىكس رايونى (تاشقى يان تەرەپ) نىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تاشقى يان تەرەپ تاشقى ئوشۇقنىڭ تۆۋەن گىرۋىكىدە (116 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىپ، ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىلىدۇ، تاشقى ئوشۇق تۆۋەن گىرۋىكىنى بويلاپ ئىتتىرىپ ئۇۋۇ-لىنىدۇ.

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇ-لىنىدۇ (117 - رەسىمگە قاراڭ).


رولى: يانپاش بوغۇم ئاغرىش، ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىلىرى ئاغ-رىش، بەلنىڭ يۇقىرى تەرىپى ئاغ-رىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋا-لاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

3. قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمى رېفلىكس رايونى

قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمىدا دوۋساق، مەزى بېزى، بالياتقۇ، جىنسىي يول قاتارلىق ئەزالار بار.

قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپى، يەنى تاشقى ئوشۇقنىڭ تۆۋەندىكى بەلباغ-سىمان دائىرىدە (118 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ. ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئا.



118 - رەسىم. قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.

ساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىلىدۇ (119 - رەسىمگە قاراڭ).

رولى: مۇھىمى ئاياللار كېسەل-

لىكلىرىنى مەسلەن: ھەيز قالايمى-

قانلىشىش، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش

قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى

ساقلاش.



4. تىز رېفلىكس رايونى

تىز رېفلىكس رايونىنىڭ ئور-


نى: ئىككى پۇت تاشقى يان تەرىپىدە،

تاشقى ئوشۇق تۆۋەن تەرەپ ئۆكچە

سۆڭەك ئالدىنقى گىرۋىكىدىكى ئو-

119 - رەسىم. قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇ-


لاش ئۇسۇلى.



120 - رەسىم. تىز رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



121 - رەسىم. تىز رېفلىكس رايونىنىڭ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.



122 - رەسىم. جەينەك رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.


يۇلچاق جايدا (120 - رەسىمگە قاراڭ).
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇ-
ۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ؛ كۈچلۈك ئۇۋۇلاش -
كۆرسەتكۈچ بارماق ياكى باش بارماق
ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ
بېرىلىدۇ. رېفلىكس رايونىنىڭ يې-
رىم ئاي شەكلىدىكى ئايلانما ئۇزۇن-
لۇقنى بويلاپ ئۇۋۇلىنىدۇ (121 - رە-
سىمگە قاراڭ).

رولى: تىز بوغۇم ياللۇغى، تىز
بوغۇمى ئاغرىش قاتارلىق تىز قىسمى
ۋە ئاياغ تەرەپ ئەزالار كېسەللىكلى-
رىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

5. جەينەك رېفلىكس رايونى

جەينەك رېفلىكس رايونىنىڭ
ئورنى: ئىككى پۇت تاشقى يان تەرەپ
5 - بارماق تاپان سۆڭىكى دۆڭ-
سىنىڭ ئالدى - كەينى تەرىپىدە
(122 - رەسىمگە قاراڭ).


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇ-
ۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن



123 - رەسىم. جەينەك رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



124 - رەسىم. جەينەك رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).



125 - رەسىم. مۇرە (يەلكە) رېف- لېكس رايونىنىڭ ئورنى.

كۈچ بېرىلىدۇ (123 - رەسىمگە قا- راڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەت- كۈچ بارماق ۋە ئوتتۇرا بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىل- دۇ. (124 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلا- شتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇ- لىنىدۇ.

رولى: جەينەك بوغۇم يۇمشاق توقۇلمىلىرى زەخمىلىنىش، جەينەك بوغۇمى ئېچىشىپ ئاغرىش، جەينەك بوغۇم ياللۇغى قاتارلىق جەينەك قىسمى ۋە يۇقىرى تەرەپ ئەزالار كې- سەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىق- نى ساقلاش.

6. يەلكە رېفلېكس رايونى

يەلكە (مۇرە) رېفلېكس رايونى- نىڭ ئورنى: ئىككى پۇت تاشقى يان تەرەپ بەشىنچى بارماق بوغۇمىدا (125 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇ- ۋۇلاش - باش بارماق ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (126 - رەسىمگە قا- راڭ)، كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەت-

كۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بى-
لەن كۈچ بېرىلىدۇ (127) - رەسىمگە
قاراڭ).



قېتىم سانى: ساقلىقنى ساق-
لاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىم-
غىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن
ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: مۇرە ياللۇغى، مۇرە ئې-
چىشىپ ئاغرىش، بىلەك جانسىزلى-
نىش، قول سىرقىراش قاتارلىق يەلكە
قىسمى ۋە بەدەننىڭ يۇقىرى تەرەپ
كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلى-
قنى ساقلاش.

126 - رەسىم. يەلكە رېفلىكس
رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك
ئۇۋۇلاش).




7. تاغاق سۆڭىكى رېفلىكس رايونى

تاغاق سۆڭىكى رېفلىكس را-
يونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇتنىڭ
يەلكە رېفلىكس رايونىنىڭ كەينى
تەرىپىدە، يەنى پۇت دۈمبىسىنىڭ
4 - ۋە 5 - پۇت بارماق سۆڭەكلىرى

127 - رەسىم. مۇرە رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

ئارىسىدىكى بەلباغسىمان دائىرىدە (128 - رەسىمگە قاراڭ).
 ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق يۇمشىقى ياكى ئۇچى بىلەن كۈچ
 بېرىلىدۇ (ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاشمىغان دەرىجىدە كۈچ
 بېرىلىدۇ، 129 - رەسىمگە قاراڭ).
 قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە،
 داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.
 رولى: مۇرە ئېچىشىپ ئاغرىش، مۇرە ياللۇغى، مۇرە بوغۇم ھەرىكىتى
 توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىق مۇرە - تاغاق سۆڭەك كېسەللىكلىرىنى داۋا-
 لاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.



128 - رەسىم. تاغاق سۆڭىكى
 رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.



129 - رەسىم. تاغاق سۆڭىكى
 رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
 ئۇسۇلى.


ئالتىنچى پۇت قىسمى رېفلىكسى رايونلىرى (4)

Ⅶ گۇرۇپپا پۇت دۇمبىسى

پۇت دۇمبىسىدە يۇقىرىقى ئېگەك، تۆۋەنكى ئېگەك، بادام بەز، كېكىردەك، كاناي، قىزىلئۆگەچ، كۆكرەك قىسمى لىمفا بەزلىرى، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى، كۆكرەك، بەدەننىڭ يۇقىرىقى قىسمى لىمفا بەزلىرى، بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى لىمفا بەزلىرى قاتارلىق II رېفلىكسى رايونى بار.



130 - رەسىم. ئۈستۈنكى ئېگەك رېف-
لىكسى رايونىنىڭ ئورنى (پۇت دۇمبىسى).



131 - رەسىم. ئۈستۈنكى ئېگەك رېفلىكسى رايونى
نى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

1. يۇقىرىقى ئېگەك رېفلىكسى رايونى

يۇقىرىقى ئېگەك ئۈستۈنكى چىش يىلتىز قىسمىغا، تاڭلاي سۆڭىكى بىلەن يۇقىرىقى ئېگەك سۆڭىكىنىڭ تۇتاشقان يېرىگە جايلاشقان بولۇپ، ئۇچلۇك نېرۋىنىڭ بىر شەخى بولغان يۇقىرىقى ئېگەك نېرۋىسى تارقالغان دائىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

يۇقىرىقى ئېگەك رېفلىكسى رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت دۇمبىسى پۇت باش بارماق ئوتتۇرا بوغۇمى توغرا سىزىقى ئالدى تەرىپىدىكى توغرا بەلباغسىمان دائىرىدە (130 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (131 - رەسىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا



132 - رەسىم. ئۈستۈنكى ئېگەك رېف-
لېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
(كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).



133 - رەسىم. تۆۋەنكى ئېگەك
رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى (پۇت
دۈمبىسى).

بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ
(132 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساق-
لاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغى-
چە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن
ئۇۋۇلىنىدۇ.


رولى: چىش ئاغرىقى، چىش
ئەتراپى ياللۇغى، چىش مىلىكى يال-
لۇغى، ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغلىنىش
ياكى جاراھەت چىقىش، تەم سەزگۈسى
توسقۇنلۇققا ئۇچراش، خورەك تارتىش
قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە
ساقلىقنى ساقلاش.

2. تۆۋەنكى ئېگەك رېفلىكس رايونى

تۆۋەنكى ئېگەك ئاستىنقى
چىش يىلتىزغا، تاڭلاي سۆڭىكى
بىلەن تۆۋەنكى ئېگەك سۆڭىكىنىڭ
تۇتاشقان يېرىگە جايلاشقان بولۇپ،
ئۈچلۈك نېرۋىنىڭ بىر شېخى بولغان
تۆۋەنكى ئېگەك نېرۋىسى تارقالغان
دائىرىدە.

تۆۋەنكى ئېگەك رېفلىكس را-
يونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت دۈمبى-
سى پۇت باش بارماق ئوتتۇرا بوغۇمى
توغرا سىزىقىنىڭ كەينى تەرىپىدىكى
توغرا بەلباغسىيان دائىرىسىدە (133 -
رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇ-
ۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ (134 - رەسىمگە قا-
راڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - باش بارماق



134 - رەسىم. تۆۋەنكى ئېگەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



135 - رەسىم. ئاستىنقى ئېگەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا بو-
غۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىپ، رېف-
لىكس رايونىنى بويلاپ ئۇۋۇلىنىدۇ
(135 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا
ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، دا-
ۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇل-
نىدۇ.


رولى: چىش ئاغرىش، چىش
ئەتراپى ياللۇغى، چىش مىلىكى يال-
لۇغى، ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغى ياكى
يارىسى، تەم سەزگۈسى توسقۇنلۇققا
ئۇچراش، خورەك تارتىش قاتارلىق
كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىق-
نى ساقلاش.

3. بادام بەز رېفلىكس رايونى

بادام بەز كېكرەك قىسمىغا
جايلاشقان بولۇپ، لىمفا توقۇلمىلى-
رىدىن تەركىب تاپقان، ئىنتايىن
مۇھىم بولغان بىر ئىممۇنت ئەزاس-
دۇر.

بادام بەز رېفلىكس رايونىنىڭ
ئورنى: ئىككى پۇت دۈمبىسى، پۇت
باش بارمىقىنىڭ 2 - بوغۇمىدا، يەنى
پېنىڭ ئوڭ ۋە سول ئىككى يان تە-
رىپىدە (136 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (137 - رەسىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىپ، رېف-لېكس رايونىدا نوقتىدا بېكىتىپ ئۇ-
ۋۇلىنىدۇ (138 - رەسىمگە قاراڭ).



136 - رەسىم. بادام بەز رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى (پۇت دۈمبىسى).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلا-
شتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە،
داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇ-
لىنىدۇ.

رولى: يۇقىرى نەپەس يولىنىڭ
ياللۇغلىنىشى ۋە بادام بەز ياللۇغى
قاتارلىق بادام بەز كېسەللىكلىرىنى
داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.



137 - رەسىم. بادام بەز رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



138 - رەسىم. بادام بەز رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

4. كېكرەك، كاناي ۋە قىزىل-

مۆڭگەچ
رېفلىكس رايونى



139 - رەسىم. كېكرەك ۋە كاناي، قىزىل-
مۆڭگەچ، كۆكرەك قىسمى لىمفا بەزلىرى
رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى (پۇت دۈم-
بېسىدە).



140 - رەسىم. كېكرەك ۋە كاناي، قىزىل-
مۆڭگەچ، كۆكرەك قىسمى لىمفا بەزلىرى
رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

5. كۆكرەك قىسمى لىمفا بەزلىرى
رېفلىكس رايونى


بۇ ئىككى رېفلىكس رايونى
بىرلەشتۈرۈلۈپ ئۆگىنىلىدۇ. چۈنكى،
بۇ ئىككى رېفلىكس رايونى ئەمەل-
يەتتە تەكرارلانغان بولۇپ، ھەر ئىك-
كىسى بىر ئورۇندا، ئۇۋۇلاشتا ئايرى-
ۋەتمەي بىرگە ئۇۋۇلسا بولىدۇ.

رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى:
ئىككى پۇت دۈمبىسى 1 - ، 2 - پۇت
بارماقلىرى ئارىسىدىن ئارقا تەرەپكە
سوزۇلىدۇ، يەنى 1 - ، 2 - پۇت بارماق
پەنچە سۆڭىكى ئوتتۇرىسىدىكى
ئويمان جايىدىكى توغرا بەلباغسىمان
دائىرىدە (139 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق
ئۈچى ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق يان
گىرۋىكى بىلەن كۈچ بېرىپ (ئۇۋۇ-
لاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاش-
مىغان دەرىجىدە كۈچ ئىشلىتىپ)،
رېفلىكس رايونىنى بويلاپ ئۇۋۇل-
ىندۇ (140 - ، 141 - رەسىمگە قاراڭ).



141 - رەسىم. كېكرەك ۋە كاناي، قىزىل-
مۇڭگەچ، كۆكرەك قىسمى لىمفا بەزلىرى
رىفلىپكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.



142 - رەسىم. ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ
يولى رىفلىپكس رايونىنىڭ ئورنى
(پۇت دۈمبىسىدە).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلا-
شتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە،
داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇ-
لىنىدۇ.

رولى: يۇقىرى نەپەس يولى
ياللۇغلىنىش ۋە كېكرەك، ئاۋاز
پەردىسى، كاناي، قىزىلئۆڭگەچ قاتار-
لىق ئورۇنلاردىكى كېسەللىكلەرنى
داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش، يال-
لۇغلىنىشقا قارشىلىق پەيدا قىلىش،
ئىممۇنىت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش.

6. ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى رىفلىپكس رايونى

ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى
ئىچكى قۇلاققا جايلاشقان بولۇپ،
ئۇنىڭ ئىقتىدارى سېزىم ئىمپۇل-
سىنى ئۆتكۈزۈپ تەڭپۇڭلاشتۇرۇش.

ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى
رىفلىپكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى
پۇت دۈمبىسى 4 - ، 5 - پۇت بار-
ماقلىرى ئارىسىدىن كەينىگە سۈرۈ-
لىدۇ، يەنى: 4 - ، 5 - پۇت بارماق
پەنجە سۆڭىكى ئوتتۇرىسىدىكى
ئويمان جايىدا (142 - رەسىمگە قاراڭ).



143 - رەسىم. ئىچكى قۇلاق ئېزىتىقۇ يولى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.




144 - رەسىم. ئىچكى قۇلاق ئېزىتىقۇ يولى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق ئۈچى ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق يان گىرۋىكى بىلەن كۈچ بېرىپ، ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاش-مىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىپ، رېف-لېكس رايونىنى بويلاپ ئۇۋۇلىنىدۇ (143 - ، 144 - رەسىملەرگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.

رولى: باش قېيىش، كۆز قاراڭ-غۇلىشىش، ماشىنىدا ۋە كېمىدە ئولتۇرغاندا باش قېيىش، قان بېسىمى ئۆرلەپ كېتىش، قان بېسىمى تۆۋەنلەپ كېتىش، قۇلاق غوڭغۇلداش، تەڭپۇڭلۇق توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

7. كۆكرەك رېفلىكس رايونى



145 - رەسىم. كۆكرەك رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى (پۇت دۈمبىسىدە).



146 - رەسىم. كۆكرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.


كۆكرەك رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت دۈمبىسى، 2 - ، 3 - ، 4 - پۇت بارماقلىرى كەينىدە. كى كەڭ دائىرىدە (145 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: ئىككى قول باش بارماق يۇمشىقى بىلەن ئۇۋۇلىنىدۇ، ئۇۋۇلاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئوخشاشىغان دەرىجىدە كۈچ بېرىلىدۇ. رېفلىكس رايونىدا ئىتتىرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (146 - رەسىمگە قاراڭ). قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلا. شتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.


رولى: كۆكرەك قىسمى ۋە ئەمچەك كېسەللىكلىرى (ئەمچەك يال-لىۋى، ئەمچەك ئۆسۈپ قېلىش، ئەمچەك راكى) قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.

8. دىئافراگما (كۆندىلەك پاسىل) رېفلىكس رايونى

دىئافراگما كۆكرەك بىلەن قورساق بوشلۇقىنى ئايرىپ تۇرىدۇ.



147 - رەسىم. دىئافراگما (كۆندىلەك پاسىل) رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى (پۇت دۈمبىسىدە).



148 - رەسىم. دىئافراگما (كۆندىلەك پاسىل) رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

غان پەردە.
دىئافراگما رېفلىكس رايونى -
نىڭ ئورنى: ئىككى پۇت دۈمبىسىدە،
ئۇ پۇت دۈمبىسىنى توغرىسىغا كې-
سىپ ئۆتۈپ بىر بەلباغنى ھاسىل
قىلغان (147 - رەسىمگە قاراڭ).
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق
يۇمشىقى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ ياكى
ئىككى قول كۆرسەتكۈچ بارماقلىرى
يان گىرۋەكلىرى بىلەن بىرلىكتە
كۈچ بېرىلىدۇ، پۇت دۈمبىسى مەر-
كەزىدىن ئىككى تەرەپكە قارىتىپ
ئۇۋۇلىنىدۇ (148 - ، 149 - رەسىمگە
قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلا-
شتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە،
داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇ-
لىنىدۇ.

رولى: ھىق تۇتۇش، كۆندىلەك
پاسىل سىپازمىلىنىش، دىئافراگما
چۇقۇقى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى
داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.



149 - رەسىم. دىئافراگما (كۆندىلەك پا-
سىل) رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى.

9. قوۋۇرغا رېفلىكس رايونى



قوۋۇرغا رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىچكى يان تەرەپ قوۋۇرغا رېفلىكس رايونى ئىككى پۇت دۈم-بىسى 1 - شىنسىمان سۆڭەك بىلەن قېيىقسىمان سۆڭەك ئوتتۇرىسىدا، تاشقى يان تەرەپ قوۋۇرغا رېفلىكس رايونى سان سۆڭەك، قېيىقسىمان سۆڭەك ۋە ئوشۇق سۆڭىكى ئوتتۇرىسىدا (150 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: باش بارماق 150 - رەسىم.. قوۋۇرغا سۆڭىكى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى (پۇت دۈمبىسىدە). ئۈچى ياكى يۈمشىقى بىلەن كۈچ بېرىپ، رېفلىكس رايونىدا نوقتىلىق بېكىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (151 - رەسىمگە قاراڭ).

قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ. رولى: قوۋۇرغا پەردە ياللۇغى ۋە قوۋۇرغىنىڭ ھەر خىل كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.



151 - رەسىم . قوۋۇرغا سۆڭىكى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى .¹

10. بەدەننىڭ يۇقىرى قىسمى لىمفا بەزلىرى رېڧلېكس رايونى



152 - رەسىم. بەدەننىڭ يۇقىرى قىسمى لىمفا بەزلىرى رېڧلېكس رايونىنىڭ ئورنى (پۇت دۈمبىسىدە).




153 - رەسىم. بەدەننىڭ يۇقىرى قىسمى لىمفا بەزلىرى رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

بەدەننىڭ يۇقىرى قىسمى لىمفا بەزلىرى دېگىنىمىز - كىندىك ئۈس-تى تەرىپىدىكى، جۈملىدىن كۆكرەك قىسمى ۋە يۇقىرى تەرەپ ئەزالاردىكى لىمفا سىستېمىسىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ مۇھىم ئىممۇنىت ئەزادۇر.

بەدەننىڭ يۇقىرى قىسمى لىمفا بەزلىرى رېڧلېكس رايونىنىڭ ئورنى: ئىككى پۇت دۈمبىسىنىڭ بىلەيزۈك (ئەگمە) قىسمىدا، تاشقى ئوشۇق ئالا-دى تەرىپىدىكى ئويما جايىدا (152 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (153 - رەسىمگە قاراڭ); كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى بىلەن كۈچ بېرىپ رېڧلېكس رايونىدا نوقتىا بېكىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (154 - رەسىمگە قاراڭ).



قېتىم سانى: ساقلىقنى ساق-
لاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغى-
چە، داۋالاشتا ئېھتىياجغا ئاساسەن
ئۆۈۋلىنىدۇ.

رولى: ياللۇغ ۋە قىزىتما قايتۇ-
رۇش، ئىممۇنىت ئىقتىدارىنى كۈ-
چەيتىش.

11. بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى لىمفا بەزىلىرى رېفلىكس رايونى

بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى
لىمفا بەزىلىرى دېگىنىمىز - كىندىك-
نىڭ تۆۋەن تەرىپى، جۈملىدىن قور-
ساق، قورساق بوشلۇقى ۋە ئاياغ تەرەپ
ئۇزالاردىكى لىمفا سىستېمىسىنى كۆر-
سىتىدۇ. ئۇ مۇھىم ئىممۇنىت ئەزادۇر.

بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى
لىمفا بەزىلىرى رېفلىكس رايونىنىڭ
ئورنى: ئىككى پۇت دۈمبىسى بىلەن-
زۈك (ئەگمە) قىسمىدا، ئىچكى ئو-
شۇقنىڭ ئالدى تەرەپتىكى ئويىمان
جايدا (155 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۆۈۋلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۆ-
ۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ (156 - رەسىمگە قا-
راڭ)؛ كۈچلۈك ئۆۋۇلاش - كۆرسەت-
كۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بى-
لەن كۈچ بېرىپ، رېفلىكس رايونىدا

154 - رەسىم. بەدەننىڭ يۇقىرى قىس-
مى لىمفا بەزىلىرى رېفلىكس رايونىنى
ئۆۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۆۋۇلاش).



155 - رەسىم. بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىس-
مى لىمفا بەزىلىرى رېفلىكس رايونى-
نىڭ ئورنى (پۇت دۈمبىسىدە).

نوقتا بېكىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (157 - رەسىمگە قاراڭ).
 قېتىم سانى: ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈچ قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە،
 داۋالاشتا ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۇۋۇلىنىدۇ.
 رولى: ياللۇغ ۋە قىزىتما قايتۇرۇش، ئىممۇنىت ئىقتىدارىنى كۈ-
 چەيتىش.



156 - رەسىم. بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى
 لىمفا بەزلىرى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
 ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



157 - رەسىم. بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى
 مى لىمفا بەزلىرى رېفلىكس رايونىنى
 ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

پۇتنىڭ دۈمبىسىدىكى II رېف-
 لېكس رايونىنى بىرلەشتۈرۈپ ئۇ-
 ۋۇلاش ئۈچۈن، ھەمدە تۆۋەندىكى
 تەرتىپ بويىچە ئەستە تۇتسا بولىدۇ:
 ئىككى توغرا سىزىق، ئىككى
 نوقتا، ئىككى ئېرىقچە (ئىككى
 توغرا سىزىق - ئۈستۈنكى ئېگەك،
 ئاستىنقى ئېگەك ئىككى رېفلىكس
 رايونىنى؛ ئىككى نوقتا - بادام بەز
 رېفلىكس رايونىنى؛ ئىككى ئېرىق-
 چە 1 - ۋە 2 - پۇت پەنجە سۆڭەك
 ئوتتۇرا يۈچۈقىدىكى كېكىردەك،
 كاناي ۋە قىزىلئۆڭگەچ، كۆكرەك
 قىسمى لىمفا بەزلىرى رېفلىكس
 رايونى؛ 4 - ۋە 5 - پەنجە سۆڭەك
 ئوتتۇرا يۈچۈقىدىكى ئىچكى قۇلاق
 ئېزىتقۇ يولى رېفلىكس رايونىنى
 كۆرسىتىدۇ).

كۆكرەك، دىئافراگما ئوتتۇرد-
 سىدا بولۇپ، ئىككى قول بىلەن
 ئۇۋۇلىنىدۇ (پۇت دۈمبىسىدىكى
 كۆكرەك، دىئافراگما رېفلىكس رايون-
 نى ئىككى قول بىلەن بىرلا ۋاقىتتا
 ئۇۋۇلىنىدۇ).

قوۋۇرغا ئۇچى پۇت، دۈمبىسى-
 نىڭ كۈتۈرۈلمە سۆڭىكىدە (قوۋۇرغا
 رېفلىكس رايونى).


لىمفا بەزلىرى پۇت ئەگمىسى-
 دىكى ئويما جايىدىن ئۇۋۇلىنىدۇ
 (يۇقىرى، تۆۋەن لىمفا بەزلىرى رېف-
 لېكس رايونى).

Ⅷ گۇرۇپپا ئوڭ پۇتنىڭ ئاستى تەرىپى

ئوڭ پۇت ئاستى تەرىپىدىكى رېفلىكس رايونلىرى سول پۇت ئاستى رېفلىكس رايونلىرى بىلەن ئاساسەن ئوخشاش، ئوڭ، سول تەرەپ ئۆزئارا ماس كېلىدۇ. بىراق، بەش رېفلىكس رايونى پەقەت سول پۇتتىلا بولۇپ، ئوڭ پۇتتا يوق. بۇلار: يۈرەك، تال، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، «S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي، مەقەت رېفلىكس رايونلىرىدۇر. باشقا بەش رېفلىكس رايونلىرى پەقەت ئوڭ پۇتتىلا بولىدۇ، سول پۇتتا يوق. بۇلار: جىگەر، ئۆت، قارىغۇ ئۈچەي ۋە سازاڭسىمان ئۆسۈك، يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي كىلاپانى، يۇقىرى كۆتۈرۈلگۈچى بوغماق ئۈچەي قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىدۇر. شۇڭلاشقا، بۇ يەردە بىز پەقەت مۇشۇ بىر نەچچە رېفلىكس رايونلىرىنى تونۇشتۇرىمىز، قالغانلىرىنى سول پۇتنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى بويىچە ئۇۋۇلسا بولىدۇ.

1. جىگەر رېفلىكس رايونى

جىگەر قورساق بوشلۇقىنىڭ ئوڭ تەرەپ يۇقىرىقى قىسمىغا جايلاشقان. ئۇ ئادەم بەدىنىدىكى ئەڭ چوڭ ئەزا بولۇپ، ئېغىرلىقى تەخمىنەن 1.5kg كېلىدۇ. جىگەر ئۆت سۇيۇقلۇقى ئاجرىتىپ چىقىرىپ، ھەزىم قىلىش پائالىيەتلىرىگە قاتناشتۇرىدۇ، ھەمدە ماددا ئالماشتۇرۇش، گلۇكوگىننى ساقلاش، زەھەر قايتۇرۇش، يۇتۇۋېلىپ مۇداپىئەلەش قاتارلىق مۇھىم ئىقتىدارغا ئىگە.



جىگەر رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئوڭ پۇت تاپىنى 4 - ، 5 - بارماق ئارىسى تىك سىزىقى بىلەن 5 - پەنچە سۆڭەك كىچىك بېشى تەكشىلىك سىزىقىنىڭ كېسىشكەن نوقتىسى ئەتراپىدىكى دائىرىدە. سول پۇت يۈرەك رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى بىلەن ئاساسەن ماس كېلىدۇ (158 - رەسىمگە قاراڭ).

158 - رەسىم. جىگەر رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى (ئوڭ پۇت ئاستى).



159 - رەسىم. جىگەر رېفلىپكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



160 - رەسىم. جىگەر رېفلىپكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (159 - رەسىمگە قاراڭ). كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم بىلەن كۈچ بېرىپ، پۇت مەركىزىي تەردىن پۇت بارماقلىرى يۆنىلىشكە قارىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (160 - رەسىمگە قاراڭ).

رولى: جىگەر ياللۇغى، جىگەر قېتىش، جىگەر ئىششىقى، جىگەر ئىقتىدارىنىڭ بۇزۇلۇشى، جىگەرنى ماي قاپلاش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.


2. ئۆت رېفلىپكس رايونى

ئۆت جىگەر ئوڭ ياپراقچىسى - نىڭ ئۆۋەن تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، سىغىمچانلىقى 40 ~ 50 cm كېلىدۇ. ئۆت خالتىسى، ئۆت سۇيۇقلۇقىنى ساقلايدۇ ۋە قويۇلدۇرىدۇ. يېمەكلىك يېگەندە ئۆت سۇيۇقلۇقىنى 12 بارماق ئۇچىگە كىرگۈزۈپ، يېمەكلىكنى ھەزىم قىلدۇرىدۇ. ئۆت رېفلىپكس رايونىنىڭ

ئورنى: ئوڭ پۇت ئاستى تەرىپى 3 - ، 4 - بارماق ئارىسى تىك سىزىقى ئۈستىدە، ئۆپكە رېفلىپكس رايونى -



161 - رەسىم. ئۆت رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى.




162 - رەسىم. ئۆت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).

نىڭ كەينى گىرۋەك تەرىپىدە (161) - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىلىدۇ (162) - رەسىمگە قاراڭ). كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىپ، رېفلىكس رايونىدا نوختا بېكىتىپ چوڭقۇر قىسىمغا قارىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (163) - رەسىمگە قاراڭ).

رولى: ئۆت كېسەللىكلىرى مەسىلەن: ئۆتكە تاش چۈشۈش، ئۆت ياللۇغى، سېرىق چۈشۈش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاش.



163 - رەسىم. ئۆت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

3. قارىغۇ ئۈچەي ۋە سازاڭسىمان


ئۆسۈك

رېفلىكس رايونى



164 - رەسىم. قارىغۇ ئۈچەي ۋە سازاڭ-

سىمان ئۆسۈك رېفلىكس رايونىنىڭ
ئورنى (ئوڭ پۇتنىڭ تاپىنىدا).



165 - رەسىم. قارىغۇ ئۈچەي ۋە سازاڭ-

سىمان ئۆسۈك رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلاش (يېنىك ئۇۋۇلاش).


قارىغۇ ئۈچەي قورساقنىڭ
تۆۋەن قىسمىغا جايلاشقان. ئۇ چوڭ
ئۈچەينىڭ باشلىنىش قىسمى بو-
لۇپ، يۇقىرىسى ئىنچىكە ئۈچەي
بىلەن، تۆۋىنى يۇقىرىغا كۆتۈرۈل-
گۈچى بوغماق ئۈچەي بىلەن تۇتۇ-
شىدۇ. سازاڭسىمان ئۆسۈك قارىغۇ
ئۈچەينىڭ ئىچكى تۆۋىنىدە.

قارىغۇ ئۈچەي ۋە سازاڭسىمان
ئۆسۈك رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى:
ئوڭ پۇت ئاستى تەرىپى، ئۆكچە
ئالدى گىرۋىكىنىڭ تاشقى يان تە-
رىپىدە (164 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇ-
ۋۇلاش - باش بارماق بىلەن كۈچ
بېرىلىدۇ (165 - رەسىمگە قاراڭ).
كۈچلۈك ئۇۋۇلاش - كۆرسەتكۈچ
بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۇچى بىلەن
كۈچ بېرىپ، رېفلىكس رايونىدا
نوقتىا بېكىتىپ ئۇۋۇلىنىدۇ (166 -
رەسىمگە قاراڭ).

رولى: ھەزىم قىلىش سىستې-
مىسى ۋە قارىغۇ ئۈچەي (سازاڭسى-

مان (ئۆسۈك) نىڭ ئۆزىدىكى كې-
سەللىكلەرنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى
ساقلاش.



166 - رەسىم. قارىغۇ ئۈچەي ۋە سازاڭ-
سىمان ئۆسۈك رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلاش (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

4. يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي كلا- پانى رېفلىكس رايونى


يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي كلاپا-
نى ئىنچىكە ئۈچەي (يانپاش ئۈ-
چەي) نىڭ قارىغۇ ئۈچەيگە كىرد-
دىغان ئاغزىغا جايلاشقان بولۇپ،
ئۇنىڭ ئىنچىكە ئۈچەيدىكى يې-
مەكلىكىنىڭ چوڭ ئۈچەيگە كىرد-
شىنى كېچىكتۈرۈپ، تولۇق ھەزىم
قىلدۇرۇپ بەدەنگە قوبۇل قىلدۇرۇش
رولى بار، ھەمدە ئۇ چوڭ ئۈچەيدىكى
يېمەكلىكنىڭ تەتۈر ئېقىپ ئىنچە-
كە ئۈچەيگە كىرىۋېلىشىدىن ساق-
لايدۇ.

يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي رېف-
لىكس رايونىنىڭ ئورنى: ئوڭ پۇت
ئاستى تەرىپى ئۆكچە ئالدى گىرۋىد-
كىنىڭ تاشقى يان تەرىپىدە، قارىغۇ
ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ ئالدى
تەرىپىدە (پۇت بارماقلىرى يۆنىلى-
شىدە 167 - رەسىمگە قاراڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇ-



167 - رەسىم. يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي كلا-
پانى رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى (ئوڭ
پۇت تاپىنىدا).



168 - رەسىم. يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي
كلاپانى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلى (يېنىك ئۇۋۇلاش).



169 - رەسىم. يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي
كلاپانى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلى (كۈچلۈك ئۇۋۇلاش).

ۋۇلاش - باش بارماق ئۈچى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ (168 - رەسىمگە قاراڭ).
كۈچ بارماق ئوتتۇرا بوغۇم ئۈچى
بىلەن كۈچ بېرىپ، رېفلېكس
رايونىدا نوقتىدا بېكىتىپ ئۇۋۇلاش.
نىدۇ (169 - رەسىمگە قاراڭ).


رولى: يانپاش - قارىغۇ ئۈچەي
كلاپانىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش،
ھەزىم قىلىش سىستېمىسى
كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ۋە ساقلاش.
قىنى ساقلاش.

5. يۇقىرى كۆتۈرۈلگۈچى بوغماق ئۈچەي رېفلېكس رايونى

يۇقىرى كۆتۈرۈلگۈچى بوغماق
ئۈچەي ئوڭ تەرەپ قورساق قىسمىغا
جايلاشقان. يۇقىرىسى قارىغۇ ئۈچەي
بىلەن تۇتىشىپ، قورساقنىڭ ئوڭ
تەرەپ يېنى بىلەن يۇقىرى ئۆرلەپ،
جىگەرنىڭ ئوڭ ياپرىقىنىڭ تۆۋەن
تەرىپىگە كەلگەندە سول تەرەپكە
قايرىلىپ توغرا بوغماق ئۈچەيگە
كىرىدۇ. يۇقىرىغا كۆتۈرۈلگۈچى
بوغماق ئۈچەي چوڭ ئۈچەينىڭ بىر
قىسمى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىقتىدارى

ئۇزۇقلۇق ماددىلارنى قوبۇل قىلىپ،
كېرەكسىز ماددىلارنى ئۆتكۈزۈپ
بېرىش.

يۇقىرى كۆتۈرۈلگۈچى بوغماق
ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ ئورنى:
ئوڭ پۇت ئاستى تەرەپ ئوتتۇرا
قىسمى بىلەن پۇت تاشقى يان تە-
رەپ پاراللېل بولغان بىر بەلباغىدە-
مان دائىرىدە (170 - رەسىمگە قاراڭ).



170 - رەسىم. يۇقىرى كۆتۈرۈلگۈچى
بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ
ئورنى .

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يېنىك ئۇ-
ۋۇلاش - باش بارماق ئۇچى بىلەن
كۈچ بېرىلىدۇ؛ كۈچلۈك ئۇۋۇ-
لاش - كۆرسەتكۈچ بارماق ئوتتۇرا
بوغۇم ئۇچى بىلەن كۈچ بېرىپ،
پۇتنىڭ ئۆكچە تەرىپىدىن پۇت بار-
ماقلىرى تەرىپىگە قارىتىپ ئۇۋۇلدە-
نىدۇ (171 - رەسىمگە قاراڭ).

رولى: ھەزىم قىلىش كېسەل-
لىكلىرى مەسىلەن: قورساق ئاغ-
رىش، ئىچى سۈرۈش، ئۈچەي ياللۇ-
غى قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ساقلىدە-
قنىنى ساقلاش.



171 - رەسىم. يۇقىرى كۆتۈرۈلگۈچى
بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ
ئورنىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى .

يەتتىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كېسەل تەكشۈرۈش ۋە ساقلىقنى ساقلاش

1. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش
ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كېسەل تەكشۈرۈش ۋە دىئاگنوز قويۇش

(1) پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش
ئۇسۇلى نېمە ئۈچۈن بىزنىڭ كېسەللىكلەرنى تەكشۈرۈشىمىز ۋە دى-
ئاگنوز قويۇشىمىزغا ياردەم بېرەلەيدۇ؟

ئالدىدا تونۇشتۇرۇپ ئۆتكىنىمىزدەك، بىزنىڭ ئىككى پۇتىمىزدا
نۇرغۇن رېفلىكس رايونلىرى بار بولۇپ، بۇ رېفلىكس رايونلىرى پۈتۈن
بەدىنىمىزدىكى ئىچكى ئەزا كېسەللىك ئۆزگىرىشلەر سادىر بولسا ياكى
ئۇنىڭ ئىقتىدارى غەيرىي نورمال بولغاندا، پۈتتىكى شۇ ئىچكى ئەزاغا
ماس بولغان رېفلىكس رايونىدا مەلۇم كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.
بۇنداق ئەھۋالدا پۈتتىكى رېفلىكس رايونىنى كۆزىتىش ۋە ئۇنى بېسىپ
ئۇۋۇلاش ئارقىلىق بۇ كېسەللىك ئالامەتلىرىنى سەزگىلى بولىدۇ، ھەمدە
ئىچكى ئەزادىكى كېسەللىك ئۆزگىرىش ياكى ئىقتىدارىدىكى نورمالسىز-
لىق ئۇچۇرىغا ئېرىشىپ، شۇ ئارقىلىق كېسەللىك ياكى كېسەللىكنىڭ
بېشارىتى ھەمدە كېسەللىك ئۆزگىرىشى بولغان ئەھمىيىنى ئورۇننى تاپ-
قىلى بولىدۇ.

(2) پۇت قىسمى رېفلىكس رايونىنىڭ پاتولوگىيىلىك ئالامىتى:
مەلۇم بىر ئىچكى ئەزانىڭ ئىقتىدارىدا نورمالسىز بولسا ياكى ئۇنىڭدا

كېسەللىك ئۆزگىرىش كۆرۈلسە، پۇتتىكى شۇ ئىچكى ئەزاغا ماس بولغان رېفلىكس رايونىدا تۆۋەندىكىدەك كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلىدۇ:

(۱) بېسىپ كۆرگەندە ئاغرىشقا سەزگۈر بولىدۇ؛ بىز يېنىك ئوۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ پۇتتىكى رېفلىكس رايونىنى ئوۋۇلساق، ساغلام، نورمال ئەزانىڭ رېفلىكس رايونىدا ئاغرىش سېزىمى بولمايدۇ. ئەمما، مەسىلە بار رېفلىكس رايونىدا بولسا ئېچىشىپ ئاغرىش سېزىمى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئاغرىش سېزىمىغا بولغان سەزگۈرلۈك دەرىجىسى يېقىن ئەتراپتىكى ئورۇنلاردىن يۇقىرى بولىدۇ. بۇ كېسەللىك بار - يوقلۇقىنى، نورمال ياكى ئەمەسلىكىنى پەرقلەندۈرۈشتىكى بىر قەدەر ئېنىق كۆرسەتمە ئالامەتتۇر.

بېسىپ ئاغرىتىش ئارقىلىق كېسەللىكنى تەكشۈرۈشتە ئاچقۇچلۇق بولغىنى بېرىدىغان كۈچ دەرىجىسىنى ياخشى ئىگەللەشتە. ئەگەر كۈچ بەك ئاجىز بولسا، ھەممە رېفلىكس رايونلىرى ئاغرىمايدۇ. ئەگەر كۈچ بەك كۈچلۈك بولسا بارلىق رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ھەممىسى ئاغرىيدۇ. كۈچ بېرىش تەكشى بولمىسا، ئاغرىشقا تېگىشلىك ئورۇن ئاغرىماي، ئاغرىشقا تېگىشلىك بولمىغان ئورۇنلار بەك ئاغرىيدۇ. مۇنداق ئەھۋاللاردا مەسىلە بار رېفلىكس ئورۇننى بېكىتىش مۇمكىن ئەمەس، نەتىجىدە دىئاگنوز قويۇشقا تېگىشلىك ئورۇن چۈشۈپ قالىدۇ ياكى خاتا دىئاگنوز قويۇش كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭلاشقا، بېرىدىغان كۈچنىڭ يېنىك ياكى كۈچلۈك دەردە جىسمىنى چوقۇم ياخشى ئىگەللەش لازىم. بىراق، بېرىدىغان كۈچنىڭ ئاجىز - كۈچلۈكلۈكى يەنە نىسپىي بولىدۇ. ئادەمگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، بەزى كىشىلەر نىسبەتەن سەزگۈر كېلىدۇ، ئازىراق كۈچ بېرىلسلا ۋايى-جانلايدۇ. بەزى كىشىلەرنىڭ ئىنكاسى قاشاڭ كېلىدۇ، ئۇلارغا خېلى كۈچلۈك كۈچ بېرىلسىمۇ ئاغرىش ھېس قىلمايدۇ. بىرەر ئورۇنغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بەزىلىرىنىڭ تېرىسى نېپىز بولۇپ قاتتىق باسقۇچلىق بولمايدۇ. بەزىلىرىنىڭ تېرىسى ۋە گۆشى قېلىن بولۇپ، بېرىدىغان كۈچ يېنىك بولسا سەزمەيدۇ. مۇشۇنداق پەرقلەر بولغاچقا، كۈچ بېرىشتە «بىر تۇتاش» قىل - ماي، ئادەم ۋە ئورۇننىڭ ئەھۋالىغا قاراپ پەرقلەندۈرۈش، جانلىق ئىگەللەش

كېرەك. ئەمەلىي قوللىنىشتا ئالدى بىلەن يېنىك ئۇۋۇلاپ، ئۇنىڭدىن كېيىن تەدرىجىي كۈچ دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ئادەتتە، كېسەللىك ئۆزگىرىشى بار بولغان رېفلىكس رايونىنى ناھايىتى يېنىك ئۇۋۇلىسىمۇ ئاغرىش ھېس قىلىدۇ. يۇقىرىقىدەك قىلغاندىلا كېسەل بار ئورۇن بىلەن ساق ئورۇننى ئايرىغىلى بولىدۇ.

(2) سىرتقى ئۆزگىرىشلەر

① رەڭگى نورمالسىز بولىدۇ: ساغلام كىشىلەرنىڭ پۇت ئاستىنىڭ تېرىسى ئادەتتە ئاققا مايىل قىزغۇچ كېلىدۇ. بىراق، كېسەللىك ئۆزگىرىش بولغان رېفلىكس رايونىدىكى ئورۇندا بەزىدە نورمالسىز رەڭ كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن: پۇت باش بارماق (باش قىسمى رېفلىكس رايونى) خىرە سۆسۈن رەڭدە بولۇپ، مېڭە قان تومۇرىدا كېسەللىك ئۆزگىرىش بولۇش مۇمكىن. چىلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ. ئېھتىمال بۇ مېڭە قان ئۆكچىسىنىڭ شەكىللەندۈرۈش گەنلىكى ياكى مېڭە قاناشنىڭ ئالدىنقى ئالامىتى بولۇشى مۇمكىن. يەنە مەسىلەن: پۇت قىسمى رېفلىكس رايونىنىڭ تېرە ئاستىدا ئەگەر كىچىك قاناش نوقتىلىرى بايقالسا ياكى ئۇيما قان شەكىلىدىكى كۆك سۆسۈن داغ ۋە ياكى ئۆمۈچۈك تورى شەكىلىدىكى سىزىقچە بولسا، كۆپ ھاللاردا بۇ شۇ رېفلىكس رايونغا ماس بولغان ئىچكى ئەزانىڭ زەخمىلەنگەنلىكىنى ياكى ئىچىدىن قانغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

② ئولتۇرۇشۇپ كېتىش: مەلۇم ئەزا ئېلىۋېتىلگەندىن كېيىن، شۇ ئەزانىڭ پۇتتىكى رېفلىكس رايونىنى كۆزەتكەندە ئويۇلۇپ كەتكەنلىكىنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ ئەسلىدە تېرىسى نىسبەتەن تۈز بولغان رېفلىكس رايونى (مەسىلەن: كۆكرەك، بالىياتقۇ، ئۇرۇقدان قاتارلىقلارنىڭ رېفلىكس رايونلىرى) دا بۇنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ. بەزى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى تۆۋەنلىسە، يېڭىلەپ كەتسە ياكى زەئىپلەشسە، پۇتتىكى ماس رېفلىكس رايونىنىڭ ئولتۇرۇشۇپ كەتكەنلىكىنى ياكى سولۇشۇپ قالغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ (مەسىلەن: بۆرەك، كىچىك مېڭە، چوڭ مېڭە قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرى).

③ ئىششش: مەسلەن: سۈيۈك يىغىلىپ قېلىپ تولۇق سىيەل-
مەيۋاتقان كېسەللەر ياكى مەزى بېزى يوغىناپ كەتكەنلەر(مەزى بېزى
دوۋساقنىڭ بوغۇزغا جايلاشقان بولغاچقا، مەزى بېزىنىڭ يوغىناپ قېلىشى
سۈيۈك چىقىرىشنىڭ قىيىن بولۇشىنى ۋە سۈيۈكنىڭ يىغىلىپ قېلى-
شىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ) نىڭ مەزى بېزى رېفلىكس رايونى ۋە دوۋساق
رېفلىكس رايونىنىڭ ئىشششغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

④ تېرە مۇڭگۈزلىشىش: يەنى بۇ بىز ئادەتتە دەيدىغان پۇتتا قاقداق
پەيدا بولۇشنى كۆرسىتىدۇ. بۇ خىل مۇڭگۈزلىشىش كۆپىنچە ئىككى
پۇتنىڭ يول مېڭىش داۋامىدا ئۇزۇن مۇددەت سۈركىلىش نەتىجىسىدە
شەكىللەنىدۇ. بىراق، بەزىدە مەلۇم كېسەللىك ئۆزگىرىشنىڭ ئىپادىسى
بولۇشىمۇ مۇمكىن. مەسلەن: مۇرە رېفلىكس رايونىدىكى قېلىن قاقداق
مۇرە ئەتراپى ياللۇغىدىن دېرەك بېرىشى مۇمكىن. ئۆپكە ۋە كانايچە رېف-
لىكس رايونىدىكى پۇت قاقدىقى ئۆپكە ۋە كانايچىنىڭ سوزۇلما كېسەل-
لىكلىرى (مەسلەن: سوزۇلما خاراكتېرلىك كانايچە ياللۇغى، كانايچە
زىققىسى قاتارلىقلار) دىن دېرەك بېرىشى مۇمكىن. جىگەر رېفلىكس را-
يونىدىكى پۇت قاقدىقى جىگەر سوزۇلما كېسەللىكىنىڭ ئالامىتى بولۇشى
مۇمكىن.

(3) تېرە ئاستى توقۇلمىلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى
ئىچكى ئەزالاردا كېسەللىك ئۆزگىرىش بولغاندا، شۇ ئەزاغا ماس
بولغان رېفلىكس رايونلىرىنىڭ تېرە ئاستى توقۇلمىلىرىدىمۇ مەلۇم كې-
سەللىك ئۆزگىرىشلەر كۆرۈلىدۇ، مەسلەن: قوشقۇچى توقۇلمىلار ئۆسۈپ
قېلىش، ياغ توقۇلمىلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىقلار. قول بىلەن رېف-
لىكس رايونىدىكى تېرىنىڭ چوڭقۇر يېرىگىچە باسقاندا، تېرە ئاستىدا
بەزى غەيرىي ئالامەتلەرنىڭ بارلىقىنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ. مەسلەن:
كىچىك دانچە ھالەتتىكى ماددىلار، يىپسىمان ماددىلار، قاتتىق تۈگۈنچەك،
كۆپۈكچە ھالەتتىكى ماددىلار ياكى سۇ ئاققاندىك سېزىم بولۇش
قاتارلىقلارنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋاللار (ئومۇملاشتۇرۇلۇپ

«مۇسبەت رېئاكسىيە» دېيىلىدۇ). شۇ رېفلىكس رايونىغا ماس بولغان ئىچكى ئەزالاردا كېسەللىك ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى ياكى ئىقتىدارىنىڭ نورمال ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ كېسەلنى تەكشۈرۈش ۋە دىئاگنوز قويۇشتا پايدىلىنىشقا بولىدۇ.

2) پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن كېسەل تەكشۈرۈش ۋە دىئاگنوز قويۇشنىڭ ئەۋزەللىكى ۋە چەكلىمىلىكى

يۇقىرىدا بىز بەزى مىساللارنى كەلتۈرۈش ئارقىلىق، پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن كېسەل تەكشۈرگىلى ۋە دىئاگنوز قويغىلى بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۇق. بۇ خىل پۇتنى سىلاپ كېسەل تەكشۈرۈش ئۇسۇلى قەدىمىيلا بار بولۇپ «پۇتنى كۆزىتىش ئۇسۇلى» دەپ ئاتالغان. بۇ زامانىمىز ئىلىم - پېنىنىڭ رەتلەپ پىششىقلىنىشى ئارقىلىق، غەرىپچە، جۇڭگوچە تەكشۈرۈپ دىئاگنوز قويۇش ۋاسىتىسى بىلەن ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈلسە تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقى شۇكى:

ئالدى بىلەن ئۇ مەسىلە بار ئورۇن بىلەن مەسىلە يوق ئورۇننى دەسلەپكى قەدەمدە پەرقلەندۈرۈپ بېرىپ، بىزنىڭ تەكشۈرۈپ دىئاگنوز قويۇشىمىزنى يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىز ئەگرى يوللارنى ئاز مېڭىپ، ۋاقىتىمىزنى ۋە راسخوتىنى تېجىيەلەيمىز. ئۇنىڭدىن قالسا، بۇ خىل پۇتنى سىلاپ كېسەل تەكشۈرۈش ئۇسۇلىغا ھېچقانداق ئۈسكىنە كەتمەيدۇ. شۇڭا، سەپەر ئۈستىدە ياكى ھەربىي يۈرۈشتە، چەت - ياقا رايونلاردا، ماشىنا - ئۈسكۈنىلەر بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا تەكشۈرۈش ۋاسىتىسى قىلىشقا بولىدۇ.

بىر ئادەمنىڭ ساغلام ھالەتتىن كېسەل بولۇشىغىچە بولغان ئارىلىقتا بىر مىقدار ئۆزگىرىش جەريانى بولىدۇ. مەلۇم دەرىجىگىچە تەرەققىي قىلا - خاندىلا ئۈسكۈنىلەر ئاندىن تەكشۈرۈپ چىقالايدۇ. دوختۇرلار ئاندىن «مەلۇم كېسەللىك» دەپ ھەقىقىي دىئاگنوز قوياالايدۇ. كۆپ ھاللاردا بۇ ۋاقىتقا

يەتكەندە ئاللىقاچان كېچىككەن بولىدۇ. كېسەلنىڭ ئازايلىنىشى ئېغىر. لاپ، كېسەلنىڭ ئاقىۋىتىگە تەسىر يېتىدۇ. پۇتنى سىلاپ كېسەل تەكشۈرۈش ئۇسۇلى قوللىنىلسا، كېسەللىك دەرىجىسىگە تەرەققىي قىلىشتىن بۇرۇن، پەقەت ئىقتىدارى بىنورمال بولغاندىلا بۇنى سەزگىلى ۋە ئۆز ۋاقتىدا تەدبىر قوللىنىپ ئالدىنى ئېلىپ ۋە تەكشۈپ، كېسەللىكنى بىخ ھالەتتە يوقاتقىلى، ئۇنىڭ چوڭ كېسەللىك بولۇپ تەرەققىي قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بۇ - پۇت قىسمى زىچلىقى رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنىڭ ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكىدۇر.

چەكلىمىلىكى:

1. پەقەتلا مەسىلە بار ئەزا ياكى تەخمىنەن ئورنىنى بىلىدۇرىدۇ. بۇ ئورۇندا كېسەللىك بولۇشىمۇ ياكى پەقەتلا ئىقتىدارى بىنورمال بولۇشىمۇ مۇمكىن. لېكىن قانداق كېسەللىك ياكى ئۇنىڭ كۈنكۈزىت ئورنىنى رەسسىيى بىلگىلى بولمايدۇ.

2. پەقەتلا خاراكتېرىنى بېكىتىشكە بولىدۇ. نەتىجىسىنى (نورمالسىز ۋە ئۇنىڭ ئېغىر - يېنىكلىك دەرىجىسىنى) كۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ. مىقەدارىنى دوكلات قىلالمايدۇ.

3. كېسەللەرنىڭ مۇسبەت رېئاكسىيىسى ھەر قايسىسىنىڭ پەرقلىق بولىدۇ. پۇت ئارقىلىق دىئاگنوز قويۇشتا توغرىلىق دەرىجىسى كۆپ ھالەتلاردا ئۇۋۇلغۇچىنىڭ ئۆزىنىڭ ھېس قىلىشى ۋە تەجرىبىسىگە باغلىق بولغاچقا، 100% توغرا بولۇشى ناھايىتى تەس.

2. پۇت قىسمى زىچلىقى رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ئۆز - ئۆزىنى ساغلاملاشتۇرۇش

سەھىيە مىنىستىرلىقىنىڭ جۇڭگو پۇت قىسمى زىچلىقى رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنى تەتقىق قىلىش جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنى تەستىقلاش ھۆججىتىدە «پۇت قىسمى زىچلىقى رايونى ئارقىلىق ساغ-

لاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىر خىل ئاددىي، ئۆگىنىش ئاسان، ئۈنۈمى كۆرۈ-
نەرلىك، ناچار تەسىرى يوق بولغان كېسەلدىن مۇداپىئەلىنىش، كېسەلنى
داۋالاش، ئۆز - ئۆزىنىڭ ساغلاملىقىنى ساقلاش ئۇسۇلىدۇر» دەپ
كۆرسەتكەن.

ئاددىي، ئۆگىنىش ئاسان دېگەنلىك - ئاسان ئۆگەنگىلى ھەم ئاسان
ئىشلىگىلى بولىدىغان، شۇنداقلا مەخسۇس ئورۇن، ئۈسكۈنە، كۆپ راس-
خۇت كەتمەيدىغان ۋە ئاسان ئومۇملاشتۇرغىلى بولىدىغان، ئاممىنىڭ
ئۆز - ئۆزىنىڭ ساغلاملىقىنى ساقلاشقا پايدىلىق بىر خىل ئۇسۇل دېگەن-
لىكتۇر.

ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك دېگەنلىك - كېسەللىكنى تەكشۈرگىلى، داۋا-
لىغىلى، ئالدىنى ئالغىلى، ساغلاملىقىنى ساقلىغىلى بولىدۇ دېگەنلىكتۇر.
ئەگەر پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى داۋاملىق ئۇۋۇلاپ تۇرسا، ئۆز-
نىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنى ئۆز ۋاقتىدا ئىگىلەپ، قايسى ئەزاسىدا كې-
سەللىك ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى ياكى قايسى ئەزانىڭ ئىقتىدارى تازا
نورمال ئەمەسلىكىنى سېزىپ، ئۆز ۋاقتىدا پۇت قىسمى رېفلىكس رايون-
لىرىنى ئۇۋۇلاش ياكى باشقا مۇۋاپىق تەدبىرلەرنى قوللىنىش ئارقىلىق
ئىقتىدارىنى تەڭشەپ، كېسەللىكنى بىخ ھالىتىدە يوقىتىپ، ۋاقىت ۋە
راسخوتنى تېجىگىلى بولىدۇ. شۇڭا، بۇ بىر خىل ناھايىتى ئۈنۈملۈك
بولغان ئامما ئۆز - ئۆزىنىڭ ساغلاملىقىنى ساقلايدىغان نىسبەتەن بىخە-
تەر، ئىشەنچلىك بولغان ساغلاملىق ئۇسۇلىدۇر.

ناچار تەسىرى يوق دېگەنلىك - پەقەت پۇت قىسمى رېفلىكس را-
يونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنىڭ بەزى بەلگىلىرى ۋە دىققەت قىلىشقا
تېگىشلىك ئىشلارغا ئەمەل قىلىنسا، ئادەتتە تاسادىپىي ھادىسە چىقماي-
دۇ. شۇڭلاشقا، بۇمۇ بىر خىل نىسبەتەن بىخەتەر، ئىشەنچلىك بولغان
ئاممىنىڭ ئۆز - ئۆزىنى ساغلاملاشتۇرىدىغان ئۇسۇل دېگەنلىكتۇر.
پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنىڭ
يۇقىرىقىدەك ئومۇملاشتۇرۇشچانلىق، ئۈنۈملۈك ۋە بىخەتەرلىكىدىن ئىبار-

رەت ئۈچ چوڭ ئەۋزەللىكى بولغاچقا، بىزنىڭچە ئۇ ئاممىنىڭ ئۆز - ئۆزىنى ساغلاملاشتۇرۇشىدىكى بىر خىل كۆڭۈلدىكىدەك ئۇسۇل بولۇپ، ئېلىمىز - نىڭ دۆلەت ئەھۋالىغا بەكمۇ باب كېلىدۇ. پۇت قىسمى رېفلىكس رايون - لىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنى ئومۇملاشتۇرۇپ كېڭەيتكەندە، مىڭلە - خان، تۈمەنلىگەن ئائىلىلەرنىڭ «ساغلاملىقىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان دوختۇرى» بولالايدۇ. مۇشۇنداق بولغاندا، مىللىتىمىزنىڭ ساغلاملىق سەۋىيىسىگە كاپالەتلىك قىلىشقا، «ئىككى مەدەنىيەت» قۇرۇلۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا پايدىلىق بولىدۇ.

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇ - سۇلىنى قوللىنىپ ئۆز - ئۆزىنى ساغلاملاشتۇرۇشتا، ئۆزئارا ئۇۋۇلاشمۇ، ئۆز - ئۆزىنى ئۇۋۇللىشمۇ بولىۋېرىدۇ. تەلەپ جەھەتتە، ئۇۋۇلاش ئۈستى - لىرىغا ئوخشاش توغرا بولۇپ كەتمەيدۇ. رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ئورنى ئانچە توغرا بولماسلىقى، ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى ئانچە قېلىپلاشقان بولماسلىقى، ئۇۋۇلاش تازا راۋان بولماسلىقى، ئۇۋۇلاش تەرتىپى ئاستىن - ئۈستۈن بولۇپ قېلىشى، ھەتتا بەزى رېفلىكس رايونلىرىنى ئاتلاپ ئۆتۈپ كېت - شىمۇ مۇمكىن. بۇ ئىشلاردىن خالىي بولغىلى بولمايدۇ. بۇلارغا يۈل قويۇلمايدۇ. بىراق، ئەمەلىي ئۈنۈمگە ئېرىشىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى بىر نەچچە نوقتىنى چوقۇم ئورۇنلاش لازىم:

(1) چوڭ تەرتىپ بويىچە (سول پۇت: تاپان ئوتتۇرىسى ← پۇت بارمىقى ← تاپان ← ئىچكى يان تەرەپ ← تاشقى يان تەرەپ ← پۇت دۈمبىسى ← تاپان ئوتتۇرىسى، ئوڭ پۇتمۇ ئوخشاش تەرتىپ بويىچە) ئىككى پۇتنى بىر قېتىم ئۇۋۇلاش (بۇنداق قىلىش بىر قېتىم پۈتۈن بەدەننى تەكشۈرگەنگە، پۈتۈن بەدەننى ساغلاملاشتۇرغانغا باراۋەر) لازىم.

(2) پۈتۈن پۇتنى ئۇۋۇلاش داۋامىدا سېزىلگەن ئاغرىغان نوقتا (- سەزگۈر نوقتا) نى كۈچەپ ئۇۋۇلاش، ئۇۋۇلاپ ئاغرىغان جايغا كەلگەندە، مەلۇم دەرىجىدە ئېچىشىپ ئاغرىش سېزىمى بولۇشى، ئاغرىمىسا ياكى قە - چىشمىسا توختىتىپ قويماستىنلا لازىم.

(3) ئۇۋۇلاشتا زېھنىنى يىغىش، ئوي - خىياللارنى چىقىرىپ تاشلا - ش، ئىككى پۇتنى ئاز دېگەندە 30 مىنۇت ئەتراپىدا ئۇۋۇلاش، شۇ ئارقىلىق قان ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەمدە تولۇق راھەتتە دەم ئالدۇرۇش لازىم. بەزى خىزمەت، ئۈگىنىش، ئائىلە يۈكى ئېغىرراق كىشىلەرگە نىسبەتەن بۇ خىل دەم ئېلىش ساقلىقنى ساقلاش ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم. ئەگەر بۇنداق كىشىلەر 30 مىنۇت ۋاقىتنىمۇ چىقىرالمىسا، ئۇلارنىڭ ئۆز خىزمەت، تۇرمۇش ئادىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، ئۆز ئىشىنى قىلغاچ پۇتنىڭ بەزى جايلىرىنى ئۇۋۇلاپ بەرسە، ئۇلارنىڭ سالامەتلىكىگە ئازدۇر - كۆپتۇر پايدىسى بولىدۇ.

سەككىزىنچى پۇت قىسمى رېفلىپكىس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كېسەل داۋالاش

بىلىشىمىزچە، ئاز بولمىغان تېببىي خادىملار پۇت قىسمى رېفلىپكىس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلىنى كىلىنىك ئەمەلىيىتىدە قوللىنىپ كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلغان. ئەمەلىيەت ئىسپاتلىدىكى، پۇت قىسمى رېفلىپكىس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش خۇددى قۇلاق يىڭىسى، يىڭىنە سانجىپ داۋالاش، ئۇۋۇلاش قاتارلىقلارغا ئوخشاش بىر خىل ئادەتتىكى دىئاگنوز قويۇپ داۋالاش ۋاسىتىسى بولۇپ، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە دىئاگنوز قويۇپ داۋالاش، خەلقنىڭ ساغلاملىقىغا كاپالەتلىك قىلىشتا ئۆزىنىڭ تېگىشلىك رولىنى ئۆتەيدۇ.

پۇت قىسمى رېفلىپكىس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنىڭ تۈپ چىقىش نوقتىسى - ئادەم تېنىدە ئۆز - ئۆزىنى تەڭشەش مېخانىزمى، ئۆزىگە خاس كېسەلگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى، ئۆز - ئۆزىنى ساقايتىش ئىقتىدارى ۋە مەلۇم دەرىجىدە ئۆز - ئۆزىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئىقتىدارى بار دەپ تونۇغانلىقىدا. بىز پۇت قىسمى رېفلىپكىس رايونىنى ئۇۋۇلدەنمىزدا، تەنگە بولغان غىدىقلاش، ئۇچرىشىش سېزىمى - بېسىلىش سېزىمى ۋە ئاغرىش سېزىمى قاتارلىق سېزىمچانلىقنى ھېس قىلغۇچى كۈچلۈك نېرۋا ئىمپۇلسىنى شەكىللەندۈرۈپ، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا يەتكۈزۈپ، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى ئومۇمىيلاشتۇرۇپ تەھلىل قىلغاندىن كېيىن ئىنكاس قايتۇرۇپ، ئادەم تېنىدە بىر قاتار ئۆز - ئۆزىنى تەڭشەش تەسىرىنى پەيدا قىلىپ، ئادەم تېنىنىڭ ئىچكى قىسمىنىڭ پائالىيىتىنى تەڭشەپ، تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلغان قىسمىنىڭ تەڭ-

پۇڭلۇقى بارا - بارا ئەسلىگە كېلىپ، ئىقتىدارى نورمال بولمىغان ئەزالا - رنىڭ ئىقتىدارى تەدريجىي نورماللىشىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئادەمنىڭ پۈت - كۈل بەدىنىنىڭ مۇداپىئەلىنىش كۈچى ئاشىدۇ. ئادەم بەدىنىدە ئەسلىدە بار بولغان مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارى كېسەلگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى قوزغىتىپ، كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى ئامىلنى يېڭىدۇ. بۇ ئارقىلىق ساقلىقنى ساقلاش ۋە كېسەلنى داۋالاش رولىنى ئوينايدۇ.

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇشنى باشقا داۋالاش ئۇسۇللىرىغا سېلىشتۇرغاندا، تۆۋەندىكىدەك ئارتۇقچىلىقلارغا ئىگە:

ئالدى بىلەن ئۇ بىر خىل ساغلام داۋالاش ئۇسۇلى، ھەمدە ساقلىقنى ساقلاش بىلەن كېسەلنى داۋالاشنىڭ ئورگانىك بىرلەشمىسى. كېسەل بولمىغاندا (تەرەققىي قىلىپ كېسەللىك دەرىجىسىگە يەتمىگەندە)، ئۇ ساقلىقنى ساقلاپ كېسەلدىن مۇداپىئە كۆرۈش چارىسىدۇر. پەقەتلا مەلۇم ئورگانىزمنىڭ ئىقتىدارى نورمال بولمىغان ياكى پەقەتلا بەزى دەسلەپكى ئالامەتلىرى كۆرۈلۈپ، ئۇنى « كېسەل » دەپ دىئاگنوز قويغىلى بولمىغاندا، پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق، ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق ساقلىقنى ساقلاپ، كېسەلدىن مۇداپىئە كۆرگىلى بولىدۇ. تەرەققىي قىلىپ كېسەل بولۇپ شەكىللەنگەندە، بۇ كېسەلنى قوغلاپ نورمال ھالەتنى ساقلاش ۋاسىتىسى بولالايدۇ.

ئۇنىڭدىن قالسا، ئۇ بىر خىل ساپ فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى بولۇپ، ئوكۇل سېلىش، دورا ئىچىش، ئوپىراتسىيە قىلىش ھاجەتسىز، ئوچۇق جاراھەت شەكىللەندۈرمەيدۇ. خىمىيىلىك دورىلارنى ئىشلەتكەندىكى قوشۇمچە تەسىرلەردىن خالىي، تېببىي مەنبە خاراكتېرلىك كېسەللىك ۋە دورا مەنبە خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنى ئازايتىپ، داۋالاش خىراجىتىنى تېجەپ قالغىلى بولىدۇ.

بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلى باشقا داۋالاش ئۇسۇللىرى بىلەن زىت ئەمەس، ماسلاشتۇرۇپ قوللانغىلى بولىدۇ. مەسىلەن: رادىئوئاكتىپ نۇر ئار -

قىلىق داۋالاش، خىمىيىلىك داۋالاش بىلەن بىرلەشتۈرۈلسە، رادىئوئاك-
تىپلىق ۋە خىمىيىلىك داۋالاشنىڭ ناچار تەسىرلىرىنى ئازايتقىلى بولىدۇ.
داۋالاش مۇددىتىنى قىسقارتىپ، ئۈنۈمنى ئۆستۈرگىلى ۋە كېسەلنىڭ ئا-
زىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ. ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاش بىلەن بىر-
لەشتۈرگەندە، ئوپىراتسىيىدىن كېيىنكى ئەسلىگە كېلىشكە پايدىلىق.
كېسەلدە دورىغا سەزگۈرلۈك بولسا ياكى دورىغا چىدامچانلىق پەيدا بولۇپ،
ئوكۇل ئۇرۇش، دورا ئىچىش ئارقىلىق داۋالاشقا بولمىسا ياكى داۋالاش
ئۈنۈمسىز بولسا؛ ئوپىراتسىيە قىلىشقا تېگىشلىك بولسىمۇ، بىراق ھەر
خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئوپىراتسىيە قىلىشقا بولمىغاندا، پۇت قىسمى
رېفلىكس رايونى ئارقىلىق داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىشقا بولىدۇ. چۈنكى،
ئۇ بىر خىل بىخەتەر، ئىشەنچلىك، پايدىسىلا بار، زىيىنى يوق داۋالاش
ئۇسۇلىدۇر. بىراق يەنە شۇنى چۈشەندۈرۈشكە تېگىشلىككى، ھەر قانداق
كېسەللىكلەرنىڭ ھەممىسىگە پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق
داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىۋېرىشكە بولمايدۇ. بەزى ئۆتكۈر خاراكتېرلىك
يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر، ئۆتكۈر خاراكتېرلىك زەھەرلىنىش، تاشقى بۆلۈم
جىددىي كېسەللىرى (سىرتقى زەخمىلىنىش، سۇنۇق، كۈيۈك، ئۆشۈك
تېشىش، زور مىقداردا قاناش قاتارلىقلار) كۆرۈلگەندە دەرھال جىددىي
قۇتقۇزۇش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش، پۇرسەتنى كەتكۈزۈپ قويماسلىق،
پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق داۋالاشنى بىر تۈرلۈك سالا-
مەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىكى ۋاسىتە قىلىش لازىم.

تۆۋەندىكى ئەھۋاللاردا پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق
داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىشقا بولمايدۇ:

(1) ھامىلدار ۋە ھەيز مەزگىلىدىكى ئاياللار (ئاياللار ۋە ھامىلنىڭ
سالامەتلىكىگە تەسىرى بولماسلىقى ئۈچۈن).

(2) ھەر خىل ئېغىر قاناش (قان تۈكۈرۈش، قانلىق تەرەت قىلىش،
مېگە قاناش، ئاشقازان قاناش، بالىياتقۇ قاناش ۋە باشقا ئىچكى ئەزالا قاناش
قاتارلىقلار) كۆرۈلگەنلەر (تېخىمۇ چوڭ قاناشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن).

(3) بۆرەك زەئىپلىشىش، يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى، جىگەر نېك-روزلىنىش قاتارلىق ھەر خىل خەتەرلىك، ئېغىر كېسەللىكلەر (كېسەللىك ئەھۋالىنى مۇرەككەپلەشتۈرۈۋەتمەسلىك ئۈچۈن).

سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە نىسبەتەن، ئادەتتە «ئىككى پۈتتىڭ ھەممە يېرىنى تولۇق ئۇۋۇلاش، ئاساسىي نوقتىنى كۈچەيتىش» ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ.

«ئىككى پۈتتىڭ ھەممە يېرىنى تولۇق ئۇۋۇلاش» دېگەنلىك - ئال-دىدا تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەن ئۇۋۇلاش تەرتىپى بويىچە ئىككى پۈتتىڭ بار-لىق رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىر قېتىم تولۇق ئۇۋۇلاش دې-گەنلىكتۇر.

«ئاساسىي نوقتىنى كۈچەيتىش» دېگەنلىك - داۋالاش ئېھتىياجىغا ئاساسەن، بەزى ئاساسىي نوقتتا بولغان رېفلىكس رايونلىرىنى كۈچەپ، قېتىم سانىنى كۆپەيتىپ ئۇۋۇلاش دېگەنلىكتۇر. جىددىي خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە نىسبەتەن پەقەتلا ئاساسىي نوقتتا بولغان رېفلىكس رايون-لىرىنى ئۇۋۇلىسا بولىدۇ. ئاساسىي نوقتتا بولغان رېفلىكس رايونلىرى:

ئالدى بىلەن تاپان ئوتتۇرىسى رېفلىكس رايونلىرى (بۆرەك ئۈستى بېزى، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى، بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋ-ساق قاتارلىق بەش رېفلىكس رايونى) جەزمەن كۈچەيتىپ ئۇۋۇلاش زۆرۈر بولغان ئورۇنلاردۇر. ئۇۋۇلاش باشلانغاندا ۋە ئاياقلىشىشتا قايتا - قايتا ئۇ-ۋۇلاش، ئاز دېگەندە ئۈچ قېتىم ئۇۋۇلاش لازىم. ئۇنىڭدىن قالسا، كېسەل ئورۇن (كېسەل كۆرۈلگەن ئىچكى ئەزا) ۋە ئۇنىڭغا قاراشلىق پۇت رېف-لىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشتىكى ئاساسىي نوقتتا قىلىش لازىم. مەسىلەن: نېرۋا سىستېمىسىنىڭ كېسەللىكلىرىدە چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە، مېڭە غولى، ماڭلاي، ئۈچلۈك نېرۋا، مېڭە ئاستى بېزى قاتارلىق رېفلىكس را-يونلىرى؛ ئايلىنىش سىستېمىسىنىڭ كېسەللىكلىرىدە يۈرەك، ئال، قال-قانبەز قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرى؛ نەپەسلىنىش سىستېمىسىنىڭ كې-سەللىكلىرىدە بۇرۇن، كېكىردەك، كاناي، ئۆپكە ۋە كانايچە، بادام بەز

قاتارلىق رېفلىپكس رايونلىرى؛ ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنىڭ كېسەل-لىكلىرىدە ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدىكى بىر نەچچە رېفلىپكس رايون-لىرى ھەمدە قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى رېفلىپكس رايونى ۋە قالغان يان بەز رېفلىپكس رايونى؛ ئىچكى ئاجراتما سىستېمىسىنىڭ كېسەللىك-لىرىدە مېگە ئاستى بېزى، قالقانبەز، قالقان يان بېزى، بۆرەك ئۈستى بېزى قاتارلىق رېفلىپكس رايونلىرى؛ ئىمۇنىت سىستېمىسىنىڭ كېسەللىك-لىرىدە تال، لىمفا بەزلىرى (جۈملىدىن كۆكرەك قىسمى لىمفا بەزلىرى، بە-دەننىڭ يۇقىرىقى، تۆۋەنكى قىسمىدىكى لىمفا بەزلىرى) قاتارلىق رېف-لىپكس رايونلىرىنى تاللاپ ئاساسىي نوقتتا قىلىش لازىم.

ئۇنىڭدىن قالسا، كېسەلنىڭ خاراكتېرى ۋە ئوخشاشمىغان ئىپادى-سىگە ئاساسەن ئاساسىي نوقتتا قىلىپ ئۇۋۇلايدىغان رېفلىپكس رايونلىرىنى تاللاش لازىم. مەسىلەن: ياللۇغ ۋە قىزىتما قايتۇرۇشتا لىمفا سىستېمىسى-نىڭ رېفلىپكس رايونلىرىنى تاللاش لازىم. ئاغرىق ۋە زىنقىنى توختىتىشتا بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىپكس رايونلىرىنى كۈچەپ ئۇۋۇلاش قاتارلىقلار. پۈت قىسمى رېفلىپكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بى-لەن كېسەل داۋالاشتا، ئادەم ئەھۋالىغا قاراپ پەرقلەندۈرۈش، ئومۇمىيلاش-تۇرۇپ ئويلاش، ھەممىنى بىر تاياققا ھەيدىمەسلىك لازىم. بىراق، بىۋاسىتە كۆرسەتمىلىك بىر چارە باركى، ئۇ بولسىمۇ ئىككى پۈتنى ئومۇمىيۈزلۈك ئۇۋۇلىغاندا ئىنكاسى بىر قەدەر سەزگۈر بولغان رېفلىپكس رايونلىرىنى تېپىپ چىقىپ، بۇنىڭ ئىچىدىن ئەڭ سەزگۈر ئورۇننى تېپىپ، بۇلارنى ئۇۋۇلاشنىڭ ئاساسىي نوقتىسى قىلىپ، مۇشۇ سەزگۈر رايون، سەزگۈر بەلباغ، سەزگۈر نوقتىنى بىر ئاز كۈچەپ ئۇۋۇلاش لازىم. ئۇۋۇلانغۇچى ئې-چىشىپ ئاغرىغانلىقىنى ھېس قىلسا، نىسبەتەن ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىش-كىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ۋاقتى: ئادەتتە ئىككى پۈتنى ئۇۋۇلىغاندا تەخمىنەن 30 مىنۇتتىن 45 مىنۇتقىچە ئۇۋۇلسا مۇۋاپىق بولىدۇ. ھەر كۈنى بىر قېتىم (زۆرۈر تېپىلغاندا كۈنىگە ئىككى قېتىم، سوزولما خاراكتېرلىك كېسەل-

لىكلەرنى ئىككى ياكى ئۈچ كۈندە بىر قېتىم) ئۇۋۇلسا، 10 - 7 كۈن بىر داۋالاش كۇرس قىلىنسا بولىدۇ.

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇ- سۇلى بىلەن كېسەل داۋالاشتا يەنە تۆۋەندىكىلەرگە دىققەت قىلىش لازىم:

(1) تاماقتىن كېيىنكى بىر سائەت ئىچىدە ئۇۋۇلماسلىق لازىم.
(2) ئۇۋۇلغاندا ئىسسىق ساقلاشقا دىققەت قىلىش، شامالنىڭ ئۇۋۇ- لىنىۋاتقان ئىككى پۇتقا بىۋاسىتە تېگىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

(3) ئۇۋۇلغاندا سۆڭەك پەردىسىنىڭ زەخىملىنىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، سۆڭەك چوقچىيىپ چىققان ئورۇندىن قاچۇرۇش لازىم.

(4) ئۇۋۇلغاندا پۇتتىكى سىرتقى زەخىمە، چىقان ۋە يىرىگىدىغان كېسەل جايدىن قاچۇرۇش لازىم.

(5) ياشانغانلار، بالىلار، ئېغىر كېسەللەر ۋە تېنى ئاجىزلارنى ئۇۋۇ- لىغاندا بەك كۈچىمەسلىك لازىم.

(6) دورا ئىچىپ داۋالىنىۋاتقان كېسەللەر ئادەتتە دوختۇرنىڭ تاپ- شۇرۇقى بويىچە دورىنى داۋاملىق ئىچسە بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋا- قىتتا، پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالىنى- ۋاتقانلار كېسەللىك ئەھۋالى ياخشىلانغاندىن كېيىن دورىنى ئاستا - ئاستا ئازايتىش، سالامەتلىكى تولۇق ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن ئاندىن دورىنى توختىتىش لازىم.

(7) ئۇۋۇلاش ئاخىرلاشقاندىن كېيىنكى يېرىم سائەت ئىچىدە ئىل- مان قايناق سۇدىن 300 ~ 500 ml ئىچىپ بېرىش لازىم. بۆرەك كېسىلى، سۇلۇق ئىششىق بارلار ئىچىدىغان سۇ مىقدارىنى مۇۋاپىق ئازايتىش، دا- ۋالاش ۋاقتىنىمۇ مۇناسىپ قىسقارتىش لازىم.

(8) ئۇۋۇلاش تۈگىگەندىن كېيىن دەرھال سوغۇق سۇ بىلەن پۇت - قول يۇماسلىق (ئوپېراتسىيە قىلىنغانلار) لازىم.

توققۇزىنچى پۇت قىسمى رېفلىپكىس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ياشان- غانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئال- دىنى ئېلىش ۋە داۋالاش (1)

ياشانغانلار يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى

يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ياشانغانلارنىڭ ساغلاملىقىغا بولغان خەۋپى ناھايىتى زور. 65 ياشتىن ھالقىغانلاردىن يۈرەك كېسەللىكلىرى بىلەن ئۆلۈپ كېتىدىغانلىرى ئەڭ كۆپ بولۇپ، ئۆلۈش سەۋەبى جەھەتتە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. شۇڭلاشقا، ياشانغانلارنىڭ يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش ئىنتايىن مۇھىم. دورا، ئوزۇقلىنىش، بەدەن چېنىقتۇرۇش، فىزىكىلىق داۋالاش قاتارلىقلار ئارقىلىق يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالا-
شنىڭ زور ئەھمىيىتى بار. پۇت قىسمى رېفلىپكىس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش بىر خىل تەبىئىي داۋالاش ئۇسۇلى بولغانلىقى ئۈچۈن، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشتا ئۈنۈمى بىر قەدەر ياخشى.

بىز بۇ ئۇسۇلنى كېڭەيتكىنىمىزدە، بەزىلەر: مەلۇم رېفلىپكىس رايونىنىڭ رولى شۇنىڭغا ماس بولغان ئىچكى ئەزالاردىكى كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش - دەپ تونۇيدۇ. ئەمەلىيەتتە پۇت ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلىنىڭ مۇھىم رولى پۈتكۈل بەدەننى ئومۇميۈزلۈك تەڭشەشتۇر. بىز 40 ياشتىن ئاشقانلارنىڭ ئىمكانىيەتنىڭ بىرىنچە

پۈتۈن پۈتۈن ئۇۋۇلاشنى تەكىتلەيمىز. نېمىشقا «40 ياش» دەپ بېكىتىلىدۇ؟ چۈنكى، نۆۋەتتىكى ياشانغانلار كېسەللىك ئىلمى بويىچە قارىغاندا، 60 ~ 40 ياش قېرىلىقنىڭ دەسلەپكى دەۋرى، 75 ~ 60 ياش قېرىشقا يېقىن دەۋر، 75 ياشتىن ئېشىش قېرىلىق دەۋرى دەپ ئايرىلىدۇ. ئىنسانلار 40 ياشتىن ئاشقاندىن كېيىن تەن ئىقتىدارى روھىي ئۇرغۇپ تۇرىدىغان ھالەتتىن تەدرىجىي تۆۋەنلەشكە باشلايدۇ. بەدەندىكى مۇقىملاشتۇرغۇچى مېخانىزم (جۈڭىيى تېبابىتىدىكى مەنپىي، مۇسبەت تەڭپۇڭلۇقى) نىڭ تەڭپۇڭلۇقى تەدرىجىي يوقايدۇ. ئارتېرىيە قېتىش كېسەللىكى ياشانغانلارغا خاس كېسەللىك ئەمەس. ئارتېرىيە قېتىش كېسىلى 25 ياشتلا كۆرۈلۈشى مۇمكىن. شۇڭا، ياشانغانلار يۈرەك قان تومۇر كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى ياش ۋاقتىدىن باشلىشى كېرەك. 40 ياشتىن ئاشقانلار ئىككى پۈتۈن ھەممىسىنى ئۇۋۇلاپ بەرسە، كېسەلدىن مۇداپىئە كۆرۈش رولىنى ئوينايدۇ. بولۇپمۇ يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنى ياش ۋاقتىدىن باشلاپلا ئالدىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. يۇقىرى قان بېسىمى، تاجىسمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسىلى، قاندىكى ماي ئېشىپ كېتىش، يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ياشانغانلاردا دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەر. بۇ كېسەللىكلەر ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

1. تاجىسمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسىلى — قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان يۈرەك كېسىلى (يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىك)

(1) كېسەللىك سەۋەبى:

تاجىسمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسىلى — تاجىسمان ئارتېرىيە بوتقىسىمان قېتىشىدىن كېلىپ چىققان يۈرەك مۇسكۇلىغا قان ۋە ئوكسىگېن يېتىشمەسلىك سەۋەبىدىن بولغان يۈرەك كېسىلىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇنىڭ قوزغىلىشىنىڭ ئاساسلىق ئامىللىرى:

(1) ئۇزاق مۇددەت جىددىي ئەقلىي ئەمگەك قىلىش، جىسمانىي

ھەرىكەت ئاز بولۇش، بەدەن چېنىقتۇرۇش كەمچىل بولۇش.

(2) ياغ مېتابولىزمى قالايمىقانلىشىش، يۇقىرى خولېستېرىنلىق ۋە مايلىق يېمەكلىكلەرنى ئۇزۇن مۇددەت ئىستېمال قىلىش، بىرلەمچى ياكى ئىككىلەمچى كېسەل قوزغىتىدىغان قاننىڭ ماي تەركىبىي ئۆرلەپ كېتىش، ئىرسىيەت ئامىللىرى، ھاراق ئىچىش قاتارلىق ھەر خىل ئامىللار بەدەننىڭ ئىچكى مېتابولىزمىدا ئۆزگىرىش پەيدا قىلغانلىقتىن بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا دىئابېت كېسەلى، بۆرەك كېسەلى، قالدانبەز ئىقتىدارى تۆۋەنلەش، جىگەر كېسەلى، ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى قاتارلىقلار ياكى ئۇزۇن مۇددەت ھورمون ياكى ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئىشلىتىشتىن بولىدۇ.

(3) ئارتېرىيە دىۋارىنىڭ ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش، يۇقىرى قان بېسىم قاتارلىقلار ئارتېرىيە بوتقىسىمان قېتىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى. باشقا ئامىللار مەسىلەن: قېرىش، تاماكا چېكىش، ھاراق ئىچىش، سېمىزلىك قاتارلىقلار.

(2) تاجسىمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسەلىنىڭ كلىنىك ئالاھىدىلىكلىرى:

(1) يوشۇرۇن تاجسىمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسەلى: بۇنىڭدا تاجسىمان ئارتېرىيەدە كېسەللىك بولسىمۇ، بىراق كېسەللىك ئالاھىدىتى بولمايدۇ. ئۇ تۇيۇقسىزلا يۈرەك سانجىقى ياكى يۈرەك مۇسكۇل تىقىلىمىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى ياكى تەدبىرىجى تەرەققىي قىلىپ يۈرەك مۇسكۇل قېتىشقا ئۆزگىرىشى مۇمكىن. ئايرىم كېسەللەردە تۇيۇقسىز ئېغىر ھالدىكى يۈرەك رېتىمى نورمالسىزلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى ياكى يۈرەك تۇيۇقسىز توختاپ قېلىپ ئۆلۈپ كېتىشى مۇمكىن. بۇ خىل كېسەللەر دەم ئالغاندا ئېلېكتروكاردىئوگرامما نورمال بولىدۇ. يۈك بەرگەندىن كېيىن ئېلېكتروكاردىئوگراممىدا يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىك ئەھۋالىنى تەكشۈرۈپ چىققىلى بولىدۇ. كېسەل دائىم جىددىي ھەرىكەت قىلغاندا ياكى ئېغىر نەرسە كۆتۈرگەندە يۈرەك سىقىلىش، كۆكسى چىڭقىلىش ھالەتلىرى يۈز بېرىپ دوختۇرغا كۆرۈنگەندە ئاندىن سېزىلىدۇ. بەزىلىرىدە تىنچ ھالەتتىمۇ ئېلېكتروكاردىئوگراممىدا يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يې-

تېشىمەسلىك كۆرۈلىدۇ. ئەمما، كېسەللىك ئەھۋالى كۆرۈلمەيدۇ.

(2) يۈرەك سانجىقى: تىپىك ئىپادىسى تۈيۈقسىز قوزغىلىش. ئەمگەك قىلىش، جىددىيلىشىش، ھاياجانلىنىش سوغۇق ئۆتۈش، زىيادە تويۇنۇپ غىزالىنىش ياكى ھەزىم قىلىش يولى ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىقلار يۈرەك سانجىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭدا كۆكرەك سۆڭىكى ئارقىسى، يۈرەك ئالدى رايونى ئاغرىيدۇ. ئاغرىق يەلكە، بەدەننىڭ يۇقىرىقى ئەزالىرى ۋە بويۇن ياكى مۈرىگىچە تارقىلىدۇ. ئاساسلىقى سول يەلكە ياكى سول يۇقىرى بىلەككىچە، ھەتتا چىمچىلاق ۋە نامسىز بارماق-قىچە يېتىپ بارىدۇ. ئاغرىش خاراكتېرى كۆپ ھاللاردا قىسىلىپ ئاغرىش سېزىمى بولىدۇ. كۆكرەككى چىڭقىلىپ نەپەس ئېلىش تېزلىشىپ، سادىجىق تۇرۇپ قالغاندەك ياكى چىڭقىلىش سېزىمى بولىدۇ. كېسەل قوزغالغاندا كېسەلنىڭ چىرايى تاترىپ كېتىدۇ، كالىپۇكى قوڭۇر رەڭگە، تىرناق ئاستى سۆسۈن رەڭگە كىرىدۇ. ھەرىكەتنى خالىمايدۇ، سوغۇق تەرلەيدۇ. بەزى كېسەللەردە ئاغرىش قورساقنىڭ يۇقىرى قىسمىدا، بويۇن ياكى كېكرەك قىسمىدا كۆرۈلىدۇ. بەزىلىرىدە ئالدى بىلەن ھەزىم قىلىش يولى-لىرىنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى مەسىلەن: قورساق ئاغرىش، كۆڭلى ئېلىشىش، ئارقىدىنلا يۈرەك رايونى ئاغرىش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. يۈرەك سادىجىقى ھەر قېتىم قوزغالغاندا بىر نەچچە مىنۇت داۋاملىشىدۇ، دەم ئالسا ياكى نىترولىستېرىن ئىچسە ئەھۋالى تېزلىكتە ياخشىلىنىدۇ. ئەگەر قوزغىلىپ ئاغرىشى تېخىمۇ ئېغىر بولۇپ، نىترولىستېرىن ئىچكەندىمۇ ئۈنۈمى بولمىسا، سوغۇق تەرلىسە، بىئارام بولسا ياكى يۈرەك مۇددەتتىن بۇرۇن سوقسا، يۈرەك دالانىچىسى تالالىق تىترىسە، قان بېسىمى تۆۋەن بولسا، يۈرەك سانجىقى دەپ بىلىسە بولىدۇ.

(3) يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى: يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى تاج-سىمان ئارتېرىيە جىددىي توسۇلۇپ قېلىشى ئارقىسىدا، بىر قىسىم يۈرەك مۇسكۇلىغا ئېغىر ۋە ئۇزاق مۇددەت قان يېتىشمەسلىك سەۋەبىدىن قىسمەن يۈرەك مۇسكۇلى نېكروزلىنىشتىن بولىدۇ. گەرچە كېسەل جىددىي قوزغالسىمۇ، ئەمما بەزى كېسەللەردە كېسەللىك قوزغىلىشتىن 3~1 ھەپتە

ئالدىدىلا بەزى ئالدىنقى ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن بولىدۇ. مەسىلەن: يۈرەك سانجىقى پات - پات قوزغىلىپ تۇرىدۇ ياكى دەرىجىسى ئېغىرلىشىدۇ. ئىلگىرى نىتروگلىتسىزىن ئىچسە كېسەللىك يېنىكلىگەن بولسا، ئەم - دىلىكتە ئۇنىڭ ئۈنۈمى بولمايدۇ.

يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسىنىڭ كلىنىك ئالامەتلىرى:

① ئاغرىش: ئاغرىش خاراكتېرى ۋە ئاغرىغان ئورۇن يۈرەك سانجىقى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ، بىراق ئاغرىش قاتتىقراق بولىدۇ ھەم ئۇزاق داۋاملىشىدۇ.

② شوڭ: مەسىلەن: چىرايى تاتىرىش، بىئارام بولۇش، ۋەھىمە بې - سىش، پۈتۈن بەدىنى ماغدۇرسىزلىنىش، سوغۇق تەرلەش، چوڭ تەرلەش، تومۇرى ئىنچىكە ۋە تېز سوقۇش، قان بېسىمى تۆۋەنلەش.

③ يۈرەك زەئىپلىشىش: ئاساسلىقى ئۆتكۈر خاراكتېرلىك سول يۈرەك ئاجىزلاش، ئۆپكەگە قان تولۇش، يۈرەك قوزغىلىش ئالامىتى كۆرۈ - لۈش، يۆتىلىش، نەپەس بوغۇلۇش، نەپەس قىيىنلىشىش، تۈز ياتالما سلىق، تۈكرۈكتىن قان كېلىش، بۇنىڭغا ئۇلاپلا ئوڭ يۈرەك ئاجىزلاش، كۆپ مىقداردا قان تولۇش، بويۇن ۋېنا تومۇرى كۆيۈش، جىگىرى يوغىناش، قورساققا سۇ چۈشۈش، پۇت سولۇق ئىشىش.

④ ئاشقازان، ئۈچەيدىكى ئالامەتلەر: بەزى كېسەللەردە كېسەل قوزغالغان دەسلەپكى مەزگىلدە كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساقنىڭ يۇقىرىقى قىسمى ئېسىلىپ ئاغرىش ئالامەتلىرى كۆرۈلگەچكە، يۈرەك كېسىلى ئىكەنلىكى كىشىنىڭ ئېسىگە كەلمەيدۇ.

(4) يۈرەك مۇسكۇلى قېتىش: تاجسىمان ئارتېرىيە بوتقىسىمان قېتىپ، يۈرەك مۇسكۇلىغا ئۇزاق مۇددەت قان يېتىشمەيدۇ. يۈرەك مۇسكۇل توقۇلمىلىرىدا قۇۋۋەت توسالغۇسى كۆرۈلۈپ، ھەتتا قوشقۇچى توقۇلمىلار ئۆسۈپ قېلىنلايدۇ. ئۇنىڭ ئالامەتلىرى ۋە بەدەندىكى ئىپادىسى: يۈرەك كېڭىيىدۇ، دەسلەپتە سول تەرەپكە، كېيىنچە ئوڭ تەرەپكە كېڭىيىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يۈرەك رېتىمى نورمالسىزلىشىدۇ. مەسىلەن: يۈرەك مۇددەتتىن بۇرۇن سوقۇش، تىترەش، ئۆتكۈزۈشچانلىقى توسقۇنلۇققا

ئۇچراش قاتارلىقلار. يەنە بەزىلەردە يۈرەك سوقۇش ھەددىدىن ئارتۇق تېزلىتىپ كېتىدۇ، بەزىلەردە يۈرەك زەئىپلىشىدۇ. يۈرەك مۇسكۇلى قېتىش گەرچە يۈرەك مۇسكۇلىغا ئوخشاش جىددىي خەۋپ پەيدا قىلمىسىمۇ، ئەمما ئەسلىگە كېلىشى ناھايىتى ئاستا بولۇپ، ناھايىتى ئۇزاق مەزگىلدىن كېيىن يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ ئېلاستىكىلىقى ئەسلىگە كېلىدۇ. كېسەل ئۆزى كېسەللىك ئالامىتىنىڭ يېرىم يىلدىن ئاشقانلىقىنى ھېس قىلىدۇ. (3) ياشانغانلاردىكى تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسەللىكىنىڭ يۇقىرىقىدەك ئالامەتلىرىدىن سىرت، يەنە تۆۋەندىكىدەك ئالاھىدە ئىپادىلەرنى بولىدۇ:

(1) تىپىك بولمىغان يۈرەك سانجىقى: ئۇنىڭ ئاغرىشى ياش ۋە ئۆت-تۇرا ياشلىقلاردەك ئېنىق بولمايدۇ. قوزغالغاندا پەقەتلا كۆكرەك قىسمى يېنىك قىسىلغاندەك سېزىم بولۇپ، جىسمانىي ھەرىكەتتىن كېيىن نەپەس قىيىنلىشىدۇ، يۈرەك سانجىقى كۆرۈلمەيدۇ ياكى تارقىلىپ ئاغرىش ئاساسىي ئىپادىسى بولىدۇ. مەسىلەن: سول يەلكە، جەينەك بوغۇمى، چىش، ئېگەك قاتارلىق جايلار ئاغرىيدۇ، بەزىلەرنىڭ بويۇن قىسمى بەكرەك ئاغرىيدۇ، ھەتتا يۈرەك سانجىقىمۇ كۆرۈلمەيدۇ، بۇنىڭ بۇنداق بولۇشى، ياشانغانلارنىڭ بېسىپ ئاغرىتىشقا سەزگۈرلۈكى تۆۋەنلىگەنلىكىدىندۇر. ياشانغانلاردا كېسەللىك جەريانى ئاستا تەرەققىي قىلغاچقا، يان شاخچىلىق قان ئايلىنىش تەدبىرىجىي شەكىللەنگەچكە يەنە بەزى ئاغرىش ئورنى دەل ئوتتۇرا قورساق قىسمىدا بولغاچقا، خاتا ھالدا ئاشقازان ئاغرىقى، ئۆت ئاغرىقى دەپ تونۇلۇپ قالىدۇ.

(2) ئادەتتە ھېچقانداق كېسەللىك ئالامەتلەر كۆرۈلمەيدۇ ياكى ئەزەلدىن تاجسىمان يۈرەك كېسەللىك تارىخى بولمىسىمۇ تۇيۇقسىزلا ئۆت-كۈر خاراكتېرلىك يۈرەك مەنبەلىك شوك، ئۆتكۈر خاراكتېرلىك سۇلۇق ئىششىق، ئېغىر ھالدىكى يۈرەك رېتىمى نورمالسىزلىشىش ياكى ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان، ئۈچەي قاناش نەتىجىسىدە ئۆلۈپ كېتىدۇ. شۇڭلاشقا، كېلىپ چىقىش سەۋەبى ئېنىق بولمىغان خەتەرلىك ئەھۋاللار كۆرۈلگەندە، ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسەللىكى بار - يوقلۇقىنى ئويلىشىش لازىم.

(3) ياشانغانلاردىكى يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسىنىڭمۇ ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكى بولۇپ، كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ كۆپ قىسمى تىپىك بولمايدۇ، ھەتتا نۇرغۇن مۇناسىۋەتسىز كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بەزى ئىلىم ئەھلىلىرى 387 نەپەر 65 ياشتىن يۇقىرى بولغان ياشانغانلار- نىڭ يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسىنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرىنى بەكمۇ كۆندۈرگەندە، ئادەتتىكى تىپىك كېسەللىك ئالامەتلىرىگە ئۇيغۇن بولغىنى ئارانلا 75 نەپەر (19.5%) بولغان، مۇتلەق كۆپ قىسىملىرى (80.5%) نىڭ ئەھۋالىدا تۆۋەندىكىدەك ئالاھىدە ئەھۋال ئاساسىي ئورۇندا تۇرغان.

387 نەپەر 65 ياشتىن ئاشقانلاردىكى ئۆتكۈر يۈرەك مۇسكۇل تىقىل- مىسىنىڭ ئاساسلىق كلىنىك ئالامەتلىرى:

كلىنىكىدا كۆرۈلگەن ئالامەتلەر:	كېسەل سانى	%
تۇيۇقسىز قوزغىلىش خاراكتېرلىك نەپەس قىيىنلىشىش ياكى يۈرەك زەئىپلىشىش	77	19.9
تىپىك قوزغىلىش	75	19.5
تۇيۇقسىز قوزغالغان روھىي كېسەللىك	51	13.2
تۇيۇقسىز ئۆلۈش	31	8
ھوشسىزلىنىش	27	7
مېگە قان تومۇر تاسادىپىيلىقى	26	6.8
ئەتراپ ئارتىرىيە تۇيۇقسىز كەپلىشىش، نېكروزلىنىش	22	5.7
ئاپلىنىپ كېتىش، ماغدۇرسىزلىنىش	19	5
يۈرەك سىقىلىش	14	3.7
ئۆتكۈر يۈرەك ئىقتىدارى زەئىپلىشىش	11	2.8
قايتا - قايتا قۇسۇش	10	2.5
ماغدۇرسىزلىق	10	2.5
ئۆپكەنى كەپلىشىش	8	2
بىئارام بولۇش	4	1
سوغۇق تەرلەش	2	0.5
جەمئىي (تىپىك كېسەللىك ئىپادىسى بارلىرى ئارانلا 19.5%)	387	100

4) ياشانغاندىكى ئالاھىدە ئەھۋالغا ئاساسەن، پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلىنىڭ تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسەللىكىگە قارىتا تۆۋەندىكىدەك داۋالاش لايىھىسى بار:

(1) غەرىپچە، جۇڭگوچە داۋالاش بىلەن بىرگە قوشۇمچە پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونلىرى ئارقىلىق داۋالاشنى قوللانسا بولىدۇ. ھەممە پۇتنى ئۇۋۇلاش ئاساسىدا نوقتىلىق قىلىپ بۆرەك ئۈستى بەز، بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق، يۈرەك، ئىنچىك ئۈچەي، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چى-گىشى، قالقان يان بەز، قالقانبەز قاتارلىق رېفلىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش لازىم. بۇ بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىپكس رايونى ئەتراپىدىكى قىلىسمان قان تومۇرلىرىنى كېڭەيتىپ، يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قان بىلەن تەمىنلىنىدۇ. شىنى كۈچەيتىپ، يۈرەك سانجىقىنى يېنىكلىتىدۇ. بىراق، يۇقىرى قان بېسىم كېسىلى بارلارنىڭ بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلماستىلىق، قالقان يان بېزى رېفلىپكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ سىپازمىلىنىشىنى يېنىكلىتىش، يۈرەك، ئىنچىك ئۈچەي رېفلىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق يۈرەك ئىقتىدارىنى تەڭشەش، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى رېفلىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق يۈرەك رېتىمى ۋە ھەزىم قىلىش يولىنىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەش لازىم. كۆكرەك رېفلىپكس رايونىنىڭ ئالدىنقى 1/3 نى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كۆكرەك قىسمى بىئارام بولۇشنى يېنىكلىتىش، قالقانبەز رېفلىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق قان تومۇرلارنىڭ تارىيىشى، كې-گىيىشىنى كۈچەيتىپ، ئېلاستىكىلىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرەك.

(2) پۇتنى ئۇۋۇلاش داۋامىدا، قان بېسىمىنى چۈشۈرگۈچى ۋە يۈرەك سانجىقىنى يېنىكلىتىدىغان دورىلارنى توختاتماستىلىق، باشقا دورىلارنىڭ مىقدارىنى ئازايتىش ياكى توختىتىش لازىم.

(3) يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى ياكى يۈرەك مۇسكۇلى قاتقانلارنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى تۇراقلاشقاندىن كېيىن ماسلاشتۇرۇپ پۇتنى ئۇۋۇلسا بولىدۇ. يۇقىرىقى رېفلىپكس رايونلىرى بىلەن چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە، جىگەر، ئۆپكە قاتارلىق رېفلىپكس رايونلىرىنى بىللە قوشۇپ ئۇۋۇلغاندا،

كېسەللىك ئەھۋالىنى تىزگىنلەشكە ۋە يۈرەك ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە پايدىلىق. ئۇۋۇلاشتا ئوتتۇرا ھال كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلاش، كۈچلۈك كۈچ بىلەن ئۇۋۇلىماسلىق لازىم.

(4) ئادەتتە تاجىسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسەلى بارلارنىڭ پۇتى ئۇۋۇلانس، كېسەللىك قوزغىلىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. يۇقىرىقى رېف-لىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشتىن سىرت، جىنسىي بەز رېفلىپكس رايونىنى قوشۇپ ئۇۋۇلىسا، يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ زەخمىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ياردىمى بولىدۇ.

(5) ياشانغانلار ئەڭ ياخشىسى باشقىلارغا ئۇۋۇلاتقۇزۇشى لازىم. چۈنكى، ئۆزىنى - ئۆزى ئۇۋۇلغاندا پۇتنى يىغىپ، بىلىنى ئىگىپ ئىش-لەشكە توغرا كەلگەچكە كۆكرەك، قورساق قىسمىغا نەسر كۆرسىتىپ، يۈرەك سىقىلىش، نەپەس تېزلىشىش ۋە كۆڭۈل ئېلىشىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. ئەگەر ياردەملەشكىلى باشقا ئادەم بولمىسا، ئورنىدا مېڭىش ئۈسكۈنىسى ياكى ئۇۋۇلاش تاختىسىنى ئىشلەتسە بولىدۇ. بۇنىڭغا قوشۇمچە قىلىپ ئەسۋاب بىلەن پۇتنىڭ ئىككى يان تەرىپى ۋە پۇت دۈم-بىسىنى ئۇۋۇلاپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

(6) پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى كېسەللىك سەۋەبىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. قالقانبەز رېفلىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىسا قاندىكى مايىنى تۆۋەنلىتىپ، ئورۇقلىتىدۇ. چوڭ، كىچىك مېڭە، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى قاتارلىق رېفلىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇ-لىسا قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىپ كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. تال، كۆكرەك، لىمفا بەزلىرى، بەدەننىڭ يۇقىرىقى ۋە تۆۋەنكى قىسمى لىمفا بەزلىرى قاتارلىق ئىممۇنىت سىستېمىسى رېفلىپكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىسا، يۈرەك مۇسكۇل ياللۇغى ۋە ئۆپكە ياللۇغىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ.

(7) پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق يۈرەك كېسەللىكلىرىنى بالدۇر بايقىغىلى بولىدۇ. قال-قانبەز ۋە ئۆپكە رېفلىپكس رايونلىرى تۇتاشقان جايدا ئەگەر تىك قاداق

پەيدا بولسا، يۈرەكتە فۇنكسىيىلىك كېسەللىك پەيدا بولغانلىقىدىن بىر-
 شارەت بېرىدۇ. يۈرەك كېڭەيگەندە يۈرەك رېفلىكس رايونىمۇ ئىچكى ياكى
 تاشقى تەرەپكە كېڭىيىدۇ. شۇڭا، يۈرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا
 باش بارماقنىڭ قورسىقى بىلەن توغرىسىغا ئىتتىرىپ ئۇۋۇلاش لازىم.
 بۇنىڭدا كۈچ مۇۋاپىق بېرىلىدۇ ھەم ئىنكاس بىلدۈرىدىغان نوقتىغا تې-
 گىپ كېسەلنى سەزگىلى بولىدۇ. يۈرەك زەئىپلىشىشنىڭ دەسلەپكى دەۋ-
 رىدە يۈرەك رېفلىكس رايونىنىڭ رەڭگى سۇس سۆسۈن رەڭگە كىرىدۇ
 ياكى داغ قېتىپ قالىدۇ. بۇ ۋاقىتتا يۈرەك، ئىنچىك ئۈچەي، قورساق
 بوشلۇقى نېرۋا چىڭشى قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلسا، يۈرەك
 ئىقتىدارىنى تەڭشەيدۇ.

شۇنىڭ بىلەن بىللە كېسەللەرگە تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك
 كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا: ① تاماكا چەكمەسلىك؛ ② يۇقىرى قان
 بېسىمىنى تىزگىنلەش؛ ③ مايلىق يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىش؛ ④
 جىسمانىي ھەرىكەتلەرنى كۈچەيتىش؛ ⑤ كەيپىياتنى خۇشال تۇتۇش
 قاتارلىقلارنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەشۋىق قىلىش لازىم.

2. يۇقىرى قان بېسىم

يۇقىرى قان بېسىم كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ
 بىرى بولۇپ، مۇستەقىل كېسەللىك ئەمەس. سەۋەبى ئېنىق بولمىغانلىرى
 بىرلەمچى يۇقىرى قان بېسىم، سەۋەبىنى ئېنىقلاشقا بولىدىغانلىرى ئىك-
 كىلەمچى يۇقىرى قان بېسىم دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ مەلۇم كېسەلنىڭ ئىپادى-
 سىدۇر. بۆرەك كېسەللىكلىرى، دىئابېت، پوداگرا، سېزىمچانلىق ئېشىپ
 كېتىش خاراكتېرلىك سۆسۈن داغ، ئىچكى ئاجراتما توسقۇنلۇققا ئۈچ-
 راشتىن بولغان كېسەللىكلەر مەسىلەن: كورتىزول كۆپىيىپ كېتىش
 كېسىلى، خروم خۇمار ھۈجەيرە ئۆسمىسى، قالقانبەز فۇنكسىيىسىنىڭ
 كۈچىيىپ كېتىشى، چوڭلارنىڭ ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى قان بېسىمى
 ئۆرلەش، توغۇتتىن كېيىنكى يۈرەك مۇسكۇل كېسەللىكلىرى قاتارلىقلار.

نىڭ ھەممىسىدە قان بېسىمى ئۆرلەپ كېتىش مۇمكىن. چوڭلارنىڭ قان بېسىمى ياش ئەھۋالىغا قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ. قان بېسىمىنىڭ يۇقىرىلىقىغا ھۆكۈم قىلىشتا كېڭىيىش بېسىمىنىڭ ئۆزلىشى مۇھىم ئاساس قىلىنىدۇ. كېڭىيىش بېسىمى ئۇدا 90 mmHg دىن ئېشىپ كەتسە، قىسقىرىش بېسىمىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر «يۇقىرى قان بېسىمى» دەپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ. قىسقىرىش بېسىمى ئۇدا $80 - 90 \text{ mmHg}$ بولسا، گۇمانلىق يۇقىرى قان بېسىمى بولىدۇ. بۇ يەردە دەۋانقان سان قىممىتى ئىلگىرى ئادەتلىنىپ كەتكەن مىللى سىماب تۆۋرۈكى بويىچە ھېسابلانغان. ھازىر دۇنيادا ئورتاق ئىشلىتىلىۋاتقان قان بېسىمى بىرلىكى KPa ، مىللى سىماب تۆۋرۈكى بىلەن KPa نى ئالماشتۇرۇپ ھېسابلىغاندا mmHg سانىنى 7.5 كە بۆلسەك KPa سانى چىقىدۇ. مەسىلەن: 150 mmHg نى 7.5 كە بۆلسەك 20 KPa بولىدۇ.

نورمال كىشىلەرنىڭ قىسقىرىش بېسىمى يېشىغا قاراپ ئۆرلەيدۇ. 40 ياشتىن تۆۋەنلەرنىڭ قىسقىرىش بېسىمى 140 mmHg (يەنى 18.6 KPa) دىن ئاشمايدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ياش ھەر 10 ياش چوڭايسا، قىسقىرىش بېسىمى 10 mmHg يۇقىرىلايدۇ.

ياشاغانلاردىكى يۇقىرى قان بېسىمىنىڭ مۇنداق ئالاھىدە ئىپادىلىرى بار: ① قىسقىرىش بېسىمىغا سېلىشتۇرغاندا قىسقىرىش بېسىمى نىسپىي تۆۋەن بولىدۇ؛ ② يامان خاراكتېرلىك يۇقىرى قان بېسىمى نىسبەتەن ئاز؛ ③ ئىككىلەمچى يۇقىرى قان بېسىمى، بولۇپمۇ ئىچكى ئاجزاتتا خاراكتېرلىك يۇقىرى قان بېسىمى نىسبەتەن ئاز؛ ④ قان بېسىمى داۋالغۇپ تۇرىدۇ، بەدەن ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرۇشى، تۇرمۇش پائالىيەتلىرى، ئىسسىق - سوغۇق ئۆزگىرىشلىرى، يەسىل ئۆزگىرىشى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى قان بېسىمىنىڭ تۇراقلىقلىقىغا تەسىر قىلىدۇ.

كېسەل قوزغىتىش مېخانىزمى: ياشانغانلارنىڭ يۇقىرى قان بېسىمىدا دائىم دېگۈدەك قىسقىرىش بېسىمى يۇقىرى، كېڭىيىش بېسىمى تۆۋەن بولىدۇ. بەزىلەر بۇنى ياشانغانلاردىكى يۇقىرى قان بېسىمى ياكى ئارتېرىيە قېتىش خاراكتېرلىك يۇقىرى قان بېسىمى دەپ ئاتايدۇ. بۇنىڭدىكى سەۋەب، ئارتېرىيە قېتىشتىن غول ئارتېرىيە بىلەن ئۇنىڭ چوڭ تارمىقىنىڭ كېڭىيىش بېسىمى ئېلاستىكىلىقى تۆۋەنلەشتىن ئىبارەت.

يۇقىرى قان بېسىمىغا دىئاگنوز قويۇشتا ئاز دېگەندە ئىككى قېتىملىق ئوخشىمىغان ئىككى كۈندىكى ئۆلچەنگەن قان بېسىمىنى ئاساس قىلىش، ھەر قېتىم ئۆلچىگەندە ئاز دېگەندە ئۈچ قېتىم ئۆلچىگەن سان قىممەتلىرىنىڭ ھەممىسى يۇقىرى قان بېسىمى دائىرىسىدە بولغان بولۇشى لازىم. ھەقىقىي دىئاگنوز قويۇشتىن ئىلگىرى داۋالاشنى باشلىماسلىق (دورا ئىشلەتمەسلىك) لازىم. باشقا مۇرەككەپ تەكشۈرۈشلەرنى قىلىش مۇھاجەتسىز. پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق كېسەللىك ئەھۋالىغا قارىتا ساقلىقنى ساقلاش قوللىنىلسا بولىدۇ.

يۇقىرى قان بېسىمىنىڭ ئالامەتلىرى: دەسلەپتە باش ئاغرىيدۇ، باش قايدۇ، ئۇيقۇ كەلمەيدۇ، ئەستە تۇتۇش ئاجىزلىشىدۇ، دىققەتسىزلىك، مەزكەزلەشتۈرەلمەيدۇ، بىئارام بولىدۇ، ماغدۇرسىزلىق ھېس قىلىدۇ، يۈردىكى ئاغرىيدۇ. كېيىنچە بۇ خىل كېسەللىك ئالامەتلىرى ئېغىرلىشىدۇ، باش قىيىپ، باش ئېغىرلىشىدۇ، يۈز - كۆزلىرى قىزىرىدۇ، پۈتۈن بەدەن يېقىمىسىزلىق ھېس قىلىدۇ، نەرسىلەر غۇۋا كۆرۈنۈش قاتارلىقلار. قان بېسىمىنىڭ يۇقىرى بولۇشى تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. بۇنىڭدىكى سەۋەب - نەتىجە مۇناسىۋىتى تۆۋەندىكى ستاتىستىكىلىق جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەندەك. پەقەت كېڭىيىش بېسىم 80 mmHg دىن ئېشىپ كەتسەلا تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلىگە ئۆزگىرىدۇ.

تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلىگە ئۆزگىرىش نىسبىتى	كېڭىيىش بېسىم سانى
1	80mmHg دىن تۆۋەن بولغاندا
1.36	89 mmHg - 80 بولسا
1.75	104mmHg - 90 بولسا
2.63	114mmHg - 105 بولسا
3.73	115mmHg دىن يۇقىرى بولسا

ئامېرىكىلىق شۇغۇرتا ساھەسىنىڭ مۆلچەرلىشىچە: 35 ياشلىق ئەر كىشىنىڭ قان بېسىمى $120/80 \text{ mmHg} >$ بولسا، ئۇنىڭ يەنە ياشاش ئۆمرى 42 يىل بولۇپ، مۆلچەرلەنگەن ئۆمرى 77 ياش بولىدۇ. ئەگەر $150/100 \text{ mmHg} \leq$ بولسا، ئۇنىڭ يەنە ياشاش ئۆمرى 25 يىل بولۇپ، مۆلچەر ئۆمرى 60 ياش بولىدۇ.

45 ياشلىق ئەر كىشىنىڭ قان بېسىمى $120/80 \text{ mmHg} >$ بولسا، ئۇنىڭ مۆلچەر ئۆمرى 77 ياش.

ئەگەر $150/100 \text{ mmHg} \leq$ بولسا، ئۇنىڭ ئۆمرى 65 ياش بولىدۇ. بىز تاجىسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى دېگەن ماۋزۇدا يۇقىرى قان بېسىمى بىلەن تاجىسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلىنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۇق. شۇڭلاشقا، يۇقىرى قان بېسىمىدىن ساقلىنىش ياشانغانلارنىڭ سالامەتلىكى ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق.

بىرلەمچى ياكى ئىككىلەمچى يۇقىرى قان بېسىمىنىڭ ھەممىسىنى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن تىزگىنلىگىلى ۋە تەڭشىگىلى بولىدۇ. ئادەتتە بىر داۋالاش مۇددىتى ئىچىدە قان بېسىمى تەدرىجىي تۆۋەنلەيدۇ.

پەللە تاللاش: پۈتۈن پۈتۈن ئۇۋۇلاش ئاساسىدا نوقتىلىق قىلىپ بۆرەك، سۈيىدۈك نەيچىسى، دوشساق، چوڭ - كىچىك مېگە، مېگە غولى، مېگە ئاستى بېزى (ھىپوفىز)، يۈرەك، ئىنچىك ئۈچەي، قالدانبەز، بويۇن قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى ئوتتۇرا ھال كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلاش، قور - ساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشىنى ئېغىر كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلاش لازىم.

كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ يەنە: چوڭ تەرەتنىڭ راۋان بولۇشىنى ساقلاشتا مەقۇت، تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى؛ ئىككىلەمچى بۆرەك كېسىلى بارلارغا جىنسىي بەز ۋە ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى؛ خروم خۇمار ھۈجەيرە ئۆسمىسى بارلارغا تۆۋەنكى قورساق، يۇقىرى - تۆۋەن لىمفا ۋە تال رېفلىكس رايونىنى قوشۇپ ئۇۋۇلاش لازىم. قالدانبەز فۇنكسىيىسى كۈ - چىيىپ كەتكەنلەرگە قالدانبەز رېفلىكس رايونىنى ئېغىر كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلاش؛ مېگە ئاستى بېزى رېفلىكس رايونىنى يېنىك ئۇۋۇلاش لازىم.

قان بېسىم پەرقى كىچىك بولغانلارنىڭ كۆكرەك ۋە دىئافراگما را-
يونىنى كۆپرەك ئۇۋۇلاش، ئەگەر كېسەل ناھايىتى ھارغىنلىق ھېس قىلسا
تېزلىكتە ياخشىلىنىشى ئۈچۈن يۈرەك، ئىنچىك ئۈچەي، چوڭ مېگە قا-
تارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى يېنىك ئۇۋۇلاپ بەرسە بولىدۇ. ئەگەر قان
بېسىم پەرقى چوڭ بولسا، بۇ ئارتېرىيە قېتىشقا باشلىغانلىقىدىن بېشارەت
بېرىدۇ. بۇنداقلارمۇ دىققەت قىلىشى، ئەگەر كۆپ قېتىم ئۆلچەنگەندە
ئوخشاش چىقىۋەرسە تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى دەپ مۇئا-
مىلە قىلىش لازىم. بۇ يەردە «مۇئامىلە» بۇ كېسەلنى تاجسىمان يۈرەك
كېسىلى دەپ دىئاگنوز قويۇش ئەمەس، تاجسىمان يۈرەك كېسىلى دەپ
ئالدىنى ئېلىش دېگەنلىكتۇر.

ئونىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن يا- شانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەر- نىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش (2)

سەكتە (مېگە قان تومۇر تاسادىپىيلىقى)

سەكتە ياشانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىك بولۇپ، تېبابەتتە «-
مېگە قان تومۇر تاسادىپىيلىقى» دەپ ئاتىلىدۇ. مېگە قان تومۇر تاساد-
پىيلىقى مېگە قاناش، مېگە ئۆمۈچۈك تورسىمان پەردە ئاستى بوشلۇقى
قاناش، مېگە قان نۆكچىسى ھاسىل بولۇش، مېگە كەپلەشمىسى قاتارلىق-
لارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

1. مېگە قاناش

(1) كېسەللىك سەۋەبى مېگە قاناشنىڭ كۆپىنچىسى قان بېسىمى
يۇقىرىلاش، ئارتېرىيە بوتقىسىمان قېتىش مەنبەلىك قان تومۇر دىۋارىنىڭ
ئېلاستىكىلىقى تۆۋەنلەش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. مېگە قاناش كۆ-
پىنچە كىشىلەر سەگەك ھالدا ھەرىكەت قىلىۋاتقاندا كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭغا
كۆپىنچە ھاياجانلىنىش، كۈچەپ تەرەت قىلىش، قاتتىق يۆتۈلۈش قاتار-
لىقلار سەۋەب بولۇپ قالىدۇ.

(2) ئالامەتلىرى

(1) ئىچكى خالتا قاناش:

① ئۆتكۈر مەزگىلى: تۇيۇقسىز بېشى قاتتىق ئاغرىپ كېتىدۇ، كۆزى
قاراڭغۇلىشىدۇ، قۇسىدۇ، يېرىم پالەچ بولۇپ قالىدۇ، ئاغزى، كۆزى مايماق
كېتىدۇ. ئەگەر قانغان ئورۇن سول تەرەپ مېڭىدە بولسا سۆزلەشتىن قا-

لىدۇ. كۆپ ساندىكى كېسەللەردە ئوخشاشمىغان دەرىجىدە ئاڭ - سېزىم توسالغۇسى كۆرۈلىدۇ. كېسەل تەگكەن دەسلەپكى ۋاقىتلاردا ئاڭ سېزىم توسالغۇسى نىسبەتەن ئېغىر بولىدۇ، ھەتتا ھوشسىزلىنىدۇ. ئاڭ - سېزىم توسالغۇسىنىڭ دەرىجىسى كېسەل تەگكەن جايىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى، ئورنى، كېڭىيىش دائىرىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. ئاڭ - سېزىم توسالغۇسىنىڭ دەرىجىسى يەنە كېسەللىكنىڭ ئېغىرلىق دەرىجىسى بىلەن بىردەك بولىدۇ. ئېغىر ئاڭ - سېزىم توسالغۇسى بولغان مېڭە قاناش يۈز بەرگەن كېسەللەرنىڭ ئۆلۈپ كېتىش نىسبىتى ناھايىتى يۇقىرى بو- لىدۇ. ئاڭ - سېزىم توسالغۇغا ئۇچرىمىغان، مېڭىسى قانغان كېسەللەردىن ئۆلۈپ كېتىدىغانلىرى ئىنتايىن ئاز بولىدۇ.

② ئەسلىگە كېلىش مەزگىلى: مېڭىسى قاناش ئېغىر بولمىغان ياكى قاننىڭ سۈمۈرۈلۈشى ياخشى بولغان كېسەل بىر نەچچە كۈن ھوش- سىزلانغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئاڭ - سېزىمى تەدرىجىي ياخشىلىنىدۇ. ئەسلىگە كېلىشنىڭ ئالدى - كەينى تەرتىپى: پۇت، بەدەننىڭ تۆۋەنكى قىسمى، سۆز قىلىش ۋە يۈز قىسمى نېرۋىلىرى؛ بەدەننىڭ يۇقىرىقى قىسمى ۋە قولنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ئەڭ كېچىكىدۇ.

③ سوزۇلما مەزگىلى: كۆپ ساندىكى كېسەللەر يېرىم يىل ئىچىدە تەدرىجىي ئەسلىگە كېلىدۇ. ئەگەر يېرىم يىلدىن كېيىنمۇ ئەسلىگە كې- لەلمىسە، يېرىم يىلدىن ئىككى يىلغىچە، كۆپ ساندىكى كېسەللەرنىڭ ئەسلىگە كېلىشى بەكمۇ ئاستا بولىدۇ. بىراق، داۋالاش ۋە چېنىقىشنى ئۈزۈپ قويماسلىق لازىم. گەرچە بۇنىڭ ئۈنۈمى ناھايىتى تۆۋەن بولسىمۇ، ئەمما، ساقىيىشتىن يەنىلا ئۈمىد بار.

(2) مېڭە كۆۋرۈكى قاناش: كېسەل تۇيۇقسىز ئېغىر ھوشسىزلىنىدۇ، ئادەتتە كېسەللەر ئەمدىلا بېشى ئاغرىپ، كۆزى قاراڭغۇلاشقانلىقىنى ھېس قىلىشىغا ھوشسىزلىنىدۇ. كۆز قارىچۇقى زور دەرىجىدە كىچىكلەيدۇ، پۇت - قوللىرى پالەچ بولۇپ قالىدۇ. كەينىدىنلا قاتتىق قىزىپ، تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ كۆز قارىچۇقى كېڭىيىدۇ، نۇرغا بولغان ئىنكاسى يوقىلىدۇ.

پۇت - قوللىرى قاتىدۇ، چىشلىرى كىرىشىدۇ، نەپەس ئېلىش رېتىمىسىز - لىنىدۇ، قان ئايلىنىش زەئىپلىشىدۇ. كالىۋىكى قوڭۇر رەڭگە كىرىدۇ، تىزناق ئۇچلىرى كۆكىرىدۇ، كېسەللىك ئەھۋالى ئىنتايىن ئېغىر بولىدۇ. (3) كىچىك مېڭە قاناش: باشنىڭ يېرىمى تۇيۇقسىز ئاغرىپ، كۆزى قاراڭغۇلىشىدۇ، ئارقا - ئارقىدىن قۇسىدۇ، ماڭسا قەدىمى كالاڭلىشىدۇ، بوينى قاتىدۇ، تېنىنىڭ بىر تەرىپىدە ھەرىكەت توسالغۇسى پەيدا بولىدۇ.

2. ئۆمۈچۈك تورسىمان پەردە ئاستى بوشلۇقى قاناش: بېشى تۇيۇقسىزلا دەھشەتلىك ئاغرىيدۇ، قۇسىدۇ، مېڭە پەردىسى غىدىقلىنىش ئالامەتلىرى (بويۇن قىسمى مۇسكۇلى تارتىشىپ قېتىش) كۆرۈلىدۇ، قىسقا ۋاقىتلىق ئاڭ - سېزىم توسالغۇسى ۋە تىنچىسىزلىنىش، خۇددىنى يوقىتىش قاتارلىق روھىي كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

3. مېڭە قان نۆكچىسى شەكىللىنىش: مېڭە قان نۆكچىسىنىڭ شەكىللىنىشى ئارتېرىيە بوتقىسىمان قېتىش يۈز بېرىپ، قان تومۇر ئىچكى پەردىسى قېلىنلاپ، تومۇر بوشلۇقى تارايغانلىقتىن بولىدۇ، يەنى، تارايغان ئورۇننىڭ توغرا كەسمە يۈزىنىڭ تارىيىشى %50 دىن ئاشقاندا قان نۆكچىسىنىڭ شەكىللىنىشى ناھايىتى تېزلىكتە كۆپىيىپ، قان ئايلىنىش سۈرئىتى ئاستىلايدۇ، بۇنىڭ بىلەن قان نۆكچىسىنىڭ شەكىللىنىشى تېخىمۇ تېزلىشىدۇ. مېڭە كىچىك ئارتېرىيىسىنىڭ تاللىشىش كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرىدىمۇ مېڭە قان نۆكچىسى شەكىللىنىدۇ. مېڭە قان نۆكچىسى كۆپىنچە تىنچ ھالەتتە ياكى قان بېسىمى تۆۋەن كېسەل - لەردە كۆرۈلىدۇ. ئۇنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى: ئاڭ - سېزىم توسالغۇسى، ھەرىكەت توسالغۇسى ۋە سېزىم توسالغۇسى كۆرۈلىدۇ.

(1) ئاڭ - سېزىم توسالغۇغا ئۇچراش: قان نۆكچىسىنىڭ ئاڭ - سېزىم توسالغۇسىنى پەيدا قىلىشى ئاستا بولۇپ، تەدريجىي ئېغىرلىشىدۇ. چوڭ مېڭە ئوتتۇرا ئارتېرىيىسىنىڭ ئىتلىپ قېلىشى يۇقىرى دەرىجىدە ئاڭ - سېزىم توسالغۇسىنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇيقۇچان ھەم خۇنىكلىشىش يېنىك تىپتىكى ئاڭ - سېزىم توسالغۇسىنى كۆرسىتىدۇ. نىشان بەلگىلەش ئىقتىدارى

تىدارى تۆۋەنلەش، ھۇشسىزلىنىش ۋە يېرىم ھوشسىزلىنىش، ئۆزىچە قالايمىقان سۆزلەش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئاڭ - سېزىم توسالغۇغا ئۇچرىغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر.

(2) ھەرىكىتى توسالغۇغا ئۇچراش: مەسلەن: بىر تەرىپى پالەچ بولۇپ قېلىش، پۇتى ئىگىلىپ قېلىش، مۇسكۇلى تارتىشىپ قېلىش، سۆزدىن قېلىش، يۇتۇش قىيىن بولۇش قاتارلىقلار.

(3) سېزىمى توسالغۇغا ئۇچراش: يۈزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نېپرۇ ئۇچلىرى جايلاشقان ئورۇنلاردىكى سېزىم توسالغۇسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەسلەن: يېرىم بەدىنى دەھشەتلىك ئاغرىش، ئايرىم جايلاردا كۆيگەندەك ياكى چۈمۈلە ماڭغاندەك سېزىم بولۇش قاتارلىقلار.

4. مېڭە كەپلەشمىسى: قان ئايلىنىشقا كىرگەن مەلۇم نۆكچە ھەردەكەت قىلىپ مېڭە قان تومۇرغا بېرىپ مېڭە ئارتېرىيىسىنى توسۇش نەتىجىسىدە كۆرۈلىدۇ. كلىنىكىلىق ئىپادىسى بولسا، يېرىم پالەچ ۋە ئاڭ - سېزىمى توسالغۇغا ئۇچراش ئاستا - ئاستا بولىماستىن، بەلكى بەكمۇ تويۇقسىز پەيدا بولىدۇ. قان ئايلىنىشقا كىرگەن نۆكچە يۈرەك تىقىلمىسىدىكى نۆكچە، يۈرەك ئىچكى پەردە ياللۇغىدا ئاجرىلىپ چىققان ماددىلار، سىرتقى زەخمە كەلتۈرۈپ چىقارغان قان ئويۇملىرى، پۇت قان تومۇر ياللۇغىدىكى نۆكچە قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىششىقلىق ئۆسمە ھۈجەيرىلىرىدىن ئاجرىلىپ قان ئايلىنىشقا كىرگەن ۋە ھاۋا نۆكچىلىرى قاتارلىقلارمۇ مېڭە قان تومۇر كەپلىشىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، بۇ خىل كېسەل كۆپىنچە ياش ۋە ئوتتۇرا ياشلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. بىراق ياشانغانلاردىمۇ كۆرۈلىشى مۇمكىن.

سەكتىنىڭ ئالدىنقى بېشارىتى: سەكتىنىڭ ئالدىنقى بېشارىتى ۋە كېسەللىك ئالامىتىنىڭ پەيدا بولۇشى ۋاقىت جەھەتتە بەزىدە ئىككىسەننىڭ ئارىلىقى نىسبەتەن يېقىن، بەزىدە يىراق بولىدۇ. مېڭە قاناش ۋە مېڭە كەپلىشىپ قېلىشتا كېسەل بولۇشتىن ئىلگىرى باش ئاغرىش، ئۇيۇشۇش سېزىمى بولۇش، ماغدۇرسىزلىنىش، كۆزى قاراڭغۇلىشىش قاتارلىق يۇقىرى

قان بېسىمىغا ئوخشاپ كېتىدىغان سەزگۈ بولىدۇ.

مېڭە قان نۆكچىسىنىڭ شەكىللىنىش دەسلەپكى ئالامەتلىرى بولسا:

① ئارىلىقنى مۆلچەرلەش توغرا بولمايدۇ. مەسىلەن: يول يۈرۈۋاتقاندا نا-
ھايىتى تۈز بەردە مېڭىۋاتسىمۇ پۇتى قايرىلىپ كېتىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ.
ئىشىكتىن كىرىپ چىقىشتا مۇرىسى ئىشىككە تېگىپ كېتىدۇ؛ ② تەرەت
قىلغۇسى كېلىپلا تۇرىدۇ، چوڭ - كىچىك تەرەت قېتىم سانى كۆپىيىدۇ،
لېكىن چوڭ تەرەتنى تولۇق چىقىرالمىدۇ؛ ③ ئولتۇرۇش ھالىتى ئالاھىدە
بولىدۇ، بىر قولىنى ياكى ئىككىلا قولىنى دائىم يوتىسىغا قويۇپ ئولتۇ-
رىدۇ، ھەمدە قول دۈمبىسىنى يوتىسىغا تەگكۈزۈپ، ئالقىنىنى يۇقىرىغا قا-
رىتىپ ئولتۇرىدۇ، ئۇنىڭغا بىر ئىستاك سۇ ياكى باشقا نەرسىنى سۇنۇپ
بەرسىڭىز ئۇ قولى بىلەن ئېلىپ ئەسلىي ھالىتىنى ئۆزگەرتىدۇ. ئۇزاق
ئۆتمەيلا يەنە ئەسلىي ھالىتى بويىچە ئولتۇرۇۋالىدۇ. ئادەتتە بۇ سەكتىنىڭ
ئالدىنقى بېشارىتى ياكى سەكتىنىڭ ئاسارىتى بولىدۇ؛ ④ نەرسىلەرگە
قارىغاندا تۇتۇق ياكى قوش كۆرۈنىدۇ ياكى كۆزى تالىدۇ. يۈز - كۆزى
ئۆۋەنگە قىيىسىپ قالىدۇ قاتارلىقلار. پۇتىدا ئالدىنقى مەزگىلدە بەزى
ئۆزگىرىشلەر بولىدۇ. مەسىلەن: پۇتنىڭ بەش بارمىقىنىڭ يۇمشىقىدا ياكى
ئۇنىڭ ئەڭ ئۈستى تەرىپىدە قان چىققان نوقتا بولسا، بۇ مېڭە قان تومۇرى
قاناشنىڭ ئالدىنقى بېشارىتى. بارماق يۇمشىقىدا تۇتۇق سۆسۈن داغ پەيدا
بولسا، بۇ مېڭە قان نۆكچىسى شەكىللەنگەنلىكىنىڭ بېشارىتىدۇر. ئۇ-
نىڭدىن باشقا يەنە باش بارماق بىلەن پۇتنىڭ باش بارمىقىنى ئالدى تە-
رەپتىن ئارقا تەرەپكە ئىتتىرىپ ئۇۋۇلساق، ھەمدە قان ئاز قېلىش ياكى
قان تولۇش ئۆزگىرىشىنى كۆرەتسەك، ئىتتىرىپ ئۇۋۇلغاندا پۇت باش
بارمىقىنىڭ يۇمشىقى قىزىلىشتىن ئاق رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. ئاق ھالەت ئى-
چىدە قىزىل چېكىت كۆرۈنمەسلىكى كېرەك. ئەگەر كۆرۈنسە بۇمۇ مېڭە
قان تومۇرىدا توسۇلۇش بار بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنداق
تەكشۈرۈشتە ئالدى بىلەن پۇتنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، پۇت بارماقلىرىنى يۈرەك
بىلەن ئوخشاش تەكشىلىكتە تۇتۇپ 5 مىنۇت ئۆتكەندە كۆزىتىش كېرەك.

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇپ داۋالاشتا مېگە قان تومۇرىدىكى ئاسادىپىيلىقتىن ئىبارەت بۇ خىلدىكى كېسەل-لەرگە قوللىنىشتا، ئاساسلىقى سەكتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە سەكتىنىڭ قالدۇرغان ئاسارىتىنى داۋالاشتا قوللىنىلىدۇ.

پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ سەكتە ئاسارىتىنى داۋالاشتا تۆۋەندىكىدەك تەسىراتىمىز بار:

(1) كېسەللىكنىڭ قوزغىلىش سەۋەبى ۋە ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالاش لايىھىسىنى بېكىتىش.

مېگە قانغان دەسلىپىدە ئادەتتە بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق داۋالىمىغان ياخشى. چۈنكى پۇتنى ئۇۋۇلغاندا قان ئېقىشى راۋانلاشتۇرۇپ، قان تو-مۇرلارنى كېڭەيتىدۇ، قاننىڭ ئايلىنىشى جانلىنىدۇ. بۇنىڭ بىلەن قان تېخىمۇ كۆپ چىقىدۇ. گەرچە بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلسا ئىنچىكە قان تومۇرلىرىنى قىسقارتىپ، كۆز تېگىنىڭ قانىشى ۋە بۇرۇن قاناشنى توختاتسىمۇ، مېگە قاناش كېسەل ئوچىقىنى يادرو ماگنىت رېزونانس ئەسۋابى ئارقىلىق تەكشۈرۈپ تاپقىلى بولسىمۇ، ئەمما قانغان تومۇرنىڭ ئىنچىكە شاخچىسىنى بىراقلا پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ. شۇڭا، پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن قان توختىتىشقا بولمايدۇ. مېگە قان تومۇرلىرى ئاسادىپىيلىقى كېسەللىك ئەھۋالى تۇراقلاشمىغاندا بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىشتىن ئېھتىيات قىلىش لازىم.

(2) پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن سەكتە ئاسارىتىنى داۋالاشتا، كېسەللىك مۇددىتى بىر يىل ئىچىدە بولغانلىرىغا ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. كېسەللىك مۇددىتى ئىككى، ئۈچ يىل بولغانلىرىغا ئۈنۈمى ئاستا بولىدۇ. كېسەللىك مۇددىتى قانچە ئۇزۇن بولسا، خاسىرى ئۈنۈمى شۇنچە تۆۋەن بولىدۇ. ئەمما ئۈنۈمىمىز بولمايدۇ. پۇتنى ئۇۋۇلاپ بەرگەندە كېسەللىك ئالامەتلىرى ياخشىلىنىدۇ.

(3) سەكتە ئاسارىتىنى داۋالاشتا نوقتىلىق ئۇۋۇلىنىدىغان رېفلىكس

رايونلىرى : چوڭ - كىچىك مېڭە، ئۇچلۇك نېرۋا، بويۇن ئومۇرتقىسى،
 كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، توققۇز كۆز ئومۇرتقىسى، قالدان-
 سىمان يان بەز، جىنسىي بەز، يۈرەك، ئال، جىگەر، ئۆت قاتارلىق رېڧلىكس
 رايونلىرى، يەنە مۇناسىۋەتلىك كېسەللىك ئالامەتلىرى بار رېڧلىكس را-
 يونلىرىنى ماسلاشتۇرۇپ ئۇۋۇلاش زۆرۈر. مەسىلەن: ئېغىز، كۆزلىرى
 قىڭغىر بولۇپ قالغانلىرىغا يۇقىرى ئېڭەك، تۆۋەن ئېڭەك، كۆز رېڧلىكس
 رايونلىرىنى؛ بەدەن تۆۋەن قىسمىنىڭ ھەرىكىتى توسالغۇغا ئۇچرىغانلارغا
 يانپاش بوغۇم، تىز بوغۇمى رېڧلىكس رايونلىرىنى قوشۇپ ئۇۋۇلاش، بە-
 دەننىڭ يۇقىرىقى قىسمىنىڭ ھەرىكىتى توسالغۇغا ئۇچرىغانلارغا يەلكە
 بوغۇمى، جەينەك بوغۇمى ۋە تاغاق سۆڭىكى رېڧلىكس رايونلىرىنى؛
 سۆزلىشى توسالغۇغا ئۇچرىغانلارغا كېكرەك، كېكرەك بېشى ئاۋاز بەل-
 بىغى رېڧلىكس رايونىنى (قالقانبەز رېڧلىكس رايونىنىڭ ئەڭ ئالدى ئۇ-
 چىدا، پۇت باش بارمىقى بىلەن 2 - بارماقنىڭ قاچا شەكىللىك تۇتاشقان
 جايىدا)، تەرتىتى توختىمايدىغانلارغا مەقەت، تۈز ئۇچەي، قالقانبەز رېڧ-
 لىكس رايونلىرىنى (چوڭ تەرەتنىڭ راۋان بولۇشى ئىنتايىن مۇھىم)؛
 پات - پات سىيگۈسى قىستاپ تۇرىدىغان، سۈيدۈكى توختىمايدىغانلارغا
 بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق، سۈيدۈك يولى، قورساقنىڭ تۆۋەنكى
 قىسمى قاتارلىق رېڧلىكس رايونلىرىنى قوشۇپ ئۇۋۇلاش كېرەك. مىجەزى
 چېچىلغانلارغا تەرتىتنى ماڭدۇرۇش، ئېغىرراق كۈچ بىلەن جىگەر رېڧ-
 لىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش، ئەگەر بەزىدە كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىر كۈچ
 بىلەن تەرەت ماڭدۇرۇشقا مۇۋاپىق بولمىسا، يېنىك كۈچ بىلەن ئۆپكە
 رېڧلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىسىمۇ بولىدۇ. ئون نەچچە قېتىم ئۇۋۇلاپ، ئۆپكە
 ئىقتىدارىنى ياخشىلاپ، جىگەردىكى ئۇيۇلمىلارنى ھەيدەشنى مەقسەت
 قىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. بۇنداق قىلغاندا يەنە نەپەس يو-
 لىنىڭ ئىقتىدارىغا پايدىسى بولىدۇ. يۇقىرىقى رېتسپىلار ھەممە پۇتنى
 ئۇۋۇلاش ئاساسىدا، نوقتىلىق ئۇۋۇلىنىدىغان رېڧلىكس رايونلىرىدۇر.

4) بىر تەرەپ پالەچلىكى ئەسلىگە كېلىشنىڭ تەرتىپى مۇنداق

بولدۇ: بەدەننىڭ تۆۋەن قىسمى، سۆز قىلىش، يۈز، بەدەننىڭ يۇقىرىقى قىسمى، ئەڭ تەسلىكتە ئەسلىگە كېلىدىغىنى تىرناق. ئەگەر ئەسلىگە كېلىش داۋامىدا سۆز قىلىش توسالغۇغا ئۇچراش، بەدەننىڭ يۇقىرىقى قىسمى توسالغۇغا ئۇچراش ياخشىلايسا، ئەمما بەدەننىڭ تۆۋەن قىسمى ئە- زالىرى توسالغۇسى ياخشىلانمىسا، بۇنىڭ سەۋەبىنى ئۆز ۋاقتىدا تېپىپ چىقىش، يەنىلا يەككە ھالدا سەكتە قاتارىدا داۋالاۋەرمەسلىك لازىم. نۇرغۇن ياشانغانلاردا ئەسلىدە بويۇن ئومۇرتقا ئۆسمىسى ياكى بەل ئومۇرتقا كې- سەللىك ئۆزگىرىشى بولغان بولىدۇ. بۇنىڭ سەكتە ئالدىدا كېسەللىك ئا- لامىتى كۆرۈلمەيدۇ. سەكتە بولغاندىن كېيىن ئىممۇنىت كۈچى ئاجىزلاپ، بەدەندىكى تارقاقلاشتۇرۇش فېرېمېنتلىرىنىڭ ئاجىزلىپ چىقىشى ئازىيىپ، بەدەندىكى زىيانلىق ماددا - ئەركىن رادىكال ۋاقتىدا تازىلاپ چىقىرىلىد- غاچقا، ئەسلىدە ئالامىتى بولمىغان ئومۇرتقا كېسەللىك ئۆزگىرىشنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ ۋە تەرەققىي قىلىپ ئومۇرتقا كېسەللىكىنى كەلتۈ- رۈپ چىقىرىدۇ. بەزىدە سەكتىدىن كېيىن پۇتلاشۇپ يىقىلىپ چۈشۈپ، بەل ياكى يانپاش بوغۇم يارىلانغان بولۇپ، سەكتىنىڭ كېسەللىك ئالامەت- لىرى ئومۇرتقا ۋە بەدەننىڭ ئاستىنقى قىسمىنىڭ سىرتقى جازاھىتىنى يوشۇرغان بولغاچقا، بەدەننىڭ ئاستىنقى قىسمىنىڭ پالەچلىكى پات ئەسلىگە كېلەلمەيدۇ. بۇنىڭغا قارىتا، بويۇن ئومۇرتقىسى ۋە بەل ئومۇرت- قىسىنى يەنىمۇ تەكشۈرۈپ كۆرۈپ، سەۋەبىنى تېپىپ كېسەللىك سەۋەبىگە قارىتا داۋالاش كېرەك.

5) پەقەتلا يۈز نېرۋا پالىچى بولغان بولسا، سەكتە قاتارىدا داۋالاش بىلەن بىللە يەنە ۋىرۇسلۇق يۇقۇملىنىشنىمۇ ئويلىشىش كېرەك. شۇڭا، پەقەتلا يۈز قىسمى پالەچ بولسا ئىممۇنىت ئىقتىدارى رېغلىپكس رايونىد- ىرىنى قوشۇپ ئۇۋۇلاش مەسلىن: كۆكرەك لىمفا بەزلىرى، بەدەننىڭ يۈ- قىرىقى - تۆۋەنكى قىسىم لىمفا بەزلىرى، بادام بەز ۋە تال قاتارلىق رېف- لېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش زۆرۈر. ئەگەر كېسەل باشلىنىپ بىر ھەپتە ئىچىدە بولسا ۋىرۇسقا قارشى دورىلارنى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە

ئىچىسە بولىدۇ.

6) پۇت رېفلىكسى رايونلىرى ئۇسۇلىدىن باشقا يەنە ئىقتىدار مەشىق قىلىشقىمۇ سەل قاراشقا بولمايدۇ. ئىقتىدار مەشىقى ئۆزى ھەرىكەت قىلىش ۋە باشقىلار ھەرىكەت قىلغۇزۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ھەمدە ئۆزى ھەرىكەت قىلىپ مەشىق قىلىش ئاساسى قىلىنىدۇ. كېسەل بولغاندىن كېيىنكى 3-1 ھەپتە ئىچىدە كېسەللىك ئەھۋالى تۇراقلىق، ئەس - ھوشى جايىدا بولسا، ھەرىكەت قىلىپ مەشىق قىلىشنى باشلىسا بولىدۇ. ① باشقىلار ھەرىكەت قىلغۇزۇش. ئاساسىي مەقسەت مۇسكۇللارنىڭ يىگىلەپ كېتىشىدىن ساقلىنىش. بۇنىڭدا كېسەلنى بوغۇم ھەرىكەت دائىرىسى بويىچە ھەرىكەت قىلدۇرۇش. يەنى ساق تەرىپىدىن باشلاپ كېسەل تەرەپىگە، چوڭ بوغۇمدىن كىچىك بوغۇمغا تەرتىپ بويىچە تولۇق ھەرىكەت - لەندۈرۈش ھەم ھەرىكىتى ئاستا بولۇش، ھەرگىز قوپاللىق قىلماسلىق لا - زىم. شۇنداق قىلغاندىلا مۇسكۇلنى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن ساقلاڭغىلى بولىدۇ. جەينەك، بارماق، ئۇشۇق بوغۇمغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. چۈنكى بۇ ئورۇنلار ناھايىتى ئاسانلا قېتىپ قالىدۇ. زورمۇ - زور ھەرىكەت - لەندۈرۈلسە بۇمشاق توقۇلمىلارنى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشى مۇمكىن. ② ئۆزى ھەرىكەت قىلىش. ئۆزى بەدەن ئەزالىرىنى ئاستا سۈرئەتتە ھەرىكەتكە كەلتۈرۈش، ساغلام تەرەپتىكى بەدەن ئەزالىرى ئارقىلىق كېسەل تەرەپ بەدەن ئەزالىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. مەسىلەن: ساق قول بىلەن كېسەل قولىنى يۇقىرىغا كۆتۈرۈش، ساق پۇت بىلەن كېسەل پۇتنى يۇقىرىغا كۆتۈرۈش، ساق قول بىلەن غالتەك ئارقىلىق كېسەل پۇتنى كۆتۈرۈش قاتارلىقلار. ھەرىكەتلىنەلمەيدىغان بەدەن ئەزالىرىنى خىيالى ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. مەسىلەن: قول بارماقلىرىنى سوزۇش، ئېگىش، يىغىش، بەدەننىڭ يۇقىرىقى قىسمىنى سوزۇش، ئېگىش، پۇتنى سوزۇش، ئېگىش قاتارلىقلار. كېسەل كارىۋاتتا سوزۇلسا، ئۆرۈلسە، ئولتۇرسا بولىدۇ. ئولتۇرغاندا ئىككى پۇتىدا غالتەكنى تېپىش، ئۆز ئورنىدا ئولتۇرۇپ مېڭىش، باشقىلارنىڭ ياردىمى بىلەن ئۆرە تۇرۇش، نەرسىلەرنى تۇتۇپ ئۆرە تۇرۇش،

قولنى قويۇپ بېرىپ ئۆرە تورۇش، بەدەن ئاستى قىسىملىرى مۇسكۇل كۈچى ۋە تەڭپۇڭلۇق ئىقتىدارىنى مەشىق قىلىش كېرەك. مېڭىشنى سىناپ كۆرۈش، گېزىت ئوقۇپ تىلنى سىناش، ئۆزى غىزالىنىشنى مەشىق قىلىش، كىيىم كىيىش ۋە تۈگمىسىنى ئېتىشنى مەشىق قىلىش، ئۆزى ئېغىز چاپقاش، چىش چۈتكىلاش، يۈز يۇيۇش، باش يۇيۇش، ئۆزى تەرەتخانىغا كىرىپ چوڭ - كىچىك تەرەت قىلىشنى مەشىق قىلىش قا - تارلىقلار. شۇنداق قىلسا، تورمۇشتا تەدبىرىجىي ئۆزىنىڭ ئىشىنى ئۆزى قىلالايدىغان بولىدۇ.

(7) پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق داۋالاشتا، كېسەل تەرەپ تەن ئەزالىرىنىڭ پۇت ئۇۋۇلىشىدا بېرىدىغان كۈچنىڭ مۇۋاپىق ۋە ئاستا بو - لۇشىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. بەزىدە كېسەل تەرەپنى ئاغرىشقا ئالاھىدە سەزگۈر كېلىدۇ. يېنىك تېگىپ كەتسىمۇ ئاغرىيدۇ. شۇڭا، ھەرىكەت ئاستا، بېرىدىغان كۈچ يېنىك قىلىپ ئۇۋۇلاش كېرەك. مۇسكۇل ۋە تېرىسى پالەچ ياكى بوغۇملىرى قېتىپ قالغانلارغا نىسبەتەن زەخمىد - لەندۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، يېنىك كۈچ بېرىپ ئاستا ئۇ - ۋۇلاش لازىم.

سەكتىدىن ساقلىنىشتا: سەكتە كۆپىنچە يۇقىرى قان بېسىمى ۋە ئارتېرىيە بوتقىسىمان قېتىشتىن بولىدۇ. شۇڭلاشقا، پۇت رېفلىكس را - يونلىرى ئارقىلىق يۇقىرى قان بېسىمى ۋە ئارتېرىيە قېتىشتىن داۋالاش سەكتىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئاچقۇچى. پۇتنى ئۇۋۇلىغاندا قان بېسىمى، قاندىكى ماي، خولېستېرىن چۈشۈرۈپ، ئارتېرىيە قېتىشتىن ئالدىنى ئال - لىدۇ. يۇقىرى قان بېسىمىنى پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق داۋالاشنى 9 - بابتا سۆزلەپ ئۆتتۇق.

ئون بىرىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق ياشانغانلاردا دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەل- لىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش (3)

دىئابىت كېسەلى

دىئابىت كېسەلى ئوتتۇرا ياش، ياشانغانلارنىڭ تەن ساغلاملىقى ۋە ئۆمرىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان، كۆپ كۆرۈلىدىغان ئىچكى ئاجراتما مې-تابولىزم كېسەللىكى بولۇپ، ياشنىڭ چوڭىيىشىغا قاراپ كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئۇ ھازىر يىلتىزىدىن داۋالاش چارىسى بولمىغان دۇنيا خاراكتېرلىك قىيىن مەسلە بولۇپ قالدى. نۆۋەتتە ئېلىمىزدىكى دىئابىت كېسەلى بارلار 30 مىليوندىن ئاشىدۇ، پۈتۈن دۇنيادا 135 مىليون نوپۇس بۇ كېسەلگە گىرىپتار بولغان. ئۇ يۈرەك - مېڭە قان تومۇر كېسەللىكى ۋە ئۆسمىدىن قالسىلا ئوتتۇرا ياش، ياشانغانلارنىڭ سالامەتلىكىگە تەھدىت سېلىۋاتقان 3 - نو-مۇرلۇق دۈشمەن بولۇپ قالدى. دىئابىت كېسەللىگە گىرىپتار بولغانلار ئى-چىدە تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسەلى، مېڭە قان تومۇر كېسەل-لىكلىرى، نېرۋا، كۆرۈش پەردىسى، جىگەر، بۆرەك قاتارلىق كېسەللىك ئۆزگىرىشى ۋە يۇقۇملىنىش قاتارلىق ئەگەشمە كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانلار غەيرىي دىئابىت كېسەلى يوقلاردىن ئىككى، ئۈچ ھەسسە كۆپ.

1. دىئابىت كېسەلى دېگەن نېمە؟


دىئابىت كېسەلى بىر خىل پۈتۈن بەدەنلىك سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىك. يەنى ئاشقازان ئاستى بەز ئارالچىلىرىدىكى β - ھۈجەيرىلىرى

ئىنسۇلىننى نورمال ئاجرىتىپ چىقىرالماسا، ئىنسۇلىننىڭ نىسپىي ياكى مۇتلەق يېتىشمەسلىكىدىن شېكەر، ئاقسىل، مايىنىڭ مېتابولىزىمى قالايمىقانلىشىپ، جىگەر ۋە مۇسكۇل گلىكوگېنى ھاسىل بولالماسا، قان ۋە سۈيۈكتىكى شېكەر ئۆرلەپ، شېكەرگە چىدامچانلىقى تۆۋەنلەشتىن بولغان كۆپ ئىچىش، كۆپ يېيىش، كۆپ سىيىش، بەدەن ئېغىرلىقى يېنىكلەش قاتارلىق تىپىك ئۈچ كۆپ، بىر ئاز كېسەللىك ئالامىتى بولغان كېسەللىك «دېئابېت كېسەلى» دەپ ئاتىلىدۇ.

2. دېئابېت كېسەللىك سەۋەبى: ئادەتتە قارىلىشىچە، ئىجتىمائىي ئىقتىسادنىڭ تەرەققىي قىلىشى بىلەن كىشىلەرنىڭ تۈر-مۇش سەۋىيىسى ئۆسۈپ، يېمەك-ئىچمەكنىڭ شېكەر تەركىبى كۆپەيىپ كەتكەچكە، بەزى قۇۋۋەت ماددىلىرىنىڭ بەدەندە ئېشىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بەدەن چېنىقتۇرۇش يېتەرسىز بولغاچقا، دېئابېت كېسەللىك پەيدا بولۇش پۇرسىتى كۆپەيتىۋېتىدۇ. بۇ دېئابېت كېسەلى پەيدا بولۇشنىڭ تاشقى سەۋەبى. ئىچكى سەۋەبلىرى: (1) ئىرسىيەت: (I تىپلىق دېئابېت كېسەلى).

(2) ئىنسۇلىن ئاجرىتىپ چىقىرىشنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقى: (II تىپلىق دېئابېت كېسەلى) قاندىكى گلۇكوزىنىڭ تولۇق ئىشلىتىلمەسلىكى تۈپەيلىدىن سۈيۈك بىلەن چىقىپ كېتىپ دېئابېت كېسەللىكى پەيدا قىلىدۇ، يېقىنقى يىللاردا دېئابېت كېسەللىك پەيدا بولۇشنىڭ ۋىرۇسنىڭ يۇقۇملىنىشى ۋە بەدەندىكى ئىممۇنىت قاتارلىق ئامىللار بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكى ئىسپاتلاندى. ئۇنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئامىللار: ① يۇقۇملىنىش؛ ② جىسمانىي ھەرىكەت ئاز بولۇش؛ ③ سىمىزلىك؛ ④ ھەددىدىن ئارتۇق غىزالىنىش؛ ⑤ بەزى تاتلىق يېمەكلىك-لەرگە خۇشتار بولۇپ قېلىش؛ ⑥ روھىي غىدىقلىنىش قاتارلىقلار. يېنىك تىپلىق دېئابېت كېسەلى كېسەللىرىنىڭ كۆپىنچەسىدە

ئېنىق كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمەيدۇ، پەقەتلا بەدەن تەكشۈرتكەندە ياكى باشقا كېسەللىككە گىرىپتار بولۇپ سۈيىدۈك ۋە قاننى لاپولاتورىيىلىك تەكشۈرگەندە ئاندىن سەزگىلى بولىدۇ. تىپىك كېسەللەردە «3 كۆپ، بىر ئاز بولۇش» ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. بىراق، ياشانغانلاردىكى دىئابىت كېسەللىكىنىڭ ئالامەتلىرى ئېنىق بولمايدۇ. ياشانغانلارنىڭ بەدنىنى نىسبەتەن سېمىز، رەڭگى - روھى قىزىرىش بولۇپ، ئىشتىھاسى ياخشى بولىدۇ. ئۇلارنىڭ قاندىكى ۋە سۈيىدۈكتىكى شېكەرنى لاپوراتورىيىلىك تەكشۈرگەندە، نورمال ياكى يۇقىرىقىغا مايىل چىقىدۇ. بەزىدە گىلۇكوزىغا چىدام-چانلىق تەجرىبىسى قىلغاندا ئاندىن ھەقىقىي دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىشتا كلىنىكىلىق دىئاگنوز قويۇپ ساقلىقنى ساقلاش ۋە داۋالاشتا بەكمۇ قىممىتى بولىدۇ. شۇنداقلا بالدۇر دىئاگنوز قويۇش، بالدۇر ئالدىنى ئېلىش، بالدۇر داۋالاشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. كلىنىكىدا ئىسپاتلىنىشىچە، دىئابىت كېسەللىرى بارلارنىڭ %90 دىن ئارتۇقراقىنىڭ ئىككى پۇت ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونى ۋە پاقالچەك سۆڭىكى ئىچكى يان تەرەپ ئولتۇرغۇچ نېرۋا رېفلىكس رايونىنىڭ ئوتتۇرا بۆلىكىدە بىردىن بىر نەچچىگىچە يۇمشاق ھۆررەكنى سىلاپ تاپقىلى بولىدۇ، ھەمدە ئاغرىشقا بەك سەزگۈر كېلىدۇ. ياشانغان دىئابىت كېسەللىرىدە ئادەتتە سوزۇلما خاراكتېرلىك بەل، مۇرە ئاغرىش تارىخى بارلىرى %40 ~ 30 نى ئىگىلەيدۇ. 7 - كۆكرەك ئومۇرتقىسى يېنىنى سىلىسا ئېنىق ئاغرىيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئىككى پۇتنىڭ ئىگىلىشىدىكى كۆكرەك ئومۇرتقىسى بىلەن ماس بولغان رايوندا يات جىسىم سېزىمى ياكى باسسا ئاغرىش سېزىمى بولىدۇ (قوشۇمچە رەسىمگە قاراڭ).



ئىچكى يان تەرىپ ئۇلۇغ ئېرىشنىڭ ئوتتۇرا بۆلۈكى
دىئابىت كېسەللىكىنىڭ مەخسۇس رېڭلىك رايونى

173 - رەسىم. دىئابىت كېسەللىكىنىڭ ئاساسىي ئىنكاس رايونى ۋە
ئۇۋلاشتا نۇقتىلىق كۈچەپ ئۇۋۇلىنىدىغان رايون.

دىئابىت كېسەللىكىنىڭ خەۋىپى كېسەللىكنىڭ ئۆزىدە ئەمەس بەلكى
ئىچكى ئاجراتما مېتابولىزمى قالايمىقانلىشىشتىن پەيدا بولغان ئەگەشمە
كېسەللىكلەردىن كېلىدۇ. بۇنىڭدا ئاسانلا ئارتېرىيە بوتقىسىمان قاتىدۇ،
ھەمدە بۆرەكتىكى مىكرو قان تومۇرلاردا كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى كەل-
تۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسلەن: تاجسىمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسەلى، بۆ-
رەك كېسەلى، كۆرۈش تور پەردىسى كېسەللىك ئۆزگىرىشى ياكى كاتاراكتا،
ئەتراپ نېرۋا ياللۇغى، تېرىگە چىققان، غەلۋىرەك چىقىش، ئاياللارنىڭ
سىرتقى جىنسىي ئەزاسى قىچىشىش ۋە كىتون كېسەلى، كىسلاتادىن
زەھەرلىنىش، ھۇشسىزلىنىش قاتارلىقلار. بولۇپمۇ يۈرەك - مېڭە قان تومۇر
كېسەللىكلىرى دىئابىت كېسەللىكىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدىكى ھاياتقا
خەۋپ يەتكۈزىدىغان ئەگەشمە كېسەللىكلەر بولۇپ، تەخمىنەن 20% دى-
ئابىت كېسەللىرى يۈرەك - مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرى تۈپەيلىدىن
ئۆلۈپ كېتىدۇ.

3. دىئابىت كېسەللىكىنىڭ پۇت قىسمى رېڭلىك رايونىدىكى نور-
مالسىز تەسىرى (دىئاگنوز قويۇشتا پايدىلىنىش جەدۋىلى 1):

ئاشقازان ئاستى بېزى رېڧلېكس رايونىدىكى ئالامىتى	دئابىت كېسىلى رېڧلېكس رايونىدىكى ئالامەتلەر	گىرىتار بولۇش مۇمكىنچىلىكى بولغان كېسەللىكلەر
1. ئىككى پۇتتا غەيرىي نەرسىنى سىيلاپ تاپقىلى بولىدۇ. (+) 2. باسقاندا ئاغرىيدۇ. (+)	1. پۇتنىڭ ئىككى يان تە- رىپىدە يۇمشاق بولىدۇ. (+) 2. باسقاندا ئاغرىيدۇ. (+)	تەسىرى دىئاگنوزى: دئابىت كېسىلى، كلىنىكىلىق ئىپادى- سىگە بىرلەشتۈرۈپ، قان ۋە سۈيىدۈكتىكى شېكەر مىقدارىنى تەكشۈرۈش كېرەك
1. ئىككىلا پۇتتا غەيرىي نەرسىلەرنى سىيلاپ بىلگىلى بولىدۇ. (+) 2. باسقاندا ئاغرىيدۇ. (+)	1. پۇتنىڭ بىر يان تەرىپىدە غەيرىي نەرسىلەرنى سىيلاپ بىلگىلى بولىدۇ. (+) 2. ئىككىلا يان تەرەپنى ياكى بىر يان تەرەپنى باسقاندا ئا- غرىيدۇ. (+)	دئابىت كېسىلى بولۇشى مۇم- كىن دېگەن گۇمان ئاساسى ئو- رۇندا تۇرىدۇ. كلىنىكىلىق ئى- پادىسىگە بىرلەشتۈرۈپ قان ۋە سۈيىدۈكتىكى شېكەر مىقدارىنى تەكشۈرۈپ دەلىللەش كېرەك
1. ئىككىلا پۇتتا غەيرىي نە- رسىلەرنى سىيلاپ بىلگىلى بولىدۇ. (+) 2. باسقاندا ئاغرىيدۇ. (+)	ئىككىلا پۇتتا نورمالسىز- لىق يوق. (-)	دئابىت كېسىلى دەپ گۇمان قىلىشقا بولىدۇ. دئابىت كې- سىلى كېسەللىرىگە شېكەر مىقدارىنى چۈشۈرۈش دورىلىرى ئىشلەتكەن بولۇپ، كېسەللىك ئەھۋالى تىزگىنلەنگەن. كلىنى- كىلىق ئىپادىسىگە بىرلەشتۈ- رۇپ، قاندىكى ۋە سۈيىدۈكتىكى شېكەر مىقدارىنى تەكشۈرۈپ دەلىللەش كېرەك
1. سول پۇتتا غەيرىي نەرسىنى سىيلاپ بىلگىلى بولىدۇ. (تۈز چىۇققا ئوخشاش نەرسە) باسسا ئاغرىيدۇ. (+) 2. ئوڭ پۇتتا غەيرىي ئالامەت يوق. (-)	1. پۇتنىڭ ئىككى يان تەرىپىدە يۇمشاق مونەك بولىدۇ (+). 2. پۇتنىڭ ئىككى يان تەرىپى- نى باسسا ئېنىق ئاغرىيدۇ. (+)	گۇمانى دئابىت كېسىلى، كلىنىكىلىق ئىپادىسىگە ئاسا- سەن قان ۋە سۈيىدۈكتىكى شېكەر مىقدارىنى تەكشۈرۈپ دەلىللەش كېرەك

1. ئوڭ پۇتتا غەيرىي نەرسىنى سىيلاپ بىلگىلى بولىدۇ. (+) ھەم ياسا ئاغرىيدۇ. (+) 2. سول پۇتتا غەيرىي ئالامەت يوق. (-)	1. پۇتنىڭ ئىككى يان تەرىپىدە يۇمشاق مونەك بولىدۇ (+) 2. باسقاندا ئېنىق ئاغرىيدۇ. (+)	كۆپىنچە ئاشقازان ئاستى بېزى بېشىنىڭ كېسىلى ياكى يوشۇرۇن دىئابىت كېسىلى دەپ قارىسا بولىدۇ، كلىنىكىلىق ئىپادىسىگە ئاساسەن قاندىكى ۋە سۈيۈڭۈكتىكى شېكەر مىقدارىنى تەكشۈرۈپ دەلىللەش كېرەك
ئىككىلا پۇتتا غەيرىيلىك يوق. (-)	1. پۇتنىڭ ئىككى يان تەرىپىدە يۇمشاق مونەك بولىدۇ (+) 2. باسقاندا ئېنىق ئاغرىيدۇ.	1. شېكەر، ئاقسىل ۋە ماي مېتابولىزمى قالايمىقانلاشقان. 2. دىئابىت كېسىلى ئۆزگىرىشىنىڭ دەسلەپكى ئالامىتى بولۇشى مۇمكىن. 3. كلىنىكىلىق ئىپادىسىگە ئاساسەن قاندىكى ۋە سۈيۈڭۈكتىكى شېكەر مىقدارىنى تەكشۈرۈپ دەلىللەش كېرەك

4. دىئابىت كېسىلىدىن ساقلىنىش : داۋالاش پرىنسىپى - قاندىكى شېكەرنى، مايىنى ۋە تەن ئېغىرلىقىنى تىزگىنلەپ، نورمال سەۋىيىسىنى ساقلاش، ئەگەشمە كېسەللىكلەرنىڭ سادىر بولۇشىدىن ۋە ئۇنىڭ تەرەققىي قىلىشىدىن ساقلىنىش، دىئابىت كېسىلىنى داۋالاش ۋە ساقلىقنى ساقلاشتا ئۈنۈپرسال تەدبىرلەرنى قوللىنىشتىن ئىبارەت. مەسىلەن: ئۈمۈتۋار كەيپىياتتا بولۇش، قانۇنىيەتلىك تۇرمۇش ئۆتكۈزۈش ۋە خىزمەت قىلىش ھەمدە: ① يېمەكلىك ئارقىلىق داۋالاش؛ ② تەنتەربىيە ھەرىكىتى ئارقىلىق داۋالاش؛ ③ دورا ئارقىلىق داۋالاش؛ ④ بۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق داۋالاش. بۇ دىئابىت كېسىلىنى داۋالاشتىكى ئۆت چوڭ ئەڭگۈشتەردۇر.

ئۈمۈتۋار، مۇقىم كەيپىيات دىئابىت كېسىلى كېسەللىرىنىڭ ئىچكى مۇھىتىنى تۇراقلاشتۇرۇشقا پايدىلىق بولۇپ، تاقەتسىزلەنگەن كەيپىيات بەزى جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرىدىغان ھورمونلارنى قوزغىتىپ،

دئابېت كېسەللىرى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. شۇڭلاشقا دئابېت كېسەللىرى ياخشى كەيپىياتنىڭ ئادەم تېنىگە پايدىلىق، ناچار كەيپىياتنىڭ ئادەم تېنىگە زىيانلىق رولىغا ھەرگىزمۇ سەل قارىماسلىقى لازىم.

(1) ھەرىكەت ئارقىلىق داۋالاش: بۇ دئابېت كېسەللىرى داۋالاشتىكى بىر ئۈنۈملۈك تەدبىر. 30 مىنۇت جىسمانىي ھەرىكەت قىلسا، قاندىكى شېكەرنى $16\text{mg} / \text{di} \sim 12$ تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئەھمىيىتى: (1) دئابېت كېسەللىرىنىڭ كۆپ قىسمى سېمىز بولۇپ، جىسمانىي پائالىيەتلەرگە ناھايىتى ئاز قاتنىشىدۇ. تەنتەربىيە ھەرىكىتى ئارقىلىق چېنىقىش تەندىكى مايىنى ئازايتىپ، تەن ئېغىرلىقىنى يېنىك-لەتكەچكە داۋالاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

(2) ياشانغان بەدىنى ئاجىز كېسەللەر چېنىقىش ئارقىلىق كېسەلگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، يۇقۇملانۇش قاتارلىق ئەگەشمە كېسەللىكلەرنى ئازايتالايدۇ. دئابېت كېسەللىرى تەنتەربىيە چېنىقىش ئارقىلىق ئىنسۇلىن ۋە شېكەر مىقدارىنى چۈشۈرۈش دورىلىرىنىڭ ئىشلىتىش مىقدارىنى تۆۋەنلىتەلەيدۇ.

(3) قاندىكى ماي مىقدارى يۇقىرى بولغان دئابېت كېسەللىرى ھەرىكەت ئارقىلىق مۇسكۇلنىڭ ھەرىكەت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ. ماي تولۇق ئىشلىتىلىپ قاندىكى ماي تۆۋەنلەيدۇ. بۇ تاجسىمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسەلى، مېگە ئارتېرىيەسى قېتىش قاتارلىق ئەگەشمە كېسەللىك-لەرنىڭ سادىر بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا پايدىلىق.

(4) دئابېت كېسەلى مەڭگۈلۈك كېسەل. شۇڭا، ھەرىكەت ئارقىلىق داۋالاشنى مەڭگۈ داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. چېنىقىشنى داۋاملاشتۇرغاندا مېتابولىزمنى ياخشىلاپ، قاندىكى ماي، شېكەرنى تۆۋەنلەتكىلى ھەمدە تەننىڭ ئىنسۇلىنغا بولغان سەزگۈرلۈكىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

دئابېت كېسەللىرىنىڭ ھەرىكەت ئارقىلىق داۋالانىشتىكى پايدى-لىنىش جەدىۋىلى (2).

تىپ ئايرىمىسى	ھەرىكەت شەكلى	مۇساپىسى
يېنىك تىپلىق	1. تېز سۈرئەتتە پىيادە مېڭىش (مىنۇتغا 90m) 2. ئوتتۇرا سۈرئەتتە پىيادە مېڭىش (مىنۇتغا 80m) 3. ھەركۈنى 4 - 2 قېتىم پىيادە مېڭىش	20 مىنۇتتا 1800m دىن مىنۇتتا 2700m غىچە 20 مىنۇتتا 1600m دىن مىنۇتتا 2400m غىچە 6 km غىچە
ئوتتۇرا تىپلىق	1. ئاستا سۈرئەتتە پىيادە مېڭىش (مىنۇتغا 60m) 2. ئوتتۇرا سۈرئەتتە، پىيادە مېڭىش (مىنۇتغا 80m) 3. ھەركۈنى 3 - 2 قېتىم پىيادە مېڭىش	20 مىنۇتتا 1200 مېتىردىن 30 مە- مۇتتا 1800 مېتىرغىچە، 20 مىنۇتتا 1600 مېتىردىن 30 مىنۇتتا 2400 مېتىرغىچە 4kg - 2 غىچە

(2) يېمەكلىك ئارقىلىق داۋالاش: بۇ ھەر خىل تىپلىق كېسەللەرنى داۋالاشنىڭ ئاساسىي ئۇسۇلىدۇر. مەيلى كېسەللىك ئەھۋالى يېنىك ياكى ئېغىر بولسۇن، ئەگەشمە كېسەللىكلەر بولسۇن - بولمىسۇن، شۇنداقلا دورا ئارقىلىق داۋالانغان بولسۇن - بولمىسۇن بۇنى ئۇزۇن مۇددەت داۋاملاش- تۇرۇش ۋە قەتئىي ئىجرا قىلىش لازىم. ئۇنىڭ مەزمۇنى ئومۇمىي ئىس- سىقلىق مىقدارى، كاربون سۇ بىرىكمىسى، ئاقسىل، ماينىڭ ئېھتىياج مىقدارى ۋە ئۇنىڭ نىسبىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كاربون سۇ بىرىك- مىسى 60%، ئاقسىل 20% ~ 15%، ماي 25% ~ 20 نى ئىگىلەيدۇ. دىئابت كېسەللىرى يېمەكلىك جەھەتتە مۇنداق تاللىشى لازىم:

(1) ئىككىسى تۆۋەن، ئىككىسى يۇقىرى، بىرسى دائىملىق يېمەك- لىكلەر، يەنى: تۆۋەن شېكەرلىك، تۆۋەن مايلىق، يۇقىرى ئاقسىللىق، يۇ- قىرى تالالىق يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشى، پۇرچاقتىن ياسالغان مەھسۇلاتلارنى داۋاملىق ئىستېمال قىلىش لازىم.

(2) شاپتۇل، نەشپۇت، ئاناناس، گىلاس قاتارلىق مېۋىلەرنىڭ تەر-
كىبىدە مېۋە يىلىمى بولۇپ، ئىنسۇلىننىڭ ئاجرىلىش مىقدارىنى ئاشۇرۇپ،
قاندىكى شېكەرنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىتىدۇ.

(3) ئاچچىق كاۋا، تىكتۇن مېۋىلىرىنى يېسە بولىدۇ. بۇ ئىككى خىل
يېمەكلىك تەركىبىدە ئىنسۇلىنغا ئوخشاش تەركىب بولۇپ ھەم قاندىكى
شېكەرنى تۆۋەنلىتىدۇ ھەم ئوزۇقلۇق تەركىبىنى مول بولۇپ، دىئابىت
كېسەللىرىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك يېمەكلىكى.

(4) قارا كۈنجۈت، سۇڭپىياز، سەۋزە يېسە بولىدۇ. بۇ كراخمالنى ئاز
ئىستېمال قىلىش كەلتۈرۈپ چىقارغان ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىق كېسەل-
لىك ئالامەتلىرىنىڭ ياخشىلىنىشىغا پايدىلىق، ھەمدە قاندىكى شېكەرنى
ئازايتىدۇ. سۇڭپىياز يەنە بەدەننىڭ ئاقسىلنى قوبۇل قىلىشىنى
كۈچەيتىدۇ.

(5) سوغۇق قايناق سۇغا چىلانغان چاي ئىچسە بولىدۇ. چۈنكى چاي
تەركىبىدە بىر خىل كۆڭۈلدىكىدەك شېكەر تۆۋەنلىتىدىغان ماددا بولۇپ،
ئۇنىڭ ئىسسىقلىققا چىداملىقى كۈچلۈك ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈنۈملۈك تەر-
كىبى دائىم قايناق سۇغا چىلاش سەۋەبىدىن بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدۇ.

(6) كاۋا تەركىبىدە تالالىق ماددا بولۇپ، شېكەر مېتابولىزىمىنى يا-
خشىلايدۇ، يەنە مايىنى تۆۋەنلىتىپ ئورۇقلىتىدۇ. ھازىر دۆلىتىمىزدە كاۋا
تالىقىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىلدى.

(3) دورا ئارقىلىق داۋالاش ئۇسۇلى: تەخمىنەن 70% ~ 60 قۇرا-
مغا يەتكەن دىئابىت كېسەللىرى يېمەكلىك، تەنتەربىيە ۋە پۇتنى ئۇۋۇ-
لاپ داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ كېسەللىك ئەھۋالىنى رازى بولغىدەك
دەرىجىدە تىزگىنلىيەلەيدۇ. پەقەت يېمەكلىك ۋە تەنتەربىيە ھەرىكىتى
ئارقىلىق داۋالايمۇ مەقسەتكە يېتەلمىگەندە، ئاندىن دوختۇرنىڭ كۆر-
سەتمىسى بويىچە دورا ئارقىلىق داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللانسا بولىدۇ.

(4) پۇت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالاش ئۇسۇلى:
بۇ ئۇنىۋېرسال داۋالاشتىكى بىر مۇھىم ۋاسىتە بولۇپ، قاندىكى ۋە
سۈيۈكتىكى شېكەرنى تېزلىكتە تىزگىنلەيدۇ ۋە كېسەل ئۆز كېسەللىرىنىڭ

كۆرۈنەرلىك يېنىكىلىگەنلىكىنى ئېنىق ھېس قىلالايدۇ. دىئابېت كېسەللىكىنى داۋالاشتىكى رېفلىپكس رېتسېپى:

(1) ئالدى بىلەن يارلىق رېفلىپكس رايونلىرىنى بىر قېتىم تەخمىنەن 20 مىنۇت ئەتراپىدا ياكى پۇت بىلەن دەسسەپ ئۇۋۇلغۇچ ئەسۋاب ئارقىلىق ئۇۋۇلاش، ئىككى پۇت قىزىپ ئۆزىنى يېنىك ھېس قىلغۇچە داۋاملاشتۇرۇش كېرەك.

(2) ئاساسىي رېفلىپكس رايونلىرىنى ۋە نوقتىلىق رېفلىپكس رايونلىرىنى ۋە مۇناسىۋەتلىك رېفلىپكس رايونلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىش كېرەك.

① ئاساسىي رېفلىپكس رايونلىرى: بۆرەك ئۈستى بېزى، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى، بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق، تال رېفلىپكس رايونلىرىنى، ئوتتۇرا ھال كۈچ بېرىش ئۇسۇلى بىلەن 20 ~ 10 قېتىم غىدىقلاش كېرەك.

② مۇناسىۋەتلىك رېفلىپكس رايونلىرى: مېگە ئاستى بېزى، كىچىك مېگە ۋە مېگە غولى، ئۈچلۈك نېرۋا، كۆز، قالقانبەز، قالقان يان بەز، ئاشقا-زان، ئۈچەي، يۈرەك، جىنسىي ئەزا، بالىياتقۇ، مەزى بېزى، بەدەننىڭ يۈ-قىرى ۋە تۆۋەن قىسمى لىمفا بەزلىرى، ئوتتۇرا ھال ياكى سەل كۈچلۈك كۈچ بىلەن ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق 30 ~ 20 قېتىم غىدىقلاش كېرەك.

③ نوقتىلىق رېفلىپكس رايونلىرى: چوڭ مېگە، ئاشقازان ئاستى بېزى، ئىچكى يان تەرەپ ئولتۇرغۇچ نېرۋا رېفلىپكس رايونلىرىنى ئوتتۇرا ھال ياكى كۈچلۈك كۈچ بېرىش ئۇسۇلى ئارقىلىق 100 ~ 50 قېتىم ئەتراپىدا غىدىقلاش كېرەك.

(3) رېتسېپ بويىچە دورا تەييارلاشنى چۈشەندۈرۈش:

① ئىككى پۇتنى تولۇق ئۇۋۇلسا، پۈتۈن بەدەندىكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەپ، جىگلو پەللىلىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، مۇسبەت، مەن-پىيلىكىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇپ، ئوزۇقلۇق ۋە قاندىكى يەلنى تەڭشەپ، كېسەلنى چىقىرىۋېتىپ نورمال ھالەتنى ساقلاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. ② بارلىق ئىچكى ئاجراتما بەزلەرنىڭ پەللە - نوقتىلىرىنى ئۇۋۇ-

لاش كېرەك. بۇ ئىنسۇلىن ئاجرىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش رولىنى ئويىدا ئايدۇ.

③ چوڭ مېڭە رېفلىكس رايونىنى نوقتىلىق ئۇۋۇلاش كېرەك. چۈنكى مېڭە ئادەم تېنىنىڭ قوماندانلىق شىتابى، چوڭ مېڭە رېفلىكس رايونى ئۇۋۇلانسىدا، چوڭ مېڭىنىڭ نورمال قوماندانلىق قىلىشى ئەسلىگە كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە مېڭە دىئابېت كېسەللىرىدە ئەگەشمە كېسەللىكلەر ئەڭ ئاسان يۈز بېرىدىغان ئەزا بولۇپ، دىئابېت كېسەللىرىنىڭ كۆپىنچىسىدە مېڭە تەقلىمىسى بولىدۇ. بۇنى ئۇۋۇلغاندا ھەم ئالدىنى ئېلىپ ساقلىقنى ساقلىيالايدۇ ھەم داۋالاش رولىنى ئوينايدۇ.

④ ئاشقازان ئاستى بېزى رېفلىكس رايونىنى نوقتىلىق ئۇۋۇلسا ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ نورمال ئىنسۇلىن ئاجرىتىپ چىقىرىش ئىقتىدارىنى تەڭشەيدۇ ۋە ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ.

⑤ ئىچكى يان تەرەپ ئولتۇرغۇچ نېرۋا رېفلىكس رايونىنىڭ ئوتتۇرا بۆلىكىنى نوقتىلىق ئۇۋۇلسا، شېكەر تۈرلىرى، ماي ۋە ئاقسىلنىڭ مېتابولىزم تەڭپۇڭلۇقىنى تەڭشەيدۇ.

⑥ ئۈچەي، ئاشقازان رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلسا، ئاشقازان، ئۈچەي يولى ئاجرىتىپ چىقارغان ھورمونلار (گاسترىن قاتارلىقلار) نىڭ ئىنسۇلىننى ئىلگىرى سۈرۈش رولى بار.

⑦ چىقىرىش ئەزالىرى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلسا، بۆرەك ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، شېكەر مېتابولىزم تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە پايدىلىق.

⑧ يۈرەك دىئابېت كېسەللىرى ئاسان زىيان يەتكۈزىدىغان ئەزا. دىئابېت كېسەللىكلەرنىڭ ئادەتتە مىجەزى چۇس كېلىدۇ. ئۇۋۇلغاندىن كېيىن ھەم مىكرو قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى ھەم كەيپىياتنى تۇراقلاشتۇرغىلى بولىدۇ. بۇ ئىنسۇلىن ئاجرىتىپ چىقىرىشنى تەڭشەش رولىنى ئۆتەيدۇ.

⑨ كۆز، يۈرەك دىئابېت كېسەللىرى ئاساسلىق زىيان يەتكۈزىدىغان ئەزا بولۇپ، ئۇۋۇلغاندىن كېيىن كېسەللىك ئالامىتىنى يېنىكلىتىپ،

ئەگەشمە كېسەللىكلەرنى ئازايتىدۇ.

قىسقىسى، دىئابېت كېسەللىرى پەقەت تۇراقلىق كەيپىياتنى ساقلاپ، قانۇنىيەتلىك، رىتىملىق خىزمەت قىلىپ، مۇقىم ۋاقىتتا، مۇقىم مىقداردا غىزالىنىپ، مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىپ، مۇۋاپىق دورا ئىچىپ، پۈت قىسمىنى ئۇۋۇلاشتا چىڭ تۇرۇپ، چىداملىق بولسلا كېسىلنى ئۇزاق مۇددەت رازى بۇلارلىق ھالدا تىزگىنلىگىلى بولىدۇ.

(4) پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق داۋالاشنىڭ ۋاقتى ۋە ئۇسۇلى: ① ئالدى بىلەن پۇتنى ئىسسىق سۇدا 15 ~ 10 مىنۇت يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن، پۇتنى قول بىلەن مىدىرلىتىپ ئوڭ - سول، يۇقىرى - تۆۋەن قىلىپ ھەر بىرىنى 50 قېتىم چاپقاش لازىم (پۇتنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى ساقلاش، ھەرگىز سوغۇق ئۆتكۈزۈلماسلىق لازىم).

② ئادەتتە ھەر كۈنى بىر نۆۋەت ئۇۋۇلاش، 10 كۈن بىر داۋالاش كۇرسى بولۇش، ئاياقلانغاندىن كېيىن بىر - ئىككى كۈن ئارام ئېلىپ ئىككىنچى كۇرسىنى باشلاش شۇ بويىچە داۋاملاشتۇرۇش لازىم.

③ ھەر كۈنى ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن 30 مىنۇت ئىچىدە 300 ~ 500 ml قايناق سۇ ئىچىش لازىم.

④ دىئابېت كېسەللىرىگە پۇتنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم قازىنىلغاندىن كېيىن يەنىلا ئۈنۈپرسال داۋالاش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇش لازىم. مەسىلەن: يېمەكلىك ئارقىلىق تىزگىنلەش، تەنتەربىيە پائالىيەتلىرى، دورا بىلەن داۋالاش، بولۇپمۇ تۇ - يۇقسىز دورا ئىچىشنى توختاتماسلىق لازىم. پەقەت بىر تەرەپتىن پۇتنى ئۇۋۇلاپ، يەنە بىر تەرەپتىن ئادەتتىكىچە دورا ئىچىش، كېسەللىكنىڭ يېنىكلەش ئەھۋالىغا قاراپ دورا مىقدارىنى تەدرىجىي ئازايتىش، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پۇت رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىدا چىڭ تۇرۇپ، سالامەتلىكنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى مۇستەھكەملەش لازىم.

ئون ئىككىنچى پۇت قىسمى رېفېلىكىس رايونلىرى
ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن
ياشاغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان
كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش
ۋە داۋالاش
(4)

قەۋزىيەت، ئىچى سۈرۈش، سوزۇلما خاراكتېرلىك
ئاشقازان ياللۇغى

1. قەۋزىيەت

چوڭ تەرەت قۇرۇق بولۇپ چىقىرىش قىيىن بولۇش، چوڭ تەرەت قېتىم سانى ئاز بولۇش - قەۋزىيەت دەپ ئاتىلىدۇ. نورمال ئەھۋالدا ئادەتتە كۈنىگە بىر قېتىم چوڭ تەرەت كېلىدۇ. بەزىلەرنىڭ ئىككى - ئۈچ كۈندە بىر قېتىم چوڭ تەرەت كېلىدۇ، نىسبەتەن قانۇنىيەتلىك بولىدۇ، تەرەت چىقارغاندا ھېچقانداق يېقىمسىزلىق ھېس قىلمايدۇ، بۇمۇ نورمال ئەھۋال. چۈنكى، ئادەتتە غىزالانغاندىن كېيىن ھەزىم قىلىش ئارقىلىق بەدەن سۇ - مۇرۇپ ئېشىپ قالغان قالدۇقلىرىنى چىقىرىشقا 48 ~ 24 سائەت كېتىدۇ. قەۋزىيەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر كۆپ تەرەپلىمە بو - لۇپ، ئاساسلىقى:

(1) تەرەت چىقىرىش كۈچى كەمچىل بولۇش. ياشانغانلارنىڭ تېنى ئاجىز، تەنتەربىيە پائالىيەتلىرى ئاز بولغاچقا، قورساق مۇسكۇللىرى ماغدۇرسىز بولىدۇ.

(2) غىزالىنىش ئادىتى ياخشى بولماسلىق. مەسىلەن: غىزا ئاللاش، كۆكتات، مېۋە ۋە تالالىق يېمەكلىكلەرنى كۆپ يېمەسلىك، سۈنى ئازىد-چىش قاتارلىق ئامىللار تۈپەيلىدىن ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشى ئازىيىپ چوڭ تەرەتنى قاتۇرىدۇ.

(3) نېرۋا ۋە روھىي ئامىللار. مەسىلەن: نېرۋا فۇنكسىيىسى بۇزۇلۇش كېسىلى، روھىي كېسەللەردە ئادەتتە قەۋزىيەت كۆرۈلىدۇ.

(4) بەزى دورىلار كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسىلەن: ئاليۇمىن ھىدروكسىد، ئەپيۇن قاتارلىقلار قەۋزىيەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(5) تۇرمۇشى قانۇنىيەتسىز بولۇش. ئۆز ۋاقتىدا چوڭ تەرەت قىلىش ئادىتىنى يېتىلدۈرمەسلىك.

(6) بەزى كىشىلەر ئىچكى ئاجراتما كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولغان بولىدۇ. مەسىلەن: مېڭە ئاستى بېزىنىڭ ئالدى ياپىرقى ئىقتىدارى ئاجىزلاش، شىلىمىشنىق سۇلۇق ئىششىق، قالقان يان بەز ئىقتىدارى كۈچىيىپ كېتىش، سىيگەك كېسىلى، دىئابېت كېسىلى (ئىچى سۈرۈشىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ) قاتارلىقلار قەۋزىيەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كېسەللىك سەۋەبى كۆپ خىل بولغاچقا، كېسەللىكنى داۋالاشقا قۇلايلىق بولۇشى ئۈچۈن، بەزىدە دوختۇرخانىغا بېرىپ تېخىمۇ ئېنىق تەكشۈرتۈپ كېسەل سەۋەبىنى ئېنىقلاش زۆرۈر.

ئادەتتە، ئورگانىزىملىق كېسەللىك بولماي يەككە نوقۇل ھالىدىكى قەۋزىيەتنىڭ تەندە مۇسبەت ئالامەتلىرى بولمايدۇ. بەزىلەرنىڭ تەرىتى تۈز ئۈچەي ۋە «S» شەكىللىك بوغما ئۈچەيدە ھەددىدىن ئارتۇق يىغىلىپ قالسا قورساقنىڭ سول ئاستى تەرىپى سپازما خاراكتېرلىك ئاغرىيدۇ. بۇنىڭ بىلەن چوڭ تەرەت قىلىش ئىستىكى راۋان بولمايدۇ. پېشەپ قۇرۇق، قاتتىق بولغانلىقتىن، بوۋاسىرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىمۇ مۇمكىن. ئەگەر قول بىلەن قورساقنىڭ سول ئاستى تەرىپىنى باسساق، ئۈگۈنچەككە ئوخشاش نەرسە قولغا ئۇرۇلىدۇ، تەرەتتىن كېيىن يوقىلىدۇ.

قەۋزىيەت بىر خىل دائىم ئۇچرايدىغان كېسەللىك بولۇپ، بەزىدە ناھايىتى جاھىل بولىدۇ. بەزى كىشىلەرنىڭ نۇرغۇن چارە - تەدبىرلەرنى

قوللىنىپ، ھەتتا دائىم ئىچىنى سۈرگۈچى دورىلارنى يەيمۇ مەسىلىنى ھەل قىلالىمىغانلىقىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ، ئۇزۇن مۇددەت قەۋزىيەت بولسا، ئادەم تېنىگە ناھايىتى چوڭ تەسىرلەرنى پەيدا قىلىدۇ. پىشەپتىكى زە- ھەرلىگۈچى ماددا بەدەن تەرىپىدىن سۈمۈرۈلۈپ ئۆز تېنىنىڭ زەھەرلىنىد- شىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قان زەھەرلىنىپ، زىيانلىق ماددىلار ھەددىدىن ئارتۇق توپلىشىپ ئادەمنى ئاسان قېرىتىۋېتىدۇ، باشنى ئايلاندۇرىدۇ، باشنى ئاغرىتىدۇ، ئۇيقۇنى قاچۇرىدۇ، ئىشتىھانى تۈتىدۇ، ئېغىزنى پۇرىتىدۇ، يۈ- رەك - مېگە قان تومۇر كېسەللىكلىرى بولغان كىشىلەر چوڭ تەرەت قىل- غاندا بەك كۈچىگەچكە، تاسادىپىي ھادىسىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇڭلاشقا قەۋزىيەت ئادەم تېنى ئۈچۈن، بولۇپمۇ ياشانغانلار ئۈچۈن ئېتىد- بارسىز قاراشقا بولمايدىغان بىر مەسىلىدۇر.

قەۋزىيەتنىڭ ئالدىنى قانداق ئېلىش ۋە داۋالاش كېرەك؟

(1) ياخشى تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش، غىزالىنىشنى تەڭشەش، بەك كۆپ تاماكا چەكمەسلىك، ئاق - قارا ئاشلىقنى مۇۋاپىقلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلىش، كۆكتات، مېۋە - چېۋە، ھەسەل قاتارلىق ئۈچەينى سە- لىقلاشتۇرىدىغان يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش لازىم.

(2) مۇۋاپىق بەدەن چېنىقتۇرۇپ، ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشىنى كۈچەي- تىش، ئۆز ۋاقتىدا چوڭ تەرەت قىلىشقا ئادەتلىنىش، چوڭ تەرەت قىلىش ئىستىكىنى بويىسۇندۇرماسلىق لازىم.

(3) مەقۇت يېرىلىش، بوۋاسىر قاتارلىق كېسەللىكلەردىن ساقلىنىش ئۈچۈن، چوڭ تەرەت قىلغاندا ھەددىدىن ئارتۇق كۈچىمەسلىك لازىم. چۈنكى چوڭ تەرەت قىلغاندا ئاغرىپ تەرەت قىلىشقا جۈرئەت قىلالماي قەۋزىيەتنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. يۈرەك، مېگە قان تومۇر كېسەللىكلىرى بار كىشىلەر بۇنىڭغا تېخىمۇ دىققەت قىلىشى لازىم.

(4) ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرىدىغان دورىلارنى ئىمكانىيەتنىڭ بېرىچە ئاز ئىشلىتىش ياكى ئىشلەتمەسلىك لازىم. ئادەتتە كەي سەي لۇ ئىشلەتسە بولىدۇ. ياشانغانلارنىڭ تېنى ئاجىز بولغاچقا، ئاشقازان ۋە ئۈچەينىڭ ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئىچ سۈز-

كۈچى دورىلارنى كۆپ ئىشلەتمەسلىك لازىم.


5) ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشتا يۇقىرىقى ئۇسۇللارنى قوللىنىشتىن باشقا، پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ تەكشۈشە بولىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر بۇ ئارقىلىق رازى بولارلىق ئۈنۈمگە ئېرىشكەن. كونكرېت ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە:

پۈتۈن پۇتنى ئۇۋۇلاشتىن سىرت، نوقتىلىق ئورۇنلارنى كۈچەيتىپ ئۇۋۇلاش، مەسىلەن: بۆرەك ئۈستى بېزى، بۆرەك، سۈيۈك نەيچىسى، دوۋساق، ئاشقازان، ئاشقازان ئاستى بېزى، 12 بارماق ئۈچەي، ئىنچىك ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، تۈز ئۈچەي، مەقەت، جىگەر، ئوت، تال، قالقانەز، قالقان يان بەز، يۈرەك قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرى «نوقتىلىق كۈچەيدىتىش» رايونلىرى بولۇپ، مۇشۇ رېفلىكس رايونلىرىنى بىر نەچچە قېتىم كۆپرەك ئۇۋۇلاش لازىم. ئادەتتىكى رېفلىكس رايونلىرىنى 10 قېتىم، ھەتتا 20 قېتىم ۋە ئۈنىڭدىنمۇ كۆپ ئۇۋۇلاش لازىم. كۈچ ئىشلىتىشتە كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراش كېرەك. بەدنى ئاجىز، كۆپ خىل كېسەللىككە گىرىپتار بولغانلارنى بەك كۈچەپ ئۇۋۇلسا بولمايدۇ. بەدنى كۈچلۈكلەرنى ئۇۋۇلاشتا كۈچەپەرەك ئۇۋۇلسا بولىدۇ. بىراق يەنىلا كېسەلنىڭ چىداشلىق ئەھۋالىنى ئۆلچەم قىلىش كېرەك.

ئۇۋۇلاشتا ئۆز - ئۆزى ئۇۋۇلسا، بەدنى ئاجىزلارنى ئائىلىدىكىلەر ئۇۋۇلاپ قويسا بولىدۇ. ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن 300 ~ 500 ml سۇ ئىچسە بولىدۇ. بۆرەك ئەھۋالى ياخشى بولمىغانلار سۇ مىقدارىنى بىر ئاز ئازايتسا بولىدۇ. ئەگەر ۋاقىت، بەدەن كۈچى چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن، پۈتۈن پۇتنى تولۇق ئۇۋۇلىغىلى بولمىسا، پەقەت نوقتىلىق رېفلىكس رايونلارنىلا ئۇۋۇلىسىمۇ بولىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر ئۇۋۇلاش ئارقىلىق ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكەن. بەزىلەر گەرچە ھەر كۈنى چوڭ تەرەت قىلىسىمۇ، بىراق چوڭ تەرتىبى نىسبەتەن قۇرۇق بولغاچقا، ھامان چوڭ تەرەتنى چىقىرىشى تولۇق بولمىغاندەك سېزىلىدۇ. باشقا كېسەل بولمىغان ئەھۋالدا قولىدىن بىر پەللىنى ئۇۋۇلسا چوڭ تەرتىبى راۋانلىشىدۇ. بۇنى كۈچلۈكرەك سىناپ باقسا بولىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر بۇنى سىناپ بېقىپ رازى بولغىدەك ئۇ.

نۈمگە ئېرىشكەن. يەنى: بىر قولىنىڭ باش بارمىقى بىلەن يەنە بىر قولىنىڭ 2 - بارماق ئالغان يان تەرەپ يىلتىز قىسمىدىكى تۈز سىزىق سىرتىنى (ئوتتۇرا بارماققا يېقىن جايىنى، رەسمىدىكىدەك) كۈچەپ رەك 10 قېتىمدىن ئارتۇق ئۇۋۇلاپ بىر ئاز ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن چوڭ تەرەت قىلسا، چوڭ تەرەت تۈگىمىگەندەك سېزىم يوقىلىدۇ. ھەر كۈنى بىر نۆۋەت ئۇۋۇلسا چوڭ تەرەتنى نورمال چىقارغىلى بولىدۇ. بۇ ئۇسۇل بەك ئاددىي، ئىشلەشكە ئەپلىك، ھېچقانداق دورا ئىشلەتمەيمۇ مەسىلىنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. ھېچقانداق ناچار تەسىرى يوق.

يەنە بىر خىل ئاددىي ئۇسۇلى شۇكى، ئىككى قولىنىڭ ئالدىنى



جوزىنىڭ گىرۋىكى (قىرى) دا يەنە بىر قولىنىڭ بارماق تەرەپتىن ئالغان ئاستى باش بارماق ئۈچى تەرىپىگە قارىتىپ ئىتتىرىپ ئۇ. بىلەن شۇ جايىنى ۋۇلاش. بىر قانچە نۆۋەت ئىتتىرىپ ئۇۋۇلسىمۇ قەۋزىيەتنى دا. دۋالاشتا رازى بولار. ۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى لىق ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

چى خەي پەللىسى (气海穴) نى ئۇۋۇلسىمۇ قەۋزىيەتنى داۋالاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. كونكرېت ئۇسۇلى: چى خەي پەللىسى كىندىك ئاستىدىن بىر سۇڭ كېلىدىغان يەردە ھەر قېتىمدا 150 قېتىم بېسىپ ئۇۋۇلاش، ھەر قېتىم ئۇۋۇلاشتا ئېچىشىپ ئېسىلغاندەك سېزىم بولۇش، ئەتىگەن، كەچتە بىر قېتىمدىن ئۇۋۇلسا ئۈچ كۈندىن كېيىن ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. ئۇدا بىر قانچە كۈن ئۇۋۇلسا قەۋزىيەت مەسىلىسى ھەل بولىدۇ.

يۇقىرىقى ئۇسۇللار ئاددىي، ئىشلەشكە ئوڭاي، ئەرزىمەس ھۈنەرگە ئوخشىسىمۇ نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ قەۋزىيەت مەسىلىسىنى ھەل قىلالايدۇ. قەۋزىيەت مەسىلىسى ھەل بولسا، قەۋزىيەت كەلتۈرۈپ چىقارغان باش ئاغ-رىش، باش قېيىش، ئىشتىھا تۈتۈلۈش قاتارلىقلارمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ

ياخشىلىنىدۇ. ساغلاملىقىنى ساقلاشقا زور ياردىمى بولىدۇ.

2. ئىچى سۈرۈش

ئىچى سۈرۈش ھەزم قىلىش سىستېمىسىدىكى كېسەللىكلەرنىڭ دائىم كۆرۈلىدىغان ئالامىتىدۇر. ئۇ تەرەت قىلىش قېتىم سانى كۆپ بو-
لۇش، چوڭ تەرتى سۈيۈق ياكى قان - يىرنىڭ ئارلاش كېلىشىنى كۆرسىد-
تىدۇ. ئىچى سۈرۈش يەنە نۇرغۇن كېسەللىكلەرنىڭ كېسەللىك ئالامەت-
لىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ سەۋەبى ناھايىتى كۆپ:

(1) ئاشقازاندىكى كېسەللىكلەر، مەسىلەن: سوزۇلما يىگلەش خارا-
كتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان راكى، ئاشقازان بىلەن ئۈچەينى ئۇلاش
ئوپېراتسىيىسىدىن كېيىن ياكى ئاشقازان سۈيۈقلۈقى كەم بولۇشتىن
كېلىپ چىققان ئىچى سۈرۈش.

(2) ئۈچەي يولى كېسەللىكلىرى:

(1) يۇقۇملىنىش: باكتېرىيىلىك تولغاق، ئامىيۇالىق تولغاق، قان
شورىغۇچ قۇرت كېسەللىكى، ۋابا قاتارلىقلار.

(2) بوغماق ئۈچەي راكى، تۈز ئۈچەي راكى، بوغماق ئۈچەي مۇد-
چىقى، بولۇپمۇ بوغماق ئۈچەي راكى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىچى سۈرۈش
كۆپ كۆرۈلىدۇ، بۇنىڭدا ئىچى سۈرۈش بىلەن قەۋزىيەت ئالمىشىپ
تۇرۇشى مۇمكىن.

(3) زەھەرلىنىش: مەسىلەن: ئارسېن، سىماب، ئاليۇمىندىن زەھەر-
لەنسە ئىچى سۈرىدۇ.

(4) بەدەننىڭ زىيادە سېزىمچانلىقى، مەسىلەن: بېلىق، راك يېگەندە
رېئاكسىيە يۈز بېرىپ ئىچى سۈرىدۇ.

(5) ئوزۇقلىنىش نامۇۋاپىق بولۇش، خام، سوغۇق، مايلىق، تەمى
ئۆتكۈر يېمەكلىكلەرنى يېسە ئىچى سۈرىدۇ.

(6) ئۈچەي يولىدىكى فۇنكسىيىلىك ئۆزگىرىشلەر، مەسىلەن: ئۆت-
كۈر خاراكتېرلىك ئۈچەي ياللۇغى، جىددىيلىشىشتىن بولغان ئۈچەي
ھەرىكىتى كۈچىيىپ كېتىش ياكى ئۈچەي سىپازمىلىنىش قاتارلىقلاردا
ئىچى سۈرىدۇ.

(7) پۈتۈن بەدەن خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر، مەسلەن: دىئابېت كېسەلى، قالدانبەز ئىقتىدارى كۈچىيىپ كېتىش، سۈيدۈك بىلەن زەھەر-لىنىش كېسەلى قاتارلىق پۈتۈن بەدەن خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر ئىچى سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئىچى سۈرۈشنىڭ كېسەللىك سەۋەبى كۆپ بولغاچقا، دىئاگنوز قو-يۇشتا ئاساسلىقى كېسەللىك تارىخى، كېسەللىك ئالامىتى، بەدەن ئالامىتى، لابوراتورىيىلىك تەكشۈرۈش نەتىجىسى قاتارلىقلارغا تايىنىلىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا «S» شەكىللىك بوغماق ئۈچەي ئەينىكى ۋە رېنتگېندە تەكشۈرۈپ، ئومۇميۈزلۈك تەھلىل قىلىپ، ئومۇميلاشتۇرۇپ دىئاگنوز قويۇش لازىم.

ئىچى سۈرگەن كېسەللەرنىڭ پۇت قىسمىنىڭ تۈز ئۈچەي، مەقئەت رېفلىكس رايونىدا مۇسبەت بەدەن ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. مەسلەن: تېرە ئاستىدا تۈگۈنچەك بولۇش، بېسىشقا سەزگۈر بولۇش قاتارلىقلار. ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش:

ئىچى سۈرۈشنىڭ كېسەللىك سەۋەبلىرى كۆپ بولغاچقا، داۋالاشمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. دىئاگنوز قويۇش ئانچە تەس ئەمەس، داۋالاش ئۈنۈمىمۇ كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. بەزىلىرىنىڭ كېسەللىك سەۋەبىنى بىر مەزگىل تەكشۈرۈپ تاپقىلى بولمايدۇ. بەزى دەسلەپكى دەۋىردە داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدىغان، كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكلەرنى ئېھتىياتچانلىق بىلەن يوققا چىقىرىش لازىم، مەسلەن: بوغماق ئۈچەي راكى، باكتېرىيىلىك تولغا قاتارلىقلار. ئادەتتىكى كېسەلگە قاراپ داۋالاش ئېلىپ بېرىش بىلەن قانائەتلىنىپ قېلىپ، كېسەلنى كېچىكتۈرۈپ قويماسلىق لازىم. ئالدىنى ئېلىش:

(1) غىزالىنىش تازىلىقىغا دىققەت قىلىش، سۈپىتى ئۆزگەرگەن يې-مەكلىكلەرنى يېمەسلىك لازىم.

(2) ياشانغانلارنىڭ ھەزم قىلىش ئىقتىدارى ناچار بولغاچقا، ئاسان ھەزم بولىدىغان ۋە ئاسان قوبۇل قىلىنىدىغان يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش، ھەددىدىن ئارتۇق خام، سوغۇق، مايلىق ۋە بەك تەملىك يېمەك-

لىكلەرنى ئىستېمال قىلماسلىق لازىم.

(3) نورمال روھىي كەيپىياتنى ساقلاش، ئىجتىمائىي پائالىيەتلەرگە قاتنىشىپ، تۇرمۇشنىڭ رەڭدارلىقىنى ئاشۇرۇش، مەيۈسلۈك، جىددىيلىك- شىش قاتارلىق ناچار كەيپىياتلاردىن ساقلىنىش لازىم.


(4) قورساق پۇت قىسمىنى ئىسسىق ساقلىشى، سوغۇق تەڭگۈزمەس- لىكى لازىم.

داۋالاش:

دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى ۋە كېسەللىك سەۋەبىگە قارىتا دورا ئىش- لىتىش كېرەك. ئادەتتىكى غىزالىنىش تەڭشەلمەسلىك، ھەزىم قىلىش نا- چار بولۇش كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىچى سۈرۈشنى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى بىلەن داۋالسا ۋە ساقلىقنى ساقلىسا بو- لىدۇ. كونكرېت ئۇسۇلى: پۈتۈن پۇتنى ئۇۋۇلسا، كۆپ خىل كېسەلنى ئورتاق داۋالاپ، پۈتۈن بەدەننى تەڭشىگىلى بولىدۇ. لېكىن پەقەت نوقتى-

لىق رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىشىمۇ بولىدۇ. مەسىلەن:

يۈرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق، ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەي، ئىنچىك ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، مەقئەت، جىگەر، ئۆت، تال، يۈرەك، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى، قالدانبەر، لىمفا بەزلىرى قاتار- لىق رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش.



يەنە بىر قولىنىڭ باش بارماق ئۈچى بىلەن شۇ جايىنى ئۇۋۇلسا قەۋزىيەتنى دۋالاشتا رازى بولالىق ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

بەزىلەردە فۇنكسىيەلىك ئىچى سۈرۈپ تەرەتتىن كېيىن قۇرۇق ئىنجىق كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭ چارسى شۇكى، پاچاق ئىچكى يان تەرىپىدىكى تۈز ئۈچەي ۋە مەقئەت رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش، يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ 10 قېتىم ئەتراپىدا ئۇۋۇلسا، قۇرۇق ئىنجىق تېزلىكتە يوقىلىدۇ (تۆۋەندىكى رەسىمگە قاراڭ).

3. سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى

سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى ئاشقازان كېسەللىكلىرىدە كىيىم پەيدا بولۇش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولغان كېسەللىك بولۇپ، ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، كۆپىيىدۇ.

سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى ئاشقازان ياللۇغى ۋە يىگىد-لەش خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى دەپ ئايرىلىدۇ. بەزى كېسەللەر بۇ ئىككى خىلنىڭ ھەممىسىگە گىرىپتار بولغان بولىدۇ. سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغىنىڭ تىپىك ئالامىتى كەم كېسەللەردە ئېنىق كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمەيدۇ. بەزىلىرىدە بولسا ھەزىم قىلىشى ياخشى بولماسلىق ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن: قورساق ئېلىشىش، كېكىرىش، ئاز ساندىكى كېسەللەردە ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، كۆڭلى ئېلىشىش كۆرۈلىدۇ. ئەمما كۆڭلى ئېلىشىش نىسبەتەن ئاز كۆرۈلىدۇ.

سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغىغا دىئاگنوز قويۇشتا ئاساسلىقى كلىنىكىلىق ئىپادىسى ۋە ئاشقازان ئەينىكىدە تەكشۈرۈش ھەم ئاشقازان شىللىق پەردىسىدىن تىرىك توقۇلما ئېلىپ تەكشۈرۈشكە تايىد. نىپ يۈزە قەۋەتلىك ئاشقازان ياللۇغى ياكى يىگىلەش خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى، ھەمدە راک ئۆزگىرىشى بولغان - بولمىغانلىقى پەرقلەندۈرۈلىدۇ. سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كەتسە، بەش يىل ئىچىدە تەخمىنەن 10% كىشىلەردە راققا ئۆزگىرىش كۆرۈلىدۇ. شۇڭا، ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈش، بىخودلۇق قىلماسلىق لازىم. لېكىن يەنە بەك جىددىيلىشىمۇ كەتمەسلىك كېرەك. چۈنكى، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغىغا گىرىپتار بولغانلارنىڭ ھەممىسى ئاشقازان راكىغا ئۆزگىرىپتەرمەيدۇ. تۆۋەندىكى ئەھۋاللار بولسا دىققەتنى قوزغاش زۆرۈر:

(1) سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغىنىڭ تارىخى بەك ئۇزۇن بولسا؛

(2) ياخشى داۋالانمىغان بولسا؛

(3) ئاشقازان ئەينىكىدە تەكشۈرۈشتە ئېغىر ھالدىكى ئاشقازان شىللىق پەردىسى ئۈچەيلەشكەن بولسا؛ (ئاشقازان شىللىق پەردە تۈزۈلۈشى ئۈچەيگە ئوخشاش تۈزۈلۈشكە ئۆزگىرىش) نى كۆرسىتىدۇ.

(4) ئوتتۇرا ھالدىن يۇقىرى تىپىك بولمىغان ئۆسۈش ئەھۋالى بولسا؛
(ئۆسۈش يېنىك، ئوتتۇرا ھال، ئېغىر دەپ ئوخشاشمىغان ئۈچ تۈرگە
ئايرىلىدۇ).

يۇقىرىقى ئەھۋاللار بولسا، چىڭ تۇتۇپ داۋالاش، كۆزۈتۈشكە دىققەت
قىلىش، راققا ئۆزگىرىشىدىن ساقلىنىش لازىم.
داۋالاش:

سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى ئاساسلىقى كېسەللىك سە-
ۋەبىگە قارىتىپ داۋالىنىدۇ.

سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغىنىڭ كېسەللىك سەۋەبى ئا-
ساسلىقى بۇرمىسىمان تاياقچە باكتېرىيە بولۇپ، ئاشقازاننىڭ ئېپىتېلىيە
ھۈجەيرىلىرىدىن بۇ خىل باكتېرىيىنى تاپقىلى بولىدۇ.

دورا بىلەن داۋالاشتا دوختۇرنىڭ داۋالاشقا شەرتسىز بويسۇنۇش
كېرەك، شۇنداق بولغاندا يىلتىزىدىن ساقىيىش نىسبىتى ناھايىتى يۇقىر-
رى بولىدۇ.

پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش كېسەللىك كېسەللىك ئالامىتىنى يېنىك-
لىتىش جەھەتتە كۆڭۈل رازى بولغىدەك ئۈنۈمگە ئېرىشتۈرىدۇ. پۈتۈن
پۇتنى ئۇۋۇلاشتىن سىرت، نوقتىلىق رېفلىكس رايونلىرىنى تاللاپ ئۇۋۇ-
لسا بولىدۇ. مەسىلەن: بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق، قالدانبەز،
ئاشقازان، چوڭ - ئىنچىك ئۇچەي، جىگەر، ئۆت، 12 بارماق ئۇچەي، قورساق
بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى، لىمفا بەزلىرى، تال قاتارلىق رېفلىكس رايونلى-
رى قاتارلىقلار. ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى يۇقىرىدىكى كېسەللىكلەر بىلەن ئوخ-
شاش.

بەك تويۇنۇپ غىزالىنىپ بىئاراملىق ھېس قىلغاندا، ئاشقازان، ئاش-
قازان ئاستى بېزى، 12 بارماق ئۇچەي رېفلىكس رايونلىرىنى ئالدى تەرەپ-
تىن ئارقا تەرەپكە قارىتىپ ئۈزۈلدۈرمەي 8 - 7 قېتىم ئۇۋۇلسا، بىرئاز
ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ئارام تاپىدۇ.

ئون ئۈچىنچى پۇت رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق
ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ياشانغانلاردا
كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى
ئېلىش ۋە داۋالاش
(5)

ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى يىغىندى ئالامىتى
ۋە مەزى بېزى يوغىناش

1. ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى يىغىندى ئالامىتى

كېسەللىك سەۋەبى ۋە كېسەل بولۇش مېخانىزمى:

ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى يىغىندى ئالامىتىنىڭ پەيدا بولۇش مېخانىزمى تېخى تولۇق ئېنىقلانغىنى يوق، لېكىن كۆپ سانلىق ئالىملار تۇخۇمدان ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلىشىشى مۇھىم سەۋەب دەپ قارايدۇ. تۇخۇمداننىڭ ئىقتىدارى ئاجىزلاشقاندىن كېيىن ئائىلىق ھورموننىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى ئازىيىپ، ھىپوفىز (مېڭە ئاستى بېزى) غا بولغان تورمۇزلاش ئاجىزلىشىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئىككىلەمچى ھىپوفىز ئىقتىدارى كۈچىيىپ كېتىش سادىر بولۇپ، قالقانبەز، بۆرەك ئۈستى بېزى پوستلاق ھورمونى ۋە ھىپوفىز ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا چەكلەش، ئۆزئارا تەڭشىلىپ تورۇشقا تەسىر قىلىدۇ.

يۇقىرىقى ئۆزگىرىش ھىپوفىز بىلەن دۆڭچە مېڭە ئوتتۇرىسىدىكى ھەمدە نېرۋا بىلەن ئىچكى ئاجراتمىلار ئوتتۇرىسىدىكى نورمال مۇناسىۋەتنى دەخلى - تەرۈزگە ئۇچرىتىدۇ. مەسلەن: چوڭ مېڭە پوستلاق قەۋىتىنىڭ تورمۇزلاش ئىقتىدارى ناچار كىشىلەردە ئاسانلا روھىي ۋە ۋېگېتاتىۋ نېرۋا

سىستېمىسى قالايمىقانلىشىش ئىپادىسى كۆرۈلىدۇ. جۇڭىيى تېبابىدە بۇ كېسەل ئاساسلىقى بۆرەك قۇۋۋىتى ئاجىزلاشتىن بولىدۇ دەپ قارىلىدۇ. ئادەم تېنىنىڭ مەنپىي - مۇسبەتلىكىنى تەڭشەش ئىقتىدارى ئاجىزلاشسا، ئاسانلا مەنپىي، مۇسبەت تەڭپۇڭسىزلىقى كېلىپ چىقىدۇ. كىلىنىك ئىپادىسى:

1. ھەيز ئۆزگىرىشى: كۆپ ساندىكى ئاياللاردا نورمال ھەيز كېلىش دەۋرىنىڭ قالايمىقانلىشىشى ۋە ھەيز مەزگىلى قىسقاراش، ھەيز مىقدارى ئازىيىش، ئاخىرىدا پۈتۈنلەي توختاشقا ئۆزگىرىدۇ. بەزى ئاياللاردا بولسا ھەيز كېلىش دەۋرى ئۇزىراپ، كەلگەندە كۆپ مىقداردا كېلىپ، ئارقىدىنلا تەرتىپسىز بولۇپ توختايدۇ. يەنە ئاز ساندىكىلىرىدە ھەيز ئۇيۇقسىزلا توختاپ قالىدۇ.

2. روھىي - نېرۋا سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىدۇ. مۇھىمى ۋېگېتاتىۋ نېرۋا سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىدۇ. بۇنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئالامەتلىرى بولىدۇ:

(1) چىرايى قىزىرىپ، پۈتۈن بەدەن قىزىپ بىئارام بولىدۇ؛ قان تومۇر نېرۋا ئىقتىدارى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ، بولۇپمۇ بوپۇن قىسمىدىكى سىمپاتىك نېرۋا ئىقتىدارى كۈچىيىپ كېتىپ، كېسەلدە يۈزى قىزىرىپ كېتىش، باش، بوپۇن قىسمى ئېسىلىپ قىزىرىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. بولۇپمۇ كەيپىياتى ھاياجانلانغاندا ۋە تاماقتىن كېيىن كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭغا ئەگىشىپ تەرلەش، سوغۇقتىن قورقۇش، تىنچىسىزلىنىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. ۋاقتى بىر نەچچە سېكۇنتتىن بىر نەچچە مىنۇتقىچە داۋاملىشىدۇ. ئېغىر بولغاندا ئۇيقۇغا تەسىر قىلىدۇ.

(2) كەيپىياتى تۇراقلىق بولمايدۇ، ئاسانلا جىددىيلىشىدۇ، ھاياجانلىنىدۇ، ئۇخلىيالمايدۇ، ماغدۇرسىزلىق ھېس قىلىدۇ.

(3) بەدەننى ئۇيۇشۇپ، ئېچىشىدۇ، چۈمۈلە ماڭغاندەك سېزىم بولىدۇ ياكى بېشى، بوغۇملىرى ئاغرىيدۇ ياكى بېلى تېلىپ ئاغرىيدۇ. بىراق، كېسەلنىڭ زىيان يەتكۈزگەنلىكىنى كۆرگىلى بولمايدۇ.

(4) بەزىلىرىدە بېشى ئايلىنىپ كۆزى قاراڭغۇلىشىش، قۇلىقى غوغۇلداش، قۇسۇش، زېھنىنى يىغالماسلىق، ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارى ئاجىزلاش.

جىزلاش قاتارلىق ئىپادىلىرى كۆرۈلىدۇ.

3. يۈرەك قان تومۇر سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىدۇ. يۈرەك سىقىلىش، يۈرەك ھەرىكىتى زىيادە تېزلىشىش ياكى بەك ئاستىلاپ كېتىش، قان بېسىمى ئۆزلەش ياكى داۋالغۇپ تۇرۇش قاتارلىق ئىپادىسى كۆرۈلىدۇ. بۇ ياشتىكى ئاياللارنىڭ قان بېسىمىنىڭ ئۆزلىشى ئەرلەرنىڭكىگە سېلىشتۇرغاندا تېز بولغاچقا، يۇقىرى قان بېسىمى قاتارلىق قان تومۇر كېسەللىك ئۆزگىرىشى ئاسانلا كۆرۈلىدۇ. ھەيز توختىغاندىن كېيىن ئارتېرىيە قېتىش كېسەللىكىگەمۇ پەيدا بولۇش (تاجسىمان ئارتېرىيىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) نىسبىتىمۇ يۇقىرى بولىدۇ.

4. مېتابولىزم ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىدۇ. ھەيز كېسىلىش دەۋرىدە يۈز بەرگەن مېتابولىزم ئۆزگىرىشىدىمۇ بەزى كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىدۇ:

(1) ماي مېتابولىزمى نورمالسىزلىشىدۇ: تېز سەمىرىپ كېتىدۇ، ئا. ساسلىقى بېلى، قورسقى، كاسپىسى سەمىرىپ كېتىدۇ. بۇ ئادەتتە فە. زىئولوگىيەلىك ھالەتكە ياتىدۇ.

(2) شېكەر مېتابولىزمى نورمالسىزلىشىدۇ: قاندىكى شېكەر تەركىبىي ئۆزلەيدۇ، ھەتتا شېكەر سىيىدۇ، شېكەرگە چىداملىق تەجرىبىسى قىلىنسا، چىداملىق دەرىجىسى تۆۋەنلەش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ. بەزىدە ئىشتىھاسى كۈچىيىپ كېتىپ قورسقى تېز ئاچىدۇ، ھەمدە تېز سەمىرىپ كېتىدۇ.

(3) سۇ - تۇز مېتابولىزمى نورمالسىزلىشىدۇ: ئوخشاشمىغان دەرىجىدە دىكى يىغىلىپ قېلىش خاراكتېرلىك سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلىدۇ.

(4) كالتسىي، فوسفور مېتابولىزمى نورمالسىزلىشىدۇ: سۆڭەك كالتسىي يوقىتىپ شالاڭلىشىدۇ، بۇمۇ كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىك ئالامەتىگە كىرىدۇ. بولۇپمۇ ھەيز كېسىلىپ ئانلىق ھورمۇن كۆرۈنەرلىك ئازايغاندىن كېيىن كۆرۈلىدۇ. شۇڭا، ياشانغان ئاياللارنىڭ سۆڭىكىنىڭ سۇ. نۇپ كېتىشى ئاسانلا يۈز بېرىدۇ، ھەمدە ئەسلىگە كېلىشى نىسبەتەن ئاستا بولىدۇ.

ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش:

1. ھەيز كېسىلىش دەۋرىدىكى ساقلىقنى ساقلاش: ھەيز كېسىلىش دەۋرىدە بەدەندە يۇقىرىقىدەك بىر قاتار ئۆزگىرىشلەر بولغاچقا، بولۇپمۇ نېرۋا تەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشى بىر مەزگىل ئۆزىدە نىڭ تەڭشىشى ئارقىلىقلا يېڭى تەڭپۇڭلۇققا ئىگە بولغاچقا، بۇ مەزگىلدە كېسەلگە ئەھۋالنى چۈشەندۈرۈش، كېسەلنى بۇنىڭغا توغرا مۇئامىلە قىلدۇرۇش، بەدەن چېنىقتۇرۇشنى داۋاملاشتۇرۇپ، خىزمەت ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈش، كەيپىياتنى تۇراقلىق ساقلاش، روھىي كۆتەرگۈچ بولۇش لازىم.

2. تۇغۇت يېشىدىكى ئاياللارنىڭ تۇخۇمدىنى كېسىپ ئېلىۋېتىشتىن ئىمكانىيەتنىڭ بېرىچە ساقلىنىش لازىم. ئەگەر تۇغۇت يېشىدىكى ئاياللارنىڭ ئىككى تەرەپتىكى تۇخۇمدىنى كېسىپ ئېلىۋېتىشتىن بۇ كېسەل كۆرۈلسە، بەزىدە كېسەللىك ئەھۋالى تېخىمۇ ئېغىر بولۇپ، ئائىلىق ھورمونى ۋە پروگېستېرون ئىشلىتىپ قوشۇمچە داۋالاش ياكى خاسلا ئائىلىق ھورموننى تولۇقلاپ داۋالاش كېرەك. داۋالاش جەريانىدا ھورمون توختىتىلسا قاناش كۆرۈلۈشى مۇمكىن.

3. دورا بىلەن داۋالاش:

(1) جۇڭگىي دورىلىرى بىلەن داۋالاش: بۆرەكنىڭ مەنپىي - مۇسبەت تەڭپۇڭلۇقىنى تەڭشەش ئاساس قىلىندۇ.

(2) تىنچلاندۇرغۇچى دورىلار ۋە سىپازىغا قارشى دورىلار مۇۋاپىق مىقداردا بېرىلىدۇ. مەسىلەن: ئوريزانول (谷维素) 10mg دىن ھەر كۈنى ئۈچ قېتىم ئىچسە مەلۇم ئۈنۈمى بولىدۇ.

(3) ھورمون ئارقىلىق داۋالاش: تەندىكى جىنسىي ھورموننىڭ تۆۋەن سەۋىيىدىكى تەڭپۇڭسىزلىقىنى تەڭشەشكە ئىشلىتىلىدۇ. ئائىلىق ھورمون بىلەن ئائىلىق ھورموننى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەتسە بولىدۇ. ھەيز كېسىلىش دەۋرىدە يەنە روھىي - ھالەت ۋە بەدەن جەھەتتە ساقلىقنى ساقلاشقا دىققەت قىلىش لازىم. ئەگەر ھەيز كېسىلىش يىغىندى ئالامىتى كۆرۈلسە، يۇقىرىقى دورىلارنى ئىشلىتىپ داۋالاشتىن سىرت، پۇت رېف-لىپكس رايونلىرى ئارقىلىق داۋالاش ھەيز كېسىلىش مەزگىلىدىكى

ئۇنىۋېرسال كېسەللىكلەرگە نىسبەتەن ناھايىتى ياخشى داۋالاش رولىنى ئوينايدۇ.

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى ئارقىلىق داۋالاش: ئالدى بىلەن پۈتۈن پۇت ئۇۋۇلىنىدۇ، پۈتۈن پۇتنى ئۇۋۇلاش ئاساسىدا نوقتىلىق كۈچەپ ئۇۋۇ-لىنىدىغان رېفلىكس رايونلىرى: چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە، مېڭە ئاستى بېزى، با-لىياتقۇ، تۇخۇمدان، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى قاتارلىقلار.

كېسەللىك ئالامەتلىرىگە ئاساسەن يەنە تۆۋەندىكى رېفلىكس رايون-لىرىنى نوقتىلىق كۈچەيتىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ: ئەگەر كۆڭلى دەككە - دۈككە بولسا، يۈرىكى قالايمىقان بولۇپ تىنچىسىزلىنسا يۈرەك، ئىنچىك ئۈچەي، قالقانبەز قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇپ ئۇۋۇلاش، قەۋ-زىيەت بولسا مەقكەت، تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونلىرىنى كۆڭلى ئېلىشىپ قوسسا ئاشقازان ئاستى بېزى، 12 بارماق ئۈچەي، توغرا ئۈچەي، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇپ ئۇۋۇلاش زۆرۈر.

2. مەزى بېزى يوغىناش (ئۆسۈش)

1. مەزى بېزى يوغىناش يەنە مەزى بېزى ئۆسۈش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ يا-شانغان ئەرلەردە دائىم كۆرۈلىدىغان سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىك، شۇنداقلا سۈيدۈك چىقىرىش ئەزالىرى تاشقى بۆلۈمىنىڭ دائىمىي كېسەللىرىدىن بىرى. مەزى بېزىنىڭمۇ بەدەندىكى باشقا ئەزالارغا ئوخشاش تەرەققىي قىلىش، يېتىلىشىدىن قېرىشىغىچە جەريانى بولىدۇ. توغۇلغان-دىن باشلاپ ياشلىق دەۋرىدىن كېيىن ئۆسۈشى تېزلىشىدۇ. تەدريجىي يېتىلىپ مۇكەممەللىشىدۇ. 30 ياش ئىچىدە ئۇنىڭ ھەجمى تۇراقلىق بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى خىل يۈزلىنىش بولىدۇ. يەنى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ تارىپىشقا قاراپ يۈزلىنىدۇ. بەزى تېنىنىڭ ھەجمى تەدريجىي كىچىكلەيدۇ. يەنە بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئۆسۈشكە يۈزلە-نىدۇ. بەزى ھەجمى تەدريجىي چوڭىيىدۇ. بۇنىڭ بىلەن مەزى بېزى ئۆ-سۈپ ياخشى سۈپەتلىك كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى شەكىللەندۈرىدۇ.

مەزى بېزىنىڭ ئۆسۈش دەرىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ. ئادەتتە نورمال بولغان g 20 ئېغىرلىقى ئېشىپ g 80 ~ 30 غىچە بارىدۇ. ئېغىرلىقى g 200 ~ 100 غا يېتىدىغانلىرىمۇ بار. ئۆسكەن ئورۇننىڭ ئورنى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، ئوخشاش بولمىغان ئورۇندىكى ئۆسۈشنىڭ سۈيىدۈك بولغان تەسىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغانلىرى ئوتتۇرا ياپراق ۋە ئىككى يان ياپراق ئۆسمىسى بولۇپ، ئەگەر ئوتتۇرا ياپراقى ئۆسسە ناھايىتى ئاسانلا ئارقا سۈيىدۈك يولى ئاغزىنى توسۇپ قويدۇ.

2. مەزى بېزى ئۆسۈشنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى

1. دەسلەپكى دەۋرلىك كېسەللىك ئالامەتلىرى:

(1) پات - پات سىيگۈسى كېلىش: بۇ مەزى بېزى ئۆسۈشنىڭ دەسلەپكى ئۇچۇرى بولۇپ، ئەڭ ئوچۇق بولغىنى سىيىش قېتىم سانى كۆپىيىش. سۈيىدۈك يولى توسۇلۇشنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ كېچىسى سىيىش تەدبىرىجى كۆپىيىدۇ.

(2) سىيىپ بولغاندىن كېيىن سۈيىدۈك يولى يوشۇرۇن ئاغرىيدۇ ياكى تەرەتتىن كېيىن سۈيىدۈك تامچىلاپ، قورساقنىڭ ئاستى قىسمى بىئارام بولغاندەك ھېس قىلىدۇ.

(3) سۈيىدۈك ئىنچىكە چىقىدۇ.

(4) چىڭقىلىپ سىيىدۇ: سۈيىدۈك يولىدا توسۇلۇش پەيدا بولسا، سۈيىدۈك چىقىرىش توسقۇنلۇقى ئاشىدۇ، قورساقنىكى بېسىمنى كۈچەپ ئاشۇرغاندا ئاندىن سۈيىدۈك چىقىرىشتىكى توسالغۇ كۈچنى يەڭگىلى بولىدۇ.

(5) سۈيىدۈكنىڭ ئۆزگىرىشى: بەزىلەرنىڭ مەزى بېزىگە قان تولۇپ قالغاچقا ياكى مەزى بېزى ئىچىدىكى قان تومۇرلىرى كېڭەيگەچكە، قان تومۇرلىرى يېرىلىپ قانايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا سۈيىدۈكتە قان بولىدۇ. بەزىلەرنىڭ سۈيىدۈك يولى توسۇلۇپ قالغاچقا، سۈيىدۈك ئېقىمى توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، سۈيىدۈك يولى ئاسان يۇقۇملىنىپ يىرنىڭ ئارىلاش سىيىدۇ.

(6) ئارقا سۈيىدۈك يولى يېقىمىسىزلىقى ۋە جىنسىي ئارىلىق بېسىم ھېس قىلىش: بۇ مەزى بېزى ئۆسۈپ ئارقا سۈيىدۈك يولى غىدىقلاشقا

ئۇچرىغانلىقتىن كۆرۈلىدۇ.

2. ئوتتۇرا دەۋرلىك ئالامەتلىرى:

(1) دوۋساق سىغىمى نىسپىي ئازايغاچقا، ھەر قېتىمقى سۈيىدۈك مىقدارى ئازىيىدۇ ۋە پات - پات سىيگۈسى كېلىپ تۇرىدۇ.

(2) سىيىش قىيىنلىشىش تەدرىجىي ئېغىرلىشىدۇ.

(3) سۈيىدۈك چىقىرىش ۋاقتى ئۇزىرايدۇ، سۈيىدۈك ئىنچىكە چىقىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا سۈيىدۈك ئۇزۇلۇپ قېلىش ھادىسىسى كۆرۈلىدۇ.

(4) قالدۇق سۈيىدۈك كۆرۈلىدۇ، ئادەتتە 100 ml ~ 50 گىچە بولىدۇ. ھەر قېتىم پەيدا قىلغۇچى شەۋەبكە يولۇققاندا مەسلەن: ھەددىدىن ئارتۇق چارچاش، قەۋزىيەت بولۇش، جىنسىي تۇرمۇش ئۆتكۈزۈش، زۇكام قاتار-

لىقلار بولغاندا ئۆتكۈر خاراكتېرلىك سۈيىدۈك يىغىلىپ قېلىش كېلىپ چىقىدۇ. بىراق، دەرىجىسى يېنىك، داۋاملاشقان ۋاقتى قىسقا بولىدۇ.

(5) سۈيىدۈك چىقىرىپ ئاخىرلاشقاندا بەزىدە قان ئارلاش سۈيىدۈك كېلىدۇ، ئاسان يۇقۇملىنىدۇ، سىيگەندە ئاغرىيدۇ.

3. ئاخىرقى دەۋرىدىكى ئالامەتلىرى:

(1) پات - پات سىيگۈسى كېلىش ئېغىرلىشىدۇ. سىيىش قېتىم سانى كۆپىيىدۇ، بولۇپمۇ كېچىدە يۇقۇملىنىش ياكى تاش پەيدا بولغان بولسا، سىيگەندە ئاغرىش ۋە سۈيىدۈك قىستاش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ.

(2) سۈيىدۈك چىقىرىشنىڭ قىيىنلىشىشى داۋاملىشىش خاراكتېرلىك ئېغىرلىشىدۇ، ھەم ھەر قېتىم سۈيىدۈك چىقىرىشتا قورساق بېسىمىنى كۆپەيتكەندە ئاندىن چىقىدۇ. ھەر قېتىمقى سۈيىدۈك مىقدارى كۆرۈنەرلىك ئازىيىدۇ ياكى ئېغىر ھالدىكى سۈيىدۈك تامچىلاش كۆرۈلىدۇ. بەزىلەردە ئورنىغا سىيىپ قويۇش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ.

(3) سۈيىدۈك چىقىرىش ۋاقتى كۆرۈنەرلىك ئۇزىرايدۇ، سۈيىدۈك بىر تۈز سىزىقتا بولمايدۇ، سىيىش جەريانى ناھايىتى قىسقا بولىدۇ، بەزىدە ئىشتاننى ھۆل قىلىپ قويىدۇ.

(4) دوۋساق ئىقتىدارى ئورۇن بېسىپ ئىشلىمەيدۇ، ئېشىپ قالىدۇ. ھەر سۈيىدۈك 150 ml دىن ئارتۇق بولىدۇ. بەزىدە 500 ml ~ 400 غا يېتىدۇ ياكى پەقەت سىيەلمەي، سوزۇلما خاراكتېرلىك سۈيىدۈك يىغىلىپ قېلىش

شەكىللىنىدۇ.

(5) سۈيدۈك يولى ئۇزاق مۇددەت توسۇلۇپ قالسا، سۈيدۈك يولى ئاسانلا يۇقۇملىنىدۇ ياكى توسۇلۇپ قېلىش دەرىجىسى تەدبىرىجىي ئېغىرلاشقاندا بۆرەكتە سۇ يىغىلىپ قېلىش، بۆرەك ئىقتىدارى تولۇق بولماسلىق، بۆرەك خاراكتېرلىك يۇقىرى قان بېسىمى قاتارلىقلار كۆرۈلۈشى مۇمكىن.

3. داۋالاش

مەزى بېزى يوغىناش ئېغىر بولغاندا ئوپىراتسىيە قىلدۇرۇپ ئېلىدۇ. ۋەتسە بولىدۇ، ئادەتتە ئوپىراتسىيىسىز داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى كىشىنى رازى قىلالمايدۇ.

1. مەزى بېزى يوغىناشتىن بولغان ئۆتكۈر خاراكتېرلىك سۈيدۈك يىغىلىپ قېلىشنى داۋالاش:

(1) ئىسسىق ئۆتكۈزۈش.

(2) ئۇۋۇلاش: كىندىكىنى بويلاپ دوۋسۇن سۆڭەك بىرلەشمىسىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىغىچە يېنىك ئۇۋۇلاپ تەدبىرىجىي كۈچەيتىسە سۈيدۈك چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

(3) يىڭنە سانجىپ داۋالاش: گۈەن يۈەن، چى خەي، جۇڭ جى، سەن يىن جاۋ، يىن لىڭ چۈەن پەللىلىرىگە يىڭنە سانجىسىمۇ سۈيدۈك چىقىرىشقا ياردەم بولىدۇ.

(4) سۈيدۈك يولىغا كاتېتىر سېلىش (سۈيدۈكنى نەيچە سېلىپ ماڭدۇرۇش).

2. دورا ئارقىلىق داۋالاش:

(1) ئائىلىق ھورمون.

(2) ئائىلىق ھورمون.

ئائىلىق ھورمون ئارقىلىق داۋالغاندا ئۈنۈمى ياخشى بولمىسا ئائىلىق ھورمون ئارقىلىق داۋالاشنى ئويلاشقا بولىدۇ.

(3) ئائىلىق ۋە ئائىلىق ھورمونلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

(4) بۆرەك ئۈستى بېزى پوستلاق ماددا ھورمونى.

3. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق مەزى بېزى.

زى يوغۇناشنى داۋالاش:

نۆۋەتتە ئادەتتىكى بەدەن تەكشۈرۈشتە مەزى بېزى ناھايىتى ئاز تەكشۈرۈلىدۇ، شۇڭا بۇ كېسەل دائىم ئېتىبارسىز قارىلىدۇ. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى قوللىنىلسا، بۇ كېسەلنى نىسبەتەن بالدۇر سەزگىلى بولىدۇ.

ئادەتتە پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى (ئۆكچە ئىچكى يان تەرپى) دا بىر چوقچىيىپ چىققان جايىنى كۆرگىلى بولىدۇ. قول بىلەن ئۇۋۇلدغاندا، ئېنىق ئاغرىشنى ھېس قىلغىلى ۋە دانچىسىمان نەرسىنى سەزگىلى بولىدۇ، بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، بولۇپمۇ دوۋساق رېفلىكس رايونىدا چوقچىيىپ چىققان جايىنى كۆرگىلى، قول بىلەن سىلىغاندا ئاغرىش نوقتىسى ۋە دانچىسىمان نەرسىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ. بۇ ئالامەتلەرنى سەزگەندە، پۇت رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنى بالدۇر باشلىسا، مەزى بېزى يوغىناش كېسەلنى داۋالاشتا ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئىشلەش ئۇسۇلى: پۈتۈن پۇتنى ئۇۋۇلاش ئاساسىدا بۆرەك ئۈستى بېزى، بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق، چوڭ مېڭە، مەزى بېزى، جىنسىي بەز، سۈيدۈك يولى، قۇيرۇق سۆڭەك، توققۇز كۆز سۆڭىكى، قورساق ئاستى قىسمى قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى نوقتىلىق كۈچەپ ئۇۋۇلاش كېرەك. ئۇۋۇلاش داۋامىدا باسقاندا ئاغرىشنى ئېنىق ھېس قىلغان ئورۇنلارنى نوقتىلىق كۈچەيتىپ ئۇۋۇلاش لازىم. ئادەتتىكى كېسەللەرنىڭ مەزى بېزى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا ئېنىق ئاغرىيدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا كۈچنى كۈچەيتىپ ئۇۋۇلاش ۋە قېتىم سانىنى كۆپەيتىش كېرەك. بۇ ئۇسۇل كېسەللىك ئەھۋالىنى تېزلىكتە ياخشىلايدۇ. يەنە كېسەللەرنىڭ ئۆز-ئۆزىنى ئۇۋۇلىشى ئۈچۈن ئۈگىتىپ قويۇش، ساقلىقنى ساقلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك. مەسىلەن: ① قىشتا ئىسسىق سۇ بىلەن پۇتنى يۇيۇش، پۇتنى ئىسسىق ساقلاشقا دىققەت قىلىش؛ ② سوغۇق، نەم جايدا ئولتۇرمايلىق، قۇيرۇق سۆڭەكنى ئاسراپ سوغۇق تەڭگۈزمەسلىك؛ ③ قول بىلەن دائىم قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمىنى ئۇۋۇلاپ بېرىش، مەقۇت كۆتۈرۈش ھەرىكەتلىرىنى ئىشلەش، چاڭ چىياڭ، ئارىلىق پەللىسى قاتارلىق ئورۇنلارنى نوقتىلىق بېسىپ ھەرىكەتلەندۈرۈش قاتارلىقلار.

ئون تۆتىنچى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرى
ئارقىلىق ساغلاملاشتۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ياشان-
غانلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئال-
دىنى ئېلىش ۋە داۋالاش

(6)

ئۇيقۇسىزلىق ، پاركىنسۇن كېسلى

1. ئۇيقۇسىزلىق

ئۇيقۇسىزلىق دېگەندە ئۇخلاش ۋاقتىنىڭ تولۇق بولماسلىقى ۋە
چوڭقۇر ئۇخلىيالماسلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئادەتتە ئۇيقۇسىزلىقتا بۇ ئىك-
كى خىل ئەھۋالنىڭ ھەر ئىككىلىسى بىرلا ۋاقىتتا مەۋجۇت بولىدۇ. بە-
زىلەر ئالدىنقى يېرىم كېچىدە ئۇخلىيالايدۇ، ئورۇنغا كىرگەندىن كېيىن
ئۇزۇنغىچە ئۇيقۇسى كەلمەيدۇ، ئۇياق - بۇياققا ئۆرۈلۈپ بىئارام بولۇپ،
كېيىنكى يېرىم كېچىگە بارغاندا ئاندىن ئۇخلاپ قالىدۇ. بۇ خىل ئۇيقۇ-
سىزلىق ئۇيقۇسىزلىقنىڭ ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان بىر خىلى بولۇپ، كۆ-
پىنچە تۇرمۇشتىكى جىددىيلىك، غەم - قايغۇ، قورقۇش، بېسىم قاتارلىقلار
تۈپەيلىدىن بولىدۇ. يەنە بەزىلەردە ھەزىم قىلىش ياخشى بولماسلىق تۈ-
پەيلىدىن دائىم ئۇيقۇسى ئۇزۇلۇپ قېلىش ياكى يامان چۈش كۆرۈش قا-
تارلىق ئەھۋاللارمۇ بولىدۇ. ئادەتتە ياشانغانلاردىكى قان تومۇر قېتىش،
يۇقىرى قان بېسىم، غەم - ئەندىشە قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن ئۇخلاشقا كى-
رىش قىيىن بولىسىمۇ، ئەمما ئۇيقۇنىڭ داۋاملىشىش ۋاقتى ئۇزۇن بولماي،
كېيىنكى يېرىم كېچىدە ئويغۇنۇپ كەتكەندىن كېيىن ئۇخلىيالايدۇ، بۇ
ياشانغانلاردا دائىم كۆرۈلىدىغان ھادىسە.

ئۇيقۇ ئادەم تېنىگە نىسبەتەن بىر خىل قوغداش خاراكتېرلىك

تورمۇزلاش ھېسابلىنىدۇ. ئۇيقۇ تولۇق بولسا، كىشىنىڭ روھىي جۇشقۇن بولىدۇ. ئۇيقۇسىزلىق كىشىنى چېچىلغاق، روھىي ھالىتىنى سولاش قىلدۇ. شۇڭا، ئۇيقۇ تۇرمۇشتىكى ئىنتايىن مۇھىم بىر ھالقا ھېسابلىنىدۇ. ئۇيقۇنىڭ ياخشى - يامان بولۇشى ئۇيقۇ ۋاقتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپلا قالماي، ئۇيقۇغا قېنىش - قانماسلىق بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. ئاتالمىش ئۇيقۇغا قېنىش - قانماسلىق دېگىنىمىز، ئادەتتە ئۇخلىغاندىن كېيىن ئالدى بىلەن يۈزەكى ئۇخلاپ، تەخمىنەن بىر سائەتتىن ئارتۇقراق ۋاقىتتىن كېيىن چوڭقۇر ئۇيقۇغا پاتىدۇ. ئۇيقۇنىڭ يۈزەكى ياكى چوڭقۇر بولۇشى ئۇيقۇ داۋامىدا ئۆزئارا ئالمىشىپ تۇرىدۇ. ئادەم ئۇخلاپ ئويغانغاندا كۆپىنچە يۈزەكى ئۇيقۇدىن ئويغىنىدۇ، بۇ ۋاقىتتا ئادەم ئۆزىنى راھەتلەندۈرگەندەك سېزىدۇ، روھىي تۇرغۇيدۇ. ئەگەر ئادەم چوڭقۇر ئۇيقۇدىن ئويغانسا ئۇيقۇغا قانمىغاندەك، يەنە ئۇخلىغۇسى باردەك ھېس قىلىدۇ. شۇڭا، ئۇخلاش ۋاقتىدىن باشقا، ئۇيقۇنىڭ چوڭقۇر ياكى يۈزەكى بولۇش نىسبىتىمۇ ئىنتايىن مۇھىم. بۇ ئىككىسىنىڭ قايسى بىرسى كەم بولسا ئادەم تېنىگە پايدىسىز. ئەلۋەتتە، يۈزەكى ئۇيقۇ كەم بولسا، ئادەم تېنىگە تەسىرى ئازراق بولىدۇ. چۈنكى كىشىلەرنىڭ چۈشتە ئازراق ئۇخلىۋېلىشى ياكى ئۇيقۇسىزلىقى سىرىشى يۈزەكى ئۇيقۇنىڭ كەم قىسمىنى تولۇقلايدۇ. ئەگەر چوڭقۇر ئۇيقۇ كەم بولسا، ئادەمنىڭ ۋېگېتاتىۋ نېرۋا سىستېمىسىنىڭ فۇنكسىيەسى قالايمىقانلىشىپ ئاسانلا ھاياجانلىنىش، كەيپىياتى تۇراقلىق بولماسلىق، بېشى قېيىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئەگەر چوڭقۇر ئۇيقۇ ياكى يېرىم كېچىدە ئۇخلاۋاتقاندا باشقىلار تەرىپىدىن ئويغۇتۇۋېتىلسە، كىشىنىڭ ئىممۇنىتلىق ئىقتىدارىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ، ئاسانلا باكتېرىيە ياكى ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملىنىپ كېسەلگە گىرىپتار بولىدۇ. ئەگەر ئۇيقۇسى دائىم تەسىرگە ئۇچرىسا، كىشىنىڭ تەن سالامەتلىكىگە بەكمۇ پايدىسىز. شۇڭلاشقا ئۇيقۇنىڭ ۋاقتى ۋە سۈپىتىگە دىققەت قىلىش كېرەك. ئادەتتە ياشانغانلار كۈنىگە سەككىز - توققۇز سائەت ئۇخلىشى لازىم. بەزىلەر ياشانغانلارنىڭ ئۇخلاش ۋاقتى ئازراق بولسىمۇ بولىدۇ دەپ قارايدۇ. بۇ توغرا ئەمەس.

ئۇيغۇسزلىقتىن ساقلىنىش ۋە ئۇنى داۋالاش ئۈچۈن تۆۋەندىكىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك:

(1) تۇرمۇش رىتىملىق بولۇش، بەلگىلىك ۋاقىتتا يېتىپ - قويۇشقا ئادەتلىنىش، ئەگەر كارىۋاتتا ياتسا ئۇيغۇ كەلمەي ئۇياق - بۇياققا ئۇرۇلسە، كارىۋاتتا يېتىش ۋاقتىنى ئازايتىش كېرەك.

(2) مۇۋاپىق جىسمانىي پائالىيەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىش، بەك قاتتىق ھەرىكەت قىلماسلىق لازىم. چۈشتىن كېيىن بىرەر سائەت ئەتراپىدا ھەرىكەت قىلىپ بەرسە، ئۇيغۇغا پايدىلىق بولىدۇ.

(3) كەچقۇرۇنلۇق غىزالىنىشقا دىققەت قىلىش، بەك ئاچ ياكى بەك توق بولۇش ھەر ئىككىلىسى ئۇيغۇغا تەسىر قىلىدۇ. ئۇخلاشتىن بۇرۇن قەھۋە ياكى قېنىق چاي ئىچمەسلىك كېرەك. ئۇخلاشتىن بېرىم سائەت بۇرۇن بىر ئىستاك سۈت ئىچسە ئۇيغۇغا پايدىلىق.

(4) ئۇخلاشتىن بۇرۇن بەزى يېنىك ھەرىكەتلەرنى قىلىش مەسىلەن: ئىسسىق سۇدا يۇيۇنۇش، ئىسسىق سۇغا پۇتنى چىلاش ياكى بىر ئاز گېزىت، كىتاب كۆرۈش قاتارلىقلار ئارقىلىق ئۆزىنى تىنچلاندۇرسىمۇ ئۇخلاشقا پايدىلىق.

(5) ئۇيغۇ كەلمىگەندە بىر ئاز ئۇيغۇ دورىسى ئىچسىمۇ بولىدۇ، بىراق دورىغا پۈتۈنلەي تايىنىۋېلىشقا بولمايدۇ. ئۇيغۇ دورىسى ئىشلىتىشتە ئېھتىياتچان بولۇش، دائىم ئىشلىتىۋەرمەسلىك لازىم. چۈنكى، دورا ئارقىلىق ئۇخلاشقۇزۇش بىلەن تەبىئىي ئۇخلاش ئوخشاش بولمايدۇ. ئۇيغۇ دورىلىرى ئاساسلىقى يۈزەكى ئۇيغۇنى كۆپەيتىپ، چوڭقۇر ئۇيغۇنى ئازايتىدۇ. دورا ئارقىلىق ئۇيغۇ كەلتۈرۈشنى تەبىئىي ئۇخلاشنىڭ ئورنىغا دەستىشكە بولمايدۇ. قېنىپ ئۇخلىيالماسلىق نورمال ئۇخلاش ئەمەس. بەزى دورىلارنىڭ يەنە ناچار تەسىرلىرى بار. مەسىلەن: دىئازېپام، لېزىئۇم قاتارلىقلار قان ئىشلەش سىستېمىسىغا تەسىر قىلىدۇ. بەزى ئۇيغۇ دورىلىرى ئاق قان دانىچىلىرىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. دورا ئىشلىتىپ ئۇخلاپ ئويغانغاندىن كېيىن باش قېيىش، روھىي سۇلغۇن بولۇش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. ئۇزاق مۇددەت ئىشلەتسە دورىغا چىدامچانلىق شەكىللىنىپ،

دورا مىقدارىنى كۆپەيتكەندە ئاندىن ئۈنۈمى كۆرۈلىدۇ. بەزى دورىلار يەنە خۇمار پەيدا قىلىدۇ. مەسىلەن: بارىتال تۈرىدىكى دورىلار، مىلتوۋىن، لىبرىئۇم قاتارلىقلار. شۇڭا، ئەڭ ياخشىسى دورا ئارقىلىق ئۇخلىماي، ئۆپ-قۇسىزلىقنىڭ سەۋەبىگە قاراپ چارە تېپىپ ھەل قىلىش كېرەك.

بىز پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى بىلەن ئۇيقۇسىزلىقنى داۋالاساق، روھىي جەددىيلىكنى پەسەيتىپ، چوڭ مېڭە-نىڭ غىدىقلىنىشى بىلەن تورمۇزلىنىش ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭسىزلىقنى تەڭشەپ، ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشەلەيمىز. ئۆزىنى ئۆزى ئۇۋۇلىسىمۇ، ئائىلە ئەزالىرى ئۇۋۇلاپ قويسىمۇ بولىۋېرىدۇ. ئۇۋۇلاش ناھايىتى ئوڭاي، ناچار تەسىرى يوق، ئۈنۈمىمۇ ناھايىتى ياخشى، كۆپچىلىك سىناپ باقسا بولىدۇ. كونكرېت ئىشلەش ئۇسۇلى:

(1) پۈتۈن پۇتنى ئۇۋۇلاش: بۇ ئارقىلىق ھەم ئۇيقۇسىزلىقنى داۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى ھەم پۈتۈن بەدەندىكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەپ، ھەر خىل سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنى داۋالىغىلى بولىدۇ.

(2) نوقتىلىق رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش: بۇ ئارقىلىق جىسمانىي كۈچى ۋە ۋاقتىنى تېجىگىلى بولىدۇ ھەم ئىشلەشكە ئوڭاي. ئوخشىمىغان ئەھۋالغا ئاساسەن بۆرەك ئۈستى بېزى، بۆرەك، سۈيدۈك نەيچە-سى، دۈۋساق، باش، مېڭە ئاستى بېزى (ھىپوفىز)، قالدانبەز، جىگەر، ئۆت، ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەي، يۈرەك، ئومۇرتقا سۆڭىكى، قۇيرۇق سۆڭەك، جىنسىي بەز، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى، ئىنچىك ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى تاللاپ ئۇۋۇلاش لازىم. ئۇۋۇلىنىدىغان ئورۇن، ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى، كۈچ بېرىش دەرىجىسى، ۋاقتى ئادەمنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ. ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق تەڭشىسە بولىدۇ. ئۈنۈمگە ئېرىشكەندىن كېيىن داۋاملاشتۇرۇپ قانۇنىيەتنى شەكىللەندۈرسە ھەم ۋاقىتدا ئۇيقۇغا كىرىشكە كاپالەتلىك قىلغىلى ھەم ناچار تەسىرى بار ئۇيقۇ دورىلىرىنى ئىشلەتمەسلىكنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

2. پاركىنسون كېسىلى

پاركىنسون كېسىلى ئوتتۇرا ياش، ياشانغانلاردا بولىدىغان بىر خىل نېرۋا سىستېما كېسەللىكى بولۇپ، بۇ كېسەلنىڭ تەرەققىي قىلىشى نىسبەتەن ئاستا، كېسەل باشلىنىپ ئېنىق دىئاگنوز قويۇلغىچە ئىككى - ئۈچ يىل ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق ۋاقىت كېتىدۇ. ياشانغانلارنىڭ گىرىپتار بولۇش نىسبىتى نىسبەتەن يۇقىرى بولىدۇ. مۆلچەرگە قارىغاندا، ئېلىمىزدە تەخمىنەن بىر مىليۇن بىر يۈز مىڭدىن بىر مىليۇن بەش يۈز مىڭغىچە پاركىنسون كېسىلى بار ئىكەن.

كېسەل سەۋەبى ئېنىق ئەمەس. لېكىن ئاساسلىقى مېگە ھۈجەيرىدە - لىرىنىڭ ئۆزگىرىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇ بىر خىل سوزۇلما، چېكىدە - نىش خاراكتېرلىك كېسەللىك ئۆزگىرىشىدۇر. كېسەللىك ئۆزگىرىشى مېگىنىڭ قارا ماددىسى بىلەن سىزىقسىمان تەنچىسىدە بولسا، دوپامىننىڭ ئاجرىتىلىشى ئازىيىپ كېتىدۇ. دوپامىن مۇسكۇلنىڭ كېڭىيىشى بىلەن قىسقىرىشىنى تەڭشەپ تۇرىدىغان بولغاچقا، ئۇنىڭ ئازىيىشى مۇسكۇلنىڭ كېڭىيىش ۋە قىسقىرىش ئىقتىدارىنى تەڭپۇڭسىزلاشتۇرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن مۇسكۇل قېتىپ قېلىش، توختاش خاراكتېرلىك تىترەش، ئىختىيا - رىي ھەرىكىتى ئاستىلاش قاتارلىق ئاساسلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆ - رۇلىدۇ. نەتىجىدە چىراي مۇسكۇللىرى قېتىپ قالغاچقا، «نىقاپ يۈز» لۈك بولۇپ قالىدۇ. قولى تىترەپ خەت يازالمايدۇ، ئېغىر بولغاندا چايناش، يۇ - تۇش، سۆزلەشمە قىيىن بولىدۇ. ھەرىكىتى قۇلايسىز بولۇپ، خىزمەت ۋە ئەمگەك قىلىشقا ئېغىر تەسىر يەتكۈزىدۇ، تۇرمۇشتا ئۆز ئىشىنى ئۆزى قىلالمايغاچقا، كېسەل بەكمۇ ئازابلىنىدۇ. بۇ كېسەل ئادەتتە دوپامىن تۈردە - دىكى دورىلارنى ئىشلىتىپ كونترول قىلىنىدۇ. ئەمما داۋالاش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك ئەمەس، تۈپ يىلتىزىدىن ساقايىتقىلى بولمايدۇ، كېسەلنىڭ داۋاملىق يامانلىشىشىنى تولۇق توسۇپ قالغىلى بولمايدۇ، پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش، پۈتۈن بەدەندىكى ئەزالارنىڭ يوشۇرۇن ئۆز - ئۆزىنى قوغداش، ئۆز - ئۆزىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئىقتىدارىنى

تەڭشىگەندە، بۇ كېسەلنىڭ ئالامەتلىرىنى يېنىكلىتىشكە، كېسەلنىڭ ئازابىنى ئازايتىشقا پايدىسى بولىدۇ.

ئاساسلىق ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە:

(1) پۈتۈن پۇتنى ئۇۋۇلاش: بۇ كېسەل پۈتۈن بەدەن خاراكتېرلىك كېسەللىك بولغاچقا، نۇرغۇن سىستېمىلارنىڭ ئىقتىدارىغا تەسىر قىلىدۇ. شۇڭا، پۈتۈن پۇتنى ئاز دېگەندە 20 مىنۇت ئۇۋۇلاشنى داۋاملاشتۇرۇش ئارقىلىق پۈتۈن بەدەندىكى ھەر قايسى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەش زۆرۈر.

(2) تۆۋەندىكى رېفلىكس رايونلىرىنى نوقتىلىق كۈچەيتىپ ئۇۋۇلاش: نېرۋا سىستېمىسىدىكى رېفلىكس رايونلىرى: چوڭ، كىچىك مېڭە، مېڭە غۇلى، مېڭە ئاستى بېزى، ماڭلاي، ئومۇرتقا (بويۇن ئومۇرتقىسى، كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، توققۇز كۆز سۆڭىكى، قۇيرۇق سۆڭىكى قاتارلىقلار) 20 مىنۇت ئۇۋۇلىنىدۇ.

چىقىرىش سىستېمىسى: بۆرەك، سۈيۈك نەيچىسى، دۈۋساق.

ئىچكى ئاجراتما سىستېمىسى: بۆرەك ئۈستى بېزى، مەزى بېزى ياكى بالىياتقۇ، جىنسىي بەز، قالقانبەز، قالقان يان بەز.

ھەرىكەت سىستېمىسى: يانپاش بوغۇم، تىز، جەينەك، مۈرە، تاغاق سۆڭەك، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ۋە يۈرەك، جىگەر، تال، ئاشقازان، چوڭ - ئىنچىك ئۈچەي، بەدەننىڭ يۇقىرى ۋە تۆۋەنكى قىسىملىرى لىمفا بەزلىرى قاتارلىقلارنى ھەر كۈنى بىر - ئىككى قېتىم ئۇۋۇلاش، ھەر قېتىمدا بىر سائەت ئىشلەش، ئادەتتە ئوتتۇرا ھال كۈچ بېرىش كېرەك. ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن 500 ml قايناق سۇ ئىچىش كېرەك. مۇھىمى بۇ كېسەل خېلى ئۇزۇن مۇددەت تەڭشەشكە ئېھتىياجلىق، شۇڭلاشقا، ئۇزۇن مۇددەت داۋاملاشتۇرۇش ئىرادىسى بولۇشى لازىم. ئۇۋۇلىغۇچى بىلەن كېسەل ئۆزئارا ماسلىشىپ داۋالاشنى داۋاملاشتۇرسىلا جەزمەن ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

مەسئۇل مۇھەررىرى: دىلشات ساۋۇت
مەسئۇل كوررېكتورى: ئامىنە ھاپىز

ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش

ئوبۇلقاسىم نۇرى
ئابلەت روزىمۇھەممەت
تەرجىمە قىلغۇچىلار: سالامەت روزىمۇھەممەت
ئايگۈل روزى

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى نەشر قىلدى
(ئۈرۈمچى بۇلاقبېشى كوچىسى 66 - قورۇ پوچتا نومۇرى: 830001)
شىنجاڭ شىنخۇا باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى
شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى تارقاتتى
1168 × 850 مىللىمېتىر، 32 فورمات، 11.75 باسما ئاۋاق
2005 - يىلى 4 - ئاي 1 - نەشرى
2011 - يىلى 5 - ئاي 3 - قېتىم بېسىلدى
تىراژى: 10000 — 20000

ISBN 978-7-5372-3903-7

باھاسى: 20.00 يۈەن

بۇ كىتابنىڭ «قولنى ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش» قىسمى
بىلىم نەشرىياتىنىڭ 2003 - يىلى 8 - ئاي 1 - نەشرىگە
ئاساسەن، «پۇتنى ئۇۋۇلاپ كېسەل داۋالاش» قىسمى جۇڭگو
دوستلۇق نەشرىيات شىركىتىنىڭ 1997 - يىلى 9 - ئاي 1 -
نەشرىگە ئاساسەن تەرجىمە ۋە نەشر قىلىندى.