


باللارنى ئۆتكۈزۈپچى سۈرۈش ۋە واۋالاش



شىنجاڭ پەن-تېخنىكا نەشرىياتى (W)

مۇقلاۋىنى لايىھىلىگۈچى : ئەنۋەر قاسىم

ISBN 7-5372-2051-4



9 787537 220514 >

ISBN7-5372-2051-4

R·219(民文)定价:6.70 元

پەن تەتقىقاتى ۋە تېخنىكا
ۋە تەتقىقاتى ۋە تېخنىكا

نۇرمان ئىسمائىل

باللاردىكى ئۆتكۈر ئىچى سۈرۈش ۋە داۋالاش

رەسلىك ۋە رەسلىك رەسلىك رەسلىك

رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك
رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك

رەسلىك رەسلىك (W) رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك

(83000) رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك

رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك

رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك

رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك

رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك

رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك رەسلىك

ISBN 7-232-2021-1/R 210

شىنجاڭ پەن - تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى (W)

مەسئۇل مۇھەررىر: گۈەن شىۋېي
مۇقاۋىنى لايىھىلىگۈچى: ئەنۋەر قاسىم

بالىلاردىكى ئۆتكۈر ئىچى سۈرۈش ۋە داۋالاش

تۈزگۈچى: نۇرمان ئىسمائىل
كورېكتورى: ئاتىكەم ئابدۇرېھىم ھاجى

شىنجاڭ پەن - تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى (W) نەشر قىلدى
(ئۈرۈمچى شەھىرى بۇلاقبېشى كوچا 66 قورۇچى نومۇرى 830001)

شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى تارقىتىدۇ
«ئىشچىلار ۋاقىت گېزىتى» باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى

1092×787م، 32 فورمات، 5.625 باسما تاۋاق

1998- يىلى 5-ئاي 1-نەشرى 1- قېتىم بېسىلدى

تراژى: 1-2200

ISBN7-5372-2051-4/R. 219

(W) باھاسى: 6.70 يۈەن

مۇندەرىجە

1. باب ئومۇمىي چۈشەنچە
1. بالىلار ھەزىم قىلىش ئورگانلىرى ۋە ئالاھىدىلىكى 2...
2. بالىلار بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ ئالاھىدىلىكى 10
3. سۇ ۋە ئېلېكتىرولىتلار تەڭپۇڭلۇقىنىڭ قالايمىقانلىشىشى 32
2. باب بوۋاق-كۆدەكلەر ئىچى سۈرۈش كېسەللىكى
1. چۈشەنچە 47
2. ئىچى سۈرۈشنىڭ بالىلارنىڭ سالامەتلىكىگە بولغان خەتىرى 49..
3. ئىچى سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر 50..
4. ئىچى سۈرۈشنىڭ پاتو - فىزىئولوگىيىسى 56
5. ئىچى سۈرۈشنىڭ دىئاگنوز ئاتالمىسى ھەم ئۆلچىمى 61..
6. كلىنىكىلىق ئىپادىسى 65
7. بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدىغان بىر نەچچە خىل تىپتىكى، ئۈچەي ياللۇغنىڭ كلىنىكىلىق ئالاھىدىلىكى 83
8. دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى 97
9. ئاقىۋىتى 100
3. باب ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىنى داۋالاش
1. ئادەتتىكى داۋالاش 101
2. يۇقۇملىنىشنى تىزگىنلەش 106
3. ئىكولوگىيىلىك داۋالاش 114
4. سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش 117
5. ئىچى سۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش 158
6. ئىچى سۈرگەن بالىلارنى ئائىلىدە داۋالاش ھەققى-دىكى ساۋات 161
7. بالىلارنى سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاشتا دائىم ئىشلىتىلىدىغان ئېرىتمىلەر 165

مجموعه کتب

1. مجموعه کتب

1. ... 101
2. ... 102
3. ... 103
4. ... 104

2. مجموعه کتب

1. ... 105
2. ... 106
3. ... 107
4. ... 108
5. ... 109
6. ... 110
7. ... 111
8. ... 112
9. ... 113
10. ... 114
11. ... 115
12. ... 116
13. ... 117
14. ... 118
15. ... 119
16. ... 120
17. ... 121
18. ... 122
19. ... 123
20. ... 124
21. ... 125
22. ... 126
23. ... 127
24. ... 128
25. ... 129
26. ... 130
27. ... 131
28. ... 132
29. ... 133
30. ... 134
31. ... 135
32. ... 136
33. ... 137
34. ... 138
35. ... 139
36. ... 140
37. ... 141
38. ... 142
39. ... 143
40. ... 144
41. ... 145
42. ... 146
43. ... 147
44. ... 148
45. ... 149
46. ... 150
47. ... 151
48. ... 152
49. ... 153
50. ... 154
51. ... 155
52. ... 156
53. ... 157
54. ... 158
55. ... 159
56. ... 160
57. ... 161
58. ... 162
59. ... 163
60. ... 164
61. ... 165
62. ... 166
63. ... 167
64. ... 168
65. ... 169
66. ... 170
67. ... 171
68. ... 172
69. ... 173
70. ... 174
71. ... 175
72. ... 176
73. ... 177
74. ... 178
75. ... 179
76. ... 180
77. ... 181
78. ... 182
79. ... 183
80. ... 184
81. ... 185
82. ... 186
83. ... 187
84. ... 188
85. ... 189
86. ... 190
87. ... 191
88. ... 192
89. ... 193
90. ... 194
91. ... 195
92. ... 196
93. ... 197
94. ... 198
95. ... 199
96. ... 200
97. ... 201
98. ... 202
99. ... 203
100. ... 204

3. مجموعه کتب

1. ... 205
2. ... 206
3. ... 207
4. ... 208
5. ... 209
6. ... 210
7. ... 211
8. ... 212
9. ... 213
10. ... 214
11. ... 215
12. ... 216
13. ... 217
14. ... 218
15. ... 219
16. ... 220
17. ... 221
18. ... 222
19. ... 223
20. ... 224
21. ... 225
22. ... 226
23. ... 227
24. ... 228
25. ... 229
26. ... 230
27. ... 231
28. ... 232
29. ... 233
30. ... 234
31. ... 235
32. ... 236
33. ... 237
34. ... 238
35. ... 239
36. ... 240
37. ... 241
38. ... 242
39. ... 243
40. ... 244
41. ... 245
42. ... 246
43. ... 247
44. ... 248
45. ... 249
46. ... 250
47. ... 251
48. ... 252
49. ... 253
50. ... 254
51. ... 255
52. ... 256
53. ... 257
54. ... 258
55. ... 259
56. ... 260
57. ... 261
58. ... 262
59. ... 263
60. ... 264
61. ... 265
62. ... 266
63. ... 267
64. ... 268
65. ... 269
66. ... 270
67. ... 271
68. ... 272
69. ... 273
70. ... 274
71. ... 275
72. ... 276
73. ... 277
74. ... 278
75. ... 279
76. ... 280
77. ... 281
78. ... 282
79. ... 283
80. ... 284
81. ... 285
82. ... 286
83. ... 287
84. ... 288
85. ... 289
86. ... 290
87. ... 291
88. ... 292
89. ... 293
90. ... 294
91. ... 295
92. ... 296
93. ... 297
94. ... 298
95. ... 299
96. ... 300
97. ... 301
98. ... 302
99. ... 303
100. ... 304

كىرىش سۆز

ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش - بالىلىق دەۋرىدە كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ بىرى، ئىككى ياشتىن كىچىك، بولۇپمۇ بىر ياشتىن كىچىك بالىلاردا ئىچى سۈرۈشنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. بالىلارنىڭ ئىچى سۈرۈشتىن ئۆلۈش نىسبىتى، نەپەس يوللىرى يۇقۇملانشتىن قالسا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئۆتكۈر ئىچى سۈرۈشتىن كېلىپ چىققان سۇسىزلىنىش بالىلارنىڭ ھاياتىغا تەھدىت سالىدىغان مۇھىم خەۋپ.

يېقىنقى بىر نەچچە يىللاردىن بېرى، خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسىنىڭ ئېشىشى، سەھىيە - ساقلىقنى ساقلاش خىزمىتىنىڭ ياخشىلىنىشى، ئىچى سۈرۈشكە دىئاگنوز قويۇش ۋە ئۇنى داۋالاش جەھەتتىكى ئىلگىرىلەشلەر نەتىجىسىدە، ئىچى سۈرۈشنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى ۋە بۇ كېسەللىك بىلەن ئۆلۈش نىسبىتى كۆزگە كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە تۆۋەنلىدى. بولۇپمۇ خەلقئارا سەھىيە تەشكىلاتى تونۇشتۇرغان بالىلاردىكى ئىچى سۈرۈشتىن بولغان سۇسىزلىنىشنى سۈيۈقلۈك ئىچى - كۈزۈپ تولۇقلاش تۈزى (Oral rehydration Salts)، قىسقارتىپ ORS دېيىلىدۇ) ئىشلىتىشكە باشلىغاندىن بېرى، يېزا - قىشلاق، شەھەرلەردە كەڭ دائىرىدە ئىشلىتىلىپ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشىلدى. بۇ بىر خىل يېڭى داۋالاش ئۇسۇلى بولۇپ، قوللىنىشقا قولايلىق، باھاسى ئەرزان، ماتېرىيالى تولۇق بولۇشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە، خەلقىمىز ئاسان قوبۇل قىلالايدۇ. بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلى ئىچى سۈرۈشتىن سۇسىزلانغانلارغا سۈيۈقلۈك تولۇقلاشقا مۇۋاپىقلىشىپلا قالماستىن، بەلكى سۇسىزلىنىشتىن ساقلىنىشتىمۇ قوللىنىلىدۇ. ئەۋلاد -

لارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشى ئۈچۈن، ئىچى سۈرۈش سەۋەبىدىن بولىدىغان سۇسىزلىنىش خەتىرىدىن بالدۇرراق قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن، مەزكۇر ئۇسۇلنى ئومۇملاشتۇرۇشقا ئەرزىيدۇ، بولۇپمۇ، چەت، قاتناش شارائىتى ناچار ئورۇنلارغا تېخىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ. شۇڭا، بالىلار ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىپ، ئۇلارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشى ئۈچۈن مەلۇم دەرىجىدە ياردىمى بولار دېگەن ئۈمىد بىلەن بۇ كىتابنى يازدىم. خاتالىق، كەمچىلىكلەر- دىن خالىي بولۇشى ناتايىن، كىتابخانلارنىڭ ۋە كەسپداشلارنىڭ تەنقىدىي پىكىر بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

ئاپتوردىن

بىرىنچى باب ئومۇمىي چۈشەنچە

ئىچى سۈرۈش - بالىلىق دەۋرىدە كۆپ ئۇچرايدىغان، ئوخشاشمايدىغان كېسەللىك سەۋەبلىرى قوزغىتىدىغان ئىچى سۈرۈش، قۇسۇشتەك ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرى خىزمىتىنىڭ قالايمىقانلىشىدىشىنى ئاساس قىلىدىغان يىغىندى ئالامەتلىك كېسەللىك. ئىككى ياشتىن كىچىك بالىلاردا پەيدا بولۇش نىسبىتى يۇقىرى، بولۇپمۇ بىر ياشتىن كىچىك بوۋاقلاردا تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. بۇ كېسەللىكنى تۆت پەسلىنىڭ ھەممىسىدە ئۇچراتقىلى بولىدۇ. لېكىن ئۇ ياز، كۈز، پەسلىدە كۆپرەك پەيدا بولىدۇ.

خەلقئارادا، بولۇپمۇ ئاسىيا، ئافرىقا، لاتىن ئامېرىكىسى قاتارلىق تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەردە نۆۋەتتە ئىچى سۈرۈش بالىلارنىڭ سالامەتلىكىگە، ھەتتا ھاياتىغا تەھدىت سېلىۋاتقان كېسەللىكلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالماقتا.

دۆلىتىمىزدە 60 - يىللاردىن ئىلگىرى ئىچى سۈرۈشنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، بۇ كېسەللىكتىن ئۆلۈپ كېتىدىغان بالىلار ناھايىتى كۆپ ئىدى. 70 - يىللاردىن كېيىن خەلقنىڭ ماددىي ۋە مەنەۋىي تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ ئېشىشى، ساقلىقنى ساقلاش، تازىلىق خىزمىتىنىڭ كۈچىيىشى نەتىجىسىدە، ئىچى سۈرۈشنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى ۋە بۇ كېسەللىك بىلەن بالىلارنىڭ ئۆلۈش نىسبىتى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىدى. يېقىنقى بىر نەچچە يىللار - دىن بېرى، بەزىبىر ئورۇنلارنىڭ تەكشۈرۈش ئەھۋالىدىن قارىغاندا، دۆلىتىمىزدە ئىچى سۈرۈشنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى %3 ~ 2 ئىدى. كەن، ئىچى سۈرۈشتىن كېلىپ چىققان سۇسىزلىنىش ۋە ئېلېكترولىت -

لار قالايمىقانلىشىش ئەھۋالى بالىلارنىڭ ھاياتىغا تەھدىت سالىدىغان ئاساس ھېسابلىنىدۇ.

80 - يىللاردىن بېرى ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش تۈزى (ORS) ئىشلىتىلىشكە باشلىغاندىن بۇيان، ئىچى سۈرۈشتىن ئۆلۈپ كېتىدىغانلار نىسبىتى تېخىمۇ تۆۋەنلىدى. بىراق يېزا - قىشلاقلاردا، تازىلىق شارائىتى ناچار ئورۇنلاردا بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى شەھەرلەرگە قارىغاندا يەنىلا يۇقىرى بولماقتا. يېقىنقى يىللار - دىن بۇيان ئېغىر تىپلىق ئىچى سۈرۈشنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى ئازلاپ، يېنىك تىپلىق كۆپەيدى، ئېغىر دەرىجىلىك سۇسىزلىنىش، ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىش ئازلاپ، ئوتتۇرا، يېنىك تىپتىكى سۇ - سىزلىنىش كۆپەيدى، ئۆتكۈر خاراكتېرلىك كۆپىيىپ، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئازلاشقا قاراپ يۈزلەنمەكتە. سەھىيە، تەشۋىقات، ساقلىقنى ساقلاش خىزمەتلىرى كۈچەيتىلسلا بۇ كېسەللىكتىن ساقلانغىلى بولىدۇ، يېقىن كەلگۈسىدە بۇ كېسەللىك چوقۇم ياخشى كونترول قىلىنىپ، پەيدا بولۇش نىسبىتى تېخىمۇ تۆۋەنلىگۈسى.

1. بالىلار ھەزىم قىلىش ئورگانلىرى ۋە ئالاھىدىلىكى

بالىلار توختىماستىن ئۆسۈپ يېتىلىدۇ، ئۇلارنىڭ يېشى قانچىكى كىچىك بولسا، ئۆسۈپ يېتىلىشىمۇ شۇنچە تېز بولىدۇ. شۇڭا ئوزۇق - لمۇق ماددىلارغا بولغان ئېھتىياجى يۇقىرى، ماددا ئالماشتۇرۇشى جۈش - قۇن بولىدۇ. ھەزىم قىلىش ئورگانلىرى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنغان ئوزۇقلۇق ماددىلار ئۆسۈپ - يېتىلىش ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ، بوۋاق - لارنىڭ ھەزىم قىلىش ئورگانلىرىنىڭ خىزمىتى تولۇق تەرەققىي قىلىپ يېتىلمىگەن بولىدۇ، شۇڭا يۇقۇملىنىش، يېمەكلىك سان - سۈپىتىنىڭ

ئۆزگىرىشى قاتارلىق سەۋەبلەردىن ئاسانلا ئىچى سۈرىدۇ. شۇڭلاشقا ئوزۇقلاندۇرغاندا، ھەزىم قىلىش ئورگانلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى نەزەردە تۇتۇپ، مۇۋاپىق ئوزۇقلاندۇرسا، ئىچى سۈرۈشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. ھەزىم قىلىش ئورگانلىرى دېگىنىمىز - ئېغىز بوشلۇقى، قىزىل-ئۆڭگەچ، ئاشقازان، ئۈچەي، ئاشقازان ئاستى بېزى، جىگەر قاتارلىق-لاردىن ئىبارەت، بۇلارنىڭ ئالاھىدىلىكى تۆۋەندىكىچە:

ئېغىز بوشلۇقى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق ۋە بوۋاق بالىلارنىڭ ئېغىز بوشلۇقى نىسبەتەن كىچىك، تىلى قىسقا ۋە كەڭ، ئىككى قوۋۇزىدا ماي مۈنەكچىلىرى بولۇپ، شۇنداقلا پايىدلىق. ئېغىز بوشلۇق-قىدىكى شىللىق پەردىلەر يۇمران، قان تومۇرلار كۆپ بولغاچقا، زەخمىلەنسە ئاسانلا يۇقۇملىنىدۇ. شۆلگەي بېزىنىڭ شۆلگەي ئاجىرد-تىشى ئازراق، بولۇپمۇ كىراخمال فېرېمېنتىنىڭ ئاجىرلىشى تېخىمۇ ئاز بولىدۇ. تۇغۇلۇپ 4 ~ 3 ئايلىق بولغاندا، شۆلگەي بېزى ئاندىن تولۇق تەرەققىي قىلىدۇ، شۆلگەيمۇ كۆپىيىدۇ، بۇ چاغدا بالىلار تولۇق يۇتۇشقا ئۈلگۈرەلمەسە، شالى ئېقىش كۆرۈلىدۇ. بۇ، فېرېمېنتلۇك ھادىسىدۇر.

قىزىلئۆڭگەچ يېڭى تۇغۇلغان بالىنىڭ قىزىلئۆڭگەچ ئوزۇنلۇق-قى تەخمىنەن 10 سانتىمېتىر، بىر ياشتا 12 سانتىمېتىر، 5 ياشتا 16 سانتىمېتىر، چوڭ بالىلارنىڭ 25 ~ 20 سانتىمېتىر ئەتراپىدا بولىدۇ. ئاشقازان بوۋاقلارنىڭ ئاشقازىنى تۈز، تەكشى بولىدۇ. بالى-نىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ تەدرىجىي تىك ھالەتكە كېلىدۇ، بوۋاقلار-نىڭ ئاشقازان كىرىش قىسمىنىڭ ئېتىلىشى ناچارراق بولغاچقا، كۆپرەك ھاۋا شۈمۈرۈۋېلىپ ئاسانلا سۈت ياندۇرۇش كۆرۈلىدۇ، چىقىرىش قىسمىنىڭ تەرەققىياتى ياخشى بولۇپ، جىددىيلىك دەرىجىسى يۇقىرى،

شۇڭا ئاسانلا سىپازمىلىنىپ قۇسۇش كېلىپ چىقىدۇ. بالىنىڭ ئاي يېشىنىڭ ئوخشىماسلىقىدىن ئاشقازان سىغىمچانلىقىمۇ ئوخشىمايدۇ. مەسىلەن: ئاي، كۈنى توشۇپ تۇغۇلغان بوۋاق بالىنىڭ ئاشقازان سىغىمچانلىقى 60 ~ 30 مىللىلىتىر، 3 ~ 1 ئايلىق بوۋاقنىڭ 150 ~ 90 مىللىلىتىر، يېشىغا توشقاندا 300 ~ 250 مىللىلىتىر بولىدۇ، شۇڭا بوۋاقلارنى ئوزۇقلاندۇرغاندا يېمەكلىكلەرنى بەك جىق بەرمەسلىك كېرەك. يېمەكلىكلەردىن سۇ 1.5 ~ 1 سائەتتە، ئانا سۈتى 3 ~ 2 سائەتتە، كالا سۈتى 4 ~ 3 سائەتتە ئاشقازاندىن بوشتىلىدۇ. ئاشقازان سۇيۇقلۇقىنىڭ تەركىبىي چوڭلارنىڭكى بىلەن ئوخشاش، لېكىن ئاشقازان كىسلاتاسى بىلەن ھەر خىل فېرېمېنتلارنىڭ ئاكتىپ-چانلىقى بىردەك تۆۋەن بولىدۇ، يېشىنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ تەدرىجىي يۇقىرىلايدۇ.

ئۈچەي بالىلارنىڭ ئۈچەي يوللىرى چوڭلارغا قارىغاندا نىسبىي ھالدا ئۇزۇن بولىدۇ، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقنىڭ ئۈچەي ئۇزۇنلۇقى قى بەدەن ئۇزۇنلۇقىنىڭ سەككىز ھەسسىسىگە، بوۋاقلارنىڭ بەدەن ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئالتە ھەسسىسىگە تەڭ بولۇپ، يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلىش ۋە شۈمۈرۈش ئۈچۈن پايدىلىق. ھەزىم قىلىش يوللىرى ئابىيۇمى نىسبىي ھالدا چوڭ، ئۈچەي دىۋارى نېپىز، شىللىق پەردىدە قان تومۇرلار كۆپ، ئۆتكۈزۈشچانلىقى يۇقىرى بولغاچقا، شۈمۈرۈش نىسبىتى يۇقىرى بولىدۇ، بۇ ھەزىم قىلىشقا پايدىلىق، مۇبادا ھەزىم قىلىش يوللىرىدا يۇقۇملىنىش بولسا، ئۈچەيدىكى زەھەرلەر ياكى باكتېرىيىلەر ئاسانلا قانغا ئۆتۈپ، زەھەرلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ياكى زەھەرلىنىشنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ئۈچەي ئۇزۇن بولغاچقا، مۇقىملىقى ناچار بولىدۇ، شۇڭا ئۈچەي كىرىشىپ قېلىش ئاسان پەيدا

بولدۇ. ئىنچىكە ئۈچەي سۈيۈقلۈقى تەركىبىدە كىراخمال فېرمېنتى، مالتوزا فېرمېنتى، قومۇش شېكەر فېرمېنتى، ئىرىپسىن ۋە ماي فېرمېنتى، سۈت، شېكەر فېرمېنتى قاتارلىق ھەزىم قىلىغۇچى فېرمېنتلار بولۇپ، نورمال ھەزىم قىلىش ئېھتىياجىنى قامدايدۇ، ئوزۇقلۇق ماددىلار، ئامىنو كىسلاتاسى، ماي كىسلاتاسى قاتارلىقلار ئىنچىكە ئۈچەيدە شۈمۈرۈلىدۇ.

ئاشقازان ئاستى بېزى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ ئاشقازان ئاستى بېزى فانكېرىياتىن، ماي فېرمېنتى، كىراخمال فېرمېنتى قاتارلىقلارنى ئاجرىتىدۇ. لېكىن ئۈچ ئايلىقتىن كىچىك بالىلاردا كىراخمال فېرمېنتىنىڭ ئاكتىپلىقى تۆۋەنرەك بولغاچقا، كىراخمال تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى بەك بالدۇر بەرمەسلىك لازىم.

جىگەر بالىلارنىڭ جىگىرى چوڭلارغا قارىغاندا نىسبەتەن چوڭراق بولىدۇ، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقنىڭ جىگىرى بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %4 گە، چوڭلارنىڭ جىگىرى بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %2 گە تەڭ كېلىدۇ. 3~1 ياشلىق بالىلارنىڭ جىگەر تۆۋەنكى گىرۋىدىكى كىنى ئوڭ تەرەپ ئوقۇرەك سۆڭەك ئوتتۇرا سىزىقى قوۋۇرغا ئاستىدىن 2~1 سانتىمېتىر تۇتۇپ بىلگىلى بولىدۇ، 5 ياشتىن كېيىن تەدرىجىي قوۋۇرغا ئاستىدىن تۇتۇپ بىلگىلى بولىمايدۇ. بوۋاقلارنىڭ جىگىرىدە قان تومۇرلار كۆپ، جىگەر ھۈجەيرىلىرى ۋە جىگەر ياپراقچىلىرىنىڭ بۆلىنىشى تولۇق بولمايدۇ. شۇڭا يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغاندا، زەھەرلەنگەندە ياكى يۈرەك زەئىپلىشىش، ئوكسىگېن يېتىشمەسلىك قاتارلىق ئەھۋاللاردا جىگەرگە قان تولۇپ ئىششىيدۇ، جىگەردە ئۆزگىرىش بولىدۇ. بالىلار جىگىرىدىكى بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلار تەرەققىياتى ناچار، جىگەر ھۈجەيرىسىنىڭ قايتا ئۆ-

سۈش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولغاچقا، بالىلاردا جىگەر قېتىش ئاز كۆرۈلىدۇ. بالا سەككىز ياشقا كىرگەندە جىگەرنىڭ تۈزۈلۈشى چوڭلار بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

1. بالىلار چوڭ تەرەتنىڭ ئالاھىدىلىكى
بوۋاق بالىلارنىڭ چوڭ تەرەت قېتىم سانى ۋە خاراكتېرى ئاشقا-زان، ئۈچەي يوللىرىنىڭ فىزىئولوگىيەلىك ھەم پاتولوگىيەلىك ھالىتىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. شۇڭا تەرەتنىڭ شەكلى ۋە خاراكتېرىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم. نورمال چوڭ تەرەت تەركىبىدە سۇ %80، يېمەكلىكلەر قالدۇقى، ئۇنىڭدىن باشقا ئاز مىقداردا شىلىمىشقى ماددا ۋە باكتېرىيىلەر بولىدۇ.

(1) ھامىلە چوڭ تەرەتنى بوۋاق تۇغۇلۇپ 4 ~ 3 كۈن ئىچىدە قارامتۇل، يېشىغا مايىل، يېپىشقاق، پۇرمايدىغان تەرەت قىلىدۇ، بۇ ھامىلە تەرەتنى دېيىلىدۇ. بۇ تەرەت ئۈچەي ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسى، ھەزىم قىلىش سۇيۇقلۇقى، ئۆت يېشىل ماددىسى ۋە يۇتۇۋالغان باش سۈيىدىن ھاسىل بولغان بولۇپ، بۇ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە تىۋىتلىق تۈكلەر كۆرۈنىدۇ. تەخمىنەن 3 ~ 2 كۈندىن كېيىن، ئادەتتىكى بوۋاقلار تەرەتكە ئۆزگىرىدۇ. ئەگەر بالا تۇغۇلغاندىن كېيىن بۇ خىل تەرەت كەلمىسە، ھەزىم قىلىش يوللىرىنىڭ پۈتەيلىكىدىن گۇمانلانسا بولىدۇ.

(2) ئانا سۈتى بىلەن بېقىلغان بالىلارنىڭ چوڭ تەرەتنى ئالتۇن رەڭگىدەك بولۇپ، سىقىما مايسىمان كېلىدۇ، چۈچۈمەل پۇرايدۇ، كىسلاتالىق رېئاكسىيىدە بولىدۇ، ھەر كۈنى 4 ~ 2 قېتىم تەرەت قىلىدۇ، ئەگەر ھەر كۈنى 5 ~ 4 قېتىم ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك تەرەت قىلسا، بوۋاقنىڭ ئادەتتىكى ئەھۋالى ياخشى بولسا، بەدەن

ئېغىرلىقى داۋاملىق ئاشسا، روھىي كەيپىياتى، ئوزۇقلىنىشى نورمال بولسا، كېسەللىك دېگىلى بولمايدۇ، بۇ فىزىئولوگىيىلىك ئىچى سۈ-رۈش بولۇپ، قوشۇمچە يېمەكلىكلەرنى قوشقاندىن كېيىن چوڭ تەرەت قېتىم سانى ئازلايدۇ. يېشىغا توشقاندىن كېيىن ھەر كۈنى بىر قېتىم تەرەت قىلىدىغان بولىدۇ.

(3) ئانا سۈتى بىلەن بېقىلمىغان بوۋاقلار چوڭ تەرەتتى بۇ كالا، قوي سۈتى بىلەن باققان بوۋاقلار چوڭ تەرەتتىنى كۆرسىتىدۇ. كالا، قوي سۈتى تەركىبىدە ئاقسىل كۆپرەك بولغانلىقتىن، چوڭ تەرەت ئىشقارلىق ياكى نېپىترال رېئاكسىيىدە بولىدۇ، چوڭ تەرەت سۇس سېرىق رەڭلىك، سىقىما مايسىمان بولۇپ، سەل چىرىگەن سېسىق پۇرايدۇ، ھەر كۈنى 2 ~ 1 قېتىم تەرەت قىلىدۇ، تەرەتتى سەل قاتتىقراق بولىدۇ، ئەگەر سۈتكە شېكەرنى جىقراق قوشۇۋەتسە ياكى كىراخمال تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى قوشۇپ بەرسە، چىرىتكۈچى باكتېرىيىلەر كۆپىيىپ، چوڭ تەرەتنىڭ كىسلاتالىق دەرىجىسى ئاشىدۇ ھەمدە قېتىم سانى كۆپىيىدۇ، تەرەت يۇمشايدۇ.

(4) ئارىلاش ئوزۇقلاندىرۇلغان بوۋاقلار چوڭ تەرەتتى ئانا سۈتى يېتىشمەي، كالا ياكى قوي سۈتى قوشۇپ بېرىپ بېقىلغان بوۋاقلار-ئارىلاش بېقىلغان بوۋاق دېيىلىدۇ. بۇنداق بالىلار-نىڭ چوڭ تەرەتتى ئانا سۈتى بىلەن بېقىلغان بوۋاقلار چوڭ تەرەتتى بىلەن ئاساسەن ئوخشاش بولىدۇ، لېكىن رەڭگى سېرىقراق كېلىدۇ، يالغۇزلا كالا ياكى قوي سۈتى بىلەن بېقىلغان بوۋاقلار چوڭ تەرەتكە قارىغاندا، يۇمشاق بولىدۇ. ئەگەر قوشۇمچە يېمەكلىكلەر قوشۇپ بېرىلگەن بولسا، چوڭ تەرەتتى چوڭلارنىڭكىگە ئوخشىشىپ كېتىدۇ. بالىلار چوڭ تەرەتتىنىڭ پۇرىقىمۇ تەرەتتىنىڭ نورمال ياكى نورمال

ئەمەسلىكىنى پەرقلەندۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئەگەر چوڭ تەرەت چىرىگەندەك سېسىق پۇرسا، ئاقسىل ھەزىم بولۇشنىڭ ناچارلاشقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر چوڭ تەرەت قاڭسىق پۇرسا، كۆپۈكچىلەر (ماغزاپىسمان) كۆپ بولسا (شېكەرلىك ماددىلارنىڭ)، ھەزىم قىلىشنىڭ ناچارلاشقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ، ئەگەر ئېچىتىش جۈش-قۇن بولۇپ، سىرتقى كۆرۈنۈشى قايماقسىمان بولسا، ماينىڭ ھەزىم بولۇشنىڭ ناچارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بوۋاقلار چوڭ تەرەتتە سۈت مۈنەكچىلىرى، ھەزىم بولمىغان ماي، كالتىسى قاتارلىقلارنىڭ مىقدارى كۆپ بولمىسا، ئەنسىرەش ھاجەتسىز. ئەگەر كالا سۈتى بىلەن بېقىلغان بوۋاقلارنىڭ چوڭ تەرەتى يېشىل كەلسە، ئۈچەي لۆمۈلدەش ھەرىكىتى تېزلاشقانلىقىدىن ياكى ئۈچەي يوللىرى ياللۇغلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇمۇ بىر خىل ئىچى سۈرۈشنىڭ ئالامىتىدۇر. ئەگەر بالىنىڭ چوڭ تەرەتى ئاقۇش كۈل رەڭ كەلسە، ئۆت يوللىرى توسۇلۇپ قالغانلىقىنى، چوڭ تەرەت قارا كەلسە، ئاشقازان - ئۈچەي يوللىرى قانغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. مۇنداق ئەھۋاللار يەنە تۆمۈر ياسال-مىلىرنى ئىچكەندىن كېيىنمۇ كۆرۈلىدۇ. چوڭ تەرەتتە قان بولۇش كۆپىنچە مەقۇت يېرىلىش ياكى تۈز ئۈچەيدىكى مونچاق گۆشنىڭ قانىشى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. ئەگەر چوڭ تەرەتتە قان ئارىلاش يېرىك بولسا، تولغاقتىن دېرەك بېرىدۇ. چوڭ تەرەتتە قان ھەم كۆپ مىقداردا شىلىمشۇق ماددا بولسا، يەنە گەندە ئىنتايىن ئاز بولۇپ، بالا تۇرۇپ - تۇرۇپ تۇتقاقلىق يىغىلسا، ئۈچەي كىرىشىپ قالغانلىقىدىن گۇمانلىق-نىش لازىم.

2) ئۈچەيدىكى باكتېرىيىلەر

ھامىلىنىڭ ئۈچىيىدە باكتېرىيە بولمايدۇ، بالا تۇغۇلغاندىن كې-

يىن باكتېرىيىلەر ئېغىز، مەقەت، ھاۋا، ئاننىڭ ئەمچەك تۈگمىسى ئارقىلىق ئۈچەيگە كىرىدۇ، ئانا سۈتى بىلەن بېقىلغان بوۋاقلار چوڭ تەرتىدە سۈت كىسلاتا تاياقچە باكتېرىيىسى بولىدۇ، ئانا سۈتى بىلەن بېقىلمىغان بوۋاقلار چوڭ تەرتىدە ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ، ئاشقازاندا باكتېرىيە بولمايدۇ، 12 بارماق ئۈچەي بىلەن ئىنچىكە ئۈچەي يۇقىرى بۆلۈكىدە باكتېرىيە ناھايىتى ئاز، تۆۋەنكى بۆلۈكىدە تەدرىجىي كۆپىيىدۇ، چوڭ ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەيدە باكتېرىيىلەر ناھايىتى كۆپ بولىدۇ. ئۈچەي يوللىرىدىكى باكتېرىيىلەر ئۆز ئارا بىر - بىرىنى چەكلەيدۇ، ئەگەر مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئۇلارنىڭ نىسبىتى بۇزۇلسا، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى مەلۇم بىر خىلى نىسبىتى ھالدا كۆپىيىپ كېتىپ، ئىچى سۈرۈشنى پەيدا قىلىدۇ. بالىلار كېسەل بولغاندا ئانتىبىيوتىك دورىلارنى قالايمىقان ئىشلەتسە ياكى ئىشلىتىش ۋاقتى ئۇزۇن بولسا، ئۈچەي يوللىرىدىكى نورمال باكتېرىيىلەرنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ، باكتېرىيە توپى قالايمىقانلىشىش - نى پەيدا قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن تەكرار يۇقۇملنىش كېلىپ چىقىدۇ ھەمدە ئىچى سۈرىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا تەتقىقاتلار ئۆرگانىزىمغا كىرگەن باكتېرىيە سانى ئىچى سۈرۈش بىلەن يېقىن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى. باكتېرىيە ئاشقازان - ئۈچەي يوللىرىغا كىرگەندىن كېيىن، ئاشقازان كىسلاتاسى بىر قىسىم باكتېرىيىلەرنى يوقىتىدۇ. بالىلارنىڭ ئاشقازان - ئۈچەي يوللىرىدا ئىممۇنىتلىق ئاكتىپلىقى بار ھۈجەيرىلەر بولۇپ، بۇلار بىر قىسىم باكتېرىيە ۋە ۋىرۇسلارنى يوقىتىدۇ. يېمەكلىك ئاشقازانغا كىرگەندىن كېيىن ئۈچەيگە بارىدۇ، ئۈچەينىڭ لۆمۈلدەش ھەرىكىتى مۇھىم مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارىغا ئىگە، ئىنچىكە ئۈچەي يۇقىرى بۆلۈكىنىڭ لۆمۈلدەش ھەرىكىتى تېزراق

بولۇپ، يېمەكلىك ۋە باكتېرىيىنى ئىنچىكە ئۈچەي تۆۋەن تەرىپىگە ئۈزلۈكسىز ئىتتىرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن باكتېرىيە چوڭ تەرەت بىلەن سىرتقا چىقىرىلىپ كېتىدۇ، بۇ، ئۈچەينىڭ مۇھىم بىر تەبىئىي مۇداپىئە ئىشلىرىنى ئىقتىدارىدۇر.

2. بالىلار بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ ئالاھىدىلىكى

بەدەن سۇيۇقلۇقى ئادەم بەدىنىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى، ئۇنىڭ سانى، تارقىلىشى ۋە ئېلېكترولىتلار تەركىبى نىسبىي تۇراقلىق بولۇپ، ھاياتلىقنى قامداشتىكى مۇھىم شەرتتۇر. بەدەندىكى سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار نىسبىي مۇقىملىقنى ساقلاپ تۇرىدۇ. سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقى ئېرۋا سىستېمىسى ۋە ئىچكى ئاجراتما بەزلەرنىڭ تەڭشىشى، ھۈجەيرە بىلەن مۇھىت ئوتتۇرىسىدىكى ماددا ئالماشتىشىنى ئىبارەت بىر قاتار بىئوخىمىيەلىك تەسىرلەر ئارقىلىق ئورۇنلىنىدۇ، ھەر قانداق كېسەللىك، زەخىملىنىش ۋە تاشقى مۇھىتتىكى جىددىي ئۆزگىرىشلەرنىڭ ھەممىسى بۇ خىل نىسبىي مۇقىملىقنى قالايمىقانلاشتۇرىدۇ، نەتىجىدە بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تارقىلىشى، تەركىبىي ۋە مىقدارىدا ئۆزگىرىش پەيدا قىلىنىدۇ. بالىلارنىڭ بەدەن يۈزى كۆلىمى نىسبىي ھالدا چوڭراق، بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ ئالماشتىشى نىسبەتەن جۇشقۇن، بەدەن تولۇق تەرەققىي قىلىپ يېتىلمىگەن، بۆرەك، نەپەسلىنىش ۋە بوفېرلاش سىستېمىسى خىزمىتى ئاجىزراق بولغاچقا، ئاسانلا كېسەللىك ۋە تاشقى مۇھىتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. ھەمدە سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىش ئوڭاي پەيدا بولىدۇ، ئەگەر ئۆز ۋاقتىدا تۈزەتمىسە، ھاياتىغا خەۋپ يېتىدۇ.

نورمال ئەھۋالدا بەدەن سۇيۇقلۇقى ئىچكەن سۇ ۋە يېمەكلىكتىن

تولۇقلىنىپ ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرىدا شۇمۇرۇلۇپ قانغا كىرىدۇ، شۇ ئارقىلىق پۈتۈن بەدەننىڭ فىزىئولوگىيىلىك ماددا ئالماشتۇرۇش ئېھتىياجىنى تەمىنلەيدۇ، بىر قىسىم سۇيۇقلۇق يېمەكلىكلەرنىڭ ئوكسىدلىنىشىدىن ھاسىل بولىدۇ، ئارىلاش يېمەكلىكلەر ھەر 100 كالىرىيە ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسى چىقارغاندا، 12 گرام سۇ ھاسىل بولىدۇ. بەدەن سۇيۇقلۇقى بۆرەك، چوڭ ئۈچەي، ئۆپكە، تېرە ئارقىلىق دائىم سىرتقا چىقىرىلىپ تۇرىدۇ. بەدەنگە كىرگەن ئومۇمىي سۇيۇقلۇقنىڭ %50 ~ 40 ى بۆرەكتىن ئۆتۈپ، سۈيىدۈك يولى ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىلىدۇ، %10 ~ 3 ى چوڭ تەرەتتىن، %50 ~ 40 ى ئۆپكە ھەم تېرىنىڭ پارغا ئايلىنىدىغان سۈيىدىن چىقىرىلىدۇ. بەدەننىڭ ئۆسۈش ئېھتىياجى ئۈچۈن قالدۇرۇلىدىغان سۇيۇقلۇق بەدەنگە كىرگەن ئومۇمىي سۇيۇقلۇقنىڭ %10 ~ 3 ىنى تەشكىل قىلىدۇ. بۇ تۆت خىل چىقىرىش يوللىرى ئىچىدە بۆرەك بەدەن سۇيۇقلۇقى مىقدارى ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ.

(1) بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تارقىلىشى

بەدەن سۇيۇقلۇقى ھۈجەيرە ئىچى بىلەن ھۈجەيرە سىرتىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ، شۇڭا ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى ۋە ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى دەپ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنىدۇ.

ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تەخمىنەن $\frac{2}{3}$ قىسمىنى ئىگىلەپ، بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %40 ىنى تەشكىل قىلىدۇ، شۇنداقلا ھەر قايسى ياشتىكىلەرنىڭ ئۆز ئارا پەرقى چوڭ بولمايدۇ. ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىنىڭ بەدەندە تۇتقان مىقدارى چوڭ ۋە نىسبەتەن مۇقىم بولىدۇ.

1- جەدۋەل. ئوخشاشمىغان ياشتىكى بالىلار بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تارقىلىشى (بەدەن ئېغىرلىقىدا ئىگىلىگەن مىقدارى %)

يېشى	يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار	بىر ياشلىق	2-14 ياش	چوڭلار
بەدەن سۇيۇقلۇقى	80	70	65	55-60
بەدەن سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي مىقدارى	35	40	40	40-45
ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي مىقدارى	45	30	25	15-20
ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي مىقدارى	40	25	20	10-15
ئارىلىق ماددا سۇيۇقلۇقى	5	5	5	5
قان پلازمىسى				

ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى، قان پلازمىسى بىلەن توقۇلما ئارىلىق سۇيۇقلۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى بەدەن سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي مىقدارىنىڭ $1/3$ قىسمىنى ئىگىلەيدۇ، يېشى قانچىكى كىچىك بولسا، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى نىسبىي ھالدا شۇنچە كۆپ بولىدۇ، ھەمدە ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى مىقدارى بىلەن ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى مىقدارى شۇنچە يېقىنلاشىدۇ. بالىلاردا ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئىچىدە ئاساسلىقى تو-قۇلما ئارىلىق سۇيۇقلۇقىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى چوڭراق بولۇپ، بۇ بالىلار بەدەن سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي مىقدارىنىڭ كۆپ بولۇشىدىكى مۇھىم سەۋەب، توقۇلما ئارىلىق سۇيۇقلۇقى ئاي-كۈنى توشۇپ تۇغۇلغان بوۋاقلاردا تەخمىنەن %40 نى، 14 ~ 1 ياشقىچە بولغان بالىلاردا %30 ~ 25 نى ئىگىلەيدۇ. قان پلازمىسى سۇيۇقلۇقى

مقدارى مۇقىم بولۇپ، بۇ تەخمىنەن بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ 5% نى تەشكىل قىلىپ، نورمال قان ئايلىنىشىنى داۋاملاشتۇرىدۇ. بەدەن سۇيۇقلۇقى ئايرىلىپ تۇرىدۇ ۋە ئۆز ئارا باغلىنىشلىق بولىدۇ. ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى بىلەن توقۇلما ئارىلىق ماددا سۇيۇقلۇقىنى ھۈجەيرە پەردىسى ئايرىپ تۇرىدۇ. ئۇ يېرىم سۈزۈك پەردە بولۇپ، سۇ ۋە ھۈجەيرە پەردىسىدىن ئۆتەلەيدىغان بارلىق ماددىلار بۇ ئىككى سۇيۇقلۇق ئىچىدە ئالمىشىدۇ، توقۇلما ئارىلىق سۇيۇقلۇقى بىلەن قان پلازىمىسىنىڭ ئوتتۇرىسىنى قىل قان تومۇر دىۋارى ئايرىپ تۇرىدۇ، ئۇ سېزىمچانلىقى ناھايىتى كۈچلۈك نېپىز پەردە بولۇپ، سۇ ۋە قىل قان تومۇر دىۋارىدىن ئۆتەلەيدىغان بارلىق ماددىلار بۇ ئارىلىقتا ئالمىشىدۇ. ئادەم بەدىنىدىكى ھۈجەيرىلەر بىلەن سىرتقى مۇھىت ئوتتۇرىسىدىكى ماددىلارنىڭ ئالمىشىشىنى ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى تاماملايدۇ. بەدەنگە كىرگەن ھەر خىل ئوزۇقلۇق ماددىلار ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئارقىلىق ھۈجەيرىگە كىرىدۇ، ھۈجەيرىنىڭ ماددا ئالمىشىش مەھسۇلاتلىرىمۇ ئالدى بىلەن ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىغا كىرىپ ئاندىن سىرتقا چىقىرىلىدۇ، شۇڭلاشقا ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئورگانىزمنىڭ ئىچكى مۇھىتى دەپ ئاتىلىدۇ.

دېمەك، بەدەن سۇيۇقلۇقى بەدەندىكى ئۈچ چوڭ ئورۇن يەنى قان پلازىمىسى، ھۈجەيرە ئارىلىق ماددىسى، ھۈجەيرە ئىچىدىن ئىبارەت ئۈچ رايوندا مەۋجۇت بولىدۇ، گەرچە بۇ ئۈچ رايوندىكى سۇيۇقلۇق ئۆز ئارا ئايرىلىپ تۇرىسىمۇ، لېكىن ئۇلار ئوتتۇرىسىدا توختىماستىن ئالمىشىش بولۇپ تۇرىدۇ. ئالمىشىش جەريانىدا ھەرىكەت تەڭپۇڭلۇقىغا يېتىدۇ.

(2) بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تەركىبى

بەدەن سۇيۇقلۇقى تەركىبىدە قان، لىمفا سۇيۇقلۇقى، سۇ، توقۇلما سۇيۇقلۇقى قاتارلىقلاردىن سىرت يەنە ئېلېكترولىتلارمۇ بولىدۇ. بالىلارنىڭ بەدەن سۇيۇقلۇقىدىكى ئېلېكترولىتلارنىڭ تەركىبىي چوڭلارنىڭكى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. بالا تۇغۇلۇپ بىر نەچچە كۈن ئىچىدە قاندىكى ناترىي ئىئونى چوڭلارنىڭكى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ، لېكىن كالىي ئىئونى ۋە خلور ئىئونى سەل يۇقىرى، كاربونىك كىسلاتا سەل تۆۋەن، سۈت كىسلاتا قالدۇقى يۇقىرىراق بولىدۇ. نورمال ئەھۋالدا ھۈجەيرە ئىچى ۋە ھۈجەيرە سىرتىدىكى ئېلېكترولىتلار كۈن-سېنتراتسىيىسى مەلۇم دائىرە ئىچىدە ساقلىنىدۇ. ئېلېكترولىتلار مۇسبەت، مەنپىي ئىئونلارغا بۆلىنىدۇ. نورمال ئەھۋالدا قان زەردابىدىكى مۇسبەت، مەنپىي ئىئونلار ئومۇمىي مىقدارى ئورتاق خىمىيىۋىي بىر-لىك مىللى ئېكۋىۋالېنتلىرى (mEq/L) بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ھازىر mmol/L بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

(1) ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى ئېلېكترولىتلار

ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدا توقۇلما ئارىلىق ماددا سۇيۇقلۇقى بىلەن قان پلازىمىسى بار، قان پلازىمىسى تەركىبىدىكى ئاقسىل زور دەرىجىدە يۇقىرى بولغاندىن سىرت، ھەر خىل ئېلېكترولىتلار مىقداردىنمۇ سەل پەرق بولىدۇ.

ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى تەركىبىدىكى مۇھىم مۇسبەت ئېلېكترولىتلار ناترىي، كالىي، كالتسىي، ماگنېي ئىئونى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. بۇنىڭ ئىچىدە ناترىي ئىئونىنىڭ مىقدارى ئەڭ يۇقىرى بولۇپ، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 142mEq/L ، كالىي، كالتسىي، ماگنېي ئىئونلىرىنىڭ مىقدارى نىسبەتەن تۆۋەن بولىدۇ، بۇنىڭدىن ناترىي ئىئونىنىڭ ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. كالىي، ماگنېي، كالتسىي ئىئونى

قاتارلىقلارنىڭ مىقدارى ئاز، تۆمۈر، سىنىك، مىس ئىئونى قاتارلىقلار. نىڭ مىقدارى تېخىمۇ ئاز بولىدۇ. بۇ مۇسبەت ئېلېكترولىتلار مىقدارى گەرچە ناھايىتى ئاز بولسىمۇ، لېكىن ھەر قايسىسىنىڭ مۇھىم فىزىئولوگىيىلىك ئىقتىدارى بار، زىيادە كۆپ بولسا ياكى ئازلاپ كەتسە، ئادەم بەدىنىنىڭ مەلۇم تەرەپتىكى نورمال ئىقتىدارىغا تەسىر يېتىدۇ. ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى تەركىبىدىكى ئېلېكترولىتلار سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاشتا، ناترىي تولۇقلاشقا ئالاھىدە دىققەت قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا كالىي، كالتسىي، ماگنىي قاتارلىقلارنى تولۇقلاشمۇ ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم. كالىي، كالتسىي، ماگنىي قاتارلىق مىقدارى ئاز ئىئونلارنى تولۇقلىغاندا، ئۇلارنىڭ مىقدارى، سۈرئىتى ۋە ئۇسۇلىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك.

ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى مۇھىم مەنپىي ئىئونلاردىن خلورىئىئونى، ھىدروكاربونات، ھەر خىل ئورگانىك كىسلاتا، فوسفات كىسلاتا تۈزى، سۇلفات كىسلاتا تۈزى قاتارلىقلار بار. ئاقسىلمۇ بەزىبىر مەنپىي ئىئونلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدا مىقدارى كۆپرەك بولغان مەنپىي ئىئونلار خلور بىلەن ھىدروكاربونات ئىئونى بولۇپ، ئۇنىڭ مىقدارى ئايرىم - ئايرىم 103 mEq/L بىلەن 27 mEq/L بولىدۇ.

قان پلازىمىسى بىلەن ھۈجەيرە ئارىلىق ماددا سۇيۇقلۇقى ئوتتۇرىسىدىكى مۇھىم پەرق، قان پلازىمىسى تەركىبىدە ئاقسىلنىڭ كۆپلۈپ كىدىن ئىبارەت بولۇپ، قان پلازىمىسىنىڭ ھەر 100 مىللىلىتىرىدا 6 گرام ئاقسىل بار. ھۈجەيرە ئارىلىق ماددا سۇيۇقلۇقىنىڭ ھەر 100 مىللىلىتىرىدا $0.05\% \sim 0.35\%$ گرام ئاقسىل بار، ئۇلار تەركىبىدىكى

ئېلېكترولىتلار مىقدارى ئاساسەن ئۆز ئارا يېقىنلىشىدۇ. قان پلازىمىسىنىڭ ئوسموس بېسىمى قان پلازىمىسىدىكى مۇسبەت، مەنپىي ئىئونلار مىللىگرام مولېكۇلاسىنىڭ يىغىندىسى بولۇپ، مەلۇم دائىرە ئىچىدە ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. نورمال قان پلازما ئوسموس بېسىمى ئا- دەستە 290 ~ 320 mOsm/L (مىللى ئوسموس مولېكۇلا/لىتر) دائىرىدە داۋالغۇپ تۇرىدۇ.

2- جەدۋەل. نورمال قان پلازىمىسىدىكى ئېلېكترولىتلار

مۇسبەت ئىئون	mEq/L	مەنپىي ئىئون	mEq/L
Na ⁺	142	HCO ₃ ⁻	27
K ⁺	5	Cl ⁻	103
Ca ⁺⁺	5	HPO ₄ ⁼	2
Mg ⁺⁺	2	SO ₄ ⁼	1
		ئورگانىك كىسلاتا	5
		ئاقسىل	16
جەمئىي	154	جەمئىي	154

(2) ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىكى ئېلېكترولىتلار

ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئىگىلەيدۇ. ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىكى ئېلېكترولىتلار تەركىبىي ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى بىلەن ئوخشاشمايدۇ. ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى تەركىبىدىكى مۇھىم مۇسبەت ئېلېكترولىت كالىي ئىئونى 150 mEq/L، ماگنىي ئىئونى 30 mEq/L، ناترىي ئىئونى 35 ~ 10 mEq/L (ئوتتۇرىچە 20 mEq/L) بولۇپ، ئاساسلىقى

كالى ئىئونىدىن ئىبارەت.

ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىكى ئاساسلىق مەنپىي ئىئون فوسفات كىسلاتا تۈزى (HPO_4^-) 140 mEq/L، ئاقسىل تەمىنلىگەن مەنپىي ئىئونلار 40 mEq/L بولىدۇ. ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى ئىچىدە ئىككى ۋالىنتلىق مۇسبەت، مەنپىي ئىئونلار، شۇنداقلا ئاقسىل-مۇ كۆپرەك بولىدۇ، بىراق ھۈجەيرە ئىچى ۋە ھۈجەيرە سىرتىدىكى سۇيۇقلۇقلارنىڭ ئوسموس بېسىمى تەڭپۇڭ بولىدۇ.

3- جەدۋەل. ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىكى ئېلېكترولىتلار

مقدارى

مۇسبەت ئىئون	mEq/L	مەنپىي ئىئون	mEq/L
K^+	150	HPO_4^-	140
Mg^{++}	30	SO_4^-	10
Na^+	20	HCO_3^-	10
		ئاقسىل	40
جەمئىي	200	جەمئىي	200

3) بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تەڭشلىشى

بالىلار بەدەنىدىكى سۇ، ئېلېكترولىتلار، كىسلاتا، ئىشقارلارنىڭ نورمال تەڭپۇڭلۇقى ئورگانىزم ئىچكى مۇھىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلايدۇ. بالىلار ئۆسۈپ تەرەققىي قىلىش باسقۇچىدا تۇرغانلىقتىن، بەدەن سۇيۇقلۇقىنى تەڭشەش ئورگانلىرى تولۇق تەرەققىي قىلىپ يېتىلىمگەن، تەڭشەش خىزمىتى ناچار، شۇڭا ئاسانلا بەدەندىكى سۇ، ئېلېكترولىت، كىسلاتا-ئىشقار تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش كېلىپ چىقىدۇ.

بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تەڭشىلىشى ۋە نېرۋا تەڭشەشلىرىنىڭ ھەممىسى ئۆزلۈكىدىن يېڭىلىنىشنى ئاساس قىلدۇ، ئىچكى مۇھىت تۇراقلىقىنى مەركەز قىلىپ، بەدەن سۇيۇقلۇقى تەركىبىدىكى ھەر قايسىسىنىڭ فۇنكسىيەلىك ئالاھىدىلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئورگانىزمنىڭ مۇكەممەل بىرلىكىنى ساقلايدۇ ۋە سىرتقى مۇھىتقا ماسلىشىدۇ، يىراق بوۋاق بالىلاردا بۇ خىل سىستېما تولۇق تەرەققىي قىلمىغان بولىدۇ. شۇڭا بەدەن سۇيۇقلۇقى سىستېمىسى ئازراق تەسىرگە ئۇچرىسا، بالىلاردا ئىچى سۈرۈش، سۈزىلىش كېلىپ چىقىدۇ.

(4) ئوسموس بېسىمىنىڭ تەڭپۇڭلۇقى

ئوسموس بېسىمى ئاددىيلاشتۇرۇپ كۆپۈش كۈچى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ھەر قانداق ئېرىتمىنىڭ مەلۇم ئوسموس بېسىمى بولىدۇ. ئوسموس بېسىم بىر خىل فىزىكىلىق ھادىسە بولۇپ، ئۇنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى ئېرىتمە تەركىبىدىكى ئېرىگۈچى ماددىنىڭ ئاز - كۆپلۈكى بەلگىلەيدۇ، ئېرىتمە ئىچىدىكى ئېلېكترولىتلار كونسېنتراتسىيەسى قانچىكى يۇقىرى بولسا، ئوسموس بېسىمى شۇنچە چوڭ بولىدۇ، ئوسموس بېسىمىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى ئېرىتمە ئىچىدىكى ئېلېكترولىت كونسېنتراتسىيەسى بىلەن توغرا تاناسىپ بولغانلىقتىن، ئوسموس بېسىمىنى ئېلېكترولىت كونسېنتراتسىيەسىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكى بويىچە ئىپادىلەشكە بولىدۇ. كلىنىكىدا ئوسموس بېسىم بىرلىكى $mOsm/L$ (مىللى ئوسموس مولېكۇلا/لىتىر) بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئېرىگۈچى ماددىلارنىڭ بەزىسى سۇدا پارچىلىنىدۇ، بەزىسى پارچىلانمايدۇ، پارچىلىنىدىغان ئېرىگۈچى ماددىلار ئىچىدە بەزىسى بىر مولېكۇلا پارچىلىنىپ ئىككى ئىئون بولىدۇ. مەسىلەن: ناترىي خلورىد ($NaCl$)، بەزىسى بىر مولېكۇلا پارچىلىنىپ ئۈچ ئىئون بولىدۇ.

مەسلەن: كالتسىي خلور (CaCl)، ئوسموس بېسىمىنى ئېرتىمە ئىچىدىكى ئېلېكترولىت دانىچىلىرىنىڭ ئاز - كۆپلۈكى بەلگىلەيدۇ، لېكىن ئېرتىمە ئىچىدىكى دانىچىلارنىڭ خوسۇسىيىتى بەلگىلەيدۇ. ئېلېكترولىتلار پارچىلانغاندىن كېيىنكى ئىئونلار مەسلەن: Na^+ ، Cl^- ، Ca^{++} ، HCO_3^- قاتارلىقلارنىڭ پارچىلانمايدىغان غەيرىي ئېلېكترولىت ئاتومىنىڭ (گلۇكوزا) خاراكتېرى ئوخشاش بولمايدۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ ئېرتىمە ئىچىدىكى ھەر بىر دانىچىسىنىڭ ئوينىيدىغان ئوسموس ئۈنۈمى ئوخشاش بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن «مىللى ئوسموس مولېكۇلا» دېگەن بۇ ئىسىم ھەر خىل مۇسبەت، مەنپىي ئىئونلار بىلەن پارچىلانمايدىغان مىللىگرام مولېكۇلا «دانىچىسى» چۈشەنچىسىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. ئېلېكترولىتلىق ئېرتىمنىڭ ئوسموس بېسىمى مۇسبەت، مەنپىي ئىككى خىل ئىئون كونسېنتراتسىيەسىنىڭ يىغىندىسىگە باراۋەر بولىدۇ. قان پلازىمىسىدىكى ئېلېكترولىتلار تەركىبىگە ئاساسلىنىپ، قان پلازىمىسىنىڭ ئومۇمىي ئوسموس بېسىمىنى ھېسابلاپ چىققىلى بولىدۇ. قان پلازما ئومۇمىي ئوسموس بېسىمى نورمال دائىرىسى $280 \sim 320 \text{ mOsm/L}$ بولىدۇ، مۇشۇ دائىرە ئىچىدىكىلەر تەڭ ئوسموسلۇق دېيىلىدۇ، بۇ دائىرىدىن تۆۋەن بولسا، تۆۋەن ئوسموسلۇق دېيىلىدۇ، بۇ دائىرىدىن يۇقىرى بولسا، يۇقىرى ئوسموسلۇق دېيىلىدۇ. بەدەن سۇيۇقلۇقى ئىچىدە ئوسموس رولىنى ئوينىغۇچى ئېرتىمە ئاساسلىقى ئېلېكترولىتلاردۇر.

ئاترىي ئىئونىنىڭ كونسېنتراتسىيەسى ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقى-لۇقى ئوسموس بېسىمىنى بەلگىلەيدىغان مۇھىم ئامىل، چۈنكى ئاترىي ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى مۇسبەت ئىئون ئومۇمىي مىقداردىننىڭ %90 نى تەشكىل قىلىدۇ. كلىنىكىدا قان پلازىمىسىدىكى ئاترىي-

نىڭ مىقدارىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ كۆپۈش كۈچىنى مۆلچەرلەيدۇ.

ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى ئېلېكترولىتلار ناترىي بىلەن خلورىن ئاساس قىلىدۇ، ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى كالىي بىلەن فوسفات كىسلاتاسىنى ئاساس قىلىدۇ، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدا ناترىي كەمچىل بولسا، ئوسموس بېسىم (كۆپۈش كۈچى) تۆۋەن بولۇپلا قالماستىن، بەلكى مەلۇم سىغىمچانلىقنىمۇ ساقلىيالايدۇ. كالىي ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىكى مۇھىم تەركىب، شۇنداقلا ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى ئوسموس بېسىمىنى ساقلىغۇچى مۇھىم ئېلېكترولىت. ھەر كۈنلۈك بەدەنگە كىرگەن يېمەكلىك ۋە سۇدىكى ئېلېكترولىت مىقدارىدىكى ئۆزگىرىش ناھايىتى چوڭ پەرقلىق بولغاچقا، ئىچى سۈرۈش ياكى قۇسۇشتىن يوقىتىش بىردەك بولمايدۇ. شۇڭا ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئوسموس بېسىمى ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ئادەم بەدنىنى ئاساسەن بۆرەكنىڭ قويۇقلاشتۇرۇش ۋە سۈيۈلدۈرۈش ئىقتىدارىغا يۆلەنىپ سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار مۇقىملىقىنى ساقلايدۇ، بۆرەك بەدەننىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسلىنىپ سۇ ياكى ئېلېكترولىتلارنى سىرتقا چىقىرىدۇ ياكى ساقلاپ قالىدۇ. بۇنىڭدىن بۆرەكنىڭ سۇ، ئېلېكترولىت تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاشتا ۋە كىسلاتا - ئىشقارنى تەڭشەش جەھەتتە مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا نېرۋا، ئىچكى ئاجراتمىنىڭ تەڭشەش سۇ ۋە ئېلېكترولىت لار تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاشتا مۇھىم تەسىر كۆرسىتىدۇ. سۇ ۋە ئېلېكترولىت قالايمىقانلىشىش ئالدى بىلەن ھۈجەيرە سىرتى رايونىدا پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن: ئىچى سۈرۈش، قۇسۇش، گىلۇكوزا ياكى فىزىئولوگىيىلىك ئاش تۇزىنى زىيادە كۆپ كىرگۈزۈش قاتارلىقلار ئالدى بىلەن

ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىنىڭ ئوسموس بېسىمى ياكى سىغىمچانلىق-
 قىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ، بۇ قان پلازىمىدىكى ناترىيىنىڭ قىممىتىدىكى
 ئۆزگىرىش ۋە قان ئايلىنىش مىقدارىدىكى ئۆزگىرىش بىلەن ئىپادىلە-
 نىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىنلا ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى كۆپۈش كۈچى
 ۋە سىغىمچانلىقىدا ئۆزگىرىش بولىدۇ. بىز مەلۇم بىر ئېرىتمىنىڭ
 كۆپۈش كۈچىنى مۆلچەرلىمەكچى بولساق، ئۇنىڭ ئوسموس بېسىمى-
 نى قان پلازما ئوسموس بېسىمى نورمال قىممىتى بىلەن سېلىشتۇرۇش-
 مىز لازىم. ئەگەر ئۇنىڭ قىممىتى $320 \text{ mOsm/L} \sim 280$ ئوتتۇرى-
 سىدا بولسا، تەڭ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە، 280 mOsm/L دىن تۆۋەن
 بولسا، تۆۋەن كۆپۈش كۈچىگە ئىگە، 320 mOsm/L دىن يۇقىرى
 بولسا، يۇقىرى كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق دېيىلىدۇ. بىز
 يۇقىرى - تۆۋەن كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇقنى مۆلچەرلىگەندە،
 قان پلازىمىسىنىڭ ئوتتۇرىچە ئوسموس بېسىمى 300 mOsm/L
 بويىچە ھېسابلىساق، بۇ سۇيۇقلۇق قانچە كۆپۈش كۈچىگە ئىگە
 ئىكەنلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ. مەسىلەن: مەلۇم بىر ئېرىتمىنىڭ ئوس-
 موس بېسىمى 200 mOsm/L بولسا، $2/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە
 بولىدۇ، 100 mOsm/L بولسا، $1/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە بولىدۇ،
 600 mOsm/L بولسا، قوش كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق
 بولىدۇ. كلىنىكىدا قان پلازىمىسىدىكى ناترىي ئىئونىنىڭ ئوسموس
 بېسىمى (كۆپۈش كۈچى) ئومۇمىي ئوسموس بېسىمىنىڭ يېرىمىنى
 ئىگىلىگەنلىكىدىن پايدىلىنىپ، كۆپۈش كۈچى ھېسابلىنىدۇ. نورمال
 ئەھۋالدا قان پلازىمىسىدىكى ناترىي ئىئونى $150 \sim 130 \text{ mEq/L}$
 $(145 \sim 135 \text{ mmol/L})$ بولسا، تەڭ ئوسموسلۇق بولىدۇ، قاندىكى
 ناترىي ئىئونى 130 mEq/L (135 mmol/L) دىن تۆۋەن بولسا،

تۆۋەن ئوسموسلۇق بولىدۇ، قاندىكى ناترىي ئىئونى 150 mEq/L (150 mmol/L) دىن يۇقىرى بولسا، يۇقىرى ئوسموسلۇق بولىدۇ. قاندىكى ناترىي ئىئونىنىڭ مىقدارى بويىچە ئوسموس بېسىم (كۆپۈش كۈچى) بەلگىلەش كلىنىكىدا دائىم ئىشلىتىلىدۇ.

5) بەدەن سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ ھاياتلىقتىكى رولى
سۇ ئىنسان ئۈچۈن كەم بولسا بولمايدىغان ماددا بولۇپ، ھاۋادىن قالسا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ، بالىلىق دەۋرىدە بەدەندىكى سۇ چوڭلارغا قارىغاندا نىسبىي ھالدا كۆپ بولۇپ، ئادەم بەدىنىنى قۇرغۇچى ھەر خىل سۇيۇقلۇق، ئۈچەي سۇيۇقلۇقى، ئۆت سۇيۇقلۇقى، قى، ئاشقازان ئاستى بېزى سۇيۇقلۇقى قاتارلىق ھەزىم قىلىش سۇيۇقلىقىلىرىنىڭ شەكىللىنىشى ئۈچۈن سۇ لازىم بولىدۇ. يېمەكلىكنى ھەزىم قىلىش جەريانىدا سۇ ئېرىتكۈچى سۈپىتىدە مەۋجۇت بولىدۇ. يېمەكلىكنىڭ شۈمۈرۈلۈشى ئۈچۈنمۇ سۇ لازىم بولىدۇ. سۇنىڭ ئادەم بەدىنى ئۈچۈن ئوزۇقلۇق رولى يوق، لېكىن سۇدىن ئايرىلسا ئوزۇقلۇق ماددىلار ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالمىدۇ. كېرەكسىز ماددىلارنى سىرتقا چىقىرىش ئۈچۈنمۇ سۇ لازىم بولىدۇ، سۇ كەمچىل بولسا، ئادەم بەدىنىدە ماددا ئالمىشىشتىن ھاسىل بولغان مەھسۇلاتلار يىغىلىپ قېلىپ، «زەھەرلىنىش» ئالامەتلىرى كېلىپ چىقىشى، ھەتتا ھاياتىغا خەۋپ يېتىشى مۇمكىن. سۇنىڭ ھاياتلىقتىكى رولىنى تۆۋەندىكىچە چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ.

① سۇ پۈتۈن بەدەندىكى توقۇلمىلارنىڭ تەركىبىي قىسمى؛ ② بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەيدۇ؛ ③ بەدەندىكى ھەر قايسى ئورگانلارنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشىنى، خىمىيىلىك رېئاكسىيىسىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ؛ ④ ھەر خىل ماددىلارنىڭ شۈمۈرۈلۈشى ۋە ھەر قايسى

ئورگانلارغا يەتكۈزۈش، چىقىرىلىشىغا قاتنىشىدۇ؛ ⑤ نورمال ئوسموس بېسىمىنى ساقلاشقا ياردەملىشىدۇ؛ ⑥ بەدەندىكى نۇرغۇن ماددىلارنىڭ ئېرىتكۈچىسى ناترىي، كالىي، كالتسىي، ماگنېي، سىنىك قاتارلىق ئانىئورگانىك تۇزلار، فېرمېنت، ھورمون قاتارلىق بىئولوگىيىلىك ئاك-تىپ ماددىلار سۇغا مۇھتاج، ئۇلار سۇدا ئېرىپ ئۆزىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ؛ ⑦ ھەر قايسى ئورگانلار خىزمىتىنى ساقلايدۇ، يەنە ئىچكى ئەزالاردىكى بوشلۇق، سىرتقى دىۋارى، كۆز قارىچۇقى، تارمۇش، بوغۇم، يۈرەك، ئۆپكە قاتارلىق ئورگانلار ھەرىكىتىدە ئاز مىقداردىكى سۇ سىلىقلاش رولىنى ئوينايدۇ. سۇ بولمىسا بەدەندىكى ھەر قايسى ئورگانلار نورمال خىزمىتىنى يۈرگۈزەلمەيدۇ. ئادەم بەدەندىكى ھەر خىل توقۇلما تەركىبىدىكى سۇنىڭ مىقدارى ئوخشاش بولمايدۇ، مەسىلەن: مۇسكۇل توقۇلمىسى تەركىبىدىكى سۇ $80\% \sim 75\%$ ، سۆ-گەك توقۇلمىسى تەركىبىدىكى سۇ مىقدارى $25\% \sim 20\%$ ، ماي توقۇل-مىسى تەركىبىدىكى سۇ مىقدارى تېخىمۇ ئاز بولۇپ $15\% \sim 10\%$ بولىدۇ. دېمەك، سۇ بولمىسا ھاياتلىق بولمايدۇ، ھاياتلىق دېمەكلىك سۇ دېمەكلىكتۇر. سۇنىڭ ئېھتىياجلىق مىقدارىنى بەدەندىكى ماددا ئالمىشىش ۋە ئېھتىياجلىق بولغان ئېنېرگىيە مىقدارى بەلگىلەيدۇ. بوۋاقلاردا ماددا ئالمىشىش جۇشقۇن، ئېنېرگىيىگە بولغان ئېھتىياج كۆپرەك، بۆرەكنىڭ قوبۇقلاشتۇرۇش ئىقتىدارى ناچارراق بولغاچقا ئېھتىياجلىق سۇ نىسبىي ھالدا يۇقىرراق بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا بالىلارنىڭ ھەرىكەت مىقدارى، ھاۋا كىلىماتى، يېمەكلىكنىڭ خاراكتې-رى، سۇنىڭ ئېھتىياجلىق مىقدارىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. بوۋاقلارنىڭ ھەر كۈنى قوبۇل قىلغان سۇ مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 60 مىللىلىتىردىن ئاز بولسا، سۇسىزلىنىش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ،

نورمال ئېھتىياجلىق مىقداردىن كۆپ ئىستېمال قىلسا پايدىسىمۇ يوق، سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىپ كېتىدۇ. يېشى قانچە كىچىك بولسا، بەدەن-دىكى سۇ مىقدارى شۇنچە كۆپ بولىدۇ، قانچە سېمىز بولسا، بەدەن-دىكى سۇ مىقدارى شۇنچە ئاز بولىدۇ، ئوزۇقلىنىش ناچارلىق كېسىل-كە گىرىپتار بولغان بالىلارنىڭ بەدىنىدىكى سۇ مىقدارى كۆپرەك بولىدۇ.

6) بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ فىزىئولوگىيىلىك سەرىپىياتى

ئادەم بەدىنىدىكى سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار ھەزم قىلىش ئورگانلىرى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ، بىر قىسىم سۇ بەدەندىكى ماددا ئالمىشىش جەريانىدا ھاسىل بولىدۇ، بۇ ئىچكى مەنبەلىك سۇ دېيىلىدۇ. بۇنىڭ مىقدارى ئاز بولۇپ ھەر 100 گرام شېكەر ماددا ئالمىشىش جەريانىدا 55 مىللىلىتىر سۇ ھاسىل قىلىدۇ، 100 گرام مايىدىن 107 مىللىلىتىر سۇ ھاسىل بولىدۇ، 100 گرام ئاقسىلدىن 41 مىللىلىتىر سۇ ھاسىل بولىدۇ، چوڭ ئادەم بەدىنىدە ھەر كۈنى ھاسىل بولىدىغان ئىچكى مەنبەلىك سۇ تەخمىنەن 300 مىللىلىتىر كېلىدۇ. سۇنىڭ ئېھتىياجلىق مىقدارى ياشنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن پەرقلىق بولىدۇ. بالىلار ئۆسۈپ يېتىلىش دەۋرىدە تۇرغانلىقتىن، ماددا ئالمىشىش جۇشقۇن، سۇنىڭ ئېھتىياجلىق مىقدارى بەدەن ئېغىرلىقى بويىچە ھېسابلىغاندا چوڭلارغا قارىغاندا كۆپرەك بولىدۇ. سۇنىڭ فىزىئولوگىيىلىك سەرىپىياتى ئاساسەن نەپەس ئېلىش، تېرىدىن پارغا ئايلىنىش، تەرلەش، سۈيدۈك ھەم چوڭ تەرەت ئارقىلىق سەرىپ بولىدۇ. سۇنىڭ سەرىپىياتى ھەم ئېھتىياجلىق مىقدارى ئېنېرگىيىلىك ماددا ئالمىشىش بىلەن يېقىن مۇناسىۋەتلىك.

(1) ئېھتىياجلىق ئېنېرگىيە: ئېنېرگىيە بوۋاقلىق دەۋرىدە كەم

بولسا بولمايدىغان مۇھىم ئېھتىياج بولۇپ، ئېنېرگىيە ① ئاساسلىق
 ماددا ئالمىشىش ئېھتىياجىنى تولۇقلاش؛ ② يېمەكلىكلەرنىڭ
 ئالاھىدە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى رولىنى تولۇقلاش؛ ③ ھەرىكەت
 ئېھتىياجىنى تولۇقلاش؛ ④ ئۆسۈپ يېتىلىش ئېھتىياجىنى تولۇقلاش؛
 ⑤ چىقىرىلىپ يوقالغان ئىسسىقلىق مىقدارىنى تولۇقلاش قاتارلىق
 بەش تەرەپتىكى ئېھتىياجىنى قامداش ئۈچۈن سەرپ بولىدۇ. ئېنېرگىيە
 دېگىنىمىز - نورمال ئاتموسفېرادا بىر كىلوگرام سۇنى 14.5°C تىن
 15.5°C قىزىتىش ئۈچۈن لازىم بولىدىغان ئىسسىقلىقدۇر، ئېنېرگىيە
 بىرلىكى كالورىيە دېيىلىدۇ. يۇقىرىدىكى بەش تەرەپ ئۈچۈن لازىم
 بولىدىغان ئىسسىقلىقنىڭ جۇغلانمىسى ئومۇمىي ئېھتىياجلىق ئېنېرگىيە
 يە دېيىلىدۇ. ئومۇمىي ئېھتىياجلىق ئېنېرگىيە مىقدارى يېشى، بەدەن
 ئېغىرلىقى، ئۆسۈش تېزلىكىگە ئاساسەن بەلگىلىنىدۇ، ھەر كۈنى ھەر
 كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن لازىم بولىدىغان ئېنېرگىيە يېڭى
 تۇغۇلغان بوۋاقلار ئۈچۈن بىرىنچى ھەپتىسىدە تەخمىنەن 60 كالورىيە،
 ئىككىنچى، ئۈچىنچى ھەپتىسىدە تەخمىنەن 100 كالورىيە،
 6~2 ئايلىققىچە تەخمىنەن 120~110 كالورىيە ئېنېرگىيە لازىم
 بولىدۇ. ئادەتتە ئاددىي ئۇسۇل بىلەن ھېسابلىغاندا بىر ياش ئىچىدىكى
 بوۋاقلار ئۈچۈن كۈنلۈكى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن
 110 كالورىيەدىن ھېسابلىنىدۇ، كېيىن ھەر ئۈچ ياشتا 10 كالورىيە
 ئازايتىلىدۇ، 15 ياشتا 60 كالورىيە ئەتراپىدا ئېنېرگىيە لازىم بولسا،
 چوڭلارغا 30 ~ 25 كالورىيە ئېنېرگىيە لازىم بولىدۇ (4-جەدۋەلگە
 قاراڭ).

ئوخشاش ياشتىكى ساغلام بالىلارغا ئېھتىياجلىق بولغان ئېنېرگىيە
 يە مىقدارىدا ئۆز ئارا پەرق بولىدۇ، ئورۇق بالىلارغا سېمىز بالىلارغا

قارىغاندا ئېنېرگىيە كۆپرەك لازىم بولىدۇ. ئومۇمىي ئېنېرگىيە مىقداردىن تەمىنلەش ئۇزاق ۋاقىت يېتەرسىز بولسا، بالىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ئاستىلايدۇ، بەدەن ئېغىرلىقى تۆۋەنلەيدۇ، ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ. ئەگەر ئومۇمىي ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەش زىيادە يۇقىرى بولسا، سېمىزلىك كېسىلى پەيدا بولىدۇ. ئېنېرگىيە يېمەكلىكلەرنىڭ ئوكسىدلىنىشىدىن پەيدا بولىدۇ. بىر گرام ئاقسىلدىن 4 كالورىيە، بىر گرام شېكەردىن 4 كالورىيە، بىر گرام مايىدىن 9 كالورىيە ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسى چىقىدۇ. ئومۇمىي ئېنېرگىيە تۆۋەندىكى بەش تەرەپنىڭ ئېھتىياجىنى تەمىنلەيدۇ.

(1) ئاساسلىق ماددا ئالماشتۇرۇش ئېھتىياجى: ئادەم ئويغاق، تىنچ ھالەتتە بەدەننى قامدايدىغان ئەڭ تۆۋەن ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسى بولۇپ، بۇ بەدەن تېمپېراتۇرىسى، مۇسكۇل كېرىلىش كۈچى، قان ئايلىنىش، نەپەسلىنىش، ئۈچەي لۈمۈلدەش ۋە بەز ھەرىكىتى قاتارلىقلارنىڭ ئاساسلىق فىزىئولوگىيەلىك ھەرىكىتى ئېھتىياجىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ تەخمىنەن ئومۇمىي ئىسسىقلىق مىقدارىنىڭ 60%~50 نى ئىگىلەيدۇ.

(2) ھەرىكەت ئېھتىياجى: بۇ مۇسكۇل ھەرىكىتىگە ئېھتىياجلىق بولغان ئىسسىقلىق مىقدارى بولۇپ، بالىلارنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا ئاساسەن ئوخشاش بولمايدۇ، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ ھەرىكىتى ئاز بولغاچقا، لازىملىق ئېنېرگىيە ئازراق بولىدۇ. بىر ياش ئىچىدىكى بوۋاقلار ھەرىكىتى ئۈچۈن لازىم بولىدىغان ئېنېرگىيە ھەر كۈنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 15~20 كالورىيە بولىدۇ. كۆپ ھەرىكەت قىلىدىغان، يىغلاڭ-غۇ بالىلارغا كېتىدىغان ئېنېرگىيە، ھەرىكىتى ئازراق بالىلارغا قارىغاندا

4~3 ھەسسە كۆپ بولىدۇ. ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ ئېھتىياج-
لىق ئېنېرگىيە مىقدارى تەدرىجىي كۆپىيىدۇ، 13~12 ياشقا كىرگەندە
ھەر كۈنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 30 كالورىيە
ئەتراپىدا ئېنېرگىيە لازىم بولىدۇ.

(3) ئۆسۈش ئېھتىياجى: بۇ بالىلاردىكى ئالاھىدە ئېھتىياج بو-
لۇپ، ئېھتىياجلىق ئېنېرگىيە ئۆسۈش تېزلىكى بىلەن توغرا تاناسىپ
بولىدۇ. يېمەكلىك تەمىنلىگەن ئېنېرگىيە مىقدارى ئېھتىياجنى تەمىنلە-
يەلمىسە، ئۆسۈپ يېتىلىش ئاستىلايدۇ، ھەتتا توختاپ قالىدۇ. بىر
ياش ئىچىدىكى بوۋاقلارنىڭ ئۆسۈشى تېز بولۇپ، ئېھتىياجلىق ئېنېر-
گىيە ئومۇمىي ئېنېرگىيە مىقدارىنىڭ %30 ~ 25 نى تەشكىل
قىلىدۇ، تەخمىنەن ھەر كۈنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن
40 ~ 30 كالورىيە ئېنېرگىيە لازىم بولىدۇ، كېيىن تەدرىجىي
تۆۋەنلەپ، ياشلىق دەۋرىگە كەلگەندە يەنە يۇقىرىلايدۇ.

(4) يېمەكلىكلەرنىڭ ئالاھىدە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ئېھتى-
ياجى: ئورگانىزمنىڭ يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلىش ۋە ئاسسىمىلياتسى-
يە قىلىش ئۈچۈن لازىم بولغان ئىسسىقلىق مىقدارى بولۇپ، ئاقسىل-
نىڭ ئالاھىدە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ئەڭ چوڭ، بۇ ئومۇمىي
ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسىنىڭ %8~7 نى ئىگىلەيدۇ، چوڭراق بالىلاردا
5% تىن ئاشمايدۇ.

(5) چىقىرىلىپ يوقالغان ئىسسىقلىق مىقدارى ئېھتىياجى: بىر
قىسىم ھەزىم بولمىغان يېمەكلىكلەر بەدەن سىرتىغا چىقىرىۋېتىلىدۇ،
بۇ قىسىم ئېنېرگىيە سەرىپىياتى ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى بىلەن بىۋاسىتە-
تە مۇناسىۋەتلىك. ئارىلاش يېمەكلىكلەر بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان بوۋاق-
لارنىڭ ئېنېرگىيە سەرىپىياتى ئومۇمىي ئېنېرگىيىنىڭ %10 دىن ئاش-
مايدۇ.

مايدۇ. ئىچى سۈرۈش ۋە باشقا ھەزىم قىلىش خىزمىتى قالايمىقانلاش-
قاندا ئېنېرگىيە يوقىتىش تېخىمۇ كۆپىيىدۇ. يۇقىرىدىكى بەش جەھەتتىن ئېھتىياجلىق بولغان ئىسسىقلىق
مقدارىنىڭ يىغىندىسى، ئېھتىياجلىق بولغان ئومۇمىي ئىسسىقلىق
مقدارى بولىدۇ. ئىسسىقلىق يېمەكلىكلەر تەركىبىدىكى قەنت، ماي
ئاقسىلدىن كېلىدۇ، ھەر كۈنلۈك تاماق تەركىبىدىكى ئومۇمىي ئىس-
سىقلىق مىقدارىنىڭ تەقسىملىنىشىدا ئاقسىل %15، ماي %35، قەنت
%50 نى ئىگىلەيدۇ.

(2) نورمال سۇ سەرىپىياتى بەدەندىكى سۇ نەپەس يولى،
تېرىنىڭ پارغا ئايلاندۇرۇشى، تەرلەش، چوڭ تەرەت ۋە سۈيىدۈك
ئارقىلىق سەرىپ بولىدۇ. نەپەس يولى شىللىق پەردىسىدە مەلۇم دەرى-
جىدە نەملىك ساقلىنىدۇ، نەپەس چىقارغاندىكى ھاۋا تەركىبىدە سۇ
بولىدۇ، كېچە - كۈندۈز توختىماستىن نەپەسلىنىش جەريانىدا ئاز
بولمىغان سۇ سىرتقا چىقىرىلىدۇ.

تېرە مەلۇم مىقداردىكى سۇنى داۋاملىق پارغا ئايلاندۇرۇپ، بەدەن
تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەيدۇ. ئەتراپتىكى تېمپېراتۇرا 38.8°C تىن ئاش-
قاندا ياكى ھاۋانىڭ نىسبىي نەملىك دەرىجىسى يۇقىرىلىغاندا، بەدەن-
نىڭ ئىسسىقلىق تارقىتىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ، بۇ ۋاقىتتا بەدەن
تېمپېراتۇرىسى تەرلەش ئارقىلىق تەڭشىلىدۇ، تەر تەركىبىدە ئاز مىق-
داردا ئېلېكترولىتلار، ناترىي، كالىي، خلور بولۇپ، تەر بىلەن بىرگە
يوقىتىلىدۇ، ئەگەر بەك كۆپ تەرلىسە، يوقىتىدىغان ئېلېكترولىتلار
مقدارىمۇ كۆپ بولىدۇ. چوڭلارنىڭ چوڭ تەرىتىدىن چىقىپ كېتىدۇ-
غان سۇ 200 مىللىلىتىر ئەتراپىدا بولىدۇ، بالىلارنىڭ يېشىنىڭ
ئوخشاشماسلىقىغا قاراپ پەرقلىق بولىدۇ، ئادەتتىكى ئەھۋالدا 100

كالورىيە ئېنېرگىيە سەرپ بولسا، چوڭ تەرەتتىن چىقىپ كېتىدىغان سۇ تەخمىنەن 8 مىللىلىتىر بولىدۇ. ئەگەر ئىچى سۈرۈپ قالسا ئەھۋال باشقىچە بولىدۇ، چوڭ تەرەت بىلەنمۇ سۇ، ئاز مىقداردىكى ئېلېكترونلار چىقىپ كېتىدۇ.

بۆرەك بەدەن سۇيۇقلۇقىنى تەڭشەشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ. بەدەندىكى زەھەرلىك ماددىلار بۆرەكتە تازىلىنىپ، سۈيىدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، شۇنداقلا ئوشۇقچە سۇ، ئېلېكترونلار ھەم باشقا زەھەرلىك ياكى كېرەكسىز ئېرىتمىلەر مۇشۇ يول بىلەن سىرتقا چىقىرىلىدۇ. ئادەتتىكى ئەھۋالدا 100 كالورىيە ئېنېرگىيە سەرپ بولغاندا، بۆرەكتىن چىقىرىلىدىغان سۇ تەخمىنەن 80 مىللىلىتىر بولىدۇ. چىقىم بولىدىغان سۇنىڭ مىقدارى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر كۈنى 100 كالورىيە ئېنېرگىيە ئۈچۈن 150 مىللىلىتىر بولىدۇ.

4-جەدۋەل. بالىلارغا كۈنلۈك ئېھتىياجلىق ئېنېرگىيە ۋە سۇ

ياش (ئاي)	ئېنېرگىيە كىلوگرام/كالورىيە	سۇ كىلوگرام/مىللىلىتىر
يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق	120 ~ 130	80 ~ 150
بىر ئايلىق	110 ~ 120	130 ~ 150
ئالتە ئايلىق	100 ~ 110	120 ~ 130
بىر ياش	90 ~ 100	110 ~ 120
تۆت ياش	80 ~ 90	90 ~ 100
يەتتە ياش	70 ~ 80	70 ~ 90
ئون ياش	60 ~ 70	60 ~ 85
13 ياش	50 ~ 60	50 ~ 65
15 ياش	40 ~ 50	45 ~ 55
چوڭلار	40 ~ 45	40 ~ 50

7 كسلاتا - ئىشقار تەڭپۇڭلۇقى

يېمەكلىك تەركىبىدە نۇرغۇنلىغان كسلاتا - ئىشقارلىق ماددىلار بولىدۇ، بەدەندە ماددا ئالماشتۇرۇش جەريانىدا ئاز بولمىغان كسلاتالىق ماددا يەنى كاربونات كسلاتاسى، سۈت كسلاتاسى قاتارلىقلار ھاسىل بولىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىشقارلىق ماددىلاردىن ھىدروكاربونات، ھىدروفوسفات قاتارلىقلارمۇ ھاسىل بولىدۇ. لېكىن ئادەم بەدنىدە ھىدروگېن ئىئونى نىسبەتەن تۇراقلىق بولغاندا، ئاندىن نورمال فىزىئولوگىك ئىقتىدارنى ساقلايالايدۇ، بەدەندىكى كسلاتا - ئىشقارلىق ماددىلار مەلۇم مىقدار ۋە نىسبەتتە ساقلىنىشى لازىم، بۇ خىل كسلاتا-ئىشقارلىق دەرىجىسىنىڭ بەلگىلىك دائىرە ئىچىدە ساقلىنىش جەريانى كسلاتا - ئىشقار تەڭپۇڭلۇقى دېيىلىدۇ.

بەدەن سۇيۇقلۇقىدىكى كسلاتا - ئىشقارلىق دەرىجىسى (pH قىممىتى) بوفېر سىستېمىسى، ئۆپكە، بۆرەكنىڭ تەڭشەش، قان سۇيۇقلۇقى ئارقىلىق بەلگىلىك دائىرە ئىچىدە ($7.35 \sim 7.45$ pH) ساقلىنىدۇ. pH قىممىتىنىڭ بەلگىلىك دائىرىدىكى مۇقىملىقىنى ساقلاپ، لىيالىشى ئاساسەن، قان پلازىمىسىدىكى بوفېر سىستېمىسى؛ ئۆپكەنىڭ كاربون IV ئوكسىدنى چىقىرىۋېتىشتىكى تەڭشەش رولى؛ بۆرەكنىڭ كسلاتا - ئىشقارلىق ماددىلارنى چىقىرىۋېتىشتىكى تەڭشەش رولى بولغانلىقىدىندۇر. بۇ ئۈچ جەھەتتىكى روللار ئۆز ئارا ماسلىشىپ، ئورگانىزمنىڭ ئىچكى مۇھىتىدا pH مۇقىملىقىنى ساقلايدۇ، پاتولوگىيىلىك شارائىتلار تۈپەيلىدىن بۇ خىل مۇقىملىق بۇزۇلسا، كسلاتا - ئىشقار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىدۇ.

ئەگەر مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بەدەندىكى كسلاتالىق ماددىلارنىڭ پەيدا بولۇش سۈرئىتى ئۆپكە بىلەن بۆرەكنىڭ تەڭشەش

ئىقتىدارىدىن ئېشىپ كەتسە، ئورنىنى بېسىشى يوقىلىپ، ھىدروگېن ئىئونلىرىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى يۇقىرىلاپ كېتىپ، pH قىممىتى تۆۋەنلەيدۇ، pH قىممىتى 7.35 دىن تۆۋەن بولسا، كىسلاتادىن زەھەر-لىنىش كېلىپ چىقىدۇ، ئەگەر بەدەندىكى ئىشقارلىق ماددىلار زىيادە كۆپىيىپ كەتسە، ھىدروگېن ئىئونلىرىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى تۆ-ۋەنلەپ، ھىدروكاربونات (H_2CO_3) يۇقىرىلاپ كېتىدۇ، pH قىممىتى 7.45 دىن يۇقىرى بولسا، ئىشقاردىن زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ. بەدەندىكى سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار ئالمىشىش توسقۇنلۇققا ئۇچرىغاندا، كىسلاتا - ئىشقار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىش پەيدا بولىدۇ.

ئەگەر كاربونات كىسلاتاسىنىڭ تۇتقان مىقدارى ئالدى بىلەن ئاشسا ياكى كېمەيسە، نەپەس ئېلىش خاراكتېرلىك كىسلاتالىق زەھەر-لىنىش ياكى ئىشقارلىق زەھەرلىنىش پەيدا بولىدۇ، ئەگەر ماددا ئالمىشىش سەۋەبىدىن كاربونات كىسلاتاسى ياكى كاربونات تۈزى (HCO_3) نىڭ مىقدارى ئېشىپ كەتسە ياكى ئازلاپ كەتسە، ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك ئىشقار - كىسلاتادىن زەھەرلىنىش پەيدا بولىدۇ. $[H_2CO_3]$ $[HCO_3^-]$ نىڭ مىقدارى كۆپىيىپ ياكى ئازلاپ كەتكەندە، ئۆپكە ۋە بۆرەك تەڭشەپ كېتەلمەسە، ئىككىسىنىڭ قىممىتى نورمال ساقلىنىپ، pH قىممىتى نورمال دائىرىدە بولىدۇ. لېكىن ئۆپكە بىلەن بۆرەكنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارىنىڭ مەلۇم چېكى بولىدۇ. مۇبادا تەڭشەش ئارقىلىق ئىككىسىنىڭ نورمال قىممىتىنى ساقلىغىلى بولمىسا، pH قىممىتى نورمال دائىرە ئىچىدە ساقلىنمايدۇ.

ئىچى سۈرگەن بالىلاردا سۇسىزلىنىش ئېغىر بولغاندا، ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش كۆرۈلىدۇ، قاندا كالىي، كالتسىي، ماگنىي تۆۋەنلەيدۇ. ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك

كىسلاتادىن زەھەرلىنىش ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان كىسلاتا - ئىشقار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىدۇر.

3. سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقىنىڭ

قالايمىقانلىشىشى

بالىلاردا سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقىنىڭ قالايمىقانلىشىشى ئالدى بىلەن ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدا پەيدا بولىدۇ، ئەگەر ئوسموس بېسىمىدىكى ئۆزگىرىش بىرلا ۋاقىتتا كۆرۈلسە، ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىمۇ سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىش پەيدا بولىدۇ. سۇ ھەم ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلاشقاندىكى لابوراتورىيىلىك دىئاگنوز ھەم داۋالاشتا، ئالدى بىلەن ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىغا قارايدۇ. ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدا ئۆزگىرىش بولغان تەقدىردىمۇ، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى تەڭپۇڭسىزلىق تۈزىتىلىپ مەلۇم ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن، ئاندىن ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى ئاستا - ئاستا تۈزىتىلىدۇ. ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىنىڭ كېمىيىپ كېتىشى سۇسىزلىنىش دېيىلىدۇ، سۇسىزلانغاندا ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئوسموس بېسىمىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسلىنىپ، سۇسىزلىنىش تەڭپۇڭسىزلىق، تۆۋەن ئوسموسلۇق، يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىش دەپ ئۈچكە بۆلىنىدۇ، تۆۋەن ياكى يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىش يەنە بىرلا ۋاقىتتا ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىكى سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىشىنى پەيدا قىلىدۇ، سۇ ياكى تۇز زىيادە كۆپ بولسا، بەدەن سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي مىقدارى ۋە ئوسموس بېسىمىدا ئۆزگىرىش پەيدا قىلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئايرىم - ئايرىم سۇ ۋە تۇز بىلەن زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ.

كلينىكىدا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان لابوراتورىيىلىك تەكشۈرۈشلەر- دە قان پلازىمىسىدىكى ئېلېكترولىتلىق ئېرىگۈچى ماددىلارنىڭ كۈن- سېنتراتسىيىسى تەكشۈرۈلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن سۇ بىلەن زەھەرلىنىش ۋە تۆۋەن ئوسموسىلىق سۈسزىلىنىش ياكى تۇز بىلەن زەھەرلىنىش بىلەن يۇقىرى ئوسموسىلىق سۈسزىلىنىشنى يالغۇزلا لابوراتورىيىلىك تەكشۈرۈش بىلەن پەرقلەندۈرۈش قىيىنراق، مەسىلەن: قان زەردابىدە- كى ناترىيىنىڭ كونسېنتراتسىيىسى تۆۋەنلىگەندە، تۆۋەن ئوسموسىلىق سۈسزىلىنىش بولۇشىمۇ مۇمكىن، بەلكىم سۇ بىلەن زەھەرلىنىش بولۇشىمۇ مۇمكىن، بىز بۇنى ئومۇملاشتۇرۇپ تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى دەپ ئاتايمىز، بۇنداق ئەھۋاللارنى پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى، سۇ بىلەن زەھەرلىنىش، تۇز بىلەن زەھەرلىنىش، يۇقىرى ناترىيلىق قان كېسىلى، تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلى ھەم يۇقىرى كالىيلىق قان كېسىلى ھەققىدە ئايرىم - ئايرىم چۈشەنچىگە ئىگە بولۇشقا توغرا كېلىدۇ.

1) تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى

بۇ كلينىكىدا كۆپ ئۇچرايدىغان بەدەن سۇيۇقلۇقى تەڭپۇڭلۇ- قى قالايمىقانلىشىشنىڭ بىر خىلى بولۇپ، قاندىكى ناترىي ئىئونىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى 130mEq/L يەنى (130mmol/L) دىن تۆۋەن بولسا تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى دېيىلىدۇ. بۇ، ناترىي يېتىشمەسلىكتىن بولغان تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى (يەنى سۇسىز- لانغاندا ئىككىلەمچى پەيدا بولىدۇ)، سۇيۇلۇش خاراكتېرلىك تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى دەپ ئىككىگە بۆلىنىدۇ. ناترىي يېتىشمەسلىك- تىن بولغان تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىنى كۆپ خىل سەۋەبلەر پەيدا قىلىدۇ، تۆۋەن ئوسموسىلىق سۈسزىلىنىش بۇنىڭ ئىچىدىكى

بىر خىلى، بۇنىڭدىن باشقا بەدەنگە كىرىدىغان ناترىينىڭ (تۇز) ئۇزۇن ۋاقىت كەمچىل بولۇشى ياكى چىقىمىنىڭ زىيادە كۆپ بولۇشى بىردەكلا تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەدەنگە كىرىدىغان ناترىينىڭ يېتىشمەسلىكىدىن كېلىپ چىققان تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى يۈرەك، بۆرەك كېسەللىرىگە ئۇزۇن مۇددەت تۇزنى چەكلەشتىن كېلىپ چىقىدۇ.

ناترىينىڭ زىيادە كۆپ چىقىم بولۇشىدىن كېلىپ چىققان تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىنى ئىچى سۈرۈش، قۇسۇش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كۆپ مىقداردا تەرلەش، بۆرەك كىچىك كانالچەسى خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش، بۆرەك ئۈستى بېزى پوستلاق ماددا خىزمىتى تولۇق بولماسلىق، شېكەر سىيىش كېسىلىدىكى كىسلاتادىن زەھەرلىنىش ھەم سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى ئۇزۇن ۋاقىت ئىشلىتىش، سۈزلىنىشنى داۋالاش مۇۋاپىق بولماي يالغۇزلا گلۇكوزا سۇيۇقلۇقىنى تولۇقلاش ياكى قايناق سۇ ۋە باشقا تەركىبىدە تۇز بولمىغان ئىچىملىكلەرنى كۆپ مىقداردا ئىچكۈزۈشتىن پەيدا بولىدۇ.

سۇيۇلۇش خاراكتېرلىك تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىدە ناترىي ئىئونى كەمچىل بولمايدۇ، پەقەت بەدەن سۇيۇقلۇقىدا سۇ زىيادە كۆپ بولۇپ، ناترىي ئىئونى سۇيۇلۇپ كېتىشتىن پەيدا بولىدۇ. بالىلاردىكى ئۆپكە ياللۇغغا بەزىدە تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئۆتكۈر بۆرەك خىزمىتى زەئىپلەشكەندىكى سۈيدۈك ئازلاش-تىنىمۇ تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى ئاسان پەيدا بولىدۇ.

تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىنىڭ ئاساسلىق كلىنىكىلىق ئالامىتى - ماغدۇرسىزلىق، ئىشتىھاسىزلىق، كۆڭلى ئايىنىش، قۇسۇش،

روھىي خۇنۇكلەش، قان بېسىم تۆۋەنلەش، پۇتلىرى ئىششىق ھەم سۈيۈك مىقدارى كۆپىيىش قاتارلىقلار بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئېغىر دەرىجىدىكى سۈيۈلۈش خاراكتېرلىك تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىدە مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنىڭ ئالامىتى كېلىپ چىقىدۇ.

داۋالاشتا، ھۈجەيرە سىرتى سۈيۈقلۈكى يېتىشمەسلىكتىن كېلىپ چىققان بولسا، ناترىينى ئاستا - ئاستا تولۇقلاش لازىم. ئالدى بىلەن 1:2 نىسبەتلىك تەڭ ئوسموسلۇق ناترىي بولغان ئېرىتمە (ئىككى ئۇلۇش فىزىئولوگىيىلىك تۇز سۈيى، بىر ئۇلۇش %1.4 لىك ناترىي بىكاربونات) ئىشلىتىپ بۇرۇن يوقاتقان مىقدارى تولۇقلانسا، تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىمۇ تۈزىتىلىدۇ، قان ئايلىنىش مىقدارى كۆپىيىدۇ، بۆرەك خىزمىتى ياخشىلىنىدۇ، شوك بولسا تۈزىلىدۇ، ئاندىن كېسەللىك ئەھۋالىغا ئاساسەن سۈيۈقلۈك تولۇقلىسا بولىدۇ.

ئەگەر تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىنى تېز سۈرئەتتە تۈزىتىشكە توغرا كەلسە، تەڭ ئوسموسلۇق فىزىئولوگىيىلىك تۇز سۈيى كىرگۈزۈلۈپ، ئادەتتە %0.9 لىك فىزىئولوگىيىلىك تۇز سۈيىنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 20 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ ئىشلەتسە، قاندىكى ناترىينى 5 mEq/L يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. ئەگەر تۈزەلمىسە %3 لىك ناترىي خىلورىد بىلەن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 12 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ ۋېنادىن تامچىلاتسا، قاندىكى ناترىينى 10 mEq/L يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. فورمۇلار بويىچە مۇنداق ھېسابلاشقا

بولىدۇ: $3\% \text{ NaCl/ml} = (0.5 : 0.6) 1.2 \times \text{Kg} \times (\text{Na}^+ - 130)$
%3 لىك ناترىي خىلورىدنىڭ بىر مىللىلىتىرى 0.5 mEq بولىدۇ.
%3 لىك NaCl تولۇقلىغاندا، ئالدى بىلەن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا ئالتە مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ بېرىپ، قاندىكى ناترىي

ئىئونىنى 5mEq/L كۆتۈرگەندىن كېيىن، ئاندىن ئەھۋالغا قاراپ كېيىنكى يېرىمنى تولۇقلاش لازىم. تامچىلاتقاندا بەك تېز بولماسلىقى، ئۇنىڭ ئىچىگە ھېچقانداق دورىلار قوشۇلماسلىقى، سۇنىڭ كىرىش مىقدارى چەكلىنىشى لازىم. ئۇنۇمى كۆرۈلسە ئالامىتى ياخشىلىنىشقا باشلايدۇ. تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىدە كالىي بىلەن كالتسىيەنىڭ تۆۋەنلىشى قوشۇلۇپ كېلىدۇ، شۇڭا بىرلىكتە داۋالاش لازىم.

2. سۇدىن زەھەرلىنىش

بەدەنگە كىرگەن سۇ مىقدارى كۆپ بولسا ياكى بەدەندە كۆپ مىقداردا سۇ يىغىلىپ قالسا، سۇدىن زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ. سۇدىن زەھەرلىنىش بىلەن تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىشتا بىردەك-لا بەدەن سۇيۇقلۇقى ئوسموس بېسىمى تۆۋەنلەپ، ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى ھەجمى ئېشىپ كېتىدۇ. لېكىن تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىشتا، سۇسىزلىنىش بىلەن بىرلا ۋاقىتتا يەنە ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى ئېرىگۈچى ماددا سانى كېمىيىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بىراق سۇدىن زەھەرلەنگەندە ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى ئېرىگۈچى ماددا سانىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ.

كېسەللىك سەۋەبى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردا سۇ ۋە ئېلېكتىر رولىتلارنى تەڭشەش فۇنكسىيىسى تولۇق يېتىلمىگەن بولىدۇ. ئەگەر بەزىبىر كېسەللىكلەر تۈپەيلىدىن ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرىدىن ياكى ۋېندىن كۆپ مىقداردا تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇيۇقلۇق ياكى تەركىبىدە ئېلېكترولىتلار بولمىغان سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈلسە، سۇدىن زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ. يەنە تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىش ھەم بۆرەك، يۈرەك خىزمىتى ناچار بولغاندا، تەركىبىدە ناترىي بولمىغان سۇيۇقلۇقنى قالايمىقان ئىشلىتىش؛ ئېغىر يۇقۇملىنىش، ئۆپكە ياللۇغى، شوك،

قان يوقىتىش، زەخمىلىنىش، چوڭ ئوپىراتسىيىدىن كېيىن سۈيدۈك ئاجرىتىشقا قارشى ھورموننىڭ ئاجرىلىشى كۆپىيىپ كېتىش؛ بۆرەك قان ئېقىمى يېتەرسىز بولۇپ، بۆرەك سۈنى نورمال چىقىرىلماسلىق؛ ئوزۇقلىنىش ناچارلىق، قان پلازىمىسىدىكى ئاقسىل تۆۋەنلەش، ھۈجەيرە سىرتى سۈيۈقلۈكى تۆۋەن ئوسموس ھالىتىدە بولۇش، سۇ ھۈجەيرە ئىچىگە يۆتكىلىپ، ئۈنۈملۈك قان ئايلىنىش مىقدارى ئازلاش؛ ئانا سۈتى بىلەن بېقىلمىغان بالىلارغا سۈتنى زىيادە سۈيۈلدۈرۈپ بېرىش-تىن ياكى سۈنى زىيادە كۆپ ئىچكۈزۈش؛ باش - مېڭە زەخمىلىنىش، سىل خاراكتېرلىك مېڭە پەردە ياللۇغى ياكى مېڭە ياللۇغى بولغاندا سۈيدۈك ئاجرىتىشقا قارشى ھورموننىڭ نورمال بولماسلىقىدىن، سۇ بىلەن زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ.

كىلىنىكىلىق ئىپادىسى سۇدىن زەھەرلەنگەندە ئادەتتىكى تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلىنىڭ ئالامىتىگە ئوخشاش ماغدۇرسىزلىق، ئىشتە-ھاسىزلىق، ئىششىش ۋە سۈيدۈك مىقدارى كۆپىيىشتىن باشقا، نېرۋا ھۈجەيرىسى سۇلۇق ئىششىغانلىقتىن تەلەتى سۆرۈنلىشىش، باش ئاغ-رىش، كۆرۈش خۇنۇكلىشىش، مۇگدەش ياكى بىئارام بولۇش ئالىم-شىپ كۆرۈلىدۇ. ئېغىرلىرى تارتىشىدۇ، ھوشسىزلىنىدۇ ۋە يۈرەك ھەرد-كىتى ئاستىلايدۇ.

سۇدىن زەھەرلەنگەن بالىلارنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە سۈيدۈكى كۆپ بولىدۇ، ئاخىرقى دەۋرىدە سۈيدۈك ئازلايدۇ ياكى سۈيدۈك بولمايدۇ، ئىششىق ئېغىرلىشىدۇ، بەدەن ئېغىرلىقى ئاشىدۇ، بەزى ئاغ-رىقلاردا نەپەس رېتىمىسىزلىشىش ياكى ۋاقىتلىق توختاش كۆرۈلىدۇ. كلىنىكىدا سۇدىن زەھەرلىنىشكە كېسەللىك سەۋەبى ۋە كلىنىكىلىق ئىپادىسىگە ئاساسەن، قان زەردابىدىكى ناترىي ئىئونىنى ئۆلچەپ

دئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ، لېكىن ناترىي ئىئونى يېتىشمەسلىكتىن بولغان تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسلى بىلەن پەرقلاش لازىم. 5-جەدۋەل. سۇدىن زەھەرلىنىش بىلەن تۆۋەن ئوسموسىلىق سۇسزىلىنىشنى پەرقلەندۈرۈش

تۆۋەن ئوسموسىلىق سۇسزىلىنىش (ناترىي يېتىشمەسلىكتىن بولغان تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسلى)	سۇ بىلەن زەھەرلىنىش (سۇيۇلۇش خاراكتېرلىك تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسلى)	
ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇق- قىزىق مىقدارى	ئازلايدۇ	كۆپىيىدۇ
بەدەن ئېغىرلىقى	كېمىيىدۇ	ئارتىدۇ
قان ئايلىنىش مىقدارى	يېتەرسىز	يېتەرلىك
شوك	ئېغىر	يوق
سۇيىدۇك مىقدارى	ئازلايدۇ ياكى يوق	سۇيىغىلىپ قالسا سۇيىدۇك يوق، سۇيۇقلۇق كۆپ كىرگۈزۈلگەن بولسا ئالدى بىلەن كۆپىيىدۇ ← ئازلايدۇ ← يوق
بۆرەك خىزمىتى	ناچار	نورمال
سۇيىدۇك كىتى ناترىي	يوق	كۆپ
قاندىكى NPN. BVM	يۇقىرىلايدۇ	نورمال
قان پلازما ئاقسىلى	يۇقىرىلايدۇ	تۆۋەنلەيدۇ
قان قىزىل ئاقسىلى	يۇقىرىلايدۇ	تۆۋەنلەيدۇ
قىزىل قان ھۈجەيرىسى		

سۇدىن زەھەرلەنگەندە شوك ئالامىتى بولمايدۇ، كۆپ سىيمەيدۇ، سۇيىدۇكنىڭ سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى تۆۋەن بولىدۇ، سۇيىدۇك كىتى ناترىي ئىئونى يۇقىرى بولىدۇ. ناترىي يېتىشمەسلىكتىن بولغان تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسلىدە شوك ئوڭاي پەيدا بولىدۇ، ئاز سىيمىدۇ ھەتتا

سۈيۈك كەلمەيدۇ، قاندا ئورپا، ئازوت يۇقىرىلايدۇ، سۈيۈكنىڭ سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى ئۆرلەيدۇ، تەركىبىدە ناترىي ئىئونى بولمايدۇ ياكى ناھايىتى ئاز بولىدۇ (پەرقى 5-جەدۋەلدىن كۆرۈڭ).

باللار بۆرىكىنىڭ سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقىنى تەڭشەش خىزمىتى تولۇق يېتىلمىگەچكە، سۇدىن زەھەرلىنىش چوڭلارغا قارىغاندا كۆپ بولىدۇ، بولۇپمۇ بوۋاقلاردا بەزىدە دوختۇرلارنىڭ سەل قارشى بىلەن دىئاگنوزى ئېنىق قويۇلماي، مۇۋاپىق توغرا داۋالاشقا ئېرىشەلمەي، خاتا داۋالاشنىڭ قالىدىغان ئەھۋاللارمۇ بولىدۇ، بۇنىڭغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. بەزىدە دوختۇرخانىلاردا بالىلارغا بېرىلىدىغان سۇيۇقلۇقنىڭ مىقدارىنى، كۆپۈش كۈچىنى تەلەپ بويىچە توغرا ئىجرا قىلماي، تەركىبىدە ناترىي بولمىغان سۇيۇقلۇقلارنى ياكى تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇيۇقلۇقلارنى كۆپ مىقداردا كىرگۈزۈشتىنمۇ ئاسانلا سۇدىن زەھەرلىنىش پەيدا بولىدۇ. بۇنداق مىساللار ئاز ئەمەس.

يەنە بىر خىل ئەھۋال بوۋاقلاردىكى يېمەك - ئىچمەكتىن بولغان سۇدىن زەھەرلىنىش بولۇپ، ئەگەر سۈت تەركىبىدىكى سۇ زىيادە كۆپ بولسا ياكى سۈنى بەك كۆپ ئىچكۈزسە، سۇدىن زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇ كۆپىنچە ئۈچ ئايلىقتىن كىچىك بوۋاقلاردا، بولۇپمۇ بالدۇر تۇغۇلغان ياكى ئوزۇقلۇق يېتىشمىگەن بوۋاقلاردا ئاسان پەيدا بولىدۇ. ئانا سۈتى، كالا سۈتى ياكى ئارىلاش بېقىلغان بوۋاقلاردا ھەممىسىدە بىردەك كۆرۈلىدۇ. قىش، كۈز پەسلىدە كۆپرەك، ياز پەسلىدە ئازراق كۆرۈلىدۇ. بەزىدە يۇقۇملىنىش ئامىلى سەۋەبىچى بولىدۇ، مەسىلەن: ئۆپكە ياللۇغى، زۇكام، تولغاق قاتارلىقلار. سۇدىن زەھەرلىنىش ئېغىر بولغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختايدۇ، ئېغىز ئەتراپى كۆكرىدۇ، پۇت - قوللىرى بوشىشىدۇ. بۇنداق ئەھۋال بىر نەچچە

سېكۇنتتىن بىر نەچچە مىنۇتقىچە داۋاملىشىپ ئۆزلۈكىدىن ياخشىلىنىدۇ. لېكىن ئۇزۇن ئۆتمەيلا يەنە قوزغىلىدۇ. تۇرۇپ - تۇرۇپ نەپەسلىنىشنىڭ ۋاقىتلىق توختىشى - سۇدىن زەھەرلىنىشتىن كېلىپ چىققان مەركىزىي نېرۋا ھۈجەيرىسى سۇلۇق ئىششىقى قوزغاتقان مەركەزلىك نەپەس زەئىپلىشىشنىڭ ئىپادىلىنىشىدۇر. قان سۇيۇقلانلىقتىن بەزىدە تۆۋەن كالتسىيلىق قان كېسىلى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئادەتتە يۇقىرى ئوسموسلۇق تۇز سۇيۇقلۇقى تولۇقلاش بىلەن بىرگە كالتسىيىمۇ تولۇقلانسا تېزىدىن ياخشىلىنىدۇ. سۇدىن زەھەرلەنگەندە %3 لىك ناترىي خلور ئېرىتمىسى بىلەن داۋالاش لازىم. %3 لىك ناترىي خلور ئېرىتمىسىنىڭ ھەر لىتىرىدا 513mEq ناترىي ئىئونى بار. ئەگەر ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا ئالتە مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ ئىشلەتكەندە، ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 3mEq دىن ناترىي ئىئونى بېرىلگەن بولىدۇ. شۇنداق قىلغاندا قاندىكى ناترىينى تەخمىنەن 5mEq/L يۇقىرىلاتقىلى بولىدۇ. ئادەتتە سۇدىن زەھەرلەنگەن ئاغرىق بالىلارغا %3 لىك ناترىي خلورىدىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 12 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ، ۋېنادىن ئوكۇل قىلغاندا كلىنىكىلىق ئالامەتلىرى ياخشىلىنىدۇ. بۇ ۋاقىتتا قاندىكى ناترىي تەخمىنەن 10mEq/L يۇقىرىلايدۇ.

%3 لىك ناترىي خلور ئېرىتمىسىنى تامچىلاتقاندا 3 ~ 2 سائەت ئىچىدە ئاستا - ئاستا تامچىلىتىش لازىم. ئەگەر تامچىلىتىش سۈرئىتى بەك تېز بولۇپ كەتسە، قاندىكى ناترىي بىراقلا يۇقىرىلاپ كېتىپ، ئەكسىچە يۇقىرى ناترىيلىق قان كېسىلىنىڭ ئالامەتلىرىنى قوزغىتىدۇ. شۇڭلاشقا ئادەتتە %3 لىك ناترىي خلور ئىشلىتىپ، قاندىكى ناترىينى 10mEq/L ~ 5 كۆتۈرسىلا كۇپايە قىلىدۇ.

ئۇنىڭدىن كېيىن مەلۇم مىقداردا 5% لىك گلوگوزىلىق فىزىئولوگىيەلىك تۇز سۈيى كىرگۈزۈش بىلەن بىرگە سۇنىڭ زىيادە كۆپ كىرىشىنى چەكلەش لازىم. شۇنداق قىلغاندا قاندىكى ناترىي يېرىم كۈندىن بىر كۈنگىچە بولغان ئارىلىقتا ئەسلىگە كېلىپ نورماللىشىدۇ. چۈنكى ھۈجەيرە ئىچى ۋە سىرتىدىكى ناترىي تەڭپۇڭلۇقى 10 نەچچە سائەت ھەتتا 3 ~ 2 كۈندە ئاندىن ياخشىلىنىدۇ.

3) تۇزدىن زەھەرلىنىش

قاندىكى ناترىيىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى 150mEq/L (150mmol/L) دىن يۇقىرى بولسا، تۇزدىن زەھەرلىنىش يەنە يۇقىرى ناترىيلىق قان كېسىلىمۇ دېيىلىدۇ. ئەگەر قاندىكى ناترىي 160mEq/L دىن ئېشىپ كەتسە، نېرۋا سىستېمىسىدا ئەگەشمە كېسەللىكلەرنى قوزغىتىدۇ، ھەتتا بەزىلەردە ئېغىر ئاسارەتلەرنى قالدۇرىدۇ ياكى ھاياتىغا خەۋپ يەتكۈزىدۇ. تۇزدىن زەھەرلىنىشتە ناترىي ئىئونى زىيادە كۆپ كىرگەچكە سۇ يوقاتمايدۇ، ناترىي ئىئونىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ئازايماستىن بەلكى ئاشىدۇ. يۇقىرى ناترىيلىق قان كېسىلىدە ئورگانىزىمغا تۇزنىڭ زىيادە كۆپ كىرىشىدىن پەيدا بولغىنى تۇزدىن زەھەرلىنىش دېيىلىدۇ. سۇ، تۇز بىرلا ۋاقىتتا يوقىتىلىدىغان ئەمما سۇنىڭ يوقىلىشى ناترىيغا قارىغاندا كۆپ بولسا، يۇقىرى ئوسموسىلىق سۈسزىلىنىش دېيىلىدۇ.

تۇزدىن زەھەرلىنىشنىڭ ئاساسىي سەۋەبلىرى، ئورگانىزىمغا تۇزنىڭ زىيادە كۆپ كىرىشى، تەڭ ئوسموسىلىق ياكى يۇقىرى ئوسموسىلىق ($5\%\text{NaHCO}_3$, $3\%\text{NaCl}$) سۇيۇقلۇقلارنى كۆپ مىقداردا كىرگۈزۈش، ئىچى سۈرگەندە تۇزلۇق سۇنى كۆپ مىقداردا ئىچكۈزۈش، ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش، تۇزنى خاتا ئىچكۈزۈش

قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق ۋە كىچىك بالىلارنىڭ بۆرىكىنىڭ تەڭشەش خىزمىتى تولۇق يېتىلىمگە ئىگىلىكتىن، تۈزدىن زە-
ھەرلىنىش نىسبىتى چوڭلارغا قارىغاندا يۇقىرى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن
باشقا باش، مېڭە زەخمىلىنىش، ھىپوفىز ئۆسۈمىسى قاتارلىق نېرۋا
سىستېمىسىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشىدە مەركىزىي نېرۋا غىدىقلىنىپ،
ئالدوستېروننىڭ ئاجرىلىشى كۆپىيىدۇ ھەم ئۇسساش سېزىمى يوقىلىدۇ.
دۇ، بۇمۇ مەزكۇر كېسەللىكنى قوزغىتىدۇ، بۇ مېڭە خاراكتېرلىك
يۇقىرى ناترىيلىق قان كېسىلى دېيىلىدۇ.

قاندىكى ناترىي يۇقىرىلىغاندا ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى
ئۆسۈمۈس بېسىمى يۇقىرىلايدۇ، ھۈجەيرە ئىچىدىكى سۇ ھۈجەيرە
سىرتىغا يۆتكىلىدۇ، بۇنىڭ بىلەن ھۈجەيرە ئىچى سۇسىزلىنىش كې-
لىپ چىقىدۇ، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇق سىغىمچانلىقى ئاشىدۇ،
ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇق سىغىمچانلىقى تۆۋەنلەيدۇ، بۇنىڭ بىلەن
ھۈجەيرە ئىچى - سىرتىدا پاتولوگىيىلىك ئۆزگىرىش پەيدا بولىدۇ.
كلنىكىلىق ئىپادىسى تۈزدىن زەھەرلەنگەندە نېرۋا سىستېمى-
سىنىڭ ئالامەتلىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ، دەسلەپكى دەۋردە
بىئارام بولىدۇ، مۈگدەيدۇ، جۆيلۈيدۇ، قىزىتمىسى ئۆرلەيدۇ، ھوشسىز-
لىنىدۇ، تىترەيدۇ، پەي رېڧلىكسىلىرى جانلىنىدۇ، مۇسكۇللار قاتتىقلى-
شىدۇ، بويۇن قىسمى تارتىشىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇسسايدۇ، نەپەسلى-
نىش تېزلىشىدۇ، قۇسىدۇ، يۈرەك ھەرىكىتى تېزلىشىدۇ، ئېغىرلىرىدا
يۈرەك زەئىپلىشىدۇ.

تۈزدىن زەھەرلەنگەندە بەدەندە ناترىي كۆپىيىپ كەتكەچكە،
داۋالاشتا بەدەندىكى ئوشۇق ناترىينى تازىلاش ئاساس قىلىنىدۇ. ئەگەر
يالغۇزلا گلۇكوزا سۇيۇقلۇقى كىرگۈزۈلسە، بەدەندىكى ناترىي ئىئونى

قويۇقلۇق دەرىجىسى تۆۋەنلەيدۇ، بۆرەكنىڭ تەڭشىشى ئارقىلىق ئار-
تۇق ناترىي سىرتقا چىقىرىلىدۇ. لېكىن تۈزدىن زەھەرلەنگەندە ھۈجەي-
رە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئەسلىدىلا كۆپ بولغاچقا، يەنە گلۇكوزا
سۇيۇقلۇقى كىرگۈزۈلسە، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىنى تېخىمۇ كۆ-
پەيتىۋېتىدۇ، بۇنىڭ بىلەن يۈرەك زەئىپلىشىش ياكى ئۆپكە سۇلۇق
ئىششىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن، يەنە قاندىكى ناترىي تېز-
دىن تۆۋەنلىسىمۇ ئوخشاشلا تارتىشىش قاتارلىق تۆۋەن ناترىيلىق قان
كېسىلىنىڭ بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن سۇيۇقلۇقنى تامچە-
لىتىش تېزلىكى ئاستا بولۇش بىلەن قاندىكى ناترىيىنى 48 سائەت
ئىچىدە تەدرىجىي تۆۋەنلىتىش تەلەپ قىلىنىدۇ. بېرىلىدىغان سۇيۇق-
لۇق تەركىبىدە ئاز مىقداردا ئېلېكترولىت بولۇشى، يەنى تۆۋەن
ئوسموسلۇق ناترىي قوشۇلغان سۇيۇقلۇق تولۇقلاش لازىم. بىرىنچى
باسقۇچتا 1:2:6 لىك ئېرىتمە، $1/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق
تولدۇرۇلىدۇ، بۇ 12 سائەت ئىچىدە تېمىتلىپ بولۇشى كېرەك. ئىك-
كىنچى باسقۇچتا 1:2:9 لىك ئېرىتمە يەنى $1/4$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە
سۇيۇقلۇق تولدۇرۇلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە 10% لىك كالت-
سىي گلۇكونات تولۇقلاپ بېرىلىدۇ. تېمىتىش سۈرئىتى ئاستا بولۇش
بىلەن بىرگە كېسەللىك ئەھۋالىنى يېقىندىن كۆزىتىش لازىم.

4) يۇقىرى كاللىق قان كېسىلى

بەدەندىكى كاللىيىنىڭ 97% ى ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدا
بولۇپ، مەلۇم قويۇقلۇقتا ساقلىنىدۇ. ھۈجەيرە سىرتىدىكى كاللىيىنىڭ
مىقدارى گەرچە ناھايىتى ئاز بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ قويۇقلۇق دەرد-
جىسى تۇراقلىق بولىدۇ. نورمال ئەھۋالدا كاللىي $3.5 \sim 5.5 \text{ mEq/L}$
($3.5 \sim 5.5 \text{ mmol/L}$) ياكى $20 \sim 14 \text{ mg}\%$ بولىدۇ.

قان زەردابىدىكى كالىينىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى 5.1mEq/L ،
(5.1mmol/L) دىن يۇقىرىلاپ كەتسە، يۇقىرى كالىيلىق قان كېسى-
لى دەپ ئاتىلىدۇ.

يۇقىرى كالىيلىق قان كېسىلى - بۆرەك خىزمىتى ناچارلاشقاندا،
ئۆتكۈر بۆرەك كېسەللىكىدە سۈيىدۈكنىڭ توختاپ كېتىشى بىلەن قان
زەردابىدا كالىي تېز سۈرئەتتە يۇقىرىلاشتىن ھەمدە بۆرەك ئۈستى
بېزى پوستلاق ھورمىنى خىزمىتىنىڭ تۆۋەنلىشى بىلەن، سۈيىدۈك
ھەيدىگۈچى دورىلارنى قالايمىقان ئىشلىتىشتىن پەيدا بولىدۇ. ئۇنىڭ-
دىن باشقا، كالىينى كۆپ مىقداردا ۋېنادىن كىرگۈزۈش، تەركىبىدە
كالىي بولغان دورىلارنى مۇۋاپىق ئىشلەتمەسلىكمۇ يۇقىرى كالىيلىق
قان كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھۈجەيرە ئىچىدىكى كالىينىڭ
ھۈجەيرە سىرتىغا يۆتكىلىشى (كىسلاتادىن زەھەرلەنگەندە ھىدروگېن
ئىئونى بىلەن ناترىي ئىئونى ھۈجەيرە ئىچىگە كىرىدۇ، كالىي ئىئونى
ھۈجەيرە سىرتىغا يۆتكىلىپ چىقىدۇ) دىنمۇ يۇقىرى كالىيلىق قان
كېسىلى كېلىپ چىقىدۇ.

بۇ كېسەللىكنىڭ ئاساسلىقى يۈرەك مۇسكۇلى بىلەن سۆڭەككە
زەھەرلىك تەسىرى چوڭ. يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىشىنى تورمۇز-
لايدۇ، كلىنىكىدا يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، يۈرەك سېلىش ئاستىلاش،
يۈرەك قېرىنچە تالالىرى تىترەش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، ئېغىرلىرىدا
يۈرەك كېڭىيىش دەۋرىدىلا توختاپ قېلىپ، ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقىدۇ.
رىشى مۇمكىن، قول - پۇتلار ھەرىكىتى ئاستىلايدۇ، بەدەن بوشىش-
دۇ، روھىي پەرىشان بولىدۇ، كۆپ ئۇخلايدۇ، ئاۋازى پۈتۈپ گەپ
قىلغىدەك ماغدۇرى قالمايدۇ، ئېغىرلىرىدا پالەچلىنىدۇ.

بالىلاردىكى يۇقىرى كالىيلىق قان كېسىلى ئاساسەن بۆرەك

خىزمىتى زەئىپلەشكەندە ۋە ۋېنادىن كالىينى كۆپ مىقداردا كىرگۈز-
گەندە پەيدا بولىدۇ. باشقا سەۋەبلەر قوزغاتقان كالىي يۇقىرىلاش ئاز
ئۇچرايدۇ. يۇقىرى كالىيلىق قان كېسىلىدە يۈرەك قان تومۇرلاردىكى
ئالامەتلەر بالدۇرلا كۆرۈلىدۇ، يەنى يۈرەك ھەرىكىتى ئاستىلايدۇ،
يۈرەك رىتمىسىز سوقىدۇ. قاندىكى كالىينى تەكشۈرگەندە يۇقىرى
بولىدۇ، ئېلېكتروكاردىئوگراممىدا تەكشۈرۈش دىئاگنوز قويۇشتا مۇھىم
ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ، ئاساسلىقى يۈرەك ھەرىكىتى بەك ئاستا
بولىدۇ، T دولقۇنى يۇقىرىلايدۇ، QRS دولقۇنى توپلىمى كېڭىيىدۇ،
P دولقۇنى تۆۋەنلەيدۇ، R — P ئارىلىقى ئۇزىرايدۇ. يۇقىرى كالىيلىق
قان كېسىلىنىڭ خەتىرى چوڭراق بولغاچقا جىددىي تەدبىرلەرنى
قوللىنىپ، قاندىكى كالىينى تۆۋەنلىتىش ئىنتايىن مۇھىم.

داۋالاشتا، تەركىبىدە كالىي بولغان يېمەكلىكلەر، تەركىبىدە
كالىي بولغان دورا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ، ئامباردا ساقلانغان قاننى
ئىشلىتىش مەنئىي قىلىنىدۇ.

يەڭگىل كېسەللەردە، قان زەردابىدىكى كالىي $6 \sim 6.5 \text{ mmol/L}$ بولۇپ،
ئېلېكتروكاردىئوگراممىدا تەكشۈرگەندە نورمال بولسا، مۇسبەت ئىش-
ونلارنى ئالماشتۇرغۇچى سېغىز تۇرغۇزۇپ، ھەمەل قىلىنىدۇ، ياكى
كالىينى ھەيدەپ چىقىرىدىغان سۈيىدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار
ئىشلىتىلىدۇ.

ئېغىر كېسەللەردە قان زەردابىدىكى كالىي $> 6.5 \text{ mmol/L}$

بولغاندا ياكى ئېلېكتروكاردىئوگراممىدا غەيرىي نورماللىق بولغۇچىلاردا

تېزدىن تۆۋەندىكى تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ.

(1) 10% لىك كالتسىي گلۇكوناتتىن ھەر كىلوگرام بەدەن

ئېغىرلىقى ئۈچۈن بىر قېتىمدا 1 ~ 0.5 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ،

ئاستا - ئاستا ۋېنادىن تامچىلاتسا، بىر نەچچە مىنۇت ئىچىدىلا ئۈنۈمى كۆرۈلىدۇ. لېكىن ساقلىنىش ۋاقتى قىسقا بولىدۇ، ئەگەر ئېلېكتروكارىد - ئوگراممىدا ياخشىلىنىش بولمىسا، تەكرار ئىشلەتسە بولىدۇ. بۇ ئارقىلىق يۇقىرى كالىينىڭ يۈرەككە قارىتا زەھەرلىك تەسىرىگە تاقابىل تۇرغىلى بولىدۇ.

(2) كالىينىڭ ھۈجەيرە سىرتىدىن ھۈجەيرە ئىچىگە يۆتكىلىشىنى تېزلىتىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ:

① گلۇكوزغا ئىنسۇلىن قوشۇپ ئىشلىتىش: ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن بىر قېتىمدا 2 گرام گلۇكوزا، ھەر 2 گرام ئىنسۇلىندىن 0.5 بىرلىك ھېسابلاپ قوشۇپ، 30 مىنۇت ئىچىدە ۋېنادىن تامچىلىتىلىدۇ. بۇ تەخمىنەن 60 ~ 30 مىنۇت ئىچىدە ئۈنۈمى كۆرۈلۈپ، 6 ~ 4 سائەت ساقلىنىدۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا قايتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

② ناترىي بىكاربونات: %5 لىك ناترىي بىكاربوناتتىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 3 ~ 5 (2 ~ 3 mmol/L) مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ، ۋېنادىن تامچىلاتسا، 10 ~ 5 مىنۇت ئىچىدە ئۈنۈمى كۆرۈلۈپ بىر نەچچە سائەتكىچە داۋاملىشىدۇ.

(3) كالىينىڭ چىقىرىلىشىنى تېزلىتىش:

① كالىينى ھەيدەش رولى بار سۈيىدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. مەسىلەن: فىروزىمىدئىتاكىرنىڭ كىسلاتا، بۇلار بۆرەكنىڭ كالىينى چىقىرىشىنى تېزلىتىدۇ.

② دىئالز يولى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى: قان زەردابىدىكى كالىينى تېزىدىن تۆۋەنلەتمەسە بولمايدىغان جىددىي پەيتتە ياكى يۇقىرىدىكى چارە - تەدبىرلەرنىڭ ئۈنۈمى بولمىغاندا، قورساق پەردىدە -

سىدىن دىئالز قىلىش ياكى قاندىن دىئالز قىلىشتا ھەممىسى بىردەكلا ئۈنۈملۈك. قاندىن دىئالز قىلغاندا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى، قىسقا مۇددەت ئىچىدە كۆپ مىقداردىكى كالىنى يۆتكەپ چىقىرالايدۇ، لېكىن مەشغۇلات مۇرەككەپ. قورساق پەردىسىدىن دىئالز قىلىشتا كالىنى يۆتكەپ چىقىرىش ئاستىراق بولسىمۇ، لېكىن قولايلىق، داۋالاش ئۈنۈمى يامان ئەمەس.

(4) ھۈجەيرىلەر پارچىلىنىشتىن ساقلىنىش: ئېنېرگىيە يېتىشمە-گەن ئەھۋالدا، بەدەندىكى ھۈجەيرىلەر پارچىلىنىپ، كالى قويۇپ بېرىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش لازىم.

سۈسزلىنىش، تۆۋەن كالىلىق قان كېسىلى، ماددا ئالماشتۇرۇش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش، تۆۋەن كالىسىي، تۆۋەن ماگ-نىي، تۆۋەن فوسفورلۇق قان كېسەللىكلىرى ئىچى سۈرۈش بابىدا سۆزلىنىدۇ.

ئىككىنچى باب بوۋاق - گۆدەك بالىلار ئىچى سۈرۈش كېسەللىكى

1. چۈشەنچە

ئىچى سۈرۈش - ئوخشىمىغان سەۋەبلەر قوزغاتقان ئىچى سۈ-رۈشنى ئاساس قىلغان ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرى خىزمىتى قالايمىقان-لىشىشنىڭ يىغىندى ئالامىتى. ئۇنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى يۇقىرى بولۇپ بالىلاردا ئوزۇقلىنىش ناچارلىشىش، ئۆسۈپ يېتىلىش توسقۇن-لۇققا ئۇچراش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتىن سىرت، ئىچى

سۈرۈشتىن سۇسزلىنىپ، ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى مۇھىم سە-
ۋەبتۇر. كۆپلىگەن تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەردە بالىلار ئىچى سۈ-
رۈش كېسەللىكى ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى بىرىنچى سەۋەب
ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى (WHO) ئىچى سۈرۈش
كېسەللىكىنى كونترول قىلىش دۇنيا خاراكتېرلىك مەسىلە قىلىپ
ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ كېسەللىك ئىككى ياشتىن كىچىك بالىلاردا كۆپ
پەيدا بولىدۇ، بىر ياش ئىچىدىكى بوۋاقلارنىڭ يېرىمى دېگۈدەك
مەزكۇر كېسەللىك بىلەن ئاغرىيدۇ. ھازىر دۆلىتىمىزدە سەھىيە ساقلىق-
نى ساقلاش خىزمىتىنىڭ ياخشىلىنىشى، بالىلارنىڭ ئوزۇقلىنىش،
تازىلىق ئەھۋالىنىڭ ياخشىلىنىشى، داۋالاش شارائىتىنىڭ يۈكسەلىشىگە
ئەگىشىپ، بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى ھەم بۇ كېسەللىك
بىلەن ئۆلۈش نىسبىتى كۆزگە كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىدى، لېكىن يەنىلا
بوۋاق - گۆدەكلىك دەۋرىدىكى كۆپ ئۇچرايدىغان، ئۆلۈمنى كەلتۈ-
رۈپ چىقارغۇچى سەۋەب.

ئىچى سۈرۈش دېگەنمىز - چوڭ تەرەت قېتىمى بىلەن شەكىل-
نىڭ ئۆزگىرىشىدۇر. چوڭ تەرەت قېتىمى ئادەتتىكىگە قارىغاندا كۆپ-
يىپ، شەكلى سۇيۇق، سۈدەك، شىلمىشۇق ياكى قان - يىرنىڭ
ئارىلاش كەلسە، ئىچى سۈردى دېيىشكە بولىدۇ. بالىلارنىڭ يېمەك -
ئىچمىكىنىڭ ئوخشىماسلىقىدىن بىر كۈنلۈك نورمال چوڭ تەرەت قېتىم
سانىمۇ پەرقلىق بولىدۇ. چوڭ تەرەتنىڭ خاراكتېرى نورمال بولۇپ،
ئۇنىڭ قېتىم سانى كۆپرەك بولسا، ئىچى سۈردى دېگىلى بولمايدۇ،
ئانىسىنى ئەمگەن بوۋاقلارنىڭ چوڭ تەرەتتى يۇمشاق كەلسە، ئىچى
سۈردى دېگىلى بولمايدۇ. بالىلارنىڭ ئىچى سۈرگەندە قىزىيدۇ، قۇس-
دۇ، روھسىزلىنىدۇ، ئىشتىھاسى تۇتۇلىدۇ، سۇسزلىنىدۇ، ئېلېكترولىت-

لار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىدۇ.

2. ئىچى سۈرۈشنىڭ بالىلارنىڭ سالامەتلىكىگە بولغان خەتىرى

1. ئىچى سۈرۈشتىن بەدەندىكى سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار كۆپ مىقداردا يوقىلىپ، سۇسىزلىنىدۇ ۋە ئېلېكترولىتلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلىدۇ، بۇنىڭ بىلەن بالىنىڭ ھاياتىغا خەۋپ يېتىدۇ.

2. ئىچى سۈرۈش مەزگىلىدە يېمەكلىك چەكلەنسە ياكى ئىچى سۈرۈش ياخشىلانغاندىن كېيىن مۇۋاپىق ئوزۇقلاندۇرۇلمىسا، ئىچى سۈرۈش ۋاقتى سوزۇلۇپ كەتسە، ئېھتىياجلىق ئېنېرگىيە يېتىشمەي، بالا ياداپ، ئوزۇقلىنىش ناچارلىق كېلىپ چىقىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ھەر خىل ۋىتامىن يېتىشمەسلىك كېسەللىكى پەيدا بولىدۇ.

ھەزىم قىلىشنىڭ ناچارلىشىشى بىلەن ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچارلىشىشى ئۆز ئارا سەۋەب، نەتىجە مۇناسىۋەتتە بولۇپ، كۆپ ھاللاردا يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بولۇپمۇ ۋىتامىن A، B₂، D يېتىشمەسلىك كۆپ ئۇچرايدۇ، مەسىلەن: ۋىتامىن A يېتىشمەس، كۆز قۇرۇش ۋە مۈڭگۈز پەردىسى يۇمشاقلىشىش كېسەللىكى، ۋىتامىن D يېتىشمەس، راخت كېسەللىكى، ۋىتامىن B₂ يېتىشمەس، جاۋغاي ياللۇغى كۆرۈلىدۇ. ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچارلىشىشى ئىچى سۈرۈشنىڭ ئېغىرلىشىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ، ئىچى سۈرۈش ۋاقتى سوزۇلغانسېرى ئوزۇقلىنىش تېخىمۇ ناچارلىشىدۇ.

3. ئىچى سۈرگەندىن كېيىن بەدەننىڭ كېسەللىككە قارشى تۇرۇش كۈچى تۆۋەنلەيدۇ، شۇڭا ھەر خىل يۇقۇملىنىش ئاسانلا پەيدا بولىدۇ. دائىم كۆرۈلىدىغان يۇقۇملىنىشلاردىن ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغى،

سۈيۈك يوللىرى يۇقۇملىنىش، يۇقىرى نەپەس يوللىرى يۇقۇملىنىش، ئۆپكە ياللۇغى، ۋېنا ياللۇغى، سېپتىسېمىيە، چىقان قاتارلىقلار كۆرۈلۈپ-
دۇ. كېسەللىك جەريانى سوزۇلغان ياكى ئەسلىدە ئوزۇقلىنىش ناچار-
لىق كېسەللىكى بار بالىلارغا، غاز بوغۇز كېسەللىكى قوشۇلۇپ كېلىدۇ.
بولۇپمۇ ئانتىبىيوتىكلارنى ئۇزۇن ۋاقىت، قالايمىقان ئىشلەتكەندە تې-
خىمۇ كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئەگەر دورىلارنى ئۆز ۋاقتىدا توختاتمىسا،
زەمبۇرۇغ ئۈچەي يوللىرىغا تەسىر قىلىپ ھەتتا پۈتۈن بەدەنلىك
زەمبۇرۇغلۇق يۇقۇملىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

4. زەھەرلىنىشتىن بولغان جىگەر ياللۇغى ئىچى سۈرۈشتە بول-
دىغان ئەگەشمە كېسەللىكلەرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ كۆپىنچە ئەسلىدە
ئوزۇقلۇق ناچارلىق كېسەللىكى، سېپتىسېمىيە كېسەللىكى بىلەن ئا-
رىغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ، بالىدا سېرىقلىق پەيدا بولىدۇ ۋە بالىنىڭ
ھاياتىغا تەھدىت سالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بەزىدە يەنە ئۆتكۈر بۆرەك
خىزمىتى زەمبۇرۇش، زەھەرلىنىشتىن بولغان ئۈچەي پالەچلىكى،
ئۈچەي قاناش قاتارلىقلارمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن
بېرى ئىچى سۈرۈش ھەققىدىكى تەتقىقات، ئىچى سۈرۈشنى تونۇش
ۋە داۋالاش جەھەتتىكى ئىلگىرىلەشلەر تۈپەيلىدىن ئەگەشمە كېسەل-
لىكلەر خېلى ئازلىدى.

3. ئىچى سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر

1. ئىچكى ئامىل

ئىچى سۈرۈش بوۋاقلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى: ①
بوۋاقلارنىڭ ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرى تولۇق تەرەققىي قىلىپ يېتىل-

مىگەن، ئاشقازان سۇيۇقلۇقىنىڭ كىسلاتالىق دەرىجىسى ھەر خىل ھەزىم قىلىشقا ياردەملەشكۈچى فېرېمېنتلار ئاكتىپلىقى تۆۋەنرەك، لېكىن بوۋاقلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى تېز، ماددا ئالمىشىشى جۇشقۇن، ئوزۇق-لۇق ماددىلارغا بولغان ئېھتىياجى يۇقىرى، ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرىنىڭ يۈكى ئېغىر بولىدۇ؛ ② بوۋاقلىق دەۋرىدە نېرۋا سىستېمىسى، ئىچكى ئاجراتما سىستېمىسى، قان ئايلىنىش سىستېمىسى ھەم جىگەر، بۆرەك خىزمىتى تەرەققىياتى يېتىلمىگەن، تەڭشەش فۇنكسىيىسى ناچارراق بولىدۇ، شۇڭا ھەزىم قىلىش يوللىرى خىزمىتى قالايمىقانلىشىش ئاسان پەيدا بولىدۇ؛ ③ بوۋاقلارنىڭ ئىممۇنىتلىق ئىقتىدارى تولۇق يېتىلمىگەن، مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارى ناچارراق؛ قاندىكى ئىممۇنىت شار ئاقسىلى چوڭلارغا قارىغاندا تۆۋەن، ئۈچەي يوللىرىدىكى ئىممۇنىت شار ئاقسىلىنىڭ بىر خىلى بولغان ئاجرىلىش تىپلىق IgA مۇ تۆۋەن بولىدۇ؛ ④ بوۋاقلار بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تارقىلىشى چوڭلارغا ئوخشىمايدۇ، سۇنىڭ ئالمىشىشى جۇشقۇن بولغاچقا بەدەن سۇيۇقلۇقى قالايمىقانلىشىش ئاسان پەيدا بولىدۇ؛ ⑤ بوۋاقلار راخت كېسەللىكى، ئوزۇقلۇق ناچارلىق كېسەللىكى بىلەن ئاسان ئاغرىدۇ. بۇلار ھەزىم قىلىش خىزمىتىنى قالايمىقانلاشتۇرىدۇ. يۇقىرىدىكى ئىچكى ئامىل تۈپەيلىدىن بوۋاقلاردا ئىچى سۈرۈش ئاسان پەيدا بولىدۇ ھەمدە ئىچى سۈرۈشتىن ئاسانلا سۇسىزلىنىدۇ.

2. يۇقۇملىنىش ئامىللىرى

يۇقۇملىنىش-ئۈچەي يوللىرى ئىچى يۇقۇملىنىش ۋە ئۈچەي يوللىرىنىڭ سىرتىدىكى يۇقۇملىنىش دەپ ئىككى خىلغا بۆلىنىدۇ... (1) ئۈچەي يوللىرى ئىچى يۇقۇملىنىش: كېسەللىك قوزغاتقۇچى مىكرو ئورگانىزىملار بۇلغانغان يېمەكلىك ياكى سۇ بىلەن بالىلار

ھەزم قىلىش يوللىرىغا كىرىدۇ، بۇ خىل ئەھۋال ئانا سۈتى بىلەن بېقىلمىغان بالىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. بالىنى ئوزۇقلاندۇرغاندا ئىشلىتىدىغان ئېمىزگە، بوتۇلكا ياكى يېمەكلىكى ئوبدان دېزىنېفېكسىيە قىلىنمىسا، يۇقۇملىنىش ئىمكانىيىتى چوڭ بولىدۇ. بۇ خىل يۇقۇملىنىشنى باكتېرىيە، ۋىرۇس، زەمبۇرۇغ ياكى پارازىت قۇرتلار كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە باكتېرىيە بىلەن ۋىرۇس ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك قوزغاتقۇچىلاردۇر.

1) باكتېرىيىلىك يۇقۇملىنىش: چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى، چوڭ ئۈچەي ئەگرى باكتېرىيىسى، ئىنچىكە ئۈچەي يىرسىنا باكتېرىيىسى، بۇندىن باشقا سالمۇنېلا تاياقچە باكتېرىيىسى، شەكىل ئۆزگەرتكۈچى تاياقچە باكتېرىيە، يېشىل يىرىڭلاتقۇچى تاياقچە باكتېرىيە قاتارلىقلار يۇقۇملىنىشنى پەيدا قىلىدۇ. بۇندىن باشقا ئۇزۇن مۇددەت كەڭ دائىرىلىك ئانتىبىيوتىك دورىلارنى ئىشلەتكەندىمۇ ئۇچەي يوللىرىدىكى باكتېرىيە توپى قالايمىقانلىشىشتىن ئاق رەڭلىك تەسۋىسمان باكتېرىيىلىك، ئۈزۈمسىمان شار باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغىنى قوزغىتىدۇ. ھازىرغىچە بايقالغان ئىچى سۈرۈشنى قوزغاتقۇچى چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىلىرى تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت.

① كېسەللىك قوزغاتقۇچى چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى:

يېقىنقى يىللاردىن بېرى بۇ خىل باكتېرىيىنىڭ ئىنچىكە ئۈچەي شىللىق پەردە يۈزىگە چاپلىشىۋېلىپ، تىۋىتلىرىنى زەخمىلەشتىن كېسەل قوزغىتىدىغانلىقى بايقالدى. بەزىبىر باكتېرىيە تۈرلىرىنىڭ بىر خىل زەھەر ئىشلەپچىقىرىدىغانلىقىمۇ بايقالدى. دۆلىتىمىزدە ئايرىپ چىققان ئون نەچچە خىل قان زەرداب تىپىدا $O_{111}, B_4, O_{55}, B_6$ ۋە B_{128}, B_{12} لىرى كۆپ كۆرۈلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بېرى بۇ خىل

باكتېرىيە قوزغاتقان ئۈچەي ياللۇغى نىسبەتەن ئازلىدى. لېكىن يەنە بەزىبىر ئورۇنلاردا مەلۇم نىسبەتنى ئىگىلەيدۇ.

② توكسىن ئىشلەپچىقىرىش تىپلىق چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى: بۇ، بوۋاقلاردا ئىچى سۈرۈشنى قوزغاتقۇچى ئاساسلىق باكتېرىيە بولۇپ، چاقىسىمان ۋىرۇستىن قالسىلا ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ، بۇ باكتېرىيە ئۈچەي شىللىق پەردىسىگە بۆسۈپ كىرمەيدۇ. لېكىن ئىسسىقچا چىدامچان توكسىن بىلەن ئىسسىقچا چىدامسىز توكسىن ئىشلەپچىقىرىدۇ. بۇلار ئىنچىكە ئۈچەي ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسىنىڭ سۇ ۋە ئېلېكتىرولىتلارنى ئاجرىتىپ چىقىرىشنى تېزلىتىش بىلەن ئىچى سۈرۈشنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ ياز پەسلىدىكى ئىچى سۈرۈشنىڭ مۇھىم كېسەللىك سەۋەبچىسىدۇر.

③ بۆسۈپ كىرىش تىپلىق چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى: بۇ خىل باكتېرىيە ئۈچەي شىللىق پەردە ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسىگە بۆسۈپ كىرىپ، شىللىق پەردىدە قان تولۇش، ئىششىق، جاراھەت قاتارلىق ياللۇغلۇق ئۆزگىرىشلەرنى پەيدا قىلىدۇ. كلىنىكىدا باكتېرىيەلىك تولغاققا ئوخشاش ئالامەتلەرنى قوزغىتىدۇ. بالىلارنىڭ بۇ خىل باكتېرىيە بىلەن كېسەللىنىش نىسبىتى تۆۋەنرەك بولىدۇ.

④ قاناش خاراكتېرلىك چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى: بۇ باكتېرىيە بىر خىل توكسىن ئىشلەپچىقىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن كېسەل قوزغىلىدۇ، كلىنىكىدا قورساق سپازمىلىق ئاغرىيدۇ، سۈدەك تەرەت قىلىدۇ، ئارقىدىنلا قانلىق تەرەت قىلىدۇ.

⑤ ئاچچىق ئۈچەي ئىگى باكتېرىيىسى: بۇ باكتېرىيە بالىلاردا ئۈچەي ياللۇغى قوزغاتقۇچى مۇھىم باكتېرىيە بولۇپ، قورساق ئاغرىش، ئىچى سۈرۈش، قان - يىرىك تەرەت قىلىشتەك ئەھۋاللار

كۆرۈلدى. بۇندىن باشقا ئىنچىكە ئۈچەي يېرىسنا باكتېرىيىسى، چاشقان كېزىك سالمۇنىلا باكتېرىيىسى، شەكىل ئۆزگەرتكۈچى تاياق-چە باكتېرىيە قاتارلىقلار بار.

(2) زەمبۇرۇغلۇق يۇقۇملىنىش: كەڭ دائىرىلىك ئانتىبىيوتىك دورىلارنى ئۇزۇن مۇددەت قالايمىقان ئىشلەتكەندە ئۈچەي يوللىرىدىكى باكتېرىيە توپى قالايمىقانلىشىدۇ، نەتىجىدە ئاق تەسۋىسىمان باكتېرد-يىلىك ئۈچەي ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ، بۇندىن باشقا بۆرەك ئۈستى بەز پوستاناق ھورمونلىرىنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەندىمۇ ئورگانىزم-نىڭ ئىممۇنىت كۈچى تۆۋەنلەيدۇ، بۇنىڭ بىلەنمۇ ئاسانلا ئاق تەسۋىسىمان باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا ئىچى سۈرۈش ۋاقتى سوزۇلۇپ كېتىدىغان بولغاچقا، كۆپىنچىسىدە ئوزۇقلىنىش ناچارلىق كېسلى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىلىك، شەكىل ئۆزگەرتكۈ-چى تاياقچە باكتېرىيىلىك ياكى يېشىل يىرىڭلىق باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغىمۇ ئىككىلەمچى پەيدا بولىدۇ.

(3) ۋىرۇسلۇق يۇقۇملىنىش: ۋىرۇس بالىلاردا ئىچى سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ئاساسىي سەۋەبلەرنىڭ بىرى، ئىچى سۈرۈشنى قوزغاتقۇچى ۋىرۇسنىڭ خىللىرى كۆپ، كۆپ ئۇچرايدىغانلىرى چاق-سىمان ۋىرۇس، كوساجى (Coxsackie) ۋىرۇسى، ئەيكو (Echo) ۋىرۇسى، نورۋاكى (Norwalk) ۋىرۇسى ۋە يۇلۇن سۈر ماددا ياللۇغى ۋىرۇسى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. لېكىن بۇلارنىڭ ئىچىدىكى چاقسى-مان ۋىرۇس كۈز، قىش پەسلىدە ئۈچەي ياللۇغىنى قوزغىتىدىغان، كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر.

(4) پارازىتلىق يۇقۇملىنىش: ئۈچەي يوللىرىدىكى پارازىت قۇرت-

لاردىن ئامۇت شەكلىدىكى قامچا قۇرت، تامچا قۇرتلار بالىلاردا ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) ئۈچەي يوللىرىنىڭ سىرتىدىكى يۇقۇملىنىش: ھەزىم قىلىش ئورگانلىرىدىن باشقا ئورگانلاردا يۇقۇملىنىش بولغاندىمۇ ئىچى سۈرۈش كېلىپ چىقىدۇ. مەسىلەن: ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغى، ئۆپكە ياللۇغى، بۆرەك ياللۇغى، زۇكام، تېرە يۇقۇملىنىش، ئۆتكۈر يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر. چۈنكى يۇقىرىدىكى كېسەللىكلەردە قىزىش ھەم كېسەللىك پەيدا قىلغۇچىلارنىڭ ئىشلەپچىقارغان توكسىنى تەسىرىدە ئۈچەي ئىچىدىكى ھەزىم قىلىشقا ياردەم بەرگۈچى فېرېمېنتلارنىڭ ئاجىزلىشى ئازلايدۇ، ئۈچەينىڭ لۆمۈلدەش ھەرىكىتى كۈچىيىپ نەتىجىدە بالىلارنىڭ ئىچى سۈرىدۇ. بىر قىسىم كېسەل بالىلاردا ئۈچەي يوللىرىدىن سىرتقى يۇقۇملىنىشنى قوزغاتقۇچىلار بىرلا ۋاقىتتا ئۈچەي يولىدىمۇ يۇقۇملىنىش قوزغىتىدۇ. بولۇپمۇ ۋىرۇسلۇق يۇقۇملىنىشتا شۇنداق بولىدۇ.

3. يۇقۇملىنىشنىڭ ئامىللىرى

بۇ ئاساسەن ھەزىم قىلىش خىزمىتىنىڭ قالايمىقانلىشىشى بولۇپ، تۆۋەندىكى ئەھۋاللار ئىچى سۈرۈشنى ئاسان پەيدا قىلىدۇ.

(1) يېمەكلىك ئامىلى: بالىلارنى ئوزۇقلاندۇرۇشنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقى ئىچى سۈرۈشنى پەيدا قىلغۇچى مۇھىم سەۋەبلەرنىڭ بىرى. بۇ كۆپىنچە ئانا سۈتى بىلەن يېقىملىغان بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ، بالىلارغا يېمەكلىكلەرنى بەك كۆپ ياكى ئاز بېرىش، قەرەلسىز ئوزۇق-ئاندۇرۇش ياكى كراخماللىق ھەم ماي تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى بەك بالدۇر، كۆپ مىقداردا بېرىش، يېمەكلىكلەرنىڭ تۈرىنى تۈيۈقسىز ئۆزگەرتىش ھەمدە بالىلارنى ئەمچەكتىن تۈيۈقسىز ئايرىش قاتارلىقلار.

نىڭ ھەممىسى ئىچى سۈرۈشنى پەيدا قىلىدۇ.

(2) يېمەكلىككە زىيادە سەزگۈر بولۇش: قىسمەن بوۋاق بالىلار كالا سۈتى ياكى بەزىبىر يېمەكلىكلەرگە زىيادە سەزگۈر بولىدۇ ياكى چىدامسىز بولىدۇ. مەسىلەن: ئاددىي شېكەر فېرېمېنتى ياكى قوش شېكەر فېرېمېنتى ۋاقىتلىق يېتەرسىز بولسا ياكى سۈت شېكەر فېرېمېنتى كەمچىل بولسا، سۈت شېكېرىنىڭ شۈمۈرۈلۈشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. يۇقىرىدىكى ئەھۋاللاردا بالىلارنى ئوزۇقلاندۇرغاندىن كېيىن ئۇلاردا ئىچى سۈرۈش پەيدا بولىدۇ. كالا سۈتىگە زىيادە سەزگۈر بالىلاردا كالا سۈتى ئىچكۈزۈلگەندىن كېيىن، 48 سائەت ئىچىدە ئىچى سۈرۈش پەيدا بولىدۇ. كالا سۈتىگە زىيادە سەزگۈر بالىلارنىڭ ئۈچەي يوللىرىدا سۈت شېكەر فېرېمېنت ئاكتىپلىقى تۆۋەن بولىدۇ.

(3) كىلىمات ۋە مۇھىت ئامىلى: ھاۋا كىلىماتى تۇيۇقسىز ئۆزگىرىپ، بالىنىڭ قورساق قىسمىغا سوغۇق ئۆتسە، ئۈچەينىڭ لۆ-مۈلدەش ھەرىكىتى كۈچىيىدۇ، ھاۋا بەك ئىسسىپ كەتسە، ھەزىم قىلىش سۈيۈقلۈقىنىڭ ئاجرىلىشى ئازىيىپ كېتىدۇ - دە، بالا ئۇسساپ كەتكەنلىكتىن كۆپلەپ سۇ ئىچىدۇ، بۇ ھەزىم قىلىش يوللىرىنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، ئىچى سۈرۈشنى پەيدا قىلىدۇ.

4. ئىچى سۈرۈشنىڭ پاتو - فىزىئولوگىيىسى

1. يۇقۇملانمىسىز ئىچى سۈرۈش: بۇ ئاساسلىقى يېمەكلىك ئامىلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىچى سۈرۈش بولۇپ، يېمەكلىك-نىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يېمەكلىكلەرنى زىيادە كۆپ بېرىش ياكى يېمەكلىكنىڭ تەركىبىي مۇۋاپىق بولمىغاندا، ھەزىم قىلىش جەريانى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ، يېمەكلىك تولۇق ھەزىم بولمايدۇ ۋە شۈمۈرۈلمەيدۇ، نەتىجىدە ئىنچىكە ئۈچەي يۇقىرى قىسمىدا

يىغىلىپ قالىدۇ، ھەمدە كىسلاتالىق دەرىجىسى تۆۋەنلەيدۇ. بۇ، ئۈچەي يوللىرى تۆۋەنكى قىسمىدىكى باكتېرىيەلەرنىڭ يۇقىرىغا يۆتكىلىشى ھەم كۆپىيىشى ئۈچۈن پايدىلىق شارائىت يارىتىپ بېرىدۇ. پارچىلانغان يېمەكلىكلەر ئېچىپ، چىرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى تېخىمۇ قالايمىقانلىشىدۇ. پارچىلىنىشتىن ھاسىل بولغان ئورگانىك كىسلاتا (مەسىلەن: سۈت كىسلاتاسى، سىركە كىسلاتاسى) ئۈچەي كانىلى ئىچى ئوسموس بېسىمىنى يۇقىرىلىتىدۇ، ھەمدە چىرىشتىن ھاسىل بولغان زەھەرلىك ماددىلار ئۈچەي دىۋارىنى غىدىقلاپ، ئۈچەينىڭ لۆمۈلدەش ھەرىكىتىنى كۈچەيتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئىچى سۈرۈش كېلىپ چىقىدۇ. ئىچى سۈرۈشتىن سۈسزىلىنىش، ئېلېكترولىت تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىدۇ. زەھەرلىك ماددا ئالىم-شەش مەھسۇلاتلىرى شۈمۈرۈلۈپ قان ئايلىنىشقا كىرىدۇ، نەتىجىدە ئوخشىمىغان دەرىجىدە زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى كېلىپ چىقىدۇ.

2. يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش: بۇ ئاساسەن باكتېرىيە ۋە ۋىرۇسلۇق يۇقۇملىنىشتىن پەيدا بولىدۇ. كېسەل قوزغاتقۇچىلار يېمەكلىك ۋە سۇ بىلەن ھەزىم قىلىش يوللىرىغا كىرىدۇ. ئاز ساندىكىلىرى كېسەل قوزغاتقۇچىلار بىلەن بۇلغانغان قول، ئويۇن-چۇق، كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئىشلىتىدىغان سايمانلار ئارقىلىق ھەزىم قىلىش يوللىرىغا كىرىدۇ. كېسەل قوزغاتقۇچىلارنىڭ كېسەل قوزغىتىش ياكى قوزغاتماسلىقى بەدەننىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچى، كېسەل قوزغاتقۇچىلارنىڭ سانى، زەھەر كۈچىنىڭ ئاجىز - كۈچلۈك - لۈكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. مىكرو ئورگانىزملارنىڭ چاپلىشىشچانلىقى ئۈچەي يوللىرى يۇقۇملىنىشىدا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشنىڭ پاتو - فىزىئولوگىيىسىنى تۆۋەندىكى

بىر قانچە تەرەپلەردىن چۈشەنەيلى.

(1) باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى.

① توكسىنلار خاراكتېرلىك ئۈچەي ياللۇغى: بۇنى ھەر خىل

ئۈچەي توكسىنى ھاسىل قىلىدىغان باكتېرىيىلەر قوزغىتىدۇ. مەسى-

لەن: توكسىن ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك چوڭ ئۈچەي تاياقچە

باكتېرىيىسى، خولېرا تىرىناقسىمان باكتېرىيىسى، چاشقان كېزىك سالا-

مۇنىلا باكتېرىيىسى، چوڭ ئۈچەي ئەگرى باكتېرىيىسى، تولغاڭ

تاياقچە باكتېرىيىسى قاتارلىق. بىز ئاساسلىقى ETEC نى مىسال

قىلىپ چۈشەندۈرىمىز. ETEC نىڭ باكتېرىيە مويىدا چاپلاشتۇرۇش

ئامىلى بولۇپ، بۇ باكتېرىيىنى ئىنچىكە ئۈچەي يۇقىرى قىسىم شىللىق

پەردە ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسىگە چاپلاشتۇرىدۇ، باكتېرىيە بۇ يەردە

ئۆسۈپ كۆپىيىدۇ، ھەمدە ئۈچەي توكسىنلىرى ھاسىل بولۇپ، ئۇ-

چەينىڭ خىزمىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ، باكتېرىيە ئۈچەي شىللىق

پەردىسىگە ھۇجۇم قىلىپ كىرمەيدۇ، ئادەتتە پاتولوگىيىلىك، مورفولو-

گىيىلىك ئۆزگىرىش چىقمايدۇ. بۇ باكتېرىيە ئىسسىققا چىداملىق توك-

سىن بىلەن ئىسسىققا چىدامسىز توكسىن ئىشلەپچىقىرىدۇ. ئىسسىققا

چىدامسىز توكسىن ئىنچىكە ئۈچەي ئېپىتېلىيە ھۈجەيرە پەردىسىدىكى

قوبۇل قىلغۇچى تەنچە بىلەن بىرىكىدۇ ھەمدە ئادىيىنلىق كىسلاتانى

ھالقىلاشتۇرغۇچى فېرمىنتىنى ئاكتىپلاشتۇرىدۇ. بۇ ئادىنوزىن ترى

فوسفات (ATP) نى AMP (سىكلىك ئادىنوزىن مونوفوسفات) غا

ئۆزگەرتىدۇ، نەتىجىدە cAMP كۆپىيىدۇ، بۇ ئىنچىكە ئۈچەي تىۋىتى

ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسىنىڭ ناترىي (Na^+)، خلور (Cl^-) ۋە سۇنى

سۈمۈرۈشىنى تورمۇزلاپ، ئۈچەي بەزىلىرىنىڭ خلورنى (Cl^-) ئاجرىد-

تىشىنى تېزلىتىدۇ - دە، ئۈچەيدىكى سۇيۇقلۇق مىقدارى كۆپىيىپ

كېتىپ، بوغماق ئۈچەينىڭ شۈمۈرۈش دائىرىسىدىن ئېشىپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئىچى سۈرۈش كېلىپ چىقىدۇ. ئىسسىققا چىداملىق ئۈچەي توكىسىنى گىۋانتلىق كىسلاتانى ھالقىلاشتۇرغۇچى فېرېمېن-تىنى ئاكتىپلاشتۇرۇش ئارقىلىق گىۋا تۈزى تىرى فوسفات (GTP) نى (cGMP) غا ئايلاندۇرىدۇ. بۇنىڭ ئىچى سۈرۈشنى قوزغىتىشتىكى مې-خانىزمى يۇقىرىدىكى بىلەن ئوخشاش.

② بۆسۈپ كىرىش خاراكتېرلىك ئۈچەي ياللۇغى: بۇنى ھەر خىل بۆسۈپ كىرىش خاراكتېرىگە ئىگە باكتېرىيە قوزغىتىدۇ. مەسىلەن: شىگېللا باكتېرىيە توپى، سالمۇنىللا باكتېرىيە توپى، چوڭ ئۈچەي ئەگرى باكتېرىيىسى قاتارلىق. بۆسۈپ كىرىش خاراكتېرلىك چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېرىيىسى (EIEC)، شىگېللا باكتېرىيە توپى ۋە ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شار باكتېرىيىسى ئاساسلىقى بوغماق ئۈچەيگە ھۇجۇم قىلىپ كىرىدۇ، چوڭ ئۈچەي ئەگرى باكتېرىيىسى ئاساسلىقى ئاچچىق ئۈچەي بىلەن يانپاش ئۈچەيگە ھۇجۇم قىلىپ كىرىدۇ. چاشقان كېزىك سالمۇنىللا باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى يانپاش ئۈچەي بىلەن بوغماق ئۈچەيدە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. يۇقىرىدىكى باكتېرىيىلەر ئۈچەي شىللىق پەردە توقۇلمىسىغا ھۇجۇم قىلىپ كىرىپ، ياللۇغلۇق كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى قوزغىتىدۇ. مەسىلەن: قان تولۇش، ئىششىق، ياللۇغلۇق ھۈجەيرىلەر ئىند-فىلتراتسىيىلىشىش، يارا ۋە سىرغىما قاتارلىقلار. كلىنىكىدا تولغاققا ئوخشاش تەرەت بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. چوڭ تەرەتنى تەكشۈرگەندە نۇرغۇنلىغان ئاق قان ھۈجەيرىسى ۋە قىزىل قان ھۈجەيرىسى بايقىلىدۇ. بوغماق ئۈچەي ياللۇغلانغانلىقتىن ئىنچىكە ئۈچەيدىن بوغماق ئۈچەيگە كىرگەن سۈيۈقلۈكنى تولۇق شۈمۈرەلمەيدۇ، ھەمدە بەزىبىر

باكتېرىيەلەر يەنە توكسىنىمۇ ئىشلەپچىقىرىدۇ، شۇڭا سۇدەك تەرەتمۇ كېلىدۇ. دائىم يۇقىرى قىزىتما، قورساق ئاغرىش ھەتتا بەزىلىرىدە قۇرۇق ئىنجىق بولىدۇ. پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى ئېغىرراق ئۆتىدۇ.

(2) ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى.

چاقىسىمان ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى: چاقىسىمان ۋىرۇس ئىنجىق-كە ئۈچەي يېقىنقى بۆلۈكىگە ئاسان ھۇجۇم قىلىپ كېرىدۇ، لېكىن ئۇ ئىنچىكە ئۈچەينىڭ ھەممىسىگە ھەتتا ئاشقازان، بوغماق ئۈچەيگىچە تەسىر يەتكۈزىدۇ، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي بىلەن ئاچچىق ئۈچەي شىللىق پەردە قەۋىتىدە پارچە-پارچە كېسەللىك ئوزگىرىشىنى كۆرگىلى بولىدۇ. چاقىسىمان ۋىرۇس ئىنچىكە ئۈچەي تىۋىتى ئۈستىدىكى ئېپىد-تېلىيە ھۈجەيرىسىگە ھۇجۇم قىلىپ كېرىدۇ، يوشۇرۇن ئويۇقچە تەسىرگە ئۇچرىمايدۇ. كېسەللەنگەن ھۈجەيرىلەردە كۆپۈكسىمان ئۆز-گىرىش بولىدۇ ياكى نېكروزلىنىدۇ. ئىنچىكە تىۋىتلار ئىششىيدۇ، رېتىمىزلىنىدۇ، قىسقىرىدۇ. زەخمىلەنگەن ئىنچىكە ئۈچەي شىللىق پەردە ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسى ھەم ئىنچىكە تىۋىتلار سويۇلۇپ، تىۋىتلار قىسقىرىدۇ، سىرتقى يۈزى رېتىمىزلىشىدۇ، بۇنىڭ بىلەن سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار ئۈچەي كانىلىغا سرغىپ چىقىدۇ. ئۈچەي بەز ھۈجەي-رىسى كۆپىيىدۇ. يېڭىدىن ئۆسكەن، يېتىلمىگەن ھۈجەيرىلەر يال-ئاچلانغان تىۋىت يۈزىنى ياپىدۇ. بۇ خىل يېڭىدىن ئۆسكەن ئېپىتېل-يە ھۈجەيرىلەردە ئىنچىكە تىۋىتلار بولمايدۇ، سۈمۈرۈش ئازلايدۇ، دەسلەپكى بىر نەچچە كۈن ئىچىدە قوش شېكەر فېرېمېنتى بولۇپمۇ سۈت شېكەر فېرېمېنتىنىڭ ئاكتىپلىقى تۆۋەنلەيدۇ، ھەزم بولمىغان سۈت شېكېرى ئۈچەي كانىلى ئىچىدە يىغىلىپ قالىدۇ. شۇڭا ئۆس-

موس بېسىم يۇقىرىلايدۇ، ھەمدە ئىنچىكە ئۈچەي تۆۋەنكى قىسمى بىلەن بوغماق ئۈچەي ئىچىدىكى باكتېرىيىلەر بىر مولېكۇلالىق سۈت شېكىرىنى پارچىلاپ، ئالتە مولېكۇلالىق سۈت شېكىرى ھاسىل قىلىدۇ، بۇنىڭ بىلەن ئۈچەي كانىلى ئىچىدىكى ئوسموس بېسىم تېخىمۇ يۇقىرىلايدۇ - دە، سۇ ۋە ئېلېكترولىتلارنىڭ ئۈچەي دىۋارىدىن ئۈچەي كانىلىغا ئېقىپ كىرىش ھاسىل بولىدۇ. ناترىي بىلەن گلۇكوزنىڭ ئوخشاش توشۇغۇچى تەنچە بىلەن بىرىكىپ، يۆتكىلىپ شۈمۈرۈلۈشى ۋە ئېپىتېلىيە ھۈجەيرە تۈۋى يان قىسىم پەردىسىدىكى K^+ ، Na^+ ، ATP فېرمىنتى ناترىي پومپىسى ئاكتىپلىقى بىردەك تۆۋەن بولىدۇ، ناترىي بىلەن گلۇكوزنىڭ شۈمۈرۈلۈشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئىچى سۈدەك سۈرىدۇ. لېكىن ئۇنىڭدىكى ناترىي بىلەن خلورنىڭ مىقدارى توكسىن ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك چوڭ ئۇچەي تاياقچە باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغغا قارىغاندا ئاز بولىدۇ. چاقىسىمان ۋىرۇلۇق ئۈچەي ياللۇغى بولغاندا، ئۈچەي شىللىق پەردە ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسىدىكى ئادىيىنلىق كىسلاتانى ھالقىلاشتۇرغۇچى فېرمىنت بىلەن گىۋانتلىق كىسلاتانى ھالقىلاشتۇرغۇچى فېرمىنت ئاكتىپلىقى نورمال بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ۋىرۇسلۇق ئىچى سۈرۈشتە شۈمۈرۈش ئىقتىدارى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. ئۈچەي شىللىق پەردەسىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى كېسەل بولغاندىن كېيىن 3 ~ 4 ھەپتە ئىچىدە ئەسلىگە كېلىپ نورماللىشىدۇ.

5. ئىچى سۈرۈشنىڭ دىئاگنوز ئاتالمىسى

ھەم ئۆلچىمى

ئىلگىرى ئىچى سۈرۈش - ھەزىم قىلىشنىڭ ناچارلىشىشى دەپ ئاتىلىپ كەلگەن. يېقىنقى يىللاردىن بېرى ئۈچەي يوللىرى باكتېرىئو-

لوگىيىسى، ۋىرۇس ئىلمىي ھەققىدىكى تەتقىقات خىزمىتىنىڭ يۈكسى-
لىشىگە ئەگىشىپ بۇ خىل ئاتاشنىڭ تولۇق ۋە ئەينەن بولمىغانلىقى
ئىسپاتلىنىپ، 70- يىللاردىن كېيىن «بوۋاقلاردىكى ئىچى سۈرۈش»
دەپ ئاتالدى. لېكىن ئىچى سۈرۈش بىر ئالامەتنىڭ ئاتىلىشى بولۇپ،
بۇنى بىر كېسەللىكنىڭ دىئاگنوز ئاتالمىسى ئورنىدا ئىشلىتىش ھەق-
قىي ئەھۋالنى چۈشەندۈرەلمەيتتى، چۈنكى ئۇنىڭ ئۆز ئىچىگە ئال-
دىغان دائىرىسى كەڭ بولۇپ، مەلۇم خىلدىكى كېسەللىككە ھەققىي
ۋەكىللىك قىلالمايتتى. 1981 - يىلى ئېچىلغان بالىلاردىكى ئىچى
سۈرۈش كېسەللىكىنى تەتقىق قىلىش مەملىكەتلىك ھەمكارلىق گۇرۇپ-
پىسىنىڭ تەييارلىق يىغىنىدا ۋەكىللەر بۇ مەسىلە ئۈستىدە تالاش -
تارتىش قىلغان ۋە دەسلەپكى قەدەمدە پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
ئۇنىڭدىن كېيىن بىر يىل ئەتراپىدا ئەتراپلىق پىكىر ئېلىش، مۇزاكىرە
قىلىش ئارقىلىق 1982 - يىلى ئېچىلغان بالىلاردىكى ئىچى سۈرۈش
كېسەللىكىنى تەتقىق قىلىش مەملىكەتلىك چوڭ يىغىنىدا «بالىلاردىكى
ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىنىڭ دىئاگنوز ئاتالمىسى ھەم ئۆلچىمى»
ھەققىدە رەسمىي قارار ماقۇللاندى ھەمدە سەھىيە مىنىستىرلىقى
رەسمىي ھۆججەت تارقىتىپ بېكىتتى. شۇ قېتىمقى يىغىندا ئىچى
سۈرۈشنى يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش ۋە يۇقۇملىنىشسىز
ئىچى سۈرۈش دەپ ئاتاش قارار قىلىندى.

يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشنىڭ ئىلگىرى قوللىنىپ
كېلىنگەن مۇقىم دىئاگنوز ئاتالغۇسى بولغان باكتېرىيىلىك تولغاق،
خولېرا قاتارلىقلاردىن باشقا، باكتېرىيىلىك، ۋىرۇسلۇق، پارازىتلىق،
زەمبۇرۇغلۇق ۋە بەزى كېسەللىك سەۋەبى ئېنىق بولمىغان يۇقۇملىنىش
خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشلەر بىردەك ئۈچەي ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ.

غان بولدى.

ئىچى سۈرۈشنى كېسەللىك جەريانىنىڭ ئۇزۇن - قىسقىلىقىغا قاراپ ئۈچ خىلغا بۆلۈشكە بولىدۇ.

(1) ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش: كېسەللىك جەريانىنىڭ داۋاملىشىشى ئىككى ھەپتە ئىچىدە بولغۇچىلار، ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش دېيىلىدۇ.

(2) سۆرەلمە خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش: كېسەللىك جەريانىنىڭ داۋاملىشىشى ئىككى ھەپتىدىن ئىككى ئايغىچە بولغۇچىلار، سۆرەلمە خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش دېيىلىدۇ.

(3) سوزۇلما خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش: كېسەللىك جەريانىنىڭ داۋاملىشىشى ئىككى ئايدىن ئاشقانلار، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش دېيىلىدۇ.

ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئۈچەي ياللۇغىدا چوڭ تەرەتنىڭ خاراكتېرى، چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرۈش ئەھۋالى، تارقالغان پەسلى ھەم كېسەل بولغاندىكى يېشىغا ئاساسلىنىپ كېسەللىك پەيدا قىلغۇچىلارنى مۆلچەرلەپ، دورا ئىشلىتىشنى ئاساس قىلىش ئۈچۈن پايدىلىنىش لازىم. بالا سۈدەك تەرەت قىلسا، بۇنىڭ كۆپىنچىسىنى چاقىسىمان ۋىرۇس ياكى ئۈچەي زەھىرى ئىشلەپچىقىرىش تىپلىق باكتېرىيىلار پەيدا قىلىدۇ، بالىلاردا بولۇپمۇ ئىككى ياشتىن كىچىك بالىلاردا كۆز، قىش پەسلىدە ئىچى سۈرۈش كۆرۈلسە، چاقىسىمان ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى بولغانلىقىنى، چوڭ ئادەملەردە 5، 6- ئايلاردا ئىچى سۈرۈش كۆرۈلسە، چوڭلار تىپلىق چاقىسىمان ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى بولغانلىقىنى؛ بالىلاردا ياز پەسلىدە ئىچى سۈرۈش كۆرۈلسە، توكسىن ئىشلەپچىقىرىش تىپلىق چوڭ ئۈچەي تاياقچە

باكتېرييىلىك ئۈچەي ياللۇغى بولغانلىقىنى؛ ئەگەر سۈدەك تەرەت قىلسا ياكى مېتاتىغا ئوخشاش تەرەت قىلىپ توختىمىسا، بۇنىڭغا قۇسۇش قوشۇلۇپ كېلىپ تېزدىن ئېغىر دەرىجىدە سۈزلىنىش پەيدا بولسا، خولېرا كېسەللىكىنى، ئەگەر كېسەلنىڭ چوڭ تەرتى شىلمىشىق ياكى قان، يىرىڭلىق بولسا ھەم قۇرۇق ئىنجىق بولسا، باكتېرييىلىك تولغاقنى ئويلىشىش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا، باكتېرييىلىك يۇقۇملارنىمۇ يەنى بۆسۈپ كىرىش خاراكتېرلىك چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرييىلىك ئۈچەي ياللۇغى، ئاچچىق ئۈچەي ئەگرى باكتېرييىلىك ئۈچەي ياللۇغى ياكى سالمۇنىلا باكتېرييىلىك ئۈچەي ياللۇغى قاتار-لىقلارنىمۇ ئويلىشىش كېرەك. ئەگەر چوڭ تەرەتتە قان كۆپ، يىرىڭ ئاز بولۇپ، مۇرابباغا ئوخشاش تەرەت قىلسا، كۆپىنچىسى ئامىوبالىق تولغاق بولىدۇ.

شارائىتى بار ئورۇنلار باكتېرىيە، ۋىرۇس ھەم پارازىت قۇرت قاتارلىق كېسەللىك پەيدا قىلغۇچىلارنى تەكشۈرۈپ، كېسەللىك پەيدا قىلغۇچىلار ئىلمى بويىچە دىئاگنوز قويۇش يەنى باكتېرييىلىك تولاغاق، ئامىوبالىق تولغاق، خولېرا، چاشقان كېزىك سالمۇنىلا باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى، ئىچ سۈرۈشنى قوزغاتقۇچى چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرييىلىك ئۈچەي ياللۇغى، ئاچچىق ئۈچەي ئەگرى باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى، چاقىسىمان ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى، تاجسىمان ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى، يېشىل ئامۇتسىمان قامچا قۇرت-لۇق ئۈچەي ياللۇغى، مىكو پلازىملىق ئۈچەي ياللۇغى قاتارلىقلارنى ئايرىپ دىئاگنوز قويۇش لازىم.

يۇقۇملىنىشىز خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش كېسەللىكى: بۇنىڭدا كېسەللىك تارىخى، ئالامىتى ھەم بەدەن تەكشۈرۈشكە ئاساسەن

ئانالىز قىلىپ، يېمەك - ئىچمەك خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش، ئالامەت خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش، زىيادە سەزگۈرلۈك خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش، شېكەر مەنبەلىك ئىچى سۈرۈش كېسەلى قاتارلىقلارنى ئايدىرپ چىقىش لازىم.

6. كلىنىكىلىق ئىپادىسى

ئوخشىمىغان كېسەل سەۋەبى قوزغاتقان ئىچى سۈرۈشتە دائىم ئوخشىشىپ كېتىدىغان كلىنىكىلىق ئالامەتلەر بولىدۇ، لېكىن يەنە ھەر قايسىسىنىڭ ئوخشىمىغان كلىنىكىلىق ئالاھىدىلىكى بولىدۇ.

1. ئىچى سۈرۈشنىڭ ئورتاق كلىنىكىلىق ئىپادىسى.

بۆسۈپ كېرىش خاراكتېرلىك باكتېرىيىلەردىن باشقا كېسەل سەۋەبلىرى قوزغاتقان ئىچى سۈرۈش (بۇ يۇقۇملانغان خاراكتېرلىك ۋە يۇقۇملانمىغان خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) كلىنىكىدا ئىككى تىپقا بۆلىنىدۇ.

(1) يېنىك تىپلىق ئىچى سۈرۈش - بۇنىڭ كۆپىنچىسىنى

يېمەكلىك ئامىلى ياكى ئۈچەي يوللىرى سىرتقى يۇقۇملانغان قوزغىتىدۇ، ياكى ئۈچەي يوللىرى ئىچىدىكى ۋىرۇس، ياكى بۆسۈپ كېرىش خاراكتېرى بولمىغان باكتېرىيىلەر بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن كېلىپ چىقىدۇ. ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرىدىكى ئالامەت ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ. ئىشتىھاسىزلىنىدۇ، ئارىلاپ سۈت ياندۇرىدۇ ياكى قۇسىدۇ، چوڭ تەرەت قېتىم سان كۆپىيىدۇ، بىر كۈندە 10 قېتىمغا يېتىدۇ، تەرەت مىقدارى كۆپ بولمايدۇ، سۇيۇق ياكى ئازراق سۇ بولىدۇ، رەڭگى سېرىق ياكى يېشىلراق بولۇپ چۈچۈمەل پۇرايدۇ، ئىچىدە ئېقىش ياكى سارغۇچىراق ئېقىش سۈت مۇنەكچىلىرى (ماغزاپ-)

سىمان) ئارىلىشىپ كېلىدۇ ياكى ئازراق شىلىمشىق ئارىلىشىپ كېلىدۇ، قان - يىرىڭ بولمايدۇ، چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرسە، كۆپ مىقداردا ماي دانىچىلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. كېسەل بالىدا پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلەر روشەن بولمايدۇ، روھىي كەيپىياتى ياخشى بولىدۇ، كۆپىنچىسىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى نورمال بولىدۇ ياكى تۆۋەن قىزىتما بولىدۇ، بەدەن ئېغىرلىقى ئاشمايدۇ ياكى سەل تۆۋەنلەيدۇ، سۇسىزلىنىش ئالامەتلىرى بولمايدۇ. ئۆز ۋاقتىدا داۋالسا بىر نەچچە كۈن ئىچىدە ساقىيىپ كېتىدۇ.

(2) ئېغىر تىپلىق ئىچى سۈرۈش - بۇنىڭ كۆپىنچىسىنى ئۈچەي يوللىرى ئىچى يۇقۇملىنىش پەيدا قىلىدۇ، بۇنىڭدا كېسەللىك جىددىي باشلىنىدۇ، بۇ تىپىدا نىسبەتەن ئېغىر ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرى ئالامىتى بولۇپ، سۇسىزلىنىش، ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىش ھەم پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامىتى روشەن بولىدۇ. مەسىلەن: بىئارام بولىدۇ، روھسىز، مۈگدەيدۇ، خاموش بولىدۇ ھەتتا ھوشسىزلىنىدۇ، يۇقىرى قىزىتما بولىدۇ ياكى بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلىمەيدۇ. تۆۋەندە ئايرىم - ئايرىم توختىلىمىز.

(1) ئاشقازان - ئۈچەي يوللىرى ئالامىتى - ئىشتىھاسىزلىنىدۇ، دائىم قۇسىدۇ، ئېغىرلىرىنىڭ قۇسۇقىدا زىغىرەڭ نەرسىلەر بولىدۇ، كەينى - كەينىدىن ئىچى سۈرىدۇ. كۈنلۈكى 10 قېتىمدىن كۆپ ھەتتا 10 نەچچە قېتىمغا يېتىدۇ، چوڭ تەرەت يېشىلراق رەڭدە، سېرىق ياكى سارغۇچ كېلىدۇ، ھەر قېتىملىق چوڭ تەرەت مىقدارى كۆپ بولۇپ، تۇخۇم شورپىسىدەك ياكى سۇغا ئوخشاش كېلىدۇ، تەركىبىدە ئازراق شىلىمشىق ئارىلىشىپ كېلىدۇ. چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە ماي شارچىلىرى ھەم ئازراق ئاق قان ھۈجەيرىلىرىنى

كۆرگىلى بولىدۇ.
(2) سۇ، ئېلېكترولىت ۋە كىسلاتا - ئىشقار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىدا قانلىشىدۇ.

سۇسزلىنىش

سۇسزلىنىش بەدەن سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي مىقدارى، بولۇپمۇ ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى مىقدارىنىڭ ئازىيىپ كېتىشى سۇسزلىنىش دېيىلىدۇ. سۇسزلىنىشتىكى سەۋەب: ① ئىچى سۈرۈش، قۇ-سۇش سەۋەبىدىن بەدەن سۇيۇقلۇقىنى كۆپ مىقداردا يوقىتىدۇ؛ ② ئوزۇقلانماسلىقتىن بەدەنگە كىرىدىغان سۇيۇقلۇق مىقدارى ئازلايدۇ، نەتىجىدە سۇسزلىنىش پەيدا بولىدۇ. سۇسزلىنىغاندا سۇ يوقىتىشتىن باشقا ناتىرىي، كالىي ۋە باشقا ئېلېكترولىتلارنىمۇ يوقىتىدۇ.

سۇسزلىنىش دەرىجىسى، يوقاتقان بەدەن سۇيۇقلۇقى مىقدارىغا ئاساسلىنىپ سۇسزلىنىش يېنىك، ئوتتۇرا، ئېغىر دەپ ئۈچ دەرىجىگە ئايرىلىدۇ. خاراكتېرى ئوخشاش بولغان سۇسزلىنىش بىلەن ئاغرىغان بالىلاردا سۇسزلىنىشنىڭ دەرىجىسى بىردەك بولمايدۇ، سۇسزلىنىش دەرىجىسىنى توغرا مۆلچەرلەش، سۇسزلىنىشنى تۈزىتىشتە بېرىلىدۇ. خان سۇيۇقلۇق مىقدارىنى بەلگىلەشتە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. ئادەتتە بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ يوقىتىلىشى بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ % 6 ~ 5 نى ئىگىلىگەندە، يەنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىدىن 60 ~ 50 مىللىلىتىر بەدەن سۇيۇقلۇقى ئازلىغاندا، ئاندىن سۇسزلىنىش بەلگىسى ۋە ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئەگەر بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ يوقىلىشى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىدا 150 مىللىلىتىردىن ئېشىپ كەتسە، بالىنىڭ ھاياتىغا خەۋپ يېتىدۇ، ھەتتا ئۆلۈپ كېتىدۇ. سۇسزلىنىش دەرىجىسىنى مۆلچەرلىگەندە كېسەللىك تارىخىنى ئەستايىدىل

سوراش، ئىچى سۈرگەن ۋاقتى، قېتىم سانى، ھەر قېتىملىق چوڭ تەرەت مىقدارى، سۇنىڭ ئاز - كۆپلۈكى، قان - يىرىڭ بار - يوقلۇقى، سۈيدۈك مىقدارى، قېتىم سانى، دوختۇرغا كۆرۈنۈشتىن ئىلگىرى قانچىلىك سىيگەنلىكى، ۋاقتى، قۇسۇش قېتىم سانى، مىق-دارى، قىزىتىش بار - يوقلۇقى قاتارلىقلارنى سوراشتىن سىرت، بەدىنىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش بىلەن بىرگە تۆۋەندىكى ئالامەت ۋە بەلگىلەرنى توغرا، ئەستايىدىل مۆلچەرلەش لازىم.

a. روھىي ھالىتىنىڭ ياخشى، ناچار، بىئارام، روھسىز، مۈگدەش، بېھۇشلۇقنىڭ بار - يوقلۇقىغا؛ b. ئالدىنقى لىپىلداق ۋە كۆز چانقىق-نىڭ ئولتۇرۇشقان ياكى ئولتۇرۇشمىغانلىقى، بالا يىغىلغاندا ياش-نىڭ بار - يوقلۇقى؛ c. تېرە ۋە شىللىق پەردىلەردە قۇرغاقلىشىشنىڭ بار - يوقلۇقىغا، كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردە، ئېغىز، كالپۇك، تىللارنىڭ قۇرغاقلىشىش ئەھۋالىغا؛ d. تېرىسىنىڭ ئېلاستىكىلىق ئەھۋالى؛ e. قان ئايلىنىشنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچراش ئەھۋاللىرىنىڭ بار - يوقلۇقىغا؛ f. سۈيدۈك مىقدارىنىڭ نورمال، ئاز ياكى سۈيدۈك بولماسلىق قاتارلىقلارغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا شارائىت بولسا قاندىكى ناترىي، خلور، كالىي، كالتسىي، كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش كۈچى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ ئەتراپلىق ئانالىز قىلىش، سۇسىزلىنىش دەرىجىسىنى بېكىتىشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. شۇنداق قىلغاندا ئاندىن ھەقىقىي يوقاتقان مىقدارى ۋە بەدەن ئېغىرلىقىدا ئىگىلىگەن نىسبىتىنى مۆلچەرلىگىنى بولىدۇ. سۇسىزلىنىشنى مۆلچەر-لەشتە يەنە ئىچى سۈرۈشتىن ئىلگىرىكى بەدەن ئېغىرلىقى بىلەن ئىچى سۈرگەندىن كېيىنكى بەدەن ئېغىرلىقى پەرق قىممىتىنى ئىگىلىگەندە تېخىمۇ ئىشەنچلىك ئۆلچەم بولالايدۇ. تۆۋەندە سۇسىزلىنىش دەرىجى-

سىنى ئايرىم - ئايرىم تونۇشتۇرىمىز:

6- جەدۋەل. ئوخشىمىغان دەرىجىلىك سۇسزلىنىشنى پەرقلەندۈرۈش

ئالامىتى	يېنىك دەرىجىلىك	ئوتتۇرا دەرىجىلىك	ئېغىر دەرىجىلىك
روھى ھالىتى	سەل ناچار	روھسىز ياكى بىئارام	مۈگدەيدۇ ياكى ھوشسىزلىنىدۇ
ئالدىنقى لىپىلداق، كۆز چانقى	سەل ئولتۇرۇشىدۇ	كۆرۈنەرلىك ئولتۇرۇشىدۇ	چوڭقۇر ئولتۇرۇشىدۇ
تېرەۋەشلىق پەردە	سەل قۇرۇيدۇ	قۇرغاقلىشىدۇ، يىغلىسا	سەل قۇرغاقلىشىدۇ، يىغلىسا ياش چىقمايدۇ
تېرمېلاستىكىلىقى	سەل ناچار	ناچارلىشىدۇ	بەك ناچار
قان ئايلىنىش توسقۇنلۇققا ئۇچراش	يوق	سەل ناچار	روھى ياكى شوڭ بولۇپ قالىدۇ
سۈيىدۈك مىقدارى	سەل ئازلايدۇ	كۆرۈنەرلىك ئازلايدۇ	ئىنتايىن ئاز ياكى يوق
ئازالغان بەدەن ئېغىرلىقى	5 %	5 ~ 10 %	10 ~ 12 %
يوقاتقان بەدەن سۈيۈقلۈكى مىقدارى (ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى)	50 مىللىلىتىر	60 ~ 100 مىللىلىتىر	100 ~ 120 مىللىلىتىر

يېنىك دەرىجىلىك سۇسزلىنىش يوقاتقان سۇنىڭ مىقدارى تەخمىنەن بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ 5 % گە توغرا كېلىدۇ. يەنى يوقاتقان بەدەن سۈيۈقلۈكى مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىدىن 50 مىللىلىتىردىن يوقىتىدۇ، سەل روھسىزلىنىدۇ ياكى سەل بىئارام بولىدۇ، تېرىسى سەل قۇرغاقلىشىدۇ، تېرىنىڭ ئېلاستىكىلىقى سەل ناچارلىشىدۇ، ئالدىنقى لىپىلداق بىلەن كۆز چانقى سەل ئولتۇرۇشىدۇ، بالا يىغلىسا ياش چىقىدۇ، ئېغىز بوشلۇقى شىللىق پەردىسى سەل

قۇرغاقلىشىدۇ، سۈيىدۈك مىقدارى سەل ئازلايدۇ.

ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسىزلىنىش يوقاتقان سۇ مىقدارى تەخمىنەن بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %10 ~ 5 گە باراۋەر بولۇپ، يوقاتقان بەدەن سۇيۇقلۇقى مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىدىن 100 ~ 50 مىللىلىتىردىن يوقىتىدۇ، بالا روھسىزلىنىدۇ ياكى جىدەل قىلىپ بىئارام بولىدۇ، تېرىسى تاتىرىپ قۇرغاقلىشىدۇ، تېرىنىڭ ئېلاستىكىلىقى ناچارلىشىدۇ، كۆز چانقى ۋە ئالدىنقى لىپىلداق روشەن ئولتۇرۇشىدۇ، يىغىلغاندا ياش ئاز چىقىدۇ، ئېغىز بوشلۇقى شىللىق پەردىسى قۇرغاقلىشىدۇ، پۇت - قوللىرى سەل مۇزلايدۇ، سۈيىدۈك مىقدارى كۆزگە كۆرۈنەرلىك ئازلايدۇ.

ئېغىر دەرىجىلىك سۇسىزلىنىش يۇقىرىدىكى ئالامەتلەر ئېغىرلىشىدۇ، يوقاتقان بەدەن سۇيۇقلۇقى ئومۇمىي بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %12 ~ 10 نى ئىگىلەيدۇ. يەنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىدىن 120 ~ 100 مىللىلىتىردىن سۇ يوقىتىدۇ. بالا ئېغىر كېسەل چىراي كېلىدۇ، ئىنتايىن روھسىز بولىدۇ، تەلەتى سۆرۈنلىشىدۇ، بېھوش ئۇخلايدۇ، ھەتتا ھوشسىزلىنىدۇ، تېرىلىرى كۆكرىپ قۇرغاقلىشىدۇ، تېرە ئېلاستىكىلىقى ئىنتايىن ناچارلىشىدۇ، ئالدىنقى لىپىلداق ۋە كۆز چاندەك قى چوڭقۇر ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ، ئۇخلىغاندا كۆزى يۇمۇلمايدۇ، يىغىلسا ياش چىقمايدۇ، بىر يەرگە قارىغاندا ئىككى كۆزى قاقىلىپ قالىدۇ، ئېغىز بوشلۇقى شىللىق پەردىسى ئىنتايىن قۇرۇپ كېتىدۇ. قان سىغىمچانلىقى كۆزگە كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىگەنلىكتىن، شوڭ ئالا-مەتلىرى كۆرۈلىدۇ، تېرىسى ئالا - چىپارلىشىدۇ، تومۇرى ئىنچىكە، تېز سالىدۇ، قان بېسىم تۆۋەنلەيدۇ، پۇت - قوللىرى مۇزلايدۇ، سۈيىدۈك مىقدارى ئىنتايىن ئاز ياكى سۈيىدۈك كەلمەيدۇ.

سۇسزلىنىشنىڭ خاراكتېرى: بۇ، بەدەن سۇيۇقلۇقى ئوسموس بېسىمىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كۆرسىتىدۇ. سۇسزلانغاندا، سۇ ۋە ئېلېكت-رولتار بىردەك يوقىتىلىدۇ، لېكىن ئوخشىمىغان كېسەل سەۋەبلىرى قوزغىغان سۇسزلىنىشتا سۇ ۋە ئېلېكترولت (ئاساسلىقى ناترىي) نىڭ يوقىتىلىش نىسبىتى ئوخشاش بولمايدۇ، شۇنىڭ بىلەن بەدەن سۇيۇق-لۇقى ئوسموس بېسىمىدا ئوخشىمىغان ئۆزگىرىش كېلىپ چىقىشقا سەۋەب بولىدۇ. سۇسزلانغاندا بەدەن سۇيۇقلۇقى ئوسموس بېسىمى-نىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسلىنىپ، سۇسزلىنىشنى تەڭ ئوسموسلۇق، تۆۋەن ئوسموسلۇق، يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش دەپ ئۈچكە بۆلىنىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە تەڭ ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئۇندىن قالسا تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش، يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش ئاز ئۇچرايدۇ. ناترىي ئىئونى ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئوسموس بېسىمىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى، شۇنىڭ ئۈچۈن قان پلازىمىسىدىكى ناترىي ئىئونىنىڭ تۇتقان مىقدار-نى ئۆلچەش ئارقىلىق، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى ئوسموس بېسى-مىنىڭ يۇقىرى ياكى تۆۋەنلىكى مۆلچەرلىنىدۇ.

نورمال ئەھۋالدا قان پلازىمىسىدىكى ناترىي ئىئونىنىڭ قۇيۇقلۇق دەرىجىسى $145 \sim 135 \text{ mmol/L}$ بولۇپ، سۇسزلانغاندا ناترىي ئى-ئونىنىڭ قۇيۇقلۇق دەرىجىسى يۇقىرىدا ئېيتىلغان دائىرە ئىچىدە بولسا، بۇ خىل سۇسزلىنىش تەڭ ئوسموسلۇق بولىدۇ، 135 mmol/L دىن تۆۋەن بولسا، تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش، 145 mmol/L دىن يۇقىرى بولسا، يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش دېيىلىدۇ.

تەڭ ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش: بۇنىڭدا سۇ ۋە ئېلېكترولتلار (ئاساسلىقى ناترىي) تەڭ نىسبەتتە يوقىلىدۇ، قان پلازىمىسىدىكى ناترىي

135~145mmol/L بولىدۇ. ھەر خىل كېسەل سەۋەبلىرى قوزغاتقان سۇسزلىنىشتا، يوقاتقان سۇ بىلەن يوقاتقان ناترىينىڭ نىسبىتى ئوخشاش بولمايدۇ، مۇبادا ئۇنىڭ نىسبىتىدىكى پەرق زور بولمىغاندا بۆرەكنىڭ تەڭشىشى ئارقىلىق، بەدەن سۇيۇقلۇقى تەڭ ئوسموسلۇق ھالەتنى ساقلايدۇ، شۇڭا تەڭ ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. بەدەن سۇيۇقلۇقىدىكى ئاساسلىق ئۆزگىرىش ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى مىقدارى ھەم ئايلىنىۋاتقان قان مىقدارى ئازلايدۇ، لېكىن ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى مىقدارىدا كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بولمايدۇ. ھۈجەيرە ئىچى، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىنىڭ ئوسموس بېسىمى بىردەكلا نورمال بولىدۇ. بۇ خىل سۇسزلىنىش، بوۋاقلاردىكى مۇددىتى قىسقىراق بولغان ئىچى سۈرۈشلەردە، ئوزۇقلىنىش ئەھۋالى نىسبەتەن ياخشى بولغان ئاغرىق بالىلاردا كۆرۈلىدۇ. كلىنىكىدا يۇقىرىدا سۆزلەنگەن سۇسزلىنىشنىڭ ئادەتتىكى ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش: ناترىينىڭ يوقىلىشى سۈدىن كۆپ بولىدۇ. سۇسزلىنىشقا تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. قان زەردابىدىكى ناترىينىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى 135mmol/L دىن تۆۋەن بولىدۇ. بۇ خىل سۇسزلىنىش ئوزۇقلۇقلىنىش ناچارلاشقان، ئىچى سۈرۈش ۋاقتى بىر قەدەر ئۇزۇن بولغان، سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاش جەريانىدا تەركىبىدە ناترىي ئاز، سۇ كۆپ بولغان سۇيۇقلۇقنى كىرگۈزگەن ياكى سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى ئىشلەتكەنلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى مىقدارى ئازلايدۇ، ئوسموس بېسىم تۆۋەنلىگەنلىكتىن سۇ ھۈجەيرە ئىچىگە يۆتكىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى تېخىمۇ ئازلايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭدىكى سۇسزلىنىش بەلگىسى

لىرى باشقا ئىككى خىل سۇسزلىنىشقا قارىغاندا ئېغىر ئۆتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە قان ئايلىنىش مىقدارى كۆزگە كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە ئازىيىدۇ. شۇڭا شوك ئاسانلا پەيدا بولىدۇ. ناتىرىي تۆۋەنلەش ئېغىر بولغۇچىلاردا مېڭە ھۈجەيرىسىدە سۇلۇق ئىششۇق پەيدا بولۇپ، مۈگدەش ھەتتا بېھوشلۇق كۆرۈلىدۇ. بۇ خىل سۇسزلىنىشتا بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ كېمىيىشى ئاز بولىدۇ، لېكىن ئېغىر دەرىجىدىكى كلىن-كىلىق ئالامەتلەر كېلىپ چىقىدۇ، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى تۆۋەن ئوسموس ھالىتىدە تۇرغانلىقتىن بالدا ئۇسساش سېزىمى ئېنىق بولمايدۇ. سۈيۈك ئازلاش ئېغىر بولمايدۇ، كالپۇك شىللىق پەردىسى قۇرغاقلىشىش روشەن بىلىنمەيدۇ. شوك بولغاندا تېرىسى ئالچىپارلىشىدۇ، كۆكرىدۇ، تېرىنىڭ ئېلاستىكىلىقى ناچارلىشىدۇ، ئالدىنقى لىپىلداق، كۆز ئويىمىنى چوڭقۇر ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ، شوك ئالامىتى تەڭ ئوسموسلۇق سۇسزلىنىشتا پەيدا بولغان شوڭقا قارىغاندا روشەن بولىدۇ، ھۈجەيرە ئىچى سۇلۇق ئىششۇق بولغانلىقتىن، نېرۋا سىستېمىسى ئالامىتى ۋە مېڭە سۇلۇق ئىششۇقنىڭ كلىنىكىلىق ئالامىتى كېلىپ چىقىدۇ. مەسلەن: باش ئاغرىش، كۆرۈش كۈچى خۇنۇكلەش، كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، روھسىزلىنىش، مۈگدەش ياكى بېھوشلىشىش، مۇسكۇللار سىپازمىلىنىش ھەم دۆلىنىش قاتارلىق ئالا-مەتلەر روشەن بولىدۇ.

يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسزلىنىش: شۇنىڭ يوقىلىشى ناتىرىي-نىڭ يوقىلىشىغا قارىغاندا نىسبىي ھالدا كۆپ بولۇپ، قاندىكى ناتىرىي ئىئونىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى 145mmol/L دىن يۇقىرى بولىدۇ. بۇ خىل سۇسزلىنىشتا ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى سىغىمچانلىقى تۆۋەنلەيدۇ، ئۇنىڭ ئوسموس بېسىمى يۇقىرىلايدۇ. سۇ ھۈجەيرە

ئىچىدىن ھۈجەيرە سىرتىغا يۆتكىلىپ چىقىدۇ. نەتىجىدە ھۈجەيرە ئىچىدىكى سۇيۇقلۇق ئازىيىپ، ھۈجەيرە ئىچى سۇسىزلىنىدۇ. بۇ خىل سۇسىزلىنىشتا سۇسىزلىنىش ئالامىتى ۋە بەلگىسى ئېغىر بولمايدۇ. بىراق بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ تۆۋەنلىشى روشەن بولىدۇ. ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى ئازىيىپ كەتكەنلىكتىن تېرە، شىللىق پەردىلەر بەك قۇر-غاقلىشىدۇ، بالا بەك ئۇسسايدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى يۇقىرىلايدۇ، بىئارام بولۇپ تىنچىسىزلىنىدۇ، ئوڭايلا جىددىيلىشىدۇ، مۇسكۇللار تەرەڭلىك كۈچى ئېشىپ كېتىدۇ، ھەتتا تارتىشىدۇ. بۇ خىل سۇسىزلىنىش يۇقىرى قىزىتما، تېرە ۋە نەپەسلىنىش ئارقىلىق سۇ يوقىتىش، سۇنى ئاز ئىچكۈزۈش ياكى قۇسۇش، ئىچى سۈرۈشتىن سۇسىزلانغاندا ناتىرىينى كۆپ مىقداردا تولۇقلاش قاتارلىق ئەھۋاللاردا كۆرۈلىدۇ.

تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلى

تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلى ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىدە كۆپ ئۇچرايدىغان ئېلېكترولىت قالايمىقانلىشىش بولۇپ، ئۆز ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلمىسا، بالىنىڭ ھاياتىغا ئېغىر تەھدىت سالىدۇ.

قان زەردابىدىكى كالىيىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى 3.5mEq/L ($14\text{mg}\%$) ياكى 3.5mmol/L دىن تۆۋەن بولسا، تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلى دېيىلىدۇ.

تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى سەۋەبلەر، بەدەنگە كىرىدىغان كالىي مىقدارىنىڭ يېتىشمەسلىكى، يەنى ئۇزاق ۋاقىت تاماق يېگۈسى كەلمەسلىك ياكى ئىنتايىن ئاز يېيىش، تاماق تاللاش، يېمەكلىك تەركىبىدە كالىي يېتەرسىز بولۇش، ئۇزۇن ۋاقىت يېمەكلىك چەكلەش قاتارلىق سەۋەبلەردىن بەدەنگە كىرىدىغان كالىي

7- جەدۋەل. ئوخشىمىغان خاراكتېرلىك سۇسزلىنىشنى پەرقلەندۈرۈش

تۈرلىرى	تەڭ ئوسموسلۇق	تۆۋەن ئوسموسلۇق	يۇقىرى ئوسموسلۇق
پەيدا بولۇش نسبىتى	ئەڭ كۆپ	دائىم كۆرۈلىدۇ	ئاز كۆرۈلىدۇ
سۇ بىلەن ناترىيى يوقىتىش	تەڭ نسبەتتە	ناترىي يوقىتىش سۇدىن كۆپ	سۇ يوقىتىش ناترىيىدىن كۆپ
قان پلازىمىسى دىكى ناترىي	135~145 mmol/L	135mmol/L دىن تۆۋەن	145mmol/L دىن يۇقىرى
ئۇسساش	ئۇسسايىدۇ	ئۇسسمايدۇ	بەك ئۇسسايىدۇ
سۈيۈك مىقدارى	ئازلايدۇ	سەل ئازلايدۇ ياكى ئازلايدۇ	كۆزگە كۆرۈنەرلىك ئازلايدۇ
روھىي ھالىتى	سەل ناچار- لىشىدۇ	بېھوش ئۇخلايدۇ يا- كى ھوشسىزلىنىدۇ	بىئاراملىنىدۇ، ئاسان تېرىكىدۇ
تېرىسى، ئېلاستىكىلىقى	قۇرغاق، ئېلاستىكىلىقى ناچار	مۇزدەك، نەم، يېپىشقاق، ئېلاستىكىلىقى ئىنتايىن ناچار	ئىنتايىن قۇر- غاق، ئېلاستىكى لىقى بىرقە- دەر ياخشى
شىللىق پەردە	قۇرغاقلىشىدۇ	قۇرغاقلاشمايدۇ	بەك قۇرغاق
ئالدىنقى لىپىلداق	ئۆلتۈرۈشىدۇ	بەك ئۆلتۈرۈشىدۇ	ئۆلتۈرۈشىدۇ
كۆز چانقى	ئۆلتۈرۈشىدۇ	ئۆلتۈرۈشىدۇ	ئۆلتۈرۈشىدۇ
تومۇرى	تېز سوقىدۇ	تېز سوقىدۇ	سەل تېز سوقىدۇ
قان بېسىم	تۆۋەنلەيدۇ	بەك تۆۋەنلەيدۇ	سەل تۆۋەنلەيدۇ
سۈيۈك سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى	نورمال	تۆۋەن	يۇقىرى

مقدارى كېمىشتىن پەيدا بولىدۇ يەنە ئىچى سۈرۈش، قۇسۇش، ئاشقازان، ئۈچەيدىن ئاققۇزۇش قاتارلىقلاردا كالىينىڭ سىرتقا چىقىرىلىشى زىيادە كۆپ بولۇپ، تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلى ئاسان پەيدا بولىدۇ. سۈيىدۈكتىن كالىي يوقىتىشنىڭ كۆپ بولۇشى بۆرەك كېسەللىكلىرىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن: ئۆتكۈر بۆرەك زەئىپلىشىشنىڭ سۈيىدۈك كۆپەيگەن دەۋرى، بۆرەك كىچىك كانالىچىسى خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش قاتارلىقلار.

سۈيىدۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى قالايمىقان ئىشلىتىش، سۇسىز-لاندۇرغۇچى دورىلارنى ئۇزۇن ۋاقىت ئىشلىتىش، بۆرەك ئۈستى بەز پوستاناق ھورمونلىرىنى ئۇزۇن ۋاقىت ئىشلىتىش قاتارلىق ئەھۋاللاردا كالىينىڭ سىرتقا چىقىرىلىشى كۆپىيىپ كېتىشىنىمۇ پەيدا بولىدۇ. تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلى پەيدا بولغاندا، كلىنىكىدا تۆۋەندىكى ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ:

(1) نېرۋا مۇسكۇل قوزغىلىشچانلىقى تۆۋەنلەيدۇ. كېسەل بالدا روھسىزلىق، ئوڭاي چارچاش، گەۋدە ۋە پۇت - قوللاردىكى مۇسكۇللار بوشىشىپ جانسىزلىشىش، تېز رېفلېكسى ئاجىزلىشىش ياكى يوقىلىش كۆرۈلىدۇ. ئېغىرلاشقاندا بوشاشقان پالەچلىك كېلىپ چىقىدۇ. ئەگەر نەپەسلىنىش مۇسكۇللىرى پالەچلەنسە، نەپەسلىنىش يۈزلەشىدۇ، ئۇ-چەي مۇسكۇللىرى پالەچلەنسە، قورساق ئېسىلىدۇ، ئۈچەي تاۋۇشى ئاجىزلايدۇ، ھەتتا ئۈچەي پالەچلىنىدۇ.

(2) كالىي تۆۋەنلىگەندە يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قوزغىلىشچانلىقى ئېشىپ كېتىدۇ، نەتىجىدە يۈرەك سېلىش تېزلىشىدۇ، ئېغىرلىرىدا يۈرەك رېتىمى قالايمىقانلىشىدۇ. ئەگەر ئېلېكتروكاردىئوگراممىدا تەك-شۈرگەندە ST بۆلۈكى تۆۋەنلەيدۇ، T دولقۇنى كۆتۈرۈلىدۇ، U دولقۇنى ھاسىل بولىدۇ.

(3) بۆرەك كىچىك كانالچىسى ئۈستۈنكى تېرە ھۈجەيرىسىدە چېكىنىش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش پەيدا بولغانلىقتىن، بۆرەكنىڭ قويۇقلاشتۇرۇش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ، شۇڭا سۈيىدۈك مىقدارى كۆپىيىدۇ.

(4) تۆۋەن كالىلىق قان كېسىلى بىلەن ئىشقاردىن زەھەرلىنىش ئوتتۇرىسىدا ئورتاق مۇناسىۋەت بولغاچقا، كېيىنكى مەزگىلدە ئىشقار-دىن زەھەرلىنىش خاراكتېرلىك قول - پۇت كىرىشىپ قېلىش ئەھۋال-لىرى كۆرۈلىدۇ.

تۆۋەن كالىلىق قان كېسىلىگە دىئاگنوز قويغاندا، كلىنىكىلىق ئالامىتى، قاندىكى كالىنى ئۆلچەش ۋە ئېلېكتروكاردىئوگراممىدا يۈ-رەكنى تەكشۈرۈش قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئانالىز قىلىش لازىم. چۈنكى كالىنىڭ كۆپ قىسمى ھۈجەيرە ئىچىدە بولىدۇ.

ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش ئېغىر تىپلىق ئىچى سۈرۈشتە ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش كۆپ كۆرۈلىدۇ. سۈسزلىنىش دەرىجىسى قانچىكى ئېغىر بولسا، ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زە-ھەرلىنىشمۇ شۇنچە ئېغىر بولىدۇ. كىسلاتادىن زەھەرلىنىش پەيدا بولۇشتىكى ئاساسلىق سەۋەب: ① ئىچى سۈرگەندە كۆپ مىقداردىكى ئىشقارلىق ماددىلار يەنى ناترىي، كالىي قاتارلىقلارنىڭ چوڭ تەرەت بىلەن سىرتقا كۆپ چىقىپ كېتىشتىن؛ ② تاماق يېمەسلىك ياكى ئۈچەي شۈمۈرۈش خىزمىتى ناچار بولۇش، ئوزۇقلىنىش ناچارلىشىش سەۋەبىدىن ماينىڭ پارچىلىنىشى كۆپىيىش نەتىجىسىدە كۆپ مىقداردا كىتون پەيدا بولۇشتىن؛ ③ سۈسزلانغاندا قان قويۇقلىشىپ، قان ئېقىمى ئاستىلاپ، توقۇلمىلارغا ئوكسىگېن يېتىشمەي، سۈت كىسلاتا-سى يىغىلىپ قېلىشتىن يەنە بىر تەرەپتىن بۆرەك قان ئېقىمى يېتەرسىز بولغانلىقتىن كىسلاتانى چىقىرىپ، ئىشقارنى ساقلاش ئىقتىدارىنىڭ

تۆۋەنلەپ كېتىشتىن ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەر-
لىنىش پەيدا بولىدۇ.

كىلىنىكىدا يېنىك دەرىجىدە كىسلاتادىن زەھەرلەنگەندە ئالامىتى
روشن بولمايدۇ. پەقەت نەپەسلىنىش سەل تېزلىشىدۇ، ئەگەر قاندىكى
كاربون IV ئوكسىدنىڭ بىرىكىش كۈچىنى (CO_2CP) ئۆلچىمىسە،
ئاسانلىقچە دىئاگنوز قويغىلى بولمايدۇ. ئېغىر دەرىجىدە كىسلاتادىن
زەھەرلەنگەندە نەپەس چوڭقۇر، تېز بولىدۇ، روھسىزلىنىدۇ، بىئارام
بولۇپ تىنچىسىزلىنىدۇ، مۈگدەيدۇ، قۇسىدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ. كالىي-
كى گىلاس رەڭگىدە قىزىرىدۇ، لېكىن يېڭى تۇغۇلغان ۋە ئالتە
ئايلىقتىن كىچىك بوۋاقلاردا نەپەسلىنىشنى تەڭشەش خىزمىتى نىسبە-
تەن ناچار بولغانلىقتىن، نەپەسلىنىشتىكى ئۆزگىرىش تىپىك بولمايدۇ.
كۆپ ھاللاردا روھسىزلىق، ئۇيقۇسىراش، چىرايى تاتىرىش، سۈت
ئېمىشنى رەت قىلىش قاتارلىقلار بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

ئېغىر دەرىجىدىكى كىسلاتادىن زەھەرلىنىشتە $\text{pH} < 7.20$
بولغاندا يۈرەك سوقۇشى ئاستىلايدۇ، ئەتراپ قان تومۇرلار قارشىلىق
كۈچى تۆۋەنلەيدۇ، يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىش كۈچى ئاجىزلىشى-
دۇ ۋە يۈرەك چىقىرىش مىقدارى ئازلايدۇ، شۇنىڭ بىلەن قان بېسىم
تۆۋەنلەيدۇ، يۈرەك زەئىپلىشىدۇ، ھەتتا ھاياتقا خەۋپ يېتىدۇ. كىسلاتا-
دىن زەھەرلىنىشنىڭ داۋاملىشىشى ئۇزۇنغا سوزۇلسا، $12 \sim 36$
سائەت) قىزىل قان ھۈجەيرىسىدىكى شېكەرنىڭ پارچىلىنىشى ئاس-
تىلايدۇ، قان قىزىل ئاقسىلىنىڭ ئوكسىگېننى بىرىكتۈرۈش كۈچى
كۈچىيىدۇ. بۇندىن باشقا كىسلاتادىن زەھەرلەنگەندە HCO_3^- ھەم
 pH بىردەك تۆۋەنلىگەنلىكتىن، H^+ ئىئونى ھۈجەيرە ئىچىگە كىرىپ
 K^+ بىلەن ئالمىشىدۇ، نەتىجىدە ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىكى كالىي
ئازلايدۇ، ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى كالىي كۆپىيىدۇ، بۇ يۈرەك

رېتىمىزلىقى كېلىپ چىقىشقا تۈرتكە بولىدۇ. ماددا ئالەمشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشتە قان پىلازمىسىدىكى ئەركىن كالتسىي كۆپىيىدۇ، كىسلاتادىن زەھەرلىنىش تۈزەلگەندىن كېيىن تۆۋەنلەيدۇ، ئەسلىدە تۆۋەن كالتسىيلىق قان كېسىلى بار ئاغرىق بالىلاردا قول - پۇت تارتىشىش كۆرۈلۈشى ياكى تارتىشىش پەيدا بولۇشى مۇمكىن. كىلىنىكىدا قان پىلازمىسىدىكى HCO_3^- ياكى CO_2CP غا ئاساسلىنىپ كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى يېنىك، ئوتتۇرا، ئېغىر دەرىجىلىك دەپ ئۈچ خىلغا بۆلۈشكە بولىدۇ (8-جەدۋەلگە قاراڭ).

8-جەدۋەل. ئوخشىمىغان دەرىجىدىكى ماددا ئالەمشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنىڭ ئىپادىسى

بىلىم	ئوتتۇرا	يېنىك	روھىي ھالىتى
يېرىم ھوشسىز ياكى ھوشسىز تارتىشىدۇ گىلاس رەڭ ياكى كۆكرىدۇ تېز، چوڭقۇر نەپەسلىنىدۇ رەتسىز كۆكرىدۇ 20 دىن تۆۋەن	بىئارام ياكى مۇگدەيدۇ، بوشىش كېتىدۇ گىلاس رەڭگىدە تېز، چوڭقۇر نەپەسلىنىدۇ ئاتىرىپ كۆكرىدۇ 20 ~ 30	بىئارام بولىدۇ ئۆزگىرىش رو-شەن بولمايدۇ سەل تېزلىشىدۇ ئاتىرىدۇ 30 ~ 40	كالىپۇك رەڭگى نەپەسلىنىشتە كى ئۆزگىرىش رەڭگى قان پىلازمىسىدىكى CO_2CP (ھەجىم پىرسەنت) مىللى ئېكۋىۋالېنت / لىتر (mEq/L) mmol/L
10 دىن تۆۋەن	10 ~ 15	15 ~ 20	
9 دىن تۆۋەن	9 ~ 13	13 ~ 18	

تۆۋەن كالتسىي ۋە تۆۋەن ماگنېلىق قان كېسلى

ئىچى سۈرگەن بالىلارنىڭ يەپ - ئىچىدىغىنى ئاز، ھەزىم قىلىشى ناچار، چوڭ تەرەتتىن كالتسىي بىلەن ماگنېي يوقالغاچقا، بەدەندىكى كالتسىي بىلەن ماگنېي تۆۋەنلەيدۇ، ئادەتتە يېنىك دەرىجىدە تۆۋەنلەيدۇ. بىراق ئىچى سۈرگەن ۋاقتى ئۇزۇن ياكى ھەرىكەتچان راخت كېسلى بار بالىلارنىڭ ئىچى سۈرگەندە، قاندىكى كالتسىي تۆۋەنلەش روشەنرەك بولىدۇ. لېكىن سۇسىزلىنىش ۋە ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلەنگەندە، قان قويۇقلاشقان ۋە كالتسىي ئىئونى كۆپەيگەنلىكتىن، كالتسىي تۆۋەنلىك ئالامىتى كېلىپ چىقمايدۇ. سۇسىزلىنىش ۋە كىسلاتادىن زەھەرلىنىشكە قارىتا سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالانغاندىن كېيىن، سۇسىزلىنىش ۋە كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنىڭ تۈزىتىلىشى بىلەنلا، كالتسىي ئىئونى ئازىيىدۇ، مۇشۇ ۋاقىتتا پۇت - قوللار تارتىشىش كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. مۇنداق ئەھۋالدا تۆۋەن كالتسىيلىق قان كېسلىنى ئويلىشىش لازىم. قاندىكى كالتسىي - نىڭ نورمال قىممىتى $2.2 \sim 2.7 \text{ mmol/L}$ ($9 \sim 11 \text{ mg\%}$) بولىدۇ. ئادەتتە 2.2 mmol/L ($9 \text{ mg\%}$) دىن تۆۋەن بولغاندا، تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ.

ماگنېي ھۈجەيرە ئىچىدىكى مۇھىم مۇسبەت ئىئون بولۇپ، بەزىبىر فېرمېنتلارنى ئاكتىپلاشتۇرۇش، شېكەر ۋە ئاقسىللارنىڭ سۈمۈرۈلۈش جەريانىدا مۇھىم رولى بار. نورمال قىممىتى $0.74 \sim 0.99 \text{ mmol/L}$ بولىدۇ. ئادەتتە يېمەكلىك تەركىبىدە ماگنېي مول بولۇپ، ئاسانلىقچە كەمچىل بولمايدۇ. لېكىن يېمەكلىك چەكلەش ۋاقتى ئۇزۇن بولۇش ياكى سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈش، ئىچى سۈرۈش، شۈمۈرۈش ناچارلىشىش قاتارلىق ئەھۋاللاردا ماگنېي تۆۋەنلەش كۆرۈلىدۇ، كۆپىنچە قاندىكى نات-

رېي، كالىي ئەسلىگە كېلىپ، نورمال بولغاندىن كېيىن، ماگنىي تۆۋەنلىگەنلىكىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، كلىنىكىدا ئىچى سۈرۈپ سۇسىزلانغان بالىلارغا سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈپ داۋالغاندىن كېيىن تىت-رەش، پۇت - قوللار تارتىشىش كۆرۈلسە، كالتسىيلىق بىرىكمىلەرنى بېرىپ داۋالاپ ئۈنۈمى بولمىغاندا، ماگنىي كەملىكىنى ئويلىشىش لازىم. ماگنىي تۆۋەنلىك كۆپىنچە ئىچى سۈرگەن ۋاقتى ئۇزۇنغا سوزۇلغان، ئوزۇقلىنىش ناچارلىق كېسلى بار بالىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

تۆۋەن فوسفورلۇق قان كېسلى

ئىچى سۈرگەن بالىلاردا، بولۇپمۇ ئوزۇقلىنىش ناچارلىشىش كېسەللىكى بار، ئىچى سۈرگەن ۋاقتى ئۇزۇن ياكى ھەرىكەتچان راخت كېسەللىكى بار بالىلارنىڭ ئىچى سۈرگەندە، تۆۋەن فوسفورلۇق قان كېسلى پەيدا بولىدۇ. سەۋەب: بەدەنگە كىرىدىغىنى ئاز بولۇش، شۈمۈرۈش ناچار بولۇش، ئىچى سۈرۈش قاتارلىق سەۋەبلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، لېكىن كۆپ ئەمەس. يېمەكلىكنى ئىنتايىن ئاز ئىستېمال قىلىدىغان بالىلارغا تەركىبىدە فوسفور بولمىغان سۇيۇقلۇقنى تولۇقلىغاندا، قاندىكى فوسفور تۆۋەنلەش كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. چۈنكى سۇيۇق-لۇق تولۇقلىغاندىن كېيىن، قان سۇيۇلىدۇ. فوسفور سۇيىدۈكتىن كۆپ مىقداردا چىقىپ كېتىدۇ. كىرگۈزۈلگەن گلۇكوزا فوسفورنىڭ ھۈجەيرە سىرتىدىن ھۈجەيرە ئىچىگە يۆتكىلىشىنى تېزلىتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن فوسفور تۆۋەنلەش كېلىپ چىقىدۇ.

فوسفور (P^-) ھۈجەيرە ئىچىدىكى مۇھىم مۇسبەت ئىئون بولۇپ، بارلىق توقۇلمىلارنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى، ئۇ شېكەر، ئاقسىل، ماي ۋە باشقا نۇرغۇنلىغان ماددىلارنىڭ ماددا ئالمىشىش جەريانىغا قاتنىشىدۇ. فوسفور كەمچىل بولسا، يېسىمان تەنچىنىڭ

ئېلېكترونلۇق يەتكۈزۈش سىستېمىسى ۋە ئوكسىگېنلىق فوسفورلىشىش توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. ATP ھاسىل بولۇش ئازلايدۇ، توقۇلمىلارنىڭ ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلىنىشى يېتەرسىز بولىدۇ.

قان قىزىل ئاقسىلنىڭ ئوكسىگېن بىلەن بىرىكىشى كۈچىيىپ، ئوكسىگېن رېسوتسىياتسىيە ئەگىرىشى سىزىقى سولغا سىلجىيدۇ، بۇنىڭ بىلەن توقۇلمىلاردا ئوكسىگېن يېتىشمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ھەر قايسى سىستېمىلارنىڭ خىزمىتى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. كلىنىكىدا يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىلىك تۆۋەن فوسفورلۇق قان كېسىلىدە كلىنىكىلىق ئالامەتلەر بولمايدۇ. ئېغىرلىرىدا ($<0.5\text{mmol/L}$) مۈگدەش، روھىي قالايمىقان بولۇش ياكى بېھوشلۇق كۆرۈلىدۇ. مۇسكۇللار ۋە يۈرەكنىڭ قىسقىرىشى ئاجىزلىشىدۇ، نەپەسلىنىش يۈزەلشىدۇ، قان ئېرىش كۆرۈلىدۇ. ئىچى سۈرگەن كېسەللەردە كېسەللىك جەريانى قىسقىراق بولغانلىقتىن، فوسفور كەملىك ئېغىر بولمايدۇ، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ياخشىلىنىشى، ئىشتىيا ئېچىلىپ ئوزۇقلىنىشقا باشلىغاندىن كېيىن ياخشىلىنىپ كېتىدۇ، ئايرىم فوسفور تولۇقلاش ھاجەتسىز.

بۆسۈپ كىرىش خاراكتېرلىك باكتېرىيىلەر قوزغاتقان ئۈچەي ياللۇغنىڭ كلىنىكىلىق ئالامىتى باكتېرىيىلىك تولغاق بىلەن ئوخشەشپ كېتىدۇ. ئاساسلىقى كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق ئاغرىش، كەينى - كەينىدىن ئىچى سۈرۈش، چوڭ تەرەت شىلىمىش، قان-يىرىڭلىق بولۇش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە كۆپ مىقداردا ئاق قان ھۈجەيرىلىرى ۋە سانى ئوخشەشمىغان دەرىجىدىكى قىزىل قان ھۈجەيرىلىرى بايقىلىدۇ. ھەمدە يۇتقۇچى ھۈجەيرىلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئادەتتە كلىنىكىلىق ئالامەتلىرى ئېغىر، پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامىتى روشەن بولىدۇ، دائىم

يۇقىرى قىزىتما بولىدۇ، ئېغىرلىرىدا شوك كۆرۈلىدۇ.

7. بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدىغان بىر نەچچە خىل

تېپتىكى ئۈچەي ياللۇغنىڭ كلىنىكىلىق

ئالاھىدىلىكى

ئۈچەي يوللىرى ئىچى باكتېرىيە، ۋىرۇس، پارازىتلار، زەمبۇرۇغ ۋە بەزى كېسەللىك سەۋەبى ئېنىق بولمىغان كېسەل سەۋەبلىرى بىلەن يۇقۇملانغان پەيدا بولغان ئىچى سۈرۈش - ئۈچەي ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ. بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدىغان ئۈچەي ياللۇغى تۆۋەندىكىلەر - دىن ئىبارەت.

چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى

تۆۋەندە ئايرىم - ئايرىم تونۇشتۇرۇلىدۇ

1. كېسەللىك قوزغاتقۇچى چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىلىك

ئۈچەي ياللۇغى بۇ خىلدىكى ئۈچەي ياللۇغىنى كېسەللىك قوزغات - قۇچى چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى قوزغىتىدۇ، ھاۋا ئىسسىق پەسىلدە بولۇپمۇ 8 ~ 5 - ئايلاردا، بىر ياشتىن كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ، يوشۇرۇن دەۋرى تەخمىنەن 2 ~ 1 كۈن بولۇپ، كېسەللىك ئاستىراق باشلىنىدۇ، كېسەلنىڭ چوڭ تەرتىبى كۈنلۈكى 10 ~ 5 قېتىم، سېرىق، يېشىل، تۇخۇم شورپىسىدەك كېلىدۇ، مىقدارى ئوتتۇرا - ھال بولۇپ، ئېچىغاندەك پۇرايدۇ، تەركىبىدە شىلىمشىق بولىدۇ، چوڭ تەرەتتى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە، ئاز مىقداردا ئاق قان ھۈجەيرىسى بايقىلىدۇ. كۆپىنچىسىگە قۇسۇش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. لېكىن پۈتۈن بەدەنلىك ئالامىتى بولمايدۇ، كۆپىنچىسىدە قىزىتما بولمايدۇ، ئەگەر ئېغىرلاشسا، ئوخشىمىغان دەرىجىدە سۇسىزلىنىش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ.

ئومۇمىي كېسەللىك جەريانى 7 ~ 3 كۈن داۋاملىشىدۇ.

2. توكسىن ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك چوڭ ئۈچەي تا.

ياقچە باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى بۇنىڭ يوشۇرۇن دەۋرى 2~1 كۈن، كېسەللىكنىڭ باشلىنىشى جىددىيەك، ئېغىر - يېنىكلىك دەرىجىسى بىردەك ئەمەس، ئاساسلىقى ئىچى سۈرىدۇ، قۇسىدۇ، سۇ- سىزلىنىدۇ. بۇنىڭدا چوڭ تەرەت قېتىم سانى كېسىلى يېنىكلەرنىڭ سەل كۆپىيىدۇ، كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلارنىڭ ئارقا-ئارقىدىن ئىچى سۈرىدۇ، چوڭ تەرەت مىقدارى كۆپ بولۇپ، تۇخۇم شورپىسىدەك ياكى سۇغا ئوخشاش تەرەت قىلىدۇ، شىلىمشىق نەرسىلەر ئارىلىشىپ كېلىدۇ، ئاسانلا سۇسىزلىنىش، ئېلىپكىترولىتلار قالايمىقانلىشىش ۋە كىسلاتادىن زەھەرلىنىش پەيدا بولىدۇ. چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە، ئاق قان ھۈجەيرىسىنى ئاندا - ساندا ئۇچراتقىنى بولىدۇ، كېسەللىك جەريانى 7 ~ 3 كۈن بولىدۇ.

3. بۆسۈپ كىرىش خاراكتېرلىك چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېر.

رىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى يوشۇرۇن دەۋرى 24~8 سائەت، كېسەل- لىك جىددىي باشلىنىدۇ، قىزىيدۇ، تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ 40°C قا چىقىدۇ، ئارقا-ئارقىدىن ئىچى سۈرىدۇ، مىقدارى كۆپ بولمايدۇ، چوڭ تەرەت يېپىشقاق بولۇپ لىغىرلاپ تۇرىدۇ، تەركىبىدە قان-يىرنىڭ بولىدۇ، كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق ئاغرىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بەزىلىرىدە قۇرۇق ئىنجىق، پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامىتى روشەن بولىدۇ، ھەتتا ئېغىرلىرى شوڭ بولۇپمۇ قالىدۇ. بۇ تىپتىكى ئۈچەي ياللۇغىنى باكتېرىيىلىك تولغاقتىن پەرق ئەتكىلى بولمايدۇ. شۇڭا ئۇنى چوڭ تەرەتتىن باكتېرىيە ئۆستۈرۈش ئارقىلىق پەرقلىنىدۇ.

4. ئۈچەي قاناش خاراكتېرلىك چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېر-
رىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى بۇ خىل ئۈچەي ياللۇغى يېقىنقى يىللار-
دىن بېرى كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. ئاساسىي كېسەللىك
قاناش خاراكتېرلىك بوغماق ئۈچەي ياللۇغى بولۇپ، كېسەللىك پەيدا
قىلىش مېخانىزمى تېخى ئېنىق ئەمەس. بىراق بۇ خىل باكتېرىيە
ئىشلەپچىقارغان ئىچكى توكسىن بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇم-
كىن دەپ قارالماقتا. تۆت پەسىلنىڭ ھەممە ۋاقتىدا كۆرۈلىدۇ. لې-
كىن 8 ~ 7- ئايلاردا، تۆت ياش ئىچىدىكى بالىلاردا كۆپرەك بولىدۇ.
ئىچى سۈرۈش ئاساسلىق ئالامىتى بولۇپ، يوشۇرۇن دەۋرى 12 سائەت-
تىن 5 كۈنگىچە بولىدۇ، كېسەللىك تېز باشلىنىدۇ، سىپازمىلىق قور-
ساق ئاغرىش بىلەن سۇغا ئوخشاش تەرەت قىلىدۇ، ئارقىدىنلا قانلىق
تەرەت قىلىدۇ، چوڭ تەرەت كۈنلۈكى 30 ~ 3 قېتىمغىچە بولىدۇ،
قۇسىدۇ، كۆپلىگەن ئانتىبىيوتىك دورىلارغا سەزگۈر كېلىدۇ. قورسىقى
قاتتىق ئاغرىپ ئاندىن ئىچى سۈرۈش، يەنى سۇغا ئوخشاش قان
ئارىلاش تەرەت قىلىش بۇ كېسەللىكنىڭ ئالاھىدىلىكى، كېسەللىك
جەريانى بىر ھەپتە ئەتراپىدا بولىدۇ، قىزىمايدۇ.

چاقسىمان ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى

ئۈچەي ياللۇغىنى قوزغاتقۇچى ۋىرۇسلار كۆپ بولىدۇ، لېكىن
كۆپ ئۇچرايدىغىنى چاقسىمان ۋىرۇس بولۇپ، بالىلاردا كۈز، قىش
پەسلىدە ئىچى سۈرۈشنى قوزغاتقۇچى ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان كېس-
سەللىك سەۋەبى. شۇڭا بۇ كۈزلۈك ئىچى سۈرۈش دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
بۇ كېسەللىكنىڭ كۆپىنچىسى كۈز، قىش پەسلىدە كۆرۈلىدۇ، 24 ~ 6 ئايلىققى-
چە بولغان بالىلاردا كۆپ، تۆت ياشتىن چوڭ بالىلاردا ئاز بولۇپ،

يوشۇرۇن دەۋرى 72~24 سائەت بولىدۇ. كېسەللىكنىڭ باشلىنىشى تېز، قىزىش ۋە يۇقىرى نەپەس يوللىرى يۇقۇملىنىش ئالامىتى كۆرۈلەدۇ، پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامىتى روشەن بولمايدۇ. بۇ كېسەللىكنىڭ باشلىنىشى بىلەنلا كۆپ ساندىكىلىرى ئالدى بىلەن قۇسىدۇ، ئاندىن ئىچى سۈرىدۇ، چوڭ تەرەت كۈنلۈكى ئون قېتىم ۋە ئونىڭدىنمۇ كۆپ بولىدۇ، مىقدارى كۆپ، سۇغا ئوخشاش ياكى تۇخۇم شورپىسىدەك تەرەت قىلىدۇ، رەڭگى سېرىق ياكى سېرىق يېشىل بولۇپ، سېسىق پۇرىمايدۇ، بەزىدە چوڭ تەرەت مېتاك سۈپىدەك ياكى سۈزۈك سۈدەك ياكى ئاق، ئېقىش كېلىدۇ. چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە ئاندا-ساندا ئاق قان ھۈجەيرىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بەزى بالىلار كۆپ ئۇسسايىدۇ، بىئارام بولىدۇ. سۇسىزلىنىش ۋە ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىش ئاسان پەيدا بولىدۇ، سۇسىزلىنىش كۆپىنچە تەڭ ئوسموسلۇق بولىدۇ، قىسمەن بالىلاردا يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىش كۆرۈلىدۇ، كۆپىنچىسى يېنىك ۋە ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسىزلىنىش بولىدۇ. بۇ كېسەللىكنىڭ ئۆزلۈكىدىن چەكلىنىش ئالاھىدىلىكى بولۇپ، ئالدى بىلەن قۇسۇش توختايدۇ، ئىچى سۈرۈشمۇ يېنىكلىەيدۇ. سۈت تۈرىدىكى يېمەكلىك بېرىلمىسە، ئەسلىگە كېلىشى تېخىمۇ تېز بولىدۇ. كېسەللىك جەريانى 8~3 كۈن بولىدۇ، قىسمەنلىرىنىڭ سەل ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ. ئانتىبىيوتىك دورىلارنىڭ ئۈنۈمى بولمايدۇ، ئۆزلۈكىدىن ساقىيىدۇ.

ئاچچىق ئۈچەي ئەگرى باكتېرىيىلىك

ئۈچەي ياللۇغى

بۇ كېسەللىك ياز پەسلىدە 6 ئايلىقتىن ئىككى ياشقىچە بولغان

باللاردا كۆپ بولىدۇ. بۇ كېسەللىكنىڭ ئاساسلىق تارقاتقۇچىسى كالا، قوي، چوشقا، ئىت قاتارلىق ھايۋانلار بولۇپ، بۇلغانغان سۇ، سۈت ياكى يېمەكلىكلەرنى يەپ سېلىش ئارقىلىق تارقىلىدۇ. كىلىنىك ئالامىتى تولغاقتا ئوخشىشىپ كېتىدۇ. كېسەللىك تېز باشلىنىدۇ، چوڭ تەرەت قېتىم سانى كۆپىيىپ، كۈنلۈكى 8~7 قېتىم بولىدۇ، دەسلەپتە دە سۇغا ئوخشاش تەرەت قىلىدۇ، تېزلىكتە شىلىمشىق ياكى قان يىرىڭلىق تەرەتكە ئايلىنىدۇ، سېسىق پۇرايدۇ، قورساق سانجىپ ئاغرىيدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ، قۇسىدۇ، باش، پۇت - قوللار ئاغرىيدۇ، ماغدۇرسىزلىنىدۇ. چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە، قىزىل قان ھۈجەيرىسى، يۇتقۇچى ھۈجەيرە ۋە كۆپ مىقداردا ئاق قان ھۈجەيرىسى كۆرۈلىدۇ. بۇ كېسەللىكنى تولغاقتىن بىلەن پەرقلىنىدۇرۇش قىيىن. بەزىلىرىدە يۇقىرى نەپەس يوللىرى يۇقۇملىنىشنىڭ دەسلەپكى ئالامىتىگە ئوخشاش قىزىش، باش ئاغرىش، چۈشكۈرۈش، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش ياكى يۆتىلىش قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ. كېسەللىك جەريانى بىر نەچچە كۈندىن بىر ھەپتىگىچە داۋاملىشىدۇ، ئىچى سۈرۈش ئېغىرراقلىرىدا سۇسىزلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئاز ساندىكى ئاغرىق بالىلاردا ئۈچەي يوللىرىنىڭ باكتېرىيىلىك ياكى چاقىسىمان ۋىرۇسلۇق يۇقۇملىنىشى قوشۇلۇپ كېلىشى مۇمكىن.

ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى

بۇ كېسەللىك كەڭ دائىرىلىك تەسىر قىلىدىغان ئانتىبىيوتىك دورىلارنى كۆپ مىقداردا ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەندىن كېيىن ئىككى-

لەمچى پەيدا بولىدۇ. چۈنكى دورىلار ئۈچەي يوللىرىدىكى باكتېرىيە توپىنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ، دورىغا چىداملىق ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈم-سىمان شارچە باكتېرىيىنىڭ ئۈچەي يوللىرىدا كۆپ مىقداردا كۆپىيىشكە سەۋەبچى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ باكتېرىيىلەر ئۈچەي دىۋارىغا بۆسۈپ كىرىپ، كېسەللىك پەيدا قىلىدۇ، كېسەللىك تېز باشلىنىدۇ، كېسەلدە پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامىتى روشەن بولىدۇ، يېنىكلىرى بىر كۈندە بىر نەچچە قېتىم تەرەت قىلىدۇ، دورىنى توختاتقاندىن كېيىن تەدرىجىي ئەسلىگە كېلىپ ساقىيىدۇ. ئېغىرلىرى كەينى-كەينىدىن سۈدەك ئىچى سۈرىدۇ ياكى تەرتى قارامتۇل رەڭدە بولىدۇ، شىلىمشىق ماددىلار كۆپ بولۇپ، ئاز ساندىكىلىرىدە قانلىق تەرەت كېلىدۇ. بۇ كېسەللىكتە سۇسىزلىنىش، ئېلېكترولىتلار قالايمى-قانلىشىش ۋە ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش پەيدا بولىدۇ. شۇنداقلا قورساق ئاغرىش، قىزىش، كۆڭلى ئايىنىش، قۇسۇش، ماغدۇرسىزلىنىش، ھەتتا شوك بولۇش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە، يىرىڭلىق ھۈجەيرە ۋە گرام مۇسبەت شارچە باكتېرىيىلەر تېپىلىدۇ. چوڭ تەرەتتىن باكتېرىيە ئۆس-تۈرگەندە، ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىلەر ئۆسىدۇ.

زەمبۇرۇغلۇق ئۈچەي ياللۇغى

بۇ ئىككى ياشتىن كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ، ھەر قانداق پەسىلدە يۈز بېرىدۇ، بۇ كېسەللىكنى ئاق رەڭلىك تەشۋىسىمان باكتېرىيە پەيدا قىلىدۇ. ئاساسلىق ئالامىتى ئىچى سۈرۈش بولۇپ، چوڭ تەرەت سۇيۇق سېرىق كېلىدۇ، ئېچىغاندەك سېسىق پۇرايدۇ، تەرەتتە كۆپۈك كۆپ بولۇپ، شىلىمشىق ماددىلار بولىدۇ. بەزىدە دۇفۇ ترىپىغا

ئوخشاش پارچىلارمۇ بولىدۇ.

چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە گرىمبوك قاپچىلىرى ۋە يالغان باكتېرىيە يىپچىلىرىنى تاپقىلى بولىدۇ. بۇ كېسەللىكنىڭ جەريانى ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ، ئاغرىق بالىدا غاز بوغۇز قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ خىل ئۈچەي ياللۇغى بىلەن ئاغرىغان بالىلاردا ئوزۇقلىنىش ناچار-لىق ياكى ئانتىبىيوتىك دورىلارنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەنلىك تارىخى بولىدۇ.

چاشقان كېزىك سالمۇنىللا باكتېرىيىلىك

ئۈچەي ياللۇغى

بۇ كېسەللىكنى چاشقان كېزىك سالمۇنىللا باكتېرىيىسى پەيدا قىلىدۇ، يېقىنقى يىللاردىن بېرى بۇ كېسەللىك دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا كۆپىيىشكە قاراپ يۈزلەنمەكتە. بىر يىلنىڭ ھەر قانداق ۋاقتىدا يۈز بېرىدۇ، لېكىن 6-، 9-ئايلىرىدا پەيدا بولۇش نىسبىتى يۇقىرى، ئىككى ياشتىن كىچىك بالىلاردا كۆپ، بولۇپمۇ بىر ياشتىن كىچىك بوۋاقلاردا پەيدا بولۇش نىسبىتى يۇقىرى بولىدۇ. ھەتتا يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىمۇ پەيدا بولىدۇ.

بۇ كېسەللىكنى ئۆي قۇشلىرى، ھايۋانلار، چاشقان، چۈش، بۈرگە قاتارلىقلار تارقىتىدۇ. بۇلغانغان يېمەكلىكلەر ئارقىلىقمۇ تارقىلىدۇ. يوشۇرۇن دەۋرى 24~8 سائەت بولۇپ، كېسەللىكنىڭ باشلىنىشى جىددىيەتكە بولىدۇ، ئاساسلىق ئالامىتى ئىچى سۇرىدۇ، چوڭ تەرەت قېتىم سانى كۈنىگە 10~6 قېتىم، ئېغىرلىرىنىڭ كۈنىگە 30 قېتىمدىن ئاشىدۇ. چوڭ تەرەت دەسلەپتە سېرىق، يېشىل، سۇغا ئوخشاش بولۇپ شىلىمشىق نەرسىلەر ئارىلاش كېلىدۇ، كېسەللىك

جەريانى سوزۇلغۇچىلاردا قېنىق يېشىل، شىلمىشقى يىرىڭلىق تەرەت ياكى قان يىرىڭلىق تەرەت كېلىدۇ. قىزىش، ئىشتىھاسىزلىق، قۇسۇش، قورساق ئاغرىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

كېسەللىكنىڭ ئېغىر-يېنىكلىك دەرىجىسى بىردەك بولمايدۇ، يېنىك كېسەللەر بىر نەچچە قېتىم سۇيۇق تەرەت قىلغاندىن كېيىن تېزدىن ساقىيىپ كېتىدۇ، ئېغىرلىرى كەينى - كەينىدىن ئىچى سۈرۈپ سۇسىزلىنىش، ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىش ۋە ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش پەيدا بولىدۇ. پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامىتى روشەن كۆرۈلىدۇ، ھەتتا شوڭ بولىدۇ. كېسەللىك جەريانى 4~2 ھەپتە، ئاز ساندىكىلىرى ئىككى ئايدىن كۆپ ۋاقىتقا سوزۇلىدۇ، چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە كۆپ مىقداردا ئاق قان ھۈجەيرىسى ۋە قىزىل قان ھۈجەيرىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ يېشى كىچىك بوۋاقلاردا كۆپ كۆرۈلىدىغان، پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامىتى ئېغىر ئۆتىدىغان ھەمدە ئاسانلا يۇقۇش-يۇقۇلمىنىشنى پەيدا قىلىدىغان كېسەللىك، شۇنداقلا كېسەلنى دوختۇرخانىدا ئۇزۇن ياتقۇزىدىغان، ئۆلۈش نىسبىتى يۇقىرى بولىدىغان، كىچىك بوۋاقلارنىڭ ھاياتىغا تەھدىت سالىدىغان بىر خىل ئۆچەي ياللۇغى كېسەللىكى بولۇپ، ھازىر يېزا-قىشلاق، ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىلىرىدىكى دوختۇرخانىلارنىڭ بۇ كېسەللىككە بولغان تونۇشى يېتەرسىز بولۇۋاتىدۇ، شۇڭا ئۇنىڭغا دەسلەپكى مەزگىلدە دىئاگنوز قويۇشتا تۆۋەندىكى كۆرسەتكۈچلەردىن پايدىلانسا بولىدۇ. (1) بۇ كېسەللىك ئىككى ياشتىن كىچىك بولۇپمۇ ئالتە ئايلىق ئىچىدىكى بالىلاردا كۆپ بولىدۇ، تۇغۇت بۆلۈمىدە ھەم يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار ئۆيىدە تارقىلىدۇ؛ (2) بۇ كېسەللىك بىلەن ئاغرىغان

ياكى گۇمانلانغان ئاغرىقلار بىلەن ئۇچراشقانلىق تارىخىي بولىدۇ؛ (3) ئىككى ياشتىن كىچىك بالىلاردا ئىچى سۈرگەن ۋاقتى ئۇزۇنراق بولۇپ، ئۇلارنى ئانتىبىيوتىك دورىلار بىلەن داۋالسا، ئۈنۈمى ياخشى بولمايدۇ؛ (4) بىرلەمچى كېسەللىك ئاساسىدا تۇيۇقسىز قىزىش، ئىچى سۈرۈش كۆرۈلىدۇ، بولۇپمۇ ئانا سۈتى بىلەن بېقىلمىغان بالىلاردا ئوزۇقلىنىش ناچارلىق ياكى ئۇزۇن مۇددەت كەڭ دائىرىلىك ئانتىبىيوتىك دورىلارنى، بۆرەك ئۈستى بېزى پوستلاق ھورمونى ياكى ئىممۇ-نىتنى تورمۇزلىغۇچى دورىلارنى ئىشلەتكەنلەردە تېخىمۇ ئاسان پەيدا بولىدۇ؛ (5) كلىنىكىلىق ئالامىتىنىڭ ئېغىر - يېنىكلىك دەرىجىسى بىردەك بولمايدۇ. گۆدەك بالىلار ۋە ئۆسمۈرلەردە ئالامىتى نىسبىي ھالدا يېنىكرەك بولىدۇ. كېسەللىكلەرنىڭ باشلىنىشى جىددىي ئۆتىدۇ، ئادەتتە يۇقىرى قىزىتما بولىدۇ، تۆۋەن قىزىتما ياكى قىزىمايدىغانلىرىمۇ بولىدۇ. مەسىلەن: سىپتىتسىمىيە بولسا، داۋاملىق ياكى رىتىمىز قىزىيدۇ، ئارىلاپ قۇسۇش، قورساق ئاغرىش، تېرە ياللۇغى، جىگەر، تال يېنىك دەرىجىدە يوغىناش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردا ئالامىتى ئېغىرراق بولۇپ، نېكروزلۇق ئۈچەي ياللۇغى، مېگە پەردە ياللۇغى، سېرىقلىق چۈشۈش، قورساق ئېسىلىش قاتارلىقلارمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ ھەمدە سۇسىزلىنىش، ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىش كۆرۈلىدۇ، ئاسانلىقچە تۈزەتكىلى بولمايدۇ؛ (6) چوڭ تەرەت ھەر كۈنى 5 ~ 2 قېتىم ھەتتا 20 قېتىم بولۇپ، مىقدارى كۆپرەك بولىدۇ، سېسىق پۇرايدۇ. چوڭ تەرەتنىڭ شەكلى كۆپ، ئۆزگىرىشچان بولۇپ، باشلىنىشتا سېرىق سۈدەك، كېيىن سېرىق يېشىل لىغىرلاپ تۇرىدىغان ياكى سېرىق يېشىل قان يىپىچىلىرى بار تەرەتكە ئايلىنىدۇ ياكى ئاق شىلىمشىق تەرەت ئارىلاپ كۆرۈلىدۇ (بوۋاقلق دەۋرىدە). قۇرۇق

ئىنجىق تاسادىپىي كۆرۈلىدۇ؛ (7) چوڭ تەرەتتى مىكروسكوپتا تەك-
شۈرگەندە ئاق قان، قىزىل قان ھۈجەيرىلىرى بولىدۇ.
بۇ كېسەللىكتىن گۇمانلانغاندا، يۇقىرىدىكى ئالاھىدىلىكلەردىن
پايدىلىنىپ دىئاگنوز قويۇش ھەمدە دەرھال ئايرىش تەدبىرىنى قوللى-
نىش لازىم. بۇنىڭدا چوڭ تەرەتتىن كۆپ قېتىم باكتېرىيە ئۆستۈرۈش
ئارقىلىق دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ.

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى ئىچى سۈرۈش

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار دېگىنىمىز - تۇغۇلۇپ 28 كۈنلۈك
بولغىچە ئارىلىقتىكى بوۋاقلارنى كۆرسىتىدۇ. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار-
دىكى ئىچى سۈرۈش تۇغۇت بۆلۈم، بوۋاقلار ئۆيىدە ياكى يېڭى
تۇغۇلغان بوۋاقلار كېسەلخانىسىدا ئىنتايىن تېز تارقىلىدۇ. شۇڭا يېڭى
تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى تارقىلىشچان ئىچى سۈرۈش دېيىلىدۇ. بۇ
كېسەللىك يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ سالامەتلىكىگە خەۋپ يەتكۈزد-
ىدىغان مۇھىم كېسەللىكلەرنىڭ بىرى.

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى تارقىلىشچان ئىچى سۈرۈشنى
پەيدا قىلغۇچى ئاساسلىق كېسەللىك سەۋەبى باكتېرىيە بىلەن ۋىرۇس
بولۇپ، باكتېرىيىدىن ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى چوڭ ئۈچەي تاياقچە
باكتېرىيىسى بىلەن ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىسى-
دۇر. ئۇنىڭدىن باشقا، يېشىل يىرىڭلاتقۇچى باكتېرىيە بىلەن ئاق
رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىمۇ بار. ۋىرۇسلاردىن چاقىسىمان
ۋىرۇس بىلەن ئەيكو ۋىرۇسى بولۇپ، بىراق ۋىرۇسلۇق يۇقۇملىنىش
ئاز ئۇچرايدۇ. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى بۇ خىل ئىچى سۈرۈشنىڭ
ئاساسلىق كېلىش مەنبەسى، بوۋاقلارنىڭ تۇغۇت جەريانىدا باش

سۈيىنى شۈمۈرۈۋېلىشتىن، بوۋاقلار ئۆيىدىكى خىزمەتچى خادىملارنىڭ مۇھىتىدىكى باكتېرىيىنى يۇقتۇرۇۋېلىشىدىن ياكى باشقا ئورۇندىن يۆت-كەپ كېلىنگەن بوۋاقلار باكتېرىيىنى ئېلىپ كىرىشتىنمۇ بولىدۇ. تارقىلىشتا نەپەس يوللىرى ياكى ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرى ئارقىلىق تارقىلىدۇ. بۇ كېسەللىك كۆپ ھاللاردا چوڭلار ياكى بالىلاردىكى تارقىلىشچان زۇكام بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. چوڭلاردا ئىچى سۈرۈشنىڭ ئالامىتى بولمىسىمۇ، لېكىن باكتېرىيە ياكى ۋىرۇسلارنى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارغا توشۇپ بېرىدۇ. باكتېرىيە بىلەن بۇلغانغان سۈتنى ئەگەر ئوبدان بىر تەرەپ قىلمىسا، يەنىلا تارقىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

بۇ كېسەللىكنىڭ يوشۇرۇن دەۋرى 3~5 كۈن، ئەڭ قىسقا بولغانلىرى بىر نەچچە سائەت بولىدۇ. باشلىنىشتا ئىشتىھاسى تۆتۈلۈپ، ئەمگىلى ئۈنىمايدۇ، ئەمەسە قۇسىدۇ، ئورۇقلايدۇ، بىئارام بولۇپ قورسىقى ئېسىلىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى نورمال بولىدۇ ياكى ئۆرلەيدۇ، بەزىسى قىزىپ $38 \sim 38.5^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، ئەڭ روشەن ئالامەتلىرى ئىچى سۈرۈش بولۇپ، چوڭ تەرەت سېرىق سۈدەك كېلىدۇ. كېيىن يېشىلغا ئۆزگىرىدۇ، قاڭسىق پۇرايدۇ، ئادەتتە قان، يىرىك بولمايدۇ، بەزىدە ئازراق شىلىمىشقا ماددا ئارىلىشىپ كېلىدۇ، كۈنىگە 10 نەچچە قېتىم تەرەت قىلىدۇ، شۇندىن كېيىنلا سۇسىزلىنىش ئالامىتى كېلىپ چىقىدۇ، بۇ ۋاقىتتا كۆز چانقى ۋە ئالدىنقى لىپىلداق ئۆلتۈرۈشىدۇ، يىغلىسا ئاۋازى ئاجىز چىقىدۇ، بەدەن ئېغىرلىقى جىددىي تۆۋەنلەيدۇ، مۈگدەيدۇ، ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش روشەن بولغۇچىلاردا نەپەسلىنىش تېز، چوڭقۇر بولىدۇ، بەزىلىرى مۈگدەپ، رەڭگى كۆكرىپ ھوشسىزلىنىدۇ، پۇت-قوللىرى

مۇزلايدۇ. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردا بۆرەكنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارى ناچارراق بولغاچقا، سۈيدۈك ئازلاش ياكى سۈيدۈك كەلمەسلىك ناھايتى ئاسان كۆرۈلىدۇ، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى ئىچى سۈرۈش، بوۋاقلارنىڭكىگە قارىغاندا ئېغىر ئۆتىدۇ.

بۇ كېسەللىك بوۋاقلار ئۆيىدە دەسلەپ بايقالغاندا ئالامىتى يېنىكرەك بولغاچقا سەل قارىلىدۇ، باشقا بوۋاقلاردا يۇقۇملىنىش بايقالغاندا، ئاندىن دوختۇر ھوشيارلىقىنى ئۆستۈرىدۇ، بۇ ۋاقىتتا ئاللىبۇرۇن خېلى تارقالغان بولىدۇ، شۇڭا دەسلەپكى دەۋرىدە ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈش ئىنتايىن مۇھىم. بۇ كېسەللىكتە دائىم كاسا قىسمى تېرە ياللۇغى، ئۆپكە ياللۇغى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. دىئاگنوز قويۇش ئۆلچىمى ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش بىلەن ئوخشاش. بۇ كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى ياخشى ئىشلەنسە، ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ① تۇغۇت بۆلۈم، بوۋاقلار ئۆيى ۋە يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار كېسەلخانىسىنى دېزىنڧېكسىيەلەش، ئايرىش تۈزۈمىنى ياخشى ئىجرا قىلىش؛ ② ئانا سۈتى بىلەن بېقىشنى تەشەببۇس قىلىش؛ ③ چوڭ ئۇچەي تاياقچە باكتېرىيىسى ۋە چاقىسىمان ۋىرۇس قوزغاتقان ئىچى سۈرۈشنىڭ يۇقۇشچانلىقى كۈچلۈك بولغاچقا، ئۆز ۋاقتىدا ئايرىش، چوڭ تەرەتنى ئۆز ۋاقتىدا دېزىنڧېكسىيەلەپ بىر تەرەپ قىلىش، خىزمەتچى خادىملار قوللىرىنى پاكىز يۇيۇپ، دېزىنڧېكسىيە قىلغاندىن كېيىن، باشقا بوۋاقلارنىڭ پەرۋىشىنى ئىشلەش؛ ④ يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار ئۆيىدە تارقىلىشچان ئىچى سۈرۈشنىڭ پەيدا بولغانلىقى بايقالغان ھامان، يېڭى بوۋاقلارنى قوبۇل قىلماسلىق ھەمدە باشقا ئورۇنلاردا تارقىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىچى سۈرگەن بوۋاقنى باشقا ئورۇنلارغا يۆتكەمەسلىك لازىم.

فېزىئولوگىيىلىك ئىچى سۈرۈش

بۇ ئەھۋال ئالتە ئايلىقتىن كىچىك خام سېمىز ياكى ھۆل تەمرەتكە تۈرىدىكى تېرە كېسەللىكلىرى بار، زىيادە سېزىمچانلىقى يۇقىرى بالىلاردا كۆرۈلىدۇ. بالا تۇغۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا سېرىق يېشىل سۇيۇق تەرەت قىلىشقا باشلايدۇ. چوڭ تەرەت قېتىم سانى ھەر كۈنى 4~5 قېتىمدىن 7~8 قېتىمغىچە بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئالامەتلەر بولمايدۇ. بالىنىڭ ئادەتتىكى ئەھۋالى ياخشى بولۇپ، روھىي ھالىتى ياخشى، ئۆسۈپ-يېتىلىشى نورمال بولىدۇ، بەدەن ئېغىرلىقى داۋاملىق ئاشىدۇ، بۇ فېزىئولوگىيىلىك ئىچى سۈرۈش بولۇپ، داۋالاش ھاجەتسىز، قوشۇمچە يېمەكلىكلەر قوشىدىغان ۋاقتى بولۇپ تاماقلاندۇرۇشقا باشلىغاندىن كېيىن، ئۆزلۈكىدىن ياخشىلىنىپ قالىدۇ.

لابوراتورىيىلىك تەكشۈرۈش

1. قان تەكشۈرۈش: ئادەتتە قان رايىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ. قان قويۇقلاشقانلىقتىن قىزىل قان ھۈجەيرىسى ۋە ھېموگلوبىن بىردەك يۇقىرىلايدۇ، باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى بولغۇچىلاردا ئاق قان ھۈجەيرىسى سانى كۆپىيىدۇ. بىر قىسىم ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغىدا ئاق قان ھۈجەيرىسى سانى ئازلايدۇ.

2. سۈيدۈك تەكشۈرۈش: سۈيدۈك ئازلىغاندا رەڭگى سېرىق بولىدۇ، ئاز مىقداردا ئاقسىل كۆرۈلىدۇ، باشقا ئالاھىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ.

3. چوڭ تەرەت تەكشۈرۈش: ئالدى بىلەن چوڭ تەرەتنىڭ رەڭگى، خاراكتېرى ۋە پۇرىقىنى كۆزىتىش لازىم. چوڭ تەرەتنىڭ

رەڭگى يېشىل بولۇپ، قاڭشىق پۇرسا، كاربون - سۇ بىرىكمىلىرى
 بىلەن زىيادە كۆپ ئوزۇقلاندۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. تەرەتنىڭ كۆرۈ-
 نۇشى ئاق، ماغزىپتەك پارقىراق، يېپىشقاق بولسا، مايلىق يېمەكلىكلەر-
 نى زىيادە كۆپ يېگۈزگەنلىكتىن دېرەك بېرىدۇ. چوڭ تەرەت قوڭۇر-
 رەڭدە غەلتە پۇرسا، ئاقسىللىق يېمەكلىكلەرنى كۆپ يېگۈزگەنلىكتىن
 بولىدۇ. چوڭ تەرەت سۈدەك بولۇپ تەركىبىدە ھەزىم بولمىغان مو-
 نەكچىلەر بولسا، ئاسان ھەزىم بولمايدىغان يېمەكلىكلەرنى كۆپ
 يېگۈزگەنلىكتىن بولىدۇ. چوڭ تەرەت قېتىم سانى كۆپەيگەن بولۇپ،
 بالىنىڭ ئادەتتىكى ئەھۋالى ياخشى بولسا، بەدەن ئامىلى بىلەن مۇنا-
 سۋەتلىك بولىدۇ. چوڭ تەرەت سۈدەك بولۇپ، قىزىتما قوشۇلۇپ
 كەلسە، ئۈچەي يوللىرى باكتېرىيىلىك يۇقۇملىنىش بارلىقىدىن دېرەك
 بېرىدۇ. قىش، كۈز پەسلىدە ئىچى سۈرگەن بولۇپ چوڭ تەرەت ئاق
 رەڭلىك، سۈدەك بولسا، ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغىدىن دېرەك بېرىدۇ،
 چوڭ تەرەت كۆكۈش سۈدەك بولسا، ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىدىن
 يۇقۇملانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. چوڭ تەرەتتە دۇفۇ قالدۇقىدەك
 نەرسىلەر بولسا، زەمبۇرۇغلۇق يۇقۇملىنىشتىن دېرەك بېرىدۇ. چوڭ
 تەرەتتە شىلىمشىق، قان، يىرنىڭ بولسا، باكتېرىيىلىك تولغاقتىن دېرەك
 بېرىدۇ. يۇقىرىدىكى ئالاھىدىلىكلەرگە ئاساسلىنىپ چوڭ تەرەت تەك-
 شۈرۈلىدۇ. ئادەتتە مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە چوڭ تەرەتتە ماي
 شارچىسى، ئاق قان ھۈجەيرىسى كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە ئاق قان ھۈجەيرە
 سانى مىكروسكوپنىڭ يۇقىرى ھەسسسىلىك كۆزىنىڭ ھەر بىر كۆرۈ-
 نۇشىدە 10 دىن ئاشمايدۇ.

چوڭ تەرەتتىن باكتېرىيە ئۆستۈرۈش ئارقىلىق ھەر قايسى تىپتە-
 كى كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى،

ئاچچىق ئۈچەي ئەگرى باكتېرىيىسى، چاشقان كېزىك سالمۇنىلا باكتېرىيىسى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىسى قاتارلىقلارنى ئۆستۈرۈپ تاپقىلى بولىدۇ. بۇ خىل تەكشۈرۈش ھازىر خېلى ئومۇملاشماقتا.

4. بىئوخىمىيىلىك تەكشۈرۈش: قان زەردابىدىكى ناترىي، كالى، كالتسىي، كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش كۈچى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق سۇسىزلىنىشنىڭ خاراكتېرى، ئېلېكتىرولىتلار قالايمىقانلىشىش ۋە كىسلاتا-ئىشقار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىش ئەھۋالىنى بىلگىلى بولىدۇ.

8. دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى

ئىچى سۈرۈشكە دىئاگنوز قويغاندا، ئالدى بىلەن كېسەللىك سەۋەبىنى تېپىپ چىقىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن كېسەللىك تارىخى، تاماقلاندۇرۇش ئەھۋالى تەپسىلىي سورىلىدۇ، مەسىلەن: زىيادە كۆپ تاماقلاندۇرۇش ياكى ئاچ قېلىش، يېمەكلىكلەر تەركىبىنىڭ مۇۋاپىق ياكى ئەمەسلىكى، يېمەكلىكلەر سۈپىتى ئۆزگەرگەن - ئۆزگەرمەكەنلىكى، يېمەكلىك تازىلىقى، ئوزۇقلاندۇرغاندا ئىشلىتىدىغان قاچا-قوشۇق، ئېمىزگە، سۈت بوتۇلكىسى دېزىنفېكسىيەلەنگەنمۇ-قانداق؟ ئىچى سۈرگەن ئاغرىقلار بىلەن ئۇچراشقانمۇ-يوق؟ دېگەنلەرنى سوراش ئارقىلىق يۇقۇملانغان خاراكتېرلىك ۋە يۇقۇملانغان ئىچى سۈرۈش پەرقلىنىدۇ. يەنە كېسەل بولغان پەسلىگە قاراش لازىم. يەنى 8~5- ئايلاردا پەيدا بولغان ئىچى سۈرۈشنىڭ كۆپىنچىسىنى كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى چوڭ ئۈچەي تايافچە باكتېرىيىسى قوزغىتىدۇ؛ 12~9- ئايلاردىكى ئىچى سۈرۈشنىڭ كۆپىنچىسى

سنى چاقىسىمان ۋىرۇس قوزغىتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، بالىنىڭ كېسەل بولغاندىكى يېشى ۋە كلىنىكىلىق ئالامىتى قاتارلىقلارنى ئومۇملاشتۇرۇپ، يۇقىرىدا سۆزلەنگەن زۆرۈر بولغان لابوراتورىيىلىك تەكشۈرۈشلەرنى ئىشلەپ، ئەتراپلىق ئانالىز قىلغاندا كېسەللىك سەۋەبى، تىپى، خىللىرى، دەۋرى بەلگىلىنىدۇ، بۇلار ئىنتايىن مۇھىم باسقۇچ. سۈيۈق-لىق بىلەن داۋالاشتىن ئىلگىرى ئىچى سۈرۈش قېتىمى، خاراكتېرى، قۇسۇش بار-يوقلۇقى، ئوزۇقلاندۇرۇش ئەھۋالى، سۇ ئىچكۈزۈش ئەھۋالى، ئىچكۈزگەن سۈيۈقلۈك تەركىبىدە تۇز بار-يوقلۇقى، سۈيۈك قېتىم سانى، مىقدارى، ئاخىرقى قېتىم سۈيۈك كەلگەن ۋاقتى قاتارلىقلارنى تەپسىلىي سوراپ، سۈسزىلىنىش دەرىجىسى، خاراكتېرى بەلگىلىنىدۇ. دىئاگنوز - كېسەللىك تارىخى، كلىنىكىلىق ئالامىتى، بەلگىسى ۋە لابوراتورىيىلىك تەكشۈرۈشلەرگە ئاساسەن قويىلىدۇ.

ئىچى سۈرۈش بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك، لېكىن توغرا دىئاگنوز قويىمىسا، داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر يېتىدۇ. شۇڭلاشقا تۆۋەندىكى كېسەللىكلەرنى سېلىشتۇرۇپ، ئايرىپ دىئاگنوز قويۇپ داۋالاش لازىم.

1. باكتېرىيىلىك تولغاق: باكتېرىيىلىك تولغاقنى تولغاق تايلاقچە باكتېرىيىسى قوزغىتىدۇ، ياز پەسلىدە بالىلاردا كۆپ پەيدا بولىدۇ. تولغاق بىلەن ئاغرىغان بىر ياش ئىچىدىكى بوۋاقلارنىڭ كلىنىكىلىق ئىپادىسى ئانچە تىپىك بولمايدۇ، شۇڭا ئۈچەي ياللۇغى دەپ خاتا دىئاگنوز قويۇلۇپ قالىدۇ. چۈنكى بەزىبىر تىپىك بولمىغان تولغاق ياكى تولغاقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە قان، يىرىڭلىق تەرەت، ئىنجىق روشەن بولمايدۇ، يەنە بىر تەرەپتىن يېقىنقى يىللاردىن بېرى بايقالغان بۆسۈپ كېرىش خاراكتېرلىك چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېرىيە-

سى (EIEC) قوزغاتقان ئۈچەي ياللۇغىدىكى چوڭ تەرەتتە قان، يىرىك ئارىلىشىپ كېلىدىغان ئالاھىدىلىك بولغاچقا، ئاسانلا تولغاق بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قويىدىغان ئەھۋاللار كۆرۈلمەكتە، شۇڭا تولغاق دەپ دىئاگنوز قويماقچى بولساق، كېسەللىكنىڭ تارقىلىش تارىخى، تولغاق ئاغرىقلىرى بىلەن ئۇچرىشىش تارىخى بولۇش ۋە چوڭ تەرەتنى مىكروسكوپتا تەكشۈرۈش ئارقىلىق پەرقلەندۈرۈش كېرەك. باكتېرىيە-لىك تولغاقتا چوڭ تەرەتتە قىزىل قان ھۈجەيرىسى، يىرىك ھۈجەيرە-سى ۋە زور يۇتقۇچى ھۈجەيرىلەر بولىدۇ. شارائىت بولسا چوڭ تەرەتتىن باكتېرىيە ئۆستۈرگەندە، تولغاق تاياقچە باكتېرىيىسىنى تاپقى-لى بولىدۇ. بۇنىڭ دىئاگنوزنى بېكىتىش ۋە پەرقلەندۈرۈشتە رولى چوڭ.

2. ئۆتكۈر نېكروزلۇق ئۈچەي ياللۇغى: بۇ كېسەللىكنىڭ باشلىنىشىدا چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى بىلەن پەرقى روشەن بولمايدۇ. لېكىن دورا ئىشلىتىپ داۋالسا، ئىچى سۈرۈش توختىمايدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى تەدرىجىي ئېغىرلىشىدۇ. دەسلەپكى مەزگىلدە سۇغا ئوخشاش تەرەت قىلىدۇ، كېيىن قوڭۇر رەڭلىك ياكى قانلىق تەرەت قىلىدۇ، قورساق روشەن ئېسىلىدۇ، قىزىتمىسى ئۆرلەيدۇ، ئارقا-ئارقىدىن قۇسىدۇ. ئېغىرلاشقاندا كافى قالدۇقىدەك ماددىلارنى قۇسىدۇ، سۇسىزلىنىش ئېغىر بولىدۇ، ھەتتا شوك بولىدۇ، زەھەرلىنىش ئالامىتى ئېغىر بولغۇچىلاردا بېھوشلۇق، تارتىشىش پەيدا بولىدۇ. شۇڭا ئىچى سۈرسىلا ئۈچەي ياللۇغى دېگىلى بولمايدۇ. فىزىئولوگىيىلىك ئىچى سۈرۈشتە يۇقىرىقىدەك ئالامەت بولىدۇ، شۇڭا سېلىشتۇرۇپ دىئاگنوز قويۇش لازىم.

9. ئاقىۋىتى

ھازىر بۇ كېسەللىكنىڭ ئاقىۋىتى نىسبەتەن ياخشى بولماقتا. بولۇپمۇ خەلقنىڭ ماددىي، مەنىۋى سەۋىيىسىنىڭ ياخشىلىنىشى، ساقلىقنى ساقلاش ئىشلىرىنىڭ راۋاجلىنىشىغا ئەگىشىپ، كىشىلەرنىڭ كېسەللىككە قارىتا تونۇشى ئۆستى. شۇڭا بالىلارنىڭ ئىچى سۈرۈپ قالسىلا، ۋاقتىدا داۋالىتىدىغان بولدى. بولۇپمۇ ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش تۈزى (ORS) ئىشلىتىلىپ، ئىچى سۈرۈشتىن سۇسىزلانغانلارنى داۋالاش قانات يايدۇرۇلغاندىن بېرى، مەزكۇر كېسەللىكنىڭ ئاقىۋىتىدە زور ياخشىلىنىش بولدى. ① بالىنىڭ ئىچى سۈرگەن ۋاقتىدىكى سالامەتلىك ئەھۋالى ۋە داۋالىنىشنىڭ بالدۇر-كېيىنلىكى؛ ② كېسەللىك قوزغاتقۇچى ئامىللارنىڭ تەسىرى، دورىغا چىداملىق كېسەللىك قوزغاتقۇچى چوڭ ئۈچەي ئاياقچە باكتېرىيىلىك ياكى زەمبۇرۇغلۇق ئۈچەي ياللۇغىنىڭ ئاقىۋىتى سەل ناچارراق، بوۋاقلاردىكى كۈزلۈك ئىچى سۈرۈش (چاقسىمان ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى) نىڭ ئاقىۋىتى ياخشىراق؛ ③ ئوزۇقلىنىش ناچارلىق ۋە راخت كېسەللىكى بار، تۇغما يۈرەك كېسەللىكى بار بالىلار ئىچى سۈرۈپ قالغاندا، ئۇلارنىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچى ئاجىز بولغانلىقتىن، كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرراق ئۆتىدۇ. ئىچى سۈرۈش، ئوزۇقلىنىش ناچارلىقىنى ئېغىرلاشتۇرۇپتۇ، ئوزۇقلىنىش ناچارلىق كېسەللىكى بار بالىلارنىڭ ئىچى سۈرۈپ قالغاندا، ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ ساقايمايدۇ؛ ④ داۋالاشنىڭ ئۆز ۋاقتىدا مۇۋاپىق بولغان-بولمىغانلىقى؛ ⑤ ئەگەشمە كېسەللەرنىڭ بار - يوقلۇقى؛ ⑥ يېشى (يېشى قانچىكى كىچىك بولسا، كېسەللىك ئەھۋالى شۇنچە ئېغىرراق ئۆتىدۇ) بىلەن مۇناسىۋەت.

لىك بولىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بېرى بۇ كېسەللىكنىڭ ئېغىر تىپلىقى ئاز، يېنىك، ئوتتۇرا تىپلىقى كۆپ، ئېغىر دەرىجىدە سۇسزلىنىش، ئېلېكت-رولتار قالايمىقانلىشىش ئاز، يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىدە سۇسزلىنىش-چىلار كۆپ بولۇپ، ئاقىۋىتى ياخشىلىنىشقا قاراپ يۈزلىنىۋاتىدۇ.

ئۈچىنچى باب ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىنى داۋالاش

بۇ كېسەللىكىنى داۋالاشتا ئومۇملاشقان تەدبىر قوللىنىلىدۇ، يەنى يېمەكلىكنى تەڭشەش ۋە داۋاملىق ئوزۇقلاندۇرۇش، ئۈچەي يوللىرى ئىچى ۋە سىرتىدىكى يۇقۇملىنىشنى تىزگىنلەش، سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىشنى تۈزەش ۋە پەرۋىشنى كۈچەيتىپ، ئەگەشمە كېسەل-لەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاشتا سۇسزلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، سۇسزلىنىشنى تۈزىتىش، داۋاملىق يېمەكلىك بېرىش، مۇۋاپىق دورا ئىشلىتىشتىن ئىبارەت.

1. ئادەتتىكى داۋالاش

(1) يېمەكلىك بىلەن داۋالاش. يېمەكلىك بىلەن داۋالاش ئىچى سۈرگەن بالىلارنى داۋالاشتىكى مۇھىم ھالقىلارنىڭ بىرى. ئىچى سۈرگەن مەزگىلدە پىرىنسىپ جەھەت-تىن يېمەكلىك چەكلەنمەيدۇ، لېكىن يەنىلا كېسەللىك ئەھۋالىغا ئاساسلىنىپ جانلىق ئىگىلەش لازىم. ئۆتكۈر ئىچى سۈرۈش كېسەللى-كىدە كېسەل بالىنىڭ ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرىنىڭ ھەزىم قىلىش، شۈمۈرۈش ئىقتىدارى پۈتۈنلەي يوقالمايدۇ، ئوزۇقلۇق ماددىلارنى شۈ-

مۈرۈشى نورمالدىكىنىڭ %60 گە يېتىدۇ. بالىلار ئىچى سۈرۈش تۈپەيلىدىن كۆپلىگەن ئوزۇقلۇق ماددىلارنى يوقىتىدۇ، يەنە بىر تەرەپ- تىن ئىشتىھاسى ناچارلاشقانلىقتىن يېمەكلىكلەرنى ياخشى يەپ، ئىچ- مەيدۇ، ۋاقتىنىڭ ئۆزىنى بىلەن ئاسانلا ئوزۇقلىنىش ناچارلىق كېلىپ چىقىدۇ، ئەگەر ئەسلىدە ئوزۇقلىنىش ناچارلىق بولسا، تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ، ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان بالىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ئوزۇق- لۇقنى چەكلەش ياكى چەكلەش ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن بولۇشى ئۇلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ، ئىچى سۈرگەن بالىلارنىڭ يېمەكلىكىنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش ئىنتايىن مۇھىم.

(1) يېنىك تىپلىق ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىدە، يېمەكلىك بى- رىش چەكلەنمەيدۇ. ئەمما تەڭشەپ بېرىش لازىم، ئېمىۋاتقان بالىلارنى داۋاملىق ئېمىتىش، كالا سۈتىگە سۇ ياكى مېتاك ئارىلاشتۇرۇپ بى- رىش، تاماق يەيدىغان بالىلار بولسا ئاسان ھەزىم بولىدىغان، يېڭى يېمەكلىكلەرنى ئاز-ئازدىن كۆپ قېتىم بېرىپ ئوزۇقلاندۇرۇش، ئاسان ھەزىم بولمايدىغان ماي تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى بەرمەسلىك لازىم. ئىچى سۈرگەندە ئاقسىلنىڭ ھەزىم بولۇپ شۈمۈرۈلۈشىگە تەسىرى بەك چوڭ ئەمەس، مۇۋاپىق بەرسە بولىدۇ.

(2) ئېغىر دەرىجىدىكى ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىدە، سۇسىزلى- نىش ئېغىر، كەينى-كەينىدىن قۇسقان بولسا، 6~4 سائەت يېمەك- لىك چەكلەپ بولىدۇ، لېكىن سۇ چەكلەنمەيدۇ، سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاپ سۇسىزلىنىش، ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىش تۈزىتىلىپ، كېسەللىك ئەھۋالى ياخشىلانغاندىن كېيىنلا، ئىشتىھاسى بولسلا بال- دۇرراق ئوزۇقلۇق بېرىش لازىم. ئانىسىنى ئېمىۋاتقانلارنى داۋاملىق ئېمىتىش، قوشۇمچە يېمەكلىكىنى ۋاقىتنىچە توختىتىپ تۇرۇش، ئانىسى-

نى ئەمىگەن بالىلارنىڭ سۈتىگە تەڭ مىقداردا مىتاك (شۈبگۈرۈچ سۈيى) ياكى سۇ قوشۇپ بېرىش ياكى سۈتنىڭ قايمىقىنى ئېلىۋېتىپ بەرسە بولىدۇ. ئاندىن تەدرىجىي نورمال ئوزۇقلاندۇرۇشقا ئۆزگەرتىش لازىم. ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغى بىلەن ئاغرىغۇچىلاردا قوش شېكەر فېرېمېنتى (ئاساسلىقى سۈت شېكەر فېرېمېنتى) كەمچىل بولىدۇ، بۇنداقلارغا ۋاقىتلىق سۈت تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى توختىتىپ، پۇرچاق-تىن ياسالغان سۈت ئورنىدا ئىشلىتىدىغان يېمەكلىكلەرنى بەرسە بولىدۇ ياكى قېتىق ئىچكۈزۈشمۇ بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئىچى سۈرۈش يېنىكلەپ، كېسەللىك جەريانى قىسقىرىدۇ ياكى 100 مىللىلىتىر يېڭى پۇرچاق سۈتىگە 10~5 گرام گلۇكوزا قوشۇپ ئىچكۈزۈپ بەرسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر ئىچى سۈرۈش ئېغىرلىشىپ كەتسە، توختىتىپ قويۇش لازىم.

ئىچى سۈرۈش مەزگىلىدىكى يېمەكلىك كېسەل بالىنىڭ ھەزىم قىلىش، شۈمۈرۈش ئىقتىدارىغا ماسلىشىش لازىم. ئېنېرگىيىسى بەك يۇقىرى بولغان يېمەكلىكلەرنى بەك بالدۇر بەرمەسلىك لازىم. ئىچى سۈرگەن بالىنىڭ ھەزىم قىلىش، شۈمۈرۈش ئىقتىدارىدا چوڭ پەرقلەر بولىدۇ، ھەمدە كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىشىگە ئەگەشپ ئۆزگىرىدۇ، كىلىنىكىدا بۇنى مۆلچەرلەش قىيىن، شۇنىڭ ئۈچۈن ئادەتتە كېسەل بالىنىڭ ئىشتىھاسى، ئىچى سۈرۈش ئەھۋالى قاتارلىق-لاردىن پايدىلىنىپ تەدرىجىي كۆپەيتىش پرىنسىپى قوللىنىلىدۇ، مەسىلەن: بوۋاقلار بولسا، ئالدى بىلەن يېرىم ھەسسە سۇيۇلدۇرۇلغان سۈت بېرىپ تەدرىجىي ساپ سۈت بېرىش، ئادەتتە يېرىم قويۇق ياكى قويۇق تاماقلارنى يېگەن بالىلار بولسا، ئاۋۋال سۇيۇق-سەلەڭ تاماقلار-نى بېرىپ تەدرىجىي ئەسلىدىكى يەپ ئۆگەنگەن يېمەكلىكلەرنى بې-

رىش، يېمەكلىكنىڭ، سۈتنىڭ مىقدارىنى ئاز-ئازدىن تەدرىجىي كۆ-
پەيتىش لازىم. تەڭشەش تېزلىكى كېسەل بالىنىڭ يېمەكلىككە چىداش-
لىق بېرىش ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىسە بولىدۇ. ئىچى سۈرگەن بالىلار
تاماق يېيىشنى باشلىغاندىن كېيىن، بەزىلىرىنىڭ چوڭ تەرەت مىقدارى
كۆپىيىپ كېتىشى مۇمكىن. يەنىلا سۇيۇقلۇق تولۇقلاش ئارقىلىق
داۋاملىق يوقىتىدىغان سۇيۇقلۇقنى تولدۇرۇش، ئىشتىھاسى بولسىلا
داۋاملىق ئوزۇقلاندۇرۇش لازىم. ئەگەر ئىچى سۈرۈش ئېغىرلىشىپ
كېتىپ، ئېغىر دەرىجىدە سۇسىزلىنىش ياكى قورسقى كۆپۈش ئەھۋال-
لىرى كۆرۈلسە، يېمەكلىكنى ئاز بېرىش لازىم. زۆرۈر تېپىلغاندا
چەكلەش كېرەك. يېمەكلىك بىلەن داۋالاش جەريانىدا يەنە شۇنىڭغى-
مۇ دىققەت قىلىش كېرەككى، ئىچى سۈرۈش ياخشىلانغاندىن كېيىن
ئوزۇقلۇق مىقدارىنى تەدرىجىي كۆپەيتىپ بېرىش لازىم.

ئىچى سۈرگەن مەزگىلدە يېمەكلىك بىلەن داۋالاشقا ئالاھىدە
دىققەت قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھەر خىل ۋىتامىنلاردىن- ۋىتامىن
A، B₁، B₂، C، PP، D بېرىش، ئۇنىڭدىن باشقا فولكوم ئاتىسىدوم
ۋە سىنىك، تۆمۈر قاتارلىق ئېلېمېنتلارنى تولۇقلاپ بېرىشكە دىققەت
قىلىش لازىم. بۇلار ئۈچەي شىللىق پەردىسىنىڭ ئۆسۈپ، ئەسلىگە
كېلىشىگە ياردەم بېرىدۇ. ئىچى سۈرۈش ساقايغاندىن كېيىن، نورمال
ئوزۇقلاندۇرۇشنى ئەسلىگە كەلتۈرسە بولىدۇ.

(2) پەرۋىش قىلىش

(1) ئىچى سۈرگەن مەزگىلدە ئوزۇقلاندۇرۇشقا ئالاھىدە دىققەت
قىلىش، سۇنى كۆپ ئىچكۈزۈش، قۇسۇش ئېغىر بولسا، ئاز-ئازدىن
كۆپ قېتىم ئىچكۈزۈش، سۈت ئېمىدىغانلارنى داۋاملىق ئەمگۈزۈش،
كېسەللىك ئەھۋالى ياخشىلانغاندىن كېيىن، تەدرىجىي نورمال ئوزۇق-

لاندۇرۇشقا ئۆزگەرتىش لازىم. ئىچى سۈرگەن مەزگىلدە يېڭىدىن قوشۇمچە يېمەكلىك قوشماسلىق، ئىچى سۈرۈش ياخشىلىنىپ نورمال ئوزۇقلىنىش ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن، ئاندىن قوشۇش كېرەك. (2) كاسا قىسمىنىڭ پەرۋىشىنى كۈچەيتىش لازىم. كېسەلدە چوڭ

تەرەت قېتىم سانى كۆپ بولغانلىقتىن، كاسا قىسمىدىكى تېرىلەر غىدىقلىنىپ ئاسانلا قىزىرىپ قالىدۇ. بۇنىڭدىن ساقلىنىش ئۈچۈن بالىنىڭ زاكسىنى ۋاقتىدا، پات-پات ئالماشتۇرۇپ، كاسسىنى ئىلمان سۇ بىلەن يۇيۇپ، يۇمشاق لوڭگە بىلەن ئاۋايلاپ پاكىز سۈرتۈپ، زېدىلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئىشلىتىلىدىغان زاكىلارنى يۇمشاق، سۇنى ئاسان شۇمۇرىدىغان رەختلەردىن قىلىش لازىم. ئەگەر پەرۋىش قىلىش ياخشى بولماسلىقتىن كاسا قىسمى قىزىرىپ قالغان بولسا، % 3 لىك دانىكار كىسلاتا سۈيى بىلەن يۇيۇپ، قۇرۇغاندىن كېيىن ۋازېلىن، بېلىق مېيى ياكى سۇيۇق پارافىن يېغى قاتارلىقلارنى سۈ-رۈپ، ئوچۇق قويۇپ قۇرۇتۇش لازىم.

(3) داۋاملىق بەدەنلىرىنى ئۆرۈپ تۇرۇش بىلەن ئۆپكە ياللۇغى قوشۇلۇپ كېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

(4) ئېغىز، قوللىرىنىڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلىش لازىم. ئىچى سۈرگەن بالىلارغا شېكەر سۈيى ئىچكۈزگەندىن كېيىن ئېغىزنى چايد-قاش ياكى ئازراق ئىلمان قايناق سۇ ئوتلىتىۋېتىش لازىم، ئەگەر ئېغىز بوشلۇقىدا غاز بوغۇز كېسەللىكى كۆرۈلسە، ۋىتامىنلىق دورىلارنى بېرىش بىلەن ئېغىز بوشلۇقىغا % 1 لىك سۆسۈن دورا (گېنتيان ۋىئولېت) سۈرۈپ قويىسا بولىدۇ.

(5) كېسەللىك ئەھۋالىنى يېقىندىن كۆزىتىش، قۇسۇش، ئىچى سۈرۈش قېتىم سانى، خاراكتېرى، تەركىبىي، مىقدارى، سۈيدۈك قېتىم

سانى ۋە مىقدارى، ئاخىرقى قېتىمقى سۈيىدۈكى ياكى سۈيۇقلۇق بىلەن داۋالغان بولسا، بىرىنچى قېتىم سۈيىدۈك كەلگەن ۋاقتى قاتارلىقلارنى ئوبدان خاتىرىلەش كېرەك.

6) دوختۇرخانىدا يېتىپ داۋاللىنىۋاتقان بولسا، سۈنى ۋاقتىدا ئىچكۈزۈشتىن سىرت، ئىچكۈزۈپ سۈيۇقلۇق تولۇقلاش تۈزىنى ۋاقتى قارارىدا ئىچكۈزۈش، ئەگەر ۋېنادىن سۈيۇقلۇق تولۇقلانغان بولسا، تامچىلاش تېزلىكى قاتارلىقلارنى يېقىندىن كۆزىتىش لازىم.

7) يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشتە ئايرىش، دېزىد-فېكسىيە قىلىشقا دىققەت قىلىش كېرەك.

2. يۇقۇملىنىشنى تىزگىنلەش

ئىچى سۈرگەن بالىلارنىڭ ھەممىسىگىلا ئانتىبىيوتىك دورىلارنى قالايمىقان ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. دۆلىتىمىزدە ئىچى سۈرۈش كېسەللە-كىگە قالايمىقان دورا ئىشلىتىش ئېغىر، بۇ خىل ئەھۋالنى تۈزىتىشكە توغرا كېلىدۇ. يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرگەنلەرنىڭ تەخمىنەن %70 ى ۋىرۇس ياكى توكسىن ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك باكتېرىيەلەر پەيدا قىلىدۇ. بۇنداقلارغا ئانتىبىيوتىك دورىلارنى ئىشلەت-تىش ھاجەتسىز. پەقەت سۈيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش بىلەن ئالامەت-لىرىگە قارىتا داۋالاشنى چىڭ تۇتسلا ساقىيىپ كېتىدۇ. ئانتىبىيوتىك دورىلار پەقەت چوڭ تەرەت شىلىمىش، قان، يىرنىڭ بارلارغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ خىل ئىچى سۈرۈشنى (بالىلار تەخمىنەن %30 نى ئىگىلەي-دۇ) بۆسۈپ كىرىش تىپلىق باكتېرىيەلەر پەيدا قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن دورا ئىشلىتىشتىن ئىلگىرى كېسەللىك سەۋەبىنى ئەستايىدىل ئانالىز قىلىپ، ئانتىبىيوتىك دورىلارنى ئىشلىتىش ياكى ئىشلەتمەس-

لىكىنى ئويلىشىش لازىم. ئەگەر شارائىت يار بەرسە چوڭ تەرەتتىن باكتېرىيە ئۆستۈرۈش ۋە دورىغا سەزگۈرلۈك تەجرىبىسىنى ئىشلەپ ئاندىن دورا ئىشلەتسە، تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئىچى سۈرۈشنى داۋالايدىغان دورىلار تۆۋەندىكى تەلەپلەرگە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

(1) دورىلىق رولى كۈچلۈك بولۇپ، ئىشلەتكەندىن كېيىن ئۈنۈمى بار بولۇشى؛

(2) ھەر خىل سەۋەبلەر قوزغاتقان ئىچى سۈرۈشكە بىردەك ئۈنۈمى بولۇشى؛

(3) ئاساسلىقى ئۈچەي يوللىرى يەرلىك قىسمىغا تەسىرى ياخشى بولۇشى، پۈتۈن بەدەنلىك ناچار تەسىرى بولماسلىقى ياكى بەك ئاز بولۇشى؛

(4) ئۈچەي يوللىرىنىڭ نورمال خىزمىتىگە تەسىر يەتكۈزمەيدىغان، بولۇپمۇ ناتىرىي، گلۇكوزا قاتارلىقلارنىڭ ماسلىشىش رولىغا توقۇنۇش پەيدا قىلمايدىغان بولۇشى؛

(5) باھاسى ئەرزان، ناچار تەسىرى ئاز، ئاسان تېپىلىدىغان دورىلار بولۇشى لازىم. شۇنداق بولغاندا داۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

يۇقۇملىنىشتىن بولغان ئىچى سۈرۈشكە تۆۋەندىكى ئانتىبىيوتىك دورىلاردىن بىر خىلىنى تاللاپ ئىشلىتىش لازىم. ئەگەر كېسەل ئەھۋالى ئېغىر بولۇپ، بىر خىل دورا بىلەن يۇقۇملىنىشنى تىزگىنلەش قىيىن بولسا، ئىككى خىل دورىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىشنى ئويلىشىش لازىم. ئانتىبىيوتىك دورىلارنى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار، كىچىك بوۋاقلار، بەدىنى ئاجىز، كېسىلى ئېغىرلارغا ئىشلەتكەن ياخشى. ئۇز-

دىن باشقا، بۆسۈپ كىرىش خاراكتېرلىك باكتېرىيىلەر قوزغاتقان ئۈچەي ياللۇغغا ئىشلىتىلىدۇ. ئانتىبىيوتىك دورىلار كېسەل قوزغاتقۇ- جى باكتېرىيىلەرنى تېزدىن ئۆلتۈرۈپ، كېسەللىك جەريانىنى قىسقارتىدۇ. (1) چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغغا گىنتا- مېتسىن، SMZco، فورازولىدون، ئامىكاسىن، ئامپىتسىللىن، پولىمىك- سىن B قاتارلىقلاردىن تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ. (2) ئاچچىق ئۈچەي ئەگرى باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغغا، گىنتامېتسىن، ئىرىترومېتسىن، خلورومېتسىن، فورازولىدون، ئامىكاسىن ئىشلىتىلىدۇ.

(3) چاشقان كېزىك سالىمۇنىلا باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغغا ئامپىتسىللىن، گىنتامېتسىن، سىفاماندولى، SMZco قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. (4) ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغغا بۇرۇن ئىشلىتىۋاتقان ئانتىبىيوتىكلارنى توختىتىپ، ئىرىترو- مېتسىن، ئوكساتسىللىن، نافتىسىللىن، كلوكاتسىللىن قاتارلىقلاردىن تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

(5) زەمبۇرۇغلۇق ئۈچەي ياللۇغغا نىستاتىن، كلوتىرېمازول قا- تارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ.

(6) پارازىت قۇرتلار كەلتۈرۈپ چىقارغان ئۈچەي ياللۇغغا مېترونىدازول قاتارلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. تۆۋەندە تونۇشتۇرۇلغان دورىلاردىن تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

(7) ۋىرۇسلۇق ئۈچەي ياللۇغىنى داۋالايدىغان ئالاھىدە دورا يوق، پەقەت يېمەكلىك بىلەن داۋالاش، سۇسىزلىنىش، ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىشنى تۈزەشنى چىڭ تۇتۇپ، قۇۋۋەتلەپ داۋالاشنى ماس- لاشتۇرسىلا، تېزدىن ساقىيىپ ئەسلىگە كېلىدۇ. بەزىلەر ۋىرازول

ئوكۇلى، ئىنتېرفېرون (IF) قاتارلىقلارنى ئىشلىتىپ داۋالاۋاتىدۇ. لېكىن ۋىرۇسلۇق يۇقۇملىنىشتا ئۆزلۈكىدىن چەكلىنىش ئالاھىدىلىكى بولغانلىقتىن، يۇقىرىدىكى داۋالاشنى چىڭ تۇتسلا، ساقىيىپ كېتىدۇ. كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئانتىبىيوتىك دورىلار ۋە مىقدارى:

1. گېنتامىتسىن (庆大霉素): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 15mg ~ 5mg دىن ھېسابلاپ، ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ.

2. بېرىن تابلىتى (黄连素): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 10mg دىن ھېسابلاپ، ئىككى ياكى ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ. ياكى كۈنلۈكى ئىككى قېتىمدىن مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىسمۇ بولىدۇ.

3. SMZco (复方新诺明): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 50mg دىن ھېسابلاپ، ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ.

4. فورازولىدون (痢特灵): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 10mg دىن ھېسابلاپ، ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ.

5. ئامپىتسىللىن (氨基苄青霉素): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 100mg دىن ھېسابلاپ، ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ ياكى كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 100~150mg دىن ھېسابلاپ، ۋېنادىن تامچىلاتىسمۇ بولىدۇ، ئېغىر يۇقۇملىنىشلاردا كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 200mg دىن ھېسابلاپ، ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ، ۋېنادىن تامچىلاتىسمۇ بولىدۇ.

6. نىئومىتسىن (新霉素): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 50~100mg دىن ھېسابلاپ، ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ.
 7. فلۇپىپىرى (氟派酸): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 20mg دىن ھېسابلاپ، 2~3 قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ. بۇ دورىنى بىر ياشتىن كىچىك بالىلارغا ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ئۇنىڭدىن چوڭلارغا ئىشلەتكەندىمۇ ئىشلىتىش ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولماسلىقى لازىم.
 8. ئامىكاسىن (丁胺卡那霉素): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 15~20mg دىن ھېسابلاپ، ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ ياكى كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 8~15mg دىن ھېسابلاپ، ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ، مۇسكۇلدىن ئوكۇل قىلىسمۇ بولىدۇ. ئىچكۈزگەندىكى ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ.
 9. پولىمىكسىن B (多粘菌素 B): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 10~20mg دىن ھېسابلاپ، ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ.
 10. سىفوبىدوم (先锋霉素必): كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 50~100mg دىن ھېسابلاپ، ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ، ۋېنادىن تامچىلىتىدۇ.
- يۇقىرىدىكى دورىلاردىن بىر خىلنى، ئېغىرراق ئاغرىقلارغا ئىككى خىلنى تاللاپ، 7~5 كۈن ئىشلىتىش لازىم. دورىلارنى كۆپ ئالماشتۇرۇشقا بولمايدۇ، ئادەتتە ئۈچ كۈن ئىشلىتىپ ئۈنۈمى كۆرۈلمەسە، ئاندىن باشقا خىلغا ئالماشتۇرۇش لازىم. يېشى كىچىك، كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلارغا بىر خىلنى ئىچكۈزۈپ، بىر خىلنى ۋېنادىن

تامچىلىتىش ئۇسۇلىنى قوللانسا بولىدۇ. ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇ-غىنى داۋالغاندا، ئىرترومىتسىندىن كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 25~50mg دىن ھېسابلاپ، 3~2 قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ ياكى ۋېنادىن تامچىلاتسىمۇ بولىدۇ ياكى ئوكۇل قىلىندۇ. ئوكساتسىللىن (新青霉素 II)، نافتىسىللىن (乙氧萘青霉素) ياكى كلوكساتسىللىن (邻氯青霉素) قاتارلىقلاردىن بىرەرنى تاللاپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

زەمبۇرۇغلۇق ئۈچەي ياللۇغىنى داۋالاش
زەمبۇرۇغلۇق ئۈچەي ياللۇغىنى داۋالغاندا، ئالدى بىلەن نىستاتىن (制霉菌素) بېرىلىدۇ. ئىككى ياشتىن كىچىكلەرگە كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 100~200 مىڭ بىرلىكتىن، ئىككى ياشتىن چوڭلارغا كۈنىگە 200~500 مىڭ بىرلىكتىن ھېسابلاپ، 3~4 قېتىمغا بۆلۈپ ئىچكۈزۈلىدۇ ياكى كلوتىمازول (克霉唑) دىن كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 30~60mg ھېسابلاپ، 3 قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ.

پارازىت قۇرتلار كەلتۈرۈپ چىقارغان ئۈچەي ياللۇغىنى داۋالاش
ئالدى بىلەن ئۈچەي ياللۇغىنى قوزغاتقۇچى پارازىت قۇرتنىڭ قايسى خىلدىكى قۇرت ئىكەنلىكىنى ئېنىقلاپ، ئاندىن دورا ئىشلىتىش لازىم. ئىچى سۈرۈشنى قوزغاتقۇچى يېشىل رەڭلىك ئامۇت شەكىللىك قامچا قۇرت قوزغاتقان ئۈچەي ياللۇغىغا ۋە تامچا قۇرتلارغا مېترونىدا-زول (灭滴灵) دىن كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 50mg دىن ھېسابلاپ، ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ئىچكۈزۈلىدۇ. بىر داۋالاش

كۈرسى 10~5 كۈن.

ئالامىتىگە قارىتا داۋالاش.

ئىچى سۈرۈش: ئىچى سۈرگەن بالىلارغا ئادەتتە ئىچى سۈرۈشنى توختاتقۇچى دورىلار ئىشلىتىلمەيدۇ. پەقەت كېسەل سەۋەبىنى داۋالاش بىلەن سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋا ش نۇقتىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. پەقەت يۇقىرىدىكى داۋالاش ئارقىلىق ئادەتتىكى ئەھۋالى ياخشىلانغان، زە-ھەرلىنىش ئالامەتلىرى يوقالغان بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا كەينى-كەينى-دىن ئىچى سۈرۈپ توختىمىغۇچىلارغا تانالىبن (鞣酸蛋白)، بىسموت سوبىكاربونات (次碳酸铋) ياكى ئاليومىن ھىدروكسىد (氢氧化铝) قاتارلىق قورۇغۇچى ياسالما لار ئارىلاپ ئىشلىتىلىدۇ. لېكىن ئىچى سۈرۈشنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ئۆتكۈر يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشتە، ئىنچىكە ئۈچەينىڭ سۇ بىلەن ئېلىپكېتىلىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش كۆپىيىپ كەتكەنلىكتىن بول-دۇ، ئۈچەي يوللىرىدىكى دىنامىكىلىق ئۆزگىرىش بىلەن مۇناسىۋىتى چوڭ ئەمەس، شۇڭا ئۈچەي لۆمۈلدەش ھەرىكىتىنى تورمۇزلىغۇچى دورىلارنىڭ داۋالاش رولى يوق، ئەكسىچە ئۈچەيدىكى نەرسىلەرنىڭ چىقىرىلىشىنى ئاستىلىتىپ، كېسەل قوزغاتقۇچى مىكرو ئورگانىزىملار-نىڭ ئۈچەي شىللىق پەردىسى بىلەن ئۇچرىشىش پۇرسىتىنى ۋە زەھەرلىك مەھسۇلاتلارنىڭ شۈمۈرۈلۈشىنى كۆپەيتىدۇ. بۇ، كېسەللىك ئەھۋالىنى ئېغىرلاشتۇرۇشى مۇمكىن. يېپىشتۇرۇلغۇچىلار باكتېرىيە ۋە توكسىنلارنى يېپىشتۈرۈپلىشتىن سىرت ئوزۇقلۇق ماددىلارنى، فېرېمېنت ۋە ئانتىبىيوتىكلارنى يېپىشتۈرۈپلىشىمۇ مۇمكىن. ئىچى سۈرۈشنى توختىتىش رولى كۆزگە كۆرۈنەرلىك ئەمەس. يېقىنقى يىللاردىن بېرى ۋىنترىن (冬眠灵)، بىسموت سۇبسالسىلات (次水杨酸铋)

ئىندومېتاسىن (消炎痛) لارنىڭ ئۈچەي توكسىنىنى ياكى بۆسۈپ كىرىش تىپلىق باكتېرىيىلەر قوزغاتقان ئۈچەي شىللىق پەردىسىنىڭ ئاجرىتىش رولىنى تورمۇزلايدىغانلىقى ياكى يېنىكلىتىدىغانلىقى، رېزى ناخولېسترامىن (消胆胺) نىڭ ئۆت كىسلاتاسى ۋە باكتېرىيە توكسىنىلىرى بىلەن بىرىكىدىغانلىقى، بۇلارنىڭ ئىچى سۈرۈشنى يېنىكلەتىش تەرەپلەردە قوشۇمچە ئۈنۈمى بارلىقى ھەققىدە مەلۇماتلار بار. قۇسۇش: بۇنىڭ كۆپىنچىسى كىسلاتادىن زەھەرلىنىش ۋە پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامىتى بولۇپ، سۇسىزلىنىش، كىسلاتادىن زەھەرلىنىش، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ياخشىلىنىشىغا ئەگىشىپ، تەدرىجىي ياخشىلىنىدۇ. ئەگەر قۇسۇش توختىمىسا زۈسەنلى، نېگىزەن قاتارلىق پەللىلەرگە يىڭنە سانجىسا بولىدۇ ياكى خىلورپرومازىن (氯丙嗪) دىن كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن $0.5 \sim 1\text{mg}$ دىن ھېسابلاپ، مۇسكۇلغا ئۆكۈل قىلسا بولىدۇ ياكى ئېمول (爱茂尔) ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

قورساق ئېسىلىش: ئاساسلىقى ئۈچەي يوللىرىدىكى باكتېرىيەنىڭ ئۈچەيدىكى شېكەرنى پارچىلىغاندا گاز كۆپ ھاسىل بولۇشىدىن قورساق كۆپىدۇ ياكى باكتېرىيىلەر چىقارغان زەھەرنىڭ تەسىرىدىن قورساق ئېسىلىدۇ. قاندا كالىينىڭ تۆۋەنلىشىدىنمۇ قورساق ئېسىلىدۇ. قورساق ئېسىلىپ قالغاندا، ئالدى بىلەن سۇسىزلىنىشنى تۈزىتىش، سۇسىزلىنىشنىڭ تۈزىلىشىگە ئەگىشىپ سۈيىدۈك كەلگەندىن كېيىن، كالىي تولۇقلاپ بېرىش كېرەك. ياخشىلانسا كالىينىڭ كەملىكىدىن قورساق ئېسىلگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا زۈسەنلى، تىيەنچۇي، چىخەي پەللىلىرىگە يىڭنە سانجىلىدۇ ياكى قورساق قىسمىغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش بولىدۇ. قورساقنىڭ ئېسىلىشى ئېغىر بولسا

نېئوستىگمىن (新斯的明) دىن ئىككى ياشتىن چوڭلارغا بىر قېتىمدا $0.2 \sim 0.3 \text{ ml}$ ، $2 \sim 3$ ياشتىكىلەرگە بىر قېتىمدا $0.3 \sim 0.5 \text{ ml}$ ، 5 ياشتىن چوڭلارغا بىر قېتىمدا $0.5 \sim 1 \text{ ml}$ تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىپ، 20 مىنۇتتىن كېيىن ئانوسقا نەيچە سېلىپ، يەل چىقىرىلىدۇ.

ھەزىم قىلىشقا ياردەملەشكۈچى دورىلاردىن پېپسىن (胃蛋白酶)، قۇرۇق يېئاسىت (干酵母)، پانكرېئاتىن (胰酶)، دومىپىن-ھەن (多酶片) قاتارلىق دورىلارنى بېرىپ، ھەزىم قىلىشقا ياردەم-لەشتۈرۈلىدۇ. باكتېرىيە توپلىرى تەڭپۇڭلۇقى بۇرۇلۇشتىن قورساق ئېسىلگەنلەرگە ئەسلىدە ئىشلىتىۋاتقان ئانتىبىيوتىك دورىلارنى توختىتىپ، ۋىتامىنلىق دورىلاردىن ۋىتامىن B_1 ، C، B_{12} قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. ئەسلىدە ئوزۇقلىنىش ناچارلىق، قان ئازلىق كېسەللىكى بار ياكى يېشى بەك كىچىك، ئىچى سۈرگەن ۋاقتى ئۇزۇن، تاماق يېيەلمەيدىغان، ئاجىز بالىلارغا ئاز مىقداردىن كۆپ قېتىم قان ياكى قان پلازىمىسى سېلىپ قۇۋۋەتلەندۈرسە بولىدۇ.

3. ئىكولوگىيىلىك داۋالاش

ئىچى سۈرۈش بالىلاردا كۆپ پەيدا بولىدىغان كېسەللىك. مىكروئىكولوگىيە ئىلمى نۇقتىئىنەزەردىن قارىغاندا، ئۈچەي يوللىرىدىكى ئىكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. ئىكولوگىيىلىك داۋالاش بىر خىل يېڭى داۋالاش ئۇسۇلى بولۇپ، تەرەققىيات ئىستىقبالى پارلاق. ھازىرقى زامان تېببىي پەن ئىلمىدىكى تەتقىقاتلار مەيلى ئادەم ياكى ھايۋانلار بولمىسۇن بەدەندە ئوكسىگېندىن قاقچۇچى باكتېرىيە ئوكسىگېنگە خۇمار باكتېرىيىگە قارىغاندا سان جەھەتتىن ناھايىتى كۆپ ئىكەنلىكىنى بايقىدى. بۇلار ئورگانىزم

بىلەن ئۆز ئارا يۆلىنىپ ئىكولوگىيىلىك تەڭپۇڭلۇقنى ساقلايدىكەن. ئورگانىزم ئۈچەي يوللىرىدىكى نورمال باكتېرىيە توپىنىڭ ئورۇنلىشىشى ئۈچۈن پايدىلىق شارائىت ھازىرلاپ بېرىدۇ. ئۈچەي يوللىرىدا ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەن ئوكسىگېندىن قاققۇچى باكتېرىيە توپى ساغلاملىقنى ساقلاشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ خىل داۋالاشنى قوللىنىشتىكى مەقسەت، ئۈچەي يوللىرىدىكى نورمال باكتېرىيە توپىنىڭ ياشاش ئادىتىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، كېسەل قوزغاتقۇچى باكتېرىيىلەرنىڭ ئورۇنلىشىپ، كۆپىيىپ، بېسىپ كىرىشىگە قارشىلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق، ئىچى سۈرۈشنى كونترول قىلىشقا پايدىلىق شارائىت ھازىرلاشتىن ئىبارەت. بالىلار ھەر خىل ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچراشتىن، مەسىلەن: سوغۇق تېگىش، يېمەكلىك تۈرلىرىنى تۇيۇقسىز ئۆزگەرتىش، ئانتىبىيوتىك دورىلارنى قالايمىقان ئىشلەتىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن، ئۈچەي يوللىرىدىكى قوش ئاچماقلىق تاياقچە باكتېرىيە سانى كۆزگە كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەيدۇ. ئۇنىڭ بىئولوگىيىلىك توسۇش رولى ئاجىزلىشىدۇ، بۇنىڭ بىلەن ئۈچەي يوللىرىدىكى كېسەللىك قوزغاتقۇچى باكتېرىيە پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ھۈجۈم قىلىپ كىرىپ، ئىچى سۈرۈشنى پەيدا قىلىدۇ. ئۈچەي يوللىرىنىڭ ئىكولوگىيىلىك تەڭپۇڭلۇقنى ساقلاش ۋە ئاسراش بالىلاردىكى ئىچى سۈرۈش كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

يېقىنقى يىللاردىكى تەتقىقاتلار ئادەم بەدىنىدە تۈمەن مىليارت مىكرو ئورگانىزملارنىڭ بارلىقىنى، ئۇنىڭ ئىچىدىكى كۆپ قىسمى ئادەم بەدىنى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان پايدىلىق مىكرو ئورگانىزملار ئىكەنلىكىنى بايقىدى. بولۇپمۇ بۇنىڭ ئىچىدىكى قوش ئاچماقلىق

تاياقچە باكتېرىيە بەدەننىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى، ماددا ئالمىشىش، ياشاش، قېرىش، كېسەل بولۇش، ئۆلۈش قاتارلىقلاردا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بايقىدى. بۇلارنىڭ ئىچىدە كۆپ ئىشلىتىلىدىغانىنى تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىل ياسالمايلاردىن ئىبارەت.

(1) پوبىفىدوبىئوگېن (回春生): بۇ يېڭى دورا بولۇپ، قوش ئاچماقلىق تاياقچە باكتېرىيە ياسالمىسى. بۇ دورىنى ئىچكەندىن كېيىن ئوخشاشمىغان ياشتىكىلەرنىڭ ئۈچەي يوللىرىدىكى قوش ئاچماقلىق تاياقچە باكتېرىيىنى تولۇقلاپ، زىيانلىق باكتېرىيىلەرنىڭ ئۆسۈشىنى ئۈنۈملۈك تۈردە تورمۇزلايدۇ، ئىچكى توكسىنلارنى تۆۋەندىلىتىدۇ، مىكرورۇڭگىزىملار ياشاش ئادىتى تەڭپۇڭلۇقىنى قايتىدىن قۇرۇدۇ.

قوش ئاچماقلىق تاياقچە باكتېرىيە توپى نورمال ئادەم ئۈچەي يوللىرىدا ياشايدۇ ھەمدە ئۈچەي شىللىق پەردە ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىلىرى بىلەن چىڭ بېرىكىدۇ ھەم باشقا ئوكسىگېندىن قاقچۇچى باكتېرىيىلەر بىلەن بىرلىكتە ئۈچەي شىللىق پەردىسى يۈزىگە ئورۇنلىشىپ، بىئولوگىيىلىك توساق شەكىللەندۈرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن كېسەللىك قوزغاتقۇچى باكتېرىيىلەرنىڭ ئورۇنلىشىشى بىلەن ھۇجۇم قىلىپ كىرىشىنى توسىدۇ. ئۈچەي يوللىرىدا كۆپ خىل ۋىتامىنلارنى بىرىكتۈرۈپ، بەدەننىڭ ئوزۇقلۇق مەنبەسىنى كۆپەيتىدۇ، ئىممۇنىت فۇنكسىيىسىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. شۇڭا بۇ دورا يېقىنقى ۋاقىتلاردىن بېرى بوۋاقلار ۋە ئۆسمۈرلەردىكى ئوزۇقلۇق ناچارلىق، ھەزىم قىلىش ناچارلىق، ئۈچەي يوللىرى خىزمىتى قالايمىقانلىشىش قاتارلىقلارنى داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ ھەمدە ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك ئۈچەي ياللۇغى، داۋالاش قىيىن بولغان ئىچى سۈرۈش

قاتارلىقلاردا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ھەر خىل سەۋەبلەر قوزغاتىدىغان ئۈچەي يوللىرى باكتېرىيە توپى قالايمىقانلىشىشقا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ دورا بىخەتەر، ھېچقانداق ناچار تەسىرى يوق.

سېروئىئوگېن (促菌生): بۇ زەھەرسىز مومسىمان سپورىلىق تاياقچە باكتېرىيە بولۇپ، ئۈچەي يوللىرىدىكى ئوكسىگېندىن قاچقۇ-چى باكتېرىيە توپىنىڭ ئۆسۈشىگە ياردەم بېرىدۇ.

3) لاکتول فورت (乐托尔): بۇ دورا كىسلاتا خۇمار سۈت تاياقچە باكتېرىيىسى ھەم ئۇنىڭ ماددا ئالمىشىش ئەھسۇلاتلىرى بولۇپ، بۇنىڭ باكتېرىيىنى تورمۇزلاش، ئۈچەي يوللىرىدىكى SIgA نى ئاجرىتىش ھەم باكتېرىيە، ۋىرۇسنىڭ ئۈچەي تۈتىگە چاپلىنىشىنى توسۇش، ئىچى سۈرۈش ۋاقتىنى قىسقارتىش، چوڭ تەرەت قېتىم سانى ھەم چوڭ تەرەتتىكى سۇ مىقدارىنى ئازلىتىش قاتارلىق رولى بار.

4) پېفېيكاڭ (培菲康): بۇ دورا قوش ئاچماقلىق تاياقچە باكتېرىيە، كىسلاتا خۇمار سۈت تاياقچە باكتېرىيىسى ھەم گەندە زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيىسىنىڭ بىرلەشمە ياسالمىسى بولۇپ، ئۈچەي يوللىرىدىكى نورمال باكتېرىيە توپىنى تولۇقلاپ، كېسەللىك قوزغاتقۇچى مىكرو ئورگانىزملارنىڭ ئورۇنلىشىشىغا قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، كېسەللىك قوزغاتقۇچى باكتېرىيەنىڭ ئۆسۈشىنى چەتكە قاقىدۇ. شۇڭا ئىچى سۈرۈشنىڭ ساقىيىپ، ئەسلىگە كېلىشى ئۈچۈن پايدىسى بولىدۇ.

4. سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش

مەقسەت: سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقى قالايمىقانلىشىشىنى

تۈزىتىپ، ئورگانىزمنىڭ نورمال فىزىئولوگىيىلىك ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت. سۈيۈقلۈك تولۇقلاپ داۋالاش-ئىچكۈزۈپ سۈيۈقلۈك تولۇقلاش، ۋىنادىن سۈيۈقلۈك كىرگۈزۈپ سۈيۈقلۈك تولۇقلاش، ئارىلاش سۈيۈقلۈك تولۇقلاشلارغا بۆلىنىدۇ. سۈيۈقلۈك تولۇقلاشتىن ئىلگىرى كېسەل تارىخى، كلىنىكىلىق ئالامىتى، ئىپادىسى، لابوراتورىيىلىك تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئاساسلىنىپ، سۇ ۋە ئېلېكتىر رولىتلار قالايمىقانلىشىشنىڭ خاراكتېرى ۋە دەرىجىسىنى مۆلچەرلەپ، مۇۋاپىق كېلىدىغان داۋالاش لايىھىسىنى بېكىتىش، ھەمدە ئەمەلىيەتتە كۆپ ئىشلىتىدىغان ئېرىتمىلارنىڭ تەركىبىي، ماسلىشىشچانلىقى، ئۇ سۇلى قاتارلىقلارنى پىششىق ئىگىلەش لازىم. ئاندىن تولۇقلىنىدىغان سۈيۈقلۈكنىڭ ئومۇمىي مىقدارى، تەركىبىي، قەدەم باسقۇچلىرى ۋە سۈرئىتىنى بەلگىلەش لازىم. سۈيۈقلۈك تولۇقلاش جەريانىدا كېسەل ئەھۋالىدىكى ئۆزگىرىشنى يېقىندىن كۆزىتىپ، ئۆز ۋاقتىدا تەڭشەش لازىم، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا داۋالاش جەريانىدا بەدەننىڭ تەڭشەش ئىقتىدارىنى تولۇق مۆلچەرلەش لازىم. ئادەتتىكى ئەھۋالدا بېرىلىدىغان سۈيۈقلۈك كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسىي جەھەتتىن ئۇيغۇن بولۇشى، بۆرەكنىڭ تەڭشەش دائىرىسىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى، سۇ ۋە ئېلېكتىرولىت تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئېھتىياجىغا ماس كېلىشى كېرەك. شۇڭا بەك مۇرەككەپلەشتۈرۈۋەتمەسلىك لازىم.

1. ۋىنادىن سۈيۈقلۈك تولۇقلاپ داۋالاش

سۈيۈقلۈك تولۇقلاشتىكى قەدەم-باسقۇچلىرى.

ۋىنادىن سۈيۈقلۈك تولۇقلاپ داۋالاش كلىنىكىدا خېلى كەڭ

دائىرىدە ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. بوۋاق، گۆدەك بالىلار ئىچى سۈرۈش، قۇ-
سۇش، يەپ-ئىچمەسلىك تۈپەيلىدىن دائىم سۇسىزلىنىش، كىسلاتادىن
زەھەرلىنىش، قاندىكى كالىي، كالتسىي، ماگنىي قاتارلىقلار تۆۋەنلەش
كېلىپ چىقىدۇ، بۇلارنى تېزىدىن تولۇقلاپ، بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ
تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاپ، ئورگانىزم ئىچكى مۇھىتنىڭ مۇقىملىقىنى
ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن، سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش ئىنتايىن
مۇھىم. ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش ئوتتۇرا دەرىجىلىكتىن
يۇقىرى سۇ يوقاتقان ياكى ئىچى سۈرۈش، قۇسۇش ئېغىر ياكى
قورسىقى بەك كۆپۈپ كەتكەنلەرگە مۇۋاپىق كېلىدۇ. ۋېنادىن سۇيۇق-
لۇق تولۇقلاپ داۋالاش تۆۋەندىكى ئۈچ مەزمۇننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
① بۇرۇن يوقاتقان مىقدارنى تولۇقلاش؛ ② داۋاملىق يوقىتىۋاتقىنى-
نى تولۇقلاش؛ ③ فىزىئولوگىيىلىك سەرىپياتنى تولۇقلاش.

بۇ ئۈچىنى تولۇقلاش ئىككى باسقۇچ بويىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ.
بىرىنچى باسقۇچى، سۇسىزلىنىش ئەھۋالىغا ئاساسلىنىپ بۇرۇن يوقات-
قان مىقدارنى تولۇقلاش، بۇ جىددىي قۇتقۇزۇش باسقۇچى؛ ئىككىن-
چى باسقۇچ، سۇسىزلىنىش تۈزىتىلگەندىن كېيىن داۋاملىق يوقىتىۋات-
قىنى بىلەن فىزىئولوگىيىلىك ئېھتىياجنى تولۇقلاش باسقۇچىدىن
ئىبارەت. چۈنكى سۇسىزلىنىش تۈزەلگەندىن كېيىن يەنىلا داۋاملىق
ئىچى سۈرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار داۋاملىق يوقىلىدۇ،
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىچى سۈرگەن بالا ياخشى ئوزۇقلانمايدۇ، بەزىلىرى
قۇسىدۇ، مۇشۇنداق ئەھۋاللاردا سۇ ۋە ئېلېكترولىتلارنىڭ فىزىئولوگى-
يىلىك سەرىپياتىنى ۋە زۆرۈر بولغان ئېنېرگىيىنى تولۇقلاش لازىم.
بۇرۇن يوقاتقانى تولۇقلاشقا بېرىلىدىغان سۇيۇقلۇق پلانىنى
بېكىتىشتىن ئىلگىرى، ئالدى بىلەن ئۈچىنى بېكىتىش لازىم يەنى

سۇسزلىنىش دەرىجىسىنى بېكىتىش، سۇسزلىنىش خاراكتېرىنى بېكىتىش، كىرگۈزۈلىدىغان سۇيۇقلۇقنىڭ سۈرئىتىنى بېكىتىش لازىم. بۇرۇن يوقاتقان مىقدارنى تولۇقلاش بۇ بالا ئاغرىغاندىن كېيىن يوقاتقان سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار ئومۇمىي مىقدارنى تولۇقلاشنى كۆرسىتىدۇ. بۇ سۇيۇقلۇق تولدۇرۇش، سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاشتا ئىنتايىن مۇھىم.

بۇرۇن يوقاتقان مىقدارنى تولۇقلاش: سۇسزلىنىش دەرىجىسىدە ئاساسلىنىپ بېكىتىلىدۇ. يەنى يېنىك دەرىجىدە سۇسزلانغانلارغا ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 50ml دىن؛ ئوتتۇرا دەرىجىدە سۇسزلانغانلارغا ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 50~100ml دىن؛ ئېغىر دەرىجىدە سۇسزلانغانلارغا ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 100~120ml دىن تولۇقلىنىدۇ. يۇقىرىدىكى مىقداردىن مەكتەپ يېشىغا يەتمىگەن ئۆسمۈرلەرگە ھەر قايسى دەرىجىدىن 1/4، مەكتەپ يېشىدىكى ئۆسمۈرلەرگە 1/3 نى ئازايتىپ تولۇقلىسا بولىدۇ. تولۇقلىنىدىغان ئېرىتمە سۇسزلىنىش خاراكتېرىگە ئاساسەن بەلگىلىنىدۇ. تەڭ ئۆسمۈسلۈك سۇسزلىنىشقا 1/2 كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ناترىيلىق سۇيۇقلۇق، تۆۋەن ئۆسمۈسلۈك سۇسزلىنىشقا 2/3 كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ناترىيلىق سۇيۇقلۇق، يۇقىرى ئۆسمۈسلۈك سۇسزلىنىشقا 1/4~1/3 كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ناترىيلىق سۇيۇقلۇق تولۇقلىنىدۇ.

ئادەتتە، بۇرۇن يوقاتقان مىقدارنى تولۇقلىغاندا، يۇقىرىدا سۆزلەنگەن مىقدارنىڭ 2/3 قىسمى ئالدىن بېرىلىدۇ، بۇنىڭ سەۋەبى، ھۈجەيرە سىرتىدىكى ناترىي ھەزىم قىلىش يوللىرى ئارقىلىقلا يوقىتىلىپ قالماستىن، بەلكى ھۈجەيرىلەر كالىي يوقاتقانلىقتىن بىر قىسىم

ناترىي ھۈجەيرە ئىچىگە كىرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇق-
قىدا كالىي كەمچىل، ناترىي كۆپ بولىدۇ. كالىي تولۇقلىغاندا ھۈجەيرە-
رە ئىچى سۇيۇقلۇقىدىكى كالىينىڭ تولۇقلىنىپ ئەسلىگە كېلىشىگە
ئەگىشىپ، ناترىي ھۈجەيرە سىرتىغا قايتىپ كېلىدۇ، شۇڭا ھۈجەيرە
سىرتى سۇيۇقلۇقىنىڭ زىيادە كۆپ كېڭىيىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش
ئۈچۈن ئالدى بىلەن $2/3$ قىسىم مىقدارىنى بېرىپ، كېسەللىك
ئەھۋالىنى يېقىندىن كۆزىتىپ، تولۇقلاشقا تېگىشلىك بولسا كېيىن
يەنە بەرسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر كلىنىكىدا سۇسىزلىنىش خاراكتېرىنى
بەلگىلەش قىيىن بولسا، ئاۋۋال تەڭ ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىش بويىدە-
چە بىر تەرەپ قىلىش، شارائىت بولسا قاندىكى ناترىينى ئۆلچەپ
ئاندىن بىر تەرەپ قىلىشىمۇ بولىدۇ.

تولۇقلىنىدىغان سۇيۇقلۇقنى كىرگۈزۈشتە ئاۋۋال تېز، كېيىن
ئاستا تېمىتىش لازىم. ئوتتۇرا ۋە ئېغىر دەرىجىدىكى سۇسىزلىنىشلاردا
ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئەتراپ قان ئايلىنىش توسقۇنلۇققا ئۇچراش
بولىدۇ، ھەتتا بەزىسىدە ئېغىر دەرىجىدە شوك بولۇشى مۇمكىن،
بۇنداقلارغا 2:1 لىك تەڭ كۆپكۈچى ناترىي تۇتقان سۇيۇقلۇقتىن ھەر
كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 20ml دىن ھېسابلاپ، 30~60 مىنۇت
ئىچىدە ۋېنادىن ئوكۇل قىلىش ياكى تېز سۈرئەتتە تامچىلىتىش
ئارقىلىق قان سىغىمچانلىقى، قان ئايلىنىش ۋە بۆرەك خىزمىتىنى
تېزدىن ئەسلىگە كەلتۈرۈش لازىم. ئۇنىڭدىن كېيىن سۇ يوقىتىش
خاراكتېرىگە ئاساسەن ئالدىنقىسىغا ئوخشىمايدىغان ئېرىتمىلەرنى تاللاپ،
ۋېنادىن داۋاملىق تامچىتىلىدۇ (ئومۇمىي مىقدارىدىن قان سى-
غىمچانلىقىنى كېڭەيتكەن مىقدارى تۇتۇپ قېلىنىدۇ)، ئوتتۇرا دەرى-
جىدىن تۆۋەن سۇسىزلىنىشتا ئەتراپ قان ئايلىنىش توسقۇنلۇققا

ئۇچراش بولمىسا، قان سىغىمچانلىقىنى كېڭەيتىش ھاجەتسىز، پەقەت بۇرۇن يوقاتقان مىقدارىدىن باشلاپلا تولۇقلىسا بولىدۇ. ئادەتتە بۇرۇن يوقاتقانى 12~8 سائەت ئىچىدە تولۇقلاپ لازىم. تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىشتا، سۇيۇقلۇق تولۇقلاش سۈرئىتى تېزىرەك، يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىشتا، سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈش سۈرئىتى سەل ئاس-تىراق بولغىنى ياخشى، ئۇنداق بولمىغاندا ئاسانلا تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا نېرۋا ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقى يۇقىرى ئوسموسلۇق بولۇپ، ناتىرىي ئىئونى تېز چىقىرىلمايدۇ، ئوشۇق ناتىرىي ئىئونى چىقىپ كېتىشتىن ئىلگىرى ئەگەر نېرۋا ھۈجەيرىسى ئىچىگە كىرگەن سۇ مىقدارى زىيادە كۆپ بولسا، ھۈجەيرە سۇلۇق ئىششىقى كېلىپ چىقىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن كلىنىكىدا يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىشقا سۇيۇقلۇق تولۇقلىغاندا ئىككىنچى كۈنىگىچە ئوزىراپ كېتىدۇ.

داۋاملىق يوقىتىۋاتقىنىنى تولۇقلاش: سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاپ سۇسىزلىنىشنى تۈزىتىش جەريانىدا سۇسىزلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەبلەر-ئىچى سۈرۈش، قۇسۇش يەنىلا داۋاملىشىدۇ، بەدەن سۇيۇقلۇقى ئۈزلۈكسىز يوقىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن داۋاملىق يوقىتىۋاتقىنىنى ئەمەلىي يوقاتقان مىقدارى قانچىلىك بولسا، شۇنچىلىك لىك ئېرىتمىلار بىلەن تولۇقلاش لازىم. ئىچى سۈرگەن بالىنىڭ چوڭ تەرىتى تاماق بېرىشنى چەكلىگەن ئەھۋال ئاستىدا كۈنىگە ھەر كىلوگ-رام بەدەن ئېغىرلىقىغا 30ml دىن توغرا كېلىدۇ. لېكىن چوڭ تەرەت مىقدارىنى توغرا مۆلچەرلەش قىيىن، ئادەتتە چوڭ تەرەت قېتىم سانى ۋە مىقدارىنىڭ ئاز-كۆپلۈكىگە ئاساسلىنىپ مۇۋاپىق دەرىجىدە ئازايتىلىدۇ ۋە كۆپەيتىلىدۇ. تولۇقلىنىدىغان سۇيۇقلۇق تەركىبى $1/3 \sim 1/2$,

كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ناتىرىيلىق سۇيۇقلۇق بېرىلىدۇ ۋە كالىي قوشۇ-
لىدۇ. بۇ سۇيۇقلۇق 16~12 سائەت ئىچىدە تەكشى ئاستا-ئاستا
تامچىلىتىلىدۇ. يېنىك ئىچى سۈرگەن ياكى قۇسىمغانلارغا يۇقىرىدىكى
سۇيۇقلۇقنى قېتىمغا بۆلۈپ ئىچكۈزۈش بولىدۇ.

فىزىئولوگىيىلىك ئېھتىياجنى تولۇقلاش: سۇيۇقلۇق بىلەن
داۋالاش جەريانىدا ئاساسىي ماددا ئالمىشىش ئۈچۈن سەرپ قىلىنىدى-
غان ئېنېرگىيىنى تەمىنلەش لازىم. يالغۇزلا گلىكوزا سۇيۇقلۇقىنى
تولۇقلاشقا تايانغاندا، ماددا ئالمىشىش ئېھتىياجى ئۈچۈن سەرپ قىلى-
نىدىغان ئېنېرگىيىنى تەمىنلىگىلى بولمايدۇ. بولۇپمۇ ئىچى سۈرگەن
ۋاقتى ئۇزۇن، ئوزۇقلىنىش ناچارلىق قوشۇلۇپ كەلگەن ئاغرىقلارغا
ئېنېرگىيە ۋە ئاقسىل تولۇقلاشقا دىققەت قىلىش لازىم. بوۋاقلارغا ھەر
كۈنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 50 كالورىيىدىن، ئاز
بولغاندىمۇ 20 كالورىيىدىن ھېسابلاش لازىم. مۇشۇنداق قىلغاندا
ئاقسىلنىڭ پارچىلىنىشىنى ئازىتىپ، كىتونلۇق قان كېسىلى پەيدا
بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بۇ باسقۇچتا ھەر 100 كالورىيىگە
150~120 مىللىلىتىر سۇ بېرىلسە بولىدۇ. ئەگەر كۈنلۈكى ھەر
كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 50 كالورىيە ئاساسلىق ماددا
ئالمىشىش ئېنېرگىيىسى بىلەن تەمىنلىگەندە، كۈنلۈكى تەمىنلىنىدىغان
سۇ مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 80~60 مىللىلى-
تىر بولىدۇ. بېرىلىدىغان سۇيۇقلۇقنىڭ كۆپۈش كۈچى $1/5 \sim 1/4$ ناتىرىيلىق
سۇيۇقلۇق بولۇپ، 24~12 سائەت ئىچىدە تامچىلىتىلىدۇ. ئەگەر
ئىچەلسە ئىچكۈزۈش لازىم.

ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاش پىرىنسىپى

ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ سۇسزلىنىشنى تۈزىتىشتە ئاۋۋال تۇز، كېيىن قەنت؛ ئاۋۋال قويۇق، كېيىن سۇيۇق؛ ئاۋۋال تېز، كېيىن ئاستا؛ سۈيدۈك كەلگەندىن كېيىن، كالىي تولۇقلاش پرىنسىپى قوللىنىلىدۇ.

ئاۋۋال تۇز، كېيىن قەنت دېگەنلىك - بىرىنچى قەدەمدە 2:1 لىك ئېرىتمە بېرىلىدۇ، بۇنىڭ تەركىبىدە قەنت يوق، كېيىنكى قەدەمدە تەركىبىدە گلۇكوزا تۇتقان ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمىلەر بېرىلىدۇ. دېگەننى بىلدۈرىدۇ.

ئاۋۋال قويۇق، كېيىن سۇيۇق دېگىنىمىز - بىرىنچى قەدەمدە ئېرىتمىنىڭ كۆپۈش كۈچى يۇقىرىراق، كېيىن ھەر قايسى ئېرىتمىنىڭ كۆپۈش كۈچى تەدرىجىي تۆۋەنلەپ بارىدۇ، ئەڭ ئاخىرىدىكى ساقلاپ داۋالاش باسقۇچىدىكى ئېرىتمىنىڭ كۆپۈش كۈچى تېخىمۇ تۆۋەن بولىدۇ. دېگەنلىك. مەسىلەن: دەسلەپ 2:1 لىك تەڭ كۆپكۈچى سۇيۇقلۇق بېرىلىدۇ، ئاندىن 4:3:2 لىك ئېرىتمە بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن 3:2:1 لىك ئېرىتمە بېرىلىدۇ، ئاخىرىدا 3:1 لىك ياكى 4:1 لىك ئېرىتمە بېرىلىدۇ.

ئاۋۋال تېز، كېيىن ئاستا دېگىنىمىز - ئالدىنقى سەككىز سائەت ئىچىدە ئومۇمىي مىقدارنىڭ $1/2$ قىسمى كىرگۈزۈلىدۇ، بۇنىڭ $2/3$ قىسمى ناترىي تۇتقان سۇيۇقلۇق بولىدۇ، سۇسزلىنىش ئېغىر بولغانلارغا دەسلەپتە 2:1 لىك ئېرىتمە بېرىلىدۇ، كېيىن تەدرىجىي ئاستىلىتىلىدۇ، يەنى بۇرۇن يوقاتقاننى تولۇقلىغاندا تېز كىرگۈزۈلىدۇ، بېرىلىدىغان سۇيۇقلۇق 12~8 سائەت ئىچىدە، تامچىلىتىلىدۇ، كېيىن تەدرىجىي ئاستىلاپ بارىدۇ. دېگەنلىك.

سۈيدۈك كەلگەندىن كېيىن كالىي تولۇقلاش دېگىنىمىز -

سۇسزلىنىش، كىسلاتادىن زەھەرلىنىشتە قاندىكى كالىي يۇقىرى بول-
 دۇ، ئەگەر سۇيۇقلۇق تولۇقلاشنىڭ دەسلەپىدىلا كالىي تولۇقلىسا،
 قاندىكى كالىي يۇقىرىلاپ كېتىدۇ. سۇسزلىنىش، كىسلاتادىن زەھەر-
 لىنىش تۈزۈلۈپ، قان ئايلىنىش ياخشىلانسا، بۆرەك خىزمىتى ئەسلىگە
 كېلىشى بىلەن سۈيىدۈك كۆپىيىدۇ، كالىي ھۈجەيرە سىرتىدىن ھۈجەي-
 رە ئىچىگە يۆتكىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن قاندىكى كالىي تۆۋەنلەيدۇ، بۇ
 ۋاقىتتا كالىي تولۇقلىمىسا، كالىي تۆۋەنلىك ئالامەتلىرى كېلىپ چىق-
 دۇ، سۈيىدۈكنىڭ كېلىشى سۇسزلىنىشنىڭ ياخشىلانغانلىقىدىن دېرەك
 بېرىدۇ. شۇڭا ئۆز ۋاقتىدا كالىي تولۇقلاپ بېرىش لازىم. دېمەك،
 يۇقىرىدىكى بۇ تۆت پرىنسىپ ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاش جەريانىدا
 ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك پرىنسىپلاردۇر. بىرىنچى كۈنى سۇيۇقلۇق
 تولۇقلاشتا:

(1) ئومۇمىي مىقدارى: بۇ يوقاتقان مىقدارى، داۋاملىق يوقىتى-
 دىغان مىقدارى ۋە فىزىئولوگىيىلىك ئېھتىياج قاتارلىق ئۈچ تەرەپنى
 ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭدا يېنىك دەرىجىدە سۇسزلانغانلارغا ھەر
 كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 120~90 مىللىلىتىر، ئوتتۇرا
 دەرىجىلىك سۇسزلانغانلارغا ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن
 150~120 مىللىلىتىر، ئېغىر دەرىجىلىك سۇسزلانغانلارغا ھەر كى-
 لوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 180~150 مىللىلىتىر لازىم
 بولىدۇ.

(2) سۇيۇقلۇقنىڭ تۈرلىرى: بۇنى سۇسزلىنىش خاراكتېرى
 بەلگىلەيدۇ. تەڭ ئوسموتىك سۇسزلىنىشقا $1/2$ كۆپۈش كۈچىگە
 ئىگە ناترىي تۇتقان سۇيۇقلۇق، تۆۋەن ئوسموتىك سۇسزلىنىشقا
 $2/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ناترىي تۇتقان سۇيۇقلۇق، يۇقىرى

ئوسموتىك سۇسزلىنىشقا $1/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ناترىي تۇتقان سۇيۇقلۇق ئىشلىتىپ تولۇقلىنىدۇ. مۇبادا سۇسزلىنىش خاراكتېرىنى بېكىتىش قىيىنراق بولسا، ئالدى بىلەن تەڭ ئوسموتىك سۇسزلىنىشنى بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلى بويىچە بىر تەرەپ قىلسا بولىدۇ. (3) سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈش سۈرئىتى سۇسزلىنىش دەرىجىسىگە قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

(1) قان سىغىمچانلىقىنى تولۇقلاش باسقۇچى، ئېغىر دەرىجىدە كى سۇسزلىنىش ياكى ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسزلىنىشقا ئەتراپ قان ئايلىنىش توسقۇنلۇققا ئۇچراش قوشۇلۇپ كەلگۈچىلەرگە، $2:1$ لىك تەڭ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ناترىي تۇتقان سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈلىدۇ. يەنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 20 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ، 60~30 مىنۇت ئىچىدە ۋېنادىن ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى تېز سۈرئەتتە تامچىلىتىلىدۇ.

(2) يوقاتقان مىقدارنى تولۇقلاش باسقۇچى، قان سىغىمچانلىقى تولۇقلانغاندىن كېيىن سۇسزلىنىش خاراكتېرىگە ئاساسلىنىپ ئوخشىمىغان سۇيۇقلۇقلار تاللاپ (بۇنىڭ مىقدارىدىن قان سىغىمچانلىقىنى تولۇقلىغان مىقدارى چىقىرىۋېتىلىدۇ) داۋاملىق بېرىلىدۇ. ئەگەر ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسزلىنىش بولۇپ ئەتراپ قان ئايلىنىش توسقۇنلۇققا ئۇچراش بولمىسا، قان سىغىمچانلىقىنى تولۇقلاش ھاجەتسىز، بۇ ۋاقىتتا بىۋاسىتە مۇشۇ باسقۇچتىن باشلاپ تولۇقلىسا بولىدۇ، بۇ ۋاقىتتا سۈرئەت سەل تېز بولىدۇ. 12~8 سائەت ۋاقىت ئىچىدە، ھەر سائىتىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 10~8 مىللىلىتىردىن تولۇقلىنىدۇ.

(3) قامداپ داۋالاش باسقۇچى، سۇسزلىنىش ئاساسىي جەھەتتە

تىن نۇزىتىلىدۇ، بۇ ۋاقىتتا داۋاملىق يوقتىدىغىنى بىلەن فىزىئولوگىيەلىك ئېھتىياج تولۇقلىنىدۇ. قالغان مىقدارنى 16 ~ 12 سائەت ئىچىدە ھەر سائىتىگە، ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 5 مىللىلىتىردىن تولدۇرۇلىدۇ. ئەگەر ئىچى سۈرۈش، قۇسۇش ياخشىلانغان بولسا، ئىچكۈزۈپ تولۇقلىسا بولىدۇ (9-جەدۋەلگە قاراڭ).

ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى تۈزەش، ئالدى بىلەن ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى كېسەللىك سەۋەبىنى داۋالاپ، ئورگانىزمنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش لازىم. يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش بولسا، سۇيۇقلۇق تولۇقلاش ۋە تەركىبىدە ئىشقار بولغان ئېرىتمىلارنى بېرىش ئارقىلىق سۈسزىلىنىش تۈزىتىلىپ قان ئايلىنىش، بۆرەك خىزمىتى ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن، كىسلاتادىن زەھەرلىنىشمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ ياخشىلىنىدۇ، ئەگەر سۇيۇقلۇق تولۇقلىغاندىن كېيىنمۇ ياخشىلانمىسا ياكى ئېغىر دەرىجىدە كىسلاتادىن زەھەرلەنگەن بولسا، كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش كۈچىنى (CO_2CP) ئۆلچەش ئارقىلىق، ئىشقارلىق دورىلار ئىشلىتىپ تۈزىتىلىدۇ.

كاربون IV ئوكسىدىنىڭ بىرىكىش كۈچى %40 ھەجىم ياكى 20mEq/L دىن تۆۋەن بولسا، كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى ئىپادىلەيدۇ، كاربون IV ئوكسىدىنىڭ بىرىكىش كۈچى %20 ھەجىم ياكى 10mmol/L دىن تۆۋەن بولسا، ئېغىر دەرىجىدە كىسلاتادىن زەھەرلەنگەن بولىدۇ. بۇنى %10 ھەجىم ياكى 5mEq/L دىن كۆتۈرگەن ئىشەنچلىك، بىخەتەر. زۆرۈر تېپىلغاندا 4 ~ 6 سائەتتىن كېيىن قايتا يەنە بىر قېتىم بەرسە بولىدۇ. ئادەتتە كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش

كۈچى %40 ھەجمىگە يەتسە، ئىشقارلىق دورا بېرىش ھاجەتسىز، ئورگانىزم ئۆزى تەڭشەپ كېتەلەيدۇ.

ئاددىي ئۇسۇل بىلەن ھېسابلىغاندا، كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش كۈچىنى %10 ھەجم ياكى 5mEq/L كۆتۈرمە كىچى بولسا، %5 لىك ناترىي بىكاربوناتتىن ھەركىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 5 مىللىلىتىر ياكى %11.2 ناترىي لاکتاتتىن ھەركىلوگرام 9-جەدۋەل. ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاش لايىھىسى

بۇرۇن يوقاتقىنى	داۋاملىق يوقىتىۋاتقىنى	فىزىئولو-گىيىلىك ئېھتىياجى
يېنىك	50	تولۇقلىنىدىغان سۇيۇقلۇق مىقدارى كۈن/ml/Kg
ئوتتۇرا	60~100	
ئېغىر	100~120	
تەڭ ئوسموسىلۇق	1/2 كۆيۈش كۈچىگە ئىگە	
تۆۋەن ئوسموسىلۇق	2/3 كۆيۈش كۈچىگە ئىگە	1/3~1 كۆيۈش كۈچىگە ئىگە كالى تۇتقان ساقلاش سۇيۇقلۇقى
يۇقىرى ئوسموسىلۇق	1/3 كۆيۈش كۈچىگە ئىگە	
سۇيۇقلۇق تولۇقلاش سۈرئىتى	12~8 سائەت ئىچىدە، سائىتىگە ھەركىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 10~8 مىللىلىتىر	24~12 سائەت ئىچىدە، سائىتىگە ھەركىلوگرام ئېغىرلىقى ئۈچۈن 5 مىللىلىتىر

قەدەم باسقۇچى	تېز سۈرئەتتە تولۇقلاش باسقۇچى	ساقلاش سۈيۇقلۇقىنى تولۇقلاش باسقۇچى
ئومومىي سۈيۇقلۇق مىقدارى كۈن/ml/Kg	يېنىك دەرىجىلىك سۈسزلىنىش 120~150 ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۈسزلىنىش 150~180 ئېغىر دەرىجىلىك سۈسزلىنىش 180~200	

بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 3 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ بەرسە ياكى %1.4 لىك ناترىي بىكاربوناتتىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 20 مىللىلىتىر ياكى %1.87 لىك ناترىي لاکتاتتىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 18 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ بەر-
سە، كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش كۈچىنى %10 ھەجىم ياكى 5mmol/L يۇقىرىلاتقىلى ياكى %5 لىك ناترىي بىكاربوناتتىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 1 مىللىلىتىر، %1.2 لىك ناترىي-
لاكتاتتىن 0.5 مىللىلىتىر، ياكى %1.4 لىك ناترىي بىكاربوناتتىن، ياكى %1.87 لىك ناترىي لاکتاتتىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 3 مىللىلىتىردىن بەرسە CO₂CP نىڭ ھەجىمىنى %1 ياكى 1mmol/L كۆتۈرگىلى بولىدۇ.

پورمىلاغا سېلىپ ھېسابلىماقچى بولسا، تۆۋەندىكىچە ھېسابلىسا بولىدۇ.

$$\text{بېرىشكە تېگىشلىك ئىشقارلىق ماددا مىقدارى mmol/L} = (22 - \text{ئۆلچەپ چىققان قىممىتى}) \times 0.5 \times \text{بەدەن ئېغىرلىقى (Kg)}$$

$$\text{ياكى (40 - ئۆلچەپ چىققان CO}_2\text{CP Vol\%)} \times 0.5 \times \text{بەدەن ئېغىرلىقى (Kg)}.$$

2.24

ناترىي بىكاربونات ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتالىق زە-

ھەرلىنىشنى تۈزىتىشتە ئالدىن تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ. چۈنكى ئۇ بوفېر-
لانغان ئىشقار بىلەن بىۋاسىتە تەمىنلەيدۇ. ئادەتتە ئومۇمىي مىقدارنىڭ
 $1/3 \sim 1/2$ ئالدىن بېرىلىدۇ، كېيىن كېسەللىك ئەھۋالىدىكى ئۆزگە-
رىشكە قاراپ تەڭشەپ بەرسە بولىدۇ.

ئېغىر دەرىجىدىكى سۇسىزلىنىشتا ئېغىر دەرىجىدىكى كىسلاتا-
لىق زەھەرلىنىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا 1.4% ناترىي بىكاربى-
ناتنىڭ ئورنىغا $1:2$ نىسبەتلىك تەڭ ئوسموتىك ناترىي تۇتقان سۇيۇق-
لۇق بىلەن قان سىغىمچانلىقىنى تولۇقلىغاندا، بىر تەرەپتىن قان
سىغىمچانلىقى تولۇقلىنىدۇ ھەمدە كىسلاتالىق زەھەرلىنىش تۈزىتىلىدۇ.

تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلىنى داۋالاش

ئالدى بىلەن بالىنىڭ تاماقلنىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش لازىم.
تاماق يېيەلمەيدىغانلارغا ۋاقىتدا كالىي خلور تولۇقلاش لازىم. ۋېنادىن
كالىي تولۇقلىغاندا، بالىنىڭ سۈيدۈكى راۋان بولغاندىن كېيىن تولۇق-
لاش لازىم.

ئادەتتىكى ئاغرىق بالىلارغا كالىي خلورىدىن كۈنلۈكى ھەر كى-
لوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن $(3 \sim 4 \text{ mmol})$ $200 \sim 300$ مىل-
لىگرامدىن، كالىي كەملىك ئالامەتلىرى روشەن بولغۇچىلارغا ھەر
كۈنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن $(4 \sim 6 \text{ mmol})$ كا-
لىي خلورىدىن $300 \sim 450$ مىللىگرام تولۇقلىنىدۇ.

يېنىك دەرىجىدە سۇسىزلانغانلارغا $4 \sim 6$ سائەتتە بىر قېتىمدىن
ئىچكۈزۈلىدۇ. ئوتتۇرا، ئېغىر دەرىجىلىك سۇسىزلانغانلارغا ۋېنادىن
تولۇقلىنىدۇ ياكى بىر قىسمى ئىچكۈزۈپ تولۇقلىنىدۇ. كالىي خلورىنى
تولۇقلىغاندا بۆرەك خىزمىتى ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن (سۈيدۈك
كەلگەن بولۇشى لازىم) تولۇقلاشنى باشلاش لازىم. كالىي خلورىنى

ۋېنادىن تولۇقلانغاندا ئۇنىڭ كونسېنتراتسىيىسى ئادەتتە 0.2% بولۇ-
 شى (تەخمىنەن 27mmol/L)، 0.3% تىن (تەخمىنەن 40mmol/L)
 ئاشماسلىقى لازىم. ئىچى سۈرگەن بالىلاردا كالىي كەملىك بولىدۇ،
 بەدەندىكى كالىينىڭ كۆپ قىسمى (98%) ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇ-
 قىدا بولىدۇ، كالىي كەملىكىمۇ ئاساسەن ھۈجەيرە ئىچى سۇيۇقلۇقىدا
 كۆرۈلىدۇ. لېكىن كالىي كەملىكىنى تۈزەش ئۈچۈن كىرگۈزۈلگەن
 كالىي ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىدىن ئۆتۈپ، ھۈجەيرە ئىچى سۇ-
 يۇقلۇقىگە كىرىدۇ. شۇنىڭدەك يۆتكىلىش سۈرئىتىمۇ ئاستىراق بولىدۇ.
 بۇندىن باشقا سۇسىزلىنىش تۈزىلىشتىن ئىلگىرى قاندىكى كالىي
 تۆۋەن بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن كالىينى تولۇقلاش بەك بالدۇر، بەك
 تېز بولماسلىقى، بولۇپمۇ بۆرەك خىزمىتى تېخى ئەسلىگە كەلمىگەن
 ئەھۋالدا تېخىمۇ دىققەت قىلىش لازىم. تەركىبىدە كالىي يوق سۇيۇق-
 لۇقنى تولۇقلاش جەريانىدا، قاندىكى كالىي سۇيۇلىدۇ، كىسلاتالىق
 زەھەرلىنىش تۈزىتىلگەندىن كېيىن كالىي ھۈجەيرە ئىچىگە يۆتكىلىدۇ.
 سۈيىدۈك كەلگەندىن كېيىن، كالىينىڭ چىقىرىلىشى كۆپىيىدۇ ھەم
 ئىچى سۈرۈشتىن كالىي داۋاملىق يوقىتىلىدۇ. بۇلار قاندىكى كالىينىڭ
 داۋاملىق تۆۋەنلىشىگە سەۋەب بولىدۇ. مۇبادا كالىي تولۇقلاش بەك
 كېيىن بولسا، تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلى ناھايىتى ئاسان پەيدا
 بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەن كالىيلىق قان كېسىلى پەيدا بولۇشنىڭ
 ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، بالدۇرراق مۇۋاپىق مىقداردا كالىي بەرسە
 بولىدۇ. ئادەتتىكى ئەھۋالدا، داۋالاشتىن ئىلگىرىكى 6 سائەت ئىچىدە
 سۈيىدۈك كەلگەن ياكى سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈلگەندىن كېيىن سۈيىدۈك
 كەلگەن ھامان، كالىي تولۇقلاشنى باشلىسا بولىدۇ. مۇبادا بالا بالىنى-
 سىغا كىرگەندىلا كالىي تۆۋەنلىك ئالامەتلىرى روشەن بولسا (ياكى

قاندىكى كالىي تۆۋەنلىگەن)، ئوزۇقلىنىش ناچارلىق، ئىچى سۈرگەن ۋاقتى ئۇزۇن ياكى ئېغىر دەرىجىدە سۇسىزلانغان بولسا، سۇيۇقلۇق كىرگۈزگەندىن كېيىن، قاندىكى كالىي تېخىمۇ تۆۋەنلەيدۇ، بۇنداقلاردا قان سىغىمچانلىقى تولۇقلىنىپ، بۆرەك خىزمىتى ياخشىلانغان ھامان (سۈيىدۈك بولسا)، كالىي تولۇقلاش باشلىنىدۇ. كالىي تولۇقلاش ۋاقتى ئادەتتە 6~4 كۈن بولىدۇ، تۆۋەن كالىيلىق ئېغىرلاردا بۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇنراق بولسا بولىدۇ.

كالىسىي بىلەن ماگنىي تولۇقلاش: ئادەتتىكى ئاغرىقلارغا قائىددى-لىك كالىسىي بىلەن ماگنىي تولۇقلاش ھاجەتسىز. ئوزۇقلىنىش ناچار-لىق ياكى راخت كېسەللىكى بار بالىلارغا كالىسىيىنى بالدۇرراق قو-شۇپ بەرگەن ياخشى. ئەگەر سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈپ داۋالاش جەريانىدا تارتىشىپ قالسا، %10 لىك كالىسىي گلۇكوناتتىن 10~5 مىللى-لىتىرنى تەڭ مىقداردىكى %10~5 لىك گلۇكوزىدا سۈيۈلدۈرۈپ، ۋېنادىن تامچىلىتىش لازىم. زۆرۈر تېپىلغاندا قايتا يەنە بىر قېتىم ئىشلەتسە بولىدۇ. ئايرىم ئاغرىق بالىلاردا تارتىشقاندىن كېيىن كالىسىي تولۇقلاپ بەرسە ئۈنۈمى بولماي، يەنىلا تارتىشىش كۆرۈلسە، تۆۋەن ماگنىيلىق قان كېسەللىكى بولۇش ئىمكانىيىتىنى ئويلىشىپ قاندىكى ماگنىيىنى تەكشۈرۈش لازىم، ماگنىيىنى تولۇقلاشتا %25 لىك ماگنىي سولفورىدىن بىر قېتىمدا ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 1.0~0.2 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ، كاسا مۇسكۇلىنىڭ چوڭقۇر قىس-مىغا ئوكۇل قىلىش لازىم. ئادەتتە ھەر 6 سائەتتە بىر قېتىمدىن، ھەر كۈنى 4~3 قېتىم ئوكۇل قىلىپ ئالامەتلىرى ياخشىلانغاندىن كېيىن، توختاتسا بولىدۇ.

2. ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش ئۇسۇلى

ئىلگىرى ئىچى سۈرگەن بالىلار ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاش ئۇسۇلى بىلەن داۋالاپ كېلىنگەنىدى. گەرچە بۇ داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى ياخشى بولسىمۇ، لېكىن بەلگىلىك داۋالاش شەرت-شارائىتى ھازىرلا ئەمەس، ئاندىن ئىشلىگىلى بولىدۇ. ئۇندىن باشقا بۇ خىل داۋالاشنىڭ چىقىمى كۆپ، مەشغۇلات تەلپى قاتتىق، خىزمەت مىقدارى چوڭ بولۇپ، كەڭ دائىرىدە ئىشلىتىپ، كېڭەيتىشتە مەلۇم قىيىنچىلىقلار تۇغۇلىدۇ. بولۇپمۇ يېزا-قىشلاقلار، يىراق-چەت، تاغلىق رايونلاردا ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاش شارائىتى كەمچىل، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ رايونلاردا بالىلارنىڭ ئىچى سۈرۈشتىن ئۆلۈش نىسبىتى يۇقىرى. ئىختىسادچىل، قولايلىق، ئاسان ئېرىشكىلى بولىدىغان ئۈنۈملۈك ئۇسۇللار ئارقىلىق، سۇسىزلىنىشنى داۋالاش مەزكۇر كېسەللىك بىلەن ئۆلۈش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىشتىكى ھالقىلىق تەدبىر. ئۇزۇن يىللىق تەتقىقات قىلىش ھەمدە ئالدى بىلەن بەزىبىر ئىچى سۈرۈش كۆپ كۆرۈلىدىغان دۆلەت ۋە رايونلاردا سىناق تەتقىقىسىدە ئىشلەش ئارقىلىق ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش تۈزى ORS (Oral rehydration Salts) ئىچى سۈرۈش كەلتۈرۈپ چىقارغان سۇ-سىزلىنىشنى تۈزىتىشتە ئۈنۈملۈك ياخشى دورا ئىكەنلىكى ئىسپاتلاندى. شۇنداقلا ORS نىڭ ئەمەلىي ئىشلىتىش ئۈنۈمى بار، ئەرزان، قولايلىق، يېزا - قىشلاق، يىراق - چەت، تاغلىق رايونلاردا كېڭەيتىپ ئىشلىتىشكە بولىدىغانلىقى ئىسپاتلاندى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى، بالىلار پاراۋانلىق جەمئىيىتى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى بىلەن ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق

تولۇقلاش سۇيۇقلۇقى، دۇنيادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەردە قانات يايدۇرۇل-
دى. ئەمەلىيەت ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشتىن سۇسىزلانغان
بالىلارغا ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش سۇيۇقلۇقىنى ئىچكۈزگەندە،
ساقىيىش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۆلۈش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىشكە
بولدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش بىر
خىل مۇستەقىل داۋالاش ئۇسۇلى بولۇپ، كلىنىكىدا كەڭ دائىرىدە
ئىشلىتىلگىنىگە 20 نەچچە يىل بولدى. دۆلىتىمىز 1981-يىلى مەزكۇر
ئۇسۇلنى ئىشلىتىشكە باشلاپ دەسلەپتە تەربىيىلىنىشنى ئاساس قىلىپ،
مەلۇم ئورۇندا سىناق قىلىپ ئىشلىتىش ئارقىلىق بۇ خىل داۋالاشنىڭ
دۆلىتىمىزگىمۇ ماس كېلىدىغانلىقى ئىسپاتلاندى. بىراق، دۆلىتىمىزدە
ئومۇميۈزلۈك كېڭەيتىلمىدى. بۇ ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاشقا قار-
غاندا تولىمۇ قولايلىق، ئىشلىتىشكە ئەپلىك، باھاسى ئەرزان.

ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاشنىڭ

نەزەرىيە ئاساسى

ئۈچەي يوللىرى شىللىق پەردىلىرىنىڭ سۇ ۋە ئېلېكترونلارنى
شۈمۈرۈش ۋە ئاجرىتىش ئىقتىدارى بار، بۇ ئىككىسى ئايرىم - ئايرىم
جەريانلاردىن ئۆتىدۇ.

شۈمۈرۈش ئىنچىكە ئۈچەي تۈتى ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسى بىلەن
چوڭ ئۈچەي ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىلىرى تەرىپىدىن ئورۇنلىنىدۇ. ئاجرد-
تىش بولسا، ئىنچىكە ئۈچەي يوشۇرۇن ئويمانلىقى ھۈجەيرىلەر
تەرىپىدىن ئورۇنلىنىدۇ. سۇنىڭ يۆتكىلىشى ئاساسەن ئوسموس بېسىم
پەرقىگە ئاساسلىنىپ بەلگىلىنىدۇ. ئوسموس بېسىم پەرقى ئېپىتېلىيە

ھۈجەيرىسىدىكى ئېلېكترونلارنىڭ ئاكتىپ يۆتكىلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئىنچىكە ئۈچەيدە سۇنىڭ شۇمۇرۇلۇشى ئىنتايىن تېز، ئىنچىكە ئۈچەيگە كىرگەن سۇنىڭ %90 ى 10 مىنۇت ئىچىدە شۇمۇرۇلۇپ بولىدۇ. سۇنىڭ شۇمۇرۇلۇشى بىر خىل پاسسىپ يەتكۈزۈش جەريانى بولۇپ، سۇ ئىنچىكە ئۈچەي شىللىق پەردىسىدىكى كىچىك تۆشۈك-لاردىن ئۆتۈپ، ئۈزلۈكسىز تۈردە ئۈچەي دىۋارىغا كىرىدۇ. ئىنچىكە ئۈچەي ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسىنىڭ ناتىرىيى شۇمۇرۇشى، ھۈجەيرە ئىچى - سىرتى سۇيۇقلۇقىدىكى ناتىرىي ئىئونىنىڭ ئالمىشىشىغا ئوخشاشلا بىر خىل ئاكتىپ يەتكۈزۈش جەريانىدۇر. ئۇ ئېنېرگىيىنىڭ قاتنىشىشى بىلەن ئاكتىپ يۆتكىلىدۇ. نورمال ئادەم ھەر كۈندە يېمەكلىكتىن قوبۇل قىلىدىغان ناتىرىي تەخمىنەن 5~4 گرام بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بەدەندىن 30~20 گرام ناتىرىي ئۈچەي سۇيۇقلۇقى ئىچىگە ئاجرىلىپ چىقىدۇ، ئىككىسىنى قوشقاندا ئىنچىكە ئۈچەي ھەر كۈنى 35~25 گرام ناتىرىيى شۇمۇرىدۇ، بۇ پۈتۈن بەدەندىكى ناتىرىيىنىڭ 1/7 گە باراۋەر كېلىدۇ. بۇنىڭدىن ناتىرىي ئالمىشىش سانىنىڭ ناھايىتى چوڭ، تېز ئىكەنلىكىنى كۆرگىلى بولىدۇ. سۇنىڭ پاسسىپ شۇمۇرۇلۇشىمۇ ناتىرىي قاتارلىق ئېرىگۈچى ماددىلارنىڭ شۇمۇرۇلۇشىنى ئاشۇرىدۇ.

ئىنچىكە ئۈچەي ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسىنىڭ كالىيىنى شۇمۇرۇشى ھۈجەيرە ئىچى-سىرتىدىكى كالىي ئىئونىنىڭ ئالمىشىش مېخانىزمى بىلەن ئوخشاش ئەمەس. بۇ، پۈتۈنلەي بىر خىل پاسسىپ يەتكۈزۈش جەريانى. ئۈچەي بوشلۇقىدىكى كالىي ئىئونىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى قاندىكى كالىيىدىن يۇقىرى بولغاندا شۇمۇرۇلىدۇ. ئەكسىچە بولسا

غاندا كالىي ئىئونى قاندىكى ئۈچەي بوشلۇقىغا ئاجرىلىپ چىقىش پەيدا بولىدۇ.

ئىنچىكە ئۈچەي ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىسىنىڭ گلۇكوزا ۋە ئامىنو كىسلاتاسى قاتارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلارنى شۈمۈرۈشى ناتىرىنى شۈمۈرۈش بىلەن ئوخشاش، يەنى بۇ بىر خىل ئاكتىپ يەتكۈزۈش جەريانىدۇر. ئىنچىكە ئۈچەينىڭ گلۇكوزىنى شۈمۈرۈشى ئۈچەي بوشلۇقىدىكى شېكەرنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى بىلەن توغرا نىسبەتتە بولىدۇ. ئۈچەي بوشلۇقىدىكى شېكەرنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى 280mM/L (مىللىگرام مولېكۇلا/لىتر) بولغاندا (يەنى %5 بولغاندا)، شۈمۈرۈش يۇقىرى نۇقتىغا يېتىدۇ. گلۇكوزىنىڭ شۈمۈرۈلۈشى بىر خىل ئاكتىپ يەتكۈزۈش جەريانى بولغانلىقتىن، ئۈچەي بوشلۇقىدىكى گلۇكوزىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى قان شېكېرىدىن تۆۋەن بولغاندىمۇ ئوخشاشلا شۈمۈرۈلۈش پەيدا بولىدۇ.

تەجرىبىلەر گلۇكوزا بىلەن ناتىرى بىرلا ۋاقىتتا مەۋجۇت بولغاندا شۈمۈرۈلۈشنى ئۆزئارا ئىلگىرىلىتەلەيدىغانلىقى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا سۇنىڭمۇ شۈمۈرۈلۈشنى ئىلگىرىلىتىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. گلۇكوزىنىڭ ناتىرى، سۇ شۈمۈرۈلۈشنى ئىلگىرىلىتىش رولى بارلىقى ئاللىقاچان ئىسپاتلانغان. گلۇكوزىنىڭ ناتىرى، سۇ شۈمۈرۈلۈشنى ئىلگىرىلىتىش رولى ئۇنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسىنىڭ ئوخشىماسلىقىدىن پەرقلىق بولىدۇ. گلۇكوزىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى 56mM/L (يەنى %2.5~1) بولغاندا، ئۇنىڭ ناتىرى، سۇ شۈمۈرۈلۈشنى ئىلگىرىلىتىش رولى ئەڭ كۈچلۈك بولىدۇ. ئەگەر گلۇكوزىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى داۋاملىق ئاشسا، ئۇنىڭ ناتىرى بىلەن سۇ شۈمۈرۈلۈشنى ئىلگىرىلىتىش رولى ھەسسىلەپ تۆۋەنلەيدۇ. ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق

تولۇقلاش سۇيۇقلۇقىنىڭ ئىچى سۈرۈشتىن بولغان سۇسىزلىنىشى تۈزىتىلىشىدىكى ئاساسلىق نەزەرىيىۋى ئاساسى مۇنداق: يەنى ئىنچىكە ئۈچەينىڭ ناترىي بىلەن گلۇكوزىنى بىرلىكتە يۆتكەپ شۆمۈرۈش مېخانىزمىگە ئاساسلانغان ئىنچىكە ئۈچەي ئىنچىكە تۈۋىتى، ئېپىتېل-يە ھۈجەيرىسىدە ناترىي بىلەن گلۇكوزىنى ئورتاق يۆتكىگۈچى تەنچە بولۇپ، ناترىي بىلەن گلۇكوزا بىرلا ۋاقىتتا بىرىككەندە، ئاندىن يۆتكەش كۆرۈلىدۇ. ھۈجەيرە ئىچىدىكى ئېلېكتر پوتېنسىئالى (-40mv) بىلەن Na^+ كونسېنتراتسىيىسى ($15\sim 20\text{mmol}$) ئۈچەي كانلى ئىچىدىكى (0mv) گە قارىغاندا تۆۋەن بولۇپ، Na^+ ئېلېكتر خىمىيەلىك ئۆزگىرىش دەرىجىسى بىلەن كونسېنتراتسىيىدىكى ئۆزگىرىش دەرىجىسىگە ئەگىشىپ، ھۈجەيرىگە كىرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا گلۇكوزىنىمۇ بىرگە ئېلىپ كىرىدۇ. گلۇكوزا ھۈجەيرە ئاستى تەرەپ پەردىسى ئارقىلىق كونسېنتراتسىيىدىكى ئۆزگىرىش دەرىجىسىنى بويلاپ، ھۈجەيرە ئارىلىقلىرىغا يامراپ كىرىدۇ. ھۈجەيرە ئاستى تەرەپ پەردىسىدىكى Na^+ ، K^+ ، ئادېنوزىن تىرىفوسفاتازا (ATP فېرېمېنتى)، ناترىي پومپىسى ناترىينى ئاكتىپ تۈردە ھۈجەيرە ئارىلىقلىرىغا چىقىرىپ بېرىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى يەنە قانغا يامراپ كىرىدۇ. سۇ بىلەن خلىرنىڭ پاسسىپ شۆمۈرۈلۈشمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ كۆپىيىدۇ. ناترىي پومپىسى Na^+ نىڭ يۆتكىلىپ شۆمۈرۈلۈشىدە ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، بىر خىل ئېنېرگىيە سەرپ قىلىش جەريانىدۇر (ئېنېرگىيىنى ATP تەمىنلەيدۇ)، ئۇ ئىنچىكە تۈۋىتىدىكى توشۇغۇچى تەنچىنىڭ ناترىينى يۆتكىشى بىلەن ئۆز ئارا ماسلىشىپ، ھۈجەيرە ئىچىدىكى ناترىينى توختىماستىن ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقىغا يۆتكەيدۇ، ھۈجەيرە ئىچىدىكى ناترىينى تۆۋەن كونسېنتراتسىيىدە ساق-

لايدۇ، بۇ ناترىينىڭ توختىماستىن شۈمۈرۈلۈشى ئۈچۈن پايدىلىق. ئەگەر ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەش يېتەرسىز بولسا ياكى ناترىي پومپىسى تورمۇزланسا، بۇ خىل يۆتكىلىش، شۈمۈرۈش جەريانى توسقۇن-لۇققا ئۇچرايدۇ. ناترىي بىلەن ئامىنو كىسلاتاسىنىڭ شۈمۈرۈلۈشىمۇ يۇقىرىدىكىگە ئوخشاشلا جەريان.

ORS تەركىبىدە گلۇكوزا مىقدارى مۇۋاپىق بولغانلىقتىن Na^+ بىلەن سۇنىڭ شۈمۈرۈلۈشىنى ئىلگىرىلىتىدۇ. بۇلار ئىچكۈزۈپ سۇ-يۇقلۇق تولۇقلاش تۈزىنىڭ سۇسىزلىنىشىنى تۈزەشتىكى ئاساسلىق مېخانىزمىدۇر.

ئىچكۈزۈپ تولۇقلاش سۇيۇقلۇقى (ORS) نىڭ

تەركىبىي ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى

ORS ئىچىدىكى ئېلېكترولىتلار ئوسموس بېسىمى 220mOsm/L بولۇپ (مىللى ئوسموس مولېكۇلا/لىتر)، $2/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق. ئۇنىڭ كۆپۈش كۈچى ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلىغاندا تەڭ ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىشتىكى يوقاتقان مىقدارىنى تولۇقلاشقا ئىشلىتىدىغان ئېرىتمىلاردىن $4:3:2$ لىك ئېرىتمە 10-جەدۋەل. ORS نىڭ ئۆلچەملىك تەركىبىي

دورا ئىسمى	مىقدارى	تەركىبىي	mEq/L
ناترىي خلور	3.5g	Na^+	90
ناترىي بىكاربونات	2.5g	K^+	20

80	Cl ⁻	1.5g	كالىي خلور
30	HCO ₃ ⁻	20.0g	گلۇكوزا پاراشوكى
111(mM/L)	گلۇكوزا	1000ml	سۇ

(بۇنىڭ ئوسموس بېسىمى 210mOsm/L)، 5:6:7 لىك ئېرىتمە (212mOsm/L) نىڭ كۆپۈش كۈچىگە يېقىنلىشىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىچى سۈرۈشتىن كېلىپ چىققان تەڭ ئوسموسلۇق سۇسىزلىقنى داۋالاشقا تېخىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ. ئىچى سۈرۈشتىن سۇسىزلىغان ئاغرىقلارنىڭ كۆپ ساندىكىسى تەڭ ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىش تۈر. بىراق ORS تۈۋەن ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىشقىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

ORS نىڭ ئالاھىدىلىكى ① بۇ خىل ئېرىتمىنىڭ تەركىبىدە كى گلۇكوزا، ئېلېكترولىتلار ۋە ئۇلارنىڭ رولى ئىنچىكە ئۈچەينىڭ شۈمۈرۈلۈشىنى ئىلگىرىلىتىش فىزىئولوگىيىلىك قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن؛ ② بۇنىڭدىكى گلۇكوزىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى %2 بولۇپ، ناتىرىي بىلەن سۇنىڭ شۈمۈرۈلۈشىنى قانائەتلىنەرلىك دەرىجىدە ئىلگىرىلىتىدۇ ھەمدە ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدۇ، ئاقسىلنىڭ پارچىلىنىشىنى ئازىتىدۇ. كىسلاتالىق زەھەرلىنىش ئېغىرلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ ③ ئېرىتمىدىكى Na⁺، K⁺، Cl⁻ نىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى چوڭ تەرەتتىن يوقاتقان ئېلېكترولىتلارنى تولۇقلايدۇ ھەمدە سۈيى-دۈك ۋە تېرىدىن پارغا ئايلىنىشتا ئېھتىياجلىق سۇغا كاپالەتلىك قىلىدۇ؛

④ بۇنىڭدىكى ناترىي بىكاربونات 30mmol/L بولۇپ، ماددا ئالمى- شش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى تۈزىتىشكە، ناترىي بولسا، چوڭ تەرەتتىن يوقىتىدىغان ناترىينىڭ مىقدارى كۆپرەك بولغان ئاجرىتىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشكە باب كېلىدۇ. تۆۋەندە تەركى- بىي ئوخشىمىغان ئىككى خىل ORS نى كۆرۈپ ئۆتەيلى.

ناترىي سىترات ORS ناترىي بىكاربونات ئاسان نەملىنىپ پارچىلىنىدۇ، تۇراقسىز بولغاچقا ئوڭايلا رەڭگى ئۆزگىرىپ، سۇس خومىرەڭ بولۇپ قالىدۇ. بۇنىڭ بىلەن داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر يېتىدۇ، بولۇپمۇ ھاۋاسى ئىسسىق، نەم جايلاردا ئۈنۈمى تېخىمۇ ئاسان يوقىلىدۇ. بۇنى نەزەردە تۇتۇپ خەلقئارا سەھىيە تەشكىلاتى 1984-يى- لى 2.5 گراملىق ناترىي بىكاربوناتنىڭ ئورنىغا ناترىي سىتراتتىن 9. 2 گرام ئالماشتۇرۇپ ئىشلىتىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. ناترىي سىترات ئاسان نەملىشىپ، تەملىك بولۇپ، بالىلار ياخشى كۆرۈپ ئىچىدۇ. بۇنىڭ رولى، ئىشلىتىش ئۇسۇلى ئەسلىدىكى ORS بىلەن ئوخشاش. قومۇش شېكەرلىك ORS بەزىدە گلۇكوزا پاراشوكىنى تې- پىش قىيىنراق بولغاندا، شېكەر ئىشلەتسىمۇ (40 گرام) بولىدۇ. ئىچى سۈرۈشتىن بولغان سۇسىزلىنىشقا ORS نى ئىچكۈزۈپ داۋالاشتا، بىرىنچى، ئىچى سۈرۈشتىن يوقاتقان سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار- نىڭ مىقدارىنى تولۇقلاش؛ ئىككىنچى، سۇسىزلىنىش تۈزەلگەندىن كېيىن يەنىلا داۋاملىق ئىچى سۈرۈشتىن داۋاملىق يوقىتىدىغان سۇ ۋە ئېلېكترولىتلارنى تولۇقلاشنى مەقسەت قىلىدۇ. شۇڭا بەزىبىر ئىچى سۈرگەن بىراق سۇسىزلىنىش تېخى كۆرۈلمىگەن بالىلارغا سۇسىزلى- نىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ORS سۇيۇقلۇقىنى ئىچكۈزۈش مۇ- بولىدۇ.

ORS نىڭ بۇرۇن چىققان ئۆلچەملىك بىر بولىقى (1000 مىللىلىتىر) سوۋۇتۇلغان قايناق سۇدا تەڭشىلىدۇ. كېيىن ئىشلىتىشكە قولايلىق بولسۇن ئۈچۈن، بىر بولاقنى ئىككى بولاق قىلدى، بۇنىڭ ھەر بولىقىنى 500 مىللىلىتىر سوۋۇتۇلغان قايناق سۇدا تەڭشىيدۇ. بۇ $2/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە بولۇپ، يوقاتقان بەدەن سۇيۇقلۇقى بىلەن داۋاملىق يوقىتىدىغان بەدەن سۇيۇقلۇقىنى تولۇقلاشقا ماس كېلىدۇ. لېكىن ئۇسۇزلۇقنى قاندۇرۇشقا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ORS پەقەتلا سوۋۇتۇلغان قايناق سۇدا ئېرىتىلىدۇ، قايناق سۇ ئىشلىتىشكە قەتئىي بولمايدۇ، چۈنكى قايناق سۇ ناتىرىي بىكاربوناتنى پارچىلاپ دورىلىق ئۈنۈمىنى يوقىتىدۇ.

ORS نىڭ ئىشلىتىلىش دائىرىسى: بۇ ھەر خىل ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈش، مەيلى يۇقۇملانۇش خاراكتېرلىك ياكى غەيرىي يۇقۇملانۇش خاراكتېرلىك ئۆتكۈر ئىچى سۈرۈش كەلتۈرۈپ چىقارغان سۇسىزلىنىشلارنىڭ ھەممىسىگە ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تو-لۇقلاپ، داۋالسا بولىدۇ. بۇ دورا يەنە يېنىك ۋە ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسىزلانغانلارنىڭ بۇرۇن يوقاتقان ۋە داۋاملىق يوقىتىۋاتقان سۇ ۋە ئېلېكتىرولىتلارنى تولۇقلاشقا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئېرىتمىدىكى ئېلېكتىرولىتلارنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى يۇقىرىراق بولغاچقا، سۇسىزلىنىش تۈزىلىپ، ئىچى سۈرۈش توختىغاندىن كېيىن، ئىچكۈزمەسلىك لازىم. ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش مىقدارى: بۇرۇن يوقاتقان سۇيۇقلۇقنى تولدۇرۇش ئۈچۈن يېنىك دەرىجىدە سۇ يوقاتقۇچىلارغا ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 50 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ، ئىچكۈ-زۈلىدۇ، ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇ يوقاتقۇچىلارغا ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 100 ~ 80 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ، ئىچكۈزۈلىدۇ. يۇقىرىد-

دىكى مىقدار ئوتتۇرىچە مىقدار بولۇپ، كېسەل بالىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا ئاساسەن كۆپەيتىشكە ياكى ئازايتىشقا بولىدۇ. بۇرۇن يوقاتقان سۇيۇقلۇق مىقدارىنى 6~4 سائەت ئىچىدە ئىچكۈزۈپ بولۇش تەلەپ قىلىنىدۇ.

داۋاملىق يوقىتىۋاتقاننى تولۇقلاشتا، قانچىلىك يوقاتسا شۇنچىلىك تولۇقلاش، يوقاتمىسا تولۇقلىماسلىق كېرەك.

ئۆتكۈر ئىچى سۈرگەن بولۇپ، سۇ يوقىتىش ئېغىر بولسا ياكى داۋاملىق قۇسۇپ سۇيۇقلۇق ئىچكۈزۈش مۇمكىن بولمىسا، ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاش لازىم. ئەگەر ئېغىر دەرىجىدە سۇسىزلانغان بالىلارغا ۋېنادىن سۇيۇقلۇق تولۇقلاش شارائىتى بولمىسا، ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش ئۇسۇلىنى ئىشلەتسە بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا بۇرۇن يوقاتقاننى تولۇقلاش ئۈچۈن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 120~100 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ، 6~4 سائەت ئىچىدە ئىچكۈ-

زۇپ بولۇش لازىم. ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش مەزگىلىدە كېسەل بالىنىڭ كۈنلۈك سۇيۇقلۇققا بولغان ئېھتىياجىغا دىققەت قىلىش لازىم. سۇيۇقلۇق تولۇقلاۋاتقاندا سۇ ۋە باشقا يېمەكلىكلەرنى بېرىش چەكلەنمەيدۇ. ئانىسىنى ئېمىدىغانلارنى داۋاملىق ئېمىتىش، كالا سۈتى ۋە باشقا يېمەكلىك بىلەن بېقىلىۋاتقانلارغا داۋاملىق تاماق بېرىش كېرەك، لېكىن ئاسان ھەزىم بولىدىغان يېمەكلىكلەرنى بېرىش لازىم. مەسىلەن: شوۋىنگۈرۈچ، سۇيۇقئاش قاتارلىق. ORS نى ئىچىۋاتقان مەزگىلدە مۇۋاپىق مىقداردا ئىلمان قايناق سۇ ئىچكۈزۈش بىلەن قاندا ناترىيىنىڭ يۇقىرىلاپ كېتىشىدىن ساقلىنىشقا ۋە سۇغا بولغان تەلپىنى قاندۇرۇشقا دىققەت قىلىش لازىم.

داۋاملىق يوقىتىۋاتقاننى تولۇقلاش باسقۇچىدا يەنىلا بالىغا خالە-

خان ۋاقتتا سۇ ئىچكۈزۈپ تۇرۇش لازىم.

دېققەت قىلىدىغان ئىشلار ① ORS نى تەڭشەشكە ئىشلە-
تىلىدىغان بۇيۇملار پاكىز بولۇشى، دورىلار سوۋۇتۇلغان قايناق سۇدا
ئېرىتىلىشى لازىم؛ ② بالىنىڭ ئاتا-ئانىسى ياكى كېسەل باققۇچىلارغا
ORS نىڭ ئەھمىيىتى، ئىچى سۈرۈشنى توختىتىشتا رولىنىڭ ياخ-
شلىقىنى چۈشەندۈرۈپ، ئۇلاردا ئىشەنچ تۇرغۇزۇش لازىم؛ ③ بۇ
دورنى تەڭشەشكەندىن كېيىن ئاز مىقداردىن كۆپ قېتىم ئىچكۈ-
زۇش تەلەپ قىلىنىدۇ. يەنى 3~2 مىنۇتتا بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا
20~10 مىللىلىتىر ئىچكۈزۈش، ئىچكۈزگەندە بەك تېز ياكى بەك
ئاستا بولۇشتىن ساقلىنىش لازىم. بۇرۇن يوقاتقانىنى چوقۇم 4~6
سائەت ئىچىدە ئىچكۈزۈپ تۈگىتىش كېرەك. مۇبادا ئىچكۈزۈلمەي ياكى
ئېشىپ قالسا، ئەتىسى ئىچكۈزۈشكە بولمايدۇ. قۇسۇۋاتقان بالىلارغا
ORS نى ئىچكۈزۈش چەكلەنمەيدۇ. ئۇلارغا سەۋرچانلىق بىلەن
ئاز-ئازدىن كۆپ قېتىم ئىچكۈزگەندە قۇسۇش تەدرىجىي توختايدۇ؛
④ شوك، بۆرەك، يۈرەك خىزمىتى ناچار ياكى ئېغىر دەرىجىدە
ئەگەشمە كېسەللىكلىرى بار بالىلارغا مەزكۇر ئۇسۇل ئىشلىتىلمەيدۇ؛
⑤ قورسقى كۆپۈپ كەتكەنلەرگە ئىشلەتمەسلىك كېرەك؛ ⑥ يېڭى
تۇغۇلغان بوۋاقلارغا ۋاقتىنچە ئىشلەتمەسلىك كېرەك؛ ⑦ ORS نى
ئىشلىتىپ سۇسىزلىنىشنى داۋالاش جەريانىدا بېرىلگەن مىقدارى ئاز
بولسا، سۇسىزلىنىش تۈزىتىلمەيدۇ، كۆپ بولۇپ كەتسە، بالىنىڭ
قاپاقلىرى ئىشىشىپ قالىدۇ. بىراق بۇ ORS نى ئىچكۈزۈش توختىغان-
دىن كېيىن تەدرىجىي ياخشىلىنىپ كېتىدۇ.

ORS ئىشلىتىپ داۋالاش تېببىي ساھەدىكى يېڭى ئىلگىرىلەش،
ئەمەلىيەت بىزگە ORS بىلەن داۋالاشنىڭ نەتىجىلىك بولۇش-بول-

ماسلىقىدىكى مۇھىم ھالقا ORS نى ئاز مىقداردىن كۆپ قېتىم ئىچكۈزۈشنى قەتئىي داۋاملاشتۇرۇش ۋە داۋاملاشتۇرالماسلىق، بۇرۇن يوقاتقان ئومۇمىي سۇيۇقلۇق مىقدارىنى 6~4 سائەت ئىچىدە ئىچكۈ-زۈپ بولۇش ياكى ئىچكۈزۈپ بولالماسلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بەردى. بۇرۇن يوقاتقان مىقدارىنى تولۇقلاشتا ORS سۇيۇقلۇقىنى كۆپرەك ئىچىشكە توغرا كەلگەچكە، ORS نىلا ئىچىپ، ئارتۇق سۇ ئىچەلمەسلىكى مۇمكىن. يۇقىرى ناترىيلىق قان كېسىلى پەيدا بولۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن سۇسىزلىنىش تۈزىتىلگەن ھامان، سۇنى كۆپرەك ئىچكۈزۈش كېرەك.

ORS سۇسىزلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ. سۇسىزلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ORS نىڭ سۇيۇلدۇرۇلغىنىنى ئىش-لەتكەن مۇۋاپىق. مىقدارى بالىنىڭ ئىچى سۈرۈش، قۇسۇش مىقدارىغا ۋە بالىنىڭ ئومۇمىيۈزلۈك ئەھۋالىغا ماسلاشتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ.

يېڭى تىپلىق ئىچكۈزۈپ تولۇقلاش سۇيۇقلۇقى يېقىنقى يىللاردىن بېرى خەلقئارادا ۋە دۆلىتىمىزدە ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنى تەتقىق قىلىش ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشماقتا. بۇنىڭ ئىچىدە «يېڭى تىپلىق ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش سۇيۇقلۇقى» ھەققىدىكى تەتقىقاتلار كىشىنىڭ ھەۋىسىنى قوزغايدۇ.

11-جەدۋەل. ORS بىلەن ئىشلىتىپ داۋالاش لايىھىسى

ماسلىشىشچانلىقى			يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسىزلىنىش
بۇرۇن يوقاتقان مىقدارى 6~4 سائەتتە تولۇقلىنىدۇ	يېنىك دەرىجىلىك	ئوتتۇرا دەرىجىلىك	ئېغىر دەرىجىلىك
	50ml/Kg	80~100ml/Kg	100~120ml/Kg

قانچىلىك يوقاتسا شۇنچىلىك تولۇقلاش	داۋاملىق يوقىتىۋاتقنى
ئېغىر دەرىجىدىكى يۈرەك كېسىلى، بۆرەك كېسىلى، ئېغىر ئەگەشمە كېسىلى بارلار يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارغا ۋاقىتلىق ئىشلىتىلمەيدۇ	چەكلىنىدىغان ئەھۋاللار

بۇنىڭ خىللىرى 20 خىلدىن كۆپ. لېكىن ھازىر كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقنى ئاشلىق ئۇنى قوشۇلغان تۇز سۇيۇقلۇقى بولۇپ ئۈنۈمى ياخشى.

ئاشلىق ئۇنى قوشۇلغان تۇز سۇيۇقلۇقى (ORS - Rice) نى ئىشلىتىش،
ORS بىلەن داۋالاشقا ئوخشاش، پەقەتلا گلۇكوزا پاراشوكىنىڭ ئورنىغا بۇغداي
ئۇنى، گۈرۈچ ئۇنى ياكى سېرىق قوناق ئۇنىدىن 80 گرام قوشۇپ تەييارلىنىدۇ،
ئالدى بىلەن 1000 مىللىلىتىر سۇغا 80 گرام ئۇن قوشۇپ، بەش مىنۇت
قايىنىتىپ، ئاندىن كېيىن ORS تەركىبىدە كۆرسىتىلگەن تۇز قوشۇپ ئىچكۈزۈۋ-
لىدۇ. ئىچكۈزۈش ئۇسۇلى ORS نى ئىچكۈزۈش ئۇسۇلى بىلەن ئوخشاش. ئۇن
ئورنىغا گۈرۈچ سۈيى (مىتاڭ) قوشسىمۇ بولىدۇ. گۈرۈچ ئۇنى قوشۇشقا توغرا
كەلسە 1000 مىللىلىتىر سۇغا 30 گرام قوشسىلا بولىدۇ. قالغىنى يۇقىرىدىكى
بىلەن ئوخشاش. بۇ خىل تەييارلانغان سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالانغاندا سۇسىزلى-
نىشنىڭ تۈزىتىلىشى تېز بولۇپ، ساقىيىش ۋاقتى كۆزگە كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە
قىسقاريدۇ ھەمدە ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلىنىدۇ. بۇنىڭ ئەۋزەللىكى تۆۋەندىكىچە:
1. گلۇكوزا پاراشوكىغا قارىغاندا ئەزان، ماتېرىياللار يەرلىك ئورۇندىنلا
تېپىلىدۇ.

2. تەمى ياخشى، ئادەتتىكى يېمەكلىكلەرگە ئوخشاپ كېتىدۇ، بالىلار ئوڭاي
ئىچىدۇ ۋە ئوڭاي سىڭىدۇ.

3. بۇنى ئىشلەتكەندىن كېيىن قۇسۇشنى ئازلىتىش ئۈنۈمى ORS گە
قارىغاندا ياخشى. خەلقئارا ئىچى سۈرۈشنى تەتقىق قىلىش مەركىزىنىڭ كۆزىتى-

شېچە، قۇسۇش قېتىم ساننى %60 ئازلىتىدىكەن.
4. ئىچى سۈرۈش ۋاقتىنى قىسقارتىدۇ، چوڭ تەرەتلىك شەكىللىنىشىنى تېزلىتىدۇ.

5. تەمىنلەيدىغان ئىسسىقلىق مىقدارى گلۇكوزىدىن كۆپ، ئىشلىتىشكە ئىپلىك، تەننەرخى ئەرزان.

ئاشقازان نەيىسى ئارقىلىق سۇيۇقلۇق تولۇقلاش
ئۆتكۈر يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشتە ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى مۇھىم سەۋەب سۇسىزلىنىش ۋە ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىشتىن ئىبارەت. ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش ئۇسۇ-
لىدىن پايدىلىنىپ سۇسىزلىنىش ۋە ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىشىنى تۈزىتىش جەھەتلەردە مەلۇم ئۈنۈمگە ئېرىشلىگەن بولسىمۇ، لېكىن ئەمەلىي ئىجرا قىلىش جەريانىدا بەزى ئەھۋاللار ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مەسىلەن: ORS سۇيۇقلۇقىنى بالغا ۋاقتىدا قائىدىلىك ئىچكۈزمەسلىك ياكى ئىچكۈ-
زۇش قىيىن بولۇش، ۋاقتىنى توغرا ئىگىلىيەلمەسلىك قاتارلىقلار. يەنە بىر تەرەپتىن ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش ئۇسۇلى گەرچە قولاي-
لىق، تەننەرخى ئەرزان بولسىمۇ، توختىماستىن ئىچكۈزۈپ تۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. بىراق ئىچى سۈرۈش قېتىم سانى كۆپ، سۈرئىتى تېز بولغان ئېغىر ئىچى سۈرۈشكە سۇسىزلىنىش قوشۇلۇپ كەلگەندە، قۇسۇش ئېغىر بولسا ORS سۇيۇقلۇقىنى ئىچكۈزۈش قىيىن بولىدۇ. بۇنداق ئاغرىقلارغا ئاشقازان نەيىچىسى ئارقىلىق ORS سۇيۇقلۇقىنى تامچىلىتىپ كىرگۈزگەندە داۋالاش ئۈنۈمى تېخىمۇ ئىشەنچلىك بولىدۇ. ئاشقازان نەيىچىسى ئارقىلىق ORS سۇيۇقلۇقىنى تولۇقلاش يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسىزلانغانلارغا، ئايرىم ساندىكى ۋېنادىن

سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈش شارائىتى يوق، ئېغىر دەرىجىلىك سۇسىزلانغان-
 لارغا ئىشلەتسە بولىدۇ. ئىشلەتكەندە خەلقئارا سەھىيە تەشكىلاتى
 تونۇشتۇرغان ORS نى ئالدى بىلەن ئېھتىياجغا ئاساسەن مىقدارىنى
 ھېسابلاپ، سۇيۇلدۇرۇپ، سۇيۇقلۇق تامچىلىتىش بوتۇلكىسىغا قاچىلا-
 نىدۇ، ئاندىن بالغا تىنچلاندۇرغۇچى ئوكۇل سېلىنىدۇ، ئەڭ ياخشىسى
 خلورفورمازىن (冬眠录) دىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 1~0.5
 مىللىگرامدىن ھېسابلاپ، ئوكۇل قىلسا بولىدۇ. بالا تىنچلانغاندىن
 كېيىن يېشىغا ئاساسەن 12-8-نومۇرلۇق نەيچە (زونتى) تاللاپ،
 بۇرۇندىن ئاشقازانغا سېلىنىدۇ، ئادەتتە نەيچىنىڭ ئاشقازانغا كىرگۈزۈ-
 لىدىغان ئۇزۇنلۇقى ياشنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ پەرقلىق بولىدۇ.
 ئالتە ئايلىق ئىچىدىكى بوۋاقلارغا 30~32، ئالتە ئايلىقتىن بىر
 ياشقىچە بولغانلارغا 36~32، 3~1 ياشتىكىلەرگە 48~36
 كىرگۈزۈلسە بولىدۇ. ئاشقازان نەيچىسى كىرگۈزۈلۈپ بولغاندىن كې-
 يىن، سۇيۇقلۇق تامچىلىتىش بوتۇلكىسىغا ئۇلىنىپ تامچىلىتىلىدۇ.
 دەسلەپتە بەك تېز بولماسلىقى لازىم، ئادەتتە بىرىنچى سائەتتە مىنۇ-
 تىغا تەخمىنەن 30 تامچە بولسا بولىدۇ. كېيىن ئېھتىياجغا ئاساسلە-
 نىپ سۈرئىتىنى تەدرىجىي تېزلەتسە بولىدۇ. بۇرۇن يوقاتقان مىقدار-
 ىنى 6~4 سائەتتە تامچىلىتىپ بولۇش تەلەپ قىلىنىدۇ. سۇسىزلە-
 نىش تۈزىتىلگەندە ئاشقازان نەيچىسىنى ئېلىۋېتىپ، ئىختىيارى سۇ
 ۋە يېمەكلىك بەرسە بولىدۇ. مۇبافا ئىچى سۈرۈشتىن يوقتىۋاتقان
 سۇ مىقدارى كۆپرەك بولسا، داۋاملىق يوقتىۋاتقاننى تولۇقلاش ئۇ-
 چۈن داۋاملىق تامچىلاتسا بولىدۇ. ئادەتتە ئاشقازانغا نەيچە سېلىپ
 سۇيۇقلۇق تامچىلىتىش 12 سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم.
 كلىنىكىلىق ئەمەلىيەت ئاشقازانغا نەيچە كىرگۈزۈپ ORS نى تامچىلىتىپ

داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ ئۈنۈمى قانائەتلىنەرلىك بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى.
ئاشقازانغا نەيچە كىرگۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلىغاندا قۇسۇشنى
توختىتىش ئۈنۈمى تېز، تەكشى تامچىلاپ كىرگەنلىكتىن ئاشقازان،
ئۈچەي يوللىرىنىڭ شۈمۈرۈلۈشى ياخشى بولىدۇ. تولۇقلاشقا تېگىش-
لىك مىقدارىغا كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ، دېزىنفېكسىيەلەش تەلىپى
قاتتىق بولمىغانلىقتىن، ئاساسىي قاتلامدىكى داۋالاش ئورۇنلىرىدا ئىش-
لىتىشكە بەك مۇۋاپىق كېلىدۇ.

ئاشقازان نەيچىسى ئارقىلىق سۇيۇقلۇق تولۇقلاش، ئىچكۈزۈپ
سۇيۇقلۇق تولۇقلاشنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسىنى كېڭەيتتى، بۇنىڭ
ئۇسۇلى ئاددىي، قوشۇمچە تەسىرى يوق بولغاچقا، بۇندىن كېيىنكى
داۋالاشلاردا بۇ ئۇسۇلنى كېڭەيتىشكە ئەرزىيدۇ.

ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى

ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش ئۇسۇلى ئەڭ دەسلەپتە
خولېراغا ئىشلىتىلگەن، ئۇنىڭدىن كېيىن چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتې-
رىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى ھەم باشقا باكتېرىيىلىك ئىچى سۈرۈشلەرگە
ئىشلىتىلدى. دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق
تولۇقلاپ داۋالاش ئومۇملاشقاندىن كېيىن باكتېرىيىلىك ئۆتكۈر ئىچى
سۈرۈش ھەمدە يېنىك ۋە ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسىزلىنىش قوشۇلۇپ
كەلگەن ئىچى سۈرۈشلەرنى داۋالاش ئۈنۈمى % 98 ~ 95 كە يەتكەن.
دۆلىتىمىزدە 1981-، 1982-يىللىرى 19 ئۆلكە شەھەرلەردىكى 1819
نەپەر ئىچى سۈرگەن ئاغرىقلارغا ORS سۇيۇقلۇقىنى ئىچكۈزۈپ
ئۈنۈمنى كۆزەتكەندە، چاقسىمان ۋىرۇسۇق ئۈچەي ياللۇغۇق ئىچى
سۈرۈشنى داۋالاش ئۈنۈمى % 96.9 كە، باكتېرىيىلىك ئىچى سۈرۈش-

نى داۋالاش ئۈنۈمى %98 كە يەتكەن. ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش ئۇسۇلىنىڭ باشقا يۇقۇملانغانلىقى ۋە يۇقۇملانغانلىقى ئىچى سۈرۈشكە قوشۇلۇپ كەلگەن سۇسزلىنىشلارنى داۋالاشنىمۇ ئۈنۈمى بىردەك ياخشى بولىدۇ.

ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاشنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈلمەستىكى سەۋەبلەر: ① خەلقئارا ۋە دۆلىتىمىزدە ORS سۇيۇقلۇقىنى ئىچكۈزۈپ سۇسزلىنىشنى داۋالاش ئۈنۈمى %98~95 كە يەتكەنلىكىنى يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتتۇق. بىراق يەنە %5~2 دە ئۈنۈمى بولمايدۇ. ئادەتتىكى ئەھۋالدا تۆۋەندىكى ئەھۋاللار ORS بىلەن داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ORS؛ ② نى مۇۋاپىق ساقلاماسلىق، يەنى ئىشلىتىۋاتقان ORS نەملىكىنى شۈمۈرۈۋېلىپ، رەڭگى ئۆزگىرىپ كەتكەن بولسا، داۋاملىق ئىشلەتسە، داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر يېتىدۇ. شۇڭا ئۇنى قۇرغاق يەردە ساقلىغان ياخشى؛ ③ ORS نى ئىچكۈزۈش جەريانىدا ئاتا-ئانىلار ياخشى ماسلاشماي، ئىچكۈزۈشكە تېگىشلىك مىقدارنى بەلگىلىگەن ۋاقىتتا ئىچكۈزۈمگەن بولسا، بىر ئىچكۈزۈشكە جىق ئىچكۈزۈپ، ئىچكۈزۈمگەندە خېلى ۋاقىتقىچە ئىچكۈزۈمىسە، داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ؛ ④ سۇيۇلدۇرۇش ۋە تەڭشەش ئۇسۇلىغا ئېتىبارسىز قاراپ، قىزىق قايناق سۇ بىلەن تەڭشەپ ئۇنىڭ تەركىبىدىكى ناترىي بىكاربونات پارچىلىنىپ كەتكەن بولسا، داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر يېتىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ORS سۇيۇقلۇقىنى بەك قويۇق ۋە بەك سۇيۇق تەڭشەشمۇ داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

سۇيۇقلۇق تولدۇرغاندىن كېيىنكى داۋالاش ئۈنۈمىنى كۆزىتىش

سۇيۇقلۇق تولدۇرۇشقا باشلىغاندىن كېيىن، كېسەللىك ئەھۋال-
نىڭ ئۆزگىرىشىنى يېقىندىن كۆزىتىش لازىم. ئادەتتە سۇيۇقلۇق
تولدۇرۇش باشلىنىپ تۆت سائەت ئەتراپىدا سۈيدۈك مىقدارى كۆپىيىدۇ.
شەكىللىنىدۇ. ئارقا - ئارقىدىن بىر نەچچە قېتىم سۈيدۈك كەلسە،
سۈزۈلۈشنىڭ تۈزەلگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. 12 سائەت ئىچىدە
تېرىنىڭ ئېلاستىكىلىقى ئەسلىگە كېلىدۇ ھەمدە كىسلاتادىن زەھەرلە-
نىش تۈزىلىدۇ، سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈلۈپ 6 سائەتلەردىن كېيىن،
لېپىلداق ۋە كۆز چاناقلىرى ئۆلتۈرۈشۈش ئەسلىگە كېلىشكە باشلايدۇ،
بالا يىغلىسا ياش چىقىدۇ، روھىي ھالىتى تەدرىجىي ياخشىلىنىدۇ،
تومۇرى، نەپەس ئېلىشى نورماللىشىدۇ، بۇ بېرىلگەن سۇيۇقلۇقنىڭ
مۇۋاپىق بولغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ؛ سۈيدۈك كۆپ بولۇپ، سۈزۈ-
لۈش ئالامەتلىرى تۈزەلمىسە، غەيرىي ئېلېكترولىتلىق سۇيۇقلۇقنىڭ
كۆپ بولۇپ كەتكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئەگەر سۈيدۈك ئاز بولۇپ،
سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلسە، كىرگۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنىڭ تەركىبىدە
ناتېرىنىڭ مىقدارى كۆپ بولۇپ كەتكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. بوش-
شېپ، ماغدۇرسىزلىنىپ، قورسقى كۆپۈپ كەتسە، كالىي تۆۋەنلىكىنى
چۈشەندۈرىدۇ. ئەگەر بالا تۇيۇقسىز بىئارام بولۇپ، رەڭگى تاتىرىپ،
تومۇر سوقۇشى مىنۇتقا 60 قېتىمدىن ئاشسا، نەپەس ئېلىشى قىيىن-
لاشسا، يۈرەك زەئىپلەشكەنلىك ياكى ئۆپكە سۇلۇق ئىششىقى پەيدا
بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى ئىچى سۈرۈشنى داۋالاش
يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى ئىچى سۈرۈشنى داۋالاش، بوۋاق-
لاردىكى ئىچى سۈرۈشنى داۋالاش بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ، لېكىن

بەزى تەرەپلەردىن ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكلىرىمۇ بار.

1. ئوزۇقلاندۇرۇش: يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ ئىچى سۈر-

گەن مەزگىلىدە ئانىسى ئېمىتكەنلەرنى داۋاملىق ئېمىتىش تەشەببۇس قىلىنىدۇ، چۈنكى ئانا سۈتى تەركىبىدە ئاجرىلىش تېپلىق ئىممۇنىت

شار ئاقسىلى IgA ھەم باكتېرىيىنى ئېرىتكۈچى فېرېمېنت قاتارلىقلار بولۇپ، ئاغرىق بالغا نىسبەتەن خېلى كۈچلۈك ئىممۇنىت كۈچى بار،

شۇڭا ئانا سۈتى بىلەن بېقىشنى داۋاملاشتۇرۇش لازىم. كالا سۈتى ياكى سۈت پاراشوكى بىلەن بېقىلغان بالىلارغا كالا سۈتىنى سۈيۈلدۈ-

رۇپ بېرىش كېرەك. ئالدى بىلەن بىر ھەسسە سۈتكە ئىككى ھەسسە سۇ ئارىلاشتۇرۇپ بېرىپ، ئىچى سۈرۈشنىڭ تەدرىجىي ياخشىلىنىشىغا

ئەگىشىپ ئىككى ھەسسە سۈتكە بىر ھەسسە سۇ ئارىلاشتۇرۇپ بەرسە بولىدۇ. ئەگەر سۈت شېكەر فېرېمېنتى ئازلاپ كېتىش سەۋەبىدىن سۈت

تۈرىدىكى بۇيۇملارغا چىدامسىز بولسا، سۈت شېكېرى تۆۋەن يېمەك-لىكلەرنى مەسىلەن: شوۋىنگۈرۈچنىڭ سۈيىنى قوشۇپ بەرسە بولىدۇ.

كېيىن ئىچى سۈرۈشنىڭ ياخشىلىنىشىغا قاراپ تەدرىجىي سۈتلۈك يېمەكلىكلەر بىلەن ئوزۇقلاندۇرسا بولىدۇ. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ

ئىچى سۈرگەندە ئوزۇقلۇق چەكلەش ۋاقتى ئۇزۇن بولۇپ كەتسە، ئۆسۈپ يېتىلىشىگە تەسىر يېتىدۇ.

2. ئانتىبىيوتىك دورىلارنى ئىشلىتىش: يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق-لاردىكى ئىچى سۈرۈشنىڭ كۆپىنچىسىنى ئۈچەي يوللىرى يۇقۇمل-

نىش پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا باكتېرىيىلىك ئىچى سۈرۈش كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. داۋالاشتا بوۋاق بالىلاردىكى ئۈچەي ياللۇغىنى داۋالاشقا

ئىشلىتىدىغان ئانتىبىيوتىكلاردىن بىر ياكى ئىككى خىلنى تاللاپ ئېلىپ، 7~5 كۈن ئىشلىتىش لازىم. ئەگەر ۋىرۇسلۇق ئۈچەي

ياللۇغى بولسا، سۇسزلىنىش ۋە ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىشنى تۈزىتىش، ئالامىتىگە قارىتا داۋالاشنى ئاساس قىلىش، زۆرۈر تېپىلغاندا مۇۋاپىق دەرىجىدە قۇۋۋەتلەپ داۋالاشنى ئېلىپ بېرىش كېرەك.

3. سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاش: يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ

بەدەن سۇيۇقلۇقى نىسبىتى باشقا ياش گۇرۇپپىسىدىكى بالىلارغا قارىغاندا چوڭ بولۇپ، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %80 نى تەشكىل قىلىدۇ، چالا تۇغۇلغان بالىلارنىڭ بەدەن سۇيۇقلۇقى

قى نىسبىتى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. يەنە يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ

ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى نىسبىتى ھالدا كۆپ بولۇپ، تەخمىنەن

بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %43 نى تەشكىل قىلىپ، ھۈجەيرە ئىچى

سۇيۇقلۇقىدىن ئېشىپ كېتىدۇ. سۇنىڭ ئالمىشىش نىسبىتى چوڭ

بالىلارغا قارىغاندا بىر ھەسسىدىن يۇقىرى تېز بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن

سۇ تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش ناھايىتى ئاسان پەيدا بولىدۇ. شۇنىڭ

بىلەن بىر ۋاقىتتا بۆرەكنىڭ قويۇقلاشتۇرۇش ھەم سۇيۇلدۇرۇش

ئىقتىدارى ناچار، نېرۋا، ئىچكى ئاجراتما سىستېمىسىنىڭ بەدەن سۇ-

يۇقلۇقىنى تەڭشەش خىزمىتىمۇ تولۇق يېتىلمىگەنلىكتىن، سۇسزلى-

نىش ھەم ئېلېكترولىتلار قالايمىقانلىشىش ئوڭاي پەيدا بولىدۇ. شۇڭا

داۋالاشمۇ باشقا ياش گۇرۇپپىسىدىكى بالىلارغا قارىغاندا قىيىن بولىدۇ.

4. ئېھتىياجلىق سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار: يېڭى تۇغۇلغان

بالىلارغا دەسلەپكى بىر نەچچە كۈن ئىچىدە ئېھتىياجلىق سۇ ۋە

ئېلېكترولىتلار مىقدارى ئىنتايىن ئاز بولۇپ، ۋېنادىن بېرىلىدىغان

فىزىئولوگىيەلىك ساقلاش سۇيۇقلۇقىنىڭ مىقدارى ھەر كىلوگرام بە-

دەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن، كۈنىگە 60~50 مىللىلىتىردىن ئېشىپ

كەتمەسلىكى، بىر ھەپتىدىن كېيىن كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن

ئېغىرلىقى ئۈچۈن 120~100 مىللىلىتىرگە كۆپەيتىلىشى ياكى ھەر 100 كالورىيە ئېنېرگىيە سەرىپىياتى ئۈچۈن 150~100 مىللىلىتىر سۇ بىلەن تەمىنلىشى لازىم. ناترىي بىلەن خلورىدىن كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 3~1 mEq لازىم بولىدۇ. تۇغۇلۇپ بىر نەچچە كۈن ئىچىدىكى بوۋاقلار قىزىل قان ھۈجەيرىسىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن كالىي قويۇپ بېرىدىغان بولغاچقا، كالىينىڭ قاندىكى قويۇقلۇق دەرىجىسى يۇقىرىراق بولۇپ، تەخمىنەن 7~5 mEq/L بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن دەسلەپكى بىر نەچچە كۈن ئىچىدە كالىي بەرمىسىمۇ بولىدۇ.

5. سۇسىزلىنىشنى تۈزىتىش: يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى سۇسىزلىنىشقا دىئاگنوز قويۇش باشقا ياش گۇرۇپپىسىدىكى بالىلارغا قارىغاندا قىيىنراق، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ يوقاتقان بەدەن سۇ-يۇقلۇقى، ئومۇمىي بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ خېلى كۆپ نىسبىتىنى تەشكىل قىلىدۇ، ئۇلار بىر كۈننىڭ كۆپىنچىسىدە ئۇخلىغاچقا، سۇ-سىزلىنىشنىڭ كلىنىكىلىق ئالامەتلىرىگە دىققەت قىلىنمايدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ فىزىئولوگىيىلىك بەدەن ئېغىرلىقى تۇغۇلۇپ بىر نەچچە كۈن ئىچىدە تۆۋەنلەيدۇ، ھەتتا بەزىدە بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ %10 ى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. يۇقىرىدىكىلەر سۇ-سىزلىنىشقا دىئاگنوز قويۇشتا قىيىنچىلىق تۇغدۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ سۇ ۋە ئېلېكتىرولىتلارنى تەڭشەش ئىقتىدارى ناچار بولغاچقا، سۇسىزلىنىش دەرىجىسىنى مۆلچەرلەشتە ئېھتىياتچان بولۇش لازىم.

ئومۇملاشتۇرغاندا، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ فىزىئولوگىيىلىك سۇ سەرىپىياتىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋە كىرگەن سۇيۇقلۇق

مقدارنىڭ يېتەرسىز بولۇشىدىن ياكى غەيرىي نورمال سۇ يوقىتىش-
تىن پەيدا بولغان سۇسىزلىنىش بىلەن يوقىتىۋاتقان مىقدارنى تولۇق-
لاش ئۈچۈن، تۆۋەندىكى ئالاھىدىلىكلەرگە دىققەت قىلىش لازىم.
(1) سۇسىزلىنىش ۋە كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنىڭ كلىنىكىلىق
ئالامىتى روشەن بولمىغاچقا، سۇيۇقلۇقنىڭ كىرىش ۋە چىقىش مىقدار-
ىنى ئەستايىدىل ئىگىلەپ، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشىنى يې-
قىندىن كۆزىتىش لازىم.

(2) تولۇقلاش ئۈچۈن كىرگۈزۈلىدىغان سۇيۇقلۇق مىقدارى
بوۋاقلارغا قارىغاندا سەل ئازايتىلىشى، بىرىنچى كۈنى تولۇقلىنىدىغان
ئومۇمىي مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 180 مىللى-
لىتىردىن ئاشماسلىقى، سۈرئىتى مۇۋاپىق دەرىجىدە ئاستىلىتىلىشى
لازم.

(3) بۆرەكنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارى ناچار، ناتىرىي بىلەن خلور-
نى چىقىرىشىمۇ بوۋاقلارغا يەتمەيدىغان بولغاچقا، ئىشلىتىلىدىغان ئې-
لېكترونلار مۇۋاپىق دەرىجىدە ئازايتىلىشى لازىم. ئوتتۇرا، ئېغىر
دەرىجىلىك تۆۋەن ئوسموسىلۇق سۇسىزلانغۇچىلارغا تولۇقلىنىدىغان نات-
رىي كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن $7 \sim 12 \text{ mEq/L}$ بولۇ-
شى، تەڭ ئوسموسىلۇق سۇسىزلانغانلارغا كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن
ئېغىرلىقى ئۈچۈن 7 mEq/L ، يۇقىرى ئوسموسىلۇق سۇسىزلانغانلارغا
كۈنىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 5 mEq/L تولۇقلىنىش
لازم. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭ بۆرىكىنىڭ سۈيۈلدۈرۈش ئىقتىدارى
تۆۋەن بولىدۇ. ئەگەر تەركىبىدە ئېلېكترونلار تۇتمىغان گلۇكوزا سۇ-
يۇقلۇقىنى كۆپ مىقداردا كىرگۈزسە، سۇ بىلەن زەھەرلىنىش كېلىپ
چىقىدۇ.

(4) يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار تۇغۇلۇپ 10 كۈن ئىچىدە، قاندىكى كالىي يۇقىرىراق بولىدۇ. شۇڭا كالىي تولۇقلاش ھاجەتسىز، ئەگەردە كالىي كەملىك روشەن بولسا، بۆرەك خىزمىتى ياخشى بولغان ئەھۋال ئاستىدا، كۈنىگە بېرىلىدىغان كالىي ئومۇمىي مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 3 mEq/L بولسا بولىدۇ.

(5) يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردا ئوتتۇرا دەرىجىلىكىدىن يۇقىرى ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش بولسا، ئىشقارلىق دورىلارنى ئىشلىتىپ تۈزىتىش لازىم. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردا جىگەرنىڭ ئىقتىدارى تولۇق يېتىلمىگەنلىكتىن، ناترىي لاکتات ئالمىشىشى ناچار بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ناترىي لاکتات ئىشلىتىلمەيدۇ. 5% لىك ناترىي بىكاربونات سۇيۇلدۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

(6) سۇيۇقلۇق تولۇقلىغاندا، تۇغۇلۇپ بىر ھەپتە ئىچىدىكى بوۋاقلاردا سۇسىزلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 50~25 مىللىلىتىر بويىچە تولۇقلىنىدۇ. بۇنىڭغا فىزىئولوگىيىلىك ساقلاش سۇيۇقلۇقى مىقدارىنى قوشقاندا، پۈتۈن كۈنلۈك ئومۇمىي مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 100 مىللىلىتىر بولىدۇ. بىر ھەپتىدىن ئاشقان بوۋاقلارغا بېرىلىدىغان پۈتۈن كۈنلۈك سۇيۇقلۇق ئومۇمىي مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 180 مىللىلىتىردىن ئاشماسلىقى، بېرىلىدىغان سۇيۇقلۇق $1/2$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق بولۇش ھەمدە يوقاتقان مىقدارنى 10~8 سائەت ئىچىدە، ھەر سائىتىگە 40 مىللىلىتىردىن ئاشماسلىق شەرتى ئاستىدا تولۇقلىنىشى لازىم.

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتا-دىن زەھەرلەنگەندە ئالامەتلىرى تىپىك بولمايدۇ، پەقەت روھىي ھالىتى

سۇسلىنىش، چىرايى كۆكرىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. شۇڭا كېسەللىك ئەھۋالىنى ياخشى كۆزىتىش لازىم. ئەگەر كىسلاتادىن زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى بولسا، ۋاقتىدا تۈزىتىش كېرەك. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارغا ناترىي بىكاربونات ئىشلىتىپ، كىسلاتادىن زەھەرلىنىش تۈزىتىلىدۇ، ئا- دەتتە يۇقىرى ناترىيلىق قان كېسىلى يۈز بېرىشتىن ساقلىنىش ئۇ- چۈن، يۇقىرى ئوسموسۇلۇق ناترىي بىكاربونات ئىشلەتمەي، بەلكى ئۇنى % 1.4 لىككە ئايلاندۇرۇپ، ۋېنادىن تامچىلىتىش لازىم. ھەر قېتىم كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش كۈچىنى 5 mEq/L كۆتۈرسە بولىدۇ. % 5 ناترىي بىكاربوناتتىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 3~5 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ ئىشلىتىش ياكى % 1.4 لىككە ئايلاندۇرۇپ ئىشلىتىش لازىم.

ئەگەر كالىي تۆۋەن بولسا، ھەر كۈنى تولۇقلاپ بېرىدىغان كالىي خلور ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 200 مىللىگرام- دىن ئاشماسلىقى، كالىيىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى % 0.15 تىن يۇقى- رى بولماسلىقى، سۇيۇلدۇرۇلغاندىن كېيىن، ۋېنادىن 6~8 سائەتتە ئاستا - ئاستا تامچىلىتىش لازىم.

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردىكى ۋىرۇسلۇق ئىچى سۈرۈشنى داۋا- لاشتا سۇيۇقلۇق تولۇقلاش، ئالامىتىگە قارىتا داۋالاش ۋە قۇۋۋەتلەپ داۋالاش چارىلىرى قوللىنىلىدۇ.

سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاش جەريانىدا دىققەت

قىلىدىغان ئىشلار

1. ئوخشاش ياشتىكى سېمىز بالىلارنىڭ بەدەن سۇيۇقلۇقى مىقدارى ئورۇق بالىلارغا قارىغاندا نىسبەتەن ئاز بولىدۇ. سۇسزلىنىش دەرىجىسىنى بەلگىلىگەندە سېمىز بالىلارنى نىسبەتەن يېنىك، ئورۇق

باللارنى نىسبەتەن ئېغىر دەپ بەلگىلەشتىن ساقلىنىش لازىم.

2. ئوزۇقلىنىش ناچار باللاردا ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇق مىقدارى نىسبەتەن كۆپ؛ ئىچى سۈرۈش، قۇسۇشتىن سۇسىزلانغاندا، تۆۋەن ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىش كۆپ؛ قاندىكى كالىي، كالتسىي، قەنت تۆۋەنلەش كۆزگە كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. شۇڭا سۇيۇقلۇق تولۇق-لىغاندا ئومۇمىي مىقدارىدىن $1/3$ ئازايتىپ تولۇقلىنىدۇ، بېرىلىدىغان سۇيۇقلۇق $2/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق بولۇشى، تامچىلى-تىش تېزلىكى ئاستىراق بولۇش، كالىي، كالتسىي قاتارلىقلارنى ئۆز ۋاقتىدا قوشۇپ بېرىش، ئېنېرگىيە ۋە ئاقسىل بىلەن تەمىنلەشكە ئالاھىدە ئېتىبار قىلىش لازىم. شارائىت بولسا يېڭى قان، قان پلازما-سىدىن ئاز مىقداردا پات - پات سېلىپ، كوللوئىدلىق ئوسموس بېسىمىنى يۇقىرىلىتىپ، سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

3. ئۆپكە ياللۇغغا ئىچى سۈرۈش قوشۇلۇپ كېلىپ سۇسىزلان-غاندا بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلى، ئىچى سۈرۈش بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. ئېغىر دەرىجىدە سۇسىزلانغۇچىلارنىڭ ئوخشاشلا قان سىغىم-چانلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ، لېكىن تولۇقلايدىغان سۇيۇقلۇق ئومۇ-مى مىقدارى ئادەتتە ھېسابلانغان مىقدارىنىڭ $3/4$ قىسمى تولۇقلىنى-دۇ، سۈرئىتى سەل ئاستىراق بولىدۇ. ئىشلىتىلىدىغان ئېرىتمىنىڭ كۆپۈش كۈچى $1/3 \sim 1/2$ بولۇشى، سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈش سۈرئىتى سائىتىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا $6 \sim 7$ مىللىلىتىر-دىن ئاشماسلىقى لازىم.

4. سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاشتا بىرىنچى باسقۇچ، يەنى بۇرۇن يوقاتقان مىقدارنى تولۇقلاشنى توغرا مۆلچەرلەش لازىم. ئەگەر مۇشۇ

باسقۇچتىكى داۋالاش توغرا بولمىسا، نەتىجىگە ئېرىشكىلى، كېسەلنى ئوڭۇشلۇق داۋالغىلى بولمايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاش پرىنسىپىنى ياخشى ئىگىلەش ئىنتايىن مۇھىم. شۇنىڭ ئۈچۈن سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ داۋالاشتا، ئالدى بىلەن ئېرىتمىنىڭ تەركىبىدە ناترىي مىقدارى يېتەرلىك بولۇشى، سۈرئىتى قان سىغىمچانلىقىنى تۈزىتىلىشى لازىم. كالىنى ۋاقتىدا تولۇقلىمىسا، سۇيۇقلۇق كىرگۈزۈپ سۇسىزلىنىش تۈزەلگەندە، قورسىقى ئېسىلىپ كېتىدۇ، فىزىئولوگىيىلىك تۈز سۈيى بەك كۆپ كىرگۈزۈلسە، قاندىكى خلور كۆپىيىپ كېتىپ، كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى تۈزىتىشكە پايدىسىز بولىدۇ، ناترىيلىق ئېرىتمىلەر كۆپ بېرىلسە، سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ؛ گلۇكوزا زىيادە كۆپ، تېز سۈرئەتتە كىرگۈزۈلسە، سۇ بىلەن زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ؛ ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەشكە ئېتىبارسىز قارالسا، بالا كۈندىن - كۈنگە ياداپ كېتىدۇ، بۇلار ئىچى سۈرۈشنى ئوڭۇشلۇق داۋالاشقا پايدىسىز. سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاش جەريانىدا يۇقىرىدىكىلەرگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم.

5. ئىچى سۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش

ئىچى سۈرۈش ئالدىنى ئېلىشقا بولىدىغان كېسەللىك، بۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەندىكى نۇقتىلارنى ياخشى ئىشلەش لازىم.

1. ئانا سۈتى بىلەن بېقىشنى تەشەببۇس قىلىش لازىم، ئانا سۈتى بالىلار بولۇپمۇ بوۋاقلار ئۈچۈن ئەڭ ياخشى ئوزۇقلۇق. ئانا سۈتىدە مول ئوزۇقلۇق بولۇپلا قالماستىن بەلكى ئاسان شۈمۈرۈلىدۇ، بوۋاقلارنىڭ كېسەللىككە قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ، ئانا سۈتى تەركىبىدىكى ئاجرىلىش تېپلىق ئىممۇنىت شار ئاقسىلى IgA، ئاشقا-

زان، ئۈچەي يوللىرىدا كىسلاتا - ئىشقارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمايدۇ ۋە ھەزىم بولمايدۇ، ئۈچەي يوللىرىدىكى كېسەللىك پەيدا قىلغۇچىلار (باكتېرىيە، ۋىرۇس) بىلەن بىرىكىپ، ئۇلارنىڭ ئۈچەي شىللىق پەردىسىگە كىرىشىنى توسىدۇ، يۇقۇملىنىشقا ۋە زىيادە سەزگۈرلۈككە قارشى تۇرۇش رولى بار. ئۇنىڭدىن باشقا، ئاز مىقداردا ئىممۇنىت شار ئاقسىللىرىدىن IgM، IgG قاتارلىقلار بولۇپ مەلۇم ئىممۇنىتلىق رول ئوينايدۇ. ئانا سۈتىدىكى سۈت تۆمۈر ئاقسىلى (Lactoferrin) چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى ۋە ئاق تەشۋىس - مان باكتېرىيىنىڭ ئۆسۈشىنى تورمۇزلاپ، سۈت كىسلاتا تاياقچە باكتېرىيىسىنىڭ ئۆسۈشىنى تېزلىتىپ، يۇقۇملىنىشقا قارشى تۇرىدۇ. شۇڭا ئانا سۈتى بىلەن بېقىلغان بالىلاردا ئىچى سۈرۈش ئاز كۆرۈلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بالا تۇغۇلۇپ بىر نەچچە ئايلىق بولغىچە چوقۇم ئانا سۈتى بىلەن بېقىش، ئەگەر سۈتى بولسلا بىر يېرىم ياشقىچە داۋاملىق ئېمىتىش تەشەببۇس قىلىنىدۇ، بالىنى ياز پەسلىدە ئەمچەكتىن ئايرىش - تىن ساقلىنىش لازىم.

2. قوشۇمچە يېمەكلىكلەرنى ۋاقتىدا، مۇۋاپىق قوشۇپ بېرىش كېرەك. بالىلارنىڭ ئۆسۈپ تەرەققىي قىلىشى تېز، ئوزۇقلۇق ماددىلارغا بولغان ئېھتىياجى يۇقىرى بولغاچقا، مەيلى قانداق ئۇسۇلدا بېقىلغان بالىلار بولمىسۇن، ئۆز ۋاقتىدا قوشۇمچە يېمەكلىكلەرنى قوشۇپ بېرىشى لازىم. لېكىن قوشۇمچە يېمەكلىك قوشقاندا بالىنىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارىغا ماسلاشتۇرۇپ، ئاۋۋال بىر خىلنى، ماسلاشقاندىن كېيىن باشقا خىلنى بېرىش، ئاۋۋال سۇيۇق يېمەكلىكلەرنى، ئاندىن تەدرىجىي قويۇق يېمەكلىكلەرنى بېرىش، ئاز مىقداردىن تەدرىجىي كۆپەيتىش قائىدىسىگە ئاساسەن، قوشۇمچە يېمەكلىكلەرنى قوشۇپ

بېرىش لازىم. ئادەتتە بالا تۇغۇلۇپ يېرىم ئايلىقتىن كېيىن، بېلىق مېيى قوشۇپ بېرىلىدۇ، تەدرىجىي مېۋە سۈيى، سەي شورپىسى بېرىلىدۇ. ئۈچ ئايلىقتىن كېيىن بۇلماق، تۆت ئايلىقتىن باشلاپ تۇخۇم سېرىقى، سەي، گۆش، بېلىق قىيمىسى قاتارلىقلارنى بېرىپ، تەدرىجىي يېمەكلىك خىللىرى كۆپەيتىلىدۇ. يېمەكلىكنىڭ سۈپىتىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىنىشى، يېڭى، ئاسان ھەزىم بولىدىغان يېمەكلىك بولۇشى، بىرلا ۋاقىتتا كۆپ خىل ھەم جىق بىرىۋېتىشتىن ساقلىنىشى لازىم. 3. سۇ مەنبەئى ۋە يېمەكلىكلەر تازىلىقىغا دىققەت قىلىش، قايناق سۇ بېرىش كېرەك.

4. بالىلارنى ياخشى تازىلىق ئادەتلىرى بىلەن تەربىيەلەش، تاماقتىن ئىلگىرى، چوڭ - كىچىك تەرەتتىن كېيىن، قول يۇيۇشقا ئادەتلەندۈرۈش، يېمەكلىك، قاچا-قۇمۇچ، سۈيدۈك لاتىسى، ئويۇنچۇق قاتارلىقلارنى داۋاملىق دېزىنفېكسىيە قىلىپ تۇرۇشى كېرەك.

5. ھاۋا كىلىماتىدا ئۆزگىرىش بولغاندا پەرۋىشنى كۈچەيتىش، ياز كۈنلىرى قايناق سۇنى كۆپرەك ئىچكۈزۈپ، ئىسسىق ئۆتۈپ كېتىشتىن، قىش كۈنلىرى سوغۇق تېگىپ قېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

6. بالىلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنى ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش، بەك چارچاشتىن، روھىي غەدىقلىنىش، جىددىيلىشىشلاردىن ساقلىنىش كېرەك.

7. ئوزۇقلىنىش ناچارلىق، راخت كېسىلى ۋە ئۈچەي يوللىرىدىن نىڭ سىرتتىن يۇقۇملىنىشىدىن ساقلىنىش ۋە ئاكتىپ داۋالاش، يېمەكلىك تازىلىقىغا دىققەت قىلىپ، ئۈچەي يوللىرى يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش لازىم.

8. ئانتىبىيوتىك دورىلارنى ئۇزۇن ۋاقىت، قالايمىقان ئىشلىتىش-
تىن ساقلىنىش ئارقىلىق، ئۈچەي يوللىرىدىكى نورمال باكتېرىيە
توپلىرى قالايمىقانلىشىشنىڭ، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە
باكتېرىيىلىك ئۈچەي ياللۇغى ۋە زەمبۇرۇغلۇق ئۈچەي ياللۇغى كېلىپ
چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

9. ھاجەتخانىنى دائىم تازىلاپ تۇرۇش، بالىلارنى خالىغان يەرگە
تەرەت قىلغۇزماسلىق، گارشوكقا تەرەت قىلغۇزغاندىن كېيىن، دەرھال
ھاجەتخانىغا تۆكۈۋېتىش لازىم.

10. ھەر خىل يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك ئىچى سۈرۈشلەرنى
ئايرىش ۋە دېزىنفېكسىيەلەش خىزمىتىگە دىققەت قىلىش لازىم. يۇقىرىد-
ىكى نۇقتىلارغا دىققەت قىلغاندا ئىچى سۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى
بولدۇ.

6. ئىچى سۈرگەن بالىلارنى ئائىلىدە داۋالاش ھەققىدىكى ساۋات

1. ئىچى سۈرگەن بالىلارنى ئائىلىدە داۋالاش

بالىنىڭ ئىچى سۈرۈپ قالغاندا، دوختۇردا ياتقۇزۇپ داۋالاش
شارائىتى بولمىسا، ئاتا - ئانىلار تۆۋەندىكى ئۈچ تۈرلۈك نۇقتىغا ئەمەل
قىلىپ، داۋالسا بولىدۇ:

(1) بالىلارغا كۆپرەك ئۇسسۇزلۇق بېرىپ سۇسىزلىنىشنىڭ ئالدىد-
ىنى ئېلىش، ئانىسىنى ئېمىدىغانلارنى داۋاملىق ئېمىتىش، كالا سۈتى
بىلەن بېقىلغان بولسا، كالا سۈتىگە سۇ قوشۇپ سۇيۇلدۇرۇپ بېرىش
ياكى ئۆز شارائىتىگە قاراپ شوۋىڭكۈرۈچ سۈيى، ئاش سۈيى، سۇس

چاي، مېۋە سۈيى قاتارلىقلارنى بەرسىمۇ بولىدۇ ياكى تۈزلۈك شېكەر سۈيى تەييارلاپ ئىچكۈزسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر ORS بولسا تەڭشەپ بەرسە تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

(2) بالغا داۋاملىق تاماق يېگۈزۈپ، ئوزۇقلىنىش ناچارلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئېمىۋاتقان بالىلارنى داۋاملىق ئېمىتىش، كالا سۈتى بىلەن بېقىلغانلار بولسا، كالا سۈتىنى يېرىم ھەسسە سۈيۈلدۈرۈپ داۋاملىق بېرىپ تۇرۇش لازىم. ئالتە ئايلىقتىن ئاشقان بالىلارغا كراخ-مال، پۇرچاق تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى، بۇلماق، كۆكتات، مېۋە شىرنىسى، مېۋە - چېۋە، گۆش ياكى بېلىق قاتارلىقلارنى بەرسە بولىدۇ. يېمەكلىكلەر يېڭى، پاكىز، يۇمشاق، ئاسان ھەزىم بولىدىغان بولۇشى لازىم. ئاز - ئازدىن كۆپ قېتىم بېرىش، ئىچى سۈرۈش توختىغاندىن كېيىن ئىككى ھەپتىگىچە ئۈچ ۋاخ تاماقتىن سىرت، بىرۋاخ تاماقنى قوشۇپ بېرىش لازىم. ئەگەر ئىچى سۈرگەن مەزگىلدە بالغا يېمەكلىك بەرمىسە، ئوزۇقلىنىش ناچارلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ئىچى سۈرگەن مەزگىلدىكى ئوزۇقلاندۇرۇشقا ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم.

(3) يۇقىرىقىدەك پەرۋىش قىلىسىمۇ ياخشىلانماي، كۆپ مىقداردا سۇيۇق تەرەت قىلسا، كۆپ قېتىم قۇسسا، تولا ئۇسنىسا، قىزىتىپ كەتسە، چوڭ تەرىتىدە قان، يىرنىڭ بولسا، دەرھال دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ كۆرسىتىش كېرەك.

2. ئائىلىدە ئېلېكترونلىق ھىساپ سۈيىنى تەييارلاش

يېقىنقى يىللاردىن بېرى مەركىزىي بالىلار كېسەللىكى ئىلمىي تەتقىقات ئورنى تەتقىق قىلىپ ئوتتۇرغا قويغان 500 مىللىلىتىر

مىتالىغا 1.75g تۇز سېلىپ ياسىغان ياكى 25 گرام قورۇغان گۈرۈچ ئۇنىغا 500 مىللىلىتىر سۇ، 1.75 گرام تۇز سېلىپ، 8~5 مىنۇت قاينىتىپ ياسىغان مىتالىغا، تۇز سېلىپ ياسىغان ئىچكۈزۈش سۇيۇقلۇقىنى، بالا ئىچى سۈرۈش بىلەنلا ئىچكۈزۈشكە باشلىسا، يەنە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 60~40 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ بەر-گەندە، سۇسىزلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈمدارلىقى %91.3 كە يەتكەن، ئەگەر بالدا سۇسىزلىنىش ئالامەتلىرى بولسا، يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىلىك سۇسىزلانغانلارغا ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا 80~60 مىللىلىتىردىن ھېسابلاپ، 6~4 سائەت ئىچىدە ئىچ-كۈزۈپ بولغاندا، سۇسىزلىنىشنى تۈزەش ئۈنۈمدارلىقى %97.3 كە يەتكەن. بۇ ئىچىش ئەپلىك، تەمى ياخشى، ئۈنۈمدار، ئەرزان ئۇسۇل. ئادەتتە سىناپ باقسىڭىز قانائەتلىنەرلىك ئۈنۈمگە ئېرىشىسىز.

ORS نى ئائىلىلەردە تەڭشەپ ھېسابلاپ بېرىش: ئىچكۈزۈپ سۇيۇقلۇق تولۇقلاش سۇيۇقلۇقى (ORS) پاراشوكىنىڭ بىر بولىقىغا 500 مىللىلىتىر سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ قوشۇپ تەڭشەپ، ھەر 3~2 مىنۇتتا بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 20~10 مىللىلىتىردىن ئىچكۈزۈپ بېرىش كېرەك. ئىشلىتىش مىقدارىنى تۆۋەندىكى جەدۋەلدىن پايدىلىنىڭ.

12- جەدۋەل. ORS نى ئائىلىدە تەڭشەش ئۇسۇلى

يېشى	ھەر قېتىملىق تەرمەتتىن كېيىن ئىشلىتىش مىقدارى	كۈنلۈك مىقدارى
2 ياشتىن كىچىكلەر	50~100 ml	500 ml
2 ياشتىن چوڭلار	100~200 ml	1000 ml
10 ياشتىن چوڭلار	ئىمكانقەدەر كۆپ ئىچكۈزۈلدۇ	2000 ml

ئەسكەرتىش: 200 مىللىلىتىر ئوتتۇراھال بىر ئىستانكان سۇغا باراۋەر.
 ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ئىككى ياشتىن كىچىكلەرگە 2~1 مىنۇتتا بىر قوشۇق بېرىلىدۇ، چوڭ بالىلار ئۆزى ئىچىدۇ، قۇسسا 10 مىنۇتتىن كېيىن، ئاز - ئازدىن بېرىلىدۇ. كېسەلنىڭ قاپاقلىرى ئىش- شىپ قالسا، ORS ئىچكۈزۈشنى توختىتىپ، كۆپرەك قايناق سۇ ئىچكۈزۈش لازىم. ORS نى ھەر كۈنى يېڭىدىن تەييارلاش لازىم.
 13- جەدۋەل. سۇسىزلىنىشنى داۋالاشتا دەسلەپكى تۆت سائەتتە بېرىلىدىغان ORS مىقدارى

بىرلىك	بەدەن ئېغىرلىقى (كىلوگرام)	* بېرىلىدىغان مىقدارى
4 ئايلىقتىن كىچىك	5 كىلوگرامدىن تۆۋەن	200~400
4~11 ئايلىق	5~7.9	400~600
12~23 ئايلىق	8~10.9	600~800
4~2 ياش	11~15.9	800~1200
5~14 ياش	16~29.9	1200~2200
15 ياشتىن ئاشقانلار	30 دىن ئارتۇق	2200~4000

ئەسكەرتىش: كېسەلنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىنى بىلمىگەندە، جەدۋەلدىكى ياش بويىچە ORS مىقدارى ھېسابلىنىدۇ.

ئالتە ئايلىقتىن كىچىك ئانىسىنى ئەمەيدىغانلارغا تۆت سائەت ئىچىدە 200~100 مىللىلىتىر قايناق سۇ ئىچكۈزۈش لازىم.
 ئائىلىدە تۈزلۈك شېكەر سۈيىنى تەييارلاش: بالىنىڭ ئىچى سۈرۈپ قالغاندا دەرھاللا دوختۇرغا ئاپىرىش، شارائىتى بولمىسا تۈزلۈك شېكەر سۈيى تەييارلاپ ئىچكۈزۈش، سۇسىزلىنىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

بىر لىتىر سۇغا بىر قوشۇق تۇز (بەك تۈزلۈك بولماسلىقى

كېرەك)، سەككىز قوشۇق شېكەر سېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ تەڭشىلىدۇ. بۇنى بىر ئۆلچەم قىلىپ ئازراق تەڭشەشكە توغرا كەلسە، يۇقىرىدىكى ئۆلچەمنى ئاساس قىلىپ، ئازراق ئېلىپ تەڭشەش بولىدۇ، مەسىلەن: 500 مىللىلىتىر تەڭشەمەكچى بولسا ھەممىسىدىن يېرىمدىن ئېلىپ، 250 مىللىلىتىر تەڭشەمەكچى بولسا ھەممىسىدىن $1/4$ دىن ئېلىپ، تەڭشەپ ئىچكۈزسە بولىدۇ.

7. بالىلارنى سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاشتا دائىم

ئىشلىتىلىدىغان ئېرىتمىلەر

بالىلارنى سۇيۇقلۇق بىلەن داۋالاشتا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئېرىتمىلەر ئېلېكترولىتلىق ۋە غەيرىي ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمىلەر دەپ ئىككى خىلغا بۆلىنىدۇ. بۇ خىل ئېرىتمىلەر ئورگانىزم يوقاتقان سۇيۇقلۇقنىڭ ئورنىنى تولدۇرىدۇ. ئورگانىزم سۇيۇقلۇقنىڭ نورمال ئۆسۈش ھالىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ، كىسلاتا - ئىشقاردىن زەھەرلىنىشنى تۈزەيدۇ، بەدەننى ئېھتىياجلىق ئېلېكترولىتلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. غەيرىي ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمىلەر بەدەننى سۇ ۋە ئىسسىقلىق ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ ئېرىتمىلەرنىڭ تەركىبىي، خاراكتېرى ئوخشاش ئەمەس. ئوخشاشمىغان خاراكتېرلىك ۋە ئوخشاشمىغان دەرد-جىللىك سۈسزىلىشقا، ئوخشاشمىغان ئېرىتمىلەر بېرىلىدۇ.

1. غەيرىي ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمىلەر

غەيرىي ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمىلەردىن $5 \sim 10\%$ گلۇكوزا ئېرىتمىسى بالىلار بۆلۈمىدە كۆپ ئىشلىتىلىدۇ، 5% لىك گلۇكوزا تەڭ ئۆسۈملۈك سۇيۇقلۇق، ئۇنىڭ ئۆسۈم بېسىمى 278 mOsm/L قان پلازىمىسىنىڭ ئۆسۈم بېسىمىگە يېقىن كېلىدۇ، شۇڭا تەڭ

كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ، شۇنداقلا، ئېلېكترولىتلىق سۇيۇقلۇقلارنى سۇيۇلدۇرۇش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىدۇ. 10% گلۇكوزىنىڭ ئوسموس بېسىمى 556 mOsm/L بولۇپ، قان پلازىمىسىنىڭ ئوسموس بېسىمىدىن ئىككى ھەسسە چوڭ، شۇڭا يۇقىرى كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق دېيىلىدۇ. لېكىن گلۇكوزىد-لار بەدەنگە كىرگەندىن كېيىن، تەدرىجىي ئوكسىدلىنىپ، كاربون IV ئوكسىدى (CO_2) بىلەن سۇ (H_2O) غا ئايلىنىپ، كۆپۈش كۈچىنى يوقىتىدۇ ھەمدە ئۆپكە، بۆرەك، تېرىلەر ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىلىدۇ. قان پلازىمىسىدا ئوسموسلۇق رولىنى ساقلاپ قالايمىدۇ. 10% ~ 5 لىك گلۇكوزىنى ئىشلىتىشتىكى مەقسەت، بەدەننى سۇ ۋە بىر قىسىم ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەشتىن ئىبارەت. يۇقىرى كۆپۈش كۈچىگە ئىگە 25% ~ 50 لىك گلۇكوزىنىڭ سۈيىدۈك ھەيدەش، سۇسىزلاندۇرۇش رولى بولغاچقا، سۇسىزلانغان ئاغرىق بالىلارنى داۋالاغاندا بۇنىڭغا ئوخشاش يۇقىرى كۆپۈش كۈچىگە ئىگە گلۇكوزا ئېرىتمىسىنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك.

2. ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمىلەر

ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمىلەر ئىشلىتىش مەقسىتىنىڭ ئوخشاشماسلىقىغا ئاساسەن كۆپ خىل ئوخشاشمىغان ئېلېكترولىتلەردىن تۈزۈلگەن. بۇ ئېرىتمىلەر ئورگانىزم يوقاتقان سۇيۇقلۇقنى تولۇقلاش، بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ تۆۋەن ئوسموسلۇق ھالىتىنى تۈزەش، كىسلاتا-ئىشقاردىن زەھەرلىنىشنى تۈزەش ھەم ئېھتىياجلىق ئېلېكترولىتلارنى تولۇقلاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

(1) فىزىئولوگىيەلىك ئاش تۇزى سۇيۇقلۇقى 0.9% لىك

ناترىي خلور ئېرىتمىسى تەڭ ئوسموسلۇق ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمە بولۇپ، ئۇنىڭ ئوسموس بېسىمى 308 mosm/L بولىدۇ. تەركىبىدە ناترىي بىلەن خلور بىردەك 154 mEq/L بولىدۇ. ناترىي مىقدارى قان پلازىمىسىدىكى ناترىيىنىڭ مىقدارى بىلەن ئوخشاش لېكىن خلور-نىڭ مىقدارى قان پلازىمىسىدىن $1/3$ يۇقىرى (103 mEq/L) بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ مىقداردا كىرگۈزۈلسە، قاندىكى خلور يۇقىرىلاپ كېتىدۇ، بولۇپمۇ ئېغىر دەرىجىلىك سۇسىزلىنىش، كىسلاتا-دىن زەھەرلىنىش ياكى بۆرەك خىزمىتى ناچار بولغاندا، ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىش خەۋىپى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن پەقەت خلورنىڭ يوقىلىشى سەل كۆپرەك بولغان ئاغرىق بالىلارغا ئىشلەتسە مۇۋاپىق بولىدۇ. كلىنىكىدا يېنىك دەرىجىدىكى سۇ يوقىتىش ياكى ئوتتۇرا دەرىجىدىكى ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى تۈزىتىشكە ماس كېلىدۇ. ئادەتتە گلۇكوزا ئېرىتمىسى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ. بۇ تاماق بېرىش چەكلەنگەن ياكى تاماق خالىمايدىغانلارغا ناترىي، خلور، سۇغا بولغان ئېھتىياجنى قامداش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ كلىنىكىدا ئىشلىتىلىش دائىرىسى ناھايىتى كەڭ. بۇنىڭدىن باشقا يەنە %5 لىك گلۇكوزىلىق فىزىئولوگىيىلىك ئاش تۇز ئېرىتمىسى بار، بۇنىڭدىن گلۇكوزا %5، فىزىئولوگىيىلىك ئاش تۇزى %0.9 نى تەشكىل قىلىدۇ. بىراق %0.9 لىك فىزىئولوگىيىلىك ئاش تۇز ئېرىتمىسى كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى تۈزىتىشكە پايدىسىز، شۇڭا گلۇكوزا بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىش كېرەك. بۇندىن باشقا مۇرەككەپ ناترىي خلور ئېرىتمىسى بولۇپ، بۇمۇ تەڭ ئوسموسلۇق ئېلېكترولىتلىق ئېرىتمە، بۇنىڭ ئوسموس بېسىمى 310 mOsm/L ، تەركىبىدە ناترىي

ۋە خلورىدىن باشقا ئاز مىقداردا كالىي (4 mEq)، كالتسىي (6 mEq) بار، ئىككىسىنىڭ مىقدارى قان پلازىمىسىدىكى كالىي، كالتسىيىنىڭ قويۇق-
 لۇق دەرىجىسىگە يېقىن كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئېرىتمىنى كۆپ
 مىقداردا كىرگۈزگەندىمۇ قان سۇيۇلۇپ، تۆۋەن كالتسىيلىق قان كې-
 سىلى ياكى تۆۋەن كالىيلىق قان كېسەللىكى پەيدا بولمايدۇ. ئۇنىڭ
 تەسىرى ۋە يېتەرسىزلىكى فىزىئولوگىيىلىك ئاش تۈزى ئېرىتمىسى
 بىلەن ئوخشاش، شۇڭا بەزىدە فىزىئولوگىيىلىك ئاش تۈزى ئېرىتمىسى
 ئورنىغا ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. لېكىن كالىي، كالتسىي ئىشلىتىش چەك-
 لىنىگەن ئەھۋاللاردا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

2) ناترىي بىكاربونات (NaHCO_3) دائىم ئىشلىتىلىدىغان
 ئىشقارلىق ئېرىتمىلەرنىڭ بىرى، ھازىرقى ياسالما بىرىنىڭ قويۇقلۇق
 دەرىجىسى %5 بولۇپ، سۇيۇلدۇرۇلغاندىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ. يەنى
 كىلىنىكىدا %1.4 لىك تەڭ ئوسموسىلۇق سۇيۇقلۇققا (%5 لىك
 ناترىي بىكاربوناتنىڭ بىر مىللىلىتىرىگە %5 لىك گلۇكوزا سۇيۇقلۇ-
 قىدىن 3.5 مىللىلىتىر قوشۇپ سۇيۇلدۇرغاندا، %1.4 لىك ناترىي بى-
 كاربونات بولىدۇ) ئايلاندۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ. ماددا ئاللىمىش خاراكتېر-
 لىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى جىددىي قۇتقۇزۇشقا توغرا كەلگەندە-
 دە، %5 لىك ناترىي بىكاربوناتنى سۇيۇلدۇرمايلا ۋېنادىن ئوكۇل
 قىلىپ كىرگۈزسىمۇ بولىدۇ. لېكىن كۆپ قېتىم ئىشلەتكەندىن كېيىن
 ھۈجەيرە سىرتى سۇيۇقلۇقى يۇقىرى ئوسموسىلۇققا ئۆزگىرىپ كېتىدۇ،
 شۇڭا دېققەت قىلىش كېرەك. ناترىي بىكاربونات تۇراقسىز بولغاچقا،
 ئىشلىتىشتىن ئىلگىرىلا تەڭشەش لازىم. تۇرۇپ قالسىلا ئاسان بۇزۇلۇپ
 قالىدۇ.

3) ناترىي لاکتات ھازىرقى ياسالماسى %11.2 لىك گرام

مولېكۇلىلىق ناترىي لاکتات ئېرىتمىسى بولۇپ، ئادەتتە % 11.2 لىك ناترىي لاکتات ئېرىتمىسىنى ئالتە ھەسسە سۇيۇلدۇرۇپ، تەڭ ئۈس-مۈسلۈق % 1.87 لىك ناترىي لاکتات ئېرىتمىگە ئايلاندۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ، % 11.2 لىك ناترىي لاکتات ئېرىتمىسى يۇقىرى ئۈسمۈسلۈق ئېرىتمە بولۇپ، بۇنىڭ ئۈسمۈس بېسىمى 334 mOsm/L ، قان پلازىمىسىنىڭ ئۈسمۈس بېسىمى 320 mOsm/L گە يېقىنلىشىدۇ. كلىنىكىدا ناترىي لاکتاتتىن ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا % 11.2 لىكتىن 0.6 مىللىلىتىر، % 1.87 لىكتىن 4 مىللىلىتىر كىرگۈزۈلسە، كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش كۈچىنى 1 mEq/L كۆتۈرىدۇ. بۇ ئېرىتمە ئىشقارلىق بولغاچقا، ئوكسىگېنلىق شارائىتتا جىگەردە ئوكسىدلىنىپ، ھىدرو كاربونات (HCO_3^-) قا ئايلىنىدۇ، بۇنى ئىشلەتكەندە ماددا ئالېمىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلى-نىشنى تۈزىتىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ، لېكىن ئۈنۈمى ئاستا، بۇنى جىگەر خىزمىتى ناچارلارغا، شوك، ئوكسىگېن يېتىشمەسلىك، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارغا، سۈت كىسلاتاسى يىغىلىپ قېلىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشلەرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. بۇنداق ئەھۋاللاردا ناترىي بىكاربونات ئىشلىتىش لازىم.

4) تىرىپىدروكسىمېتېلامىنوتان (THAM) بۇ بىر خىل ئورگانىك ئاممونى بولۇپ، بۇنى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىغا % 7.28 لىك ئېرىتمىسىدىن (0.6 m) ياكى % 3.64 لىك ئېرىتمىسىدىن 2 مىللىلىتىردىن بېرىلسە، كاربون IV ئوكسىدى بىرىكىش كۈچىنى 1 mEq/L كۆتۈرىدۇ. بۇ تەركىبىدە ناترىي بولمىغان كۈچلۈك ئورگانىك تەسىرىنى پەسەيتكۈچى دورا. بەدەن سۇ-يۇقلۇقىدا كاربون كىسلاتاسى بىلەن رېئاكسىيەلىشىپ ھىدرو-

كاربونات (HCO_3^-) ھاسىل قىلىدۇ، كاربون IV ئوكسىدنىڭ بىرىكىش كۈچىنى بىۋاسىتە تۆۋەنلىتىدۇ. شۇڭا ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش، نەپەس ئېلىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىش ۋە ئارىلاشما خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشلەردە ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ناترىي چەكلەنگەن ئاغرىق بالىلارغا ئىشلىتىشكە مۇۋاپىق كېلىدۇ. بۇ دورىنىڭ تەسىرى تېز بولۇپ، قاننىڭ pH قىممىتىنى تېزلىكتە ئاشۇرىدۇ. شۇڭا قاندىكى pH قىممىتىگە ئاساسلىنىپ، ئىشلىتىش مىقدارى بەلگىلىنىدۇ. بۇ دورىنىڭ يەرلىك ئورۇنغا بولغان غىدىقلاش تەسىرى كۈچلۈك بولۇپ، ئوكۇل قىلغاندا قان تومۇر سىرتىغا چىقىپ كەتسە، قىزىرىپ ئىشىشى، قاپارتقۇ پەيدا قىلىدۇ، ھەتتا نېكروزلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم. كۆپ مىقداردا، تېز سۈرئەتتە ئوكۇل قىلىنسا، نەپەسنى تورمۇزلايدۇ، ھەتتا نەپەس توختاپ قالىدۇ ھەمدە تۆۋەن قان بېسىم، يۇقىرى كالىيلىق قان كېسەللىكى، تۆۋەن كالتسىيلىق قان كېسەللىكى، تۆۋەن قەنتلىك قان كېسەللىكى قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا دورا ئىشلەتكەندىن كېيىن كېسەلنىڭ ئەھۋالىدىكى ئۆزگىرىشنى يېقىندىن كۆزىتىپ تۇرۇش لازىم. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلارغا ئىشلىتىش مەنىسى قىلىنىدۇ. ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى تۈزىتىشتە يەنىلا ناترىي بىكاربوناتنى تاللاش لازىم.

5) كالىي خلور (KCl_2) بۇنىڭ %15 ~ 10 لىكى بولۇپ، كلىنىكىدا كالىي تولۇقلاش ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ. ئادەتتە ۋېنادىن تامچە-لاتقاندا %0.2 ئېرىتمىسى (تەركىبىدىكى كالىي 27 mmol/L) ئىشلىتىلىدۇ. قويۇقلۇق دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى بولغاندا %0.3 لىك

(تەركىبىدىكى كالىي 40 mmol/L) دىن ئاشماسلىقى لازىم. كالىيلىق ئېرىتمىلەرنى ۋېنادىن بىۋاسىتە ئوكۇل قىلىشقا بولمايدۇ، بىۋاسىتە ۋېنادىن كىرگۈزگەندە يۈرەك مۇسكۇلىنى تورمۇزلايدۇ، يۈرەك قىسقىدۇ. رىش باسقۇچىدىلا توختاپ قېلىپ، ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

3. ئارىلاش ئېرىتمىلەر

بۇ ئېرىتمىلەر ھەر خىل تەڭ ئوسموسلۇق ئېرىتمىلەرنى ئوخ- شاشمىغان نىسبەتتە ئارىلاشتۇرۇش ئارقىلىق تەييارلىنىدۇ، بۇ خىلدىكى ئېرىتمىلەر كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن، داۋالاشتا ياخشى ئۈ- نۈمگە ئېرىشىشنى مەقسەت قىلىپ لايىھىلەنگەن. ئوخشىمىغان ئەھۋال- دىكى سۇسىزلىنىشقا سۈيۈقلۈك تولۇقلاش ئېھتىياجى ئۈچۈن ئىشلە- تىلىدۇ. تەڭ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ئېرىتمىلەرنى ھەر قانداق نىسبەتتە ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، يەنىلا تەڭ كۆپۈش كۈچىنى ساقلاپ قالىدۇ.

1) 2:1 ئېرىتمە بۇ ئېرىتمىدە فىزىئولوگىيىلىك ئاش تۈزى ئىككى ئۆلۈش، 1.87% لىك ناترىي لاکتاتس ياكى 1.4% لىك ناترىي بىكاربونات بىر ئۆلۈش بولىدۇ. بۇ ئېرىتمىنىڭ ئوسموس بېسىمى 316 mOsm/L بولۇپ، تەڭ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۈيۈق- لۈقتۇر. كلىنىكىدا بەدەن سۈيۈقلۈقىنى تولۇقلاش، كىسلاتادىن زە- ھەرلىنىشنى تۈزىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

2) 2:3:4 لىك ئېرىتمە بۇ ئېرىتمىدە فىزىئولوگىيىلىك تۈز سۈيى تۆت ئۆلۈش، $10\% \sim 5\%$ لىك گلوكونا ئۈچ ئۆلۈش، 1.4% لىك ناترىي بىكاربونات ياكى 1.87% لىك ناترىي لاکتاتس ئىككى ئۆلۈش بولىدۇ. ئۇنىڭدىكى ئېلېكترولىتلار مىقدارى (mEq/L بويىچە) 106 Na^+ ، 60 Cl^- ، 46 HCO_3^- بولىدۇ. ئوسموس بېسىمى 210 mOsm/L

بولۇپ، $2/3$ كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ئېرىتمىدۇر. بۇ ئېرىتمە ئىشقارلىق خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولۇپ، ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى تۈزىتىش، بەدەن سۇيۇقلۇقىنى تولۇقلاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. $3:2:1$ لىك ئېرىتمە بۇ ئېرىتمىدە $10\% \sim 5\%$ لىك گلۇكوزا ئۈچ ئۇلۇش، فىزىئولوگىيىلىك تۇز سۈيى ئىككى ئۇلۇش، 1.87% لىك ناترىي لاکتاس ياكى 1.4% لىك ناترىي بىكاربونات بىر ئۇلۇش بولىدۇ. تەركىبىدىكى ئېلېكترولىتلار، $79 \text{ Na}^+ (\text{mEq/L})$ ، 59 Cl^- ، 28 HCO_3^- بولۇپ، ئوسموس بېسىمى 150 mOsm/L ، يېرىم كۆپۈش كۈچىگە ئىگە ئېرىتمىدۇر.

$5:6:7$ لىك ئېرىتمە بۇ ئېرىتمىدە 1.87% لىك ناترىي لاکتاس ياكى 1.4% لىك ناترىي بىكاربونات بەش ئۇلۇش، $10\% \sim 5\%$ لىك گلۇكوزا ئالتە ئۇلۇش، فىزىئولوگىيىلىك تۇز سۈيى يەتتە ئۇلۇش بولىدۇ. تەركىبىدىكى ئېلېكترولىتلار، $106 \text{ Na}^+ (\text{mEq/L})$ ، 60 Cl^- ، 212 mOsm/L ، كۆپۈش كۈچى $2/3$ بولۇپ، ئىشقارلىق ئېرىتمىدۇر، ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كىسلاتادىن زەھەرلىنىشنى تۈزىتىشكە ئىشلىتىلىدۇ.

$1:1$ لىك ئېرىتمە بۇ ئېرىتمىدە فىزىئولوگىيىلىك تۇز سۈيى بىر ئۇلۇش، $10\% \sim 5\%$ لىك گلۇكوزا بىر ئۇلۇش بولىدۇ، بۇ قان پلازىمىسى ئوسموس بېسىمىنىڭ يېرىمىگە تەڭ ($1/2$ يەنى) كۆپۈش كۈچىگە ئىگە. يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىدىكى سۇسىزلىنىش ياكى تەڭ ئوسموسلۇق ۋە يۇقىرى ئوسموسلۇق سۇسىزلىنىشلاردا كۆپ ئىشلىتىلىدۇ.

$4:1$ لىك ئېرىتمە (فىزىئولوگىيىلىك ساقلاش سۇيۇقلۇقى) بۇنىڭ تەركىبىدە $10\% \sim 5\%$ لىك گلۇكوزا تۆت ئۇلۇش، فىزىئو-

لوگىيىلىك تۇز سۈيى بىر ئۇلۇش، % 0.15 لىك كالىي خلور قوشۇلغۇ-
 ۋان ئېرىتمە بولۇپ، ئوسموس بېسىمى 100 mOsm/L، 1/3
 كۆپۈش كۈچىگە ئىگە سۇيۇقلۇق، فىزىئولوگىيىلىك ئېھتىياجنى تو-
 لۇقلاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

(7) % 3 لىك ناترىي خلور ئېرىتمىسى بۇ يۇقىرى كۆپۈش
 كۈچىگە ئىگە ناترىي تۇتقان سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى
 ئېلېكترولىتلار 511 Na^+ ، 511 Cl^- (mEq/L)، ئوسموس بېسىمى
 1022 mOsm/L بولۇپ، 3.5 كۆپۈش كۈچىگە باراۋەر كېلىدۇ.
 بۇ ئاساسەن سۇ بىلەن زەھەرلەنگەندە ئىشلىتىلىدۇ. يۇقىرىدىكى ئارىلاش
 ئېرىتمىلەر بالىلار بۆلۈمىدە دائىم ئىشلىتىلىدىغان ئېرىتمىلەردۇر.

小兒科常用藥

(文庫本)

著者 文庫本・愛知
 校對者 木下樹

出版 (W) 科學出版社上海

科學出版社上海

(100028 上海 45 號 55 號 55 號 55 號)

科學出版社上海

科學出版社上海

科學出版社上海

科學出版社上海

科學出版社上海

科學出版社上海

科學出版社上海

责任编辑:关秀梅

封面设计:艾尼瓦尔·卡斯木

小儿急性腹泻与治疗

(维吾尔文)

努力曼·斯马义 编写

阿提卡木 责任校对

新疆科技卫生出版社(W)出版

新疆新华书店发行

(乌鲁木齐市龙泉街66号 邮编 830001)

新疆新华书店发行

·工人时报印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 5.625印张

1998年5月第一版第一次印刷

印数:1—2200

ISBN7—5372—2051—4

R·219(民文)定价:6.70元