

تېرە كېسەللىكلىرى ئىلمى

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

كىرىشى سۆز

بۇ كىتاب 1983-يىلى 11-ئايدا سەھىيە مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن ئېچىلغان «پۇتۇن مەملىكەتلىك ئوتتۇرا دەرىجىلىك تىببىي مەكتەپلەر دەرسلىكلىرىنى تۈزۈش، تەھرىرلەش يىغىنى» نىڭ روھىغا ئاساسەن، تۈزگۈچى، تەرجىمە - نەشىر قىلغۇچى خادىملارنىڭ ئور-
تاق تىرىشچانلىقى ئارقىسىدا يېزىلىپ، تەرجىمە - نەشىر قىلىندى. پۇتۇن مەملىكەتلىك ئوتتۇرا دەرىجىلىك تىببىي مەكتەپلەر فېلىدشېرلىق كەسپى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
«تېرە كېسەللىكلىرى ئىلمى» ھازىرقى زامان تىببىي پېنىنىڭ ئاساسىي بىر قىسمى بولۇپ، ئادەم ئورگانىزىمىنىڭ تېرە سىستېمىسى بويىچە بارلىققا كەلگەن بىر كى-
مىك تىببىي پەن. شۇڭلاشقا ئوقۇتۇش جەريانىدا مەزكۇر پەننىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە مەخ-
سۇس كەسپىي جەھەتتىكى تەلەپلەرگە بىرلەشتۈرۈپ، ئاساسىي نەزەرىيە بىلىملىرىنى ئو-
قۇتۇش بىلەن ئاساسىي تېخنىكىلىق مەشقىنى ھەقىقىي تۈردە كۈچەيتىش لازىم. بۇ كى-
تابتا كۆپ ئۇچرايدىغان تېرە كېسەللىكلىرى مۇھىم نۇقتا قىلىندى ھەمدە يېقىنقى يىل-
لاردىن بۇيان تېرە كېسەللىكلىرى ئىلمىي نەزەرىيىسى ۋە ئەمەلىيىتىدىكى بەزى تەرەق-
قىياتلار كىرگۈزۈلدى. يەنە بەزى تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ رايون ئالاھىدىلىكىنى كۆزدە
تۇتۇپ، ئاز قىسىم تاللاپ ئوقۇتۇلىدىغان باب ۋە پاراگرافلار قوشۇلدى. ئوقۇتۇش جە-
ريانىدا مۇھىم مەزمۇنلارنى تاللاپ، مۇھىملىرى بىلەن مۇھىم ئەمەلىيلىرىنى ئېنىق ئا-
رىيۇپ بىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ.

بىزنىڭ تەرجىمە سەۋىيىمىز چەكلىك بولغاچلىقىمىز، يېتەرسىزلىكلەردىن خالىي بو-
لۇش تەس. يەنە قايتا نەشىر قىلىپ تۈزىتىش كىرگۈزگەندە پايدىلىنىش ئۈچۈن، كەڭ
تىببىي خادىملار ۋە ئوقۇتقۇچى - ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەزكۇر دەرسلىك ھەققىدە قىممەتلىك
پىكىرلىرىنى بېرىشىنى سەھىيە ئۈمىد قىلىمىز.

1989 - يىلى 7-ئاي

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

مۇندەرىجە

I ئومۇمىي قىسمى

- 1 بىرىنچى باب تېرە ھەستولوگىيەسى
- 4 ئىككىنچى باب تېرە فىزىئولوگىيەسى
- 6 ئۈچىنچى باب تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ سىجىرىمى ۋە دىئاگنوستىكىسى
- 6 1. تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئالامەتلىرى
- 10 2. تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ دىئاگنوزى
- 13 تۆتىنچى باب تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش ئىلمى
- 13 1. تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپلىرى
- 14 2. تېرە كېسەللىكلىرىنى داۋالاش

II خۇسۇس قىسمى

- 31 بىشىنچى باب ئالېرگىيەلىك تېرە كېسەللىكلىرى
- 31 1. تېگىشىش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى
- 33 2. دورا ئەسۋىسى
- 37 3. ئېكزېما
- 40 4. ئۇزلۇقىدىن سىزىمچانلىق خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى
- 40 5. ئالاھىدە رېئاكسىيىچان تېرە ياللۇغى
- 43 6. ئېشەك يېمى
- 46 7. دۆڭچە ئەسۋاملىق ئېشەك يېمى
- 46 ئالتىنچى باب كېسەللىكلىرى
- 46 1. سانا ئەت تېرە كېسەللىكلىرى
- 49 2. شاللىق تېرە ياللۇغى
- 52 يەتتىنچى باب شارچە باكتېرىيىدىن يۇقۇملانغان تېرە كېسەللىكلىرى
- 52 1. يىرىك قاپارتمىلىق يارا
- 55 2. تۈك خالىتىسى ياللۇغى
- 56 سەككىزىنچى باب ئاچچاق تاياقچە باكتېرىيىدىن يۇقۇملانغان تېرە كېسەللىكلىرى
- 56 1. ماخاۋ
- 63 2. تېرە سىلى
- 65 توققۇزىنچى باب ۋىرۇسلۇق تېرە كېسەللىكلىرى
- 66 1. ئاددىي قوقاق
- 67 2. بەلباغسىمان قوقاق
- 69 3. سۆگەل
- 72 4. يۇقۇملۇق يۇمشاق سۆگەل
- 72 5. يۇقۇملۇق قىزىل داغ


- 73 ئونىنچى باب زامچۇرۇغلۇق كېسەللىكلەر 73
18. باش تەمرە ئىككىسى 73
29. قول - پۇت ۋە تىرناق تەمرە ئىككىسى 76
38. بەدەن تەمرە ئىككىسى ۋە پۇت تەمرە ئىككىسى 78
48. ئالا - چىپار تەمرە ئىككىسى 79
58. ئەسۋىسىمان زامچۇرۇغ كېسەلى 80
- ئون بىرىنچى باب سىغىلىسى ۋە سۆز ئەك 83
18. سىغىلىسى 83
28. سۆز ئەك 87
- ئون ئىككىنچى باب داشاراقلار پەيدا قىلىدىغان تېرە كېسەللىكلىرى 89
18. قوتۇر 89
28. ھاشارات مەنبەلىك تېرە ياللۇغى 90
38. يىتىلاش كېسەلى 92
- ئون ئۈچىنچى باب قىزىكا - خەمبە ئامەللىرى مەنبەلىك تېرە كېسەللىكلىرى 93
18. نۇرسەزگۈرلۈكى پەيدا قىلىدىغان تېرە كېسەللىكلىرى 93
28. يازلىق تېرە ياللۇغى 95
38. ئۇششۇك 96
48. قول - پۇتلار يېرىلىش 97
- ئون تۆتىنچى باب نېرۋا خاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغى ۋە تېرە قىچىشىدىغان كېسەللىكلەر 97
18. نېرۋا خاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغى 97
28. قىچىشقاق كېسەلى 99
38. تۈگۈنلۈك قىچىشقاق ئەسۋىسى 101
- ئون بەشىنچى باب قىزىل داغ، دۆڭچە ئەسۋە، تەڭگە قاسرا قىلىق تېرە كېسەللىكلىرى 102
18. تەڭگە تەمرە ئىككىسى 102
28. قىزىلگۈل رەڭلىك توپان ئەسۋىسى 106
38. ئاددىي توپان ئەسۋىسى 107
48. كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ 108
58. ياپىلاق لىشاي 110
- ئون ئالتىنچى باب تېرە قان تۈەۋرلىرى ياللۇغى 111
18. تېرە قان تۈەۋرلىرى ئاللىبىرگىيىلىك ياللۇغى 112
28. تۈگۈنلۈك قىزىل داغ 112
38. قان تۈەۋر تۈگۈنلۈك ياللۇغى 114
- ئون يەتتىنچى باب قوشۇقۇچى توقۇلمىلار كېسەللىكلىرى 114
18. قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى 115
28. تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى 117

- ئون سەككىزىنچى باب تېرە قوشۇمچە ئەزالىرىدىكى كېسەللىكلەر 120
- § 1. ياغ تەپچىمىدىغان تېرە ياللۇغى 120
- § 2. ئاددىي دانخورەك 121
- § 3. قىزىل بۇرۇن 123
- § 4. دائىرىلىك چاچ چۈشۈش 124
- ئون توققۇزىنچى باب تېرىدىكى ياخشى سۈپەتلىك ئۆسۈملەر 125
- § 1. تاتۇق ئۆسۈمىسى 125
- § 2. قان تومۇر ئۆسۈمىسى 126
- يىگىرمىنچى باب تېرە باشقا كېسەللىكلەرى 128
- § 1. ئاق كېسەل 128
- § 2. قاسراقلىق تېرە كېسەلى 129
- § 3. پېمىگۇس 130
- 1 - قوشۇمچە. دائىم ئۇچرايدىغان تېرە كېسەللىكلىرىنى پەرقلەندۈرۈش جەدۋىلى 133
- 2 - قوشۇمچە. سىرتىغا دائىم ئىشلىتىلىدىغان دورىلار رېتسىپلىرى 136
- 3 - قوشۇمچە. مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگەن تەجرىبىدىن ئۆتكەن جۇڭخىي دو- 146
- رىلىرى قەدىمكى رېتسىپلىرى 146

I ئومۇمىي قىسمى

بىرىنچى باب تېرە ھىستولوگىيىسى

تېرە — ئادەم بەدىنىنىڭ ئەڭ چوڭ ئەزاسى بولۇپ، بەدەننىڭ سىرتقى يۈزىنى قاپلاپ تۇرىدۇ ھەم بەدەن سىرتقى يۈزىدىكى ھەر قايسى بوشلۇق ئېغىزلىرىدا شىللىق پەرەدىگە ئۆزگىرىدۇ. تېرە سىرتقى يۈزى ئېرىقچىلار ۋە قىرلارغا تولغان بولۇپ، ئويمان يېرى تېرە ئېرىقچىلىرى، دۆڭ يېرى تېرە قىرلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇلار ئالغان، تاپان، قول-پۇت بارماق ئۇچلىرىنىڭ ئىگىلىگەن يۈزى تەرىپىدە ئېرىقچىلار ۋە قىرلار سىزىقچىلارنى پەيدا قىلىدۇ، ئۇنىڭ شەكلى ئىرىسىيەت ئاساسى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ.



چوڭلار تېرىسىنىڭ سىرتقى يۈزى ھەجىمى تەخمىنەن $1.5 \sim 2.0 m^2$ بولىدۇ. ئادەم بەدىنىدىكى ھەر قايسى ئورۇنلار تېرىلىرىنىڭ قېلىن-ئېچىزلىكى ئوخشاش بولمايدۇ، تېرە ئاستى توقۇلمىلىرىنى ھېسابلايمىغاندا تەخمىنەن $0.5 \sim 4 mm$ ئارىلىقىدا بولىدۇ. تېرىنىڭ رەڭگى ئىرىق، يەككە تەن ۋە سىرتقى مۇھىت قاتارلىق ئامىللار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. تېرە — يۈزە تېرە، ھەقىقىي تېرە، تېرە ئاستى تۈۋى قۇلىمى ۋە ئۇنىڭ قوشۇمچە ئەزالىرىدىن تۈزۈلگەن (1.1 - رەسىم).

1. يۈزە تېرە

چوڭلارنىڭ يۈزە تېرىسى ئۈچ خىل ئاساسىي ھۈجەيرە تىپى يەنى كېراتىن ھۈجەيرىلىرى،

- 1.1 - رەسىم. تېرە تۈزۈلۈشىنىڭ مودېلى
- A. يۈزە تېرە، B. ھەقىقىي تېرە، C. تېرە ئاستى ماي توقۇلمىسى؛ 1. يۈزە تېرە قان تېرەچىكىسى، 2. كۈللەكچى تاللىرى، 3. ئىلاستىك تاللىرى، 4. چىرىقۇر قان توقۇلمىسى، 5. تۈك خالىسى، 6. تۈك ئەمچەكسىمان ئۆسۈپچىسى، 7. تېرە يېزى، 8. مېسنىر (Meissner) تەنچىسى، 9. چاچ - تۈكلەر، 10. تېرە ياغ يېزى، 11. تۈكلەرنى تىكلىگۈچى مۇسكۇل، 12. ھالقا قەۋەت تەنچىسى.

قارا پېگمېنت ھۈجەيرىلىرى ۋە لانگېرخانىسى ھۈجەيرىلىرىدىن تۈزۈلگەن. بۇنىڭ دىن باشقا، تىپى بېكىتىلمىگەن ھۈجەيرىلەرمۇ بار. بۇ بەلكىم قارا پېگمېنت ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئالدىنقى گەۋدىسى ياكى يېتىلىمىگەن لانگېرخانىسى ھۈجەيرىلىرى بولۇشى مۇمكىن.

1. كېراتىن ھۈجەيرىلىرى: بۇ ھۈجەيرىلەر مۇڭگۈز ماددا ئاقسىلىنى بىرىكتۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگە. يۈزە تېرە نېگىزىدىن ئۈستىگە قاراپ تەدرىجىي نېگىز قەۋەت، تىكەن سىمان قەۋەت، دانىلىق قەۋەت، سۈزۈك قەۋەت ۋە مۇڭگۈز ماددا قەۋەتلىرىگە بۆلۈنىدۇ، ئەڭ ئاخىرى مۇڭگۈز ماددا ئاقسىلى شەكىللىنىپ چۈشۈپ كېتىدۇ. ھەر قايسى قەۋەتنىڭ نامى كېراتىن ھۈجەيرىلىرى مۇڭگۈزلىشىش ھۈجەيرىسىگە بۆلۈنۈش جەريانىدىكى ئوخشاشمىغان باسقۇچنىڭ ھالەت ئۆزگىرىشىنى ئىپادىلەيدۇ. نورمال ئەھۋالدا يۈزە تېرە ھۈجەيرىلىرى 4~3 ھەپتىدە بىر قېتىم پۈتۈنلەي ئالماشتىدۇ. بۇ ئۆزگىرىشكە كەتكەن ۋاقىت يۈزە تېرە ھۈجەيرىلىرى ئۆسۈش دەۋرانىدۇر.

(1) نېگىز قەۋەت: يۈزە تېرىنىڭ تېگىگە جايلاشقان بولۇپ، بۆلۈنۈش ۋە قايتا ئۆسۈش ئىقتىدارىغا ئىگە، چاچ چىقىش قەۋىتى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ بىرلا قەۋەت خادىغا ئوخشاش تىزىلغان يۇمىلاق تۈۋرۈكسىمان ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن. ئاستى تەرىپى ھەقىقىي تېرە بىلەن دولقۇنسىمان گىرەلىشىدۇ، ئۈستى تەرىپى كۆۋرۈك دانىچىلار ئارقىلىق تىكەنلىك ھۈجەيرىگە تۇتۇشىدۇ. نېگىز ھۈجەيرە ئىسپىدە مىقدارى ئوخشاش بولمىغان قارا پېگمېنت تەنچىلىرى بولىدۇ.

(2) تىكەنسىمان قەۋەت: نېگىز قەۋەتىنىڭ ئۈستىگە جايلاشقان. 8~6 قەۋەت كۆپ بۇلۇڭلۇق ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن، ھۈجەيرىلەر ئارىسىدا نۇرغۇن تىكەنلىك ئۆسۈكچە بار، كۆۋرۈك دانىچىلار ئارقىلىق ئۆز ئارا يېتىلىشىپ ھۈجەيرە ئارقىلىق بوشلۇقىنى شەكىللەندۈرىدۇ. بۇ، لىمفا سۇيۇقلۇقى ۋە ماددىلار ئالماشتىرىغان ئورۇندۇر.

(3) دانىلىق قەۋەت: بۇ قەۋەت كۆپ بۇلۇڭلۇقتىن موكا شەكىلىگە يۈزلەنگەن ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن. تەخمىنەن 3~2 قەۋەت بولىدۇ. ئەمما مۇڭگۈز قەۋىتى قېلىن ئورۇنلاردا ئون قەۋەتتىن كۆپرەك. ھۈجەيرە پلازىمىسىدا ئىشقارخومار سۈزۈك مۇڭگۈز ماددا دانىچىلىرى كۆپ بولىدۇ، بۇ ئادەتتە مۇڭگۈز ماددىنىڭ ئىپتىدائىي ماددىسى دەپ قارىلىدۇ.

(4) سۈزۈك قەۋەت: 3~2 قەۋەت يادروسىز ياپىلاق ھۈجەيرىلەردىن ئىبارەت. ئالاقان، تاپاندا روشەنرەك بولىدۇ. تېرىنىڭ نېپىز ئورۇنلىرىدا بولمايمۇ قالىدۇ. دائىملىق قائىدە بويىچە بويالغان كەسىمدە رەڭسىز سۈزۈك بەلباغسىمان بولۇپ قالىدۇ. سۇ ۋە ئېلېكتىرولىتلارنىڭ ئۆتۈشىنى توساش رولىغا ئىگە.

(5) مۇڭگۈز قەۋىتى: يۈزە تېرىنىڭ ئەڭ سىرتقى قەۋىتىدىكى، يادروسىز ياپىلاق ھۈجەيرىلەر بولۇپ، ئۆز ئارا قاتلىنىپ تاختاي شەكىلىگە كىرىپ قالىدۇ، بۇ كېراتىن ھۈجەيرىلىرى بۆلۈنۈشنىڭ ئەڭ ئاخىرقى باسقۇچىدۇر. قېلىن - نېپىزلىكى ئورۇننىڭ ئوخشاشماسلىقىغا قاراپ بىردەك بولمايدۇ، ئاسراش رولىغا ئىگە.

2. قارا پېگمېنت ھۈجەيرىلىرى: نېرۋا قىرىسىدىن بارلىققا كەلگەن شاخسىمان بىر خىل ھۈجەيرىلەر بولۇپ، نېگىز ھۈجەيرىلەر ئارىسىغا جايلاشقان. تېرە رەڭگى ئوخشاش بولمىغان ئىرقىيلىكلەر قارا پېگمېنت ھۈجەيرىلىرىنىڭ سانى ئوخشاش بولىدۇ.

قەخمەنەن ھەر ئون نېگىز ھۈجەيرە ئىچىدە بىردىن بولىدۇ. قارا پېگمېنت ھۈجەيرىلىرى قارا پېگمېنت تەنچىلىرىنى بىرىكتۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگە. بۇ تەنچىلەر شاخسىمان ئۆسۈكچە ئۇچى ئارقىلىق قوشنا كېراتىن ھۈجەيرىسىگە يەتكۈزۈلىدۇ. قارا پېگمېنت تەنچىلىرىنىڭ ئۇلترا بىنەپشە نۇرىنى قايتۇرۇش رولى بار. بۇنىڭدىكى دانىچىلارنىڭ سانى ۋە چوڭ - كىچىكلىكى ئىمىز تېرە رەڭگىنىڭ ئوخشىماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ.

3. لانگېرخانىمىس ھۈجەيرىلىرى: يىللىكتىن كەلگەن يۈزە تېرىدىكى يەنە بىر خىل شاخسىمان ھۈجەيرىدىن ئىبارەت بولۇپ، تىكەنسىمان قەۋەتتە كۆرۈلىدۇ. تەركىمىدە لىزو-زوما قۇرۇلمىسى بار، بۇ مۇڭگۈز ماددا قەۋىتى ۋە ھەقىقىي تېرىدىن كەلگەن ئاللىبىرگېنلارنى يۇتۇپ تازىلاپ، تېرىدە كېچىكىپ يۈز بېرىدىغان زىيادە سېزىمچانلىق رېئاكسىيەسىدە مۇھىم رول ئوينايدۇ.

نېگىز پەردە بەلبېغى: PAC بىلەن بويلاپ ئوپتىكىلىق مىكروسكۇپتا كۆرۈشكە بولىدۇ. بۇ يۈزە تېرە قۇرۇلمىسىنىڭ تىرىكى بولۇپ، يۈزە تېرە بىلەن ھەقىقىي تېرە ئوتتۇرىسىغا جايلىشىپ، بۇ ئىككىسىنى زىچ باغلاپ تۇرىدىغان، «كۆپ تۆشۈكلۈك» يېرىم ئۆتكۈز-گۈچى سۈزگۈچ بولۇپ، بەدەن سۇيۇقلۇقى بىلەن ھۈجەيرە ئارىسىدىكى ئاللىمىش يولىدۇر. نۇرغۇنلىغان ئىممۇنىت رېئاكسىيە ماددىلىرى ئادەتتە ەۋشۇ ئورۇندا پەيدا بولىدۇ.

2. ھەقىقىي تېرە

ھەقىقىي تېرە — يۈزە تېرە بىلەن تېرە ئاستى توقۇلمىلىرى ئارىسىغا جايلاشقان. كوللاگېن تاللىرى، ئېلاستىك تاللىر ۋە تورسىمان تاللىر قاتارلىق بىرلىكتۈرگۈچى توقۇلمىلاردىن تۈزۈلگەن بولۇپ، كوللاگېن تاللىرى 90% نى ئىگىلەيدۇ. بۇنىڭدىن باشقا يەنە تەركىمىدە نېگىز ماددا ۋە ھۈجەيرىلەر مۇ بولىدۇ. ئورنىنىڭ چوڭقۇر ۋە تېمىزلىقىغا قاراپ ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە قەۋەت ۋە تورسىمان قەۋەتكە بۆلۈنىدۇ. ئالدىنقىسى يۈزە تېرە بىلەن ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچىگە ئوخشاش ئۆسۈپ كىرىپ تۇتۇشىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە قىل قان تومۇرلار تۈرى بىلەن نېرۋا ئۇچلىرى مول. تورسىمان قەۋەت ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە قەۋەت ئاستىغا جايلاشقان بولۇپ، زىچ، توم تالا تۇتاقلىرى بولىدۇ، شۇڭلاشقا ئېلاستىكىلىقى ۋە تارتىشقا قارشى كۈچى خېلى چوڭ.

3. تېرە ئاستى توقۇلمىلىرى

ھەقىقىي تېرە ئاستىغا جايلاشقان، كۆپ مىقداردا ياغ ھۈجەيرىلىرى تارقالغان، شاللاڭ بىرىكتۈرگۈچى توقۇلما تالا تورلىرى ئارقىلىق كىچىك ياپراقچىلارغا بۆلۈنىدۇ. بۇ تېرە ئاستى ياغ قەۋىتى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

4. تېرىنىڭ قان تومۇرلىرى، لىمفا كانالىچىلىرى، نېرۋا ۋە مۇسكۇللىرى

يۈزە تېرىدە قان تومۇر بولمايدۇ، ھەقىقىي تېرە ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە قەۋىتىدە دە يۈزە قان تومۇر چېكىشى بولۇپ، ئۇ، تېرە ئاستى توقۇلمىلىرىنىڭ چوڭقۇر قان تومۇر

چېكىشى بىلەن ئۆتۈشۈش ئارقىلىق تېرىنى ئوزۇقلاندۇرىدۇ ۋە بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەيدۇ. تېرىنىڭ قان تومۇرلىرى بىلەن لىمفا كانالىچىلىرى ياندىشىپ مېشىپ، لىمفا تۈگۈنىگە قۇيۇلۇپ لىمفا سىستېمىسىنى ھاسىل قىلىدۇ. لىمفا سىستېمىسى لىمفا سۇيۇقلۇق قىزىق سۇزىدۇ ۋە ئىممۇنىت فۇنكسىيىسىگە قاتنىشىدۇ. تېرىدە تېگىش، ئاغرىش، بېسىم ۋە تېمپېراتۇرا قاتارلىق سېزىشنى باشقۇرىدىغان يۇلۇندىن كەلگەن سېزىم نېرۋىلىرى بار، ئۇنىڭدىن باشقا قان تومۇر، تەر بېزى ۋە تۈك تىكىلىگۈچى مۇسكۇللارنىڭ فۇنكسىيىسىنى تەڭشەيدىغان، ۋېگېتاتىپ نېرۋىدىن كەلگەن ھەرىكەت تالالىرىمۇ بار. تېرىنىڭ مۇسكۇلى ئاساسلىق سىلىق مۇسكۇل بولۇپ، تۈك تىكىلىگۈچى مۇسكۇل، قان تومۇر دىۋارى، ئەمە چەك دېغى ۋە تەر بېزى ئەتراپى قاتارلىق ئورۇنلارغا تارقىلىپ، يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ۋېگېتاتىپ نېرۋىنىڭ باشقۇرۇشىدا بولىدۇ؛ يۈز تېرىسىدىكى چىراي مۇسكۇللىرى توغرا يوللۇق مۇسكۇل بولۇپ، يۈز نېرۋىسى تەرىپىدىن باشقۇرۇلىدۇ.

5. تېرىنىڭ قوشۇمچە ئەزالىرى

تېرىدە چاچ - تۈك، تېرە ياغ بېزى، تەر بېزى ۋە تىرناق قاتارلىق قوشۇمچە ئەزالار بار. چاچ - تۈكلەر ئۇزۇن، قىسقا ۋە سېرىق تۈكلەرگە بۆلۈنىدۇ. ئۇنىڭ تېرە يۈزىدىن چىقىپ تۇرغان قىسمى تۈك غولى، تېرە ئىچىدىكى تۈك خالىتىسىغا ئورۇلۇپ تۇرغان قىسمى تۈك يىلتىزى، تۈك خالىتىسىنىڭ تېگىدىكى ئويما يېرى تۈك ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچىسى دەپ ئاتىلىدۇ. ئالاقان - تاپان، كالىپۇك، ئەمچەك توپچىسى، زەكەر بېشى، دىلچىق، كىچىك جىنىسى لەۋ قاتارلىقلاردىن باشقا پۈتۈن بەدەننىڭ تېرىسىنى چاچ - تۈكلەر قاپلاپ تۇرىدۇ. ئىنسانلار چېچىنىڭ ئۆسۈش تېزلىكى كۈنىگە تەخمىنەن $0.37mm$ بولىدۇ. تېرە ياغ بېزىنىڭ ئېغىزى تۈك خالىتىسىغا ئېچىلىپ تۇرىدۇ. ئۇ ئاجرىتىپ چىقارغان تېرە يېغى چاچ ۋە تېرىنى سىملىقلايدۇ. بۇنىڭ فۇنكسىيىسى بالاغەتكە يېتىش دەۋرىدە ئۇرغۇپ، ياشانغاندا پەسەيىدۇ. تەر بېزى - كىچىك ۋە چوڭ تەر بەزىلىرىگە بۆلۈنىدۇ، ئالدىنقىسى پۈتۈن بەدەنگە تارلىنىپ تەر ئاجرىتىدۇ. كېيىنكىسى قولتۇق، مەقشەت ئەتراپى، ئاياللار سىرتقى جىنىسى ئەزالىرى ۋە سىرتقى قۇلاق يولى قاتارلىق ئورۇنلاردا بولىدۇ. تىرناق قاتتىق مۇڭگۈزلەشكەن ئېپىتېلىيە بولۇپ، ئۇنىڭ ئېچىلىپ تۇرغان قىسمى تىرناق تاختىسى، يېتىم ئۇچىدىكى تېرە يېپىپ تۇرغان قىسمى تىرناق يىلتىزى دەپ ئاتىلىدۇ، تىرناق ئۇلى تىرناق تاختىسىنىڭ ئاستىدا بولۇپ، ئۇنىڭ يېقىن ئۇچى تىرناق ئاساسى دەپ ئاتىلىدۇ، بۇ تىرناق ئۆسۈش ئورنىدۇر. تىرناق كۈنىگە تەخمىنەن $0.1mm$ ئۆسىدۇ.

ئىككىنچى باب تېرە فىزىئولوگىيىسى

تېرە ئادەمنىڭ ئەڭ چوڭ ئەزاسى بولۇپ، پۈتۈن بەدەننىڭ فۇنكسىيەلىك پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىپ، ئىچكى ۋە تاشقى مۇھىت تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلايدۇ. تېرىنىڭ مۇھىم فىزىئولوگىيەلىك فۇنكسىيىسى تۆۋەندىكىدەك:

1. توساقلىق رولى

تېرە تەبىئىي توساق بولۇپ، بەدەننى ئاسراش رولىغا ئىگە، تېرە يۇمشاق ئېلاستىك تارتىمىغا چىداشلىق ۋە يېپىنچىلىق ئالاھىدىلىكىگە ئىگە بولغانلىقتىن، بەدەننىڭ مېخانىكىلىق تەسىردىن زەخمىلىنىشىنى پەسەيتىدۇ. تېرە يۈزىدىكى تېرە يېغى تېرىنى سىلىقلاش رولىنى ئوينايدۇ، ئۇنىڭ پارچىلىنىشىدىن ھاسىل بولغان ئەركىن ياغ كىسلاتاسى مەك-نەپشە نۇرىنىڭ ئورگانىزمنى زەخمىلەندۈرۈشىدىن ئۇنۇملۇك مۇداپىئە قىلىدۇ. ساغلام تېرە - ئاجىز كىسلاتا، ئىمتىقار ۋە سۇنىڭ ئۆتۈشىگە نىسبەتەن بەلگىلىك توساقلىق رولىنى ئوينايدۇ.

2. بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەش رولى

تېرە - بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەش مەركىزىنىڭ كونتروللىقىدا چېچىلىش، كونۇبىكىسىيە، پارلاندۇرۇش، ئۆتكۈزۈش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئىسسىقلىق تارقىتىدۇ ياكى تېمپېراتۇرىنى ساقلايدۇ. بولۇپمۇ چېچىلىش تېرىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەشتىكى مۇھىم شەكىلدۇر.

3. ئاجراتقىلارنى چىقىرىش رولى

كىچىك تەر بەزىلىرى تەر ئاجرىتىپ چىقىرىش رولى ئارقىلىق بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەيدۇ، شۇنداقلا بىر قىسىم ماددا ئالماشتىرىش مەھسۇلاتلىرىنى سىرتقا چىقىرىدۇ. تېرە ياغ بېزى ئاجرىتىپ چىقارغان تېرە يېغى چاچنى سىلىقلايدۇ ۋە تېرىنى ئاسرايدۇ.

4. شۈمۈرۈش رولى

مۇكەممەل تېرىنىڭ مەلۇم خىمىيىۋى ماددىلارنى شۈمۈرۈش رولى روشەن بولمايدۇ. ئەمما يۇمران نېپىز ۋە نەملەنگەن تېرىدىن نىسبەتەن ئاسان ئۆتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا دورىنىڭ قۇرۇلمىسى بىلەن خاراكتېرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ تېرىدىن ئۆتۈپ شۈمۈرۈلۈشىمۇ ئوخشىمايدۇ. مەسىلەن: ياقىسىمان ماددىلار ۋە ياغدا ئېرىيدىغان ماددىلار (ئېنىم مېتاسىلار ۋە ئۇنىڭ تۈزلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) ۋە كورتمكۇستروئىدلىق ھور-مۇن قاتارلىقلار ئاسانراق شۈمۈرۈلىدۇ، فاتىرىي، كالىي، سىنىك ئىئونلىرى تېرىدىن ئۆتىدۇ، سۇ ۋە سۇدا ئېرىيدىغان ماددىلارنىڭ شۈمۈرۈلۈشى ناچارراق بولىدۇ. تېرىنىڭ بۇ خىل رولى بەدەن ساغلاملىقىنى قامداش ۋە دورا تاللاشتا ئىنتايىن مۇھىم.

5. سېزىش رولى

سىرتقى مۇھىتنىڭ تېرىگە بولغان ھەر خىل غىدىقلاشلىرى ئوخشىمىغان رېتسېپتور ۋە ھەر قايسى نېرۋا ئۇچلىرى ئارقىلىق مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا يەتكۈزۈلۈپ، چوڭ

مېڭە پوستلاق قەۋىتىدە تېمپېراتۇرا، تېڭىش، ئاغرىش قاتارلىق سەزگۈلەرنى بەرپا قىلىپ، ئادىن چىققۇچى نېرۋىلار ھەر خىل رېئاكسىيەلەرنى پەيدا قىلىدۇ. قىچىشىش نېرۋا ئار- قىماق يەتكۈزۈلۈشى ۋە ئۇنىڭ پەيدا بولۇش مېخانىزمى تېخى ھازىرغىچە تولۇق ئېنىقلان- مىدى، ئەمما قىچىشىشنىڭ چوڭ مېڭە پوستلاق قەۋىتىنىڭ كونترول قىلىشىغا ئۇچرايدىغانلىق قىمىنى ئەمەلىيەت ئىسپاتلىدى، كلىنىكىلىق داۋالاشتا بۇ نۇقتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

6. ماددا ئالماشتۇرۇش رولى

تېرىدە سۇ، ئېلېكترولىتلار، ئاقسىل، شېكەر ۋە ياغلار بولۇپ، ئۇلار ماددا ئالماشتۇرۇشقا قاتنىشىدۇ. تېرىدىكى سۈتەركىيى ياغدىن كېيىنلا تۇرىدۇ (بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ 20% ~ 18 نى ئىگىلەيدۇ). بۇ، تېرىنىڭ ئىچكى مۇھىتىنى ساقلاشتا ۋە بەدەن- دىكى سۇنىڭ ئالماشتۇرۇش تەڭشەشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ. تېرىدىكى ئېلېمېنتلار تېرىنىڭ فىزىئولوگىيەسىنى تەڭشەشتە ۋە بەزى فىرمېنتلارنى جانلاندۇرۇشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە، گۈڭگۈرت مۇڭگۈز ماددا ئاقسىلى تۈزۈلۈشىنىڭ مۇھىم تەركىبى قىسمى، تېرىنىڭ تەر- كىمىدىكى تالالىق ئاقسىل، غەيرىي تالالىق ئاقسىل ۋە شارچە ئاقسىل قاتارلىق 3 خىل ماددا يۈزە تېرە ھۈجەيرىلىرى بىلەن فىرمېنتنىڭ مۇھىم تەركىبىدۇر. تېرىدىكى قەنت- لەر ئاساسلىق ھۈجەيرە ماددا ئالماشتۇرۇش ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدۇ ھەم ھۈجەيرە- نىڭ تەركىبىي قىسمى بولىدۇ. مۇكوپولىسا كىسسىلەردىن بىرى گۈچى توقۇلما ئاساس ماددىسىنى تۈزگۈچى ماددىدۇر؛ قەنت يۈزە تېرىدە سۈت كىسلاتاسىغا پارچىلىنىپ، تېرە سىرتقى يۈ- زىنىڭ كىسلاتالىقلىقىنى ساقلاشتا بەلگىلىك رول ئوينايدۇ. ياغ ئاساسلىق تېرە ئاستى تو- قۇلىملىرىغا تارقىلىپ، ئېنېرگىيەنى ساقلايدۇ ۋە بەدەننى ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدۇ. ياغسىمان ماددىلار ھۈجەيرىنىڭ زۆرۈر تەركىبى؛ تېرىدىكى تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى مەلۇم زامبۇرۇغلارنى تورمۇزلايدۇ؛ 7- دېھىدروخولېستېرول ئۇلترا بىنەپشە نۇرىنىڭ چۈشۈشى بىلەن ۋىتامىن D₃ گە ئايلىنىدۇ.

ئۈچىنچى باب تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ سىمپتوماتولوگىيەسى ۋە دىئاگنوستىكىسى

18. تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئالامەتلىرى

ھەر خىل تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ گەرچە ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكى بولسىمۇ، ئەمما ئوخشىمىغان تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشايدىغان بەزى ئورتاق ئى- پادىلىرى بولىدۇ. شۇڭلاشقا تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئاساسلىق كلىنىك ئىپادىلىرىنى ئىگى- لەش تېرە كېسەللىكىگە دىئاگنوز قويۇش، داۋالاش ۋە ئۇنى تەتقىق قىلىشنىڭ مۇھىم ئاساسىدۇر. تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ كىسەللىك ئالامەتلىرى ئادەتتە ھېسسىي ئالامەتلەر ۋە غەيرىي ھېسسىي ئالامەتلەرگە بۆلۈنىدۇ:


1. ھېسسىي ئالامەتلەر

بۇ كېسەل سۈبىيىكتىپ ھېس قىلغان ئالامەتلەرنى كۆرسىتىدۇ. قىچىشىش ئەڭ ئومۇم لاشتان سۈبىيىكتىپ ئالامەت بولۇپ، ئۇنىڭ دەرىجىسى يەككە تەننىڭ چىدامچانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئوخشاش بىر كېسەللىكتە بەزى ئاغرىقلارنىڭ سېزىمى يەڭگىل، بەزىلىرىنىڭ چىدىغۇسىز بولىدۇ. ئەمما كېسەلنىڭ سۈبىيىكتىپ رولىنى جارى قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىش، مۇۋاپىق داۋالاش، ناچارغىدىن قىلىنىشتىن ساقلىنىش ئارقىلىق قىچىشىشنى توختات قىلى بولىدۇ. ئاغرىش، كۆيگەندەك بولۇش، جىددىيلىشىش، قۇرغاقلىشىش، روھىي جەھەتتە سۆزلىشىش، ئۇيۇشۇش قاتارلىق نورمالسىز سېزىملارمۇ پەيدا بولىدۇ، ئەمما قىچىشىش قارقارىغاندا ئاز ئۇچرايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا بەزى تېرە كېسەللىكلىرىدە توكۇپ تىترەش، قىزىش ۋە باشقا بەزى پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلەر قوشۇلۇپمۇ كېلىدۇ.

2. غەيرىي ھېسسىي ئالامەتلەر

بۇ تېرە، شىللىق پەردىدىكى غەيرىي نورمال ئىپادىلەر ۋە كۆرۈش، تۇتۇش ياكى باشقا تەكشۈرۈشلەر ئارقىلىق ئېرىشكەن بەدەن بەلگىلىرى بولۇپ، ئادەتتە زەخىملىنىش ياكى تېرە ئەسۋىسى دەپ ئاتىلىدۇ. بىرلەمچى ۋە ئىككىمچى دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ.

1. بىرلەمچى زەخىملىنىش: بۇ تېرە كېسەللىكىدىكى پاتولوگىيىلىك ئۆزگىرىشلەر بىۋاسىتە پەيدا قىلىدىغان ئىپادىلەر ئىكەنلىكى تېرە ئەسۋىسى بولۇپ، تېرە كېسەللىكىگە دىئاگنوز قويۇشتىكى مۇھىم ئاساستۇر. كۆپ ئۇچرايدىغانلىرى تۆۋەندىكى بىرلەمچى خىلدىن ئىبارەت (1، 3-رەسىم).



سۇلۇق بۇۋەكچە (يۈزە تېرە ئىچىدە) سۇلۇق بۇۋەكچە (يۈزە تېرە ئاستىدا)

1 (داغلىق ئەسۋە): تېرەدە ئومۇمىي يىمىش ۋە ئويما ئىلىشىش بولماي پەقەت يەرىلىك ئورۇنداردا ئۆزگىرىشلەر بولىدۇ. بۇنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى، رەڭگى ۋە شەكلى ئوخشىمايدۇ. تېرىگە قان تولىشىدىن كېلىپ چىققانلىرى قىزىل داغ دېيىلىپ، باسقاندا رەڭگى ئۆزگىرىدۇ، تېرە ئىچى قاناشتىن كېلىپ چىققانلىرى بېغىرەڭ بولىدۇ. باسقاندا رەڭگى ئۆزگەرمەيدۇ. چوڭلىرى قان قېيىش دېيىلىپ، كىچىكلىرى قان قېيىش توچكىسى دېيىلىدۇ. پېگمېنت كۆپىيىپ ياكى ئازىيىپ كەتكەنلەر ئايرىم-ئايرىم ھالدا پېگمېنت چۆكمە دېيىلىدۇ ۋە پېگمېنت ئازىيىش دېيىلىدۇ دەپ ئاتىلىدۇ.

3. 1-رەسىم. تېرە بىرلەمچى زەخىملىنىشنىڭ مودېلى

پېگمېنت كۆپىيىپ ياكى ئازىيىپ كەتكەنلەر ئايرىم-ئايرىم ھالدا پېگمېنت چۆكمە دېيىلىدۇ ۋە پېگمېنت ئازىيىش دېيىلىدۇ دەپ ئاتىلىدۇ.

(2) دۆڭچە ئەسۋە: يۈزە تېرە بىلەن ھەقىقىي تېرەنىڭ يۈزە قەۋىتىدىكى پاتولوگىيىلىك ئۆزگىرىشتىن ئىبارەت بولۇپ، ئادەتتە كىلىنىكىدا دىئامېتىرى 0.5cm دىن كىچىك بولغان ئۇ-يۇل دۆڭچە ھاسىل بولىدۇ. شەكلى، رەڭگى ۋە چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمايدۇ. كۆپىنچە ياللۇغ رېئاكسىيىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(3) تۈگۈنچە: ھەقىقىي تېرە ياكى تېرە ئاستىنىڭ ئۇيۇل زەخمىلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، تېرە يۈزىدىن كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدۇ ياكى تېرە ئاستىغا يوشۇرۇنغان بولىدۇ. دىئامېتىرى ئادەتتە 0.5cm دىن يۇقىرى بولۇپ، رەڭگى كېسەل تۈرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ. تۇتسا ئىنقىلىتلىرى ئاستىمىلەنگەن سېزىمنى بېرىدۇ. ھۈجەيرەلەرنىڭ ئىنقىلىتلىرى ئاستىمىلەنىشىدە ياكى ئۆسۈش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ.

(4) سۇلۇق قاپارتقۇ ۋە چوڭ قاپارتقۇ: بۇ مۇڭگۈز قەۋەت ئاستى، يۈزە تېرە ئىچى ياكى يۈزە تېرە ئاستىنىڭ كاۋاكلىق زەخمىلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئىچىدە سۇيۇقلۇق بولىدۇ. كۆپىنچىلىرىنىڭ سىرتقى يۈزى تۈمۈرىدۇ. دىئامېتىرى 0.5cm ئىچىدىكىلىرى سۇلۇق قاپارتقۇ، 0.5cm دىن چوڭ بولغانلىرى چوڭ قاپارتقۇ دېيىلىدۇ. كۆپىنچە ياللۇغ رېئاكسىيىچان كېسەللىكلەردە كۆرۈلىدۇ.

(5) يىرىڭلىق قاپارتقۇ: بىر لەمچىمۇ بولىدۇ، سۇلۇق قاپارتقۇدىن كېيىن ئىككىلەمچىمۇ پەيدا بولىدۇ. ئىچىدە يىرىڭ بولۇپ، ئەتراپى قىزىرىدۇ. كۆپىنچە يۇقۇملانغانلىق كېسەللىكلەردە كۆرۈلىدۇ.

(6) يەلتاشما: بۇ ھەقىقىي تېرە يۈزە قەۋىتىنىڭ قان تومۇرلىرى كېڭىيىش ۋە سىرىغىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ۋاقىتلىق سۇلۇق ئىششىق پۇلتا يىمىسىدىن ئىبارەت. رەڭگى ھالەت ياكى تاتارغان رەڭدە بولىدۇ. چوڭ - كىچىكلىكى ۋە شەكلى ئوخشاش بولمايدۇ، تاشما جىددىي يۈز بېرىپ بىر كۈن ئىچىدىلا يانمىدۇ. شىددەتلىك قىچىشىدۇ، كۆپىنچىلىرىنى ھالەت ئۆزگىرىش رېئاكسىيىسى پەيدا قىلىدۇ.

يۇقىرىدا سۆزلەنگەن بەزى زەخمىلىنىشلەر يەنى داغلىق ئەسۋە بىلەن دۆڭچە ئەسۋە، دۆڭچە ئەسۋە بىلەن سۇلۇق قاپارتقۇ ئۆزگىرىش جەريانىدا ئارىلاشۇپ چۈشۈپ بولىدۇ. مۇنداق ئەھۋالدا ئايرىم - ئايرىم ھالدا داغلىق دۆڭچە ئەسۋە ۋە دۆڭچە قاپارتقۇلۇق ئەسۋە دەپ ئاتىلىدۇ.

2. ئىككىلەمچى زەخمىلىنىش: بىر لەمچى تېرە ئەسۋەلىرىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن ياكى داۋالاش نەتىجىسىدىن ۋە مېخانىكىلىق زەخمىلەندۈرۈشىدىن كېلىپ چىققانلىرى مۇشۇ تۈردىكى تېرە ئەسۋەسىگە مەنسۇپ بولىدۇ (2، 3 - رەسىم).

(1) تەڭگە قاسراق: بۇ تۆكۈلگەن مۇڭگۈز ماددا قەۋەت ھۈجەيرىسىدىن ئىبارەت. پاتولوگىيىلىك ئەھۋال ئاستىدا مۇڭگۈزلىشىش نورمالسىزلىققا ئايلىنىپ، تەڭگە قاسراق كۆپىيىدۇ. ئۇنىڭ شەكلى، چوڭ - كىچىكلىكى ۋە قېلىن - ئېچىزلىكى ئوخشاش بولمايدۇ. كۆپىنچە قىزىل داغ، دۆڭچە ئەسۋە ياكى سۇلۇق قاپارتقۇلارنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بارلىققا كېلىدۇ.

(2) شەلۋەرەش: بۇ يۈزە تېرىنىڭ چەكلىك كەمچىللىك بولۇپ، كېسەللىك ئۆزگىرىشى نېگىز قەۋەتتىن يۇقىرىدا يۈز بېرىپ ساقايىغاندىن كېيىن تاتۇق قالىدۇ. كۆپىنچە يۈزە سۇلۇق قاپارتقۇنىڭ ئۆزگىرىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

(3) يارا: تېرىدىكى زەخمىلىنىش چوڭ قۇرلۇقى ھەقىقىي تېرىدىن تۆۋەنرەك بولسا يارا دېيىلىدۇ. ئۇنىڭ شەكلى ۋە چوڭقۇر-تېپىزلىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشىنىڭ خاراكتېرىگە ئاساسەن ئوخشاش بولمايدۇ. كېسەللىك ئۆزگىرىشى ھەقىقىي تېرىنى زەخمىلەندۈرگەنلىكتىن ساقايغاندىن كېيىن تاتۇق بولۇپ قالمايدۇ. كۆپىنچە تۈگۈنچە، نېكروزلىنىش ياكى شەلۋەرەش قاتارلىق كېسەللىك ئۆزگىرىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

(4) قاچ: تېرى زەخمىلەنگەن ئورۇندىكى شىرلىك سۇيۇقلۇق، يىمىرىك ياكى قان ۋە توقۇلما پارچىلىرى قۇرۇپ قېتىشىدىن ھاسىل بولغان زەخمىلىنىش بولۇپ،


كېسەللەنگەن ئورۇنغا چاپلىشىپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭ رەڭگى، قېلىن - تېپىزلىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشىنىڭ خاراكتېرىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. قانلىق قاچ، قان زەردا پىلىق قاچ، يىمىرىكلىق قاچ ۋە ئارىلاشما قاچ قاتارلىقلارغا بۆلۈنىدۇ.

(5) تىرناق ئىزى: تاتىلاش ياكى سۈركىلىشتىن كېلىپ چىققان ھەقىقىي تېرى يۈزەقە-ۋىتىدىن يۇقىرىسىنىڭ زەخمىلىنىشىدىن ئىبارەت. بۇ ئادەتتە يىمىرىك بولىدۇ. ھەقىقىي تېرى زەخمىلەنگۈچىلەرنىڭ سىرتقى يۈزى يىمىرىك بولغان قانلىق قانچىلىنىدۇ.

(6) تېرى يېرىلىش: تېرى سىزىقچىلىرىنى بويلاپ ھاسىل بولغان كېسىك ئېغىزغا ئوخشاش يېرىقلاردىن ئىبارەت. بۇ يۈزە تېرىدە ياكى چوڭقۇرلىشىپ ھەقىقىي تېرىدە چەكلىنىدۇ. تېرىنىڭ قۇرغاقلىشىشى ۋە ئېلاستىكىلىقىنىڭ تۆۋەنلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا كۆپىنچە تېرى تارتىشقا ئىدا يۈز بېرىدۇ. بوغۇم، ئالقان، تاپان، جاۋغاي قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

(7) تېرىنىڭ يېگىلىشى: يۈزە تېرىنىڭ ياكى يۈزە تېرى بىلەن ھەقىقىي تېرىنىڭ يېگىلىش كېسەللىك ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت بولۇپ تېرى ئېچىزلاش، سىرتقى يۈزى سىلىقلىنىش ھەم سەل ئولتۇرۇش، قۇرغاقلىشىپ ئاسان قورۇق كىرىش، بەزىدە تېرىنىڭ نورمال سىزىقچىلىرى يوقىلىش، كېسەللەنگەن ئورۇندىكى تېرى قوشۇمچە ئەزالىرىمۇ تەسىرگە ئۇچراش قاتارلىق ئالاھىدىلىككە ئىگە.

(8) تاتۇق: يارا ياكى ھەقىقىي تېرى ئاستى توقۇلما كەمتۈكلۈكىنى يېڭى ئۆسكەن بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلارنىڭ تولدۇرۇشىدىن تاتۇق كېلىپ چىقىدۇ. كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ نورمال توقۇلما تۈزۈلۈشى پۈتۈنلەي يوقىلىدۇ. تاتۇق — ئاتروپىيىلىك ۋە ئۆسۈش خاراكتېرلىك ئىككى خىل بولىدۇ.



3. 2 - رەسىم. تېرى ئىككىلىمە ھېچ زەخمىلىنىشنىڭ مودېلى

كېسەللەنگەن ئورۇنغا چاپلىشىپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭ رەڭگى، قېلىن - تېپىزلىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشىنىڭ خاراكتېرىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. قانلىق قاچ، قان زەردا پىلىق قاچ، يىمىرىكلىق قاچ ۋە ئارىلاشما قاچ قاتارلىقلارغا بۆلۈنىدۇ.

(5) تىرناق ئىزى: تاتىلاش ياكى سۈركىلىشتىن كېلىپ چىققان ھەقىقىي تېرى يۈزەقە-ۋىتىدىن يۇقىرىسىنىڭ زەخمىلىنىشىدىن ئىبارەت. بۇ ئادەتتە يىمىرىك بولىدۇ. ھەقىقىي تېرى زەخمىلەنگۈچىلەرنىڭ سىرتقى يۈزى يىمىرىك بولغان قانلىق قانچىلىنىدۇ.

(6) تېرى يېرىلىش: تېرى سىزىقچىلىرىنى بويلاپ ھاسىل بولغان كېسىك ئېغىزغا ئوخشاش يېرىقلاردىن ئىبارەت. بۇ يۈزە تېرىدە ياكى چوڭقۇرلىشىپ ھەقىقىي تېرىدە چەكلىنىدۇ. تېرىنىڭ قۇرغاقلىشىشى ۋە ئېلاستىكىلىقىنىڭ تۆۋەنلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا كۆپىنچە تېرى تارتىشقا ئىدا يۈز بېرىدۇ. بوغۇم، ئالقان، تاپان، جاۋغاي قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

(7) تېرىنىڭ يېگىلىشى: يۈزە تېرىنىڭ ياكى يۈزە تېرى بىلەن ھەقىقىي تېرىنىڭ يېگىلىش كېسەللىك ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت بولۇپ تېرى ئېچىزلاش، سىرتقى يۈزى سىلىقلىنىش ھەم سەل ئولتۇرۇش، قۇرغاقلىشىپ ئاسان قورۇق كىرىش، بەزىدە تېرىنىڭ نورمال سىزىقچىلىرى يوقىلىش، كېسەللەنگەن ئورۇندىكى تېرى قوشۇمچە ئەزالىرىمۇ تەسىرگە ئۇچراش قاتارلىق ئالاھىدىلىككە ئىگە.

(8) تاتۇق: يارا ياكى ھەقىقىي تېرى ئاستى توقۇلما كەمتۈكلۈكىنى يېڭى ئۆسكەن بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلارنىڭ تولدۇرۇشىدىن تاتۇق كېلىپ چىقىدۇ. كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ نورمال توقۇلما تۈزۈلۈشى پۈتۈنلەي يوقىلىدۇ. تاتۇق — ئاتروپىيىلىك ۋە ئۆسۈش خاراكتېرلىك ئىككى خىل بولىدۇ.

9) لەشايىسىمان ئۆزگىرىش: سوزۇلما تېرە ياللىۋى ياكى مېخانىكىلىق تەسىرنىڭ ئۇ-
زۇن مۇددەت غىدىقلىشىدىن تېرە قېلىنلايدۇ، تېرە قىرى ئېگىز لەپ، تېرە ئېرىقچىسى چوڭ-
قۇرلايدۇ، سىرتقى يۈزى يىرىكىلىشىپ چەمدەك بولۇپ قالىدۇ، بۇ لەشايىسىمان ئۆزگىرىش
ياكى لەشايلىشىش دەپ ئاتىلىدۇ. كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ يېڭىلىنىشى قېنىقلىشىدۇ ياكى سۇس-
لىشىدۇ ھەمدە ئازراق تەڭگە قاسراق بولىدۇ.

28. تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ دىئاگنوزى

تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ دىئاگنوزى—ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش خىزمىتىنىڭ ئاساس-
سىدۇر. كېسەل تارىخىنى سوراڭ، بەدەن تەكشۈرۈش ۋە مەلۇم لابوراتورىيىلىك تەك-
شۈرۈشلەرگە ئاساسلىنىپ قولغا كەلتۈرۈلگەن ماتېرىياللارنى ئانالىز قىلىش ئارقىلىق توغ-
را دىئاگنوز قويۇلىدۇ. ئۇسۇللىرى ۋە باسقۇچلىرى تۆۋەندىكىدەك:

1. كېسەل تارىخى

كېسەل تارىخىنى سوراڭ ئۇسۇلى ئىچكى كېسەللىكلەرگە ئوخشاش. مۇكەممەل كې-
سەل تارىخى ئادەتتىكى تۈرلەر، كېسەلنىڭ ئاساسلىق زارى، ھازىرقى ۋە بۇرۇنقى كېسەل تارىخى،
شەخسىي تارىخى ۋە جەمەت تارىخى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تېرە ئەسۋىسىنىڭ
يۈز بېرىشى پۈتۈن بەدەننىڭ كېسەللىكىنىڭ تېرىدىكى ئىپادىلىنىشى ئىكەنلىكىنى دائىم
ئەستە تۇتۇپ، تېرە ئەسۋىسى بىلەن پۈتۈن بەدەن ئەھۋالىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئەتراپلىق،
ئەستايىدىل سوراپ تەكشۈرۈشكە دىققەت قىلىش لازىم. كېسەللىك پەيدا بولغان ۋاقىتىنى،
تېرە ئەسۋىسىنىڭ تەركىبىنى ۋە ئورنىنى، ئەسۋىنىڭ يۈز بېرىش جەريانى ۋە ئۇنىڭ
داۋالاش بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى مەقسەتلىك سوراڭ لازىم. دورا ئىشچىلىق،
ئۇچرىشىش، يۇقۇلمىنىش، يېمەك-ئىچمەك ۋە ئەتراپتىكى ھەم ئائىلىدىكىلەرنىڭ كېسەل
بولۇش ئەھۋالى قاتارلىق گۇمانلىق ئامىللارنى تەكشۈرۈپ تېپىپ چىقىش لازىم.
مۇكەممەل، ئويىچىكىپ كېسەل تارىخى تېرە كېسەللىكىگە دىئاگنوز قويۇشتا ئىنتايىن
مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

2. بەدەن تەكشۈرۈش

بەدەن تەكشۈرۈش — سىستېمىلىق تەكشۈرۈش بىلەن تېرە بۆلۈم تەكشۈرۈشنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ. ئالدىنقىسى ئىچكى كېسەللىكلەرنىڭكىگە ئوخشاش. تېرە ئەسۋىسىنى تەك-
شۈرگەندە يورۇقلۇق يېتەرلىك بولۇشى، قالدۇرۇپ قويماي، تېرىنى تولۇق ئېچىپ تەكشۈ-
رۇش، زۆرۈر تېپىلغاندا چوڭايتىش ئەينىسى ئىشلىتىش لازىم. تەكشۈرگەندە تۆۋەندىكى نۇقتا-
تىلارغا دىققەت قىلىنىدۇ:

1. تۈرلىرى: بىرلەمچى ياكى ئىككىلەمچى، بىر خىل ياكى كۆپ شەكىللىك ئىكەنلىك-
كىگە دىققەت قىلىش لازىم. ئەگەر بىر ۋاقىتتا ئىككى خىلدىن كۆپرەك بىرلەمچى تېرە
ئەسۋىسى مەۋجۇت بولسا، كۆپ شەكىللىك زەخمىلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ.

2. شەكىل ھالىتى: ئەگەر دۆڭچە ئەسۋە بولسا، يۇمىلاق، يېرىم يۇمىلاق، كونۇس شەكىللىك، كىندىك ئويىمىنى شەكىللىك ياكى كۆپ بۇلۇڭلۇق بولىدۇ. سىرتقى يۈزىنىڭ سىلىق ۋە يىرىكىلىكى، ئۆسۈش ياكى يىمىگەلىش، قۇرغاق ياكى نەم، زىيا دەمۈڭگۈزلىشىش بار - يوقلۇقى قاتارلىقلارغا دىققەت قىلىنىدۇ.

3. رەڭگى: قېنىق بېغىررەڭ، قەھۋە رەڭ دەپ ھەر خىل نەرسىلەرنىڭ رەڭگى بىلەن سېلىشتۇرۇلىدۇ.

4. چوڭ - كىچىكلىكى: مەلۇم نەرسىلەرگە سېلىشتۇرۇلىدۇ ياكى cm ئۆلچەم قىلىنىدۇ.

5. گىرۋىكى: رەتلىك ياكى رەتسىز، ئېنىق ياكى ئېشىقسىز، خەرىتىسىمان، بۇدۇر، سىزىقسىمان دېگەندەك شەكىللەر بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

6. ئورنى: ئوچۇق، يېپىق، يۈكۈلىدىغان ياكى سوزۇلىدىغان تەرەپ، تېرە، شاسلىق پەردە ياكى ئۇلارنىڭ چېگرىسىدا دېگەندەك شۆزلەر بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. بۇ كېسەل سەۋەبىنى ئانالىز قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم. خاتىرىلەنگەندە ئۇنىڭ ئاناتومىيىلىك ئورنىغا ئاساسەن تەسۋىرلىنىدۇ.

7. تارقىلىشى: چەكلىك ياكى پۈتۈن بەدەنلىك، سىممېتىرىك ياكى بىر تەرەپلىك، توپ - توپ ياكى تارقاق بولىدۇ.

8. ئورۇنلىشىشى: بەلباغسىمان، تاسسىسىمان، تەسۋىسىمان ئورۇنلىشىدۇ. نېرۋايا - كى قان تومۇرلارنى بويلاپ ئورۇنلىشىشىنىڭ بار - يوقلۇقى كۆزىتىلىدۇ.

9. نېگىزى: كەڭ ياكى تار، ساقاقتا ئوخشاشمۇ - ئەمەس. ئەگەر يارابولسا تېگىنىڭ ئەھۋالى كونكرېتنى بايان قىلىنىدۇ.

10. تۇتۇپ تەكشۈرۈش: ئاساسلىق دائىرىسى، چوڭقۇرلۇقى، قاتتىقلىقى، ھەرىكىتى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك سىزىم قاتارلىقلار كۆزىتىلىدۇ.

3. مۇناسىۋەتلىك تېرە سىناقلىرى

1. چاپلاش سىنىمى: ئۇچرىشىش خاراكتېرىلىك تېرە يالا - ۇغى بىلەن تېرە كەسىپى كېسەللىكلىرىنىڭ سەۋەبىگە دىئاگنوز قويۇشتا ئىشلىتىلىدۇ. ئالدى بىلەن سىناق قىلىنغۇچى ماددىنى سۇيۇلدۇرغۇچى بىلەن مۇۋاپىق قويۇقلۇقتا سۇيۇلدۇرۇپ، بۇنىڭغا $1cm^2$ چوڭلۇقتىكى تۆت قەۋەت داكنىنى چاپلاپ، سول بىلەكنىڭ ئىچكى تەرىپى ياكى كەينى تەرىپىدىكى ئەسۋە يوق ئورۇنغا چاپلاپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە $1.5cm^2$ كەڭلىكتىكى ئېپىز سۇ - لياۋپەردە ياكى ماي قەغەز يېپىلىپ، تۆت ئەتراپى پلاستىر بىلەن مۇقىملاشتۇرۇلىدۇ. سىناق قىلىنغۇچى ماددا چاڭ - توزان بولسا ئاڭدا بىلەن ئەملەنگەن داكنىغا چېچىپ چاپلىنىدۇ، ئەگەر قاتتىق ماددا بولسا ئالدى بىلەن سۇدا ئېرىتىپ ياكى سوقۇپ ئاندىن يۇقىرىدىكى ئۇسۇل بويىچە ئىشلىتىلىدۇ. پەي ياكى ئىلما توقۇلما بۇيۇملار بولسا، شۇ نەرسىلەرنىڭ ئۆزىنى سىناق قىلىدىغان ئورۇنغا چاپلاپ، يېپىپ قويۇلىدۇ. ئادەتتە 48 ~ 24 سائەت ئۆت كەندىن كېيىن نەتىجىسى كۆزىتىلىدۇ، ناۋادا يەرىلىك ئورۇندا رېئاكسىيە بولسا، سىناق قىلىنغان ماددىنى دەرھال ئېلىۋېتىپ، پاكىز سۇ بىلەن يۇيۇش لازىم. رېئاكسىيە

نەتىجىسى ئۇچرىشىش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى خەللىمەنلىك تەتقىقات گورۇپپىسىنىڭ خاتىرىلەش ئۆلچىمىگە ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك خاتىرىلەندى:

1+ (گۇمانلىق) پەقەت ئازراق قىزىرىدۇ.

2+ (ئاجىز مۇسپىي) قىزىل داغ، ئىنفېلىتراتسىيە بولىدۇ، دۆڭچە مېڭە قوشۇلىدۇ.

3+ (كۈچلۈك مۇسپىي) قىزىرىپ ئىششىيدۇ، دۆڭچە ئىسۋە، ئىنفېلىتراتسىيە، كىچىك سۇلۇق پۇۋەكچىلەر پەيدا بولىدۇ.

4+ (ئىنتايىن كۈچلۈك مۇسپىي) چوڭ قاپارتقۇ پەيدا بولىدۇ.

5- (مەنپىي) رېئاكسىيە بولمايدۇ.

تەجرىبە نەتىجىسى دىئاگنوز قويۇشتا پايدىلىنىدۇ. ئەمما ساختا مۇسپىي ۋە ساختا مەنپىي بولۇشتەك ئىنچىكەلىك بولغاچقا، چىقىرىۋېتىش لازىم.

بۇ ئۇسۇلدا بىر قېتىمىدا كۆپ خىل ماددىلارنى سىناق قىلغىلى بولىدۇ. يۇقىرىدىكى ئۇسۇل بويىچە ھەر خىل سىناق قىلىنىدىغان ماددىلارنى سىناق قىلىدىغان تېرىگە يۇقىرى-تۆۋەن، ئوڭ-سول تەرەپتىن ھەر قايسىسىنىڭ ئارىلىقىنى 5cm دىن قويۇپ رەتلىك چاپلاپ، خاتىرىلەنىدۇ، ھەمدە ئېرىتكۈچى بىلەن ئوڭ بىلەن كەكسەلىشتۈرۈپ تەجرىبە ئىشلىنىدۇ. كېسەللىك ئۆتكۈر ياكى ساقىيىش باسقۇچىدا تۇرغاندا، بۇ تەجرىبىنى ئىشلەشكە بولمايدۇ.

2. باشقا تەكشۈرۈشلەر: تېرە چىچىلىش كېسىلى، ئەينەك پارچىسى بىلەن بېسىپ تەكشۈرۈش، *Auspitz* ئالاھىتى قاتارلىقلارنى بەشمىچى، سەككىزىنچى ۋە ئون بەشمىچى بىلەن لاردىن كۆرۈڭ. توغرا دىئاگنوز قويۇش تەس بولغان كېسەللەردە تېرىدىن تىرىك توقۇلما ئېلىپ تەكشۈرۈلىدۇ.

4. باشقا كلىنىكىلىق تەكشۈرۈشلەر

ئۆپكە ياكى سۆڭەكنى رېنتگېندە تەكشۈرۈشنىڭ تېرە سىلى بىلەن سۆڭەك سېغىلىمىغا دىئاگنوز قويۇشتا بەلگىلىك ياردىمى بولىدۇ.

5. لابوراتورىيىلىك تەكشۈرۈشلەر

1. زامبۇرۇغلارنى بىۋاسىتە تەكشۈرۈش ئۇسۇلى: بۇنىڭ زامبۇرۇغدىن يۇقۇرلانغان كېسەللىككە دىئاگنوز قويۇشتا ياردىمى بولىدۇ. كېسەللەنگەن چاچ، قاقچ، زەخىملىككەن ئورۇننىڭ گېرۇمىدىن تەڭگە قاسراق ياكى كېسەللەنگەن تىرناق ئۇۋاقلىرى قاتارلىقلارنى ئېلىپ، ئۇلارنى ئايرىم - ئايرىم ھالدا سۇۋالما ئەينىكى ئۈستىگە قويۇپ، ئاندىن ئۇنىڭ ئۈستىگە 10% كالىي ھىدروكسىدنىڭ $1\sim 2$ تامچە قېمىتىپ، ئۇنىڭ ئۈستىنى يايقۇچى ئەينەك پلاستىكا بىلەن يېپىپ، ئىسپەرتچىراقنىڭ يالقۇنىدا مۇڭگۈز ماددا ئېرىپ تۈتەكلەشكە ئىگە قەدەر يېنىك قىزدۇرۇلىدۇ ھەمدە يايقۇچى ئەينەك پلاستىكا كىمى يېنىك بېسىپ ئارتۇق كالىي ھىدروكسىد ئېرىتمىسى پاختا بىلەن شۇمۇرۇۋېلىنىپ، مىكروسكوپتا تەكشۈرۈلىدۇ. ئالدى بىلەن تۆۋەن ھەسسىلىك ئەينەكتە تەكشۈرۈلىدۇ، ئاۋادا سېپورا ياكى زامبۇرۇغ يېپىچىلىرى بارلىقىدىن گۇمان بولسا، ئاندىن يۇقىرى

ھەسسىلىك ئەينەكتە تەكشۈرۈلۈپ ئىسپاتلىنىدۇ. ئەمما نەتىجىسى مەنپىي بولسىمۇ زامبۇرۇغ كېسەللىكىنىڭ ئېھتىمالىنى يوققا چىقىرىشقا بولمايدۇ.

2. باشقا مۇناسىۋەتلىك لابىراتورىيىلىك تەكشۈرۈشلەر: زۆرۈر تېپىلغاندا، قاننى بىئوخىمىيىلىك تەكشۈرۈش، يىرىك شارچىە باكتېرىيىسى، كىمىياتاغا قارشى تايانچە باكتېرىيە، سېفىلىس بۇرما تەنچىسى، قىچىشقا قارشىلىق سىناشچىسى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈش ۋە ئىمۇنونولوگىيىلىك تەكشۈرۈش قىلىنىدۇ.

تۆتىنچى باب تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش ئىلمى

18. تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپلىرى

بۇ بابتا پەقەت تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئادەتتىكى ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپلىرى تونۇشتۇرۇلدى، مۇناسىۋەتلىك كونكرېتنى ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى مەخسۇس قىلىنىپ سۆزلىنىدۇ.

1. ياخشى تازىلىق ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش

ياز كۈنى پات-پات يۇيۇنۇپ، كىيىم - كېچەكنى ۋاقىتىدا ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش؛ قىش پەسلىدە تېرىنىڭ نەملىكىگە دىققەت قىلىپ، تېرىنى ئاسراش، يوتقان - كۆرپىنى قەزلەشلىك ئاپتاپقا سېلىش لازىم. تېرىسى زىيادە مايلىشىپ تۇرغۇچىلار مۇۋاپىق يۇيۇنۇش، يۇيۇنغاندا سۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى بەك يۇقىرى بولۇپ كەتمەسلىكى ($38 \sim 40^{\circ}\text{C}$ ئەڭ مۇۋاپىق)، ئەڭ ياخشى نېپىترال سۇيۇن ئىشلىتىش لازىم، تېرىسى قۇرغاقلار زىيادە كۆپ يۇيۇنماسلىقى، بولۇپمۇ ئىشچىلىق سۇيۇنلارنى ئىشلەتمەسلىكى كېرەك. يۇقىرىدىكى تەدبىرلەر ئادەتتىكى تېرە كېسەللىكلىرى يۈز بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

2. تەنتەربىيىلىك چېنىقىشنى تەشەببۇس قىلىپ،

تەن ساغلاملىقىنى ئاشۇرۇش

پەسىل ۋە ئوبىيېكتىنىڭ ئوخشاشلىقىغا قاراپ تەنتەربىيىلىك چېنىقىش تۈرلىرى تاللىنىلىدۇ. مەسىلەن: ساغلاملىق گىمناستىكىسى، سۇۋۇزۇش، يۈگرەش، ئاپتاپقا مۇۋاپىق دەرىجىدە قاقلىنىش قاتارلىقلار ماددا ئالماشتۇرۇشنى ياخشىلاپ، بەدەن ساغلاملىقىنى ئاشۇرۇپ، تېرىنىڭ كېسەللىگە قارشى كۈچىنى ئاشۇرۇشقا پايدىلىق.

3. كېسەللىك سەۋەبىنى تېپىش ۋە ئۇنى يوقىتىش

تېرە كېسەللىكنىڭ كېسەللىك سەۋەبى نىسبەتەن مۇرەككەپ، مەسىلەن: ئالېرگىيىلىك تېرە كېسەللىكلىرى، تېرە كەسپىي كېسەللىكلىرى ۋە يۇقۇلمىلىق تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆز ئالدىغا كېسەل سەۋەبى بولىدۇ. شۇڭا بۇلارنى تەپسىلىي تەكشۈرۈش لازىم. پەقەت كېسەل سەۋەبىنى يوقا تىقاندىلا ئاندىن تۈپتىن داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدۇ.

4. ئاكتىپ داۋالاپ، ھەر خىل ناچار غىدىقلىنىشتىن ساقلىنىش

بەزى تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ كېسەل سەۋەبى گەرچە ۋاقىتلىق تېپىلمىسىمۇ، ئاكتىپ داۋالاپ، تاتىلاش ۋە قىزىق سۇدا يۇيۇنۇشتىن، لازا، بېلىق، راي ۋە ھاراق قاتارلىق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىشىمۇ، داۋالاش ئۇنۈمىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. ناۋادا داۋالاش كېچىكتۈرۈلسە ياكى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىنمىسا، تەكرار قوزغىلىپ سوزۇلمىغا ئۆزگىرىپ داۋالاش تېخىمۇ قىيىنلىشىدۇ.

5. ئىزولاتسىيە خىزمىتىنى ئەستايىدىل ياخشى ئىشلەش

يۇقۇملۇق تېرە كېسەللىكلەردىن يىرىلماق قاپارتقۇ، دانىخورەك، ماخاۋ قاتارلىقلارنىڭ باشقىلارغا يۇقۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئىزولاتسىيە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش لازىم.

28. تېرە كېسەللىكلىرىنى داۋالاش

بۇ بابتا تېرە كېسەللىكلىرىگە مۇناسىۋەتلىك ئىچىدىن ۋە سىرتىدىن ئىشلىتىدىغان دورىلار بىلەن داۋالاش، فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى ۋە تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئاساسلىق پەرۋىشى تونۇشتۇرۇلىدۇ.

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى

بۇ دورىلارنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ، ئىچكى بۆلۈمدە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارغا ئاساسەن ئوخشايدۇ. تېرە كېسەللىكىدە دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى تۆۋەندىكىچە:

1. ياللۇغقا قارشى ۋاستىچى ماددىلىق دورىلار: كۆپلىگەن ئالېرگىيىلىك تېرە كېسەللىكلىرى قوزغالغاندا، ۋاستىچى ماددا جانلىنىپ ياكى قويۇپ بېرىلىپ، توقۇلمىلارنى زەخمىلەپ، ياللۇغ پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل تەسىرگە ئىگە ۋاستىچى ماددا ياللۇغ ۋاستىچى ماددىسى دېيىلىدۇ. ياللۇغ ۋاستىچى ماددىسىغا قارشى تۇرۇپ، ئۇنى تەڭشەپ داۋالاش رولىنى ئۆتەيدىغان ھەرقانداق دورىلار ياللۇغ ۋاستىچى ماددىسىغا قارشى دورىلار دەپ ئاتىلىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى تۆۋەندىكىدەك نەچچە خىل بولىدۇ:
(1) ھىستامىنغا قارشى دورىلار: بۇ دورىلار ھىستامىن بىلەن ھىستامىن ئاكسېپتورلىرى

تالاشىپ، ھىستامىننى مۇناسىپ ئاكسىپېتور بىلەن بىرىكتۈرمەي ئۇنىڭ رولىنى يوقىتىپ، داۋالاش ئۈنۈمىگە ئېرىشىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغان ياسالما مىللىرى تۆۋەندىكىچە:

دېفېنھىدرا مىن (*benadryl*): تېرە كېسەللىكىدە دائىم ئىشلىتىلىدىغان دورا بولۇپ، ئامىنو ئېتىل ھىدروكاربون تۈرىگە كىرىدۇ. $25mg$ لىق تابلېتى كۈنىگە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر تابلېتكىدىن ئىچكۈزۈلىدۇ، ئوكۇلىنىڭ ھەر بىر ئامپولى $20mg$ لىق بولۇپ، مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئىشلىتىلىدۇ. كىچىك بالىلارغا 0.2% لىك قىيامى ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $3mg \sim 1$ دىن ئىچكۈزۈلىدۇ.

خلور فېنېرامىن (*Chlortrimeton*): بۇمۇ تېرە كېسەللىكلىرىدە دائىم ئىشلىتىلىدىغان دورا بولۇپ، ئامىن ھىدروكاربون تۈرىگە كىرىدۇ. ھەر بىر تابلېتى $4mg$ لىق، كۈنىگە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر تابلېتكىدىن ئىچكۈزۈلىدۇ. $10mg$ لىق ئامپولى مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. بۇ دورا كىچىك دوزىدا ئىشلىتىلىشىمۇ ئۈنۈم بېرىدۇ، ناچار تەسىرى ئاز، ياشاغلار بىلەن بالىلارغا ئىشلىتىشكە مۇۋاپىق كېلىدۇ.

بۇكلېزىن (*buclicizinehydrochloride*): پېپېرازىن تۈرىدىكى دورا، ھەر تابلېتى $25mg$ لىق، ئىشلىتىش ئۇسۇلى بېئادىرل بىلەن ئوخشاش، بۇنىڭ تەسىر قىلىش ۋاقتى ئۇزۇن. بۇ دورىنىڭ ھامىلىگە يامان تەسىرى بولۇشى مۇمكىن، شۇڭلاشقا ھامىلدار-لىقنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.

دېكلوكسىزىن (*Decloxizine hydrochloride*): بۇمۇ پېپېرازىن تۈرىدىكى دورا، ھەر بىر تابلېتى $25mg$ لىق، ئىشلىتىش ئۇسۇلى بېئادىرل بىلەن ئوخشاش. ناچار تەسىرى ئازراق، ھەمدە قوشۇمچە دېمى سىقىلىشىنى ياخشىلاش رولى بار، ئەمما تەسىر قىلىش ۋاقتى بۇكلېزىننىڭكىدىن قىسقا بولىدۇ.

ئاتاراكسى (*atarax*): بۇ پېپېرازىن تۈرىگە كىرىدۇ. ھەر بىر تابلېتى $25mg$ لىق، ئىشلىتىش ئۇسۇلى بېئادىرل بىلەن ئوخشاش. تەسىرى كۈچلۈكرەك، ناچار تەسىرى ۋە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار بۇكلېزىن بىلەن ئوخشاش. يۇقىرىدا سۆزلەنگەن پېپېرازىن تۈرىدىكى دورىلارنىڭ خولىغا قارشى تۇرۇش رولى خېلى ياخشى.

پىرىبېنزامىن (*pyribenzamine*): ۋىنىلىدى ئامىنى تۈرىدىكى دورا تابلېتى، $25mg$ لىق، ئىشلىتىش ئۇسۇلى بېئادىرل بىلەن ئوخشاش، بىراق تەسىرى ئۇنىڭغا قارىغاندا كۈچلۈك ھەم ئۇزۇن، ئىچكەندە چايناشقا بولمايدۇ، يەرلىك ئورۇنغا ئىشلەتكەندە تېرە ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ.

ئانتېرگان (*antergan*): بۇمۇ ۋىنىلى دىئامىنى تۈرىدىكى دورا، بىر تابلېتى $4mg \sim 2$ لىق، ئىشلىتىش ئۇسۇلى خلور فېنېرامىن بىلەن ئوخشاش. تىنچلاندۇرۇش تەسىرى كۈچلۈكرەك.

فېنېرگان (*phenergan*): فېنوتېمىازىن تۈرىدىكى دورا تابلېتىكىسى، $25mg$ لىق، ئوكۇلى $25mg/ml$ لىق، چوڭلار $25mg \sim 12.5$ دىن كۈنىگە ئۈچ قېتىم، كىچىك بالىلارغا ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا ھەر قېتىمدا $1mg \sim 0.5$ ، كۈنىگە $3 \sim 1$ قېتىم ئىچكۈزۈلىدۇ. چوڭلارغا ھەر قېتىمدا $50 \sim 25$ ، بالىلارغا $1mg \sim 1.0$ دىن مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېنادىن تېمىتىلىدۇ، تەسىرى كۈچلۈك ھەم ساقلىنىش ۋاقتى ئۇزۇن.

بولىدۇ. دورىنى جىگەر، بۆرەك زەخمىلەنگەنلەر ۋە نۇرغا سەزگۈر تارىخى بارلارغا ئېھتىياتلىق بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ھەر خىل دورىلاردىن ئادەتتە بىر خىلى ئىشلىتىلىدۇ، نام ۋادا ئۇنۋى بولمىسا ياكى كېسەللىك ئالامىتى ئېغىرراق بولسا، ئوخشىمىغان تىپتىكى ئىككى خىل دورا بىرلىكتە ئىشلىتىلىدۇ. چىدامچانلىقى نىسبەتەن ناچار بولغان كېسەللىككە مەتدارنى ئازايتىپ ئىشلىتىش كېرەك. بۇ تۈردىكى دورىلارنىڭ باش قېيىش، ئۇيقۇسىراش قاتارلىق ناچار تەسىرى بولغانلىقتىن، دورا ئىچكەن ۋاقىتتا ماشىنا ھەيدەش مەسلىك ياكى ئېگىز بوشۇقتا، سۇ ئۈستىدە مەشغۇلات ئىشلىمەسلىك كېرەك.

ھىستامىنغا قارشى دورىلارنىڭ تۈرى كۆپ، مەسىلەن: H_2 ئاكسىپېتورىنى ئۈزگۈچى يېڭى دورىلاردىن سىمېتىدىن (*Cimetidine*) تېرە كېسەللىكلىرى بۆلۈمىدە 0.2g دىن، كۈنىگە ئۈچ قېتىم ئىچكىۈزۈلسە ئېشەك يېمىگە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. (2) 5- ھىدروكسىتىرېپتا مىن ($5-HT$) غا قارشى دورىلار: $5-HT$ - مۇياللۇغ ۋاسىتىچى ماددىسىغا كېرىدۇ. ھىستامىنغا قارشى دورىلارنىڭ ھەممىسى $5-HT$ غا قارشى تۇرۇش رولىغا ئىگە، بۇنىڭدىن باشقا خىلور پرومازىن، ئاتروپىن، كورتىكو سىتىروئىد، رېزېرپىن، ناترىي سالىسىلىس ۋە ئامىدوپرىنۇم قاتارلىقلارنىڭمۇ ئوخشىمىغان دەرىجىدە $5-HT$ غا قارشى تۇرۇش رولى بار. ئىچكى كېسەللىكلەردە ئىشلىتىلىدىغان مۇناسىۋەتلىك دورىلارنىڭ ئىشلىتىلىش ئۇسۇلىدىن ۋە دىققەت قىلىنىدىغان ئىشلىرىدىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ.

(3) كىتىنغا قارشى دورىلار: تراسىلول (*trasytol*) فېرېمېنتى تورمۇزلىغۇچى دورا، بۇ كىتىننىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى ۋاسىتىلىق تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. ئېكزېما، يەلتاشما ۋە قان تومۇر - نېرۋا مەنبەلىك سۇلۇق ئىششىنى داۋالايدۇ. كۈن ئارىلاپ بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 100000U ۋېناغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ، 20~15 قېتىم بىر داۋالاش كۇرسى ھېساپلىنىدۇ. بۇ دورىنىڭ ناچار تەسىرى روشەن ئەمەس، تەكرار ئۆكۈل قىلىنغان ئايرىم ساندىكى كېسەللەردە ئاللىبىرگىيەلىك شوك يۈز بېرىدۇ.

(4) ياللىۇغ ۋاسىتىچى ماددىلىرىغا قارشى باشقا دورىلار: *EACA* پلازىمىنوگېنىنىڭ جانلىنىشىنى تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. سىرغۇقتىن بولغان يەلتاشما ۋە سويۇلۇش خاراكتېرلىك تېرە كېسەللىكلىرى، سىستېمىلىق تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى ۋە ئاللىبىرگىيەلىك قان تومۇر ياللىۇغى قاتارلىقلارغا بىلگىلىك ئۈنۈم بېرىدۇ. كۈنىگە 8g~10g، ياشتىن كىچىك بالىلارغا كۈنىگە ھەر kg بىرەن ئېغىرلىقتا 100mg دىن ئۆچكە بۆلۈپ ئىچكىۈزۈلىدۇ. ئايرىملاردا كۆڭۈل ئېلىنىشى رېئاكسىيىسى بولىدۇ، ھامىلدارلىقنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە ئىشلىتىش مەنئى قىلىنىدۇ.

2. كورتىكو سىتىروئىد ھورمونلىرى: بۇ دورىلار ئاساسلىق ياللىۇغقا قارشى، ئاللىبىرگىيەلىك قارشى ۋە ئىممۇنىتېنى تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. ئېغىر ئۆتمىدىغان دورا ئەسۋەسى، تارقىلىشچان ئېكزېما، ئۆتكۈر يەلتاشمىغا ئاللىبىرگىيەلىك شوك ياكى كېكىمدەك سۇلۇق ئىششىقى قوشۇلۇپ كېلىش، ئېغىر تىپلىق كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ، سىستېمىلىق قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى، تېرە - مۇسكۇل ياللىۇغى، پېمفېگۇس قاتارلىق كېسەللىكلەرگە

ئىشلەتمەيدۇ. ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتمەسە يۈز يۇمىلاقلىشىش، قان بېسىم يۇقىرىلاش، دىئابىت كېسىلى، ھەزىم قىلىش يوللىرى قاناش، سۆڭەك ماددىسى شالاڭلىشىش، ئېلېكترولىتلار قالايمىقا ئىلىشىش، ئۆپكەسىلىيا مانلىشىش ۋە تەكرار يۇقۇلمىنىش قاتارلىق ناچار رېئاكسىيەلەر يۈز بېرىدۇ. شۇڭا كۆزىتىشكە دىققەت قىلىپ، ئۆز ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىش لازىم. يۈرەك تاجىسىمان ئارتېرىيىسى بوتقىسىمان قېتىش كېسىلى، دىئابىت كېسىلى، يارا كېسىلى، سۆڭەك ماددىسى شالاڭلىشىش ياكى ھەرىكەتچان ئۆپكەسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلەتمەسەن مەنىنى قىلىنمەيدۇ. كورتىكوسىتروئىد ھورمونلىرىنىڭ دائىم ئىشلەتمەسەن بىر نەچچە خىل ياسالما ھورمونلىرى تۆۋەندىكىچە جەدۋەللىشىشتۇرۇلدى:

1.4 - جەدۋەل. كورتىكوسىتروئىد ھورمونلىرىنىڭ دائىم ئىشلەتمەيدىغان تۈرلىرى، ياللۇغقا قارشى تۇرۇش ئۈنۈمى ۋە ئىشلەتمەش ئۇسۇلى، مىقدارى

ئىسمى	تۈرلىرى	بىئولوگىيەلىك دولى، يېرىم ئا-جىزلاش دەۋرى	ياللۇغقا قارشى ئۈنۈم قىممىتى	ئۆلچىمى	چوڭلار مىقدارى mg/كۈن	ئىشلەتمەش ئۇسۇلى
كورتىزون	قىسقا ئۇنۇملۇك	12 سائەت < 36 ~ 12 سائەت	0.8	تابىلىت/25mg	100~300	ئىچىلىدۇ
ھىدروكورتىزون	قىسقا ئۇنۇملۇك		1.0	ئامپول/85~100mg	50~100	ۋېناغا تېمەتلىدۇ
پىرىدنىزون	ئوتتۇرا ئۇنۇملۇك		3.5	تابىلىت/5mg	10~60	ئىچىلىدۇ
پىرىدنىزولونۇم	ئوتتۇرا ئۇنۇملۇك		4.0	تابىلىت/5mg	10~60	ئىچىلىدۇ
دېكسامېتازون	ئۇزاق ئۇنۇملۇك	48 سائەت	30.0	تابىلىت/0.75mg ئامپول/2mg	1.5~9 2.0~10	ئىچىلىدۇ ۋېناغا تېمەتلىدۇ، ياكى ۋېناغا مۇسكۇلغا ئىنكۇب قىلىنىدۇ

ئوخشىمىغان تۈردىكى كورتىكوسىتروئىد ھورمونلىرىنى سۇندۇرۇپ ھېساپلاش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە: كورتىزون $25mg \approx$ ھىدروكورتىزون $20mg \approx$ پىرىدنىزون $5mg \approx$ دېكسامېتازون $0.75mg$. خەۋپلىك، ئېغىر كېسەللەرگە دەسلەپتە چوڭ دوزدا ئىشلەتمەيدۇ. جىددىي قۇتقۇزۇشقا كېسەللەر (ئاللىبىرگىيەلىك شىرك) دە كېسەللەك ئالامەتلىرى تورمۇزلاشقا نىسبەتەن كېيىن توختىتىلىدۇ. كېسەللەك جەريانى ئۆز لۈكىدىن چەكلىنىدىغان تېرە كېسەللەكلىرى (دورا ئەسۋىسى) گە ئىشلەتكەندە، كېسەللەك ئالامەتلىرى كونترول قىلىنغاندىن كېيىنمۇ 3~5 كۈنگىچە ئەسلىدىكى مىقدارىنىڭ 20% ى ئازايتىلىپ، ئاندىن توختىتىلىدۇ. ئۇزۇن مۇددەت دورا ئىشلەتمەش زۆرۈر بولغاندا (پېچەتگۇس) ھەر 5~7 كۈندە بىر قېتىم، ئەسلىدىكى مىقدارىنىڭ 10% ى ئازايتىلىپ، ئەڭ ئاخىرى كېسەللەك ئالامەتلىرىنى كونترول قىلالايدىغان ئەڭ كىچىك قامداش مىقدارى بېرىلىدۇ. ئەگەردورا مىقدارىنى ئازايتىش جەريانىدا كېسەللەك يەنە تەكرارلانسا دوزىنى چوڭايتىپ، كېسەل

لىك ئالامەتلىرى كونترول قىلىنىدۇ. ئۇزۇن كۈرسىلۈك داۋالىغاندا كۈن ئارىلاپ دورا بېرىش ئۇسۇلى تەشەببۇس قىلىنىدۇ، يەنى ئوتتۇرا ئۈنۈملۈك ھورمونلارنى ئىشلەتكەندە، ئىككى كۈنلۈك مىقدارى كۈن ئارىلاپ ئەتىگەندە بىر قېتىم بېرىلىدۇ. بۇ ئۇسۇل ئۇزۇن مۇددەت دورا ئىچىشتىن كېلىپ چىقىدىغان ناچار تەسىرنى ئازايتىدۇ.

3. ئىمىمونىتىلىق داۋالاش ئۇسۇلى: ئىمىمونىتىلىق ئۇسۇل بىلەن كېسەللىكنى داۋالاش ئىمىمونىتىلىق داۋالاش ئۇسۇلى دېيىلىدۇ. دائىم ئىشلەتمەيدىغانلىرى تۆۋەندە تاللاپ تونۇشتۇرۇلدى:

(1) ترانسفېر فاكىتور ($transferfactor - TE$) سەزگۈرلەشتۈرگۈچى لىمفا ھۈجەيرىلىرىدىن ئېلىنغان بىر خىل ياسالما. ئورگانىزمنىڭ ھۈجەيرە ئىمىمونىت رېئاكسىيەسىنى قوزغاپ، ئەسلىگە كەلتۈرۈپ ۋە كۈچەيتىپ، ئىمىمونىت فۇنكسىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. تېرە كېسەللىكلىرىدىن پۈۋەكچە كېسەلى، تەكرار قوزغىلىدىغان ئاددىي قوقاق، بەلباغسىمان قوقاق، بېسىپ يىغىندى ئالامىتى ۋە چىقان قاتارلىقلارغا كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ. ئۈنۈمى %80 تىن يۇقىرى. يەنە تېرە ۋە شىلىلىق پەردىسىنىڭ تەسۋىسىمان باكتېرىيەلىك سوزۇلما كېسەلى، سىل، ماخاۋ، سىستېمىلىق قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى ۋە تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى قاتارلىقلارغىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. ئادەتتە بىلەك ئىچى تەرىپىنىڭ تېرە ئاستىغا ھەپتىدە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 1ml (بىر ئامپول) دىن ئۆكۈل قىلىنىدۇ. داۋالاش كۈرسى كېسەل تۈرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ پەرقلىق بولىدۇ. بۇنىڭ ئاساسلىق ناچار تەسىرلىرى: ئۆكۈل قىلىنغان ئورۇن ئىشىشى، ئېچىشى، ئاغرىش، بۆرەك خىزمىتى ۋاقىتلىق ئاجىزلاش، پۈتۈن بەدەن يېتىشمەزلىنىش ۋە باش قېيىش، ئايرىم كېسەللىرىدە يېنىك دەرىجىدە سوغا ئىنسان تېرە ئەسۋىسى پەيدا بولۇش، قىچىشىش، دانىخو-رەك كۆپىيىش، لىمفا تۈگۈنلىرى چوڭىيىش ياكى ۋاقىتلىق رېئاكسىيەدىن بولغان لىمفا ھۈجەيرىلىرى كۆپىيىش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

(2) لېۋامىزول ($levamisole - LMZ$): مەدە قۇرتقا قارشى كەڭ دائىرىلىك دورا، يەنە ئىمىمونىت فۇنكسىيەسىنى كۈچەيتىدىغان قوشۇمچە رولى بار، بولۇپمۇ T ھۈجەيرىنىڭ ئىمىمونىت فۇنكسىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ ۋە كۈچەيتىدۇ. تەكرار قوزغىلىدىغان ئاددىي قوقاق، ماخاۋ، تەسۋىسىمان باكتېرىيە كېسەلى، سىستېمىلىق قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى، تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى، بېسىپ يىغىندى ئالامىتى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. ئادەتتە چوڭلارغا ھەر ئىككى ھەپتىدە ئۇدا ئۈچ كۈن، ھەر كۈنى $0.15g$ دىن، ئۈچكە بۆلۈپ ئىچكىزۈلىدۇ. بالىلارغا كۈنىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $2.5mg$ دىن ھېساپلىنىدۇ. ئادەتتە ناچار تەسىرى ئاز بولۇپ، يەڭگىل ئۆتىدۇ، كۆڭۈل ئېلىنىش، قۇسۇش، ئىچى سۈرۈش، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش ۋە ئاشقازان يېتىشمەزلىنىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. ئەمما بۇلار ئۈزلۈكسىز يوقىلىدۇ. يەنە تارالما زۇكام سىمان يىغىندى ئالامەت، تېرە نېكروزلىنىشلىق قان تومۇر ياللۇغى، چوڭ قاپارتقۇلۇق يۈزە تېرە بوشىشىش تىپىلىق دورا ئەسۋىسى، نېپروا سىستېمىسى رېئاكسىيەسى ياكى ئېغىرلاشقان بۆرە چاقىسى سىمان رېئاكسىيە قاتارلىقلارنى، ھەتتا ئاق قان ھۈجەيرىسى ۋە قان پلاستىنكىسى ئازلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭلاشقا دورا ئىشلەتكەن مەزگىلدە ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىش لازىم.

3) يەرلىك ئىممونىستىلىق داۋالاش ئۇسۇلى: دىئىتروفلوروبىنزول ($DNFB$) بىلەن دىئىتروفلوروبىنزول ($PNFB$) تېرىدە كېچىكىچى قوزغىلىش تىپلىق ئاللىرگىيىلىك رېئاكسىيىنىڭ يۈز بېرىشىنى قوزغاپ، مەلۇم تېرە كېسەللىكلەرنى داۋالاش رولىغا ئىگە. $2000 \mu g/0.1ml$ لىق $DNFB$ ياكى $DNFB$ تۇتقان ئاتسېتون ئېپىستېسى كېسەللىككە ئورۇنغا سۈرتىلىدۇ، $20 \sim 4$ كۈندىن كېيىن $50 \mu g/0.1ml$ لىق ئاتسېتون ئېپىستېسى قايتا سۈرتىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى ئاسانلا يۈز بېرىدۇ، ياپىلاق سۆگەل بىلەن ئاددىي سۆگەلنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

4) باشقا بەزى يېپىڭى ئىسسىق-ئىسسىق ياسالما ئىسسىقلىرى: ئىتېرېن روت (IF) ۋە ئۇنىڭ يېتەكچى دورىلىرى $Poly I:C$ دىن $1 \sim 2ml$ مۇسكۇلغا ھەپتىدە 2 قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ) ۋىرۇسلىق تېرە كېسەللىكىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. مونوكلىونال ئانتىبىلامۇ ئالاھىدە رېئاكسىيىچان تېرە ياللۇغى، تەڭگە تەمرەككە، ياپىلاق لىشاي، پېمىگۇس ۋە سىستېمىلىق قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. تە. بەزى ئىممۇنىتەنى تورمۇزلىغۇچى دورىلار مۇناسىۋەتلىك كېسەللىكلەرنىڭ داۋالىشىدا بايان قىلىنىدۇ.

4. كالىتسىي ياسالما لىمىلىرى: ياللۇغ ۋە ئىششىقنى قايتۇرۇش، ئاللىرگىيىگە قارشى تۇرۇش رولى بار. بۇ ئاللىرگىيىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغان ياسالما لىمىسى كالىتسىي گلۇكونات بولۇپ، ھەر بىر تابلېتكىسى $0.5g$ لىق، كۈنىگە $3 \sim 6g$ دىن، ئۈچكە بۆلۈپ ئىچكۈزۈلىدۇ. 10% لىك كالىتسىي گلۇكوناتتىن ھەر قېتىمدا $10ml$ دىن، ۋېناغا كۈنىگە $1 \sim 2$ قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. ۋېناغا ئوكۇل قىلىندىدا سۈرئىتى ئاستا بولۇش كېرەك. 5% لىك كالىتسىي خلور ئوكۇلى ۋە كالىتسىي لايىتات تا-لىپتى قاتارلىق باشقا ياسالما لىمىلىرىنىڭ مىقدارى ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش. كالىتسىي ياسالما لىمىلىرىنى دېگىتالىس بىلەن بىللە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

5. زامبۇرۇغقا قارشى دورىلار: 1) گرېزوفۇلفىن ($griseofulvin$): يۈزە ئورۇندىكى زامبۇرۇغنى تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. ئىچكەندە شۇمۇرۇلگەندىن كېيىن مۇڭگۈز ماددا ئاقىلى بىلەن بىرىكىپ مۇڭگۈز قەۋەتتە چۆكۈپ، زامبۇرۇغ بۆسۈپ كىرىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. نۆۋەتتە، ئاساسلىق باش تەمرە تىكىشىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. چوڭلارغا كۈنىگە $0.6 \sim 0.8g$ دىن، بالىلارغا ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $15 \sim 20mg$ دىن ھېساپلاپ، ئىككىگە بۆلۈپ تاماقتىن كېيىن ئىچكۈزۈلىدۇ. ئەگەر كىچىك كۇمىلاچلىرىنى ئىشلىتىش توغرا كەلسە، مىقدارى تەڭدە يېرىم ئازايتىلىدۇ. دورا ئىچكەندە، مايلىق يېمەكلىك يېسە ياكى بىر ۋاقىتتا قىل يوپۇر-ما قىلىق ئەمەن قاينا تىمىسى (يېنىچېنىتساڭ) ئىچسە، دورىنىڭ شۇمۇرۇلۇشى ئاشىدۇ. ئاساسلىق چىگەرنى زەھەرلەش ۋە ئاشقا زان-ئۇچەي يوللىرى رېئاكسىيىسى يۈز بېرىشتەك نا-پار تەسىرى بار، بىراق بۇ داۋالاشقا تەسىر قىلمايدۇ. بۇ دورىنى سىرتىدىن ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

2) نىستاتىن ($nystatin$): ئاساسلىق تەسۋىسىمان باكتېرىيە كېسەللىكىنى بولۇپمۇ ئاشقا زان-ئۇچەي يوللىرى، تېرە، شىللىق پەردە ۋە جىنسسىي يول قاتارلىق ئورۇن-لاردا تەسۋىسىمان باكتېرىيە كېسەللىكىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. چوڭلار ھەر قېتىمدا

$10000000u \sim 5000000$ دىن كۈنىگە 4 قېتىم ئىچىدۇ. يەرلىك ئورۇنغا ھەر 1g تەر - كىمىدە $1000000u \sim 100000$ دورا بولغان مەلھىمى ياكى $100000u/ml$ ئارىلاشما سۇيۇق - لۇقى سۈرتىلىدۇ. ئاساسلىق ناچار تەسىرى ئاشقا زان - ئۇچەي رېئاكسىيىسى بولۇپ، دورا - ھەقدارىنى ئازايتقاندا ياكى دورىنى توختاتقاندا، تېز سۈرئەتتە يوقىلىدۇ.

(3) كلوترىمازول (*Clotrimazole*): بىرىكتۈرۈلگەن كەڭ دائىرىلىك زامبۇرۇغقا قار - شى دورا. بۇ چوڭقۇر ۋە يۈزە ئورۇندىكى زامبۇرۇغلارنىڭ ھەممىسىنى تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىق تەمرەتكە ۋە تەسۋىسىمان باكتېرىيىلىك يۇقۇلمىلىرىنى داۋالايدۇ. كۈ - لىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $50mg \sim 40$ دىن ئىچكۈزۈلىدۇ. ئادەتتە تەسۋىسىمان باكتېرىيىدىن يۇقۇلمىلىرىغا $14 \sim 10$ كۈن دورا ئىشلىتىلىدۇ. كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىشتىھا تۇتۇلۇش قاتارلىق ناچار تەسىرلىرى بولىدۇ. يەرلىك ئورۇنغا $5\% \sim 3$ لىك كلوترىمازول مەلھىمى ياكى ئۇنىڭ زىماتى، $3\% \sim 2$ لىك كلوترىمازول دىسپىتېل سۇل - فوكسىد ياكى ئۇنىڭ ئاتسېتون ياسالغىلىرى قاتارلىقلارنى ئىشلەتكەندە، ھەممىسى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

(4) ئېكونازول (*econazole*): كەڭ كۆلەملىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ناچار تەسىرى ئاز، زامبۇرۇغقا قارشى بىرىكتۈرۈلگەن يېڭى دورا، يەنە گىرىزىمۇفۇلگىن، نىستاتىنوم ۋە پېنتامىلىن قاتارلىق ئۈچ خىل دورىغا ئوخشاش قوشۇمچە تەسىرى بار. تەمرەتكە بىلەن جىنسىي يول تەسۋىسىمان باكتېرىيىلىك كېسىلىنى داۋالاشتا 1% ئېكونازولنىڭ مۇناسىۋەتلىك ياسالغىلىرى سىرتىدىن سۈرتىلىشە ساقايىتىش ئۈنۈمى 90% تىن يۇقىرى بولىدۇ.

(5) كېتون كونازول (*Keton conazole*): بىرىكتۈرۈلگەن، زامبۇرۇغقا قارشى يەنە بىر يېڭى دورا. تەمرەتكىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. كۈنىگە $200mg$ دىن، ئۇدا 2 ھەپتە ئىچكۈزۈلىدۇ. يەرلىك ئورۇنغا بۇ دورىنىڭ 2% لىك زىماتى ئىشلىتىلىدۇ. ئاساس - لىق ناچار تەسىرى ئالامەتلىك چىگەر رېئاكسىيىسىدىن ئىبارەت.

6. ۋىرۇسقا قارشى دورىلار:

(1) يودوكسۇرىدىن (*iodoxuridine, IDUR*): ۋىرۇسلارنىڭ *DNA* نى قايتا ياساشنى تورمۇزلايدۇ. ئاددىي قوقاق بىلەن سۆڭەلنى داۋالاشتا 0.25% زىماتى ياكى $10\% \sim 5$ لىك *DMSO* ئېرىتمىسى سىرتىدىن سۈركىلىدۇ، بەلباغسىمان قوقاقنى دا - ۋالاشتا يودوكسۇرىدىننىڭ 40% لىك ئېرىتمىسى ياكى 40% لىك *DMSO* ئېرىتمىسى سىرتىدىن چا پىلىنىدۇ، $0.5\% \sim 0.1$ لىك كۆزگە تېخىمىدىغان يودوكسۇرىدىن بىلەن قاپارتقۇلۇق مۈڭگۈز پەردە ياللۇغىنى داۋالىغاندا ئۈنۈم بېرىدۇ.

(2) سىتارابىن (*Cytarabine Ara - C*): تەسىرى يودوكسۇرىدىننىڭكىگە ئوخشاش. كەڭ كۆلەملىك بەلباغسىمان قوقاق، ئېغىر ئۆتمىدىغان قاپارتقۇلۇق ئېغىز بوش - لۇقى ياللۇغى ۋە ئېغىر ئۆتمىدىغان سۇ چېچەك قاتارلىقلارنى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدۇ. كۈنىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $2mg \sim 1$ دىن ياكى كۈنىگە $30 mg/m^2$ دىن ھېساب - لاپ ئىشلىتىلىدۇ. 5% لىك گلىكوزا ئېرىتمىسى بىلەن ۋېسادىن تېخىمىلىدۇ، 5 كۈن بىر داۋالاش كۈرسى قىلىنسا، قانائەتلىنەرلىك ئۈنۈم بېرىدۇ. ئىشتىھا تۇتۇلۇش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش قاتارلىق رېئاكسىيىلەر يۈز بېرىدۇ. بۇ دورا بىلەن ئۇزۇن مۇددەت

داۋالغاندا ئاق قان ھۈجەيرىلىرى بىلەن قان پلاستىنكىسىنى تەكشۈرۈشكە دىققەت قىلىش لازىم.

3) ئاتسىكلوگۋانوزىن (*acycloquanosin*): ۋىرۇسقا قارشى يېڭى دورا. ۋىرۇسلارنىڭ DNA پولىمېرازاسىنى قاماللاش رولى بولۇپ، ئاددىي قوقاقنى داۋالاشتا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. 5%~3 لىك مەلھىمى ھەر 3 سائەتتە بىر قېتىم، سىرتىدىن جەمئىي 7 كۈن سۈرتىلىدۇ. باكتېرىيە يوقىتىشقا ئىشلەتكەندە كۈنىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 10mg دىن ھېساپلاپ، ۋېنادىن ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئاددىي قوقاق ۋىرۇسىدىن كېلىپ چىققان مېڭە ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

7. قامال قىلىپ داۋالاش ئۇسۇلى: پروكا يىمى ئىشلىتىپ، كېسەللىك ئۆزگىرىشى بولغان ئورۇندىكى يامان سۈپەتلىك غىدىقلىنىشنىڭ مەركەزگە يەتكۈزۈلۈشى ئۈزۈۋېتىش — قامال قىلىپ داۋالاش ئۇسۇلى دېيىلىدۇ. بۇ داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ ئورگانىزىمنىڭ نورمال مۇداپىئەلىنىش ۋە تەڭشەش فۇنكسىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەمدە كېسەللىك ئۆزگىرىشى بولغان ئورۇننىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش ۋە ئەسلىگە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولى بار. ئادەتتە ئېكزېما، تەڭشەك تەمرەتكە كېسىلى ۋە قىچىش خاراكتېرلىك تېرە كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ، دائىم قوللىنىلىدىغان ئۇسۇللار تۆۋەندىكىچە:

1) ۋېنادىن قامال قىلىش: 0.25% لىك پروكا يىمى ئېرىتمىسىدىن 20ml~10g 0.1~0.2g ۋىتامىن C نى قوشۇپ، كۈنىگە بىر قېتىم ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، 10 قېتىم بىر داۋالاش كۇرسى بولىدۇ ياكى مىكروپىسىز لاندۇرۇلغان پروكا يىمى كرىستاللىنى ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 8mg~4 دىن ھېساپلاپ، فىزىئولوگىيىلىك تۈز سۈيىدە ياكى 5% لىك گلىكۇزا ئېرىتمىسىدە 0.1% لىك قويۇقلۇقتا تەييارلاپ 0.5~1.0g ۋىتامىن C نى قوشۇپ، كۈنىگە بىر قېتىم ۋېناغا تېخىمىلىدۇ، 10 قېتىم بىر داۋالاش كۇرسى بولىدۇ، ئوكۇل قىلىش ياكى تېخىمىش سۈرئىتى ئاستا بولۇش لازىم.

2) يەرلىك ئورۇننى قامال قىلىش: 0.25%~0.5 لىك پروكا يىمى ئېرىتمىسى كېسەللىك ئوچىقى ياكى ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى تېرە ئاستىغا ئىنقىلىپلار تىپىلىك ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئىشلىتىش مىقدارى تېرە ئەسۋەسىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ بەلگىلىنىدۇ، ئەمما بىر قېتىمقى ئومۇمىي مىقدارى 1.0g دىن ئاشماسلىقى، كۈنىگە بىر قېتىم ياكى كۈن ئا-رىلاپ بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىشى، 10 قېتىم بىر داۋالاش كۇرسى قىلىنىشى كېرەك. مۇچە زەخمىلەنگەن ئۇچىنىڭ ئۈستى تەرەپ تېرىسى ئاستى ھالەتسىمان قامال قىلىنىدۇ. ئىشلىتىش مىقدارى ۋە داۋالاش كۇرسى يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش.

بۇ ئۇسۇلنى يۈرەك، جىگەر، بۆرەك ئېغىر كېسەللىكلىرىگە ياكى سۇلقانلىقلارغا سەزگۈرلۈكى ئاشقانلارغا ئىشلىتىش مەنىسى قىلىنىدۇ، دورا ئىشلىتىشتىن بۇرۇن تېرىگە سىناق قىلىپ، مەنپىي بولسا ئاندىن ئىشلىتىلىدۇ.

8. ئۆز قېنى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى: ئېھتىمال غەيرىي خاس سەزگۈرسىز لەندۈرۈش رولى بولۇشى مۇمكىن، سوزۇلما ئېكزېما، ئېشەك يېمى، چاچ خالىتىسى ياللۇغى، چىقان ۋە قىچىشقا قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

ئادەتتە تۆۋەندىكىچە ئىككى خىل داۋالاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ:

(1) تولۇق تەركىبلىك قان بىلەن داۋالاش: كېسەللىك ۋېئاسىدىن قان ئېلىپ مۇسكۇلغا دەرىھال ئوكۇل قىلىنىدۇ، تۇنجى قېتىم $5ml$ ، كېيىن ھەر قېتىمدا $10ml$ دىن، $2 \sim 3$ كۈندە بىر قېتىمدىن ئوكۇل قىلىنىدۇ، 10 قېتىم بىر داۋالاش كۇرسى بولىدۇ.

(2) ئېرىگەن قان بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى: $10ml$ لىق مىكروپىسزىلاندىرۇلغان شېرىققا مىكروپىسزىلاندىرۇلغان پار سۇيىمىدىن $5ml \sim 3$ ، ئاندىن كېسەللىك ۋېئاسىدىن $1ml$ قان ئېلىپ، ئىككىسىنى ئارىلاشتۇرۇپ قان ئېرىگەندىن كېيىن بۇنىڭغا يەنە 2% لىك پروكاين ئېرىتمىسىدىن $1ml$ نى ئارىلاشتۇرۇپ مۇسكۇلغا كۈن ئارىلاپ بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ، 10 قېتىم بىر داۋالاش كۇرسى بولىدۇ.

ئۆتكۈر يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر ياكى ھامىلدارلارغا ئىشلىتىش مەنىسى قىلىنىدۇ. ھەيز كەلگەن ۋە بالا ئېچىتىۋاتقان مەزگىلدە بۇ ئۇسۇل ۋاقىتتىنچە ئىشلىتىلمەيدۇ.

9. ھىستامىن شارچە ئاقسىلى: قىزىل، ئالاھىدە خاس تېرە ياللۇغى، سوزۇلما ئېشەك يېمى، كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ، ياپىلاق لىشاي ۋە كانايچە زىققىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالايدۇ. $7 \sim 10$ كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا $2ml$ دىن تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، $2 \sim 4$ ھەپتە بىر داۋالاش كۇرسى بولىدۇ. بۇ دورىنى ئىشلىتەتكەن مەزگىلدە ھىستامىنغا قارشى دورىلارنى ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ئادەتتە ئاچار تەسىرى كۆرۈلىمەيدۇ، ئاز ساندىكى كېسەللەرگە ئوكۇل قىلغاندا ھىستامىننىڭ كىدەك رېئاكسىيە يۈز بېرىدۇ. ئەمما بۇنىڭ بىلەن دورىنى توختىتىش ھاجەتسىز. بۇ دورىغا سەزگۈرلۈكى ئاشقانلار، زەرب چىرىسىمان شارچە باكتېرىيىلىك بوغۇز ياللۇغى ۋە قاناش تەبىئەتلىك كېسەللىكلەرگە گىرېتار بولغۇچىلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ھەيز مەزگىلدە ۋاقىتلىق ئىشلىتىلمەيدۇ.

10. باشتىلار: تېرە كېسەللىكلىرىدە ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن: چوڭ دوزىلىق ۋېئاسىن E (كۈن $50 \sim 150mg$) قىيىرلىسىقتىن بولغان تېرە كېسەللىكى، ئۇششۇك، كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ، سۆسۈن داغ، تېرە قاتە تىقلىشىش كېسىلى ۋە تېرە مۇسكۇلى ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ. يېقىندا بەزىلەر پۇراقلىق ۋېئاسىن A كىسلاتاسىنى ئىشلىتىپ قانداقلا ھالدا تەمرەتكە، تەڭگە تەمرەتكە ۋە ياپىلاق لىشايلىرىنى ياكى غەيرىي قۇرۇلمىلىق ۋېئاسىن A كىسلاتاسى بىلەن ئادەتتىكى دالىخۇرەكنى داۋالىغان. بۇ ئىككى دورىنىڭ دەسلەپكى ئىشلىتىلىش مىقدارى تەخمىنەن كۈنىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $1mg$ بولىدۇ. كېيىن ئۈنۈملۈك ئەڭ كىچىك قامدىما مىقدارىغا ئازايتىلىدۇ. ۋېئاسىن A كىسلاتاسىنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلىتەتەندە ئېغىز، بۇرۇن، تېرە قاتارلىق ئورۇنلار قۇرۇش، مۇسكۇل، بوغۇملار ئاغرىش ۋە بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى قاتارلىق رېئاكسىيىلەر كۆرۈلىدۇ، ئەمما مۇتلەق كۆپ ساندىكى كېسەللەر بەرداشلىق بېرەلەيدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئانتىبىيوتىكلار، ۋېئاسىن قاتارلىق دورىلار بىلەن داۋالاش فارماكولوگىيىنىڭ ياكى ئىچكى كېسەللىكلەر ئىلمىنىڭ مۇناسىۋەتلىك قىسىملىرىدا تەكرارلىنىدۇ.

2. سىرتىدىن دورا ئىشلىتىپ داۋالاش ئۇسۇلى

سىرتىدىن دورا ئىشلىتىپ داۋالاش ئۇسۇلى — بىر پۈتۈن داۋالاشنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، تېرە كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. دورا ئىشلەتكەندە تۆۋەندىكى مەسىلىلەرگە دىققەت قىلىش لازىم:

1. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ خۇسۇسىيىتى: ئادەتتە دورىلارنىڭ فارما-كولوگىيىلىك تەسىرى ۋە فىزىكا-خىمىيىلىك خۇسۇسىيىتىگە ئاساسەن تۆۋەندىكىلەرگە بۆلۈنىدۇ: (1) تازىلىغۇچى دورىلار: بۇ زەخمىلەنگەن ئورۇندىكى پاتولوگىيىلىك ھاسىلاتلارنى تازىلايدىغان دورىلاردۇر. دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى $1:8000 \sim 1:5000$ لىك ماركاسىپ (PP)، $4\% \sim 2\%$ لىك دانىكا كىسلاتا ئېرىتمىسى، 0.02% لىك فۇراتسىلىن ئېرىتمىسى ۋە ئۆسۈملۈك ياكى مەدەن ياغلىرى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.
- (2) قوغدىغۇچى دورىلار: زەخمىلەنگەن تېرىنى قوغداش، قۇرۇتۇش ياكى ئازراق قورۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە دورىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئادەتتە بۇ تۈردىكى دورىلار تۇراقلىق، مۆتىدىل بولۇشى ۋە غىدىقلاش خۇسۇسىيىتى بولماسلىقى تەلەپ قىلىنىدۇ. ھالبۇكى ئىشلىتىلىدىغانلىرى كالامىن، سىنك ئوكسىد، تالىك تالىمنى قاتارلىقلاردۇر.
- (3) قىچىشىنى توختاتقۇچى دورىلار: يەرلىك ئورۇننىڭ تېمپېراتۇرىسىنى چۈشۈرۈش، ياللۇغقا قارشى تۇرۇش ياكى يۈزە ناركوز ئارقىلىق قىچىشىنى توختىتىدىغان دورىلارنىڭ ھەممىسى مۇشۇ تۈردىكى دورىلارغا كىرىدۇ. مەسىلەن: $2\% \sim 1\%$ لىك كامفۇرا، $1\% \sim 0.25\%$ لىك مېنتول، 0.1% لىك فەتۇروھىدروكورتىزون، 0.03% لىك دىكسامىتازون، $1\% \sim 0.5\%$ لىك كاربول كىسلاتاسى ۋە 5% لىك بېنزوكائىن قاتارلىقلار.
- (4) چىرىشنىڭ ئالدىنى ئالغۇچى ۋە دېزىنېفىكسىيەلىگۈچى دورىلار: چىرىشكە قارشى دورىلار باكتېرىيىنىڭ ئۆسۈشىنى تۈرۈۋېتىپ، قورۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قىچىشقا قىي توختىتىش رولىغا ئىگە. دېزىنېفىكسىيە قىلغۇچى دورىلارنىڭ تەسىرى كۈچلۈك بولۇپ، باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش رولىغا ئىگە. ئەمما بۇ ئىككىسىنىڭ چېگرىسى ئېنىق ئەمەس. يۇقىرى قويۇقلۇقتىكى چىرىشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان دورىلار باكتېرىيىنى ئۆلتۈرۈش، تۆۋەن قويۇقلۇقتىكى دېزىنېفىكسىيە قىلغۇچى دورىلار باكتېرىيىنى تۈرۈۋېتىش تەسىرىگە ئىگە. بۇنىڭدىن باشقا بەزى تازىلىغۇچى دورىلارنىڭ چىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە دېزىنېفىكسىيە قىلىش قوشۇمچە رولىمۇ بار. دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى: 3% لىك دانىكا كىسلاتاسى، $2\% \sim 1\%$ لىك گېنتامىن ۋىتېرېن، 0.1% لىك رېئانواۋ، $1:5000$ لىك ماركاسىپ، $1:2000$ لىك برومو-گېر-مىنوم، $5\% \sim 2\%$ لىك ھىدراگىرى ئامىنو خلورىد ۋە ھەر خىل ئانتىبىيوتىك ياسالماقلار.
- (5) زامبۇرۇغقا قارشى دورىلار: $10\% \sim 3\%$ لىك ئاتسىمدى سالتسىپىلاس، $10\% \sim 5\%$ لىك ئاتسىمدى بېنزويىك، $10\% \sim 5\%$ لىك سۇلفۇر، 10% لىك دودېكانىد بۇنىڭ كىسلاتا، $30\% \sim 10\%$ قاتتىق سىركە كىسلاتاسى، 10% تىنافتات قاتارلىقلار. زامبۇرۇغقا قارشى باشقا دورىلار مۇشۇ بايىمكى ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار بىلەن داۋالاش ئۇسۇلىدا تونۇشتۇرۇلدى.
- (6) قۇرت ئۆلتۈرگۈچى دورىلار: بۇ بەدەن سىرتى يۈزىدىكى پارازىت قۇرتىنى ئۆلتۈرۈپ قوتۇرۇش ۋە پىتىلاش كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدىغان دورىلاردىن ئىبارەت. ھالبۇكى ئىشلىتىلىدىغانلىرى: سىتېمون تىنىكتۇرىسى، 1% لىك پروفىل بېنزېمېن ھېكسا خلورىد

(*Prophyl Benzemenehexa chlorid*)، 10% ~ 5% لىك سۇلفۇر ۋە 25% لىك بېنزىل بېن-
زوئاتىس قاتارلىقلار. *Rid* يېڭى تىپتىكى پارازىت قۇرت ئۆلتۈرگۈچى بىرخىل دورا يېمە-
رونىل بۇتوكسىمىدى - قوتۇر ۋە پىستىلاش كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ يېڭى،
زىيانسىز، كۆڭۈلدىكىدەك پارازىت قۇرت ئۆلتۈرگۈچى بىرخىل دورا.
(7) مۇڭگۈز ماددىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرگۈچى دورىلار: مۇڭگۈزلىشىش تو-
لۇق بولمىغان زەخمىلىنىشكە ئىشلىتىلىدۇ. بۇخىلدىكى دورىلار تېرىنى يېنىك دەرىجىدە غىم-
دەقلايدۇ، دورىنى ئىشلەتكەندىن كېيىن، شۇ ئورۇن تېرىسىنىڭ كىچىك قان تومۇرلىرى
قىسقىراپ، ياللۇغ رېئاكسىيىسى پەسىيىپ، مۇڭگۈز قەۋىتى ھاسىل بولۇش نورماللىشىشى
ئىلگىرى سۈرىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى: 5% ~ 2% كوكسىس مېيى تۈرىدىكى دورىلار،
2% ~ 1% لىك سالتىسىلىك كىسلاتا، 5% ~ 3% لىك سۇلفۇرىس، 0.5% ~ 0.1% لىك ئانتىرال-
مىن قاتارلىقلار.

(8) مۇڭگۈز ماددىنى چۈشۈرگۈچى دورىلار: بۇ مۇڭگۈز ماددىنى بوشىتىدىغان ھەمدە
ئۇنى ئاجرىتىدىغان دورىلاردىن ئىبارەت. دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى: 10% ~ 5% لىك سالتى-
سىيلىك كىسلاتا، 10% لىك رېزورىنسىن، 10% لىك قارىغاي پار مېيى قاتارلىقلار.
(9) قورنىغۇچى دورىلار: بۇ تۈردىكى دورىلار ئاقسىلنى قاتۇرۇش، چۆكتۈرۈش رولى-
غا ئىگە، يەرلىك ئورۇنغا ئىشلەتكەندىن كېيىن، سىرغىما ماددىلار ئازلاپ ياللۇغنىڭ قاي-
تىشى تېزلىشىدۇ ھەم تېرە مايلىرىنىڭ سىرتقا چىقىرىلىشى بىلەن تەرنىڭ ئاجرىلىپ چى-
قىرىلىشى كونترول قىلىنىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى: 10% ~ 5% ~ 3% تاننىك كىسلاتاسى،
0.5% ~ 0.2% لىك قورغۇشۇن ئاتسېنات، ئاليومىن ئاتسېنات، 5% ~ 2% لىك كۈمۈش نېترات
ۋە 2% ~ 1% لىك گېنتامىن ۋىتولېت قاتارلىقلار.

(10) چىرىتكۈچى دورىلار: بۇ ئۆسۈپ چىققان بىخلىما گۆش توقۇلمىسى ياكى سۆگەل-
سىمان ئۆسۈمنى يۇزۇشقا ئىشلىتىلىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى: كاربون كىسلاتاسى، 30%
لىكتىن يۇقىرى قاتتىق سىركە كىسلاتاسى، 20% لىك سالتىسىيلىك كىسلاتا قاتارلىقلار.

2. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورا ياسالغىلىرىنىڭ تىپلىرى: دورا ياسالغىلىرىنىڭ دا-
ۋالاشقا ۋە ئالدىنى ئېلىشقا مۇۋاپىقلاشتۇرۇلغان شەكىللىرى دورا ياسالما تىپلىرى دەپ
ئاتىلىدۇ. بىر تۈردىكى ياسالما بىلەن رېتسېپتىكى ياسالغىلىرىنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى سىرتىدىن
ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ ياسالما تىپىدىن ئىبارەت. ئادەتتە ئۇنىڭ شەكلى، تۈزۈلۈشى،
رولى ۋە ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلىرى جەھەتتىن تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىلغا بۆلۈنىدۇ:

(1) تالغان دورىلار: قۇرۇتۇش، ئېزىش، تاسقىش ئارقىلىق ياسالغان پارا-
شوك «تالغان دورا» دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ ئاسراش، ئىسسىقلىق تارقىتىش، نەملىكنى
شۈمۈرۈش، ياللۇغ قايتۇرۇش ۋە قىچىشىنى تىزىتىش رولى بار. ئۆتكۈر شەلۋەرەش
بولمىغان سىرغىشلىق زەخمىلىنىشكە ئىشلىتىلىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرى تاللىق تاللىق،
كالا مىن، سىنك ئوكسىد، كراخمال قاتارلىقلار.

(2) يۇيۇشقا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ئېرىمەيدىغان پاراشوكلار سۇ ياكى ئىسسىق سۇ
بىلەن ئارىلاشتۇرۇلۇپ ياسىلىدۇ، چاقىلما دورىلار دەپمۇ ئاتىلىدۇ. تەسىرى تالغان دورىلار
بىلەن ئوخشاش، ئەمما ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئاسان چاپلىشىدۇ. كالا مىننىڭ يۇيۇشقا ئىشلى-
تىلىش

تەملىدىغان ياسالغۇسى ئادەتتە كۆپ ئىشلىتىلىدۇ. ناۋادا بۇ دورىغا قىچىشىنى توختاتقۇ-
چى، ياللىغ قايتۇرغۇچى دورىلارنى قوشقاندا خېلىلا ئۈنۈم بېرىدۇ. ئىشلىتىلىدىغان كې-
سەللىكلەرنى تالغان دورىلارنىڭكىگە ئوخشاش.

(3) ئېرىتمىلەر (ھۆل كومپرىس دورىلىرى): سۇدا دورىلارنىڭ ئوخشىمىغان قويۇق-
لۇقتا ئېرىشىدىن ئىبارەت. تەسىرى ئېرىگەن دورىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ ھەمدە
ئىسسىقلىق تارقىتىدۇ، ياللىغ قايتۇرىدۇ، قىچىشىنى توختىتىدۇ، سىرغىتىلارنى شۇمۇر-
دۇ ۋە تازىلايدۇ. ئۆتكۈر شەلۋەرەشلىك سىرغىتىلارغا ئىشلىتىلىدۇ، كۆپىنچە ئوچۇق سوغ
كومپرىسلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

(4) ئىسپىر تىلىق ياسالغۇسى: ئادەتتە ئۇچۇچان ئورگانىك ماددىلارنىڭ ئىسپىر تىلىقى
ئېرىتىشنى كۆرسىتىدۇ. دورا تەركىبىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ قىچىشىنى توختىتىش،
ياللىغ قايتۇرۇش، باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش (تورمۇزلاش)، مۇڭگۈز ماددىنى چۈشۈرۈش
رولىغا ئىگە. يېنىك دەرىجىدىكى لىشايىسىمان ئۆزگىرىشكە ئىشلىتىلىدۇ. دورا كۈنىگە 3~2
قېتىم موي قەلەم بىلەن سۈرتىلىدۇ.

(5) مەلھەم دورىلار: ئوخشاشمىغان قويۇقلۇقتا مەلھەم ئاساسىي ماددىسى بىلەن تەي-
يارلىنىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغان مەلھەم ئاساسىي ماددىلىرى: ۋازېلىن، لانولىن، سۇ-
يۇق پارافىن قاتارلىقلاردۇر. مەلھەم دورىدا دورىنىڭ ئەسلىدىكى تەسىرى بولغاندىن
سىرت يۇمشاقلىتىش، سىلىقلاشتۇرۇش، ياللىغ قايتۇرۇش، ئىسسىقلىق ساقلاش ۋە سىڭىپ
كىرىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلىرى بولىدۇ. سوزۇلما تېرە قېلىنلاشتەك ئەھۋاللاردا
ئىشلىتىلىدۇ.

(6) پاستا دورىلار: مەلھەم ئاساس ماددىسىنىڭ تەركىبىدە 25~50% پاراشوك بولسا
پاستا دېيىلىدۇ. تەسىرى مەلھەم بىلەن ئوخشاش، ئاز مىقداردىكى سىرغى-
تىلارنى شۇمۇرۇش رولىمۇ بار، ئىسسىقلىق ساقلاش، سىڭىپ كىرىش خۇسۇسىيىتى مەلھەم
دورىلارنىڭكىدىن ئاجىزراق، سۇس ئۆتكۈر سىرغىش روشەن بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا
ئىشلىتىلىدۇ. ئادەتتە سىنىك ئوكسىد پاستىسى ئاساسىدا كېسەللىكنىڭ ئېھتىياجىغا قا-
راپ مۇناسىۋەتلىك دورىلارنى قوشۇپ تەسىرى كۈچەيتىلىدۇ.

(7) مايلىق دورىلار: ئۆسۈملۈك مېيى ياكى سۇيۇق پارافىن ئاساسىدا ئېرىمەيدى-
غان پاراشوكتىن 50~40% ئارىلاشتۇرۇپ ياسىلىدۇ. تازىلاش، ئاسراش ۋە يېنىك دەرد-
چىدە ياللىغ قايتۇرۇش تەسىرى بار، سۇس ئۆتكۈر خاراكتېرلىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ، ئا-
دەتتە سىنىك ئوكسىد مايلىق ياسالغۇسى كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ.

(8) ئېمۇلسىيە: ماي بىلەن سۇنىڭ ئېمۇلسىيىلىنىشى ئارقىلىق ياسالغان يا-
سالغۇلار ئېمۇلسىيىلەر دەپ ئاتىلىدۇ، بۇمۇ مەلھەمگە كىرىدۇ. سۇ بىلەن ئورالغان ماي
تىمى ۋە ماي بىلەن ئورالغان سۇ تىمى دەپ ئىككى خىل تىمىغا بۆلۈنىدۇ. ئالدىنقى
شۇخۇلگاۋ دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇنى يۇيۇپ چىقىرىش نىسبەتەن ئاسان، كۆپىنچە ياز پەس-
لىدە ئىشلىتىلىدۇ، كېيىنكىسى سوغۇق زىچات دېيىلىدۇ، ئالدىنقىسىغا قارىغاندا يۇيۇپ چى-
قىرىش تەس، كۆپىنچە قىش پەسلىدە ئىشلىتىلىدۇ. ئېمۇلسىيىلەردە مەلھەملىك ياسالغۇ-
لارنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى بولغاندىن سىرت، ئاز مىقداردىكى سىرغىتىلارنى شۇمۇرۇش، قى-
چىشىنى توختىتىش، ياللىغ قايتۇرۇش، سىڭىپ كىرىش قاتارلىق بۇ خۇسۇسىيەتلىرى مەل-

ھەم ياسالما لىمىلىرىنىڭكىدىن كۈچلۈك، چۈنكى ئاساس ماددا تەركىبىدىكى دورىلار ئاسانلا قوپۇپ بېرىلىدۇ. شۇڭا نۆۋەتتە مەلھەم ياسالما تىپىدىكى دورىلار ئىچىدە ئەڭ كۆڭۈلدىكىدەك دورىلار بولۇپ قالدى. سوزۇلما ياكى ئاز مىقداردا سىرغىتىلما ماددىلار بولغان تېرە ئەسۋىسىگە ئىشلىتىلىدۇ. كۈنىگە 4~3 قېتىم نېپىز سۈرتىلىدۇ، ئوراپ قويما سىلىق كېرەك.

(9) قاتتىق مەلھەملەر: ماي، پارافىن، سېغىز، كاۋچۇك قاتارلىق قاتتىق جىسىم ياكى يېرىم قاتتىق جىسىمنىڭ شىلىمىش قاتتىق ئاساس ماددىسىغا تەسىر قىلغۇچى دورىنى قوشۇپ، بىرەر ماتېرىيال ياكى ئاق رەڭنىڭ ئۈستىگە سۈركەپ ياسىلىدۇ، ئۇنىڭدىكى دورىنىڭ سىمى ئىچى كىرىشى ۋە شۇمۇرۇلۇشى مەلھەملەر بىلەن ئوخشاش، ئەمما تەسىرى ئۇزۇن ھەم چوڭقۇر، ئىشلىتىشكە ئاددى ۋە پاكىز بولۇپ، يەرلىك ئورۇن تېرىسى سوزۇلما ھۆڭگۈزلىك شىش كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ.

(10) سۇۋالما پەردىلىك ياسالما لىملار: دورىلارنى ئورگانىك ئېرىتكۈچىدە ياكى كولىد-ئىمدى سۇيۇقلۇقتا ئېرىتىپ تېرىگە سۈركىگەندە، قۇرۇغاندىن كېيىن نېپىز پەردە شەكىللىنىدۇ. بۇ تىپتىكى دورىلار ئاسان سىمىش كىرىدۇ. شۇڭا دورا ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ھەم ئۇزارتىش، قوشۇمچە تېرىنى ئاسراش ئارتۇقچىلىقىغا ئىگە. سوزۇلما تېرە ياللۇغى ۋە بەزى كەسىپى تېرە كېسەللىكلىرىدىن مۇداپىئەلىنىشكە ئىشلىتىلىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغان سۇۋالما پەردىلىك ياسالما لىملار: پولۋىنېل ئاتسېتال (*Polvinyl Acetal*)، تۇمانلاشتۇرۇلغۇچى ياسالما لىملار (چوڭ كۆلەمدىكى زەخمىلىك ئىشلىتىلىدۇ) ۋە كولىدنى ئۇلۇق ياسالما لىملار (30% لىك سالتىمىلىك كىسلاتالىق كولىدلىرىدۇن) دەپ ئۈچ خىل بولىدۇ.

يۇقىرىدا سۆزلەنگەن مۇناسىۋەتلىك دورا ياسالما لىملىرىنىڭ دائىم ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلىرى قوشۇمچە ئىككىدە تەپسىلىي سۆزلەندى.

3. سىرتىدىن دورا ئىشلىتىشكە مۇناسىۋەتلىك پرىنسىپلار: دورا ئىشلەتكەندە ئادەتتە تۆۋەندىكى پرىنسىپلارغا دىئەت قىلىش لازىم:

(1) مۇۋاپىق دورىنى تاللاش: دورىنى تاللاش ئىنتايىن مۇھىم، بۇ ھەقتە داۋالاشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش - بولماسلىقىغا تەسىر قىلىدۇ، تاللاشنى تېرە ئەسۋىسىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەش لازىم. ئۆتكۈر، شەلۋەرەش بولمىغان سىرغىشلارغا يۇغۇچى ياكى تاللان دورىلار ئىشلىتىلىدۇ؛ ئەگەر قىزىرىش، ئىششىش ئېغىر بولسا ياكى شەلۋە-رەشلىك سىرغىش بولسا ئېرىتمە بىلەن ھۆل كومپرىس قىلىش كېرەك. سۇس ئۆتكۈرسىر-غىش ئىنتايىن ئاز بولسا ئالدى بىلەن پاستىلار ئىشلىتىلىدۇ؛ ناۋادا چوڭ زەخمىلىكلىرىگە ئىسسىق پەسىللەردە پاستا ئىشلىتىلسە، تەرىنىڭ پارلىنىشى توسۇنلۇققا ئۇچراپ ئەكسچە كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىدۇ. مۇنداق ۋاقىتتا ماي ياسالما لىملىرى سۈرتىلىدۇ؛ ئەگەر كېسەللەنگەن ئورۇن قۇرۇشۇپ، كىچىكلىشىگەن بولسا ئېمولىسىيە ياسالما لىملىرىنى ئىشلىتىش ئىنتايىن مۇۋاپىق. سوزۇلما دەۋرىدە ئالدى بىلەن ئېمولىسىيە ياسالما لىملىرى، مەلھەم، قاتتىق مەلھەم ياكى سۇۋالما پەردىلىك ياسالما قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش كېرەك؛ ئەمما تېرە ئەسۋىسىنىڭ قېلىنلىقى روشەن بولمىسا تىنىمىكتۇرا ياكى ئىسپىر تىلىق ياسالما ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

(2) دورىنىڭ خاراكتېرىگە دىققەت قىلىش: تېرە ئەسۋىسى، ئورنى، يېشى ۋە جىنسى ئايرىمىسى قاتارلىق ئەھۋاللارغا ئاساسەن بەلگىلەش لازىم. غىدىقلاشچانلىقى كۈچلۈك دورىلارنى ئۆتكۈر كېسەللىكلەر، قېرى، گۆدەك، ئايال كېسەللىكلەر ۋە يۈز قىسمى، بوشلۇقلار ئېغىزى ئەتراپىدىكى تېرىلەرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا دورىنى مەقسە قىلىپ ئىشلىتىش، ئاددىي بولۇشنى پىرىنسىپ قىلىپ، مۇرەككەپ بولۇپ كېتىشنى چەكلەش كېرەك. مۇشۇنداق قىلغاندا دورىنى ئىقتىساد قىلىپلا قالماي، دورا رېئاكسىيە بېرىپ قالسا، سېزىمچانلىق مەنپىيىنى تېپىش ئاسان بولىدۇ.

(3) مۇۋاپىق قويۇقلۇقنى ئىگىلەش: ئوخشاش بىر دورىنىڭ ئوخشىمىغان قويۇقلۇقتا فارماكولوگىيىلىك خۇسۇسىيىتى پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ. شۇڭلاشقا كېسەللىك ئېھتىياجىغا ئاساسەن دورا قويۇقلۇقنى مۇۋاپىق تاللاش لازىم. ئادەتتە تۆۋەن قويۇقلۇقتىن باشلاپ، كېيىن كېسەللىك دورىغا بولغان چىدامچانلىق ۋە كېسەللىك ئېھتىياجىغا ئاساسەن قويۇقلۇقنى تەدرىجىي ئاشۇرۇلىدۇ.

(4) دورا ناچار تەسىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش: تېرە زەخمىلەنگەندە دورىلار ئاسان شۈمۈرۈلىدۇ، بەزى دورىلار (سالىسىلىك كىسلاتا، چۆكتۈرۈلگەن ئاق سىماب) بۇزۇلمىغان تېرە ئارقىلىق شۈمۈرۈلىدۇ. بولۇپمۇ كەڭ كۆلەمدە دورا سۈرگەندە شۈمۈرۈلۈپ زەھەرلىنىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىش لازىم. بۇنىڭدىن باشقا سۇلفانىلامىد، پېنىسىلىن، فۇراتسىمىلىن قاتارلىق دورىلار يەرلىك ئورۇندا ئالېرگىيىلىك رېئاكسىيىنى كۆپىرەك كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ئىمىكانىيەتنىڭ بېرىچە ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

3. فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى

بۇ باقتا دائىم قوللىنىلىدىغان بىر نەچچە خىل فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ تەسىرى، مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەرنى ۋە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار قىسقىچە تونۇشتۇرۇلىدۇ.

1. توك بىلەن داغلاش ئۇسۇلى: بۇ توك ھارارىتىدىن پايدىلىنىپ پاتولوگىيىلىك توقۇلمىنى يوقىتىش ئۇسۇلىدۇر. ئاددىي سۆڭەك بىلەن تاپان سۆڭىكىگە ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئۇسۇل قوللىنىلغاندىن كېيىن 5~7 كۈن مەزكۇر ئورۇننى پاكىز، قۇرغاق تۇتۇش لازىم.
2. ئاۋاز چاستوتىسىلىق توك بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى: بۇ تۆۋەن چاستوتىلىق توك بىلەن داۋالاشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلى. تېرە كېسەللىكلەرنى بۇ ئۈمىدىكى بەلباغسىمان قوقاق، لىمفا قانىلى ياللۇغى، دەسلەپكى دەۋرىدىكى تاتۇق ئۆسسىسى ۋە تېرە چەكلىك ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. يۈرەك ئالدى رايونى ۋە مېڭە قىسمى زەخمىلەنگەنلەرگە ئىشلىتىش مەنپىي قىلىنىدۇ.

3. مۇزلىتىپ داۋالاش ئۇسۇلى: تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا چوڭقۇر دەرىجىدە مۇزلىتىش ئارقىلىق يەرلىك ئورۇندىكى پاتولوگىيىلىك توقۇلمىنىڭ نېكروزلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، داۋالاش مەقسىتىگە يېتىشتىن ئىبارەت، ھازىر كلىنىكىنىڭ ھەرقايسى ئوپېراتسىمىخانىلىرىدا كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلىپ كەتتە. تېرە كېسەللىكىدىن قان تومۇر ئۆسسىسى، سۆڭەك، تاتۇق ئۆسسىسى، شىلىق پەردە ئاق دېقى، ياشانغانلاردىكى تېرە دۈڭگۈزەش كېسىلى، ئاساس

ھۈجەيرە راکى، تەڭگىسىمان ھۈجەيرە راکى ۋە ئەسلى ئورۇنلۇق راک قاتارلىقلارغا ئىش-
لىتىلىدۇ. مەشغۇلاتتىن كېيىن يارا يۈزىنى ئاسراپ قاچىنىڭ ئۈزلۈكسىز چۈشۈپ كې-
تمىشىنى قولغا كەلتۈرۈش لازىم.

4. ئۇلترا بىنەپشە نۇر بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى: سۈنئىي ئۇلترا بىنەپشە نۇر
ئىشلىتىلىپ يەرلىك ئورۇندىكى تېرەدە قان تولۇش، كىمپەكلىشىش، قۇرۇشلار بولىدۇ
ھەمدە ئاغرىق توختىتىش، قىچىشىنى توختىتىش ۋە باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش قاتارلىق تە-
سىرى بار. قىزىلگۈل توپان ئەسۋىسى، تەڭگە تەمرە تەككە كېسىلى، چاچ خالىتا سوزۇلما يال-
لۇغى، ئاق كېسەل، دانىخورەك قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ، تەڭگە تەمرە تەككە
كېسىلىنىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دەۋرى، نۇرغا سەزگۈرلىكى ئېشىش، ھەرىكەتچان ئۆپكە
سىلى ھەم يۈرەك، جىگەر، بۆرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولمىغانلارغا ئىشلىتىش مەنىسى قىم-
لىنىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئۆپتىك - خىمىيىلىك داۋالاش ئۇسۇلى بىلەن تەڭگە تەمرە تەككە ۋە
ئاق كېسەلنى داۋالاشنى بولىدۇ، بۇ تەڭگە تەمرە تەككە كېسىلىنى داۋالاش قىسمىدا
تەپسىلىي سۆزلەندى.

5. لازېر نۇرى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى: لازېر نۇرى پەيدا قىلغان تەسىر
ئارقىلىق كېسەللىك ئۆزگىرىشى بار توقۇلمىلارنى كېسىپ، قاتۇرۇپ ياكى ھورغا ئايلا-
ندۇرۇپ داۋالاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. بۇ مەڭ، تاپانسىمان سۆگەل، يىرىڭلىق
بىخلىما گۆش ئىششىقى، سۆگەلىسىمان ئۆسمە ۋە يامان سۈپەتلىك ئۆسمە قاتارلىقلارغا
ئىشلىتىلىدۇ.

6. رادىئوئاكتىپ ئىزوتوپ بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى: تېرە كېسەللىكلىرى بۆلۈم-
دە تېرىگە ^{32}P ۋە ^{90}Tc كۆپرەك چۈشۈرۈلىدۇ. بۇنىڭ تەسىرى رېنتگېن نۇرى بىلەن ئوخ-
شاش. يۈزە قان تومۇرلار ئۆسمىسى، سوزۇلما ئېكزېما، نېرۋاخاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغى ۋە
ئېگىز ھۈجەيرە راکى ۋە قاسراقسىمان ھۈجەيرە راکى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

7. رېنتگېن نۇرى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى: رېنتگېن نۇرىنىڭ ھۈجەيرە بۆلۈنۈ-
شىنى تورمۇزلاش رولى بار. نېرۋاخاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغى، سوزۇلما ئېكزېما، چەك-
لىك قىچىشقاق كېسىلى، سۆگەل، قان تومۇر ئۆسمىسى قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتى-
لىدۇ، تاتۇق ئۆسمىسى بىلەن تېرە راکى ئۆپپىراتسىيىسىدىن كېيىن شۇ ئورۇنغا چۈشۈ-
رۈلىدۇ. ھازىر بۇ ئۇسۇلنىڭ تېرە كېسەللىكلىرىدە قوللىنىش دائىرىسى تارايماقتا.

يۇقىرىدا سۆزلەنگەن رادىئوئاكتىپ ئىزوتوپ بىلەن داۋالاش ۋە رېنتگېن نۇرى
بىلەن داۋالاشنىڭ مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرىنى تاللاشتا ئىنچىكە ۋە سالماقلىق
بىلەن ئويلىشىش كېرەك. تېرە ئۆتكۈر يۇقۇلمىنىش، تېرە يىگىلىش، ئاق قان ھۈجەي-
رىلىرى ئازىيىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىشتە ئېھتىيات قىلىش ياكى ئىشلىتىشنى مەنئىي
قىلىش لازىم.

4. تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئاساسىي پەرۋەشى ھەققىدە ساۋات

1. ئادەتتىكى پەرۋىشتە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار ئىچكى كېسەللىكلەرنىڭ
كىمگە ئوخشاش. كېسەلنىڭ ئىدىيەۋى ئەلدىشىشى ۋە كەيپىياتىدىكى جىددىلىكىنى ئۈز-

لۈكسىز يوقىتىپ، روھىي ئامىلىنىڭ كېسەللىك ئۆزگىرىشىگە (قىچىشىش) تەسىر قىلىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ، كېسەلنى تېببىي خادىملارنىڭ يېتەكچىلىكىدە ھەرخىل داۋالاشقا پائال ماسلىشىدىغان قىلىش لازىم. كىمىمى كەڭ ھەم يۇمشاق بولۇشى، ئەڭ ياخشىسى پاختا رەختتىن تىكىلىشى، تامىقى سۇيۇق، تۈزسىز بولۇشى، ئالدى بىلەن ئاسان ھەزىم بولىدىغان، ئوزۇقلۇق قىممىتى مول يېمەكلىكلەرنى يېگۈزۈپ، بېلىق، راي، دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ۋە ھاراق قاتارلىق يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلماسلىقى لازىم. باشقا دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك ئىشلار تۆتىنچى بايىنىڭ بىرىنچى پاراگرافىدىكى تېپىرەك كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپلىرىدىن پايدىلىنىلسا بولىدۇ.

2. كېسەللەنگەن ئورۇننى تازىلاپ بىر تەرەپ قىلىش: ئوخشىمىغان ئەھۋالغا قارىتا بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. ئادەتتىكى سىرغىما سۇيۇقلۇق ۋە قاقچ بولسا ھۆل كومپىرىس قىلىنىدۇ ياكى چىلاپ قويۇپ تازىلىنىدۇ. قاقچ قېلىن بولسا ئالدى بىلەن پاستا سۈرتۈپ ئوراپ، قاقچ يۇمشىغاندىن كېيىن ئاندىن پېنىست بىلەن تازىلىنىدۇ. ئەگەر يىرىڭلىق قاپارتقۇ بولسا ئۇنى ئالدى بىلەن دائىملىق قائىدە بويىچە دېزىنفېكسىيە قىلىپ، ئاندىن يىرىڭلىق قاپارتقۇنىڭ دىۋارى كېسىۋېتىلىدۇ. چوڭ قاپارتقۇنىڭ ئىچىدىكى سۇيۇقلۇقنى پۇلكىسىيە قىلىپ تارتىپ چىقىرىۋېتىپ، قاپارتقۇ دىۋارى ساقلاپ قېلىنىدۇ. ناۋادا قاپارتقۇ دىۋارى بۇزۇلغان بولسا كېسىپ ئېلىۋېتىلىدۇ. تۈكلۈك ئورۇننىڭ تېرىسى زەخمىلەنسە، ئالدى بىلەن تۈكلەرنى قىرىپ، كېسەللەنگەن ئورۇن پاكىز يۇيۇلىدۇ. تەكرار دورا ئىشلەتكەندە، دورا ئىشلىتىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن مەزكۇر ئورۇندىكى چاپلىشىپ قالغان مەلھەم ياكى پاستا، ئۆسۈملۈك مېيى بىلەن پاكىز يۇيۇلىدۇ. يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئوخشىمىغان بىر تەرەپ قىلىشتىن كېيىن قايتىدىن تېڭىپ قويۇلىدۇ.

3. مۇناسىۋەتلىك ياسالما لارنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى:

(1) يۇغۇچى دورىلار: دورىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن دورىنى چايقاپ ئارىلاشتۇرۇپ، پاختا ياكى مويۇق قەلەمنى تەڭگۈزۈپ كۈنىگە 10 ~ 6 قېتىم ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك سۈرتىلىدۇ. ئادەتتە تەكرار دورا ئىشلەتكەندە ئەسلىدە بار بولغان دورىنى تازىلاش ھاجەتسىز. ناۋادا، دورا يىغىلىپ زىيادە قېلىنلاپ كەتسە، يىلپان سۇغا چىلانغان داكا بىلەن يۇيۇپ، ئاندىن يەنە دورا سۈرتىلىدۇ.

(2) ئېرىتمىلەر: ئوچۇق سوغۇق كومپىرىسقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇسۇلى تۆۋەندىكىدەك: 6 ~ 4 قەۋەت دېزىنفېكسىيەلەنگەن داكنى ئېرىتمىگە چىلىغاندىن كېيىن سۇ تامچىسىدەك دەرىجىدە سىقىپ، ئاندىن زەخمىلەنگەن ئورۇننىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ چاپلىنىدۇ. ئالاھىدىرەك ئورۇننى ھۆل كومپىرىس تىلىشتا بېنىت ئۇسۇلى بويىچە پەرۋىش قىلىنىدۇ. تەخمىنەن 30 مىنۇت تۇرغاندىن كېيىن تېڭىق ئېلىۋېتىلىپ، ئېرىتمىدە پاكىز يۇيۇپ، يەنە يۇقىرىدىكى ئۇسۇل بويىچە كومپىرىس قىلىنىدۇ. تېڭىق ئالماشتۇرۇش قېتىم سانى پەسىل ۋە كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ. دورىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى نىسبەتەن چوڭ (ئەڭ ياخشىسى پۇتۇن بەدەن سەتەمىنىڭ ئۈستى) بولغاندا، دورا زەھىرىنىڭ شۇمۇرۇلۇپ كېتىشى ۋە سوغۇق تېڭىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىش لازىم.

(3) مەلھەم ۋە پاستىلار: ئىككى قەۋەت داكنى مەلھەم تاختىسى ئۈستىگە تەكشى يېيىپ،

تەشكىلگۈچ پىچاق (قۇمۇش شىپا تىل) بىلەن دورىنى داكىغا 2mm قېلىنلىقتا تەكشى سۈركەپ، تېرە ئۈستىدىكى چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ كېسەللىك بار ئورۇنغا چا پىلاپ بېنىت بىلەن مۇقىملاشتۇرۇلىدۇ. ئالاھىدە ئورۇنغا دورا تاشقاندا بېنىت ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. كۈنىگە 2~1 قېتىم دورا ئالماشتۇرۇلىدۇ. تۈكلەر ئۇزۇن ئورۇنلارنىڭ تېرىسىگە ئادەتتە پاستا ئىشلىتىش مۇۋاپىق ئەمەس.

4) قاتتىق مەلھەم: دورىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن كېسەللىككە ئىگە ئورۇن يىلىمان سۇ بىلەن يۇيۇلىدۇ. ئەسلىدىكى چاپلىشىپ قالغان قاتتىق مەلھەم ئىسپىرت ياكى بېنىزىن بىلەن پاكىز يىيۇپ، سۈرتۈپ قۇرۇتۇلغاندىن كېيىن دورا سۈركىلىدۇ. 3~1 كۈندە بىر قېتىم دورا ئالماشتۇرۇلىدۇ. ناۋادا يەرلىك ئورۇندا رېئاكسىيە بولسا، دورا ئېلىپ قالىنىدۇ ۋە مەدە مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىنىدۇ.

4. ئېغىر كېسەللەرنىڭ پەرۋىشى: تېرە ئۈستى، كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ ۋە پېمىگۇس ئېغىر بولغان كېسەللەردە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان پەرۋىشلەرگە دىققەت قىلغاندىن سىرت، كېسەلخانىنى ئىسسىق تۇتۇپ، كېسەلخانا ھاۋاسىنى دېزىنفېكسىيە قىلىشقا دىققەت قىلىش لازىم. كەڭ كۆلەمدە شەلۋەرىگە كېسەللەردىكى يۇقۇملانمىش پۇر-سىتمىنى ئازايتىش ئۈچۈن، كېسەلنىڭ يوتقان - كۆرپە كىرىملىرىنى، كىيىم - كېچەكلىرىنى پات - پات ئالماشتۇرۇپ، مىكروپىسز لاندۇرۇلغان كىرىملىكنى ئىشلىتىش كېرەك. تېمپېراتۇرا (قولتۇق ئاستىدىن ئۆلچەشكە بولىدۇ)، پولىمىس، نەپەسنى قەرەللىك ئۆلچەپ، بەدىنىنى پات - پات ئۆرۈپ، ياتاق يارىسى ۋە ئۆپكە يىغىلىش خاراكتېرلىك ياللۇغ پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. ئەگەر ھەر قايسى بوشلۇق ئېغىزلىرى ۋە قاتلانغان ئورۇنلاردا شەلۋەرىش بولسا، 3% لىك دانىسكا كىسلاتاسى ئېرىتمىسى ياكى 1:8000 لىك ماركانسونۇپ ئېرىتمىسى بىلەن يۇيۇپ ئاندىن دورا چاپلاش لازىم.

II مەخسۇس قىسمى

بەشىنچى باب ئاللىبىرگىيىلىك تېرە كېسەللىكلىرى

بۇ بابتا بايان قىلىنىدىغان ھەر خىل تېرە كېسەللىكلىرى، كلىنىكىدا تېرىدە غەيرىي ئالاھىدە خاس ياللۇغلۇق رېئاكسىيە پەيدا قىلىدىغان ئالاھىدىلىككە ئىگە كېسەللىكلەر-دۇر. كېسەل سەۋەبى كۆپىنچە ئاللىبىرگىيىلىك رېئاكسىيە بىلەن مۇناسىۋەتلىك، ئەمما غەيرىي ئاللىبىرگىيىلىك رېئاكسىيەگە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىرىمۇ بار. نۆۋەتتە تۈرگە بۆلۈش بىر دەك ئەمەس، بەزىلەر تېرە ياللۇغىنى ئېگىزىما تۈرىدىكى تېرە كېسەللىكلىرى قاتارىغا كىرگۈزگەن. بىز بۇنى ئادەتلىككەن تۈرگە ئايرىش بويىچە يىغىنچا قىلاپ، ئاللىبىرگىيىلىك تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ دائىرىسىگە كىرگۈزدۇق.

18. تېگىشىش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى

تېگىشىش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى — سىرتتىن كەلگەن مەلۇم بىر خىل كېسەل پەيدا قىلغۇچى ماددىنىڭ تېرىگە تېگىشىشىدىن كېلىپ چىققان ئۆتكۈر تېرە ياللۇغىدىن ئىبارەت. بۇ ئىمتىيىن كۆپ كۆرۈلىدۇ.

كېسەللىك سەۋەبى: ئادەتتە غىدىقلىنىشتىن بولغان تېرە ياللۇغى، ئاللىبىرگىيىلىك تېرە ياللۇغى دەپ ئىككى تىپقا بۆلۈنىدۇ:

1. غىدىقلىنىشتىن بولغان تېرە ياللۇغى: بۇ بۇرۇن غىدىقلىنىشتىن بولغان بىرلەمچى تېرە ياللۇغى دەپ ئاتىلاتتى. كېسەل پەيدا قىلغۇچى ماددا ئورگانىزمنىڭ چىدامچانلىقىدىن ئېشىپ كەتسە، تۇنجى قېتىم تەگسىمۇ غىدىقلىنىش تۈپەيلىدىن ئاللىبىرگىيىلىك تېرە ياللۇغى پەيدا بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

2. ئاللىبىرگىيىلىك تېرە ياللۇغى: بەزى تېنى ئالاھىدە سەزگۈر ئاز ساندىكى كېسەللەر، تۇنجى قېتىم سەزگۈرلۈك پەيدا قىلغۇچى مەلۇم ماددىغا يولۇققاندا 20~4 كۈن يوشۇرۇن دەۋرىنى ئۆتكۈزىدۇ، مەزكۇر ماددىغا يەنە بىر قېتىم يولۇقسا 2~1 كۈن ئىچىدىلا كېسەللىك پەيدا بولىدۇ. كېسەللىك مېخانىزمىدىن قارىغاندا، بۇ ئاللىبىرگىيىلىك تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ IV تىپىغا مەنسۇپ.

3. كېسەل پەيدا قىلغۇچى ماددىلار: غىدىقلىغۇچى ماددا ۋە ئافىلاكتوگېن دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. ئالدىنقىسى خىمىيە سانائەت خام ئەشيانى، كۈچلۈك كىسلاتا، كۈچلۈك ئىشقار، سىماب ۋە خروم خىمىيەۋى بىرىكمىلىرى ۋە ھاياتيات زەھىرى، كېيىنكىسى دورىلار، دېھقانچىلىق دورىلىرى، گىرىم بۇيۇملىرى، تېرە،

ئۆسۈملۈك شىرنىسى ياكى گۈل يوپۇرماقلىرى قاتارلىقلاردۇر. فورمالىن ۋە خىروم كىسلاتا تۈزلىرىغا ئوخشاش بەزى كېسەل پەيدا قىلغۇچى ماددىلارنىڭ ئوخشىمىغان قويۇقلۇقتىكىمىلىرى غىدىقلاشنى ياكى سېزىمچانلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش تەسىرىگە ئىگە. سېزىمچانلىقنى ئەڭ كۆپ پەيدا قىلىدىغان ئانافلاكتوگېن خام ئۇرىش (*urish*) دۇر. بۇرۇن ئۇنىڭ پارغا ئايلاپلايدىغان تەركىبى ئۇرىشئول (*urishiol*) پەيدا قىلىدۇ دەپ قارالغانىدى. ھازىر دۆلىتىمىزدە ئۇرىشئولنىڭ پارغا ئايلىنىدىغان تەركىبى نون فېنىئول (*nonphenol*) ۋە ئۇرىش سېنسېتىۋى لاکتون (*urish sensitivi lacton*) دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل ماددىمۇ ئۇرىشلىق تېرە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

كىلىنىك قىيىنچىلىقلىرى: گۇمانلىق ياكى ئېھتىمال تېپىش تارىخى بولىدۇ، شۇنداقلا ئەگىشىپلا تەككەن ئورۇندا ئۆتكۈزۈلۈشى كېلىشىمى پەيدا بولىدۇ، ئۇنىڭ ئېغىر - يېنىمىلىك دەرىجىسى، كېسەل پەيدا قىلغۇچى ماددىنىڭ خاراكتېرى، قويۇقلۇقى، يولۇققان ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن - قىسقىلىقى ۋە يەككە تەننىڭ رېئاكسىيەچانلىقى قاتارلىقلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك. يېنىمىلىك دەرىجىدىكى قىزىل داغ، دۆڭچە ئەسۋە، سۇلۇق قاپارتقۇ ياكى چوڭ قاپارتقۇ بولىدۇ. ناۋادا كېسەل پەيدا قىلغۇچى مەنبە كۈچلۈك غىدىقلىغۇچى ماددىلار بولسا، ھەتتا ئېكروز بارلىققا كېلىدۇ. تېرە ئەسۋىسى ئادەتتە بىر خىللا بولىدۇ. مەلۇم بىر تېرە ئەسۋىسى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ. بۇنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى ۋە شەكىل ھالىتى تەككەن ماددىنىڭ دائىرىسى بىلەن ئاساسەن بىر دەك، گىرۋىكى نىسبەتەن ئېھتىمال بولىدۇ (1.5- رەسىم). كېسەللەنگەن ئورۇن كۆپىنچە تەككەن ئوچۇق ئورۇن بىلەنلا چەكلىنىدۇ. ئەگەر تەككەن ماددا چاڭ - توزانلىق ياكى پارغا ئايلىنىپ تارقىلىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بولسا، يېھىق تۇرغان تېرىدىمۇ ئەسۋە پەيدا قىلىدۇ. كېسەلدە قىچىشىش ياكى كۆيۈپ قىزىش سېزىمى ئوخشىمىغان دەرىجىدە يۈز بېرىدۇ. ئېغىرلىرىدا ئاغرىش، قىزىتما، توڭلاپ تىتىرەش قاتارلىق پۈتۈن بەدەننىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كېسەل جەريانى ئۆزلىكىدىن چەكلىنىدۇ، كېسەل سەۋەبىنى يوقىتىپ، مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلغاندىن كېيىن كۆپىنچە 2 ~ 1 ھەپتە ئىچىدىلا تولۇق ساقىيىپ كېتىدۇ، ئەمما يەنە تەككە كېسەللىك قايتىلىنىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: ئادەتتە تېپىش تارىخى، تېرە ئەسۋىسىنىڭ شەكىل ھالىتى، ئورنى قاتارلىقلارغا ئاساسەن دىئاگنوزنى قويغىلى بولىدۇ. ئېكزىما ۋە تىلىما كېسەللىرىدىن پەرقلىنىدۇرۇش لازىم. ئۇلار مەزكۇر باقتا ئايرىم - ئايرىم سۆزلىنىدۇ.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش: ئالدى بىلەن كېسەل پەيدا قىلغۇچى ماددىنى يوقىتىپ، ئاندىن تۆۋەندىكىدەك بىر تەرەپ قىلىنىدۇ:

1. سىرتتىن دورا ئىشلىتىش: ئادەتتە يەرلىك ئورۇن سىمپتوماتىك بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. مەسىلەن: قىزىرىپ ئىششىش، دۆڭچە ئەسۋە ياكى كىچىك سۇلۇق قاپارتقۇلارغا كالاھىن يۇغۇچى ياسالغىنى سۈرتىلىدۇ، ناۋادا چوڭ قاپارتقۇ ۋە شەلۋەردەش بولسا ئالدى بىلەن قاپارتقۇ ئىچىدىكى سۇيۇقلۇقنى چىقىرىۋېتىپ، ئاندىن ئېرىتمە بىلەن سوغۇق كومپرىس قىلىنىدۇ. ئۆتكۈر لۈك ئەھۋالى ياخشىلانغاندىن كېيىن سىنىك ئوكسىد پاستىسى ياكى

مېيىنى ئىشلىتىشكە ئۆزگەرتىلىدۇ ۋە ياكى كورتىكومىستروئىد ئىمۇلىسىيىسى سۈرتىلىدۇ.

2. ئىچىدىن دورا ئىشلىتىش: تېرە ئەسۋىسى كەڭ كۆلەمدە بولسا ياكى قىزىتما قاتارلىق باشقا ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كەلسە، ھىستامىنغا قارشى دورىلار، ۋىتامىن C ئىچكۈزۈلىدۇ ياكى كالتسىي ياساللىمىلىرى ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى تۆتىنچى بايتا تەپسىلىي بايان قىلىنىدۇ.

3. ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپى: كېسەل پەيدا قىلغۇچى ماددىغا قايتا يولۇقۇشتىن ساقلىنىپ، سۇلغا نىلامىد مەلھىمى، پېنتسىلىلىن مەلھىمى، سالىقىنلاشتۇرۇش مېيى قاتارلىق ئاسان سەزگۈرلۈك پەيدا قىلىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىش مەنى قىلىنىدۇ. كېسەل پەيدا بولغاندا ئۆز ۋاقتىدا داۋالاپ غەدىقلىنىشتىن ساقلىنىپ، كېسەللىك ئەۋالى يامانلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. خام *urish* قا زىيادە سەزگۈر ئىشچىلارغا سىر دەرىخى يود بۇرھىقى نايناتىمىسى ئىچكۈزۈلسە، خام *urish* قا چىدامچانلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ.

28. دورا ئەسۋىسى

دورا ھەر خىل يوللار ئارقىلىق بەدەنگە كىرگەندىن كېيىن كېلىپ چىققان تېرە ئەسۋىسى—دورا ئەسۋىسى ياكى دورا مەنبەلىك تېرە ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ، ئېغىرلىرىغا سىستېمىلىق زەخمىلىنىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

كېسەللىك مەۋجىتى: دورا ئەسۋىسىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبى ئىنتايىن مۇرەككەپ بولۇپ، ئادەتتە تۆۋەندىكى ئامىللارغا مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىدۇ:

1. ئاللىرىگىيىلىك رېئاكسىيە: كۆپ ساندىكى دورا ئەسۋىسىنىڭ كېسەللىك مېخانىزمى مى ئاللىرىگىيىلىك رېئاكسىيىگە مۇناسىۋەتلىك، بەدەن سۇيۇقلۇقى ئىمىمونىتى ياكى ھۈجەيرە ئىمىمونىتى رېئاكسىيىسىدىن كېلىپ چىقىدۇ ياكى ئىككىلىسى بىرلىكتە پەيدا قىلىنىدۇ. بۇنى يەككە تەن ئالامىدە سەزگۈر تەننىڭ سىپاسى بەلگىلەيدۇ. شۇڭلاشقا دورا ئىشلەتكۈچىلەر گەرچە كۆپ بولسىمۇ، ئەمما كېسەل ئىنتايىن ئاز ساندىكىلىرىدە يۈز بېرىدۇ. تۆتىنچى قېتىم دورا ئىشلەتكەندە 20~4 كۈنگىچە يوشۇرۇن دەۋرى (سەزگۈرلىشىش ۋاقتى) بولىدۇ. بۇ مەزگىلدە يەنە قايتا دورا ئىشلىتىلسە بىر نەچچە مىنۇتتىن 24 سائەتكىچە تېرە ئەسۋىسى چىقىدۇ (رېئاكسىيە ۋاقتى). دورا ئەسۋىسى كۆرۈلىشىمۇ، مەزكۇر دورا يەنە ئىشلىتىلسە قايتا قوزغىلىدۇ. بەزى كېسەللەردە ھەتتا قايىچىلاشما سەزگۈرلۈك ياكى كۆپ مەنبەلىك سەزگۈرلۈك كۆرۈلىدۇ. بۇ تۈردىكى دورا ئەسۋىسىنى كۆپرەك كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان دورىلاردىن: بىئولوگىيىلىك ياساللىملار؛ ئافىتىمىئوتىكىلاردىن: پېنتسىلىلىن؛ قىزىتما قايتۇرۇپ ئاغرىق توختاتقۇچى دورىلاردىن: پىرا-زولون تۈرىدىكى دورىلار ۋە سالتسىيىلىك كىسلاتا تۈزۈ ياساللىمىلىرى؛ سۇلغا نىلامىدلار، باربىتال تۈرىدىكى دورىلار، بەزىگە كەككە قارشى دورىلار ۋە بەزى ئېغىر مېتال ياساللىمىلىرى قاتارلىقلار بار. جۇڭخىي دورىلىرىنىڭ دورا ئەسۋىسى پەيدا قىلىشى نىسبەتەن ئاز ئۇچرايدۇ. ئەمما پەربۇن، مۇرەككەپ سازاڭ، ئوسما يىلتىزى، چۈەن شىنلەن قاتارلىقلارنىڭ ئوكۇلىمۇ دورا ئەسۋىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى مەلۇم بولدى.

2. زەھەرلىك رېئاكسىيىسى: بىسمۇت، ئارسىن، يود بىرىكىملىرى

ۋە بىرۈم بىرىكىمىلىرى قاتارلىقلارنى ئۇزۇن مۇددەت، كۆپ مىقداردا ئىشلەتكەندە ياكى چىگەر، بۆرەك خىزمىتى تىنچلىقىغا ئۇچرىغاندا بۇ خىل ئەھۋال ئاسانلا يۈز بېرىدۇ.

3. فوتوزېنسىتېزاتسىيە (*Photosensitization*): فوتوزېنسىتېزاتسىيەلىك بەزى دورىلار ئورگانىزىمغا كىرگەندىن كېيىن، ئۇلار بىلەن بىللە نۇر چۈشكەندە ئۇنىڭ كېلىپ چىقىدۇ. بۇ نۇر زەھەرلىك رېئاكسىيەسى ۋە نۇر ئاللىبىرگىيەلىك رېئاكسىيەسى دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. فوتوزېنسىتېزاتسىيەنى كۆپرەك پەيدا قىلىدىغان دورىلار: سۇلفا ئىلامىدلار، سېدورمىد، ئاياللىق ھورمونى، فېنوتىئازىن تۈرىدىكى دورىلار، ۋېنتىرىن، تېتراتسىكلېن گۇرۇپپىسىدىكى دورىلار، گرىزېئوفۇلۋىنۇم ۋە جۇڭگىي دورىلىرىدىن جىن كېۋىزى، داغۇر داڭگۇيى قاتارلىقلاردۇر. ئون ئۈچىنچى بايىمىكى فوتوزېنسىتېزاتسىيەلىك تېرە ياللۇغىدىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ.

كەينى ئىپادىلىرى: كېسەل بولۇشتىن بۇرۇن دورا ئىشلەتكەن تارىخى بولىدۇ، رېئاكسىيە ۋاقتىدىن كېيىن تېرە ئەسۋىسى ئۆرلەيدۇ. تېرە ئەسۋىسىنىڭ شەكىل ھالىتى كۆپ خىل بولۇپ، بىر خىل دورا ئوخشىمىغان تىپتىكى تېرە ئەسۋىلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇنداقلا بىر خىل تېرە ئەسۋىسىنى ئوخشىمىغان ھەر خىل دورىلارمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، كۆپ كۆرۈلىدىغان تېرە ئەسۋىسى تۆۋەندىكىدەك نەچچە خىل بولىدۇ:

1. مۇقىم قىزىل داغ تىپلىق دورا ئەسۋىسى: ئەڭ كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇ يۇمىلاق ياكى سۇيۇقلۇق شەكىللىك سۇلۇق ئىشلىتىلىش قىزىل داغ بولۇپ، مەركىزى قېنىق قىزىل، چېگرىسى ئېنىق، ئۇنىڭ ئۈستىدىن سۇلۇق قاپارتقۇ ياكى چوڭ قاپارتقۇ بارلىققا كېلىدۇ، تېرە ئەسۋىسى تېرە بىلەن شىللىق پەردە چېگرىسىدا ئاسان پەيدا بولىدۇ، ئەمما باشقا ئورۇنلاردىمۇ يۈز بېرىدۇ. قىچىشىش روشەن بولىدۇ، كېسەللىك جەريانى ئىككى ھەپتە داۋاملىشىپ ئاندىن تولۇق ساقىيىدۇ. ئەمما ئېغىرلاردا كېسەللىك جەريانى ئىككى ھەپتە ئۇزۇن بولۇپ، شىللىق پەردە بوشلۇقىغا تەسىر قىلىدۇ، ئاغرىش ھېس قىلىدۇ، قىزىتما ۋە باشقا ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. كۆپ ھاللاردا كېسەللىك جەريانى ئۇزۇن بولىدۇ، تېرىدىكى بىرلەشمى زەخمىلىنىش يانغاندىن كېيىن مەزكۇر ئورۇندا پېگمېنت چۆكمىسى قالىدۇ (2.5-رەسىم). ئەگەر بۇ دورىنى يەنە ئىچسە تېرە ئەسۋىسى بۇرۇنقى ئورۇندا پەيدا بولغاندىن سىرت، باشقا ئورۇنلاردىمۇ پەيدا بولىدۇ. تەكرار دورا ئىچمەسە تەكرار قوزغىلىپ، شۇ ئورۇندىكى پېگمېنت چۆكمە دېغى تەدرىجى كېسىكىلىپ، رەڭگى قېنىقلىشىدۇ. بۇ مەزكۇر تىپتىكى تېرە ئەسۋىسىگە دىئاگنوز قويۇشتا ئالاھىدە ئەھمىيەتكە ئىگە.

2. قىزىل داغ تىپلىق دورا ئەسۋىسى: ئىسپاتى تەن كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇ ئىسكاراتىمنا-سىمان ۋە قىزىلسىمان دەپ ئىككى خىل تىپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئادەتتە كېسەللىك چىددىي باشلىنىپ، تېرە ئەسۋىسى بويۇن، يۈزدىن، گەۋدە ۋە تۆت مۇچىگىچە تېزلىكتە تەرىقىي قىلىدۇ. ئالدىنقىسىدا چوڭ پارچىلىق قىزىل داغ، كېيىنكىسىدە داغلىق دۆڭچە ئەسۋە زەخمىسى بولۇپ، خۇددى ئىسكاراتىمنا ۋە قىزىلغا ئوخشايدۇ، كەڭ كۆلەمدە تارقىلىدۇ، ئېغىر بولسا پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدۇ، قىچىشىش كۆرۈنەرلىك بولىدۇ، كۆپىنچە تىترەش، قىزىتما، باش ئاغرىش، ئىشتىھا تۇتۇلۇش قاتارلىق پۈتۈن بەدەنلىك

ئالامەتلەر قوشۇلىدۇ. ئەمما ئىسكىلاتىمىز ۋە قىزىلىنىش باشقا ئالامەتلىكلىرى كۆرۈلىدۇ، 1~2 ھەپتەدە ساقىيىدۇ.

3. ئېشەك يېمى تىپلىق دورا ئەسۋابى: نىسبەتەن كۆپ كۆرۈلىدۇ. شەكىل-ھالىتى بىر دەك بولمىغان، چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان يەلتاشما ئۆرلەپ، شىددەتلىك قىچىشىدۇ، قىزىتما ۋە ھەزىم قىلىش يوللىرى ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئاز ساندىكى كېسەل لەردە ئاللىبىرگىيەلىك شوك بىرلىكتە يۈز بېرىدۇ.

4. چوڭ قاپارتمىلىق يۈزە تېرە بوشىشىش تىپلىق دورا ئەسۋابى: يۈزە تېرە زەھەردىن نېكرىزىلىنىپ ئېرىش كېسىلى تىپلىق دورا ئەسۋابى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ خەۋپلىك چوڭ قاپارتما تىپلىق دورا ئەسۋابى، ئەمما نىسبەتەن ئاز كۆرۈلىدۇ. كېسەل بولۇشتىن بۇرۇن كۆپىنچە قاتتىق چارچاش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش، ئىچى سۈرۈش، قورساق ئاغرىش ۋە قۇسۇش قاتارلىق ئالدىنقى دەۋرلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، كېيىن نەچچە سائەت ئىچىدىلا ئەسۋەپەيدا بولىدۇ. باشلانغاندا يۈز، بويۇن، كۆكرەك قاتارلىق ئورۇنلاردا قىزىل داغ ۋە يەلتاشمىغا ئوخشاش زەخمىلىنىش بولىدۇ ھەمدە بۇلار تېز سۈر-ئەتتە كېڭىيىپ ئۆز ئارا بىرلىشىپ، ئۈستىگە بوشاشقان چوڭ قاپارتمىلار (3.5-رەسىم) چىقىدۇ، «Nikolsky's» ئالامىتى مۇسپەي بولىدۇ. يۈزە تېرە كەڭ دائىرىدە سويۇلۇپ ئېچىلىپ، كۆيۈكتەك شەلۋەرىدۇ، ئېغىز بۇشلۇقى شىلىق پەردىسىگىمۇ تەسىر قىلىدۇ. پۈتۈن بەدەنلىك زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى ئېغىر بولغانلاردا قىزىتما قوشۇلىدۇ ۋە ئىچكى ئەزالارغا تەسىر قىلىدۇ، ئادەتتە تېرە ئەسۋابى ئىككى ھەپتىدىن كېيىن يوقىلىشقا باشلايدۇ، ئېغىر كېسەللەرنى ئۆز ۋاقتىدا جىددىي قۇتقۇزمىسا، يۇقۇلمىنىش، قان زەھەرلىنىش كېسىلى، بۆرەك خىزمىتى زەخمىلىنىش، ئۆپكە ياللۇغى ياكى قاناش تۈپەيلىدىن ئۆلۈپ كېتىدۇ.

5. سويۇلۇش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى تىپلىق دورا ئەسۋابى: بۇمۇ ئېغىر ئۆلۈم تېدىغان دورا ئەسۋابى، ئەمما نىسبەتەن ئاز كۆرۈلىدۇ. يوشۇرۇن دەۋرى 20 كۈندىن كۆپرەك بولىدۇ. كېسەللىك تۈيۈقسىز قوزغىلىپ، ئىلگىرىلەشچان ئېغىرلىشىدۇ. دەسلەپتە قىزىل داغ تىپلىق تېرە ئەسۋابى كۆرۈلىدۇ، نەچچە كۈندىن كېيىن ئۆز ئارا بىرلىشىپ، پۈتۈن بەدەنگە قارامتۇل قىزىل سۇلۇق ئىششىقلىق داغ يامراپ، سۇلۇق قاپارتما، شەلۋەرىش، سىرغىشىش ۋە قاقچىلىنىش يۈز بېرىدۇ، ھەتتا يۈز، بويۇن، تۆت مۇچە يىراق ئۇچى ۋە سىرتقى جىنسسىي ئەزالاردىمۇ كۆرۈلىدۇ. كېسەللەنگەندىن كېيىن سۇلۇق ئىششىق تەخەسەن ئىككى ھەپتەدە تەدرىجىي يېنىپ، كەڭ كۆلەمدە سويۇلۇشقا باشلايدۇ. قول ۋە پۇتلار خۇددى تۆشۈك پەلەي ۋە تۆشۈك پايپاققا ئوخشاش سويۇلىدۇ (4.5-رەسىم). پۇت-قولنىڭ تىرىناقلىرى ۋە چاچمۇ چۈشۈپ كېتىدۇ. سويۇلۇش تەكرار يۈز بېرىپ بىر ئاي ياكى ئۈچ كۈن ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇنراق داۋاملىشىدۇ. دائىم پۈتۈن بەدەنلىك تۈگۈنلىرىنىڭ چوڭىمىشى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى كۆپىنچە 39°C تىن يۇقىرى بولىدۇ. ئېغىر كېسەللەردە جىگەر، بۆرەك ۋە نەپەسلىنىش سىستېمىسىغا تەسىر قىلىپ، ھاياتىغا خەۋپ يەتكۈزىدۇ، شۇڭا پائال جىددىي قۇتقۇزۇش لازىم.

دېئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دېئاگنوزى: ئادەتتە دورا ئىچكەن تارىخى، يوشۇرۇن دەۋرى، تېرە ئەسۋابىنىڭ شەكىلى ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ئالامەتلەر

ئانا لىزىغا ئاساسەن دىئاگنوز تىكلەندۈرۈلگەن بۇنى تۆۋەندىكى كېسەللىكلەردىن پەرقلەندۈرۈش لازىم:

1. كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ: ئون سەككىزىنچى بايقا قارالسۇن.
2. قىزىل: بۇ تارقىلىشچان كېسەللىك. ئالدى بىلەن نەپەسلىنىش يوللىرىدا كاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلەر نەپەس تەن ئېغىر بولىدۇ. ئەسۋە چىقىرىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن قوۋۇز شىلىق پەردىسىدە «Koplik» دېغى پەيدا بولىدۇ، تېرە ئەسۋىسى قۇلاق كەينى، بويۇن، چاچ گىرۋەكلىرى قاتارلىق ئورۇنلاردىن باشلىنىپ يۈز، گەۋدە، تۆت مۇچە ۋە ئالغان بىلەن تاپان قاتارلىق ئورۇنلارغا تەدرىجىي يايىلىدۇ، قىچىشىش روشەن بولمايدۇ.

3. ئىسكارلاتىنا: يۇتقۇنچا قان تولۇش روشەن بولۇپ، تىل «مېرىكا دەرىخىنىڭ مېۋىسى» گە ئوخشاپ قالىدۇ. ئېغىز ئەتراپى تاتىرىپ، بويۇن لىمفا تۈگۈنى ئىشىپ، پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلەر روشەنلىشىدۇ. تېرە ئەسۋىسى پارچە-پارچە توق قىزىلغا ئايلىنىپ، ئەسۋىلەر ئارىسىدا ئازراق قۇ نورمال تېرە بولمايدۇ، بۇ ئەھۋال قاتلىنىدىغان ئورۇنلاردا تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ. كۆپىنچە قان قېيىش دېغى كۆرۈلىدۇ، قىچىشىش رو-شەن بولمايدۇ. ئەتراپ قان رايىدا ئاق قان ھۈجەيرىلىرى ۋە نېپىترال دانىلىق ھۈجەيرىلەر كۆپىيىدۇ.

داۋالاش: گۇمانلىق دورىنى دەرھال توختىتىپ، بەدەندىكى دورىنىڭ سىرتقا چىقىرىلىشىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن، كۆپرەك سۇ ئىچىش، زۆرۈر تېپىلغاندا سۇيۇقلۇق بېرىش لازىم. ئادەتتە يەڭگىلەكلەرگە ھىستامىنغا قارشى دورىلار، ۋىتامىن C ياكى كالىتسىيە-سالىسىلىرى بېرىپ، يەرلىك ئورۇن سىمپتوماتىك بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىن، تېرە ئەسۋىسى تېزراق يوقىلىدۇ. ئېغىر بولسا يۇقىرىدىكى دورىلارنى ئىشلىتىش بىلەن بىللە كور-تىكوسىتروئىد ھورمونلىرىدىن پرىدنىزون كۈنىگە $20 \sim 40mg$ دىن ئىچكۈزۈلىدۇ ياكى ھىد-روكورتىزون $200mg \sim 100$ دىن ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. دورا مىقدارى كېسەللىك ئالامىتى ياخشىلانغاندىن كېيىن تەدرىجىي ئازايتىلىپ توختىتىلىدۇ. يۈزە تېرە زەھەرلىنىشتىن ئېكرۇز-لىنىپ ئېرىش قىيىنلىق دورا ئەسۋىسى ۋە سويۇلۇشچان تېرە ياللۇغى قىيىنلىق دورا ئەسۋىسىدە، يۇقىرىدىكى بىر تەرەپ قىلىشلارنى قوللانغاندىن سىرت، تۆۋەندىكى تەد-بىرلەرنى كۈچەيتىش لازىم:

1. ھىدروكورتىزوننىڭ كۈندىلىك مىقدارىنى $200 \sim 400mg$ غا كۆپەيتىپ، بۇنىڭغا ۋىتامىن C دىن $2g \sim 1$ ، گلۇكوزىدىن $2000 \sim 1000ml$ قوشۇپ ۋېناغا ئاستا سۈرۈش تېمىتىلىدۇ.

2. سۇيۇقلۇق بىلەن ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقىغا دىققەت قىلىش: كورتىكوسىتروئىد-نى ئىشلەتكەندە قاندا كالىي ئازىيىش ئەھۋالىنىڭ بار-يوقلۇقىغا دىققەت قىلىش لازىم. زۆرۈر تېپىلغاندا قان ياكى قان شىرىسى بېرىلىدۇ.

3. دېزىنېفىكسىيە تەدبىرىنى قوللىنىپ ئىمىكىلەمچى يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش: كېسەلخانا بىلەن كىرلىكلەرنى دېزىنېفىكسىيە قىلىپ مىكرو بىسىز لاندۇرۇش، تىببىي خادىم-لار مىكرو بىسىز مەشخۇلاتنى قەتئىي ئىجرا قىلىشى، ناۋادا يۇقۇملىنىش بولسا، ئال-تېنىمۇ تىكلارنى ئىمىكا نىيەتلىك بېرىپ بەلگىلەش لازىم.

4. پەرۋىشنى كۈچەيتىش: ئېغىر كېسەللەر قاتارىدا پەرۋىش قىلىش لازىم (تۆ-
تىنچى باب ئىككىنچى پاراگرافقا قارالسۇن). قاتلىنىپ تۇرىدىغان ئورۇنلار تېرىسىدىكى
شەلۋەرنى 3% لىك دانىكا كىسلاتا ئېرىتمىسى بىلەن يۇيۇپ، گېنېتىيان ۋېتولىست ئې-
رىتمىسى سۈركىلىدۇ؛ كۆز زەخمىلىگەندە ئانتىبىيوتىك كۆز مەلھىمى ۋە كورتىكوستېرو-
ئىد كۆز دورا سۈيىمى ئىمىكانىيەتنىڭ بېرىچە بالدۇرراق ئىشلىتىش؛ ئېغىز بوشلۇقىنى 2%
لىك ناترىي بىكاربونات ئېرىتمىسى بىلەن چايناش، ئاندىن گېنېتىيان ۋېتولىست سۈركەش،
پات - پات بەدەننى ئۆرۈپ، سۈرتۈپ، ياتاق يارىسى ۋە يىغىلىش خاراكتېرلىك ئۆپكە
ياللۇغى يۈز بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

5. جۈگىچە داۋالاش: دەسلەپكى دەۋرىدە ئىسسىقلىقنى قايتۇرۇپ، زەھەرنى تازىلاش،
قاننى سۈۋۈتۈپ، ئەملىكنى ھەيدەش مۇۋاپىق. ئادەتتە يىڭى خۇا، لىيەنچىياۋ، مامكاپ،
خام ئەگرى سۇناي، ئوسما يوپۇرمىقى، قىزىل چوغلۇق، فۇلىڭ، ياۋا كەشمىر، چۈچۈك بۇيا
قاتارلىقلار قاينىتىپ ئىچكىزۈلىدۇ. ئەسلىگە كېلىش دەۋرىدە مۇسپىيلىكنى قۇۋۋەتلەش، تالنى
ساغلاملاشتۇرۇش، ئەملىكنى يوقىتىش لازىم. دائىم شىقىلداق، يۈەن شېن، شىخۇ، زىدەن شېن، بەي-
جۇ، يېشى پۇرچاق، سىڭىيرىن، خۇاڭبۇ قوۋزىقى، خام چۈچۈك بۇيا، تۇفۇلىڭ قاتارلىقلار
قاينىتىپ ئىچكىزۈلىدۇ. ئېغىر كېسەللەرگە قىزىتمىنى قايتۇرۇپ زەھەرنى تازىلاش، بە-
دەننى تازىلاپ مۇسپىيلىكنى قۇۋۋەتلەش مۇۋاپىق، بۇنىڭغا ئادەتتە شىجياۋ دېخۇاڭتياڭ قا-
ناتىمى تەركىبى كۆپەيتىلىپ ياكى ئازايتىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

ئالدىنقى ئېلىش: دورا ئىشلىتىشتىن بۇرۇن دورا ئەسۋابى ياكى باشقا ئاللىرىگىيە-
لىك كېسەل تارىخىنىڭ بار - يوقلۇقىنى تەپسىلىي سوراش لازىم؛ مۇناسىۋەتلىك داۋالاش-
پەرۋىش تۈزۈمىنى ئەستايىدىل ئىجرا قىلىپ، دورا سەزگۈرلۈك سىنىقىمىنى ياخشى ئىشلەش
لازىم، دورا ئىشلەتكەندە كۆرسەتكۈچ بولۇش، قالايمىقان قارىغۇلارچە ئىشلىتىشتىن ساق-
لىنىش كېرەك. داۋالاش جەريانىدا كېسەللىك ئەھۋالى يېتىندىن كۆزىتىلىدۇ، ناۋادا كې-
سەلدە قىزىتما، تېرە ئەسۋابى، قىچىشىش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلسە گۇمانلىق دورى-
نى دەرھال توختىتىپ، سەۋەبىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش لازىم. دورا ئەسۋابى دەپ دىئا-
گنوزى مۇقىملاشتان بولسا، شۇ دورىنى مەنى قىلىش كاپىيەسىنى تۇرغۇزۇش، ھەمدە كېسەل تارى-
خىنىڭ بىرىنچى بېتىگە رېئاكسىيە قىلىدىغان دورىنى ئەسكەرتىپ تىببىي خادىملارنىڭ پايدى-
لىنىشىغا قولايلىق يارىتىش كېرەك.

38. ئېكزېما

ئېكزېما (ھۆل تەمرەتكە) — كۆپ ئۇچرايدىغان، ئېپېتېمال ئاللىرىگىيىلىك ئامىل بىل-
ەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئۇزە تېرە ياللۇغلىنىدىغان، رېئاكسىيە خاراكتېرلىك تېرە كېسەلى.
بۇنىڭ زەخمىسى كۆپ شەكىللىك، سىرغىمىلىق، سىجىپتىرىك، سوزۇلما تەكرار قوزغىلىشقا
مايىل ۋە شىددەتلىك قىچىشىش قاتارلىق ئالاھىدىلىككە ئىگە.

كېسەللىك سەۋەبى: كېسەل پەيدا بولۇش سەۋەبى ئىنتايىن مۇرەككەپ، نۆۋەتتە بە-
دەن ساپاسى ئامىلى، ئاللىرىگىيىلىك رېئاكسىيە ۋە روھىي - نېرۋا قاتارلىقلار بىلەن مۇ-
ناسىۋەتلىك دەپ قارالماقتا. ئىرسىيەت ئامىلى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن.

دەپمۇ تۇنۇلىدۇ، سەزگۈر تەن ساپاسىلىقى كېسەللەردە يۇقۇلمىنىشتىن بولغان كېسەل ئۈچىتى، ئۈچەي يولىدىكى پارازىت قۇرت، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، ماددا ئال- مىنىشنىڭ توسالغۇغا ئۇچرىشى، ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ قالايمىققا ئېلىشى، بېلىق، راک، گۈلچىڭى ياكى چاڭ - توزان، كانا، ھاۋا رايى ئامىلىلىرى، مەلۇم ئۆسۈملۈكلەر، پەي ياكى توقۇلما بۇيۇملىرى، سوپۇن، پۇراقلىق ماتېرىياللار، بويلاق، كۆپ تەرلەش ياكى تەرىلمەسلىك قاتارلىق بەزى ئىچكى - تاشقى ئامىللار ئېكزېمىنى قوزغىتىدۇ ياكى ئېغىرلاشتۇرىدۇ. روھى جىددىلىشىش، زىيادە چارچاش، قاغۇرۇش، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق باشقا ئامىل لارنىڭمۇ بۇ كېسەلنىڭ يۈز بېرىشى ۋە كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن مۇناسىۋ ىتى بار. كېسەللىك مېخانىزمىدىن قارىغاندا، ئېكزېما يۇقىرىدا بايان قىلىنىغان مۇناسىۋەتلىك ئامىللار كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان كېچىكىپ پەيدا بولۇش تىپلىق ئالېرگىيىلىك تېرە كېسەللىكىدۇر.

كېلىشك ئىپادىلىرى: ئادەتتە كېسەل باشلىنىشنىڭ ئاستا - تېزلىكىگە ئاساسەن ئۆتكۈر، سۇس ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما دەپ ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

1. ئۆتكۈر ئېكزېما: زەخىملىنىش دەسلەپتە قىزىل داغ بولۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن تېزلىكتە دۆڭچە ئەسۋە، سۇلۇق قاپارتقۇ ياكى دۆڭچە قاپارتىملىق ئەسۋە ناھايتى تېزلا پەيدا بولىدۇ، ئادەتتە مەلۇم بىر تېرە ئەسۋىسى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ ھەمدە كۆپ خىل زەخىملىنىش بىر ۋاقىتتىلا مەۋجۇت بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا زەخىملىنىشنىڭ چېگرىسى كۆپىنچە ئېنىق بولمايدۇ (5.5 - رەسىم). تاتلىغاندا ۋە يۇيۇپ سۈرتكەندە، ئىنتايىن ئاسانلا شەلۋەرەپ سۈيى چىقىدۇ. ناۋادا ئىككىلەمچى يۇقۇملانسا يىرىكلىق قاپارتقۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ تۆت مۆچىنىڭ ئىككىلىدىغان تەرىپىدە، قول، يۈز، سىرتقى چىن- سىي ئەزالار ۋە ئەمچەك قاتارلىق ئورۇنلاردا ئاسان يۈز بېرىپ، ئادەتتە سىمىيىتىرىك تارقىلىدۇ. شىددەتلىك قىچىشىش ھېس قىلىدۇ، تۇتقا قىلىق قوزغىلىدۇ، ئىسسىق غىدىق- لىغاندا، ھاراق ئىچكەندە ۋە كەيپىياتى داۋالغۇپ تۇرغاندا تېخىمۇ قوزغىلىدۇ.

2. سۇس ئۆتكۈر ئېكزېما: كۆپىنچە ئۆتكۈر ئېكزېمىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئەسلىدىكى زەخىملىنىش تەدرىجى يوقىلىپ، تەڭگە قاسراق ۋە قاقچ پەيدا بولىدۇ، بۇ مۇشۇ دەۋردىكى ئېكزېمىنىڭ ئالاھىدىلىكى (6.5 - رەسىم). بۇنىڭدىمۇ قىچىشىش يەنىلا روشەن بولىدۇ. داۋاملىق بىر تەرەپ قىلىش ئارقىلىق بىرنەچچە ھەپتە ئىچىدىلا ساقىيىپ كېتىدۇ. ئەگەر غىدىقلىنىشتا ئۇچرىسا، ئۆتكۈر ئېكزېمىغا ئايلىنىدۇ.

3. سوزۇلما ئېكزېما: يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككى خىل ئېكزېما كۆپ قېتىم تەكرار قوزغالغاندىن كېيىن، سوزۇلما ئېكزېمىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ. ئەمما كېسەللىك سوزۇلما باشلى- مىدىغانلىرىمۇ بار. بۇنداق ۋاقىتتا كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ تېرىسى قېلىنلاپ، سىرتقى يۈزى يىرىكلىشىپ كېچىكلىشىدۇ ۋە قارامتۇل قىزىل بولۇپ قالىدۇ ياكى پېگمېنت چۆكمىسى قور- شۇلىدۇ، كۆپىنچىلىرى ئوخشىمىغان دەرىجىدە لىشايلىشىدۇ، چېگرىسى ئېنىق بولمايدۇ (7.5 - رەسىم). قىچىشىش بەزىدە يەڭگىل، بەزىدە ئېغىر قوزغىلىدۇ. كېسەل جەريانى- نى ئاستا بولۇپ، نەچچە ئاي ياكى نەچچە يىل داۋاملىشىدۇ، بۇجەرياندا ئىم تەكرار قوزغىلىپ، ئۆتكۈر ئېكزېمىغا ئايلىنىپ قالىدۇ. ئېكزېما كېسەللىك جەريانى بويىچە تۈرگە

ئايىرىلىشتىن سىرت، تېرە ئەسۋىسىنىڭ شەكىل - ھالىتى، چىققان ئورنى ۋە ئوخشاشمىغان كېسەل سەۋەبى قاتارلىقلارغا ئاساسەنمۇ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: داچەنسىمان ئېك زېمىن، ئۇرۇقدان خالىتى ئېكزېمىسى ۋە پاقالچاق ۋېنوسى ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىش خاراكتېرلىك ئېكزېمى قاتارلىقلار. ئەمما ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى ۋە ئۆزگىرىش جەريانى يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئۈچ باسقۇچ ئىچىدە بولىدۇ.

مەزكۇر كېسەل مۇۋاپىق داۋالاش بىلەن بىللە، ھەرخىل قوزغاتقۇچى ئامىللار - دىن ساقلىنىش كۆپىنچىسى ۋاقىتلىق پەسىيىدۇ، ئەمما يەنىلا ناھايىتى ئاسان قوزغىلىدۇ ياكى پەسىللىك قوزغىلىدۇ. يەنە بەزى ئاز ساندىكى كېسەللەرنىڭ كېسەللىك ئالاھىتى تەدرىجىي يەڭگىلەيدۇ، سېزىمچانلىقىنى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق ساقىيىپ كېتىدۇ.

دېئاگنوز: كۆپ شەكىللىك زەخمىلىنىش، سىرغىشقا يۈزلىنىش، سىمىيىتىرىك تارقىلىش، شىددەتلىك قىچىشىش ۋە تەكرار قوزغىلىش قاتارلىق ئالاھىدىلىكلەرگە ئاساسەن دېئاگنوز قويۇش تەس ئەمەس، بۇنى يولۇقۇشتىن بولىدىغان تېرە ياللۇغى ۋە نېرۋا خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغىدىن پەرقلىنىدۇرۇش لازىم. مەزكۇر باب ۋە ئون تۆتىنچى بابتا ئايرىم - ئايرىم بايان قىلىندى.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. ئىچىدىن دورا ئىشلىتىش: ئادەتتە ھىستامىنغا قارشى بىر خىل دورا بىلەن تىنىچلاندۇرغۇچى دورا ئىشلىتىلىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا ئوخشىمىغان تۈردىكى ئىككى خىل ھىستامىنغا قارشى دورىلارنى بىرلىكتە ئىشلىتىش بىلەن بىللە، ۋىتامىن C ياكى كالتە - سىي ياسالغىلىرى بېرىلىدۇ؛ تېرە ئەسۋىسى كەڭ كۆلەمدە تارقالغان ئۆتكۈر كېسەللەر - گە كورتىكوستېروئىد ھورمونى قىسقا مۇددەت ئىشلىتىلىدۇ، ئەمما قېرىلار ۋە بالىلارغا ئىمۇنىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم. تەكرار قوزغىلىدىغان جاھىل كېسەللەر ئۆز قېنى بىلەن ياكى ھىستامىن شارچە ئاقسىلى بىلەن داۋالىنىدۇ. ناۋادا ئىككىلىمىچى يۇقۇملىنىش يۈز بەرگەن بولسا، ئانتىبىيوتىك دورىلار قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

2. سىرتىدىن دورا ئىشلىتىش: ئۆتكۈر دەۋرىدە سىرغىشنىڭ بار - يوقلۇقىغا قاراپ، ئېرىتمىدە ھۆل كومپرىس قىلىنىدۇ ياكى يۇغۇچى سۇيۇقلۇق سۈرتىلىدۇ. سۇس ئۆتكۈر ئېكزېمىغا ئىمولىمىيە، ماي ياسالغىسى ياكى كوكىس مېيى تۈرىدىكى پاستىلار ئىشلىتىلىدۇ. سوزۇلما دەۋرىدە تەركىبىدە مۇڭگۈز ماددىنى چۈشۈرگۈچى دورىلار بار مەلھەم ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: 5% لىك سالىسىپىلىك كىسلاتا مەلھەمى ياكى 10% ~ 5 لىك قارىغاي مېيى مەلھەمى قاتارلىقلار. ئەگەر كوكىس مېيى تۈرىدىكى ياسالغىغا كورتىكوستېروئىد ھورمونى قوشۇۋېتىلسە، ئۇنىمۇ تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. كېيىنكىسىنى يالغۇز ئىشلىتىشكە مۇمكىن بولىدۇ.

3. فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى: سوزۇلما ئېكزېمىنى كۆپ قېتىم داۋالاشقا ئىشلىتىش ئۈنۈم بەرمەسە، رادىئوئاكتىپلىق ئىزوتوپ ياكى رېنتگېن دەۋالاشنى ئويلىشىشقا بولىدۇ.

4. ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپى: بارلىق گۇمانلىق ئامىللار، فىزىكىلىق، خىمىيىلىك ئامىللار، يېمەكلىكلەرنىڭ ھەرخىل ناچار غىدىقلاشلىرىدىن ساقلىنىش ۋە ئۆز ۋاقتىدا داۋالاپ، سوزۇلماغا ئۆزگىرىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

4§. ئۆزلۈكىدىن سېزىمچانلىقىنى خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى

ئۆزلۈكىدىن سېزىمچانلىقىنى خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى — ئۆزلۈكىدىن سېزىمچانلىقىنى خاراكتېرلىك ئېكزېما دەپمۇ ئاتىلىدۇ. كېسەلگە ئۆز بەدىنىدىكى توقۇلمىلارنىڭ پارچىلىنىشىدىن پەيدا بولغان مەلۇم ماددىلارغا سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش، يەرلىك ئورۇندىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشىنىڭ غىدىقلىشى پەيدا قىلغان كەڭ كۆلەملىك تېرە ياللۇغى رېئاكسىيىسى سەۋەب بولىدۇ.

كېسەل پەيدا بولۇشتىن بۇرۇن تېرىنىڭ مەلۇم بىر يېرىدە ئېكزېما ياكى سىرتقى يۇقۇملانغان بولغان يارا يۈزى بولىدۇ، مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىنمىسا، يەرلىك ئورۇنغا ئىشلىتىلگەن دورىنىڭ غىدىقلىشى ياكى ئۇنىڭغا سەزگۈرلۈك ئېشىپ كېتىشتىن، ئەسلىدىكى تېرە كېسەلى يامانلىشىپ، قىزىرىپ ئىشىشىپ شەلۋەرىدۇ، سىرغىش روشەن بولىدۇ، يارا ئەتراپىدىكى دۆڭچە ئەسۋە، سۇلۇق قاپار تىقۇ ۋە يىرىڭلىق قاپار تىقۇلار كۆپىيىدۇ. كېسەللەنگەن ئورۇندىن سىرغىپ چىققان سۇيۇقلۇق ئىشقارلىق بولىدۇ. سىرغىما سۇيۇق لۇقنى ساغلاملارغا (ئاپتۇر ۋە مۇناسىۋەتلىك ھەراھلىرى) داغ چاپلاش سىنىقى ئىشلىتىلگەندە نەتىجىسى مۇسبەت بولغان. بۇ سىرغىما سۇيۇقلۇقنىڭ تېرىگە نىسبەتەن غىدىقلاش تەسىرىنىڭ بارلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. شىددەتلىك قىچىشىدۇ ياكى بەزىدە كۆيۈپ قىزىش سېزىمى بولىدۇ. يەرلىك ئورۇندىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى يەنە بىر قەدەر ئىلگىرىلىگەن ھالدا يامانلىشىپ يۇقىرى پەللىگە چىققاندا، 2~1 كۈن ئىچىدە پۈتۈن بەدەنگە تۇيۇقسىز تارقاپ ئەسۋە چىقىدۇ. كېسەللىك ئالامەتلىرى خۇددى ئۆتكۈر ئېكزېمىغا ئوخشايدۇ، ئوخشاش شەكىللىك رېئاكسىيە قوشۇلۇپ، پۈتۈن بەدەن يېقىمسىزلىشىدۇ ۋە تۆۋەن قىزىتما بولىدۇ. ئەسلىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى ياخشىلانغاندىن كېيىن، پۈتۈن بەدەندىكى تېرە ئەسۋەسىمۇ تەدرىجىي يوقىلىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئالدىنقى تەخمىنەن بىر نەچچە ھەپتە ئەتراپىدا بولىدۇ. بىراق تەكرار قوزغىلىش كۆپ كۆرۈلىدۇ.

داۋالاش تەپسىلاتى ئېكزېمىنىڭكىگە ئوخشاش، ئەمما يەرلىك ئورۇندىكى يۇقۇملىنىشىنى، كونترول قىلىشنى كۈچەيتىش لازىم.

5§. ئالاھىدە رېئاكسىيىچان تېرە ياللۇغى

ئالاھىدە رېئاكسىيىچان تېرە ياللۇغى — ئالاھىدە رېئاكسىيىچان ئېكزېما ياكى پات ئورۇنلۇق تېرە ياللۇغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. «ئالاھىدە رېئاكسىيىچان» دېگەن سۆز، ئىرسىيەتلىك ئامىللار بىلەن روشەن ئالاقىسى بولغان ۋە رىئاكتىپ بىلەن مۇناسىۋەتلىك، ئۆزلۈكىدىن قوزغىلىدىغان ئاللىرىگىيىلىك بىر خىل كېسەللىككە قارىتىلغان. ئالاھىدە رېئاكسىيىچان تېرە ياللۇغى يەنە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان مەنىگە ئىگە ئاللىرىگىيىلىك تېرە كېسەللىكىدىن ئىبارەت.

كېسەللىك سەۋەبى: كۆپ ساندىكىلىرى ئىرسىيەتلىك زىيادە سەزگۈر بەدەن ساپاسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك، ستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا 73.9% كېسەل ئەجداد تارىخىغا

ئىمگە ئىكەن. زىيادە سەزگۈرلۈك كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ماددىلار — ئاساسلىق يېمەكلىك، نەپەس ئارقىلىق كىرگۈچى ماددىلار ۋە يېمەكلىكلىشىش خاراكتېرلىك ماددىلار دەپ ئۈچ خىل بولىدۇ. بوۋاقللىق دەۋرىدە ئاساسلىق بەزى ھايۋان ئاقسىلى تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرگە زىيادە سەزگۈرلۈك كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا زىيادە ئوزۇقلاندۇرۇش، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، چىش چىقىش ياكى ۋاكسىنا ئەمەلەش قاتارلىقلارمۇ زىيادە سەزگۈرلۈكنى قوزغايدۇ؛ بالىلىق دەۋرىگە كەلگەندە، يېمەكلىككە بولغان سېزىمچانلىق كۆپىنچە تەدرىجىي تۆۋەنلەيدۇ، ئەمما ھايۋانات پېيى (نەپەس ياكى يېمەكلىكلىشىش ئارقىلىق كىرىدۇ)، چاڭ - توزان، كانا، گۈل چېرىقى قاتارلىق نەپەس ئارقىلىق بەدەنگە كىرىدىغان ماددىلارغا نىسبەتەن سېزىمچانلىقى ئاشىدۇ؛ ياشلىق دەۋرى ۋە ئوتتۇرا ياشلىق دەۋرىگە كەلگەنچە نەپەس ئارقىلىق كىرىدىغان ماددىلارغا سېزىمچانلىق داۋاملىق ئاشىدۇ؛ روھىي جەددىلىشىش، باكتېرىيىلىك ياكى زامبۇرۇغلۇق يۇقۇملىنىشنىڭ قوشۇلۇپ كېلىشى كېسەللىك ئەھۋالىنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ. خېلى ئۇزۇن كېسەللەرنىڭ قېنىدىكى IGE كۆپىيىپ، T لىمفا ھۈجەيرىسى فۇنكسىيىسى تولۇق بولماسلىق، كېسەل ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك، يەنە تېرىمدىكى β - ئادرېنالىن ئىقتىدارلىق ئاكسىپېتور توسۇلۇش ھادىسىسى كۆرۈلىدۇ. **كېسەللىكنىڭ ئىپادىلىرى:** بۇ كېسەللىكنىڭ ئالامەتلىرى ئوخشىمىغان ياشتا ئوخشىمىغان ئالاھىدىلىككە ئىگە. ئادەتتە بوۋاقللىق دەۋرى، بالىلىق دەۋرى، ياشلىق دەۋرى ۋە ياش قورامىغا يەتكەن دەۋرى دەپ بۆلۈنىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە گۆدەكلىك دەۋرىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئاز ساندىكى كېسەللەردە ئۈچ دەۋرنىڭ ھەممىسىدە كۆرۈلىدۇ. ئەمما بىر دەۋرىدەلا ياكى ئىككى دەۋرىدەلا كۆرۈلىدىغانلىرىمۇ بولىدۇ. تېرىمنى سىجاش سىنىقىدا ئاق رەڭلىك سىجاش رېئاكسىيىسىنىڭ بولۇشى (قان ئازلىق ھالىتى) مەزكۇر كېسەللىكنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكىدۇر.

1. بوۋاقللىق دەۋرى: گۆدەكلەر ئېگىزىدا دەۋرى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. تېرە ئەسۋىسە - نىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن سىرغىما تىپى، قۇرغاق تىپى ۋە ماي تەپچىش تىپى دەپ ئۈچ خىلغا بۆلۈنىدۇ.

(1) سىرغىما تىپى: سىمىز، نىسبەتەن كىچىك بوۋاقلار (ئىككى ئايلىق بوۋاقلار) دا كۆپ كۆرۈلىدۇ. كېسەللىك باشلانغاندا تېرىدە چېگرىسى ئېنىق بولمىغان قىزىل داغلىق زەخمىلىنىش بولىدۇ. ئېغىرلاشقاندا زىچ دۆڭچە ئەسۋە ۋە سۇلۇق قاپارتقۇ قوشۇلۇپ، شەلۋەرەيدۇ، سۈيى سىرغىيدۇ. قاچاق ھاسىل بولىدۇ. مەڭزى، ماڭلاي، باش تېرىسى، قۇلاق سۇپۇرىسى ۋە بويۇن قاتارلىق ئورۇنلاردا ئاسان پەيدا بولىدۇ، سىمىيەتلىك تارقىلىدۇ، كۆپىنچىسى ئېغىز ئەتراپىغا تارقالمايدۇ. ئادەتتە ئىچى سۈرۈش، ئوزۇقلانما ناچارلىشىش ۋە يۈزلىمىغا تۈگۈنلىرى ئىشىشى قاتارلىقلار قوشۇلۇپ كېلىدۇ. (2) قۇرغاق تىپى: نىسبەتەن چوڭراق، ئورۇق، ئاجىز، بوۋاقلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. تېرە ئەسۋىلىرى ئىچىدە سۇس قىزىل ياكى قېنىق قىزىل رەڭلىك داغ پارچىلىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ، چېگرىسى ئېنىق بولمايدۇ، قۇرغاقلىشىپ كېچىكلىشىدۇ، ئېنىق سىرغىش بولمايدۇ، ئارىسىدا زىچ دۆڭچە ئەسۋە بولىدۇ، ئەمما سۇلۇق قاپارتقۇ بولمايدۇ. ئادەتتە يۈز، گەۋدە ۋە تۆت مۇچىگە تارقىلىدۇ.

3) ماي تەپچىش تىپى: تېرە ياللۇغى ئاساسىدا تېرە يېغى تەپچىش قوشۇلمىدىغان ئالاھىدىلىكى بار. ئادەتتە تېرە ئەسۋىسى نىسبەتەن كەڭ كۆلەمدە بولۇپ، بەزىدە تېرە قىزىرىش كېسىلى ۋە كۆرۈنەرلىك كېپەكلىشىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. كۆپىنچە سىمىمېترىك ھالدا، تېرە ئاستى ھاي بېزى نىسبەتەن كۆپرەك تارقالغان ئورۇنلاردا يۈز بېرىدۇ. يۇقىرىدىكى ھەر قايسى تىپلارنىڭ ھەممىسىدە تۇتقا قىلىقتەك شىددەتلىك قىچىشىش بولىدۇ، تەكرار قوزغىلىدۇ، بولۇپمۇ كالا سۈتى، بېلىق تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى يېيىش ياكى بەزى ناچار غىدىقلىنىشقا يولۇقۇشلاردا تېخىمۇ بەكرەك قوزغىلىدۇ. ئادەتتە كۆپىنچە ئىككى ياش ئەتراپىدا تولۇق ساقىيىپ كېتىدۇ. ئاز ساندىكىلىرى بالىلىق دەۋرى ۋە ياش - قورامىغا يېتىش دەۋرىگىچە داۋاملىق تەرەققىي قىلىدۇ، كۆپىنچە ئېشەك يېمى قوزغىلىدۇ.

2. بالىلىق دەۋرى: بوۋاقلىق دەۋرىدىكىمنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بارلىققا كېلىدۇ، تۇنجى قېتىم پەيدا بولىدىغانلىرىمۇ بار. تۆۋەندىكى ئىككى تىپقا بۆلۈنىدۇ:

(1) ئېكزېما تىپى: ئالتە ياشتىن 10 ياشقىچە بولغان بالىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. تېرە ئەسۋىسىنىڭ ئىپادىلىرى — چوڭلاردىكى سۇس ئۆتكۈر ياكى سوزۇلما ئېكزېما بىلەن ئوخشاش، ئەمما تىز ئويىمنى، ئوشۇق بوغۇمنىڭ يىغىلىدىغان تەرىپى، جەينەك ئويىمنى، پاقالچاقنىڭ تۈزلىنىدىغان تەرىپى ۋە بويۇن قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

(2) قىچىشقا ئەسۋە تىپى: ئوقۇش يېشىغا توشمىغان ئوغۇل بالىلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. گۈرۈچتەك چوڭلۇقتا قىچىشقا ئەسۋىسىمان دۆڭچە ئەسۋە تارقاق چىقىدۇ، سىرتقى يۈزى يىرىك، تېرە رەڭگىدە ياكى بېغىرەڭ رەڭدە بولىدۇ. پۈتۈن مۈچىنىڭ تۈزلىنىدىغان تەرىپىدە ۋە دۈمبىگە كۆپرەك چىقىدۇ. شىددەتلىك قىچىشىپ، تىز - ئاق ئىزىدىن قانلىق قاقچ پەيدا بولىدۇ. يېرىقلىمغا تۈگۈنلىرىدە ئاغرىقسىز ئىش شىق بولىدۇ.

مەزكۇر دەۋرىدە كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ، ۋاقىتلىق پەسىيىدۇ ياكى بىر نەچچە يىلدىن كېيىن يەنە قوزغىلىدۇ، بەزىلىرى سۆرەلمە بولۇپ قېلىپ، ساقايماي ياشلىق دەۋرى ۋە ياش قورامىغا يەتكەن دەۋرىدىمۇ داۋاملىشىدۇ. ئادەتتە چۆپ قىزىتمىسى، زىققا ۋە ئاللىبىرگىيىلىك بۇرۇن ياللۇغى قاتارلىقلار قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

3. ياشلىق ۋە ياش قورامىغا يەتكەن دەۋرى: تېرە ئەسۋىسى — ئاساسلىق قۇرغاق ياپىلاق دۆڭچە ئەسۋە بولۇپ، ئۆز ئارا تۇتىشىپ، لىمشا يىلىشىپ داغ پارچىلىرىغا ئايلىنىدۇ، قاسراق پېگمېنت چۆكمىسى بولىدۇ، سىرغىش ئاز بولىدۇ. تۆت مۇچە بوغۇملىرىنىڭ يىغىلىدىغان تەرىپى، بويۇن، ماڭلاي ۋە قاپاق قاتارلىق ئورۇنلارغا كۆپ رەڭ چىقىدۇ، شىددەتلىك قىچىشىدۇ، قانلىق قاقچ ۋە تىزنىق يارىسى قوشۇلىدۇ، كېسەللىك ياشنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ يەڭگىلەيدۇ، ئوتتۇرا ياشقا كەلگەندىن كېيىن كۆپىنچىلىرى ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ. ئادەتتە نەپەسلىنىش يوللىرىنىڭ ئاللىبىرگىيىلىك كېسەللىكلىرى ياندىشىپ كېلىدۇ.

لاپور اتورىدىلىك تەكشۈرۈش: قاندا ئىپىزىن خۇمار ئاق قان ھۈجەيرىلىرى

كۆپىيىمەدۇ، پاسسىپ يۆتكىلىش سىنىقى ($P - K$ سىنىقى) مۇسپى بولىدۇ، قاندىكى IgE كۆپىيىمەدۇ، T ھىمفا ھۈجەيرىلىرى فۇنكسىيەسى تالۇق بولمايدۇ.

دەئاگنوزى: ئەجداد تارىخى، كېسەل پەيدا بولۇش يېشى، تېرە ئەسۋىسىنىڭ ئالاھىدىلىكى، پەيدا بولغان ئورنى، شىددەتلىك قىچىشى، تېرىدىكى جىجالغان ئورۇنلارنىڭ ئاق بولۇپ قېلىش ئالاھىتى، مۇناسىۋەتلىك كېسەللىكلەرنىڭ ئەگىشىپ كېلىشى قاتارلىقلارغا ئاساسەن دەئاگنوزى تىكلەندۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا لابوراتورىيەلىك تەكشۈرۈش قىلىنىدۇ، بالىلىق دەۋرى ۋە ياش قورامىغا يەتكەن دەۋرىدىكى تېرە ئەسۋىسىنى نىسپىي ھالدا خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغىدىن پەرقلىنىدۇرۇش ئۈن تۆتىنچى باقتا سۆزلەندى.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: يېشىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ خىل دورىلارنى (بوۋاقلار-گۆدەكلەرگە) ياكى سىمپرومىپىتا دىن (ياش-قورامىغا يەتكەن دەۋرىدە) تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تىنچلاندۇرغۇچى دورىلار بېرىلىپ قىچىشىنى توختىتىش كۈچەيتىلىدۇ. ناۋادا باكتېرىيىدىن ياكى زامبۇرۇغدىن يۇقۇملانغان بولسا، بۇنىڭغا قارشى دورىلار بىرلىكتە بېرىلىدۇ. ئاللىبىرىگىنىڭ يېمەكلىك، گۈل چېچى ياكى چاڭ-توزان، كانا ئىكەنلىكى ئېنىق بولسا، ئىچكىۈزۈش ياكى تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىش ئۇسۇلىدا ئورگانىزم سىزىمچانلىقىنى ئۆزگەرتىدۇ. چوڭلاردا كېسەللىك ئېغىر بولسا، كورتىكوستىروئىد ھورمونلىرى ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ. ئەمما بالىلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئۆز قېنى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى، ھىستامىن شارچە ئاقسىلى بىلەن داۋالاش قاتارلىقلارمۇ قوللىنىلىدۇ. جۇڭگىي دورىلىرىدىن كۈشك تابلېتىكىسى كۈنىمگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5 تابلېتىكىدىن ئىچكىۈزۈلسە بەلگىلىك ئۈنۈم بېرىدۇ.

2. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ئېكزېمىنىڭ ئوخشاش. بۇنىڭدىن باشقا بوۋاقلىق دەۋرىدىكى قۇرغاق تىپىغا قاراپۇرچاق دىستىللەنگەن مېپى مەلۇمى ئىشلىتىلىدۇ. بالىلىق دەۋرى ۋە ياش-قورامىغا يەتكەن دەۋرىدە ئىشلىتىش زەخمىلەنگەن بولسا، تەركىبىدە 1% لىك ھىدروكورتىزون بولغان 10% لىك ئورېئال زىماتى ئىشلىتىلسە، كېسەللىك ئالامىتىنى يەڭگىلەيتىپ، قانائەتلىنەرلىك ئۈنۈم بېرىدۇ.

3. ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپى: كېسەل سەۋەبىنى ئىزدەش ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىش، تېرە قۇرغاقلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ناچار غىدىقلىنىشتىن ساقلىنىش قاتارلىقلارنىڭ كېسەللىك ئالامىتىنى يەڭگىلەيتىش ۋە تەكرار قوزغىلىشىنى ئازايتىشقا بەلگىلىك يارىتىلىدۇ.

68. ئېشەك يېمى

ئېشەك يېمى ئادەتتە «سۇغان پارچىسى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ، بۇ نۇرغۇنلىغان ئوخشىمىغان سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدىغان، تېرە شىللىق پەردە، قان تومۇرلاردا رېئاكسىيە كۆرۈلىدىغان كېسەللىكتۇر. يەلتاشما ئۆزلەش كلىنىك ئالاھىدىلىكىدۇر. بەزىدە باشقا شوك ئورگانلار ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كېلىدۇ، كۆپ ئۇچرايدۇ.

كېسەلىك سەۋەبى: ئىمىۋىتىلىق ۋە غەيرىي ئىمىۋىتىلىق دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. ئالدىنقىسىنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى I تىپلىق ئاللىرىگىيىلىك رېئاكسىيە، ئاز ساندىكىلىرىدە II، III تىپلىق ئاللىرىگىيىلىك رېئاكسىيە بولىدۇ. كېيىنكىسى ھىستامىن قويۇپ بەرگۈچى ياسالما (ئاتروپىن، ئاسپىرىن) ۋە خولەن چىقارغۇچى نېرۋا ئىمپولسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

دائىملىق قوزغاتقۇچى سەۋەبلەر تۆۋەندىكىچە:

1. يېپەكلىك: ئاساسلىق دېڭىز مەھسۇلاتلىرى، موگۇ ۋە ھاراق تۈرىدىكىلەر.
2. نەپەس ئارقىلىق كىرىدىغان ماددىلار: گۈل چېشى، ئاقىر قەرە، ھايۋانلار تېرە كېچىكى ۋە پەي قاتارلىقلار.
3. يۇقۇملانغۇچى: پاكىت تېرىسىملىك، ۋىروسلىق ۋە پارازىت قۇرۇقلۇق يۇقۇملىنىشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
4. ئىچكى كېسەللىكلەر: ئۆسمە، بىرىكتۈرگۈچى توقۇلما كېسەللىكلىرى، ئاشقازان-ئۇچەي كېسەللىكلىرى، ماددا ئالماشتۇرۇش ۋە ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ توسالغۇغا ئۇچرىشى ھەم روھىي ئامىل قاتارلىقلار.
5. فىزىكىلىق ئامىللار: سوغۇق، ئىسسىق، كۈن نۇرى، مېخانىك غىدىقلىنىش قاتارلىقلار خولەن چىقارغۇچى نېرۋا ئىمپولسىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. دورىلارمۇ ئېشەك يېمىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەمما دورىلار پەيدا قىلغانلىرى دورا ئىسۋىسى دائىرىسىگە كىرىدىغانلىقى ئۈچۈن، مۇشۇ بايىنىڭ ئىككىنچى پاراگرافىدا بايان قىلىندى.

كىلىنىك ئىپادىلىرى

1. ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما ئېشەك يېمى: ئالدى بىلەن تېرە قىچىشىپ ئاندىن يەلتاشما بارلىققا كېلىدۇ. بۇرتمىنىڭ رەڭگى سۇس قىزىل، تاتارغان ياكى تېرە رەڭگىدە بولىدۇ. چوڭ - كىچىكلىكى، شەكلى بىردەك بولمايدۇ، تارقاق ياكى بىرلىشىپ چوڭ پارچىغا ئايلىنىدۇ، چېگرىسى ئېنىق بولۇپ، ئەتراپىدا قىزىل داغ بولىدۇ. تېرىدىكى زەخىمە يېرىم سائەتتىن بىر نەچچە سائەتكىچە داۋاملاشقاندىن كېيىن ئۈزلۈكسىز يوقىلىپ ئىز قالمايدۇ، ئەمما بىر كۆتۈرۈلۈپ بىر پەسىيىپ بىر كۈندە نەچچە قېتىم قوزغىلىدۇ. بەدەننىڭ ھەر قايسى قىسىملىرىدىكى تېرىگە ئىسۋە ئۆرلەيدۇ. ناۋادا ئاشقازان-ئۇچەي يولى بىلەن كېكىردەك شىللىق پەردىلىرىگە تەسىر قىلسا كۆڭۈل ئېلىنىش، قۇسۇش، قورساق ئاغرىش، ئىچى سۈرۈش ياكى كېكىردەك قىچىشىش، نەپەس قىيىنلىشىش، ھەتتا تۈن چۇقۇپ قېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىر بولغۇچىلاردا يەنە ئاللىرىگىيىلىك شوڭ ئالامىتى كۆرۈلۈپ، ئادەمنىڭ دىققىتىنى قوزغايدۇ. ئادەتتە بىر نەچچە كۈن ياكى 2~1 ھەپتە ئىچىدە ساقىيىپ كېتىدۇ. ئەگەر تەكرار قوزغىلىپ نەچچە ئايدىن كۆپرەك ۋاقىت ئۆزىراپ ساقايىمسا سوزۇلما ئېشەك يېمى دەپ ئاتىلىدۇ.
2. ئېشەك يېمىنىڭ باشقا تىپلىرى:

- (1) قان تومۇرلۇق سۇلۇق ئىششىق: بىردىنبىر ئۆتكۈر، چەكلىك، ئويىملاشمايدىغان سۇلۇق ئىششىق بولۇپ، چېگرىسى ئېنىق ئەمەس، كۆپىنچە تېرە رەڭگىدە بولىدۇ. قاپاق، كاپۇك ياكى سىرتقى جىنسىي ئەزا قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپرەك يۈز بېرىدۇ،

كېكىردەك شىللىق پەردىسىدىمۇ كۆرۈلىدۇ. يەرلىك ئورۇندا يېنىك دەرىجىدە قىچىشىش ياكى چىقىلىش سېزىمى بولىدۇ. تېرىدىكى زەخمىگە ئادەتتە بىر نەچچە سائەت ياكى بىر نەچچە كۈن داۋام قىلىپ ئاندىن ياندىۇ، ئەمما تەكرار قوزغىلىدۇ (5. 10 - رەسىم).
(2) سۈنئىي ئېشەك يېمى (تېرىگە سىزىق چۈشۈش كېسىلى): (5. 11 - رەسىم) گال ئەسۋابلار بىلەن تېرە چىقىلىغاندىن كېيىن، سىزىق بويلاپ يەلتاشما چىقىدۇ، قىچىشىدۇ. تىرىناق ئىزى ياكى بېسىلغان، چىڭ باغلانغان ئورۇننىڭ تىرىسىدىمۇ زەخمىلىنىش يۈز بېرىدۇ. بۇ ئېھتىمال فىزىكىلىق ئامىل ياكى دورىلار (بولۇپمۇ پېنتامىلىن) بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن.

(3) خولسىن چىقىرىشتىن بولغان ئېشەك يېمى: بۇنىڭ 15% دىن كۆپرەكى نورمال ياشلاردا كۆرۈلىدۇ. كۆپىنچە ھەرىكەت، تەرلەش، روھىي جىددىلىقتىن كېيىن ئاسان قوزغىلىدۇ. بۇنىڭدىكى تېرە ئەسۋامى 2mm ئەتراپىدىكى تۈك خالىلىق يەلتاشىدىن ئىبارەت، ئەتراپىدا قىزىل داغ روشەن بولىدۇ. بەزىدە سۈنئىي ھەمراھقا ئوخشاش يەلتاشما كۆرۈلىدۇ. تارقاق تارقىلىپ، ئۆز ئارا بىرلەشمەيدۇ. تېرە ياغ بېزى نىسبەتەن كۆپ بولغان ئورۇندا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. ئالغان ۋە تاپاندا تېرە ئەسۋامى بولمايدۇ. بەزىدە پەقەت قاتتىق قىچىشىشلا بولۇپ تېرە ئەسۋامى بولمايدۇ. ئاز ساندىكى كېسەللەردە پۈتۈن ئاتىتىملىقلىرىغا ئوخشاش پۈتۈن بەدەنلىك رېئاكسىيە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ھەرىكەت قىلغاندىكى ياكى پۇتنى ئېسىق سۇغا چىلىغاندىكى تەرلەش تېرە ئەسۋامىنى قوزغايدۇ، بۇ توغرا دىئاگنوز قويۇشنىڭ ئاددى ھەم ئۈنۈملۈك سىنىقىدۇر.

دىئاگنوزى: زەخمىلىنىش يەلتاشىمنى ئاساس قىلىدۇ، تېز پەيدا بولۇپ، تېز يانسايدۇ، دىئاگنوز قويۇش تەس ئەمەس. باشقا تىپلىق ئېشەك يېمىگە دىئاگنوز قويۇشتا تېرىنى چىچاش سىنىقى بىلەن ھەرىكەت-تەرلەش سىنىقىنى ماسلاشتۇرۇشنىڭ ياردىمى بولىدۇ.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

(1) ھىستامىنغا قارشى دورىلار: ئادەتتە خلور فېنرامىن ياكى بېنادىل ئىشلىتىلىدۇ. يەنە شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ۋىتامىن C ياكى كالىتسىي ياسالىملىرىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. خولسىن چىقىرىشتىن بولغان ئېشەك يېمى دەپ ئېنىق دىئاگنوز قويۇلغان بولسا، ئاتىتىملىق خولسىنغا قارشى تەسىرى بار ھىستامىنغا قارشى دورىلاردىن: ئاتاراكسىس، سىپروھېپتامدىن قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. ئاتاراكسىس تېرىنى چىچاشتىن بولغان كېسەلگىدۇ نىسبەتەن ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

(2) جىددىي قۇتقۇزۇپ بىر تەرەپ قىلىش: ئۆتكۈر كېكىردەك سۇلۇق ئىششىقى ياكى ئاللىبىرگىيىلىك شوك بولسا، ئادرېنالىندىن 0.5mg ~ 0.3 مى تېرە ئاستىغا دەرھال ئۆكۈل قىلىش كېرەك. زۆرۈر تېپىلغاندا 20 مىنۇتتىن كېيىن يەنە بىر قېتىم ئۆكۈل قىلىنىدۇ، بىر ۋاقىتتا كورتىكوستېروئىد ھورمونى بېرىلىدۇ. كېكىردەك سۇلۇق ئىششىقىغا نەپەس قىيىنلىشىش قوشۇلۇپ كەلگۈچىلەرگە ئوكسىگېن شۇمۇرتۇش، زۆرۈر تېپىلغاندا كانايىنى يېرىش ئوپېراتسىيىسىنى ئىشلەش لازىم.

(3) باشقىلار: ھىستامىنغا قارشى دورىلارنى ئىشلەتكەندىن سىرت، سوزۇلما ئېشەك يېمى بولسا يەنە ئاممىنىڭ ئۆلۈم، رېزېرپىنۇم ھىستامىن شارچە ئاقسىلى قاتارلىقلار

بېرىلمىدۇ ياكى ئۆز قىيىنى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى قوللىنىلمىدۇ. قان تومۇرلۇق سۇلۇق ئىششىققا ئاتىسىدۇم 6 - ئامىنو كا پرويكۇمدىن ھەر قېتىمدا 2g ، كۈنىگە 4 ~ 3 قېتىم سىناق تەرىقىسىدە ئىچكۈزۈلۈدۇ. جۇڭيىچە بىيە نىچىڭلىق داۋالاشنىڭ سوزۇلما ئېشەك يېمىگە بەلگىلىك ئۇنۇمى بولىدۇ.

2. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: زۆرۈر تېپىلغاندا 5% لىك سىمپرىتۇس كامفورا ياكى تەركىبىدە فېنول بولغان يۇيۇشقا ئىشلىتىلىدىغان كالامىن ئىشلىتىلىدۇ.

3. ئالدىنقى ئېلىش پىرىنسىپى: كېسەل پەيدا قىلغۇچى ئامىلنى پائال ئىزدەپ تېپىپ ۋە يوقىتىپ، سوزۇلما كېسەللەرنىڭ يېجەك -- ئىچكىكىگە دىققەت قىلىپ، قالايمىقان دورا ئىچىشتىن ساقلىنىپ، كېسەل بولۇش پۇرسىتىنى ئازايتىش لازىم.

78. دۆڭچە ئەسۋىلىك ئېشەك يېمى

بالىلار ۋە ئۆسۈرلەردە كۆپرەك كۆرۈلىدىغان دۆڭچە ئەسۋىلىك ئېشەك يېمى بۈرگە، كانا، پاشا قاتارلىقلارنىڭ چېقىمى بىلىشىدىن پەيدا بولىدىغان تېرىدىكى ئاللىبىرگىيىلىك رېئاكسىيىدىن ئىبارەت. ياز، كۈز پەسلىدە كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. تېرىدىكى ئەسۋە - يۇمىلاق ياكى سوقىچاق شەكىللىك يەلتىشىملىق دۆڭچە ئەسۋىنى ئاساس قىلىدۇ. تېرە ئەسۋىسىنىڭ ئۇزۇن ئوقى تېرە سىزىقى بىلەن بىردەك بولىدۇ، بەزىدە ئۇنىڭ ئۈستىگە چوڭ قاپارتقۇ ياكى قانلىق قاپارتقۇ چېقىسىدۇ (5. 12 - رەسىم). زەخىملىشىش كۆپىنچە كېچىدە پەيدا بولۇپ، تەخمىنەن 12 ~ 2 كۈندە داۋاملىشىپ ئاندىن يوقىلىدۇ. ئورنىدا ۋا - قىتىلىق بېگىمېنت چۆكىمىسى قالىدۇ. ئەمما كەينى - كەينىدىن تۈركۈملەپ يۈز بېرىدۇ. تېرە ئەسۋىسى بويۇن، بىلىيزۇك، پا قىلچاق، بەل، ساغرا قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپرەك بولىدۇ. تارقاق ياكى توپ تارقىلىدۇ، قىچىشقا ئىگە تاقىلىشىشتىن يۇقۇلمىسىدۇ. داۋالاشتا ئېشەك يېمىنى داۋالاشتىن پايدىلىنىش، ھەمدە بۈرگە، سالجا قاتارلىق ھاساراتلارنى يوقىتىشقا دىققەت قىلىش لازىم.

ئالتىنچى باب كەسپىي تېرە كېسەللىكلىرى

كەسپىي تېرە كېسەللىكلىرى - ئەمگەك ۋە ئىشلەپچىقىرىش جەريانىدا، ئىشلەپچىقىرىش شارائىتىدىكى زىيانلىق ئامىللار كەلتۈرۈپ چىقارغان بىر تۈركۈم تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى. بەزى كەسپىي ئامىللار سالامەتلىككە تەسىر قىلماي، پەقەت تېرىدە ئالاھىدە ئۆزگىرىشلار پەيدا قىلسا، كەسپىي ئالاھىدىلىك دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ باقتا پەقەت سانائەت ۋە بەزى يېزا ئىگىلىك تېرە كېسەللىكلىرى قىسقىچە تونۇشتۇرۇلىدۇ.

18. سانائەت تېرە كېسەللىكلىرى

پۈتۈن كەسپىي كېسەللىكلىرى ئىچىدە سانائەت تېرە كېسەللىكلىرى ئەڭ كۆپ سالماقنى ئىگىلەيدۇ. بولۇپمۇ خىمىيە سانائىتى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ پەيدا بولۇش پۇرسىتى تېخىمۇ كۆپ.

كېسەل سەۋەبى: خىمىيىلىك، فىزىكىلىق ۋە بىئولوگىيىلىك دەپ ئۈچ چوڭ ئامىلغا بۆلۈنىدۇ. خىمىيىلىك ئامىللار كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سانائەت تېرە كېسەللىكلىرى ۋە ئۇلارنىڭ پەيدا بولۇش مېخانىزمى ئالدىدا سۆزلەنگەن يېقىنلىشىشتىن بولغان تېرە كېسەللىكلىرىگە ئوخشاش بولۇپ، غەدىقلىغۇچى ماددا ۋە ئاللىبىرگەن دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. ئالدىنقىلىرىنى كۆپىنچە كىسلاتا، ئىشقار، مېتال ئېلېمېنتلار ۋە ئورگانىك ئېرىتىمچى قاتارلىقلار، كېيىنكىلىرىنى كۆپىنچە بويلاق ماتېرىياللىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئارىلىق تەبىئىيەتلىرى، كاۋچۇك ياساشتا ئىشلىتىلىدىغان ئىلگىرى سۈرگۈچى ياسالما ۋە قېرىشنىڭ ئالدىنى ئالدىدىغان ياسالما، تەسۋىر روشەنلەشتۈرگۈچى دورىلار، يۇقىرى مولىكۇلىلىق بىرىكمىلەر (بىرىكمە سېغىز) ۋە دورا ياساش سانائىتى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. ئەمما بەزى غەدىقلىغۇچى ماددىلارنىڭ تۆۋەن قويۇقلۇقتىكىلىرىمۇ ئاللىبىرگىيە پەيدا قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە. فىزىكىلىق ئامىللاردىن: تېمپېراتۇرا، كۈن نۇرى، رادىئوئاكتىپ نۇر ۋە مېخانىكا قاتارلىق زىيانلىق فاكىتورلار نىسبەتەن كۆپ ئۇچرايدۇ. بىئولوگىيىلىك ئامىللاردىن: باكتېرىيە، ئۆسۈملۈك (تەبىئىي سېغىز، ئاقىر قەرها) قاتارلىقلارمۇ تېرىدە ياللۇغ رېئاكسىيىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئادەتتىكى ئەمگەك ۋە ئىشلەپچىقىرىش شارائىتىدا، مەلۇم بىرخىل ئامىل مۇستەقىل تەسىر قىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان تېرە كېسەللىكى ئىنتايىن ئاز ئۇچرايدۇ. ئادەتتە نۇر-غۇن ناچار شارائىتنىڭ بىر ۋاقىتتا تەسىر قىلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدىن سىرت ئىشلەپچىقىرىش مەشغۇلات ئۇسۇلى، مۇداپىئەلىنىش تەدبىرلىرى، شەخسىي تازىلىق ئادىتى، پەسىل، جىنسسىي ئايرىمىسى، ياش ۋە تېرە تىپى قاتارلىق ئامىللارمۇ كېسەل پەيدا بولۇش بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

كلىنىك ئىپادىلىرى: سانائەت تېرە كېسەللىكلىرى ئوخشىمىغان سەۋەبتىن نۇر-غۇن ئامىللار تەسىرىدىن كلىنىكىدا ھەرخىل، ھەر يىغىن ئىپادىلىنىپ، تۈرى خېلىلا كۆپ بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە كۆپ ئۇچرايدىغانلىرى تۆۋەندىكى بىرنەچچە خىلدىن ئىبارەت:

1. تېرە ياللۇغى، ئېكزېما تىپى: ئەڭ كۆپ ئۇچرايدۇ. كۆپىنچە خىمىيە سانائىتىدە ئىشلەيدىغانلار ۋە سىرىچىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. دەسلەپكى دەۋرىدىكى ئالامەتلىرى يېقىنلىشىشتىن بولغان تېرە ياللۇغىغا ئوخشاش بولىدۇ. ئەگەر يېقىنلاشقۇچى ماددا سۇيۇقلۇق بولسا، تېرە ئەسۋىسى كۆپىنچە قول ۋە بارماقلارنىڭ ئارقىسى، بىلىك قاتارلىق ئورۇنلاردا، گاز بولسا، تېرە ئەسۋىسى يۈز، بويۇن قىسمىدا، ئۈنمىدىن قالسا قولنىڭ ئارقىسىدا، پاراشوك بولسا، بويۇن ۋە يەلكە قىسمىدا ھەم تۆت مۇچىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. نۇر-غۇن كېسەللەردە تەكرار قوزغالغاندىن كېيىن ئېكزېمىغا ئۆزگىرىدۇ.

2. كۆيۈك، يارا تىپى: ئېلېكتىر بىلەن ھەل بەرگۈچىلەر ۋە خىمىيە سانائىتى ئىشچىلىرىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئاساسلىق كۈچلۈك كىسلاتا، كۈچلۈك ئىشقار ياكى ئېغىر مېتال تۇزلىرى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزىدە رادىئوئاكتىپلىق زەخمىلەنشىش كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە ئۇچراشقان ئورۇندا قىزىل داغ ۋە ئىششىش بولىدۇ، ئېغىرلاشقاندا سۇلۇق قاپارتقۇ، چوڭ قاپارتقۇ، دەتتا نېكروزلىنىش ۋە يارىلىنىش كۆرۈلىدۇ، كۆيۈش ياكى ئاغرىش ھېس قىلىدۇ. خروم كىسلاتاسى پەيدا قىلغان يارا نىسبەتەن ئالاھىدىرەك بولۇپ، ئاغرىمايدۇ، يارا خۇددى قۇشنىڭ كۆزىگە ئوخشايدۇ، شۇڭلاشقا «قۇش كۆزىسىمان» يارا دەپ

ئاتىلىدۇ. يۇقىرىدىكىلەرنىڭ چاڭلىرى بۇرۇن ئوتتۇرا پاسسىنى يارىلاندىرىدۇ ياكى تې-
شۋېتىدۇ. ئارىسىنىڭ بىرىكىملىرىمۇ ئالاھىدىلىكى يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش يارىنى كە-
تۈرۈپ چىقىرىدۇ.

3. دانىخورەك، تۈك خالتا ياللىغى تىپى (ماي ئەسۋىسى): ئادەتتە قارا ماي ياكى مېنېرال
مايغا يولۇقىدىغان ئىشچىلاردا كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭ ئالاھىدىلىكى تۈك تۆشۈكچىلىرى مۇڭگۈز-
لىشىپ كېتىش، سۆگەلىسىمان دۆڭچە ئەسۋە شەكىللىنىشتىن ئىبارەت. بەزىدە مۇڭگۈز
ماددا نوپۇسى بارلىققا كېلىدۇ، ئۇنىڭ مەركىزىدە قارا توچكا بولىدۇ، بۇ خۇددى دا-
نىخورەككە ئوخشايدۇ. تۈك تۆشۈكىدىكى تۈكلەر سۇنۇپ قولغا يىرىك بولىدۇ. ئەگەر
ئىككىلىمىچى يۇقۇملانسا، تۈك خالتا ياللىغى ياكى چىقان پەيدا بولىدۇ.

4. تېرە پېگمېنتى نورمالسىزلىقلىرى: كوكىس مېيى، قارا ماي، ئارىسىنىڭ سىلىق-
لاش مېيى قاتارلىق ماددىلارغا ئۇزۇن مۇددەت يولۇقسا تېرىدە پېگمېنت چۆكىمى پەيدا
بولىدۇ. كۆمۈر كوكىس مېيى بىلەن قارا ماي يەنە زەھەرلىنىش خاراكتېرلىك تېرە قا-
رىيىش كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھىدروكۇبىنونا يولۇقىدىغان ئىشچىلاردا تېرە رەڭ-
سىزلىنىش يۈز بېرىدۇ.

5. تېرە يۇقۇملىنىش: تېرە تەسۋىسىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلى، ئېرىسىپېلا
زوتىد ۋە كۆيدۈرگە قاتارلىقلار.

دېئاگنوزى: ئىش تۈرى، ئىشلىگەن يىلى، ئىشلەپچىقىرىشتا يولۇقۇش ئەھۋالى،
كېسەل پەيدا قىلغۇچى گۇمانلىق ئامىللار ۋە بىر سېخىمى ئىشچىلارنىڭ كېسەل بولۇش
ئەھۋالى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كەسپىي تارىخى تەپسىلىي سورۇلىدۇ؛ تېرە
ئەسۋىسىنىڭ تىپى، ئورنى، يولۇققان ماددىلار بىلەن بولغان ھۇناسۋىتى ئانالىز قىلى-
نىدۇ؛ كېسەل بولۇش ئەھۋالى، ئىشلەپچىقىرىش جەريانى، مەشغۇلات ھالىتى ۋە گېگىنىلىق
مۇداپىئەلىنىش تەدبىرى قاتارلىقلار ئىشلىگەن مەيداندا تەكشۈرۈلىدۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا
ھەرىكەت ھالىتىنى كۆزىتىش ياكى داغ چاپلاش سىنىقى ئىشلىتىلىدۇ. بۇلارغا ئاساسەن
دېئاگنوز قويۇپ مۇۋاپىق داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ.

ئالدىنى ئېلىش

1. ئىشلەپچىقىرىش شارائىتىنى ياخشىلاپ، ھۈنەر-مەئەت ئىشلەپچىقىرىش جە-
ريانىنى ئىسلاھات قىلىپ، ئىشچىلارنىڭ زىيانلىق ماددىلار بىلەن ئۇچرىشىش پۇرسىتىنى
ئازايتىش لازىم.

2. زاۋۇت، كانلاردىكى مەھىيە تەشكىلىنىڭ رولىنى تولۇق جارىي قىلدۇرۇپ ۋە
كۈچەيتىپ گېگىنا تۈزۈمىنى ۋە ساقلىق ساقلاش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش لازىم.

3. شەخسىيىنىڭ مۇداپىئەلىنىشىنى كۈچەيتىپ، خىزمەت ۋاقتىدا خىزمەت كىيىمى،
قالپىقى ۋە قولقاپنى كېيىشى، ئېغىز ۋە يۈز ماسكىسىنى ھەم مۇداپىئەلىنىش ئەينىكىنى
تاقىشى لازىم. بەزى ئىش تۈرلىرىدە ئۇزۇن قونجىلىق ئۆتۈك كىيىشى لازىم. ئوچۇق
تۈرىدىغان ئورۇنلارنىڭ تېرىلىرىگە ئىش تۈرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ تۆۋەندىكى
تېرە قوغدىغۇچى ياسالما سۇرتىلىدۇ:

(1) «نەملىكتىكى مەشغۇلات» تىكى قوغدىغۇچى ياسالما سۇرتىلىرى رېتسىپى: قاتتىق ماي
كېسلاتاسى 12%، سىنىك ئوكسىد 3%، ئۆسۈملۈك مېيى 85%، بۇنىڭدىن باشقا مېتېلى

صلىكون مېيى ۋە ئېمۇلىسىنى ئۆۋەتتە كەڭ تارقالغان سۇدىن مۇداپىئەلىنىش ئېمۇلىسىنى سى بولۇپ، كىسلاتا ۋە ئىشقاردىن مۇداپىئەلىنىشتىمۇ بەلگىلىك ئۈنۈمى بولىدۇ.

(2) «مايدىكى مەشغۇلات» تىكى قوغدىغۇچى ياسالما رېتسىپى: مېتېسېللىلوز 4% ، كلىتسىرىن 10% ، كاۋلىن 10% ، تالىك 10% ، دېستىلانغان سۇدىن 66% ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. (3) «ئەملىك ۋە مايدىكى مەشغۇلات» تىكى قوغدىغۇچى ياسالما رېتسىپى: سۇسىز قوي يۇڭى يېغى 70% ، ئابدېمىلىك مېيى 30% .

(4) قارا ماي، كوكىس مېيىدىن قوغدىغۇچى ياسالما رېتسىپى: 5% لىك تىتانىي دىئوكسىد ياكى 10% ~ 5% سىنىك ئوكسىد يۇغۇچى ياسالما مېيى ۋە ئېمۇلىسىنى.

داۋالاش: ئاساسلىق يەرلىك ئورۇن سىمپتۇماتىك بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. خىمىيىلىك كۆيۈك دەرھال كۆپ مىقداردىكى پاكىز سۇ بىلەن 30 مىنۇت يۇيۇلىدۇ، ئاندىن ناترىي ھىدروكاربونات ياكى دانىكا كىسلاتا ئېرىتمىسى ئايرىم - ئايرىم ئىشلىتىلىپ، كىسلاتا - ئىشقارلىق ماددىلار نېيتراللاشتۇرۇلىدۇ. ئاندىن يەنە تېرە ياللۇغى ۋە ئېكزېمىنىڭ يەرلىك ئورۇنى داۋالاش پرىنسىپى بويىچە بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. ناۋادا تۈك خالىتىنى زەخمىلەنگەن بولسا، سۇلفۇرىس يۇغۇچى ياسالما لىمىرى سىرتىدىن سۇرتىلىدۇ. زىيادە مۇڭ گۈزلىشىپ يېرىلغان بولسا، 10% ~ 5% لىك ئورېئا زىماتى ياكى سالتىپىلىك كىسلاتا مەلھىمى سۇرتىلىدۇ. يارا يۈزىنىڭ پاكىزلىقىنى ساقلاپ، ئىككىلەمچى يۇقۇلمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. تېرە ئەسۋىسى كەڭ كۆلەمدە بولغان ياكى تەكرار قوزغالغان كېسەللەرگە ھىستامىنغا قارشى دورىلار قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. ناترىي تىموسۇلفات ياكى ۋىتامىن C ۋېنادىن ئوكۇل قىلىنىدۇ.

2§. شاللىق تېرە ياللۇغى

شاللىق تېرە ياللۇغى — يېزا ئىگىلىك تېرە كېسەللىكىگە تەئەللۇق. دېھقانلار شال تېرىش جەريانىدا ھەر خىل زىيانلىق ئامىللارغا يولۇقۇشتىن كېلىپ چىقىدىغان بىر قاتار تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى. ئادەتتە چىلىنىپ شەلۋەرەش تىپلىق تېرە ياللۇغى ۋە قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلىق تېرە ياللۇغى كۆپ ئۇچرايدۇ.

1. چىلىنىپ شەلۋەرەش تىپلىق تېرە ياللۇغى

بۇنى دېھقانلار «قول-پۇت چىرىش» دەپ ئادەتلىگەن. شەرقى جۇڭگو ۋە جەنۇبى جۇڭگودا كۆپ كۆرۈلىدۇ. كېسەل پەيدا بولۇش ۋاقتى ھەر قايسى جايلارنىڭ ھاۋا كىلىماتىغا قاراپ ئوخشىمايدۇ. ئادەتتە 8 ~ 5- ئايلاردا كۆپ بولىدۇ. كېسەل پەيدا بولۇش نىسبىتى 50% تىن يۇقىرى، ئايلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

كېسەللىك مەنبەسى: دېھقانلار شاللىقتا مايسا يۇلۇش، مايسا كۆچۈرۈش، مايسا ئوت ئاش جەريانىدا قول-پۇتى، 40 ئىسسىقلىقتىكى ئىشقارلىق سۇدا ئۇزۇن ۋاقىت تۇرغانلىقتىن ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە داۋاملىق مېخانىكىلىق سۈركىلىشكە ئۇچرىغانلىقتىن كېسەللىنىدۇ.

كېيىنكى ئىپادىلىرى: ئادەتتە شاللىقىدا ئۇدا 5~3 كۈن ئىشلىگەندىن كېيىن كېسەللىنىدۇ. دەسلەپتە قول - پۇت بارماقلىرى ئارىسى ۋە ئۇنىڭغا يېقىن ئەتراپنىڭ تېرىلىرى ئىشىپ ئاقىرىپ، پۇرۇلۇپ ئۇشش ھادىسىسى كۆرۈلىدۇ. كېيىن قۇم، لايىنىڭ سۈركىمىسىگە داۋاملىق ئۇچرىغانلىقتىن، ئۇنىڭ تېرى تۆكۈلۈپ، تېرىنىڭ قىچقىزىل شەلۋەرىگە يۈزى ئېچىلىپ قالىدۇ، ئېغىرلىرىنىڭ قول - پۇت بارماقلىرىنىڭ ئالغان ۋە تاپان تېرىسى يىڭنە تۆشۈكىدەك ۋە سېرىق پۇرچاقتەك چوڭلۇقتا ھەرە ھۆكۈنمىسىمان سويۇلىدۇ. شەددەتلىك قىچقىشىدۇ ۋە ئاغرىيدۇ. ناۋادا قۇرۇق ئىپتىزدا ئىشلىگەن ۋە ئۆزگەرتىلمەس، 5~2 كۈن ئىچىدە كېسەللىنىش ئىسھاقى پەسىيىدۇ، ئىسھاق تىرىنىڭ ئېرىقى ياللىغۇسى ياكى باشقا يىمىرىلىشلىق يۇقۇملىنىش بولسا كېسەللىك جەريانى ئۇزىراپ كېتىدۇ.

ئالدىنى ئېلىش: قۇرغاق ئورۇندا ئىشلەش بىلەن نەملىكتە ئىشلەشنى نۆۋەتلەش تۇرۇپ، ئەمگەك كۈچلىرىنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك، يېزا ئىگىلىكىنى مەشھۇرلاشتۇرۇشنى تەدرىجىي ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، زىيانلىق ئامىللارنىڭ غەدىقلىنىشىنى ئازايتىپ يېتەكلىش لازىم. شەخسىي قوغدىنىشنى كۈچەيتىپ، شاللىققا چۈشۈشتىن بۇرۇن قول - پۇتقا 20% دېۋېرقاي ئىسپىرتى سۈرتۈش، ئىشتىن چۈشكەندە قول - پۇتنى يىلماي سۇدا پاكىز يۇيۇپ، سۈرتۈپ قۇرۇتقاندىن كېيىن 12.5% لىك زەمچە قوشۇلغان 3% لىك ئاشتۇزى ئېرىتمىسىگە 15~10 مىنۇت چىلاش ئىستاتىيىنى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

داۋالاش: ئۇشش باسقۇچىدا قول - پۇتقا كۆيدۈرۈلگەن ئاق زەمچە تالقىنى سېپىپ قۇرۇتۇلىدۇ. شەلۋەرىگە نەملىك كېيىن ئۇشش سۈركىلىدۇ. ناۋادا ئىككىلىمچى يۇ-قۇملىنىپ ۋە سۈيى چىققان بولسا 1:5000 لىك مارگانسۇپ بىلەن ھۆل كومپرىس قىلىنىپ دۇھەم بۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئانتىبىيوتىكلار ئىچكۈزۈلىدۇ.

2. قۇيرۇقلۇق لىچىنىكىلىق تېرىيالىغۇسى

مەزكۇر كېسەل دۆلىتىمىزدە چاڭجياڭنىڭ جەنۇبىدىكى ھەرقايسى ئۆلكىلەر، سىچۈەن، شەرقىي شىمال قاتارلىق گۈرۈچ ئىشلەپچىقىرىدىغان جايلارنىڭ ھەممىسىدە يۈز بېرىدۇ. جەنۇبىي رايونلاردا ئادەتتە «ئۆدەك جىنى چاڭلىشىش»، «ئۆدەك پوقى شامىلى دارىش» ياكى «قىش چىشقا سۇ كېسەلى» دەپ ئاتىلىدۇ. 6- ئايدىن 9- ئايغىچە بولغان مەزگىلدە كۆپ كۆرۈلىدۇ، ياش ۋە جىنسى ئايرىما پەرقى بولمايدۇ. يۇقۇملىنىش نىسبىتى 90% تىن يۇقىرى بولىدۇ.

كېسەل سەۋەبى: ھايۋانلار قان شورغۇچى قۇرت كېسىلىدىن يۇقۇملانغانلىقتىن، ئۇنىڭ قۇيرۇقلۇق لىچىنىكىلىرى ئادەم تېرىسىگە كىرىپ كېسەل پەيدا قىلىدۇ. ئادەم ئۇنىڭ ئازغان ماكان ئىگىسى؛ ئارىلىق ماكان ئىگىسى - لىمنايىيە قۇرۇلۇشى دەپ قارىلىدۇ. دۆلىتىمىزدە مەزكۇر كېسەلنى پەيدا قىلىدىغىنى ئاساسلىق ئىككى خىل: بىرى، ھايۋانات (كالا، قوي) دىكى ئورنىتىلغان شورغۇچى قۇرت قۇيرۇقلۇق لىچىنىكىسى، يەنە بىرى ئۆي قۇشلىرى (ئۆدەك ياكى ياۋا ئۆدەكلەر) دىكى تىرىخو قان شورغۇچى قۇرت قۇيرۇقلۇق لىچىنىكىسىدۇر. ئالدىنقىسى ئاساسلىق شىمال تەرەپتە، كېيىنكىسى جەنۇب تەرەپتە كۆرۈلىدۇ.

كەلىمەك ئىپادىلىرى: دەسلەپتە يۇقۇملۇق سۇغا يولۇققان تېرە قىچىشىدۇ. كېيىن كۈنە جۇتىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىدەك قىزىل تىنچىك پەيدا بولۇپ، بىرنەچچە سائەت ياكى بىرەر كۈندىن كېيىن ماش ياكى سېرىق پۇرچاقنىڭ چوڭلۇقىدا تەرەققىي قىلىپ سۇلۇق ئىشىنىشلىق دۆڭچە ئەسۋىگە ياكى دۆڭچە قاپارتقۇلۇق ئەسۋىگە ئايلىنىدۇ. ئەسۋە قاتتىق، سۇس قىزىل ياكى ئوچۇق قىزىل رەڭدە، ئەسۋىنىڭ چوققىسىدا قۇيرۇقلۇق لىچىنىسكا تېشىپ كىرگەن ئىز بولىدۇ. بۇزۇلغاندىن كېيىن ئاز مىقداردا سۇ سىرغىپ، قاقچىلىنىدۇ. زەخمىلىنىش پاقالچاق بىلەن بىللە كىتە، بولۇپمۇ يۇقۇملۇق سۇنىڭ سىرتقى يۈزىگە يولۇققان ئورۇندا ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدۇ. پۇتىنىڭ پاتقاق كىرىپ قالغان قىسمىدا تېرە ئەسۋىسى بولمايدۇ، شىددەتلىك قىچىشىدۇ ياكى سىنچىپ ئاغرىيدۇ. كېسەللىك 4 ~ 3 كۈن ئىچىدە ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىقىپ، بىر ھەپتە ئەتراپىدا تەدرىجىي يوقىلىدۇ. ئەمما تەك رار يۇقۇملىنىش كېسەللىك ئەھۋالىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، كېسەللىك جەريانىنى ئۇزارتۇپ تىمدۇ. لا بورا تورىيىلىك تەكشۈرۈشتە، قاندا ئىمپوزىن ھۈجەيرىلىرى كۆپىيىپ كېتىدۇ.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. داۋالاش: داۋالاشتا يەرلىك ئورۇندىكى ياللۇغنى قايتۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، ئىككىمىلەمچى يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپ قىلىنىدۇ. سىرتىدىن كالا مىن سۇر-تىلىدۇ، ناۋادا ئىككىمىلەمچى يۇقۇملىنىش قوشۇلۇپ كەلسە 2% لىك گېنتامىن ۋېتولىت سۇر-كىلىدۇ. تېرە ئەسۋىسى كەڭ كۆلەملىك، شىددەتلىك قىچىشقان كېسەللەرگە ھىستامىنغا قارشى دورىلار قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ.
2. ئالدىنى ئېلىش: ئۇنىۋېرسال تەدبىر قوللىنىش لازىم. بۇ تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:

(1) كېسەللەنگەن ئۆي قۇش، ھايۋانلىرىنى شۇ ئورۇندىكى مال دوختۇرخانىلىرىدا داۋالاش لازىم.

(2) ئارىلىق ماكان ئىگىسىنى يوقىتىش، دائىم قوللىنىدىغان قۇلۇلە يوقىتىش ئۇسۇلىلىرى: ئاممىياك بىلەن قۇلۇلە يوقىتىش، يەنى 6cm چوڭقۇرلۇقتا ھەر بىر مو يەرگە $25\text{kg} \sim 15\text{kg}$ دىن ھېسابلاپ ئاممىياك سۈيى قۇيۇلىدۇ. ئادەتتە دورا 6 سائەت ئىچىدىلا ئۇ-نۇم بېرىدۇ، قوشۇمچە ئوغۇتلاشنىڭ قۇلۇلە ۋە لىچىنىكا قاتارلىقلارنى ئۆلتۈرۈش رولى بار، ناتىرىي پېنتاخلوروفىن قۇلۇلىنى ئۆلتۈرۈش رولىغا ئىگە. 5cm چوڭقۇرلۇقتا ھەر بىر مو يەرگە 0.5kg دورا ئىشلىتىلسە روشەن ئۈنۈم بېرىدۇ، ئەمما مائىسىغا بەلگىلىك زىيىنى بولغانلىقتىن، مائىسا كۆچۈرۈشتىن بۇرۇن زىيانلىق نەرسىلەرنى يوقىتىش لازىم. بۇنىڭدىن باشقا ئاممىيەتلىك ھىدروكاربون تىنى ھەر مو يەرگە 15kg ، ئوت - چۆپ كۈلى (ھەرمو يەرگە 50kg) نى ئىشلىتىشنىڭمۇ قۇلۇلە يوقىتىشتا بەلگىلىك رولى بولىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ئوغۇتلاش ئۈنۈم بېرىدۇ.

(3) تەرەتنى باشقۇرۇش: ئۆي قۇش، ھايۋانلىرىنىڭ قىمغىنى ئېچىتىپ، پارازىت قۇرت تۇخۇمىنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن، ئوغۇت قىلىنىشى كېرەك.

(4) شەخسىي قوغدىنىش: ئىشلىگەندە شاللىققا چىلىنىدىغان ئورۇننىڭ تېرىلىرىنى ئاس-راش ئۈچۈن كونا لاتا، نېپىز سۇلياۋ بىلەن ئورۇلىدۇ ياكى شاللىققا چۈشۈشتىن 10 مىنۇت بۇرۇن 15% لىك دې بۇتلىغىتالات ئېمۇلسىيىسى (دى بۇتلىغىتالات 15، يارىيىلىمى 1، سو-

دەئۇم مېتېلۇل سېللۇلوزا 1، فېنول 0.5، 100 بولغىچە سۇ قوشۇلىدۇ، سۈركىلىنىدۇ. 20% ~ 15 دېۋىر قاي يېلىمى ئىسپىرتى ياكى زەمچە قوغدىغۇچى ھەلەسى (ناقتول 6، تالەك تالقىنى 10، دېۋىر قاي يېلىمى 12، پولىمېرىزلاشقان ماي، پارافىن، ۋازېلىن 100 گىچە قوشۇلىدۇ) قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى قوغدىنىشتا بەلگىلىك ئۇنۇم بېرىدۇ.

يەتتىنچى باب شارچە باكتېرىيىدىن يۇقۇلمىنىشلىق تېرە كېسەللىكلىرى

شارچە باكتېرىيىدىن يۇقۇلمىنىشلىق تېرە كېسەللىكلىرى — يىرىغىلىق تېرە كېسەللىكلىرى. لىرى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئاساسلىق ئۇزۇمسىمان باكتېرىيە، زەنجىرسىمان باكتېرىيە ياكى ئىككىلىنىڭ ئارىلاش يۇقۇملاندۇرۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يۇقۇلمىنىش ئورنى، باك-تېرىيە تۈرى ۋە زەھەرلەش كۈچىنىڭ ئوخشاشماسلىقىغا قاراپ كىلىنىك ئىپادىلىرىمۇ بىردەك بولمايدۇ. بۇ باپتا دائىم ئۇچرايدىغان يىرىغىلىق تېرە كېسەللىكلىرىدىن يىرىك قاپارتمىلىق يارا ۋە تۈك خالتا ياللۇغى تونۇشتۇرۇلىدۇ.

18. يىرىك قاپارتمىلىق يارا

يىرىك قاپارتمىلىق يارا ئادەتتە «سېرىق سۇلۇق يارا» دەپ ئاتىلىدىغان دائىم ئۇچرايدىغان، تېگىپ كەتسە يۇقىدىغان يىرىغىلىق تېرە كېسەلى. بالىلاردا نىسبەتەن كۆپ كۆرۈلىدۇ. ياز، كۈز پەسلىدە ئاسان تارقىلىدۇ.

كېسەل سەۋەبى: كۆپىنچە ئالتۇن رەڭلىك ئۇزۇمسىمان شارچە باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قان ئېرىتكۈچى زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە ياكى ئىككىسى ئارىلاش يۇقۇملاندۇرۇپ، كېسەل پەيدا قىلىشىمۇ مۇمكىن. B تىپلىق زەنجىرسىمان شارچە باك-تېرىيە كەلتۈرۈپ چىققارسا، بۆرەك شارچىسى، بۆرەك ياللۇغى قوشۇلىدۇ. ئۈزە تېرە زەخمىلىنىش، بىدەننىڭ كېسەلگە قارشى كۈچى ئاجىزلاش، تازىلىق شارائىتىنىڭ ناچارلىقى ۋە ئىسسىق نەم ھاۋا كىلىماتى قاتارلىقلار كېسەل پەيدا بولۇشنىڭ ئاساسلىق تۈرتكىسى بولىدۇ.

كىلىنىكىلىق ئىپادىلىرى: كىلىنىكىدا تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىل تىپى كۆپىرەك كۆرۈلىدۇ:

1. چوڭ پۇۋەكچە تىپلىق يىرىك قاپارتمىلىق يارا: بۇنى ئاساسلىق ئالتۇن رەڭلىك ئۇزۇمسىمان شارچە باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نىسبەتەن چوڭراق بالىلاردا، ياز پەسلىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. دەسلەپتە پەيدا بولغان تېرە ئىسسىق سۇلۇق قاپارتمىسى بولۇپ تارقاق بولىدۇ. بۇ تېز سۈرئەتتە داۋىردەك چوڭلۇقتا چوڭ قاپارتمىغا ئايلىنىدۇ. دىۋارى ئېمىز ھەم تولغان، ئىچىدىكى سۇيۇقلۇق سۈپ - سۈزۈك بولىدۇ، كېيىن تەدىرىجى دۇغلىشىدۇ، قىزىل دېغى ئېنىق بولمايدۇ. بىر نەچچە كۈندىن كېيىن قاپارتمىدا دىۋارى بوشىشىغا باشلايدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىرگە يىرىغىلىق سۇيۇقلۇق ئۆزىنىڭ ئېغىرلىقى

كۈچىدىن چۆكۈپ، ئۈستى سۈزۈك، ئاستى دۇغ يېرىم ئايسىمان بولۇپ قالىدۇ (7. 1 - رەسىم). قا پارتما يېرىلغاندىن كېيىن سۇس ساغۇچ رەڭدە قا قاچىلىنىدۇ، بەزىدە قا پارتما ما مەركىزىدىكى ياللۇغ يېنىپ تۆت ئەتراپىغا كېڭىيىپ ھالقىسىمان يىرىڭلىق قا پارتما نى شەكىللەندۈرىدۇ. ھالقىسىمان يىرىڭ قا پارتمىلىق يارا دەپمۇ ئاتىلىدۇ. زەخمە - لىنىش يۈز، بويۇن ۋە پۇت - قوللاردا كۆرۈلىدۇ، ئازراق قىچىشىدۇ.

2. ئاددىي تىپلىق يىرىڭ قا پارتمىلىق يارا، يېقىنلىشىشتىن يۇقۇدىغان يىرىڭ قا پارتمىلىق يارا دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ ئوقۇش يېشىغا توشمىغان بالىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. يۇقۇمچانلىقى كۈچلۈك، كۆپىنچە زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە ياكى ئۇزۇم سىمان شارچە باكتېرىيىنىڭ ئارىلاش يۇقۇملاندۇرۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. كېسەل پەيدا قىلغۇچى باكتېرىيىنىڭ زەھەرچانلىقى نىسبەتەن كۈچلۈك بولغانلىقتىن، كېسەللىك جىددىي باشلىنىدۇ، ئېغىر ئۆتىدۇ. دەسلەپتە قىزىل رەڭلىك داغ توپچىلىرى ياكى پۇرچاق چوڭلۇقىدا دۆڭچە ئەسۋە بىلەن سۇلۇق قا پارتما پەيدا بولىدۇ. بۇ تېزلا يىرىڭلىق قا پارتماغا ئايلىنىدۇ. ئەمما كېسەللىك باشلىنىشىدىلا يىرىڭلىق قا پارتما بولغۇچىلارمۇ بولىدۇ. قا پارتما ئەتراپىدا قىزىل داغ روشەن بولىدۇ. قا پارتما دىۋارى نېپىز بولغانلىقتىن ئاسان يىرتىلىدۇ، قا پارتما قورۇشۇپ، قېنىق سېرىق رەڭدە قېلىن قا قاچىلىنىدۇ (2. 7 - رەسىم).

يىرىڭلىق قا پارتمىمۇ ئۆز ئارا بىرلىشىپ چوڭ كۆلەمدە زەخىملىنىش ۋە قا قاچ پەيدا بولىدۇ. قىچىشىپ تاتىلىنىشتىن ھەر خىل ئەملىمە يۇقۇملىنىش بارلىققا كېلىدۇ. بۇ ئوچۇق ئورۇندا ئاسان يۈز بېرىدۇ. كېسەللىك جەريانى تەخمىنەن 10 ~ 6 كۈن بولىدۇ، ئاۋادا ئۆز ۋاقتىدا داۋالىمىسا كېسەللىك جەريانى ئۇزىراپ كېتىدۇ. مەزكۇر تىپلىق يىرىڭ قا پارتمىلىق يارىغا ئادەتتە يارا ئەتراپىدىكى لىمفا تۈگۈنلىرى، ئىششىق قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئېغىرلاشقاندا يۇقىرى قىزىتما ۋە پۈتۈن بەدەن يېقىمسىزلىنىش كۆرۈلىدۇ. بەزى كېسەللەردە بۆرەك شارچىسى بۆرەك ياللۇغى ئىككىلىمە مېچى يۈز بېرىدۇ.

3. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردا يىرىڭ قا پارتمىلىق يارا، مەزكۇر كېسەل يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلاردا يۈز بېرىدىغان، ئېغىر ئۆتىدىغان چوڭ قا پارتمىلىق يىرىڭلىق قا پارتما كېسەلى. كېسەل بالىنىڭ بەدەن ساپاسى ئاجىز بولىدۇ. ئالتۇن رەڭلىك ئۇزۇم سىمان شارچە باكتېرىيىنىڭ يۇقۇملاندۇرۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. كېسەللىك جىددىي باشلىنىدۇ ھەم كۆپىنچە بوۋاقلار تۇغۇلغاندىن كېيىنكى 10 ~ 4 كۈن ئىچىدە يۈز بېرىدۇ. دەسلەپتە كۆك بۇرچاقتەك ياكى ياڭاق تەك سۇلۇق قا پارتما پەيدا بولۇپ، دۇغلىنىدۇ ھەم كېڭىيىپ بىرلىشىپ 2 ~ 1 كۈن ئىچىدىلا كەڭ دائىرىدىكى تېرىگە تارىلىدۇ. قا پارتما دىۋارى ئىنتايىن نېپىز بولۇپ، ئاسان يىرتىلىدۇ. يىرتىلغاندىن كېيىن ئېچىلىپ قالغان ئورۇن سىلىق، قىسپقىسىل رەڭلىك شەلۋەرەش يۈزىدىن ئىبارەت بولۇپ، گىر-ئۈنكى قىسقىراپ ئېگىلىپ چۇچا سىمان شەكىلگە «Nikolsky's» ئالامىتى مۇسپىي بولىدۇ. ئوچۇق ئورۇندا ئاسان يۈز بېرىدۇ. يۇقىرى قىزىتما ياكى بەدەن تېمپېراتۇرىسى كۆتۈرۈلۈشلىك، قۇسۇش، ئىچى سۈرۈش ۋە زەخىملىنىش قاتارلىق پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئەگەر ئۆز ۋاقتىدا داۋالىمىسا سېپىتىسىمىيە، ئۆپكە ياللۇغىمە بۆرەك ياللۇغى ياكى مېڭە پەردە ياللۇغى قاتارلىقلار كېلىپ چىقىپ ھاياتىغا خەۋپ يېتىدۇ. مەزكۇر كېسەلنىڭ يۇقۇشچانلىقى كۈچلۈك. ئاۋادا بوۋاقلار ئۆيىدە مەزكۇر كېسەل

سېزىلىسە، دەرھال ئىزولاتسىيە، دېزىنفېكسىيە قىلىپ پائال داۋالاش بىلەن تارقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

دەئاگنوزى: ياش، ھەر قايسى تىپىنىڭ كلىنىكىلىق ئالاھىدىلىكى (يېرىم ئايىسىمان يىرىڭلىق قاپارتما؛ قېنىق سېرىق رەڭلىك يىرىڭلىق قاقچ ۋە كەڭ كۆلەمدە سويۇلۇش) ۋە كېسەل پەيدا بولۇش پەسلى قاتارلىقلارغا ئاساسەن دەئاگنوز قويۇلىدۇ.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: بۇ دورىنى ئىشلىتىشتە باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قىچىشىنى توختىتىش، قورۇش، قاقچنى چۈشۈرۈش، يارا يۈزىنى تازىلاش قاتارلىقلار پرىنسىپ قىلىنىدۇ.

(1) يىرىڭلىق قاقچنى تازىلاش: 1:8000 لىك ماركانسۇپتا ياكى 0.02% لىك فۇرات-سىلىلىن ئېرىتمىسىدە پاكىز يۇيۇلىدۇ. قاقچ قېلىن بولسا ئالدى بىلەن قاقچ چۈشۈرۈ-دىغان ياسالغۇنى سۈرتۈپ يۇمشاتقاندىن كېيىن، يۇقىرىدىكى ئۇسۇل بويىچە پاكىز يۇيۇپ، قاقچنى ئېلىۋېتىپ ئېرىتمىسىن مەلۇمى ياكى 2% لىك گېنتامىن ۋېنولىت ئېرىتمىسى كۈنىگە بىر - ئىككى قېتىم سۈرتىلىدۇ.

(2) دۆڭچە ئەسۋە ۋە سۇلۇق قاپارتىشنى ئاساس قىلغان زەخمىلىنىش: سىرغىتما سۇ-يۇقلۇق نىسبەتەن ئاز بولسا ئالدى بىلەن يۇيۇشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇلفۇرلۇق كالامىن كۈنىگە نەچچە قېتىم سۈرتىلىدۇ. ئەگەر سۇلۇق قاپارتىمدا سىرغىتما سۇيۇقلۇق نىسبەتەن كۆپ بولسا، 0.1% لىك رېۋانولۇم ئېرىتمىسى ياكى 0.02% لىك فۇراتسىلىلىن ئېرىتمىسى ھۆل كومپرىس قىلىنىدۇ. نىسبەتەن چوڭ سۇلۇق قاپارتىشنىڭ سۈيىنى چىقىرىۋېتىپ، دىۋارىنى پاكىز ئېلىۋەتكەندىن كېيىن ھۆل كومپرىس قىلىنىدۇ.

2. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ئادەتتە دورا ئىچىش زۆرۈرىيىتى بولمايدۇ. چۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلىرى بولمىغان، مەھەللىسى ئورۇنلىمىغا تۈگۈنسى ئاغرىپ ئىشلىتىلغان، تىپىرىنىڭ زەخمىلىنىش دائىرىسى نىسبەتەن چوڭ بولغان ياكى بۆرەك ياللۇغى قوشۇلۇپ كەلگەن كېسەللەرگە ئانتىبىيوتىكىلار ياكى باكتېرىيىگە قارشى باشقا دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار يىرىك قاپارتىملىق يارىغا گىرىپتار بولسا، ئىمىكا نىمىيەنىڭ بېرىچە بالدۇرراق ئۈنۈم-لۈك ئانتىبىيوتىكىلارنى تاللاپ ئىشلەتكەندىن سىرت، قان بېرىش، گامما شار ئاقسىلىنى مۇسكۇلغا ئۆتكۈل قىلىشتەك پۈتۈن بەدەنلىك قۇۋۋەتلەپ داۋالاشقۇدەك قىلىش ھەمدە پەرۋىش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتىش لازىم.

ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپلىرى: تازىلىقتا دېققەت قىلىپ، تېرىنى پاكىز تۇتۇش، قاتلىنىپ تۇرىدىغان تېرىگە ئاتىسىدېورىك - زېنىك ئوكسىدى تالقىنىنى سېپىپ قۇرغاق تۇتۇش، تېرىنىڭ پۈتۈنلۈكىنى ئاسراپ، سىرتقى زەخمىلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، قىچىشىدىغان ھەر خىل تېرە كېسەللىكلىرىنى پائال داۋالاش لازىم. يىرىڭلىق تېرە كېسەللىككە گىرىپتار بولغان ھەر قانداق تىپىي خادىملار بوۋاقلار بۆلۈمىگە كىرمەسلىكى كېرەك. بالىلار كوللېكتىپلەردىن كېسەل بولسا، دەرھال ئىزولاتسىيە قىلىپ، داۋالاش ۋە كىيىم - كېچەك، نەرسە - كېرەكلىرىنى دېزىنفېكسىيە قىلىش لازىم.

28. تۈك خالىسى ياللۇغى

مەزكۇر كېسەل — ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تۈك خالىسى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىنىڭ ئۆتكۈر يىرىڭلىق ياللۇغىدىن ئىبارەت.

كېسەللىك سەۋەبى: ئاساسلىق ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە ياكى ھەر خىل تىپلىق ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيىلەرنىڭ ئارىلاش يۇقۇملاندۇرۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئاجىز تەن، دېئابىت كېسەلى، تېرە زەخمىلىنىش، ناچار تازىلىق ئادەتلىرى، كەسپىي ئامىللار ۋە لازىدەك غىدىقلىغۇچى يېمەكلىكلەرنى يېيىش قاتارلىقلار دائىم ئۇچرايدىغان قوزغاتقۇچى سەۋەبلەردۇر.

كلىنىك ئىپادىلىرى: دەسلەپتىلا تۈك خالىسى ئېغىزغا بىردەك ياللۇغ ئىنقىپاتىراتسىيە بىلىك كىچىك دۆڭچە ئەسۋە پەيدا بولىدۇ. تەدرىجىي يىڭىنىدەك ياكى تېرىقتەك چوڭلۇقتىكى دۆڭچە ئەسۋىلىك يىرىڭلىق قاپارتمىغا ئايلىنىدۇ. ئاندىن ئاز - ئازدىن يىرىڭلىق سۇيۇقلۇق چىقىپ، قورۇشۇپ، قاقچىلىنىدۇ. تەخمىنەن بىرەر ھەپتە ئەتراپىدا قاقچ چۈشۈپ ساقىيىپ كېتىدۇ. ئادەتتە تاتۇق بولمايدۇ. تېرە ئەسۋىسىنىڭ سانى ئوخشاش بولمايدۇ، ئەمما ئۆز ئارا بىرلەشمەيدۇ، قىچىشىدۇ ياكى كۆيۈپ ئاغرىيدۇ. ئادەتتە قوزغىلىشقا مايىل بولۇپ، نەچچە ھەپتىگىچە ياكى نەچچە ئايغىچە ئۈزۈرپ كېتىدۇ. تۈك كۆپ بولغان ئورۇندا ئاسان يۈز بېرىدۇ. كېسەل بولغان ئورۇن ۋە ئىمپادىلىرى ئوخشىمىغا ئىللىق، ئاتىلىشىمۇ ئوخشىمايدۇ. باش تېرىسىدە بولسا باش تېرە تۈك خالىسى ياللۇغى، ساقاللىق ئورنىدا بولسا ساقال يارىسى ۋە گەجىدىكى چاچنىڭ قىرىسىدا پەيدا بولغانلىرى ئۇزۇن مەزگىل تەكرار قوزغىلىش ۋە سۈركىلىش تۈپەيلىدىن ئەمچەكسىمان ئۆسۈپ كۆپىيىدۇ. بۇ، تۈك خالىسى ئەمچەكسىمان ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ.

دىئاگنوزى: ياللۇغ، ئىنقىپاتىراتسىيەلىك تۈك خالىسى مەنبەلىك دۆڭچە ئەسۋە ۋە دۆڭچە ئەسۋىلىك يىرىڭلىق قاپارتمىنىڭ بولۇشى تۈك كۆپ بولغان ئورۇندا پەيدا بولۇش، تەكرار قوزغىلىشقا مايىل بولۇش قاتارلىقلاردىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ.

داۋالاش: ئادەتتە سىرتىدىن ئىشلەتمەيدىغان دورىلار ئاساس قىلىنىدۇ. ياللۇغ قايتۇرۇش، باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش، قىچىشىنى توختىتىش داۋالاش پرىنسىپى قىلىنىدۇ. 2.5% لىك تىمىكتۇرا يود ياكى تىمىكتۇرا ۋاتېرخلور ئىشلەتمەيدۇ. 3~5% لىك چوڭتۇرۇلگەن ئاق سىماب مەلھىمى ياكى مۇرەككەپ نېئومىتسىن مەلھىمى سۈرتىلىدۇ.

ناۋادا تېرە زەخمىلىنىش نىسبەتەن كۆپرەك بولسا ياكى پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كەلسە سۇلفانىلامىدلار ياكى ئانتىبىيوتىكلار بېرىلىدۇ. سوزۇلما تۈك خالىسى ياللۇغىدا دورا ئىشلەتكەندىن سىرت، ئۆز قېنى بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى، ئۆز بەدەنلىك ۋاكسىنا بىلەن داۋالاش ئۇسۇلى ياكى ئارىلاشما ۋاكسىنى ئۆكۈل قىلىش قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. بەزىدە ئۇلترا بىنەپشە نۇرغا قاقلاش ئۈنۈم بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە كېسەل پەيدا قىلىدىغان قوزغاتقۇچى ئامىللارنى يوقىتىشقا دىققەت قىلىنىدۇ.

سەككىزىنچى باب ئاچىماق تاياقچە باكتېرىيىدىن يۇقۇملانغۇچىلىق قېرە كېسەللىكلىرى

18. ماخاۋ

ماخاۋ — ماخاۋ تاياقچە باكتېرىيىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سوزۇلما يۇقۇملۇق كېسەللىك. بۇنىڭدا باكتېرىيە ئاساسلىق تېرە، شىللىق پەردە ۋە ئەتراپ نېرۋىلىرىغا تاجا-ۋۇز قىلىپ كىرىدۇ. ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى دەۋرىگە كەلگەندە بىر قىسىم كېسەللىرىنىڭ ئىچكى ئەزاسىدا زەخمىلىنىش يۈز بېرىدۇ، ھەتتا غەيرىيلىك ۋە مېمېلىك كۆرۈلىدۇ. كېسەللىك سەۋەبى: ماخاۋ تاياقچە باكتېرىيىسى كىسلاتاغا قارشى ئاچىماق تاياقچە باكتېرىيىگە تەئەللۇق. ئۇنىڭ شەكىل — ھالىتى تاياقچە باكتېرىيىگە ئوخشاش. داۋالاشتىن بۇرۇن ياكى تەكرار قوزغا لغۇچىلاردىكى باكتېرىيە مۇكەممەل بولۇپ، تەكشى بويىلىدۇ. ئۇنىڭ داۋالاشتىن كېيىن، باكتېرىيە تېنى ئۇزۇلۇپ قىستا توقما قىسمان، قوش شار-چىسىمان، تەشۋىسىمان ياكى دانچىسىمان بولۇپ قالىدۇ. ماخاۋ تاياقچە باكتېرىيىسىنى بەدەن سىرتىدا ئۆستۈرۈش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولىمىدى. يېتىشىمى يىمىرلاردىن بېرى «armadillos» نى ئىشلىتىپ، ماخاۋنىڭ ھايات مودېلىنى تىكلەپ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىپ، ماخاۋ تەتقىقاتىنى يېڭى يول ۋە يېڭى ئۇسۇل بىلەن تەمىنلىدى.

ئېمېدىمۇ لوگىيىسى: ئادەتتە يۇقۇملۇق ماخاۋغا گىرىپتار بولغۇچىنىڭ ئۆزى مەز-كۈر كېسەللىكنىڭ بىردىنبىر يۇقۇملۇق مەنبەسى دەپ تونۇلماقتا؛ كېسەل پەيدا قىلغۇچى باكتېرىيە ئاساسلىق بۇرۇن شىللىق پەردىلىرى ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىرىلىدۇ. ناۋادا مۇشۇنداق كېسەللىرى بىلەن ئۇزۇن ۋاقىت زىچ ئارىلىشىپ يۈرسە، كېسەل پەيدا قىلغۇچى باكتېرىيە نەپەسلىنىش يوللىرى ياكى تېرە شىللىق پەردىلىرىنىڭ زەخمىلىگەن يېرى ئارقىلىق بەدەنگە كىرىدۇ؛ ئورگانىزم ماخاۋ تاياقچە باكتېرىيىسى بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن كېسەل بولۇش - بولماسلىقىنى ۋە كېسەللىگەندىن كېيىن ئۇنىڭ ئىپادىلىنىش تىپلىرىنى، كېسەللىك جەريانى ۋە ئاقىۋىتىنى، ھەرقايسى ئورگانىزمنىڭ ئىممۇنىت ئىقتىدارىنىڭ ئاجىز ۋە كۈچلۈكلىكى بىلەن ئادەتتە كىچىك بالىلار، يا-شانغان تېنى ئاجىزلار، بولۇپمۇ ھۈجەيرە ئىممۇنىت كەمتۈرلىكى بولغۇچىلار ئىنتايىن ئاسان يۇقۇملىنىدۇ دەپ قارىلىدۇ. ماخاۋ كېسەللىكى پەيدا قىلىدىغان ئامىللارنىڭ يۈ-قىرىدا سۆزلەنگەنلىرىدىن سىرت، ھاۋا كىلىماتىنىڭ نەملىكى، يامغۇرنىڭ كۆپلىكى، ئىچ-قىمىلى مۇھىت، چۇغراپىيىلىك رايون قاتارلىقلارمۇ بۇ كېسەللىكنىڭ يۈز بېرىشىگە ۋە تار-قىلىشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: ئادەتتە يوشۇرۇن دەۋرى 5~2 يىل، قىسقا بولغانلارنىڭ پەقەت ئۈچ ئاي، ئۇزۇن بولغانلارنىڭ 10 يىلدىن كۆپرەك بولىدۇ. ئورگانىزمنىڭ ئىممۇنىت ئىقتىدارى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، كىلىنىك ئىپادىلىرى، باكتېرىيىلۈگىيىلىك تەكشۈرۈش،

پاتولوگىيىلىك ئۆزگىرىش، ئىممۇنولوگىيىلىك سىناق ۋە داۋالاشقا بولغان رېئاك-
سىمىسى قاتارلىقلاردا پەرق ئىنتايىن چوڭ بولىدۇ. 1973 - يىلىدىكى ئونىنچى قېتىملىق
خەلقئارالىق ماخاۋ يىغىنىنىڭ تەشەببۇسىغا ئاساسەن، ماخاۋنى پولاروگراف
(*polarograph*) لىق تۈرگە ئايرىش ئۇسۇلى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. يەنى كېسەل ئورگانىزىم
نىڭ ئىممۇنىت ئىقتىدارىغا ئاساسەن، ماخاۋ ئىككى قۇتۇپلۇق تىپقا ۋە ئىككى تىپ
ئوتتۇرىسىدا تەۋرىنىپ تۇرىدىغان ئۈچ خىل ئارا تىپلارغا بۆلۈنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن
ئاتالمىش «بەش قۇتۇپلۇق تۈرگە بۆلۈش ئۇسۇلى» شەكىللىنىدۇ. تۆۋەندە ئايرىم -
ئايرىم بايان قىلىنىدۇ :

1. سىلىسمان ماخاۋ (TT): مەزكۇر تىپلىق كېسەلنىڭ ئىممۇنىت ئىقتىدارى نىسبە-
تەن كۈچلۈك بولۇپ، پولاروگرافىنىڭ بىر ئۇچىدا تۇرىدۇ. ئاساسلىق كېسەللىك ئۆزگى-
رىشى تېرە بىلەن ئەتراپ نېرۋىسىدا چەكلىنىدۇ. كېسەللىك تەرەققىياتى ئاستا، تېرىدىكى
زەخمىلىنىشنىڭ ھەجىمى چوڭ، سانى ئاز بولىدۇ. داغ ئەسۋىسى بىلەن داغ پارچىسى
كۆپ ئۇچرايدۇ. دەسلەپتىكى داغ ئەسۋىسىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى بىردەك بولمايدۇ، يۇمى-
لاق ياكى سوقمىچاق شەكىللىك، ئاق، سۇس قىزىل ياكى قىزىل، گىرۋەكلىرى ئېنىق بولىدۇ.
2~3 ئايدىن كېيىن كېسەللىككە ئورۇن ئۇيۇشىدۇ ۋە تەرلىمەيدۇ. تېرە يىرىكىلىشىپ،
ئۈستى ئازراق قاسراق بىلەن قاپلىنىدۇ، تۈكلەر چۈشىدۇ، بەزىلىرىنىڭ مەركىزىي قىسمى يې-
نىپ ھالقىسىمان ياكى يېرىم ھالقىسىمان بولىدۇ، تارقىلىشى سىمىيەتلىك بولمايدۇ (1.8 - رەسىم).
داغ پارچىسى كۆپىنچە ئىنقىلىپلىق تىپلىك ئۆزگىرىدۇ، گىرۋەكلىرى ئېگىز كۆتۈ-
رۈلۈپ، ئىچىگە يانتۇلىشىدۇ. زەخمىلىنىش يۈز بىلەن كاسسىدا كۆپرەك پەيدا بولىدۇ.
قۇلاق چوڭ نېرۋىسى، بىلىك نېرۋىسى، يان پاكالچاق غول نېرۋىسى ۋە چاناق ئۈستى نېر-
ۋىسى قاتارلىقلار ئادەتتە روشەن ھالدا ئىشىشىپ قاتتىقلىشىپ، موگىسىمان ياكى تەسۋىس-
مان بولۇپ قالىدۇ (2.8 - رەسىم)، سىمىيەتلىك ئەمەس، ئاز ساندىكى كېسەللىرىدە
پەقەت نېرۋا ئالاھىدىلا بولۇپ، تېرە ئەسۋىسى بولمايدۇ. بۇنداقلار نوقۇل نېرۋا يال-
لۇغلىق سىلىسمان ماخاۋ دەپ ئاتىلىدۇ. نېرۋا ئىدارە قىلىدىغان ئورۇنلارغا تەسىر قى-
لىپ، ئوزۇقلىنىش توسالغۇغا ئۇچرىغانلىقتىن، دەسلەپكى دەۋرىدە چوڭ - كىچىك بېلىقچە
مۇسكۇللار يىگىلەيدۇ، ئېغىرلاشقا ئىدارە «قارچۇغا پەنجىسىمان قول» (3.8 - رەسىم)،
«مايمۇن ئالقمىنى»، «ساڭگىلىما بىغىشى»، «ساڭگىلىما پۇت»، «توش -
قىمان كۆز» قاتارلىق غەيرىيىلىكلىرى ۋە تاپان يارىسى كۆرۈلىدۇ
(4.8 - رەسىم)، ئەمما شىللىق پەردىگە ۋە ئىچكى ئەزاغا تەسىر قىلمايدۇ، قاش چۈش-
مەيدۇ. باكتېرىيە تەكشۈرگەندە ئادەتتە مەنپىي، لېپرومىن (*lepromin*) رېئاك-
سىمىسى كۈچلۈك مۇسپىي، زەخمىلىنىشكەن تېرىنى پاتولوگىيىلىك تەكشۈرگەندە
سىلىسمان بىخلىما گۆش ئىشىشى بولىدۇ. ھۈجەيرە ئىممۇنىت فۇنكسىيىسى نورمال ياكى
نورمالغا يېقىن بولىدۇ. مەزكۇر تىپلىق كېسەلنى دەسلەپكى دەۋرىدە داۋالاشقا قىيىن
ياخشى، ئەمما غەيرىيىلىكلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قىيىن.

2. ئارا تىپلىق سىلىسمان ماخاۋ (BT): بۇ تىپتىكى زەخمىلىنىش سىلىسمان ماخاۋغا
ئوخشاش. ئەمما تېرە ئەسۋىسى نىسبەتەن كىچىك، سانى كۆپ، كەڭ دائىرىدە تارقىلىدۇ،
سىمىيەتلىك بولمايدۇ. زەخمىلىنىشكەن ئورۇن قىزىل ياكى ئازراق ساغۇچ بولىدۇ، سىرتقى يۈزى

قۇرغاق بولمايدۇ، گىرۋىكى ئېنىق، نىسبەتەن چوڭ ئەسۋىنىڭ گىرۋەكلىرى بەزىدە سۇنىڭ ھەمراھقا ئوخشاش زەخمىلىنىدۇ. بەزىدە زەخمىلەنگەن ئورۇننىڭ مەركىزىدىكى تېرە نورمال تېرىگە ئوخشايدۇ. خۇددى «تۆشۈك تەشكەندەك» ئىچى - سىرتىنىڭ چىگرىسىدا ئېنىق ھالقا شەكىللىنىدۇ. تەسىرگە ئۇچرىغان نېرۋا سىلىسىمان ماخاۋدەك توم قاتتىق ۋە رەتسىز بولمايدۇ، سېزىمىنىڭ توسالغۇغا ئۇچرىشى نىسبەتەن ئاستا پەيدا بولىدۇ ھەمدە يەڭگىل ئۆتىدۇ. باكتېرىيە تەكشۈرۈش (2^+ ~ 1^+) بولىدۇ. لېپرومىن رېئاكسىيىسى كۆپىنچە ئا-جىز مۇسپىي ياكى گۇمانلىق بولىدۇ. ھۈجەيرە ئىمىونىت فۇنكسىيىسى نورمال ئادەملەر-نىڭكىدىن تۆۋەنرەك بولىدۇ. توقۇلما پاتولوگىيىسى سىلىسىمان ماخاۋ بىلەن ئوخشاش، ئەمما ئۆزە تېرە ئاستىدا تارايغان ئىنفېلىتراتسىيىلەنمىگەن بەلباغنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئاقىۋىتى نىسبەتەن ياخشى، ئەمما تۇراقلىق ئەمەس، ئىككى قۇتۇپقا ئۆزگىرەلەيدۇ، نا-ۋادا ماخاۋ رېئاكسىيىسى يۈز بەرسە، غەيرىيلىك ياكى مېيىپىلىق پەيدا بولىدۇ.

3. ئارا تىپلىق ماخاۋ (BB): زەخمىلەنگەن تېرە كۆپ شەكىللىك، كۆپ رەڭلىك بولىدۇ ھەمدە TT بىلەن LL ئالاھىدىلىكى كۆرۈلىدۇ. ئوخشاش بىر كېسەلدىكى ئوخشاش بىر زەخمىلىنىشتە ئىككى تىپنىڭ تېرە ئەسۋىسى چىقىرىدۇ. داغ ئەسۋىسى، داغ پارچىلىرى ۋە ئىنفېلىتراتسىيىلىك زەخمىلىنىش قاتارلىقلار بولىدۇ، توق سېرىق، ئاچ سېرىق ياكى قارامتۇل قىزىل رەڭلىك، بىر قىسىملىرىنىڭ گىرۋەكلىرى ئېنىق، بىر قىسىملىرى-نىڭ مۇجمەل بولىدۇ. تېرە ئەسۋىسى كەڭ دائىرىدە تارقىلىپ، كۆپ بولىدۇ، ئەمما سىممېتىرىك بولمايدۇ. ئادەتتە قاش چۈشمەيدۇ. نېرۋىدىكى زەخمىلىنىش TT نىڭ كىمىدىن يەڭگىلرەك، LL نىڭكىدىن ئېغىرراق، ئۇيۇشۇش يېنىك دەرىجىدە بولىدۇ، شىللىق پەردىگە ۋە ئىچكى ئەزالارغا تەسىر قىلىدۇ. باكتېرىيە تەكشۈرۈش (4^+ ~ 3^+) بولىدۇ. لېپرومىن رېئاكسىيىسى مەنپىي. بۇ تۈردىكى ماخاۋ ئىنتايىن تۇراقسىز بولۇپ، BT تىپىغا ياكى BL تىپىغا ئۆزگىرىدۇ.

4. ئارا تىپلىق ئۆسسىمان ماخاۋ (BL): زەخمىلىنىش ئۆسۈمچەن تىپلىق ماخاۋغا ئوخشايدۇ. ئەمما پۈتۈنلەي سىممېتىرىك ئەمەس. داغ ئەسۋىسى، داغ پارچىسى، تۈگۈن-چە ۋە يېمىلما يۈزە ئىنفېلىتراتسىيىلىنىش بولىدۇ. ئىچى گىرۋىكى ئېنىق، سىرتقى گىرۋىكى مۇجمەل «تېشىلىك» تۆشۈكتەك رايونلارنى كۆرگىلى بولىدۇ؛ ئازراق كېچىكىدۇ، بىر قىسىم تېرە ئەسۋىسى يېنىك دەرىجىدە ئۇيۇشىدۇ. نېرۋىنىڭ تەسىرگە ئۇچرىشى كېچىكىپ كۆرۈلىدۇ، تەكشى توملىشىدۇ، ئەمما نىسبەتەن يۇمشاق بولىدۇ، سىممېتىرىك بولمايدۇ، چاچ، قاش چۈشۈپ كېتىدۇ. شىللىق پەردە ۋە ئىچكى ئەزاغا تەسىر قىلىدۇ. باكتېرىيىنى تەك-شۈرگەندە (5^+ ~ 4^+) بولىدۇ. لېپرومىن رېئاكسىيىسى مەنپىي، ئاقىۋىتى ئۆسۈمچەن تىپنىڭكىدىن بىر ياكى BB ياكى LL تىپىغا ئۆزگىرىدۇ.

5. ئۆسسىمان ماخاۋ (LL): بۇ تىپتىكى كېسەلنىڭ ماخاۋ تاياقچە باكتېرىيىگە بولغان ئىمىونىتلىق كۈچى يېتەرسىز بولغانلىقتىن، بولاروگراف (Plarograp) نىڭ يەنە بىر ئۇچىدا تۇرىدۇ. يۇقۇشچانلىقى كۈچلۈك. تېرە زەخمىلىنىپ روشەن ھەم كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بولىدۇ. داغ ئەسۋىسى، داغ پارچىسى، يېمىلما ئىنفېلىتراتسىيىلىنىش ۋە تۈ-گۈنچە قاتارلىق كۆپ خىل شەكىلدە كۆرۈلىدۇ. تېرە زەخمىلىنىش كىچىك ھەم كۆپ، سانى مۇقىم ئەمەس، ئىنفېلىتراتسىيە روشەن، گىرۋەكلىرى مۇجمەل بولىدۇ. سىممېتىرىك، كەڭ

گۈلەمدە تارقىلىدۇ. پۈتۈن بەدەننىڭ تېرىلىرىگە تەكشى تەسىر قىلىدۇ. دەسلەپتە چوڭ- كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان سۇس قىزىل ياكى سۇس رەڭلىك داغ ئەسۋىسى پەيدا بولۇپ، تەدرىجى يۈزە ئىنفېلىتراتسىيەلىك تېرە زەخمىلىنىشكە ئۆزگىرىدۇ ياكى داغ پارچىلىرى تېرە يۈزىدىن ئېگىز كۆتۈرۈلىدۇ، سىرتقى يۈزى سىلىق مايلانغاندەك پارقىراپ، سۇلۇق ئىششىق ياكى يەلتەشمىدەك كۆرۈلىدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتمەيلا ئۆزئارا بىرلىشىپ چوڭ دائىرىدە يىمىرما، چوڭقۇر ئىنفېلىتراتسىيەلىك زەخمىلىنىدۇ. كېسەللىك تەدرەققىياتىغا ئەگىشىپ چوڭ- كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان تۈگۈنچە شەكىللەنىپ قىزىل ياكى بېغىررەڭ پارقىراق شىرنىلىك نەرسىگە ئوخشاپ قالىدۇ (5.8 - رەسىم). ئەگەر يۈزىدە بولسا، تېرىنىڭ يىمىرما قېلىنىلىشى، داغ پارچىسى، تۈگۈنچە قاتار- لىقلارنىڭ ئارىلىشىپ كېتىشىدىن «شىر يۈزى» (6.8 - رەسىم) دەك كۆرسىتىدۇ. كېسەل باشلانغاندا يەرلىك ئورۇندا چۈمۈلە ئۆمىلىگەندەك سېزىم بولۇپ، كېيىن يېنىك دەرىجىدە ئويۇشىدۇ. ئەڭ ئاخىرى تېرە ئەسۋىسى بار ئورۇن تېرىسىنىڭ سېزىمى پۈتۈنلەي يوقىلىدۇ ۋە تەرلىمەيدۇ. دەسلەپكى دەۋرىدە قاش چۈشۈپ شالاڭلىشىدۇ، كېيىن كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئىلگىرىلىشىگە ئەگىشىپ قاش، كىرىپىك ۋە بۇرۇن تۈكى پۈتۈنلەي چۈشۈپ كېتىدۇ. ئەتراپ نېرۋىغا كېچىكىپ تەسىر قىلىدۇ، نېرۋىلار سىمىيەتلىك يېنىك دەرىجىدە تەكشى تولىشىدۇ، يۇمشاق بولىدۇ. ھەرىكىتى ۋە ئوزۇقلىنىشى توسالغۇغا ئۇچرايدۇ، ئەمما غەيرىيلىك TT تىپىغا نىسبەتەن ئاز كۆرۈلىدۇ. ئوتتۇرا، ئاخىرقى دەۋرىدىكى كېسەللەرنىڭ كۆز، بۇرۇن، يۇتقۇنچاق - كېكىردەك قاتارلىق ئورۇن- لىرىنىڭ شىللىق پەردىسى ۋە لىمفا تۈگۈنلىرى، جىگەر، ئال، يىلىك، جىنىسى بەزلەرنىڭ ھەممىسى زەخمىلىنىدۇ ۋە بۇنىڭغا مۇناسىپ «ئىگەر بۇرۇن»، ئەمالىق، بارماقلار ئۇچى ئىنچىكىلەش، ئەرلەر ئاياللىشىپ كېتىش ۋە ئاياللاردا ھەيز تۇتۇلۇش قاتارلىق كلىنىك لىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، باكتېرىيە تەكشۈرۈش ($5^+ \sim 6^+$) بولىدۇ، لېپرومىن رېئاك- سىيە مەنپىي، ھۈجەيرە ئىممونىت سىنىقى روشەن تۆۋەنلەيدۇ، پاتولوگىيەلىك تەك- شۈرۈشتە تىپىك كۆپۈك ھۈجەيرىدىن شەكىللەنگەن ئالاھىدە بىخلىما گۆش ئىششىقىغا ئۆز- گىرىدۇ. ئاقسۇدى باشقا تۈردىكىلەرنىڭكىدىن ناچار. ئەمما دەسلەپكى دەۋرىدە داۋا- لىسا ئۈنۈمى نىسبەتەن ياخشى بولىدۇ، ناۋادا داۋالاش كېچىكىپ ئاخىرقى دەۋرىدە ئېلىپ بې- رىلسا، فۇنكسىيەلىك توسالغۇ ئۇچراش ۋە غەيرىيلىك پەيدا بولۇپ، ئەسلىگە كېلىشى قىيىنلىشىدۇ.

6. تۈرى بېكىتىلمىگەن تىپى I بۇنىڭدا ھەرقايسى تىپلىق ماخاۋنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدىكى ئىمپادىلىرى كۆرۈلىدۇ، ئەمما ھەرقايسى تىپلىق ماخاۋنىڭ تىپىك ئالاھىدىلىك- لىرى بولمايدۇ. شۇڭا «بەش قۇتۇپلۇق تۈرگە بۆلۈنۈشى» گە كىرگۈزۈلمىگەن، كلىنىك كىدا سۇس رەڭلىك داغ، قىزىل داغ ياكى قوڭۇر رەڭلىك داغ ئىمپادىلىنىدۇ، داغنىڭ ھەج- مى كىچىك، سانى ئاز، يېنىك دەرىجىدە سېزىم توسالغۇغا ئۇچرايدۇ. نېرۋىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىشى نىسبەتەن يەڭگىل، باكتېرىيە تەكشۈرۈشتە كۆپىنچە مەنپىي بولىدۇ، لېپرومىن رېئاكسىيەسى كۆپ ساندىكىلەرنىڭ مۇسپىي، ئاز ساندىكىلەرنىڭ مەنپىي بولىدۇ. بۇ تۈر- دىكى ماخاۋنىڭ خاراكتېرى بىكىتىلمىگەن، ئاز ساندىكىلىرى ئۆزلۈكىدىن ساقايغاندىن سىرت، ئورگانىزم ئىممونىت ئىقتىدارىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ خېلى نۇرغۇنلىرى TT تىپىغا، بىر قىسمىلىرى BB تىپىغا ياكى BL تىپىغا ئۆزگىرىدۇ.

ماخاۋ رېئاكسىيەسى : ماخاۋنىڭ سوزۇلما كېسەللىك جەريانىدا ، دورىلار ، ھاۋا كىلىماتى ، ئەگەشمە كېسەللىكلەر ، زىيادە چارچاش ، ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ ئۆزگىرىشى ، روھىي غىدىقلىنىش ياكى ھاراق ئىچىش قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن ئەسلىدىكى ئالامەتلەر تۇيۇقسىز ئۆتكۈر ياكى سۇس ئۆتكۈر جانلىنىش ھادىسىسى يۈز بېرىش ، ئېغىر-لاردا پۈتۈن بەدەننىڭ ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىش — ماخاۋ رېئاكسىيەسى دېيىلىدۇ . ئۇنىڭ پەيدا بولۇش مېخانىزمىنى ئېھتىمال ئىمىجىنى تەكپۈڭلۈقنىڭ قالايمىقا ئىلىشىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن . بۇ ، كلىنىكىدا I تىپى ، II تىپى ۋە ئارىلاش تىپى دەپ ئۈچ خىلغا بۆلۈنىدۇ . I تىپىدىكى ماخاۋ رېئاكسىيەسى — كېچىككەن ھالەت ئۆزگىرىش رېئاكسىيەسىگە تەئەللۇق بولۇپ ، ئاساسلىق TT ۋە BB تىپلىق كېسەللىكلەردە يۈز بېرىدۇ . بۇنىڭدا ئەسلىدە بار بولغان تېرە ئەسۋىسى ۋە نېرۋا ئالامەتلىرى ئېغىرلىشىپ ، يېڭى زەخمىلىنىش پەيدا بولۇش ، ئەمما پۈتۈن بەدەننىڭ ئالامەتلەر بولماسلىق ، قاننى قاندىلىك تەكشۈرگەندە نورمال سىزلىق روشەن بولماسلىق ، رېئاكسىيەدىن كېيىن كۆپ ساندىكى كېسەللەرنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى ياخشىلىنىپ ، ئاز ساندىكى كېسەللەر يامانلىشىپ كېتىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ . II تىپتىكى ماخاۋ رېئاكسىيەسى III تىپلىق ھالەت ئۆزگىرىش رېئاكسىيەسىگە تەئەللۇق بولۇپ ، ئاساسلىق LL ۋە BL تىپلىق كېسەللىكلەردە يۈز بېرىدۇ . بۇنىڭدا دائىم ئۇچرايدىغان ئالامەتلەر تۈگۈنلۈك قىزىل داغ ، كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ ، نېكروزلۇق قىزىل داغ ، نېرۋا كۆرۈنەرلىك ئىشىشىپ ، باسقاندا ئاغرىش ھەمدە ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئاغرىشىدۇر ، ئادەتتە كۆرۈنەرلىك پۈتۈن بەدەننىڭ ئالامەتلەر ۋە باشقا ئەزالار ئالامەتلىرىدىن ئاق قان ھۈجەيرىلىرى كۆپىيىش ، قاننىڭ چۆكۈشى تېزلىشى ۋە قان ئازلىق قاتارلىقلار قوشۇلىدۇ . III تىپلىق ماخاۋ رېئاكسىيەسى — يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككى تىپى بولغان ئارىلاشما تىپلىق ماخاۋ رېئاكسىيەسىدىن ئىبارەت .

دېئاگنوزى : ماخاۋغا دېئاگنوز قويۇشتا ئالاھىدە ئېھتىياتچان پوزىتسىيىدە بولۇش كېرەك ، ئادەتتە تۆۋەندىكى بىرنەچچە تەرەپتىن قول سېلىش لازىم :

1. كېسەل تارىخى : ماخاۋغا گىردىپتار بولغان كېسەل بىلەن ئۇچرىشىش تارىخىنىڭ بار-يوقلۇقىنى ۋە ماخاۋ تارقىلىش رايونىدىن كەلگەن — كەلمىگەنلىكىنى نۇقتىلىق ئىگىلەش .
 2. بەدەن تەكشۈرۈش : تېرە ، شىلىق پەردىدە گۇما ئىلىق زەخمىلىنىشنىڭ بار-يوقلۇقى ۋە سېزىمى ، تەرلەش ئەھۋالى ، ئەتراپ نېرۋا ئىشىشىپ قاتتىقلاشقانمۇ-يۇق ، لىمفا تۈگۈنىنىڭ ئىشىشى ئەھۋالى ۋە غەيرىيلىكلىرىنىڭ بار-يوقلۇقى قاتارلىقلارغا دىققەت قىلىش لازىم .
 3. باكتېرىيە تەكشۈرۈش : زۆرۈر تېپىلغاندا چاقى ئۇستى ، مەڭزى ، قۇلاق يۇمشىقى ، ئېگەك قاتارلىقلارنىڭ ئەسۋە بار ئورنىدىن ۋە بۇرۇن شىلىق پەردىسىدىن توقۇلما سۇ-يۇقلۇقى قىرىپ ئېلىنىپ ماخاۋ تايانچى باكتېرىيەسىنىڭ بار-يوقلۇقى تەكشۈرۈلىدۇ .
 4. كەسپىنى پاتولوگىيەلىك تەكشۈرۈش : گۇما ئىلىق كېسەللەرنىڭ يېڭى پەيدا بولغان تېرە ئەسۋىسىدىن توقۇلما ئېلىپ تەكشۈرگەندە دېئاگنوز ئېنىقلىنىدۇ . لېپرومىن سىنىقى تىپىنى ئايرىش ۋە ئاقمۇتتىگە ۋەكۈم قىلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ، ئادەتتە مەخسۇس ئورگاندا ئىشلىنىدۇ .
- دېئالېزى :** ماخاۋنىڭ تېرە زەخمىسى ھەر خىل ، ھەر ياڭزا بولىدۇ ، بۇنى بەدەن تەمرەتكىسى ، ئالاچىپار تەمرەتكە ، قىزىل ھال رەڭ توپان ئەسۋىسى ، توقول توپان ئەسۋىسى ، ئادەتتىكى بۆرە چاقىسى ، يەرلىك تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى ، تۈگۈنلۈك

قىزىل داغ (ماخاۋ رېئاكسىيىسى بولغاندا) قاتارلىق تېرە كېسەللىكىدىن پەرقلەندۈرۈشكە دىققەت قىلىش لازىم. يۇقىرىدىكى كېسەللەرنىڭ ھەرقايسىسىنىڭ ئالاھىدە كلىنىك كىلىمى ئىپادىلىرى بولىدۇ، ئەمما ئەتراپ نېرۋىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىشى ۋە تەرىلىمە سىلىك ئالامىتى بولمايدۇ. ماخاۋ بىلەن باشقا نېرۋا كېسەللىكلىرىنى پەرقلەندۈرۈشتە مەزكۇر كېسەلنىڭ نېرۋا ئالامەتلىرى ئەتراپ نېرۋىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىشىدىن كېلىپ چىققانلىقى، ئادەتتە چوڭقۇر سىزىمدا ئۆزگىرىش روشەن بولمايدىغانلىقى، نېرۋا غولىنىڭ تومىلاپ چوڭلايدىغانلىقى مۇھىم نۇقتا قىلىنىدۇ. زۆرۈر تەپسىلىغا ئىزاھ قىلىش تەجرىبىسىنى ئىشلەشنىڭ پەرقلەندۈرۈشكە ياردىمى بولىدۇ.

داۋالاش: ئوزۇقلىنىشنى كۈچەيتىشكە دىققەت قىلىپ، مۇۋاپىق ئىدارام ئالدۇرۇش، ھاراق ئىچىشنى چەكلەش لازىم. دورا ئىشلىتىش پرىنسىپى: دەسلەپكى دەۋردە، يېتەرلىك مىقداردا، تولۇق كۇرسلۇق، رېتىملىق دورا ئىشلىتىشتىن ئىبارەت، نۆۋەتتە ماخاۋنى داۋالاشتا دائىم ئىشلىتىلىدىغان دورىلار تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىلدىن ئىبارەت:

1. سۇلفۇن تۇرىدىكى دورىلار: ماخاۋ تايياقچە باكتېرىيىسىنى تورمۇزلاش رولى بار. داۋالاش ئۈنۈمى نىسبەتەن ياخشى. نۆۋەتتە ماخاۋنى داۋالاشتا ئالدىنقى قاتاردىكى دورا ھېسابلىنىدۇ. بۇ تۈردىكى دورىلارنىڭ بەلگىلىك ناچار تەسىرى بولۇپ، ئۇزۇن مۇددەت ئىشلىتىلىدۇ - غايىلىقتىن، مۇۋاپىق مىقدارنى ئىگىلەش لازىم. ناۋادا داۋالاش جەريانىدا قان ئاز-لىق كۆرۈلسە، تۆمۈر ياسا لىمىلىرى بېرىلىدۇ. دورا ئەسۋىسى كۆرۈلسە، دورا توختىتىلىدۇ. چىگرە، بۆرەك زەخمىلەنگەن ۋە قان ئازلىق بولغان كېسەللەرگە ئىپتىتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم. دائىم ئىشلىتىلىدىغان دورىلاردىن: داپسونۇم (DDS) دەسلەپتە كۈنىگە 25g دىن بېرىلىپ، كېيىن ھەر 4~2 ھەپتەدە 25mg دىن ئاشۇرۇپ، كۈندىلىك قامداش مىقدارى 100mg غا يەتكۈزۈلىدۇ. ھەر ئالتە كۈندە بىر كۈن دورا ئىچىش توختىتىلىدۇ، ئۇدا 3 ئاي ئىچكۈزۈلگەندىن كېيىن دورا ئىچىش 2 ھەپتە توختىتىلىدۇ. دورا ئىچىش تەكرارلانغاندا قامداش مىقدارىدىن باشلىنىدۇ. دىئاگنوستىك سۇلفۇن (DADDS) ئۇزاق ئۈنۈملۈك ئوكۇل بولۇپ، ھەر ئىككى يېرىم ئايدا بىر قېتىم، مۇسكۇلغا 225mg (1.5ml) دىن ئوكۇل قىلىنىدۇ. ھازىر بۇ دورا ئالدىنقى ئىپتىتىياتقا ئىشلىتىلمەكتە.

2. سۇلفۇكاربامىد تۈرىدىكى دورىلار: ماخاۋ تايياقچە باكتېرىيىسىنى تورمۇزلاش ۋە ئورگانىزىمدىكى يۇتقۇچى ھۈجەيرىلەرنىڭ فۇنكسىيىسىنى كۈچەيتىش رولىغا ئىگە. ئادەتتە سۇلفۇن تۈرىدىكى دورىلارغا چىداشلىق بېرەلمىگەن ياكى ئۈنۈمى بولمىغان كېسەللەرگە ئىشلىتىلىدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت (12 ئايدىن كۆپرەك) ئىشلەتكەندە، ئاسانلا دورىغا چىدامچانلىقىنى پەيدا قىلىش، يىمىكىنى زەھەرلەش تەسىرى بولغانلىقتىن، قايتا ئىشلەپچىقىرىش توسالغۇغا ئۇچراش خاراكتېرلىك قان ئازلىقىنى ۋە دانىچە ھۈجەيرە ئازلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭلاشقا بۇ دورا نۆۋەتتە كۆپىنچە باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. تاتسىپتازونۇم (TB1) مۇ ئىشلىتىلىدۇ، بۇنىڭ ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى سۇلفۇنغا ئوخشاش بولۇپ، ئىشلەتكەندە قاتتىق كۆزىتىش لازىم.

3. خلوفازېمىن (B_{88}): ماخاۋ تايياقچە باكتېرىيىسىنى تورمۇزلاش ۋە ياللۇغلىق ئىشقا قارشى تۇرۇش رولى بولۇپ، سۇلفۇن تۈرىدىكى دورىلارغا نىسبەتەن چىدامچانلىق

پەيدا بولغان ۋە ماخاۋ رېئاكسىيىسى يۈز بەرگەن كېسەللەرگە ئىشلىتىلىدۇ. دەسلەپتە كۈن ئارىلاپ $0.1g$ دىن بېرىلىپ، ئىككى ھەپتەدىن كېيىن كۈنىگە $0.1g$ دىن بېرىلىدۇ. دورا ئىشلىتىشنىڭ باشقا ئۇسۇللىرى ۋە داۋالاش كۇرسى داپسونۇمنىڭكىگە ئوخشاش. ماخاۋ رېئاكسىيىسى يۈز بەرگەندە كۈنىگە $400mg \sim 200$ دىن بېرىلىپ، رېئاكسىيە تىزگىنلەنگەندىن كېيىن دورا مىقدارى تەدرىجى ئازايتىلىدۇ. تېرە قىزىرىش دائىم ئۇچرايدىغان ئاچار تەسىرى بولۇپ، تېرە زەخمىلەنگەن ئورۇندا بەكمۇ روشەن كۆرۈلىدۇ.

4. رېئاكسىيەسى: تېز سۈرئەتتە باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش رولى بولۇپ، پاتلا روشەن ئۈلۈم بېرىدۇ، ئەمما دورىغا چىدامچانلىق ئاسان پەيدا بولىدۇ. شۇڭلاشقا باشقا ماخاۋغا قارشى دورىلار بىلەن بىرلىكتە ئىشلىتىش لازىم. ئادەتتە چوڭلارغا كۈنىگە $450 \sim 600mg$ دىن، ئۆچكە بۆلۈپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

5. جۇغىي دورىلىرى: ساۋىڭجۈاڭۋەن كۈمۈشچى كۈنىگە $12g \sim 9$ دىن، ئۆچكە بۆلۈپ ئىچكۈزۈلسە مەلۇم ئۈنۈمى بولىدۇ.

ماخاۋ رېئاكسىيىسىنى داۋالاش: كېسەلدە ماخاۋ رېئاكسىيىسى كۆرۈلگەن ھالدا-ۋالاپ، كېسەل ئازابىنى ئازايتىش ۋە غەيرىيلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. ئادەتتە كور-تىكسىتروئىد ئىشلىتىپ داۋالىنىدۇ. تالىدومىد (*Thalidomid*) II تىپلىق رېئاكسىيەسىگە مۇۋاپىق كېلىدۇ. چوڭلارغا كۈنىگە $400mg \sim 200$ بېرىلىپ، كېسەللىك ئەھۋالى تېز سۈرئەتتە ئازايتىلىدۇ. كېيىن قانداش مىقدارى $100mg \sim 25$ غا كېچەيتىلىدۇ. لى گوتتېڭ (يىلتىز پوستى، نوتا - يوپۇرما قىلىرى ئېلىنىپ تاشلىنىدۇ)، كۈنىگە $30g \sim 15$ ، سۇدا قاينىتىپ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچكۈزۈلىدۇ. بۇ ئىككى تىپلىق رېئاكسىيىنىڭ ھەممىسىگە ئۈنۈم بېرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ھىستامىنغا قارشى دورىلار، كالتسىي - يالىلىلىرى، ۋىتامىن B_1 ، B_{12} ، C ۋە قانداقلاپ داۋالاش ئۇسۇلى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ. ئېغىر ماخاۋ رېئاكسىيىسى ياكى ماخاۋغا قارشى دورىلار بىلەن داۋالاشقا مۇناسىۋەتلىك رېئاكسىيىلەر بولغاندا دورىنى ۋاقىتلىق توختاتقاندىن ياكى دورا مىقدارىنى ئازايتقاندىن سىرت، دورىنى ئادەتتە پۈتۈنلەي توختىتىپ قويۇشقا بولمايدۇ. قوشۇمچە: 1984 - يىلى ماخاۋ كېسەلى مەسلىھەت يىغىنىدا كۆپ باكتېرىيە تىپلىق ماخاۋغا «ماخاۋ كېسەلىنى بىر لەشە خىمىيەلىك داۋالاش سىناق لايىھىسى» نى قوللىنىش تەشەببۇس قىلىنىپ، ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشىلدى. بۇنىڭدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن، تۆۋەندە تونۇشتۇرۇلىدۇ:

1. *DDS* كۈنىگە بىر قېتىم، $100mg$ دىن ئىچىلىپ ئالتە كۈندە بىر قېتىم دورا توختىتىلىدۇ.

2. رېئاكسىيە ياكى رېئاكسىيە (*Ripamdin*) لار دەسلەپتە كۈنىگە $600mg$ دىن، ئىككى كۈندىن كېيىن ھەر ئايدا بىر قېتىم، $600mg$ دىن كۆزىتىش ئاستىدا ئىچكۈزۈلىدۇ.

3. B_{666} ھەر ئايدا بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا $300mg$ دىن نازارەت ئاستىدا ئىچىلىدۇ. ئەگەر B_{666} نى ئىچىشنى رەت قىلسا، ئۇنىڭ ئورنىغا ئېتونامىد ياكى پروتونامىد كۈنىگە $300mg$ دىن ئىچكۈزۈلىدۇ.

كۆزىتىشتە كلىنىكىلىق ساياھەت بولسا مۇشۇلا يىمە بويىچە مۇستەھكەم داۋالاشنى 3 يىل ياكى يالغۇز *DDS* لايىھىسى بويىچە مۇستەھكەم داۋالاشنى 5 يىل داۋاملاشتۇرغىلى بولىدۇ. ئالدىنقى ئېلان: ئېچىمچىلىق رايونىدىكى ئاممىغا تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ماخاۋ ۋە ھىمىيە ۋە ماخاۋ كېسەلىگە گىرىپتار بولغانلارنى كەمسىتىش روھى ھا-

لەتتىنى يوقىتىش لازىم. ئىمكانىيەتنىڭ بېرىچە بالدۇر بايقاپ، بالدۇر داۋالاش ھەمدە باكتېرىيە تەكشۈرۈشى مۇسپىي بولغانلارنىڭ ئىزولاتسىيە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ۋە مايىل كىشىلەر بىلەن كېسەلنىڭ ئائىلە تاۋابىتى تلىرىنى قەرەللىك تەكشۈرۈپ، ئۇلارغا كالىپت — گىمۇبىرىن ۋاكسىنىسىنى ئەمەلەش لازىم.

28. تېرە سىلى

تېرە سىلى — سىل تاياقچە باكتېرىيىسى كەلتۈرۈپ چىقارغان تېرە سوزۇلما كېسەلى. يۇقۇلمىنىش يوللىرى ئىچكى يۇقۇلمىنىش ۋە سىرتقى يۇقۇلمىنىش دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. ئىچكى يۇقۇلمىنىشتا بەدەندىكى سىل كېسەللىك ئوچىقىدىكى سىل تاياقچە باكتېرىيىلىرى قان ۋە لىمفا ئارقىلىق ياكى قوشنا ئورۇندىكى كېسەل ئوچىقىدىن بىۋاسىتە تېرە توقۇلمىلىرىغا يامراشتىن كېسەللىك پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن: دۆڭچە ئەسۋە نېكرىزىلىمىشلىق سىل ئەسۋەسى ۋە قاتتىق قىزىل داغ قاتارلىقلار. سىرتقى يۇقۇلمىنىشتا سىل تاياقچە باكتېرىيىسى زەخمىلەنگەن تېرە ياكى شىللىق پەردىدىن بىۋاسىتە مەزكۇر ئورۇننىڭ تېرىسىگە تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشتىن كېسەللىك پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن: ئاددىي بۆرە چاقىسى ۋە سۆگەلىسىمان تېرە سىلى قاتارلىقلار.

كىلىنلىك ئىپادىلىرى: چەكلىك تىپى ۋە ئەسۋە تىپى دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ.

1. ئاددىي بۆرە چاقىسى: بۇ چەكلىك تىپلىق تېرە سىلىغا كىرىدۇ. تېرە سىلىنىڭ 60% نى ئىگىلەيدۇ. بالىلار ۋە ياش — ئۆسمۈرلەردە ئاسان يۈز بېرىدۇ. دەسلەپتە ئاز ساندا تېرىقتەك ياكى سېرىق پۇرچاقتەك چوڭلۇقتا قارامتۇل قىزىل رەڭلىك قاتتىق تۈگۈنچە پەيدا بولۇپ بۆرە چاقىسى تۈگۈنى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنى ئەينەك پىلاستىنكا بىلەن بېسىپ قارىغاندا سۇس سېرىق رەڭدە، يەنى ئالما مۇرابباسىمدەك كۆرۈنىدۇ. مانا بۇ مەزكۇر كېسەلنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. كېيىن تۈگۈن تەدرىجى چوڭىيىپ ھەم بىرلىشىپ داغ پارچىسىغا ئايلىنىدۇ، ئۈستىنى نېپىز بېلىق قاسرىقىدەك كېچەك قاپلاپ ئالىدۇ، گىرۋىكى ئېنىق بولىدۇ، تۈگۈن ئۆزلۈكىدىن شۇمۇرۇلىدۇ ياكى بۇزۇلۇپ يارىلىنىپ يۈزە يارا شەكىللىنىدۇ ھەمدە تۆت تەرەپكە ياكى بىر تەرەپكە قاراپ ئۆزلۈكسىز سۇ ئاستىدا ماڭغاندەك تەرەققىي قىلىدۇ. مەركىزىي قىسمى ساقىيىپ ئورنى يىگىلەشچان تاتۇق بولۇپ قالىدۇ (8 . 7 - رەسىم)، ئەمما تاتۇق ۋە ئۇنىڭ گىرۋەكلىرىدە يەنە يېڭىدىن تۈگۈن پەيدا بولىدۇ. بۇ يۈز، پۇت — قول ۋە كىيىمدا ئاسان يۈز بېرىدۇ. بۇرۇن ۋە ئېغىزنىڭ شىللىق پەردىلىرىدىمۇ كۆرۈلىدۇ، كۆپىنچە بىر تەرەپتە بولىدۇ. ھىسسىي ئالامەتلەر يەڭگىل، كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ ئۇزۇنغىچە ساقايمايدۇ، توقۇلما بۇزۇلغانلىقتىن غەيرىيلىك كېلىپ چىقىدۇ.

2. سۆگەلىسىمان تېرە سىلى: بۇمۇ چەكلىك تىپلىق تېرە سىلىغا كىرىدۇ. چوڭلاردا ئاسان يۈز بېرىپ، ئەرلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ. دەسلەپتە بېغىرەك دۆڭچە ئەسۋە چىقىپ، كېيىن تەدرىجى تەرەققىي قىلىپ تۈگۈنگە ئايلىنىدۇ، تېڭى سىلىق، بارغانسېرى ئۆزئارا بىرلىشىپ سۆگەلىسىمان كۆپىيىش خاراكتېرلىك داغ پارچىسىغا ئايلىنىدۇ. بۇلارنىڭ ئوتتۇرىسى نىسبەتەن چوڭقۇرراق ئېرىقچە سىزىق بىلەن ئايرىلىپ تۇرىدۇ. باسقاندا ئاز

مەقداردا يىرىپ سىرغىپ چىقىدۇ. تۆت ئەتراپىغا قاراپ تەرەققىي قىلىدۇ، گىرۋەكلىرىمى قىزىل چەمبەر ئوراپ تۇرىدۇ. مەركىزىي قىسمى سا قىيىپ، ئورنىدا يىگىلەشچان ئاق تۇق پەيدا بولىدۇ. قول-بارماقلارنىڭ ئارقا تەرىپى، پۇت، كاسسا قاتارلىق ئوچۇق تۈرىدە خان ئورۇنلاردا (8. 8- رەسىم) ئاسان يۈز بېرىدۇ، ئادەتتە ھەممىسى ئالامەتلەر بولمايدۇ، كېسەللىك جەريانى ئاستا بولىدۇ. ئەگەر داۋالامىسا نەچچە يىلدىن نەچچە ئون يىلغىچە ساقايمايدۇ. 3. دۆڭچە ئەسۋە نېكروزلىنىشلىق سىل ئەسۋەسى: بۇ ئەسۋە تىپلىق تېرە سىلىغا كىرىدۇ. ياشلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. ئادەتتە باشقا ئەزالارنىڭ سىلى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. تىپىك زەخمىلىنىش — كۆمە قوناق چوڭلۇقىدا جىگەررەك، يەككە، ئەتراپى قىزىل چەمبەر بىلەن ئورالغان، مۇستەھكەم، تۈك خالىتلىق دۆڭچە ئەسۋە ياكى تۈگۈنچىدىن ئىبارەت، باسقاندا ئاغرىمايدۇ. كېيىن مەركىزىي قىسمى نېكروزلىنىپ قاقچىلىنىپ، قاقچ چۈشۈپ كەت-كەندىن كېيىن يالقۇن تاغ ئېغىزىدەك كىچىك يارا بولۇپ قالىدۇ. نەچچە ھەپتە ساقايىدۇ، ئورنىدا پېگمېنت توچكىسىمان چۆكۈمە بولۇپ، چېچەكسىمان تات-تۇق پەيدا بولىدۇ (8. 9- رەسىم). تۈركۈملەپ، توپ- توپ، نۆۋەتلىشىپ سىمىيىتىرىك ھالدا پەيدا بولۇش بۇنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. پۇت- قولنىڭ تۈزلىنىدىغان تەرىپىدە ئاسان يۈز بېرىدۇ. بولۇپمۇ تىزنىڭ ئالدى، جەينەكنىڭ كەينى تەرىپىدە بەكمۇ ئاسان يۈز بېرىدۇ، ھەممىسى ئالامەتلەر بولمايدۇ، كېسەللىك جەريانى ئاستا بولىدۇ.

4. قاتتىق قىزىل داغ: بۇمۇ ئەسۋە تىپلىق تېرە سىلىغا كىرىدۇ. قىش، ئەتىيازدا ئاسان يۈز بېرىدۇ، پۇت- قول كۆكۈرۈش قوشۇلۇپ كەلگەن ياش ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە باشقا ئەزالارنىڭ سىلى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. دەسلەپتە دادۇرنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىدە چوڭقۇر تۈگۈن بولۇپ، نەچچە ھەپتەدىن كېيىن چوڭىيىدۇ ھەمدە تېرە بىلەن چاپلىشىپ تېرە يۈزىدىن ئازراق كۆتۈرۈلىدۇ، رەڭگى قارامتۇل قىزىل ياكى بېغىررەك بولىدۇ، قاتتىق، مىدىرىمايدۇ، چېگرىسى ئېنىق ئەمەس، باسقاندا ئازراق ئاغرىيدۇ. مانا بۇنىڭ ئالاھىدىلىكى. نەچچە ئايدىن كېيىن بىر قىسىم تۈگۈننىڭ مەركىزىي قىسمى يۇمشاقلىشىپ ئازگالىسىمان ياكى سۇ ئاستىدا ماڭغاندەك يارىغا ئايلىنىدۇ، ئاستا ساقايىدۇ. ساقايغاندىن كېيىن ئورنى پېگمېنت چۆكۈملىك تاتۇق بولۇپ قالىدۇ. بىر قىسىم تۈگۈن ئۆزۈكىدىن شۇمۇرۇلۇپ كېتىدۇ. پاقالچاقنىڭ تۆۋەنكى 1/3 قىسمىنىڭ يىغىلىدۇغان تەرىپىدە ئادەتلىنىش خاراكتېرلىك يۈز بېرىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ ئادەتتە ئاسان قوزغىلىدۇ.

دېئاگنوزى: ھەر قايسى تىپتىكى تېرە زەخمىلىنىشنىڭ ئالاھىدىلىكى، ئاسان يۈز بېرىدىغان ئورۇن، سوزۇلما كېسەللىك جەريانى ۋە زۆرۈر تېپىلغاندا توقۇلمىنى پاتولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ۋە تۈبېرىكۈلىنى سىنىقتى قاتارلىقلارغا ئاساسەن ئومۇميۈزلۈك ئانالىز قىلغاندا دېئاگنوز قويۇش تەس ئەمەس.

سېلىشتۇرما دېئاگنوزى: سۆڭەكلىسىمان تېرە سىلىنى ئادەتتىكى سۆڭەك بىلەن، ئادەتتىكى بۆرە چاقىسىنى تەخسىسىمان قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى بىلەن دۆڭچە ئەسۋە نېكروزلىنىشلىق سىل ئەسۋەسىنى تۈگۈنلۈك قان تومۇر ياللۇغى بىلەن، قاتتىق قىزىل داغ ۋە تۈگۈنلۈك قىزىل داغنى ئالېرگىيىلىك قان تومۇر ياللۇغى بىلەن پەرقلىنىدۇرۇش لازىم. بۇلار مەزكۇر بايىنىڭ ئايرىم پاراگرافلىرىدا تونۇشتۇرۇلىدۇ.

داۋالاش

1. پۈتۈن بەدەنلىك داۋالاش: ئىزونيئازىدۇم (*isoniasidum*) نۆۋەتتە تېرە سىلىنى داۋالاشتا ئەڭ ئالدى بىلەن تاللىنىدىغان دورا بولۇپ، يالغۇز ئىشلىتىلىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ھەر قېتىمدا $100mg$ دىن، كۈنىگە ئۈچ قېتىم ئىچكىزۈلىدۇ. ئادەتتە بىر داۋالاش كۇرسى يېرىم ئايدىن ئاز بولمايدۇ. ئىزونيئازىدۇمنى ئىشلىتىپ ئۇنۇمى بولمىغاندا سىرېپتو مېتسېن بىلەن سىلىغا قارشى باشقا دورىلارنى بىرلەشتۈرۈپ داۋالاشقا بولىدۇ. سىرېپتو مېتسېننىڭ ئىشلىتىش مىقدارى $0.5g$ بولۇپ، كۈنىگە ئىككى قېتىم مۇسكۇلغا ئۆسكۈل قىلىنىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى تۇراقلاشقاندىن كېيىن ھەپتىدە ئىككى قېتىم، ئومۇمىي مىقدارى تەخمىنەن $60g$ بولىدۇ. پارا - ئامىنو سالىسىسىلىك كىسلاتاغا ئىزونيئازىدۇم ياكى سىرېپتو مېتسېن قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. چوڭلارغا كۈنىگە $12g \sim 8g$ نى $4 \sim 3$ قېتىمغا بۆلۈپ ئىچكىزۈلىدۇ. $60 \sim 90$ كۈن بىر داۋالاش كۇرسى قىلىنىدۇ. ئاددىي بۆرە چاقىسىنى يۇقىرىقىدەك داۋالاشقا ئىشلىتىش سىرتىدا D_2 قوشۇپ بېرىلىدۇ. دەسلەپتە كۈنىگە $50000u$ ئۆسكۈل قىلىنىپ، بىر ھەپتە ئىچىدە تەدرىجى كۆپەيتىلىپ كۈندىلىك قامداش مىقدارى $100.000u$ گە يەتكۈزۈلىدۇ. ئۇدا $6 \sim 4$ ئاي ئىشلىتىلىدۇ.

2. يەرلىك ئورۇننى داۋالاش: ھەجىمى نىسبەتەن كىچىك بولغان ئاددىي بۆرە چاقىسى ۋە سۆگەلىسىمان تېرە سىلىغا سىرېپتو مېتسېندىن $0.5g$ ياكى 2.5% لىك ئىزونيئازىدۇمغا 1% لىك پروكايمىندىن $1ml$ قوشۇپ، زەخمىلىگەن تېرە ئاستىغا كۈنىگە بىر قېتىم، ئۇدا بىر ھەپتە ھالقىسىمان ئۆسكۈل قىلىنىدۇ. دورىنى بىر نەچچە كۈن توختاتقاندىن كېيىن يۇقىرىدىكى ئۇسۇل بويىچە يەنە بىر نەچچە قېتىم داۋالىنىدۇ. زەخمىلىگەن ھەجىمى نىسبەتەن كىچىك بولغان سۆگەلىسىمان تېرە سىلى توكتا كۆيدۈرۈۋېتىلىدۇ ياكى ئۆسكۈل قىلىپ قىلىپ ئېلىۋېتىلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا $20\% \sim 15\%$ لىك پارا - ئامىنو سالىسىلىك كىسلاتا مەلۇمى ياكى 5% لىك ئىزونيئازىدۇم مەلۇمى چەكلىمى تېرە سىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. تېرە سىلىغا گىرىپتار بولغان بەزى كېسەللەرگە باشقا سىستېمىلىق ئىشلەتكۈچى قوشۇلۇپ كېلىدۇ، شۇڭلاشقا كېسەل ئوچىقىمىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاشقا دىققەت قىلىپ بىرلىكتە داۋالاش لازىم. داۋالاش جەريانىدا مۇۋاپىق ئارام ئېلىش ۋە يېتەرلىك ئوزۇقلىنىش كېرەك.

توققۇزىنچى باب ۋىرۇسلۇق تېرە كېسەللىكلىرى

ۋىرۇس ئەڭ كىچىك مىكروب بولۇپ، تەركىبىدىكى يادرو كىسلاتاسى تۈرىنىڭ ئوخشاشمىسىغا قاراپ، DNA لىق ۋىرۇس ۋە RNA لىق ۋىرۇس دەپ ئىككى چوڭ تۈرگە بۆلۈنىدۇ. ۋىرۇسنىڭ يۇقۇملاندۇرۇشىدىن كېلىپ چىققان تېرە كېسەللىكى تېرە ۋىرۇسلۇق كېسەلى دەپ ئاتىلىدۇ. كىلىنىكىلىق ئىپادىسىگە ئاساسەن قاپارتمىلىق (DNA ۋىرۇسىغا مەنسۇپ)، ئاددىي قوقاق ۋە بەلباغسىمان قوقاق، يېڭى بىئولوگىك (DNA ۋىرۇسىغا مەنسۇپ) سۆگەل، يۇقۇملۇق يۇمشاق سۆگەل ۋە ئەسۋىلىك (RNA ۋىرۇسىغا مەنسۇپ) قىزىل، سوغان، يۇقۇملۇق قىزىل داغ قاتارلىق ئۈچ تىپقا بۆلۈنىدۇ.

18. ئاددىي قوقاق

ئاددىي قوقاق—قىزىتمىلىق قوقاق دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ ئاددىي قوقاق ۋىرۇسى كەل-
تۈرۈپ چىقىرىدىغان دائىم ئۇچرايدىغان تېرە ۋىرۇسلۇق كېسىلىدۇر.
كېسەللىك سەۋەبى: ئاددىي قوقاق ۋىرۇسى (ئىنگىلىزچە قىسقارتىپ HSV دەپ يېزىل-
لىدۇ) كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئانتىگېن خۇسۇسىيىتىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ I تىپى،
II تىپى (HSV I ۋە HSV II) گە بۆلۈنىدۇ. I تىپى ئاساسلىق كۆپىيىش ئەزالىرىدىن
باشقا تېرە ۋە شىللىق پەردىگە، II تىپى كۆپىنچە كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ تېرىسى ۋە شىل-
لىق پەردىلىرىگە تاجاۋۇز قىلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بېرى II تىپىنىڭ بالىلارغا يۇقىرىراق
پەيدا بولۇش بىلەن مۇناسىۋىتى بار دەپ قارالماقتا. ئىككى تىپنىڭ ئوتتۇرىسىدا
گىرەلەشمە ئىممۇنىت بولىدۇ. HSV نىڭ بىردىنبىر تەبىئىي ماكانى، ئادەم ۋىرۇس تۈك-
رۈك چاچراندىلىرى ياكى بىۋاسىتە يېقىنلىشىش ئارقىلىق بەدەن ئىچىگە كىرسە تۇنجى
قېتىمقى يۇقۇلمىش يۈز بېرىدۇ. يۇقۇلغاندىن كېيىن ئاز ساندىكىلىرىدە كلىنىكىلىق
ئىپادىلەر بولغاندىن سىرت، 90% تىن كۆپرەكىدە كلىنىكىلىق ئىپادىلەر بولمايدۇ، بۇ
يوشۇرۇن يۇقۇلمىش دەپ ئاتىلىدۇ. ۋىرۇس بەدەندە يوشۇرۇنلۇق بىر ئۆمۈر ۋىرۇس
توشۇغۇچى بولۇپ قالىدۇ، قىزىتما، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، ھەيز كېلىش دەۋرى،
ھامىلدارلىق، يۇقۇلمىش، چارچاش قاتارلىق قوزغاتقۇچى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن ئور-
گانىزمنىڭ كېسەلگە قارشى كۈچى ئاجىزلىغاندا ۋىرۇس جانلىنىپ قايتا يۇقۇلمىشنىڭ
مەنبەسى بولۇپ قالىدۇ. بۇ كلىنىكىدا قوزغىلىشچان ئاددىي قوقاق بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ.
كلىنىك ئىپادىلىرى: بىرلەمچى ئاددىي قوقاق ۋە قوزغىلىشچان ئاددىي قوقاق دەپ
ئىككى تىپقا بۆلۈنىدۇ:

بىرلەمچى ئاددىي قوقاق ئىنتايىن ئاز ئۇچرايدۇ، ئاساسلىق بەش ياشتىن تۆۋەن
ۋە ئالتە ئايلىقتىن يۇقىرى ئىممۇنىت فۇنكسىيىسى تۆۋەن ياكى ئوزۇقلىنىش ناچارلاشقان
گۆدەكلەردە يۈز بېرىدۇ. ئادەتتە قوقاق مەنبەلىك چىش مۈلكى ياللۇغى، ئېغىز بوشلۇقى
ياللۇغى بارلىققا كېلىدۇ. يەنە پۈتۈن بەدەندە كەڭ كۆلەملىك سۇلۇق قاپارتقۇرۇلىدۇ. قى-
زىتما، يەرلىك ئورۇنلىرىغا تۈگۈنلىرى ئىششىش، باسقاندا ئاغرىشلار قوشۇلۇپ كېلىدۇ.
قوزغىلىشچان قوقاق كۆپ كۆرۈلىدۇ. جاۋغاي، كالاپۇك گىرۈكى، بۇرۇن تۆشۈكى
ياكى سىرتقى جىنسنى ئەزا قاتارلىقلارنىڭ تېرىسى بىلەن شىللىق پەردىسى چېگرىداشقان
ئورۇنلاردا ئاسان يۈز بېرىدۇ. دەسلەپتە يەرلىك ئورۇن قىمىزىدۇ،
قىمىشىدۇ ياكى چىقىلىدۇ ھەم قىزىل داغ بارلىققا كېلىپ يىڭنە ئۈچىدەك ياكى تېرىق
چوڭلۇقىدەك شىرىلىق، توپ-توپ سۇلۇق قاپارتقۇ پەيدا بولىدۇ (1.9 - رەسىم)، ھەمدە
بۇزۇلۇپ شەلۋەرەپ، ئەڭ ئاخىرى قۇرۇپ قاقچامىپ سا قىمىدۇ. كېسەللىك جەريانى 10
كۈن ئەتراپىدا بولىدۇ، ئەمما ئادەتتە ئەسلىدىكى ئورۇندا قوزغىلىدۇ.

ئوخشىمىغان ئورۇندىكى قوقاقنىڭ ئىپادىلىرىمۇ ئوخشىمايدۇ. كۆزدىكى قوقاق ئا-
دەتتە شاخسىمان مۇڭگۈز پەردە ياللۇغى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئېغىز بوشلۇقى، يۇتقۇنچاق
ۋە كېكىرىدەكتىكى قوقاق ئاسان بۇزۇلۇپ، يارىلىنىپ ئاغرىيدۇ. كۆپىيىش ئەزاسىنىڭ
ئاددىي قوقاق جىنسنى مۇناسىۋەتتە يۇقىدۇ، سۈيدۈك يولىدا يۈز بەرسە، سۈيدۈك يولى

كۆيۈپ ئاغرىدۇ، سىيىش قىيىنلىشىدۇ. ھامىلدار چىنسىي ئەزاسىدىكى قوقاق بالا چۈشۈپ كېتىشى ياكى بوۋاقلاردىكى قوقاقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بالىيا تىقۇ بويىنى قوقاقچىدا با-لىيا تىقۇ بويىنى راكىنىڭ بار - يوقلۇقىغا نىسبەتەن ھوشيار بولۇش لازىم.

دېئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دېئاگنوزى: قوزغا تىقۇچى ئامىلى، تېرە بىلەن شىللىق يەردىن كېچىرىشىدا توپ - توپ سۇلۇق قاپارتىقۇ پەيدا بولۇش، كۆيۈشۈش، قى-زىش قوشۇلۇپ كېلىش، قىچىشىش، چىڭقىلىش، ئاسان قوزغىلىش قاتارلىقلار مەزكۇر كېسەل-نىڭ ئالاھىدىلىكلىرىدۇر. بۇنى مۇقىم قىزىل داغلىق دورا ئەسۋاسى (بەشىنچى بايقا-راڭ)، بەلباغسىمان قوقاق (تۆۋەنكى پاراگرافقا قاراڭ) لاردىن پەرقلەندۈرۈش كېرەك.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش: سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار ئارقىلىق تازىلاش، قۇ-رۇتۇش، ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. 2% لىك گىنتىئان ۋېئولت ئېرىتمىسى، 0.1% لىك ئىندوكسۇرىدىن كۆز دورا سۈيى، 3% لىك ئاتسىكلەك گۋا-نوزىن (acyclic gwanosin) زىماتى قاتارلىقلار سۈرتىلىدۇ. مۇز كۆمۈرىس قىلىنىدۇ. ياكى ئېغىر سۈرتىلىدۇ. ناۋادا باكتېرىيىدىن يۇقۇملىنىش قوشۇلۇپ كەلسە 1% لىك نېئومېتىس-مە لەھمى ياكى پاستىسى ئىشلىتىلىدۇ. ئەمما كۆر تىمكوسىتروئىد مە لەھمىنى ئىشلىتىش مەنى قىلىنىدۇ بۇ كېسەللىك ئۆز - ئۆزىدىن چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ، ئادەتتە پۈتۈن بەدەنلىك داۋالاش زۆرۈرىيىتى بولمايدۇ. پات - پات قوزغىلىدىغان ۋە ئېغىر ئالامەتلىك ئاددىي قو-قاققا ترانسىفېر فاكىتور ئىشلىتىلىدۇ ۋە سىتارابىس (Ara - C) كۈنىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $3mg \sim 1g$ (دىن) ياكى ئادېنېن ئارابىنوزىد (Ara - A) كۈنىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $10mg$ (دىن) ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. كۆزدە يۈز بەرسە 0.5% ~ 0.1% لىك ئىندوكسۇ-رىدىن كۆز دورا سۈيى كۆزگە تېمىتىلىدۇ ھەمدە پاكىز پەرۋىش قىلىشقا دىققەت قىلىنىدۇ. تەكرار قوزغىلىشنى ئازايتىش ئۈچۈن، ئارام ئېلىشقا دىققەت قىلىش، روھىي جىد-دىلىشىشتىن ساقلىنىش ھەمدە مۇناسىۋەتلىك كېسەللىكلەرنى داۋالاش لازىم. يەنە لىۋا-مىزولىمۇ ئىچكىزۈلىدۇ، چېچەك ۋاكسىنىسى ياكى كالىپت - گۋېرىن ۋاكسىنىسى ۋە سۈرىكى ئۆتكەن تۈبېرىكۇلىن قاتارلىقلار ئەملىنىدۇ.

28. بەلباغسىمان قوقاق

كېسەللىك سەۋەبى: سۇ چېچەك - بەلباغسىمان قوقاق ۋىروسى (VZV) كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ ۋىروس بىلەن ئىممۇنىت كۈچى بولمىغان بالىلار تۇنجى قېتىم يۇقۇملان-غاندا كلىنىكىدا سۇ چېچەك بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ ياكى يوشۇرۇن يۇقۇملىنىش بولۇپ قا-لىدۇ. كېيىن مەزكۇر ۋىروس سەزگۈنەرۋا تۈگۈننىڭ نېۋرونى ئىچىگە يوشۇرۇنۇۋېلىپ، ئورگانىزمنىڭ ئىممۇنىت ئىقتىدارى تۆۋەنلىگەندە، جانلىنىپ ھەمدە ئەتراپ نېرۋا تا-للىرىنى بويلاپ مەزكۇر رايوننىڭ تېرىلىرىگە يۆتكىلىپ بەلباغسىمان قوقاق يۈز بېرى-دۇ. يۇقۇملۇق كېسەلگە گىرىپتار بولۇش، سىرتقى زەخمىلىنىش، رادىئوئاكتىپ نۇرى بى-لەن داۋالاش، دورا (ئېغىر مېتال تۈرىدىكىلەر) ۋە يامان سۈپەتلىك ئۆسمە قاتارلىق-لار ئادەتتە مەزكۇر كېسەلنىڭ قوزغاتقۇچىسى بولىدۇ. ساقايغاندىن كېيىن ئۆمۈرلۈك ئىم-مۇنىت پەيدا بولۇپ، ئىنقىياپىن ئاز قوزغىلىدۇ.

كەلىمىك ئىپادىلىرى: ئەتىياز، كۆز پەسلىدە كۆپ ئۇچرايدۇ. بىر قىسىم كېسەللەردە ئەسۋە چىقىشتىن 3~1 كۈن بۇرۇن يېمىك دەرىجىدە قىزىتما، يېقىمىزلىنىش، ئىشتىھا تۇتۇلۇش، يەرلىك ئورۇننىڭ سەزگۈرلۈكى ئېشىش، كۆيۈپ قىزىش ياكى نېرۋا ئاغرىش قاتارلىق ئالدىنقى دەۋرلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە دائىم قورساق جىددىي كېسەللىكلەرنى، كۆكرەك پەردە ياللۇغى ياكى قوۋۇرغا ئارىلىق نېرۋىسى ئاغرىش قاتارلىقلاردىن گۇمانلىنىپ خاتا دىئاگنوز قويۇلۇپ قالىدۇ. نېرۋا ئاغرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ياكى ئۇنىڭدىن سەل كېيىنرەك كېسەللەنگەن ئورۇندا پارچە - پارچە قىزىل داغ پەيدا بولىدۇ، كېيىن توپ - توپ دۆڭچە قاپارتقۇلار كۆرۈلۈپ، سۇلۇق قاپارتىمغا ئايلىنىدۇ. قاپارتىما سۈيى سۈزۈك، دىۋارى چىڭقىلىپ مەرۋايىتتەك پارقىرايدۇ، تېگى ئازراق قىزىرىپ، تۆت ئەتراپى قىزىل جەمبەر بىلەن ئورنىلىپ تۇرىدۇ. بەزىلىرىنىڭ مەركىزىي كىمىدىكى ئەڭ ئازراق ئويما ئېلىنىدۇ. ئەسۋە بىر تەرەپ بويلاپ ئەتراپ نېرۋىسىغا تارقىلىپ بەلباغسىمان تىزىلىدۇ. بۇنىڭ ئالدى - كەينى ئادەتتە ئوتتۇرا سىزىقىدىن ئاشمايدۇ، توپ - لار ئارىسىدىكى تېرە نورمال بولىدۇ (209-رەسىم). يېقىن ئەتراپىدىكى لىمفا تۈگۈنىلىرى ئىشتىھىدۇ ۋە باسقاندا ئاغرىيدۇ. بىر نەچچە كۈندىن كېيىن قاپارتقۇنىڭ سۈيى قۇرۇپ قاقچىلىنىپ تەخمىنەن 4~2 ھەپتىدىن كېيىن ساقىيىپ كېتىدۇ. بىر قىسىم كېسەللەردە (بولۇپمۇ ئوتتۇرا ياشلىقلار ۋە ياشانغانلاردا) قوقاقتىن كېيىنكى نېرۋا ئاغرىش ئادەتتە ئالتە ئاي ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇن داۋاملىشىدۇ.

ياشانغان، تېنى ئاجىز، ئوزۇقلىنىش ئەھۋالى ناچار ياكى ئۆسمە بولغان كېسەللەردە تىپىك بولمىغان تېرە زەخمىلىنىشى ئاسان يۈز بېرىدۇ. مەسىلەن: قانلىق قاپارتقۇ، گانگرىنا، يارا ياكى بىرىككەن چوڭ قاپارتقۇ قاتارلىقلار. بۇلار ئايرىم - ئايرىم قاناشلىق، گانگرىنا لىق ياكى چوڭ قاپارتقۇلۇق بەلباغسىمان قوقاق دەپ ئاتىلىدۇ. پەقەت قىزىل داغ، دۆڭچە ئەسۋىلا بولۇپ، تىپىك سۇلۇق قاپارتقۇ بولمىغانلار تولۇق بولمىغان بەلباغسىمان قوقاق، نېرۋا ئاغرىش بولۇپ تېرە زەخمىلىنىشى بولمىغانلار ئەسۋىسىز بەلباغسىمان قوقاق دەپ ئاتىلىدۇ.

بەلباغسىمان قوقاق قوۋۇرغا ئارىلىق نېرۋىسىغا ئاسانلا تاجاۋۇز قىلىنغانلىقتىن، گەۋدىدە كۆپ پەيدا بولىدۇ. ئەگەر ئۇچلۇك نېرۋا يۇقىرىقى شېخىغا تاجاۋۇز قىلىنسا، باشنىڭ ماڭلاي قىسمى زەخمىلىنىدۇ ھەمدە كۆز ئاللىمىغا تەسىر قىلىدۇ، بۇ كۆز بەلباغسىمان قوقاق دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدا شىددەتلىك ئاغرىشتىن سىرت، مۇڭگۈز پەردە يارىلىق ياللۇغى، كۆز ئاللىمى ياللۇغى، ھەتتا مېڭە ياللۇغى قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ ھەمدە ئەمەلىيەتتىن ياكى ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يۈز نېرۋىسىغا تاجاۋۇز قىلىنسا يۈز - لەچلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. پۈتۈن بەدەندە كەڭ كۆلەمدە تېرە زەخمىلىنىشى بولغان ئېغىر ئالامەتلىكلەر كەڭ كۆلەملىك بەلباغسىمان قوقاق دەپ ئاتىلىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: توپلانغان ياللۇغلۇق سۇلۇق قاپارتقۇ نېرۋىنىڭ بىر تەرەپنى بويلاپ تارقىلىش، بەلباغسىمان تىزىلىش، نېرۋا ئاغرىش كۆرۈنەرلىك بولۇش مەزكۇر كېسەلنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. بۇنى ئاددىي قوقاق (يۇقىرىقى پاراگرافقا قاراڭ)، يېقىنلىشىشتىن بولغان تېرە ياللۇغى (بەشىنچى بايقاڭ) بىلەن پەرقلىنىدۇرۇش لازىم. ئەسۋىسىز بەلباغسىمان قوقاقنى ئۆت خالتا ئۆتكۈز ياللۇغى ھەم قو-

ۋۇرغا ئارىلىق ئېرۇشى ئاغرىش قاتارلىقلاردىن بەرقلەندۈرۈش لازىم. بۇلار ئىچكى، تاشقى كېسەللىكلەردە ئايرىم - ئايرىم سۆزلىنىدۇ.

داۋالاش: ئاغرىق توختىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئىككىلەمچى يۇقۇلمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە كېسەللىك جەريانىنى قىسقارتىش قاتارلىقلار داۋالاش پرىنسىپى قىلىنىدۇ. 1. ئىچىدىغان دورىلار: ئاغرىق توختاتقۇچى ھەر خىل دورىلار ۋە ئېرۇشنى قوغدىغۇچى دورىلاردىن ئاسپىرىن، پارا-ئەتسېتامول، پېروفېنازېن، ۋىتامىن B_1 ، B_{12} ، E قاتارلىقلار ئاللاپ ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى ئىچكۈزۈلىدۇ. كېسەللىك ئالامىتى جىددىي ياكى يېشى چوڭ كېسەللەرگە ئىمكانىيەتنىڭ بېرىچە بالدۇرراق ئاز مىقداردا كورتىكوستېروئىدنى قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم. كەڭ كۆلەملىك، ئېغىر ئالامەتلىك كېسەللەرگە ئالدى بىلەن سىتارابىن ($Ara - C$)، ئادېنىن ئارابىنوزىد ($Ara - A$)، ئاتسىكلېك گۇانوزىن، ترانسفېر فاكىتۇر ياكى ئىنتېرفېرون قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. ئىككىلەمچى يۇقۇلمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئانتىبىيوتىكلار ئەھۋالغا قاراپ بېرىلىدۇ.

جۇڭىدا قىزىتمىنى قايتۇرۇپ نەملىكنى ھەيدەش، ئىسسىقنى سۈرۈپ زەھەر قايتۇرۇش داۋالاش پرىنسىپى قىلىنىدۇ. ئادەتتە لۇڭدەنشى گەنتاڭ قاينا تېمىسى، سەيخۇشۇ گەنتاڭ قاينا تېمىسى ياكى ۋىلىگتاڭ قاينا تېمىسى تەركىبى قوشۇپ ياكى ئازايتىپ ئىشلىتىلىدۇ. 2. سىرتىدىن دورا ئىشلىتىش: قورۇش، قۇرۇتۇش، سۈركىلىشنى ئازايتىش ۋە ئىككىلەمچى يۇقۇلمىنىڭ ئالدىنى ئېلىشلار پرىنسىپى قىلىنىدۇ. مەسىلەن: 5% لىك ئىدوكسۇرېدىن دىمېتىل سۇلفوكسىد ئېرىتمىسى، 3% لىك ئاتسىكلېك گۇانوزىن زىماتى، تىرا-مىتسىن گلىتسىپرىد ياكى گىنتامىن ۋېنولت ئېرىتمىسى قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. كۆزدىكى بەلباغسىمان قوڭاققا 0.5% ~ 0.1% لىك ئىدوكسۇرېدىن دىمېتىل سۇلفوكسىد كۆز سۈيى ياكى 0.1% لىك فوتېنېزول (V_{0133}) كۆز سۈيى كۆزگە تېجىتىلىدۇ.

يۇقىرىقىدىكىلەردىن باشقا ئاۋاز چاستوتىلىق توك بىلەن داۋالاش، گېلىي فېئون جۇلالىق نۇرى، ماگنىت بىلەن ماسساژ قىلىش ۋە ئۇلىتىرا-بىسىنەپشە نۇرىدا نۇرلاندۇرۇش قاتارلىقلار ئاللاپ ئىشلىتىلىدۇ.

3. سۆڭەك

كېسەللىك سەۋەبى: سۆڭەك - ئەمچەك تۈگمىسىسىمان كۆپ ئۆسۈمچان پۈۋەكچە ۋىرۇسى ئىچىدىكى ئادەم ئەمچەك تۈگمىسىسىمان ئۆسۈمچەك ۋىرۇسى كەلتۈرۈپ چىقارغان سۆڭەكسىمان ئۆسۈمچەك تېرە كېسەللىكىدۇر. ئوخشىمىغان سۇب تىپلىق ۋىرۇسنىڭ ئورگانىزىمدا جايلاشقان ئورنى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، ئوخشىمىغان رېئاكسىيە پەيدا قىلىپ، ئوخشىمىغان ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭدىن دائىم ئۇچرايدىغانلىرى ئادەتتىكى سۆڭەك، تاپان سۆڭىلى، ياپىلاق سۆڭەك، ئۇچلۇق ھۆل سۆڭەك قاتارلىقلار. مەزكۇر كېسەللىك كۆپىنچە بىۋاسىتە يېقىنلىشىشتىن يۇقۇلمىنىدۇ. بولۇپمۇ ھۈجەيرە ئىمىنىش ئارقىلىق ئۆتۈۋەلىمگەندە تېخىمۇ ئاسان كېسەللىنىدۇ، ئادەتتە سىرتقى زەخمىلىنىش يۇقۇلمىنىشنىڭ مۇھىم ئامىلى.

كلىنىك ئىپادىلىرى

1. ئاددىي سۆڭەك: ياش - ئۆسمۈرلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ. تېرە ئەسۋىسى گۈرۈچتەك،

دادۇردەك چوڭلۇقتا ياكى تېخىمۇ چوڭ مۇڭگۇز ماددا گۆپىيىش خاراكتېرلىك يېرىم شار-سىمان دۆڭچە ئەسۋە بولىدۇ. جىسمى سەل قاتتىق، سىرتقىي يۈزى قۇرغاق، يىرىك، تەك-شىمسىز بولىدۇ. ئۇچى تىمكەنسىمان، سېرىق ياكى سۇر جىگەررەك بولىدۇ. پۇت، قول ۋە بارماقلارنىڭ ئارقا تەرىپى ۋە تىرناقنىڭ گىرۋىكى قاتارلىق ئورۇنلاردا ئاسان پەيدا بولىدۇ (3.9 - رەسىم). يېڭى باشلانغاندا بەزىدە پەقەت يىرلا سۆڭەك بولىدۇ (بۇ ئانا سۆڭەك دېيىلىدۇ)، كېيىن تەرەققىي قىلىپ بىر نەچچىدىن بىر نەچچە ئوغلىچە كۆپىيىدۇ. ئادەتتە ھېسسىي ئالامەتلەر بولمايدۇ ياكى ئۇرۇلغاندا ئازراق ئاغرىيدۇ. كېسەللىك جەريانى سۈزۈلما بولۇپ، تەبىئىي ھالدا ئۈزلۈكسىز ساقىيىپ كېتىدۇ. بويۇن، يۈز، ئېڭەك قاتارلىقلاردا يۈز بېرىدىغان ئاددىي سۆڭەك يۇمشاق، ئۇزۇن، ئىنچىكە يىپىقا ئوخشاش بولىدۇ. بۇ يىمىسىمان سۆڭەك دېيىلىدۇ. باش ياكى ماڭلايدا يۈز بەرگەنلىرىنىڭ كۆپىنچىلىرى بارماق ئۈچىدەك پۇلتىيىپ چىقىدۇ. چوققىسى مۇڭگۇز ماددىغا ئوخشاش بولۇپ بارماقسىمان سۆڭەك دېيىلىدۇ. سىرتقىي جىنىسىي ئەزا ۋە مەقەت ئەتراپى قاتارلىق ئورۇنلاردا يۈز بەرگەنلىرىنىڭ تېگى تار، سىرتقىي يۈزى ھۆل، پارىقراق، ئېگىز - پەس، تەكشىسىز، خۇددى توخۇ تاجىسىدەك ياكى ئەمچەك تۈگۈمىسىدەك پۇلتىيىپ تۇرىدۇ. بۇ ئۇچلۇق ھۆل سۆڭەك (4.9 - رەسىم) ياكى تىناسىل كېسەللىك سۆڭىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇچلۇق ھۆل سۆڭەك سۈركەلگەنلىكتىن ئادەتتە شەلۋەرەيدۇ، قانايىدۇ، ئىككىلەمچى يۈ-قۇملىنىدۇ ۋە سېسىق پۇرايدۇ. ئاز ساندىكىلىرى يامان سۈپەتلىككە ئۆزگىرىپ كېتىدۇ.

2. تاپان سۆڭىلى: تاپاندا پەيدا بولىدىغان سۆڭەلدىن ئىبارەت. قورامىغا يەتكەن ياشلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. سىرتقىي زەخمىلىنىش، سۈركىلىش ۋە كۆپ تەرلەش بۇنىڭ قوزغالتقۇچىسى بولغانلىقتىن، بېسىلغان ۋە سۈركەلگەن ئورۇندا كۆپ كۆرۈلىدۇ. سۆڭەك يالغۇز ياكى كۆپ، ماشتەك ياكى تېخىمۇ چوڭراق، يۇمىلاق ياكى رېتىمىسىز شەكىللىك مۇڭگۇز ماددا پارچىسىدىن ئىبارەت. رەڭگى سۇس سېرىق ياكى سۇر جىگەر رەڭدە بولۇپ، ئەتراپىنى قېلىنراق مۇڭگۇز ماددا ھالقىسى ئوراپ تۇرىدۇ (5.9 - رەسىم). ناۋادا مۇڭگۇز ماددا يۈزە قەۋىتى سويۇلۇپ كەتسە مەركىزىدىكى يۇمشاق پىلىكتەك ئىناق رەڭلىك مۇڭگۇز ماددا ئېچىلىپ قېلىپ ئەتراپىنى كىچىك قارا توچكىلار ئوراپ تۇرىدۇ. ئەگەر نۇرغۇن سۆڭەكلەر ئۆزئارا بىرلىشىپ كەتسە، بۇ ئويۇلغان سۆڭەك دېيىلىدۇ، سىققا ئاغرىيدۇ.

ئاددىي سۆڭەككە دىئاگنوز قويۇش تەس ئەمەس، ئەمما تاپان سۆڭىلى بىلەن قانداقنى پەرقلەندۈرۈش لازىم. قانداق پۇتتىنىڭ گىرۋەكلىرىدە ۋە پۇت بارماقلىرىنىڭ ئاسان بېسىلىپ سۈركىلىدىغان قىسمىدا يۇمىلاق تۈۋرۈكسىمان مۇڭگۇز ماددا نوپىسى شەكىللىنىپ، خۇددى شىنا قاققاندا ھەقىقىي تېرىگە ئۇيۇلۇپ كىرىدۇ. سىرتىنى ناۋاترەك ھالقا ئوراپ تۇرىدۇ، مەركىزى خۇددى توخۇ كۆزىدەك سىرتقىي يۈزى سىلىق بولىدۇ. باسقاندىكى ئاغرىش بەكمۇ روشەن. ئۇچلۇق ھۆل سۆڭەكلىنى ياپىلاق ھۆل سۆڭەلدىن پەرقلەندۈرۈش لازىم. كېيىنكىسىمۇ ھۆل سۆڭەك ئالاھىدىلىكىگە ئىگە، پەقەت بۇنىڭ تېگى نىسبەتەن كەڭ، ئۇچى ياپىلاق توم بولىدۇ، تېرە ئەسۋەسىدە سېغىلىش بۇرما تەنچىسى كۆپ مىقداردا بولىدۇ.

3. ياپىلاق سۆڭەك: ياش - ئۆسمۈرلەردە كۆپرەك بولىدۇ، شۇڭلاشقا ياشلاردىكى ياپىلاق سۆڭەك دېيىلىدۇ. بۇ يىڭىنىدەك ياكى ئۇنىڭدىن سەل چوڭراق ياپىلاق

دۇڭچە ئىسۋە بولۇپ، سىرتقى يۈزى پاراق سىلىق، سەل قاتتىق، چېگرىسى ئېنىق، رەڭگى نورمال تېرىمدەك ياكى سۇس جىگەررەڭ بولىدۇ. سانى نىسبەتەن كۆپ، ھەتتا زىچلىقتىن ئۆز ئارا بىرلىشىپ پارچە - پارچە بولۇپ قالىدۇ. تاتلىمىغا ندا ئۆز-ئۆزىدىن ئەملىنىپ، يىمىسىمان تىزىلىپ تېرە زەخمىلىنىدۇ (6.9- رەسىم). يۈز، قولنىڭ ئارقىسى، بىلىك ۋە يوتىنىڭ سوزۇلىدىغان تەرىپى قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپرەك بولىدۇ. ئادەتتە ھېسسىي ئالامەتلەر بولمايدۇ ياكى ئازراق قىچىشىدۇ. كېسەللىك جەريانى سوزۇلما بولۇپ، ناگاندا ئۆزلۈكىدىن يوقاپ كېتىدۇ، ئاددىي سۆگەل قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

داۋالاش: ھەرخىل سۆگەلنى داۋالاشتا يەرلىك ئورۇننى داۋالاش ئۇسۇلى ئاساس قىلىنىدۇ.

1. يەرلىك ئورۇننى داۋالاش:

(1) ئاددىي سۆگەل: ئالدى بىلەن سۆگەلنى ئىسسىق سۇغا چىلاپ سىرتقى يۈزىدىكى ئۆسۈپ قالغان سۆگەللىرىنى مەدەنىي ئېلىۋېتىپ، ئاندىن چىرىتكۈچى دورىلار سۈركىلىدۇ، مەسىلەن: 33% لىك قىزىلرۇت ئاستىلىك كىسلاتا، قاغاچۇلۇكى ئۇرۇقى، قاتتىق سىركە كىسلاتا قاتارلىقلار. بىلچىمەتسىنىڭ فېزىئولوگىيىلىك تۈزۈلۈشىدىكى 0.1% لىك ئېرىتمىسى سۆگەلنىڭ تېگىگە ئۆكۈل قىلىنغاندىن كېيىن ئۆزلۈكىدىن چۈشۈپ كېتىدۇ ياكى دېزىن فېكسىمىلەنگەن پاختا پىسەلكۈچ بىلەن سۆگەل تېگىنى تېرىگە پارالېل يۆنىلىشتە كۆپ قېتىم ئىتتىرىگەندىن كېيىن سۆگەل چۈشۈپ كېتىدۇ. ئاندىن بېسىپ قان توختىتىلىدۇ ھەمدە يود تىنىكتورىنى سۈرتىلىدۇ.

(2) تاپان سۆگىلىمە يەرلىك ئورۇننى داۋالاش ئاددىي سۆگەلنىڭ ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشاش. يۇقىرى ئۆسۈملۈك قۇز سۈيى، 95% لىك ئىسسىق ياكى 2.5% لىك فلۇروئۇراتسىل سۆگەلنىڭ مەركىزىگە ئۆكۈل قىلىنىدۇ. ئەمما ئۆمۈرلۈك تاتۇق پەيدا قىلىدىغان داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىشقا بولمايدۇ.

(3) ۋىرۇسقا قارشى مۇناسىۋەتلىك دورىلار: 5% لىك 5-فلۇوراتسىل زىماتى (مەلھىمى)، 40% لىك ئىمدوكسۇرىدىن زىماتى (ياكى دىمېتېل سۇلۋوكسىد ئېرىتمىسى) ھەرخىل سۆگەلنى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدۇ.

(4) دىئىتروخلوروبېنىزول بىلەن يەرلىك ئىممۇنىتېلىق داۋالاش، بۇ ياپىلاق سۆگەلگە نىسبەتەن ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

(5) يۇقىرىقىدىكىلەردىن سىرت، توكتا كۆيدۈرۈش، مۇزلىتىش، جۇلالىق نۇردا داۋالاش قاتارلىق داۋالاش ئۇسۇللىرى قاتلاپ ئىشلىتىلىدۇ. نىسبەتەن چوڭ بولغان ئۇچ-لىۋۇق ھۆل سۆگەل ئوبېراتسىيە قىلىپ ئېلىۋېتىلىدۇ.

2. پۈتۈن بەدەننىڭ داۋالاش: زەخمىلىنىش نىسبەتەن كۆپ بولسا يەرلىك ئورۇننى داۋالاش بىلەن سىرت، ۋىتامىن B_{12} ، ھىناق قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ ياكى ئوسما يىلتىزى مۇسكۇلغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ. لېڧامىزول ياكى ئىنتېرڧېرون ئىندوتېر ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ماگنىي ئوكسىد كۈنىگە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 0.5g دىن ياكى ئۇرۇتروپىن كۈنىگە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 0.3~0.5g دىن سىناق تەرىقىسىدە ئىشلىتىلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بېرى بەزىلەر ئادەم ئەمچەكسىمان ئۆسمە ۋىرۇسىدىن ياسىغان ئانتىگېن (ھەر ھەپتىدە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 0.1ml دىن جەمئىي ئۈچ قېتىم تېرە ئاستىغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ)

ياكى ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە يۇتقۇچى ئەنچىسى ئېرىتكۈچى ماددىسى بىلەن داۋالاپ بەلگىلىك ئۈنۈمگە ئېرىشكەن.

48. يۇقۇملۇق يۇمشاق سۆگەل

يۇقۇملۇق يۇمشاق سۆگەل ئادەتتە «سۇ سۆگەل» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇنى چېچەك ۋە رۇسى ئىچىملىكى يۇقۇملۇق يۇمشاق سۆگەل ۋىرۇسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىۋاسىتە يېمىنىلىشىش ياكى ئۆز بەدەنلىك ئەمىلىنىش ئارقىلىق يۇقۇملىنىدۇ. قۇرتلارنىڭ چېچىمۇ بىلىشى ۋاسىتىسى بولىدۇ، ئىممۇنىت كۈچى ئاجىزلىغاندا، ئاسانلا كەڭ كۆلەمدە تېرە زەخمىلىنىش يۈز بېرىدۇ.

كېلىملىك ئىپادىلىرى: بالىلاردا ۋە ياشلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. تىپىك تېرە زەخمىلىنىش گۈرۈچ ياكى دادۇر چوڭلۇقىدىكى سۇس قىزىل ياكى تېرە زەڭگىرىدىكى يېرىم شار شەكىللىك دۆڭچە ئەسۈدىن ئىبارەت. سىرتقى يۈزى شامدەك سىلىق، مەركىزى كىمىدىكى تەڭسەل ئويمان، رەڭگى سۈر ئاقما تۇل (7.9 - رەسىم) بولىدۇ. سىمقا سۈتتەك ئاق رەڭلىك يېلىمىسىمان ماددا، يەنى يۇمشاق سۆگەل كىچىك تەنچىسى چېقىدۇ. تارقىلىشى تەكشى بولىمايدۇ. گەۋدە، ئۇرۇقدان خالىتىسى، تۆت مۇچە قاتارلىق ئورۇنلاردا ئاسان پەيدا بولىدۇ. ئازراق چېچىشىدۇ ياكى چېچىشمايدۇ، كېسەللىك جەريانى سوزۇلما.

داۋالاش: مەزكۇر كېسەلدە پۈتۈن بەدەنلىك داۋالاش قىلىنمايدۇ. يەرلىك ئورۇننى داۋالاش ئالدى بىلەن تېرە دېزىنفېكسىيە قىلىنىپ، ئاندىن قان تومۇر قىسقىچى بىلەن يۇمشاق سۆگەل كىچىك تەنچىسى سىقىپ چىقىرىۋېتىلىپ، بېسىپ قان توختىتىلىدۇ، يەنە 5% لىك يود تىنىكتۇرىسى ياكى 33% لىك قىزىلغۇرۇ ئاتىپتىك كىسلاتا سۆگەلنىڭ مەركىزىگە تېمىتىپ كىرگۈزۈلىدۇ.

كوللېكتىپ تۇرمۇشتا مەزكۇر كېسەل سېزىلسە، دېزىنفېكسىيە قىلىپ ئىزولاتسىيە قىلىشقا دىققەت قىلىپ ئۆز ئارا يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

58. يۇقۇملۇق قىزىل داغ

مەزكۇر كېسەل — بەشىنچى كېسەل دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىشتىن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. 2 ياشتىن 10 ياشقىچە بولغان بالىلاردا ئاسان يۈز بېرىدۇ. قىش، باھار پەسلىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ، تارقىلىشچان بولىدۇ.

يوشۇرۇن دەۋرى تەخمىنەن 14~5 كۈن. كېيىن مەڭزى قىسمىدا تۇيۇقسىز سۇلۇق ئىششىقلىق قىزىل داغ كۆرۈلۈپ، كېيىن شەكىللىك تارقىلىدۇ، گىرۈكى ئېنىق قىلىنماستىن بولىدۇ. ئاز ساندىكى كېسەللەردە يۈز زەخمىلىنىش كۆرۈلۈشكە باشلىغاندىن كېيىنكى 4~2 كۈندە مۇچە ئۇچىدا كۆپ ھالقىلىق، چاقىسىمان ياكى نەقىش سىزىقىدەك قىزىل داغ پەيدا بولىدۇ. ھەمدە يېقىن تەرەپكە قاراپ يامرايدۇ. تېرە ئەسۋىسى ھاۋا كىلىماتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ بەزىدە يوشۇرۇن، بەزىدە ئاشكارا كۆرۈلىدۇ. ئازراق چېچىشىدۇ ياكى قىزىرىدۇ، ئارىلاپ تۆۋەن قىزىتما بولىدۇ، كېسەللىك جەريانى تەخمىنەن 11 كۈن ئەتراپىدا، تېرە ئەسۋىسى بارلىققا كەلگەن تەرتىپى بويىچە يوقىتىلىدۇ.

لىدۇ، ئاقىۋىتى ناھايىتى ياخشى. دىئاگنوز قويۇشتا تىلىما، سوغان ۋە ئىسكارلاتىما قاتارلىقلاردىن پەرقلەندۈرۈش لازىم.

داۋالاش: ئاساسلىقى كېسەللىك ئالامىتىگە قاراپ بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. يۇيۇشقا ئىشلىتىلىدىغان كالامىن ئېرىتمىسى ياكى قالقان ياسالىمىسى سۈركىلىدۇ. ۋىتامىن C ۋە قىزىتما قايتۇرغۇچى دورىلار ئىچكىۈزۈلىدۇ. يۇقۇملۇق بولغانلىقتىن ئىزولاتسىيە قىلىپ داۋالاش لازىم.

ئونچى باب زامبۇرۇغلۇق كېسەللىكلەر

زامبۇرۇغ — پارازىتلىق ياكى چىرىندىخورلۇق بىلەن ياشايدىغان بىر تۈرلۈك جانلىقلاردىن ئىبارەت. كېسەل چاقىرغۇچى زامبۇرۇغ كەلتۈرۈپ چىقارغان كېسەللىكلەر — زامبۇرۇغ كېسەلى دېيىلىدۇ. بۇ ئادەتتە يۈزە قىسىم زامبۇرۇغ كېسەلى ۋە چوڭقۇر قىسىم زامبۇرۇغ كېسەلى دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. ئالدىنقىسى يۈزە تېرە، چاچ، تىرىناق قاتارلىق ئورۇنلارغا تاجاۋۇز قىلغانلىقتىن، تېرە زامبۇرۇغ كېسەلىمۇ دېيىلىدۇ. ھەر خىل ھەمرەتكە زامبۇرۇغىدىن كېلىپ چىققانلىرى تەمرەتكە دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ كېسەل بولۇش نىسبىتى زامبۇرۇغ كېسەلى ئومۇمىي ساننىڭ 90% دىن كۆپرەكىنى ئىگىلەيدۇ. يۈزە تېرە ئاستى توقۇلمىسى ۋە ئىچكى ئەزالارغا تاجاۋۇز قىلسا چوڭقۇر قىسىم زامبۇرۇغ كېسەلى دېيىلىدۇ. گەرچە بۇ نىسبەتەن ئاز ئۇچرىسىمۇ، ئەمما خەۋپى چوڭ. ھەزكۇر بابتا دائىم ئۇچرايدىغان بىر نەچچە خىل تەمرەتكە ۋە كەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسەلى ئايرىم - ئايرىم تونۇشتۇرۇلىدۇ.

18. باش تەمرەتكىسى

باش تەمرەتكىسى — باش قىسمىنىڭ زامبۇرۇغىدىن يۇقۇملانغانىنى كۆرسىتىدۇ. زامبۇرۇغ ئاساسلىق چاچقا تاجاۋۇز قىلىدۇ. كلىنىكىدا سېرىق تەمرەتكە، ئاق تەمرەتكە ۋە قارا چېكىتلىك تەمرەتكە دەپ ئۈچ تىپقا بۆلۈنىدۇ. يېزا - قىشلاقلاردا كېسەل پەيدا بولۇش نىسبىتى يۇقىرىراق. كېسەل شەھەردىكى ئوقۇش يېشىغا توغرىغان بالىلار كۆپلىكتە پەيدا بولىدۇ.

كېسەللىك سەۋەبى: سېرىق تەمرەتكىسى سېرىق تەمرەتكە زامبۇرۇغى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاق تەمرەتكىسى پەيدا قىلغۇچى زامبۇرۇغ كىچىك سىمپورىلىق باكتېرىيىگە مەنسۇپ. رەڭلىك تەمرەتكە زامبۇرۇغى بىلەن چاچ چۈشۈرگۈچى تەمرەتكە زامبۇرۇغى قارا چېكىتلىك تەمرەتكىسىنىڭ كېسەل پەيدا قىلغۇچىسىدۇر. باش تەمرەتكىسى ئاساسلىق ساتراش ئەسۋابلىرى، تاغاق، باش كىيىم ياكى ياستۇق قاتارلىقلار ئارقىلىق يۇقىرىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا مۈشۈك، ئىت، قوي قاتارلىقلارنىڭ تەمرەتكىسىمۇ يۇقۇملۇق ھەنبە بولالايدۇ. كىلىنىك ئىپادىلىرى: كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى زامبۇرۇغ ۋە كلىنىك ئىپادىسىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئۈچ تىپقا بۆلۈنىدۇ:

1. سېرىق تەمرە تەكە: دەسلەپتە تۈك خالىتا ئەتراپىدا ياللۇغ رېئاكسىيىسى يۈز بېرىدۇ. كېيىن يىرىڭلىق قاپارتقۇغا ئايلىنىپ، قۇرۇغاندىن كېيىن گۇڭگۇرتتەك سېرىق كېيىنەكسىمان كىچىك قاقچ پەيدا بولىدۇ. ئوتتۇرىسىنى چاچ تېشىپ چىقىدۇ. بۇ سېرىق تەمرە تەكە قاقچى دەپ ئاتىلىدۇ. مانا بۇ مەزكۇر كېسەلنىڭ ئالاھىدىلىكى (10، 1- رەسم) دۇر. دەسلەپتە تېرە تارقاق زەخمىلىنىپ كېيىن تەدرىجى بىرلىشىپ، كۈنلەرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن توپلامىش ئاقامتۇل سۈر رەڭدە بولىدۇ. ئەمما ئىسپىرتنى سۈركىگەندە گۈڭگۇرتتەك سېرىق رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. سېرىق تەمرە تەكە قاقچى خېلىلا مەھكەم چاپلىشىپ ئاسان سويۇلمايدۇ. سويۇۋەتكەندە ئاستىدا قىزىل، سىملىق، يۈزە يارا يۈزى ئېچىلىدۇ. ساقايغاندىن كېيىن ئاتروپىيىلىك تاتۇق بولۇپ قالىدۇ. باش چاشقان سۈيىدۈكىدەك سېسىق پۇرايدۇ. كېسەللەنگەن چاچ قۇرۇپ، ساغرىپ، ئىنچىكىلەپ، بوشاپ، ئاسان چۈشۈپ كېتىدۇ. تۈك ئاساسىي ماددىسى بۇزۇلۇپ كەتكەنلىكتىن ئەڭ ئاخىرى مەڭگۈلۈك تارتۇق قىلىنىدۇ، قىچىشىدۇ، كېسەللىك جەريانى ئاستا، ئۈزلۈكسىز ساقايمايدۇ. سېرىق تەمرە تەكە زامبۇرۇغى بەزىدە تىرناق تاختىسى ۋە باشقا سىلىق تېرىلەرگە تاجاۋۇز قىلىدۇ. تىرناق تاختىسى ئەركىن قىزى ئاستى ياكى باشقا ئورۇنلاردا سېرىق تەمرە تەكە قاقچى شەكىللىنىدۇ. ئەمما بەدەن سېرىق تەمرە تەكەسىدە بەزىدە دۆڭچە ئەسۋە ۋە قاسراق سىل بولىدۇ.

2. ئاق تەمرە تەكە: ئوقۇش يېشىدىكى ئۆسمۈرلەردە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. تارقاق چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولماسلىق، يۇمىلاق ياكى رەتسىز كۈلرەك تەڭگە قاسراقلىشىپ، داغ پەيدا بولۇش ھەم چېگرىسى ئېنىق بولماسلىقتەك ئالاھىدىلىكى بار. تەمرە تەكە دائىم رەسىمدە تۈك خالىتالىق ئەسۋە پەيدا بولىدۇ. شۇ ئورۇندىكى تۈكلەرنىڭ پارقراقلىقى يوقىلىپ، كۆپىنچە باش تېرىسىدىن 0.5cm ئورۇندىن قىزىلىپ كېتىدۇ. قالدۇق تۈك ئەتراپىدا ئاق غىلاپسىمان قاقچ پەيدا بولۇپ، زامبۇرۇغلىق غىلاپ دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ، مەزكۇر كېسەللىكنىڭ تىپىك ئالاھىدىلىكىدۇر (10، 2- رەسم). قىچىشىدۇ، كېسەللىك جەريانى ئاستا بولىدۇ، بالاغەتكە يېتىش دەۋرىگە كەلگەندە ئاندىن ئۈزلۈكسىز ساقايىدۇ. 3. قارا چېكىتلىك تەمرە تەكە: ئۆسمۈرلەردىن باشقا يەنە چوڭلاردىمۇ كۆرۈلىدۇ.

كۆپرەك ئورۇن زەخمىلىنىدىغان، دائىرىسى كىچىك، يۇمىلاق ياكى ئىللىمپىسىمان تەڭگە قاسراقلىق داغدىن ئىبارەت. كېسەل ئورۇندىكى چاچ قىزىلىپ، باش تېرىسىدىن ئارانلا چىقىپ تۇرىدۇ. قالدۇق چاچ ئورنىدا قارا توچكىلار پەيدا بولىدۇ. شۇڭا قارا چېكىتلىك تەمرە تەكە دەپ ئاتىلىدۇ. بەزىدە كېسەللىك ئورۇندىكى چاچ باش تېرىسىدىن 0.3cm ئورۇندىن قىزىلىپ، قالدۇق چاچ ئەتراپى ئاق غىلاپسىمان قاقچىلىنىدۇ. بۇنداق ئەھۋالنى ئىنچىكىلىك بىلەن ئاق تەمرە تەكەدىن پەرقلىنىدۇرۇش كېرەك. ئادەتتە ئوخشاشمىغان دەرىجىدە قىچىشىدۇ، كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ، دائىم ئۇزۇنغىچە ساقايمايدۇ. تۈك خالىتلىرى بۇزۇلۇپ، تەمرە تەكە ساقايغاندىن كېيىن توچكىسىمان تاتۇقلىق چاچ چۈشۈش ئاسارەت بولۇپ قالىدۇ.

ئاق تەمرە تەكە بىلەن قارا چېكىتلىك تەمرە تەكەگە بەزىدە يىرىڭلىق تەمرە تەكە (10، 3- رەسم) قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا قىزىرىش، ئىشىش بولۇپ، غەلۋىرەكسىمان پۇلتىمىپ چىقىدۇ. يان قىزىلىرى رەتلىك بولۇپ، كېسەلگەن گۆشكە ئوخشاپ قالىدۇ، سىرتقى يۈزىدىكى تۆشۈكلەردىن يىرىڭ ئېقىپ تۇرىدۇ. ئاغرىش ئېغىر بولمايدۇ.

تەمرەتكە سا قايىنا ندىن كېيىن چېكىتىسىمان تاتۇقلۇق چاچ چۈشۈش ئاسارەت بولۇپ قالىدۇ. [دېئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دېئاگنوزى]

1. دېئاگنوز ئاساسلىرى تۆۋەندىكى جەدۋەلدىكىدەك:
10. 1 - جەدۋەل. 3 خىل تىپتىكى باش تەمرەتكىسىگە دېئاگنوز قويۇش ئاساسلىرى

سېرىق تەمرەتكە	ئاق تەمرەتكە	قارا چېكىتمەك تەمرەتكە
ياش قۇرامى	ئۆسمۈرلەر، چوغلار	ئۆسمۈرلەر، چوغلار
كلىنىك ئىپادىلىرى	سېرىق تەمرەتكە قاقمىچى، كۈلرەك تەڭگە قاسراقلىق داغ، ھەممى كىچىك مېرەك تەڭگە قاسراقلىق كېسەللەنگەن چاچ چۈرۈك-چاچ چۈرۈكلىش، پىيۇق قىرى ئورۇن-داغ بولۇش، چاچ تۆۋەندىن قىزىقىلىش، ئىنچىكە ساغۇچ دىن قىزىقىلىش، باكتېرىيە غە-چېكىتمەك تاتۇقلۇق چاچ چۈشۈش بولۇش، تاتۇقلۇق، چاچ لىمى پەيدا بولۇش چۈشۈش. چاشقان سۇيىدۇ-كىمەك پۇراش	كۈلرەك تەڭگە قاسراقلىق داغ، ھەممى كىچىك مېرەك تەڭگە قاسراقلىق كېسەللەنگەن چاچ چۈرۈك-چاچ چۈرۈكلىش، پىيۇق قىرى ئورۇن-داغ بولۇش، چاچ تۆۋەندىن قىزىقىلىش، ئىنچىكە ساغۇچ دىن قىزىقىلىش، باكتېرىيە غە-چېكىتمەك تاتۇقلۇق چاچ چۈشۈش بولۇش، تاتۇقلۇق، چاچ لىمى پەيدا بولۇش چۈشۈش. چاشقان سۇيىدۇ-كىمەك پۇراش
كېسەللىك جەريانى	ئۇرلۇكىدىن ساقىيىش يۈز-لىنىشى بولمايدۇ	بالاغا، تىكە يېتىش دەۋرىدىن كېيىن ئۇرلۇكىدىن ساقىيىدۇ

2. سېلىشتۇرما دېئاگنوزى: بۇنى يىرىڭلىق قاپارتقۇ، تەڭگە تەمرەتكە، دائىرىلىك چاچ چۈشۈشتىن پەرقلىنىدۇرۇش كېرەك. مۇشۇ بايىنىك ھەر قايسى پاراگرافلىرىدا ئايرىم-ئايرىم سۆزلەندى. زۆرۈر تېپىلغاندا زامبۇرۇغنى مىكروسكوپتا تەكشۈرۈپ، دېئاگنوز قويۇشتا پايدىلىنىش كېرەك.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. گىرىزېتوفولۇن بىلەن ئۇنىۋېرسال داۋالاش: گىرىزېتوفولۇن نۆۋەتتە باش تەمرەتكىسىنى داۋالايدىغان ئۇنىۋېرسال دورا. داۋالاشتا دورا ئىمچىش، باش يۇيۇش، دورا سۈرتۈش، چاچنى چۈشۈرۈش ۋە دېزىنفېكسىيە قىلىش قاتارلىق 5 تۈرلۈك ئۇنىۋېرسال چارە قوللىنىلىدۇ، بىر تەرەپلىملىك قىلىشقا بولمايدۇ. ئۆسمۈرلەرگە ۋە تەن مىكرونىزېدى بويىچە ھەر كۈنى ھەر $1g$ بەدەن ئېغىرلىقىغا $15 mg$ دىن، چوڭلارغا ھەر كۈنى $0.6 \sim 0.8g$ دىن تاماقتىن كېيىن ئىككىگە بۆلۈپ ئۇدا $15 \sim 20$ كۈن ئىچكۈزۈلىدۇ. ئاق تەمرەتكە ۋە زەخمىلەنگەن يۈزى باش تېرىسىنىڭ يېرىمىدىن ئارتۇقنى ئىگىلىگەن سېرىق تەمرەتكە بارلار چوقۇم 25 كۈن دورا ئىمچىش كېرەك. يەنە كۈچەيتىلگەن گىرىزېتوفولۇننىڭ قوناق مېيى ئىمولىسىيىسىنى ئىشلىتىشكە ھەم گىرىزېتوفولۇننىڭ مىقدارىدىن قەسەمى كېيىن يېتىشكە بولىدۇ. دورا ئىمچىش جەريانىدا مايلىق تاماقلارنى يېسە ياكى شىۋاق قايىنا تەمسىنى ھەر كۈنى قوشۇپ ئىچسە دورىنىڭ شۈمۈرۈلۈشىگە پايدىلىق بولىدۇ.

داۋالاش جەريانىدا ھەر 7~10 كۈندە بىر قېتىمىدىن، جەمئىي 8~6 قېتىم چاچنى چۈشۈ-ۈپ تۇرۇش كېرەك. ھەر كۈنى يىلىمان سۇدا باشنى سويۇنلاپ يۇيۇپ، 10% لىك گۈڭگۈرت مەلھىمى ياكى مۇرەككەپ سالتىمىلىك كىسلاتا مەلھىمىنى سۈرتۈشكە بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا 1% لىك ئېكونازول (*Ecunazol*) ياكى 2.5% لىك يود ئۇدا ئىككى ئاي سۈرتىلىشىمۇ بولىدۇ. ئاغرىقلار ئىشلەتكەن باش كېيىم، ياستۇق كىرىلىكى، لۆڭگە ۋە تاغلار داۋالاش جەريانىدا ۋە داۋالاش ئاخىرلاشقاندا ئايرىم-ئايرىم دېزىنفېكسىيە قىلىنىشى كېرەك. شۇنداق قىلغاندا قايىنا يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

2. چاچنى يۇلۇپ داۋالاش: بۇ ئۇسۇل دەسلەپكى دەۋرلىك ئەسۋە سانى ئاز بولغان

گىچىك دائىرىدىكى زەخمىلىنىشكە مۇۋاپىق كېلىدۇ. قىسقۇچ بىلەن كېسەللەنگەن ئورۇن ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى 1cm دائىرە ئىچىدىكى چاچنىڭ ھەممىسىنى، يېڭىدىن ئۆسۈپ چىققان چاچلارنىمۇ ئۇدا 3 قېتىم يۇلۇش، شۇنىڭ بىلەن بىرگە باشنى يۇيۇپ، دورا سۈرتۈش ۋە دېزىنىڭ فېكسىيە قىلىنىشى ئىمكانىي ئايدىن ئارتۇق داۋاملاشتۇرۇش كېرەك.

3. ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپى: تەشۋىقات خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئاغرىقلارنى ئاكتىپلىق بىلەن داۋالاش كېرەك. ئاغرىقلار بىلەن ياستۇق، باش كىيىم، يۇيۇنۇپ تاش-رىنىش ۋە پەدەز بۇيۇملىرىنى ئورتاق ئىشلەتمەسلىك لازىم. ساقچا نىملارنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، بۇلغاغان ساقچىلىق ئۈسكۈنىلىرىنى ئەستايىدىل دېزىنڧېكسىيە قىلىش كېرەك.

28. قول، پۇت ۋە تىرنىق تەمرە تېكىسى

ئالغان، تاپان، قول، پۇت بارماقلىرىنىڭ تېرىسى ۋە تىرنىقلىرىنىڭ زامبۇرۇغلار بىلەن يۇقۇلمىنىشى — قول، پۇت ۋە تىرنىق تەمرە تېكىسى دەپ ئاتىلىدۇ. پەيدا بولۇش نىسبىتى يۇقىرى بولغاچقا داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش مۇھىم نۇقتا قىلىنىدۇ.

كېسەللىك سەۋەبى: كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەل پەيدا قىلغۇچى زامبۇرۇغ — تۈك زامبۇرۇغ ئائىلىسى ۋە يۈزە تېرە تەمرە تېكىسى زامبۇرۇغ ئائىلىسىدۇر. پۇت تەمرە تېكىسى ۋاسىتىلىق يولۇقۇش (كۈندىلىك بۇيۇملار ياكى مۇنچا) ئارقىلىق يۇقىدۇ. قول ۋە تىرنىق تەمرە تېكىسى كەسپىي ئاممىلدىن سىرت، كۆپىنچە ئۆزىدىكى پۇت تەمرە تېكىسىدىن يۇقىدۇ. پۇت تىرنىق تەمرە تېكىسى — پۇت تەمرە تېكىسىنىڭ بىۋاسىتە يامرىشىدىن كېلىدۇ.

كلىنىك ئىپادىلىرى

1. قول ۋە پۇت تەمرە تېكىسى: پۇت ۋە قول تەمرە تېكىسىنىڭ ئورنى گەرچە ئوخشاش بولمىسىمۇ، ئەمما كلىنىك ئىپادىلىرى ئوخشاش. بىردىنبىر ئوخشىمايدىغان يېرى قول تەمرە تېكىسى دەسلەپتە كۆپىنچە بىر تەرەپتە چەكلىنىدۇ، شۇڭا «ئىككى پۇت، بىر قول كېسەلى» دەپمۇ ئاتىغان. كۆپ ئۇچرايدىغانلىرى ئۈچ تىپقا بۆلۈنىدۇ:

(1) پىشلاقلىشىپ شەلۋەرەش تىپى: پۇتنىڭ ئۈچىنچى، تۆتىنچى بارماق ئارىلىقلىرى ۋە ئۇنىڭ ئىگىلىدىغان تەرىپىنىڭ تېرىسى ئاقىرىپ پىشلاقلىشىدۇ (4.10-رەسىم). پۇت تەمرە تېكىسى ئېغىر بولغاندا يۈزە تېرىسى سويۇلۇپ، قىزىرىپ، شەلۋەرەيدۇ، سېسىق پۇرايدۇ، قىچىشىدۇ. ئىككىلەمچى تىلما ۋە لىمفا قانلىق ياللۇغى قاتارلىقلارنى ئاسانلا پەيدا قىلىدۇ. ياز پەسلىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇ تىپتىكى قول تەمرە تېكىسى نىسبەتەن ئاز ئۇچرايدۇ.

(2) سۇلۇق قاپارتما تىپى: سۇلۇق قاپارتقۇچى سۈزۈك ياكى يېرىم سۈزۈك بولىدۇ. دائىم ئالغان، تاپان ياكى پۇت گىرۋىكىنىڭ تېرىلىرىدە يۈز بېرىدۇ. بەزىلىرى بىرلىشىپ چوڭ قاپارتقۇغا ئايلىنىدۇ، توپ - توپ بولىدۇ. نەچچە كۈنلەردىن كېيىن قاپارتقۇ قورۇشۇپ كېپەكلىشىپ چۈشۈپ كېتىدۇ. ئالغاندىكىلىرى ھالقىسىپ جان تەڭگىلىك قاسرا قىلىشىدۇ، شىددەتلىك قىچىشىدۇ، ئىككىلەمچى يۇقۇلمىنىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ، ياز پەسلىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ.

3) تەڭگە قاسراقلىق مۇڭگۈزلىشىش تىپى: بۇ تىپى نىسبەتەن كۆپ كۆرۈلىدۇ. يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئورۇنلاردا ئۇششاق تەڭگە قاسراق ھاسىل بولىدۇ. ئالاقان ۋە ئاپاندا كۆرۈلسە چېگرىسى نىسبەتەن ئېنىق بولۇپ، ھالقا شەكىللىك ئالاھىدىلىككە ئىگە ياكى كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ تېرىسى زىيادە قېلىنلاپ، يىرىكىلىشىپ يېرىلىدۇ (10-سىم). قانچە قىچىشمايدۇ، يېرىق نىسبەتەن چوڭقۇر بولغاندا ئاغرىيدۇ. يۇقىرىدىكى ئۈچ تىپ بىرلا ۋاقىتتا مەۋجۇت بولغاندا مەلۇم بىر زەخمىلىنىش ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ. 2 - 3 - تىپلىرى كۆپىنچە ياز، قىشتا ئۆۋەتلىشىپ كۆرۈلۈشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە.

2. تىرناق تەمرە تىكىسى: كۆپىنچە بىر تىرناق تىن باشلىنىپ تەدرىجى قوشنا تىرناققا تارقىلىدۇ. تىرناق ئاستىدا پەيدا بولسا تىرناق پلاستىنىكىسى قېلىنلاپ ئۆزگىرىدۇ، چۆرۈكلىشىپ يېرىلىدۇ، سىرتقى يۈزى يىرىكىلىشىپ ئېگىز - پەس بولۇپ، مەينەت كۆرۈنىدۇ (6.10 - رەسىم). ئېغىرلىرىدا تىرناق پلاستىنىكىسى بىلەن تىرناق ئۇلى ئايرىلىپ تىرناق ئاستىغا ھۆڭگۈز ئاقسىلى يىغىلىپ قالىدۇ. يەنە بىر تىرناقنىڭ سىرتقى يۈزىدە چەكلىك توچكىسىمان دۇغلاشقان رايون پەيدا بولىدۇ، پۈتۈن تىرناق قىچىمۇ يامرىشى مۇمكىن. بۇ زامبۇرۇغلۇق ئاق تىرناق دېيىلىدۇ (7.10 - رەسىم).

3. تېرە تەمرە تىكىسى زامبۇرۇغ ئەسۋىسى: تېرە تەمرە تىكىسى زامبۇرۇغى كېسەللىك ئوچىقى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاللىبىرگىيىلىك تېرە ئەسۋىسىدىن ئىبارەت، بۇ پۇت تەمرە تىكىسى ۋە باش تەمرە تىكىسىدە كېسەللىك ئۆزگىرىشى ئېغىرلاشقاندا كۆرۈلىدۇ. زەخمىلىنىش خىلمۇ - خىل بولىدۇ. ئەمما كۆپىنچىسى تەر قا پارىقۇسى ۋە تىلىمغا ئوخشاپ قالىدۇ، لىشايسىمان تېرە ئەسۋىسىمۇ چىقىدۇ. زەخمىلىنىش كېسەللىك ئوچىقىدىن يىراق ئورۇندا يۈز بېرىدۇ. تېرە ئەسۋىسىدىن زامبۇرۇغنى تەكشۈرگەندە مەنپىي بولىدۇ. تريخوفىتىن (*trichophyten*) تېرە سىنىمى مۇسپىي بولىدۇ. تېرە ئەسۋىسى كېسەللىك ئوچىقىنىڭ ياخشىلىنىشىغا ئەگىشىپ تەدرىجى ئازىيىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سىجىشتۇرما دىئاگنوزى: ھەر قايسى تىپلىق تېرە ئەسۋىسىنىڭ ئالاھىدىلىكى، تىرناق پلاستىنىكىسىنىڭ شەكلى ئۆزگىرىش، كۆپ پەيدا بولۇش پەسلى قاتارلىقلارغا ئاساسەن دىئاگنوز قويۇش تەس ئەمەس. قول تەمرە تىكىسى ۋە تىرناق تەمرە تىكىسى قولدىكى ئېگىز ھەۋە تىرناق تىكىسى تەڭگە تەمرە تىكە بىلەن پەرقلىنىدۇ. ئۇلار مەزكۇر باقتا ئايرىم - ئايرىم سۆزلەندى.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. داۋالاش: پىشلاقلىشىپ شەلۈدرەش تىپلىق قول - پۇت تەمرە تىكىسىگە ئالدى بىلەن كومىكۇلۇم تالىقىنى ياكى پۇت تەمرە تىكىسى تالىقىنى ئىشلىتىلىدۇ، ناۋادا ئىككى مەچى يۇقۇملىنىش بولسا 1:5000 لىك ماركانۇسۇپ ئېرىتمىسىگە چىلىنىدۇ، شەلۈدرەش ياكى يۇقۇملىنىش ياخشىلانغاندىن كېيىن 2% ~ 1% كلوترىمازول ياكى ئېكونازول زىماتى ياكى ئۇنىڭ ئېرىتمىسى ئىشلىتىلىدۇ. سۇلۇق قاپارققۇ تىپلىقلارغا زامبۇرۇغقا قارشى يۇقىرىدىكى ئېرىتمىلەرنى ئىشلەتكەندىن سىرت 5% لىك ئاتسىدى سالتىمىيلاس ئىسپىرتى، مۇرەككەپ ئاتسىدى بېنزويىك ئىسپىرتى ياكى كۇرتىس ھېچىسىمىك تىنمەكتۇرىنى قاتارلىقلار

ئىشلىتىلىدۇ؛ تەڭگە قاسراقلىق مۇڭگۈزلىشىش تېمپىغا يۇقىرىدىكى مۇناسىۋەتلىك دورىلار-
نىڭ بەلەملىرى سۈرگىلىدۇ.

تىرناق تەمرە تېكىسىنى داۋالاشتا دورا سۈركەشتىن بۇرۇن كېسەللەنگەن تىرناقنى
قىرىپ ئېچىپ، ئاندىن 30% لىك قاتتىق سىركە كىسلاتا ئېرىتمىسى ياكى مۇرەككەپ
تىرناق تەمرە تېكىسى تېمىكتۇرىسى سۈرگىلىدۇ، 40% ئۇرپا مەلھىمىنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
كېسەللەنگەن تىرناق ئېچىپ، ئاندىن كېيىن كلوترىمازول ياكى ئېكونازول مەلھىمى
كېسەللەنگەن تېرە ئەسلىگە كېلىپ نورماللاشقانچە ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر كېسەللەنگەن تىر-
ناق كۆپ بولمىسا ياكى تىرناق قىسىلىپ كەتكەن بولسا تاشقى كېسەللىك بۇلۇمىدە ئويۇپ-
راتسىيە قىلىپ ئېلىۋېتىشكە بولىدۇ. ئويۇپراتسىيىدىن كېيىن دورا سۈركەش قوشۇمچە تە-
لىملىنىدۇ. تىرناق تەمرە تېكىسىنى داۋالاش بىلەن بىر ۋاقىتتا پۇت، قول تەمرە تېكىسىنى پاي-
ئال داۋالاش كېرەك.

تەمرە تېكە زامبۇرۇغ ئەسۋىسىگە گىرىپتار بولغۇچىلارغا گىرىپتوزوفۇلۋىنۇم قىسقا مۇھ-
دەت ئالامەتلىرى كۆنىتىرول قىلىنىدىغانچە ئىچكىۈزۈلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن
بىر ۋاقىتتا ھېستامىنغا قارشى دورا ياكى كالىتسىي ياسالىملىرى بېرىلىدۇ.
كېسەللىك ئۈچۈن 1:20 لىك ئالىيۇمىن ئاتسىتات ياكى 3% لىك بورىك كىسلاتا ئېچىپ-
رىتىمىسى كۆمۈرىس قىلىنىپ، كېسەللىك ئالامىتى ياخشىلانغاندىن كېيىن، زامبۇرۇغقا قار-
شى يەرلىك داۋالاش تەلىملىنىدۇ.

2. ئالدىنى ئېلىش: پۇت تەمرە تېكىسىنى ئۆز ۋاقتىدا داۋالاپ، يۇقۇلمىنىش مەنبە-
سىنى ئازايتىش، لۆڭگە، ئاياغ ۋە پايپاقلارنى دائىم يۇيۇپ ئاپتاپقا سېلىش، قول بىم-
ئەن پۇتنى تاتىلاش ئادىتىگە خاتىمە بېرىش، كوللېكتىپ مۇنچىلارنىڭ كەشلىرى ياكى لۆڭ-
گىسىنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

38. بەدەن تەمرە تېكىسى ۋە يوتا تەمرە تېكىسى

بەدەن تەمرە تېكىسى—باش تېرىسى، ئالقان، تاپان، تىرناق پلاستىكىسى قاتارلىق
لاردىن باشقا ئورۇندىكى تېرە يۈزە قىسمىنىڭ زامبۇرۇغلۇق يۇقۇلمىنىشىدىن ئىبارەت.
بۇنىڭ ئەۋرەت-يوتا قىسمىدا يۈز بەرگەنلىرى يوتا تەمرە تېكىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

كېسەللىك دەۋرى: كېسەل پەيدا قىلغۇچى زامبۇرۇغ پۇت، قول تەمرە تېكىسىنىڭكىگە ئوخ-
شاش. بۇ كۆپىنچە پۇت تەمرە تېكىسىنىڭ بىۋاسىتە يامرىشىدىن ياكى بۇلغانغان سايمانغا
ۋاسىتىلىق يولۇقۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بالىلار دېكىسى تەمرە تېكىسىگە گىرىپتار بولغان
مۇشۇك، ئىت قاتارلىقلارغا بىۋاسىتە يولۇقۇشتىن پەيدا بولىدۇ. كورتيكوستېروئىدنى ئۇ-
زۇن مۇددەت ئىچىش، دېسئامىت ياكى كوشىمەن كېسىملى قاتارلىقلار مەزكۇر كېسەلنىڭ
قوزغاتقۇچى ئامىلىدۇر.

كلىنىك ئىپادىلىرى: دەسلەپتە سانى ئانچە كۆپ بولمىغان يىڭىندەك سۇس قىزىل
رەڭلىك دۆڭچە ئەسۋە، سۇلۇق قاپارتقۇ ياكى دۆڭچە قاپارتقۇلۇق ئەسۋە چىقىدۇ، كېيىن
تەدرىجى سىرتىغا قاراپ كېڭىيىدۇ، گىرۋەكلىرى ئېنىق بولۇپ، مەركىزىي قىسمىدىكى

گەسۋە تەدرىجى يوقىلىدۇ، ھالقا، يېپىرىم ھالقا ياكى كۆپ ھالقا شەكىلىدە بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە. مەركەز قىسمىنىڭ تېرىسى كۆپىنچە نورمال ياكى ئازراق كېپەكلىشىدۇ، ۋاقىتلىق پېگمېنت چۆكمىسى ھاسىل بولۇشىمۇ مۇمكىن (10، 8 - رەسم). يوتا تەمرە تېكىسى تەرىدىن پىشلاش ۋە سۈركىلىشنىڭ نەتىجىسىدە زەخىملىنىش نىسبەتەن قېلىنلايدۇ، يۇقىرىقى گىرۋىكى كۆپىنچە ئېنىق ئەمەس، تۆۋەنكى گىرۋىكى ئېنىق كۆرۈنىدۇ (10، 9 - رەسم). يۈز، بويۇن، بەل، يوتا، ساغرا ۋە ئەۋرەت قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپ پەيدا بولىدۇ، قىچىشىدۇ. ئىسسىق پەسىلدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش: پۇت - قول تەمرە تېكىسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش ئۇسۇلىغا ئوخشاش.

48. ئالا - چىپار تەمرەتكە

مەزكۇر كېسەل ئادەتتە «تەردى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ يۈزە مۇڭگۈز قەۋىتىنىڭ يېنىك ئۆتىدىغان سوزۇلما زامبۇرۇغلۇق يۇقۇملىنىشىدۇر.

كېسەللىك سەۋەبى: ھالقا ئىسپان توپان سىمپورىلىق زامبۇرۇغ كەلتۈرۈپ چىقىرىلىدۇ. مەزكۇر زامبۇرۇغ بىردىنبىر ياغ خۇمار ياستى باكتېرىيىسى بولۇپ، نورمال تېرە زامبۇرۇغلىرى توپىنىڭ بىرى. يۇقىرى تېمپېراتۇرا ۋە نەملىك، تېرە مېيىنىڭ تەپچىپ چىقىشى، بەك تار كىيىم قاتارلىقلار كېسەل قوزغاتقۇچى ئامىللار. ئېرىسىيەت ئامىلى، كورتيكوستېروئىد ھورمونلار ۋە ئىممۇنىتەتنى تورمۇزلىغۇچى دورىنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلىتىش، ئوزۇقلىنىش ناچارلىقى، لىمفا فاكىتورىنىڭ كەملىكى قاتارلىقلار ئىچكى مەنبەلىك قوزغاتقۇچى ئامىللاردۇر.

كېسەلنىڭ ئىپادىلىرى: ياش، ئوتتۇرا ياشلىقلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. دەسلەپتە تۈك تۆشۈكىنى ئوراپ تۇرغان يۇمىلاق شەكىللىك، گۈرۈچ چوڭلۇقىدا، سۇس رەڭلىك داغ پەيدا بولىدۇ. كېيىن تەدرىجى چۆكىپ سېرىق بۇرچاق ياكى ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ داغ ئەسۋىسىگە ئايلىنىدۇ. بەزىلىرى بىرلىشىپ چوڭ بىر پارچە بولۇپ قالىدۇ. تېرە ئەسۋىسىدە ياللۇغلىنىش رېئاكسىيىسى روشەن بولمايدۇ. ئەسۋە رەڭگى كېسەل تېرىسىنىڭ رەڭگى ۋە كۈن نۇرىغا قايلىنىش دەرىجىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، تېرە رەڭ، بېغىررەڭ، سۇس سۇررەڭ، سۇس رەڭ ياكى سۇس سېرىق رەڭ ئارىلىشىپ ئالا - چىپار بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىنى شاكالسىمان تەڭگىلىك قاسراق ئوراپ تۇرىدۇ. ئەمما بەزىدە ئوخشىمىغان نۇقتىدىن كۆرۈپ تەكشۈرگەندە ئۇنى تونۇماق ئاسان. كۆكرەك، دۈمبە قىسمىدا كۆپرەك بولىدۇ. ئەمما قولتۇق، بويۇن، يۈز، يوتا، قورساق قاتارلىق ئورۇنلارغىمۇ تەسىر قىلىدۇ. ھېسسىي ئالامەتلەر روشەن بولمايدۇ. كېسەللىك ئالامىتى قىش پەسلىدە پەسىيىپ يوقىلىدۇ، يازدا ياكى كۆپ تەرلىگەندە ئېغىرلىشىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: يېشى، ئالا - چىپار تېرە ئەسۋىسى، كۆپ پەيدا بولىدىغان ئورۇنلار ۋە پەسلى قاتارلىقلارغا ئاساسەن دىئاگنوز قويۇش تەس ئەمەس، بۇنى ئاق كېسەل ۋە ھال رەڭلىك ئەسۋىدىن پەرقلىنىدۇرۇش كېرەك. مەزكۇر بابتا ئايرىم سۆزلەندى.

داۋالاش: تۆۋەندىكى دورىلار تاللاپ سۈرگىلىدۇ: 2% ~ 1% لىك كلوترىمازول زىچا-
 ئى، 2% ~ 1% لىك ئېكونازول زىچا، 5% لىك ئاتسىدى سالتىسىلاستىمىپىرتى، مۇرەك-
 كەپ ئاتسىدى بېنئىزولىمىك ئىسسىپىرتى كۈنىگە ئىككى قېتىم سۈرتىلىپ
 تېرە ئىسسىپىرتى يوقالغاندىن كېيىنمۇ 3 ~ 2 ھەپتە داۋاملاشتۇرۇ-
 لىدۇ ياكى 40% لىك ناترىي تېئوسۇلفات ئېرىتمىسى سۈرتىلىپ قۇرۇغاندىن كېيىن يەنە
 4% لىك سۇيۇق تۇز كىسلاتاسى ھەر كۈنى ياكى كۈن ئارىلاپ بىر قېتىمدىن ئۇدا 3 ~ 2
 ھەپتە سۈرگىلىدۇ. ئادەتتە كىلىمىكىدا يۇقىرىدىكى داۋالاش ئارقىلىق ساقايىتۇەتكىلى بو-
 لىدۇ، ئەمما ئاسان قوزغىلىدۇ. يېقىندا بەزىلەر ھەر كۈنى ئاخشىمى سترونىتسىي دىسۇل-
 فىد چاچ يۇيۇش ياسالدى ياكى سىنىك پىرىتىئون (*Zinc Pyrithione*) نى سۈرتۈپ
 بىر نەچچە مىنۇت تۇرغۇزغاندىن كېيىن يۇيۇش لازىم، جەمئىي ئىككى ھەپتە ھەر ئاخشا-
 دا بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈنۈمى روشەن، بىخەتەر بولۇپ، سېسىق پۇرىمايدۇ.
 مەزكۇر كېسەل يولۇقۇش ئارقىلىق يۇقىمغا ئىلىقى ئۈچۈن، ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە ئىمكا-
 نىيە تىنىك بېرىچە كېسەل قوزغىتىدىغان ئامىللارنى يوقىتىش لازىم.

58. تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسەلى

مەزكۇر كېسەل تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ ئائىلىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تېرە، شىل-
 لىق پەردە ۋە ئىچكى ئەزالارنىڭ زامبۇرۇغلۇق يۇقۇلمىنىشىدىن ئىبارەت. تېرە ۋە شىل-
 لىق پەردىنىڭ يۇقۇلمىنىشى نىسبەتەن كۆپ ئۇچرايدۇ.
كېسەللىك سەۋەبى: تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ ئائىلىسى شەرتلىك كېسەل
 پەيدا قىلغۇچى زامبۇرۇغدۇر. تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسەللىكى ئاساسلىق
 ئاق تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاق تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ
 ساغلام ئادەمنىڭ تېرىسى، ئېغىز بوشلۇقى، يۇقىرىقى نەپەس يولىرى، ئۈچەي يولىرى ۋە
 جىمىسى يول شىللىق پەردىسى قاتارلىق ئورۇنلىرىغا ماكانلىشىدۇ، ئەمما كېسەل پەيدا
 قىلمايدۇ. ئوزۇقلىنىش ناچارلىشىپ ئورگانىزم ئاجىزلاشقان، شېكەر سېپىش كېسەلى ياكى
 سوزۇلما خۇراتقۇچى كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغاندا ۋە كەڭ دائىرىلىك ئانتى-
 پىئوتىكلار، كورتىكوستېروئىد ھورمونى ياكى ئىممۇنىتېنى تورمۇزلىغۇچى دورىلارنى
 ئۇزۇن مۇددەت ئىشلىتىش مەزكۇر كېسەلنى قوزغايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئەزا كۆچۈرۈش
 ئوپېراتسىيەسى، كەسپىي ئامىل ۋە تىببىي مەنبەلىك بۇلغىنىش قاتارلىقلارمۇ كەلتۈرۈپ
 چىقىرىدۇ.

كېسەللىك ئىپادىلىرى: يۇقۇلمىنىش ئورنىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ تېرە، شىللىق
 پەردە ۋە ئىچكى ئەزا تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسەلى دەپ ئۈچ خىل تىپقا بۆلىنىدۇ:
 1. تېرە تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسەلى: تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىل دا ئىم ئۇچرايدۇ:
 (1) شەلۋەرە شىلىك قىزىل داغ: كېسەللەنگەن تېرە قىچقىزىل، چېگرىسى ئېنىق، گىر-
 ۋەكلىرى يەلپۈگۈچسىمان بولۇپ، ئۈستى ئاپئاق پىشلاقمىدۇ ھەمدە پەردىسىمان قاس-
 راقلىشىدۇ، ئېغىرلىرىدا سويۇلۇپ شەلۋەرەيدۇ؛ بەزىدە گىرۋەكلىرىدە دۆڭچە ئەسۋە
 ياكى سۇلۇق قاپارتقۇ كۆرۈلىدۇ، بۇلار سۇفېمى ھەمراھقا ئوخشاش تارقىلىدۇ. دۆڭچە

ئەسۋە يۈزى ھالقا شەكىللىك يىمىسىمان كېپەكلىشىدۇ. بويۇن، قولتۇق، كىندىك، ئاياللاردا ئەمچەك ئاستى، جىنسىي لەۋ، مەقەت ئەتراپى ۋە بوۋاقلار زاكا ئورنى قاتارلىقلاردا كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا قول، پۇت بارماقلىرىنىڭ ئارىلىقىدا پەيدا بولسا بارماق ئارىلىقى شەلۋەرەش دېيىلىدۇ، قىچىشىپ ئاغرىيدۇ (10. 10 - رەسىم). (2) كەڭ دائىرىلىك تېرە تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلى: 4 ~ 3 ئايلىق بوۋاقلاردا ياكى بالىلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. دەسلەپتە يىڭنە ياكى تېرىقتەك سۇس قىزىل رەڭلىك دۆڭچە ئەسۋە چىقىپ، كېيىن تەدرىجى كۆپىيىپ، ئۆزئارا بىرلىشىپ قىپقىزىل چوڭ بىر پارچە داغقا ئايلىنىدۇ ھەمدە تەڭگە قاسرا قىلىشىدۇ ئازراق قوشۇلىدۇ. چېگرىسى ئېنىق، گىرۋەكلىرى سۈنئىي ھەمراھتەك زەخىلىنىدۇ. دەسلەپتە زاكا تۇتۇلغان ئورۇن ۋە ئۇنىڭ يېقىن ئەتراپىدىكى تېرىلەردە يۈز بېرىدۇ، كېيىن قورسا قىمىڭ تۆۋەنكى قىسمى بەل، تۆۋەنكى مۈچلەر، گەۋدە، قولتۇق ۋە بويۇن قاتارلىق ئورۇنلارغا تەرەققىي قىلىدۇ، دائىم غاز بوغۇز قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

(3) تىرناق ئېرىقچىسى ياللۇغى ۋە تىرناق كېسەللىكى: تىرناقلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. ئالدىنقىسىدا تىرناق ئەتراپى سۇس ئۆتكۈر خاراكتېردە، قارامتۇل قىزىل رەڭدە ئىشىشىپ دۇ، ئازراق ئاغرىيدۇ، يىرىك سىرغىش كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. كېيىنكىسىدە تىرناق پلاستىكىسى قېلىنلاپ، شەكلى ئۆزگىرىدۇ، تىرناق يۈزىدە توغراقىرلار ۋە ئېرىقچە سىزىقلىرى بولىدۇ، ئەمما پاراقىرا قىلىقنى يوقاتمايدۇ. ئېغىر بولغاندا تىرناق پلاستىكىسى بىلەن تىرناق ئۇلى ئاجرىلىپ كېتىدۇ، ئەمما تىرناق ئاستىدا مۇڭگۈز ماددا ئاق سىلىنىڭ ئۇۋا قلىرى ئولتۇرۇشۇش بولىدۇ. بۇ تىرناق تەمرەككىسىدىن پەرقلىنىدۇرۇش تىكى مۇھىم ئالاھىدىلىكتۇر.

2. شىلىق پەردە تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلى: كۆپ ئۇچرايدىغانلىرى تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل بولىدۇ:

(1) غاز بوغۇز: بوۋاقلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭدا ئېغىز بوشلۇقى شىلىق پەردىسى، تىل ئارقىسى، يۇتقۇنچاق ۋە چىش مۆلكى قاتارلىق ئورۇنلارغا چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان، ئۇيىغان سۈتتەك ئاق پەردە چاپلىشىپ تۇرىدۇ، ئاق پەردىنى سۇرتىپ كەندە قىپقىزىل شەلۋەرگەن يۈزى ئېچىلىپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جاۋاغا يىغا تەسىر قىلسا، تەسۋىسىمان زامبۇرۇغلۇق جاۋاغا يىاللۇغى دېيىلىدۇ.

(2) جىنسىي يول ياللۇغى: دېتايىت كېسىلى بولغان ۋە ھامىلدار بولغان ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. جىنسىي يول شىلىق پەردىسى قانغا تولۇپ، قىزىرىدۇ، ساختا پەردە ياكى ئاق رەڭلىك داغ تۆشۈكلىرى پەيدا بولىدۇ، ئاق خۇن پىشلاققا ئوخشاپ قالىدۇ. سىرتقى جىنسىي ئەزالار قىزىرىپ، ئىشىشىدۇ، شەددەتلىك قىچىشىدۇ، كۆيۈشۈش سېزىمى بولىدۇ، تاتىلانما تاتۇق قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

3. ئىچكى ئەزا تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلى: بۇنىڭدا ئۈچەي ۋە ئۆپكە يۇقۇملىنىش كۆپ كۆرۈلىدۇ، ئالدىنقىسى مۇدەك ئىچى سۇرۇش ياكى دۇفۇ قىلىنىدەك تەرەت قىلىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ، ئەمما تەرەتتە قان ياكى شىلىق سۇيۇقلۇق بولمايدۇ، ناگاندا قورساق كۆپۈپ ئاغرىيدۇ، كېيىنكىسى كاناي ياللۇغى ياكى ئۆپكە يىاللۇغىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى ئىپادىلەيدۇ، تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ، كۆكرەك ئاغرىيدۇ، يۇتىلىدۇ.

قان تۈكۈرىدۇ ياكى شىلمىشقى يىلمىسىمان بەلغەم تۈكۈرىدۇ، ئۆپكە سىلى ياكى ئۆپكە ئۆسمىسىگە ئوخشايدىغان ئالامەتلىرىمۇ بولىدۇ.

4. تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ ئەسۋىسى: ئاز ئۇچرايدۇ، بۇ كېچىككەن ھالەت ئۆزگىرىش رېئاكسىيىسىنىڭ ئىككىلەمچى قوزغىلىشىدىن ئىبارەت. كىلىنىكىلىق ئىمپادىلىرى تېرە تەمرە تىكىسى زامبۇرۇغ ئەسۋىسىگە ئوخشاش. كېسەللەنگەن ئورۇندىن زامبۇرۇغ تەك شۈرگەندە مەنپىي بولىدۇ. تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلى ياخشىلانغاندا، تېرە ئەسۋىسىمۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ يوقىلىدۇ ياكى ئازلايدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: تېرە ۋە شىلىق پەردە تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلىنىڭ كىلىنىكىلىق ئالامەتلىكىگە زامبۇرۇغ تەكشۈرۈش ئەھۋالىنى بىرلەشتۈرگەندە، ئىچكى ئەزا تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلىگە دىئاگنوز قويۇشتا كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرى بىرلەشتۈرگەندىن سىرت، تەكرار زامبۇرۇغ ئۆستۈرگەندەلا توغرا دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ. كىلىنىكىدا بۇنى پىشلاقلىشىپ شەلۋەرەش تىپىلىق قول تەمرە تىكىسى (مۇشۇ بايتا ئايرىم سۆزلەندى)، تىرنىق ئېرىقچىسى يىرىقلىق ياللۇغى ياكى زاكىدىن بولغان تېرە ياللۇغىدىن پەرقلىنىدۇرۇش لازىم. تىرنىق ئېرىقچىسى يىرىقلىق ياللۇغى تىرنىق ئېرىقچىسىنىڭ ئۆتكۈر ياللۇغى بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ. زاكىدىن بولغان تېرە ياللۇغىدىكى تېرە ئەسۋىسى نوقۇل قىزىل داغنى ئاساس قىلىدۇ ھەم زاكىلىنىدىغان ئورۇن بىلەن چەكلىنىدۇ. كاسا يېرىقى، چات يېرىقى قاتارلىق پۈك-لەنگەن تېرىدە تېرە ئەسۋىسى نىسبەتەن يەڭگىلەك بولىدۇ. ئۈچەي ۋە ئۆپكە تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلىنى ئىچكى كېسەللەكلەردىن پەرقلىنىدۇرۇش لازىم. ئىچكى كېسەللەكلەردە تەسۋىسىمى سۆزلەندى.

داۋالاش: كېسەل قوزغاتقۇچى ئامىلىنى يوقىتىپ، ئوزۇقلىنىشنى كۈچەيتىپ، ۋىتامىن B گۇرۇپپىسىدىكى دورىلارنى تولۇقلاش بىلەن بىر ۋاقىتتا، تېرىنىڭ پاكىزلىكى بىلەن قۇرغاقلىقىنى ساقلاشقا دىققەت قىلىش لازىم. زەخمىلەنگەن ئورۇننى 1:5000 بولغان ماركازىنۇپ ئېرىتمىسى بىلەن يۇيۇپ، قۇرۇغاندىن كېيىن، 2% لىك گىنتىئان ۋېتولېت ئېرىتمىسى، 1% لىك كلوترىمازول زىماتى ياكى 1% لىك ئېپىكونازول زىماتى كۈنىگە 2~3 قېتىم سۈركىلىپ، 2~1 ھەپتە داۋاملاشتۇرۇلىدۇ. غاز بوغۇز ۋە جىنىسىي يول ياللۇغىغا ئالدى بىلەن 2% لىك ناترىي ھىدروكاربونات ئېرىتمىسى بىلەن ئېغىزنى چايقاش ياكى ياللۇغلانغان ئورۇننى يۇيۇپ، ئاندىن يۇقىرىدىكى دورىلارنى سۈركەش لازىم. نىستاتىنمۇ مەلۇمى ($100000u/g$) ياكى نىستاتىنمۇ جىنىسىي يول شامچىسى (شا مچە $100000u$) كۈنىگە بىر قېتىمدىن 14~10 كۈن ئىشلىتىلىدۇ.

ئۈچەي تەسۋىسىمان زامبۇرۇغ كېسىلىگە نىستاتىنمۇ $4000000u \sim 2000000u$ دىن، بالىلارغا كۈنىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $10000u \sim 5000u$ ھېسابلاپ تۆتكە بۆلۈپ، چوڭ تەرەتتىنى ئۆستۈرگەندە زامبۇرۇغ مەنپىي بولغانغا قەدەر ئىچكىۈزۈلىدۇ. *Poly aldehydo - nystatin sodium* دىن $100000u$ نى $5ml$ فىزىئولوگىيىلىك تۇز سۈيىدە ئېرىتىپ، ياللۇغ قايتىپ، خەپىرۈك ئۆستۈرگەندە زامبۇرۇغ مەنپىي بولغانغا قەدەر كۈنىگە 2~1 قېتىم پارلاندۇرۇپ شۇمۇرۇلىدۇ.

ئالدىنى ئېلىش: پۈكلىنىپ تۇرىدىغان ئورۇنلارنىڭ تېرىسىنى پاكىز، قۇرغاق ساقلاپ،

كېسەل پەيدا قىلغۇچى ئامىلىنى ئۆز ۋاقتىدا يوقىتىش، ئانتىبىيوتىكلار، كورتىكوستروئىد ھورمونلىرى ۋە ئىممۇنىتلىق ياسالغۇچىلارنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش لازىم. كەڭ دائىرىلىك ئانتىبىيوتىكلارنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەندە، بىرلا ۋاقىتتا ۋىتامىن B گۈرۈپپىسىنى قولۇقلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك.

ئون بىرىنچى باب سىفىلىس ۋە سۆزنەك

18. سىفىلىس

سىفىلىس — سىفىلىس بۇرما تەنچىسى پەيدا قىلغۇچى. يۇقۇملۇق كېسەللىكتۇر. تېرە، شىلىق پەردىلەر ۋە پۈتۈن بەدەندىكى ھەر قايسى توقۇلمىلار ۋە ئەزالارغا بۆسۈپ كىرىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئۇزۇن، ئالامەتلىرى بەزىدە ئاشكارىلىنىپ، بەزىدە يوقىلىپ تۇرىدۇ. ئەگەر مۇھىم ئەزالارغا بۆسۈپ كىرسە ھاياتىمۇ خەۋپ يەتكۈزىدۇ.

كېسەللىك سەۋەبى ۋە يۇقۇش شەكلى: كېسەل قوزغاتقۇچى — سىفىلىس بۇرما تەنچىسىدۇر. يۇقۇش شەكلىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن كلىنىكىدا ناتۇغما (تېرىشچە) سىفىلىس ۋە ھامىلىگە ئۆتكەن (تۇغما) سىفىلىستىن ئىبارەت ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. ناتۇغما سىفىلىس كۆپىنچە ناپاك جىنسىي مۇناسىۋەتتىن بىۋاسىتە، ئاگانىدا بۇلغىغان ماددىلار ياكى قان بېرىش ئارقىلىق ۋاسىتىلىق يۇقىدۇ. ھامىلىگە ئۆتكەن سىفىلىس — سىفىلىسقا گىرىپتار بولغان ھامىلدار ئايالىنىڭ قېنىدىكى بۇرما تەنچە بالا ھەمراھى ئارقىلىق ھامىلىگە ئۆتىدۇ.

كلىنىك ئىپادىلىرى: يۇقۇملانغان ۋاقتى، كلىنىك ئالاھىدىلىكى ۋە يۇقۇش يولىنىڭ رەڭنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن ئادەتتە تۆۋەندىكى دەۋرلەر بويىچە بايان قىلىمىز:

1. ناتۇغما سىفىلىس: دەسلەپكى دەۋرلىك (1-دەۋرى ۋە 2-دەۋرى)، ئاخىرقى دەۋرلىك (3-دەۋرى) ۋە يوشۇرۇن سىفىلىستىن ئىبارەت ئۈچ خىلغا بۆلۈنىدۇ.

- 1) 1 - دەۋرلىك سىفىلىس، يەنى قاتتىق شانكىر: ناپاك جىنسىي مۇناسىۋەتتىن يۈقىدۇ. يوشۇرۇن دەۋرى تەخمىنەن ئۈچ ھەپتە، يۇقۇملانغان ئورۇندا ئاغرىتىش، ئىنفېلىتاتسىيىلىك قاتتىق تۈگۈنچە پەيدا بولىدۇ، ئادەتتە تاق چىتىدۇ، خورما رەڭگىدە بولىدۇ. ئۇزاق ئۆتمەي يۈزى شەلۋەرەيدۇ ياكى يۈزە يارا بارلىققا كېلىدۇ. يارىنىڭ چوڭ كىچىكلىكى تەخمىنەن 1cm، دۈگىلەك ياكى ئېللىپس شەكلىدە بولىدۇ، ئەتراپى ئازراق كۆتۈرۈلۈپ تىك قىر شەكلىگە كىرىدۇ. نېگىزى پاكىز، كۈمۈرچەكتەك قاتتىق، ئىچىدە نۇرغۇنلىغان بۇرما تەنچىلەر بولىدۇ. زەخىملىنىش — تاجسىمان ئېرىقچە، خەتنىلىك ئىچىكى قاننى، بالىياتقۇ بويىنى ۋە چوڭ جىنسىي لەۋ قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. قاتتىق شانكىر پەيدا بولۇپ 3~2 ھەپتىدە، ئىككى تەرەپتىكى يېرىقلىمىغا تۈگۈنلىرىدە ئاغرىتىش، يىرىتىش ئىشلىتىدۇ، يۈزى قىزارمايدۇ، ئۆز ئارا بىرلىشىپ كەتمەيدۇ، بۇ چاغدا، سىفىلىسلىق قان زەرداپى مۇسپىي رېئاكسىيە بېرىشكە باشلايدۇ. دالەتتە ئىككى شەكلى ئادەتتە 3~4 ھەپتىدىن كېيىن ساقىيىپ، چېچەكتەك تاتۇق قالىدۇ.

(2) 2 - دەۋرلىك سىفىلىس: بۇرما تەنچىنىڭ قاندىن پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىشىدىن پەيدا بولىدۇ، بەكمۇ يۇقۇملۇق. 2 - دەرىجىلىك سىفىلىسنىڭ ئەسۋىسى ئاساسەن تېرە ۋە شىلىق پەردىلەرگە چىقىدۇ، كۆپىنچە قاتتىق شاكىر پەيدا بولۇپ 12~6 ھەپتە ئۆت كەندە بارلىققا كېلىدۇ، ئەسۋە چىقىشتىن بۇرۇن ئوخشاش بولىمىغان دەرىجىدە پۈتۈن بەدەنلىك - دەسلەپكى دەۋرلىك كېسەللىك ئالامەتلىرى پەيدا بولۇپ، بىر نەچچە كۈندىن كېيىن تېرە ئەسۋىسى چىقىدۇ. داغلىق ئەسۋە بىلەن دۆڭچە ئەسۋە كۆپ بولىدۇ، يىمىرىلىق قاپارتقۇ ئاز ئۇچرايدۇ، ئەسۋە قاتمۇ قات چىقىشىمۇ مۇمكىن. تېرە ئەسۋىسىنىڭ چېگرىسى ئېنىق، مىس رەڭلىك بولۇپ، باسما رەڭگى پۈتۈنلەي قايتمايدۇ، ئىنقىلىتلىرى تىنىپىلىنىدۇ. كەڭ دائىرىدە سىمپىترىك تارقىلىدۇ، پۈتۈن بەدەن تېرىسىگە چىقىدۇ، ئاياللار سىرتقى جىنسىي ئەزاسى، مەقشە ئەتراپىدىكى زەخمىلىنىشى ھەم مېشە ياپىلاق ئۆسۈپ پۇلتىيىپ چىقىدۇ، بۇزى ھۆللىشىپ تۇرىدۇ. شۇڭا ياپىلاق ھۆل-سۆگەل دەپ ئاتىلىدۇ، ئىچىدە نۇرغۇنلىغان بۇرما تەنچىلەر بولىدۇ. تېرە ئەسۋىسى ئادەتتە 3~2 ھەپتە ئىچىدە يوقىلىپ كېتىدۇ، ئەمما داۋالانمىسا ياكى داۋالاش تولۇق بولمىسا، يۇقۇملانغاندىن كېيىن بىر - ئىككى يىل ئىچىدە ئەسۋە ھەمىشە قايتا چىقىدۇ. بۇ قايتىلانما سىفىلىس ئەسۋىسى دەپ ئاتىلىدۇ. دۆڭچە ئەسۋە كۆپىنچە ھالقا شەكىللىك، يايى شەكىللىك ياكى گۈل چەمبەرەكسىمان تىزىلىدۇ. ئاز ساندىكىلىرى مۇلى قۇلۇلىسىنىڭ قەپىمىدەك زەخمىلىنىدۇ. 2 - دەۋرلىك سىفىلىستىن پۈتۈن بەدەندىكى يۈزەلىمىغا تۈگۈنلىرى ئاغرىقىمىز ئىششىنىدۇ. ئىچكى ئەزالارغىمۇ تەسىر كۆرسىتىدۇ. سىفىلىس قان زەھەب رېئاكسىيىسى 100% مۇسبەت بولىدۇ، شۇڭا ئۆز ۋاقتىدا تولۇق داۋالاش شەرت.

(3) 3 - دەۋرلىك (ئاخىرقى دەۋرى) سىفىلىس: كۆپىنچە يۇقۇلمىنىپ تۆت يىلدىن كېيىن كېسەللىنىدۇ. ئاساسەتلىك دەسلەپكى دەۋرىدە داۋالانمىغان ياكى يېتەرلىك داۋالانمىغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ، يۇقىمايدۇ. تۈگۈنلۈك سىفىلىس ئەسۋىسى ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان زەخمىلىنىشتۇر، تەخمىنەن تېرىق ياكى پۇرچاق چوڭلۇقىدىكى قوڭۇر رەڭلىك ئىنقىلىتلىرى تىنىپىلىك تۈگۈننىڭ سانى ئاز بولىدۇ، سىمپىترىك بولمايدۇ. گەۋدە قىسمىدا كۆپ بولىدۇ، ھەمىشە توپ - توپ چىقىپ، گۈلچەمبەر ياكى يىلان شەكلىدە تىزىلىدۇ. تۈگۈنچە ئۆز-ئارا كۆمۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ئاز ساندىكىلىرى بۇزۇلۇپ يارىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ، ساقايغاندىن كېيىن تاتۇق قالدۇرىدۇ. ئاز ساندىكى كېسەللەردە دەرەخ يېلىمىسىمان ئىششىق ئىمپادىلىنىدۇ، تۈگۈنچە دەسلەپ چىققاندا پۇرچاقچىلىك بولۇپ، تېرە ئاستى-خىسچە يېپىتىلىپ بارىدۇ، ئاستا - ئاستا ئىسكىنە گىمىرۈنكىدەك يارا شەكىللىنىپ، بۆرەك ياكى تاقىغا ئوخشاپ قالىدۇ، چۆرىسىدە پېڭگېنىت ئولتۇرۇشقان بەلباغ بولىدۇ. ساقايغاندىن كېيىن يىڭىلىمە تاتۇق قالىدۇ. يۇقىرىدا بايان قىلىنغان زەخمىلىنىشلەردە كۆپىنچە ئوبىيېكتىپ بىتاپلىق بولمايدۇ.

بۇرۇن ئوتتۇرا پاسىلى ۋە قاتتىق تاڭلاي تېشىلىش شىللىق پەردىلەر زەخمىلىنىشنىڭ ئاساسىي ئىمپادىلىرىدۇر. زەخمىلىنىش بۆرەك - قان تومۇرلارغا ئۆتسە ئادۇرتا يالىڭى، ئادۇرتا قاقىمقى تولۇق يېپىلما سىلىق ۋە ئادۇرتا ئۆسمىسى قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ. يۇلۇن سىفىلىسى ۋە پالەچلىكتىن بولغان دۆتلۈك - سىفىلىسنىڭ نېرۋا سىستېمىسىدىكى كۆپ كۆرۈلىدىغان ئىمپادىلىرىدۇر. ئۇلاردىن باشقا سۆڭەك ۋە كۆز قاتارلىق

سىستېمىلار ئىمۇزەخمىلەندۈرىدۇ. 3- دەرىجىلىك سىفىلىسنىڭ قان زەردا بىدىكى رېئاكسىيەنىڭ مۇسپىلىك نىسبىتى 30% ئەتراپىدا بولىدۇ.

2. تۇغما سىفىلىس: ھامىلدار ئايال ئەگەر دەسلەپكى دەۋرلىك سىفىلىسقا گىرىپتار بولسا، كۆپىنچە ھامىلدارلىقنىڭ 4- ئېيىدا ھامىلىگە ئۆتۈپ، ئۆلۈك تۇغۇلۇش، بويىدىن ئاجراش ياكى بالىدۇر تۇغۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا تۇغما سىفىلىس كۆپىنچە بالىدۇر تۇغۇلغانلاردا ئۇچرايدۇ. ئۇنىڭ پەيدا بولۇش ۋاقتىغا ئاساسەن دەسلەپكى دەۋرلىك تۇغما سىفىلىس ۋە ئاخىرقى دەۋرلىك تۇغما سىفىلىسقا بۆلۈشكە بولىدۇ.

(1) دەسلەپكى دەۋرلىك تۇغما سىفىلىس: ھەمىشە 4 ياش ئىچىدە كېسەللىنىدۇ، يۇقۇم-لۇق بولۇپ ئالامەتلىرى كۆپىنچە تۇغۇلۇپ 3 ئايدىن كېيىن كۆرۈلىدۇ. ئاغرىق بالائۇ-رۇق، ئۆسۈپ يېتىلىشى ناچار، يىغىلىغاندىكى ئاۋازى بوغۇق، دائىم سىفىلىسلىق بۇرۇن ياللۇغى بولۇپ تۇرىدۇ. ئېغىز ئەتراپى، مەقەت ئەتراپى، ئالقان، تاپان ۋە كاسا قاتارلىق ئورۇنلاردا پارچە - پارچە ئىنقىلىراتسىيىلىك قىزىل داغ چىقىدۇ، ھەمىشە ئازراق تەڭگە قاسراق قوشۇلۇپ كېلىدۇ ياكى چوڭ قاپارتقۇ شەلۋەرەيدۇ. ئېغىز ئەتراپى گۇگۇسۇنسىمان يېرىلىدۇ، ساقايغاندىن كېيىن گۇگۇسۇنسىمان تاتلىق قالىدۇ. ئەگەر سۆڭەك ئېپىفىزى ياللۇغى يۈز بەرسە «ساختا پالەچ» بارلىققا كېلىدۇ. جىگەر، تال، لىمفا تۈگۈنلىرى چوڭىيىدۇ، سىفىلىس قان زەرداب رېئاكسىيەسى مۇسپىي بولىدۇ.

(2) ئاخىرقى دەۋرلىك تۇغما سىفىلىس: 4 ياشتىن ئاشقاندا يۈز بېرىدۇ. تېرە ئەس-ۋىسى ئاساسەن ناتۇغما ئاخىرقى دەۋرلىك سىفىلىسنىڭكى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ، لېكىن يۈرەك - قان تومۇرلار ۋە نېرۋا سىستېمىسىغا ئىنتايىن ئاز بۆسۈپ كىرىدۇ. ئۈچ چوڭ ئالاھىدىلىكى بار: (1) ئۇيۇل ماددىلىق مۇڭگۈز پەردە ياللۇغى، 20 ~ 5 ياش تا پەيدا بولىدۇ. ئىككى تەرەپتىكى مۇڭگۈز پەردىگە چوڭقۇر ئىنقىلىراتسىيىلىنىدۇ، كۆرۈش قۇۋۋىتىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ؛ (2) نېرۋا خاراكتېرلىك گاسلىق، كۆپىنچە 10 ياش ئەتراپىدا پەيدا بولىدۇ، ھەمىشە ئىككى تەرەپتە تۇيۇقسىز قوزغىلىدۇ؛ (3) شىناسىمان چىش، يەنى دائىملىق ئۈستۈنكى ئۇدۇل چىشلارنىڭ ئۈستى كەڭ، ئاستى تار، ئاستى گىر-ۋېكىنىڭ نەق ئوتتۇرىسىدا يېرىم ئاي شەكىللىك كەمتۈك بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سۆڭەك پەردىسى ياللۇغى، قىلىچ شەكىللىك پاقالچاق سۆڭىكى ۋە ئىگەرسىمان بۇرۇن قا-تارلىق بەلگىلەرنىمۇ ئۇچراتقىلى بولىدۇ.

3. يوشۇرۇن سىفىلىس: ئاغرىقنىڭ يۇقۇملانغان تارىخى بارلىقى، سىفىلىس قان زەردا-ب رېئاكسىيەسىنىڭ مۇسپىي بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. لېكىن ھېچقانداق كلىنىك ئىپادىلىرى بولمايدۇ. لاپوراتورىيىلىك باشقا تەكشۈرۈش نەتىجىلىرىنىمۇ مەنپىي بولىدۇ ھەمدە قان زەرداب سىنىقى بىئولوگىيىلىك ساختا مۇسپىي بولغانلار چىقىرىۋېتىلىدۇ. 4-يىل-نىڭ ئىچىدىكىلىرى دەسلەپكى دەۋرلىك يوشۇرۇن سىفىلىس، 4 يىلدىن ئاشقانلىرى ئاخىر-قى دەۋرلىك يوشۇرۇن سىفىلىس دەپ ئاتىلىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سىڭىشتۇرما دىئاگنوزى: ناپاك جىنسىي كېسەللىك تارىخىنىڭ بار - يوقلۇقى، ھازىر ۋە ئۆتكەندە سىفىلىس كېسەلىگە گىرىپتار بولغان تارىخىنىڭ بار - يوق-لۇقىنى، داۋالىنىش ئەھۋالىنى ۋە ئاغرىقنىڭ ئانىسىنىڭ تۇغۇش تارىخىنى سوراش شەرت. بەدەن تەكشۈرۈش ئەتراپلىق، سىستېمىلىق بولۇش، قالدۇرۇپ قويما سىلىق لازىم. شۇنىڭ

بىلەن بىللە سىغىلىش قان زەرداب مىنىمىنى ئىشلەش، دەسلەپكى دەۋرلىك سىغىش
مىستىن گۇمانلانغان ئاغرىقلارنىڭ زەخمىلەنگەن ئورنىدىن سىغىش
سۇيۇقلۇقىنى ئىسسىق مەكروسكوپنىڭ قاراڭغۇ كۆرۈش
دا ئىسسىق تەكشۈرۈش شەرت. زۆرۈر تەپسىلاتتا، مەيلى، يۇلۇن سۇيۇقلۇقىنى تەكشۈرۈش
ۋە رېنتگېندە تەكشۈرۈش ئاساسىدا دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان
جۇلالىق نۇردا زىچ بۇرما تەنچە ئانتىبىيولىتىنى يېپىشتۇرۇش تەجرىبىسى ۋە جۇلالىق نۇردا
زىچ بۇرما تەنچە ئىممۇنىتلىق شارچە ئاقسىل M تەجرىبىسى يولغا قويۇلدى. گەرچە
ئىشەنچلىك بولسىمۇ، لېكىن تېخىچە ئومۇميۈزلۈك ئىشلىتىلمىدى.

داۋالاش: پېنتسىلىنلارنى ئۆۋەتتە سىغىلىشقا قارشى كۆڭۈلدىكىدەك دورا بولۇپ، ئۇنى يۇقىرى، داۋالاش جەريانى قىسقا ۋە زەھىرى ئاز بولۇشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە. دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى (WHO) جىنسىي كېسەللىكلەر مۇتەخەسسسلرى كومىتېتى 1981 - يىلىدىكى يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان داۋالاش پرىنسىپلىرىغا ئاساسەن، مۇھىم نۇقتىلىرىنى تۆۋەندىكىچە تونۇشتۇرىمىز: دەسلەپكى دەۋرلىك سىغىلىش كېسەلى بىلەن ئاغرىغانلارغا بېجىزاتىن پېنتسىلىن مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. ھەر تەرەپتىكى يانپاشقا $1,200,000U$ دىن جەمئى $2,400,000U$ ئوكۇل قىلىنىشلا كۇپايە. ئاخىرقى دەۋرلىك ئاغرىق-لارغا، كۈنىگە $600,000U$ دىن جەمئى 15 قېتىم ياكى ھەپتىدە $2,400,000U$ دىن جەمئى 3 قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ، لېكىن يۈرەك - قان تومۇرلار ۋە مەركىزىي نېرۋا سىستېمىدا سىغىلىش بارلارغا پروكا يىن پېنتسىلىنلاردىن ھەر كۈنى ھەر قېتىمدا $600000U$ دىن جەمئى 20 قېتىم ئىشلىتىش، ئومۇمىي مىقدارى $12,000,000U$ دىن يۇقىرى بولۇشى لازىم. دەسلەپكى دەۋرلىك تۇغما سىغىلىش بىلەن ئاغرىغان بالىلارغا بېجىزاتىن پېنتسىلىن ئىشلىتىشكە بولىدۇ. مىقدارى ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $50000U$ دىن، مۇسكۇلغا بىرلا قېتىم ئوكۇل قىلىنسا كۇپايە قىلىدۇ. ئاخىرقى دەۋرلىك تۇغما سىغىلىشنى داۋالاش ئاخىر-قى دەۋرلىك ناتۇغما سىغىلىش بىلەن ئوخشاش. ھامىلدار ئاياللار سىغىلىش بىلەن ئاغرىسا، ناتۇغما سىغىلىشنىڭ دەۋرلەرگە بۆلۈنۈشى بويىچە پېنتسىلىن بىلەن داۋالاش لازىم. داۋالاش رېئاكسىيەسىنىڭ پەيدا بولۇشىنى توسۇش ئۈچۈن، نېرۋا خاراكتېرلىك سىغىلىش ۋە يۈرەك قان تومۇرلار سىغىلىشنى، سىغىلىشقا قارشى داۋالاشتىن $3 \sim 2$ كۈن بۇرۇن، ھەر كۈنى پرىدنىزوندىن $30 \sim 20mg$ ئىچكىۈرۈش، ئەگەر رېئاكسىيە بولمىسا ياكى يېنىمىگە، ئاستا - ئاستا توختىتىش كېرەك. پېنتسىلىنغا سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كەتكەنلەرگە تېتراتسىمىلەن ياكى ئىترىترىمىتىن ئىچكىۈرۈشكە بولىدۇ، چوڭلارغا ھەر كۈنى $2g$ دىن تۆتكە بۆلۈپ ئىچكىۈرۈلىدۇ، $20 \sim 15$ كۈن بىر داۋالاش كۇرسى قىلىنىدۇ، ئومۇمىي مىقدارى $40 \sim 30g$ ، سەككىز ياشتىن كىچىك ئوغرىقلارغا تېتراتسىمىلەن ئىشلىتىشكە بولىدۇ، ئۇنى داۋامىي قىلىش رەتلىكىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ ۋە سۆڭەكلىرىنىڭ ئۆسۈشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. قاتتىق شاكىر ۋە يايلاق ھۆل سۆڭەك بولسا يەرلىك ئورۇنغا 0.5% لىك نىسبەتەن.

مەتسىن ياكى 5% لىك چۆكتۈرۈلگەن ئاق سىماب مەلھىمى سۈركەش شەرت. ئۇيۇل ماددىلىق مۇڭگۈز پەردە ياللۇغىدا كۆزىگە كۆرتىمىز كۆز دورا سۈيى تېمىتىش شەرت. دەرەخ يىلمىسىمان ئىششىغان كېسەللەرنىمۇ مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

داۋالاش ئايلاشقا ئىدىن كېيىن قەرەللىك تەكشۈرۈپ تۇرۇش، مۇبادا قايتا قوزغىلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە ئۆز ۋاقتىدا داۋالاش لازىم.

ئالدىنقى ئېلىش: ئازادلىقتىن كېيىن سىغىلىش مەملىكىتىمىزدە ئاساسىي جەھەتتىن يوقىتىلدى. نۆۋەتتە بىر قىسىم رايونلاردا يەنە ئاخىرقى دەۋرلىك ئاغرىقلار بار. ئەگەر يېڭىدىن پەيدا بولغان كېسەللەر بولسا، ۋاقتىدا ئۈزۈل - كېسىل داۋالاش ھەم يۇقۇش مەنبەسىنى تەكشۈرۈپ ئېتىقلاش، ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، تارقىلىپ كېتىشىنى توسۇش كېرەك.

28. سۆزنەك

سۆزنەك — سۆزنەك قوش شارچە باكتېرىيىسىنىڭ يۇقۇملاندۇرۇشىدىن پەيدا بولىدىغان، سۈيدۈك ئاجرىتىش، جىنسىي ئەزالاردىكى يۇقۇملۇق كېسەللىكتۇر. نۆۋەتتە بۇ كېسەل مەملىكىتىمىزدە ئاز ئۇچرايدۇ، لېكىن قىسمەن دېڭىز بويى رايونلىرىدا يەنىلا ئاز ساندا يېڭىدىن پەيدا بولغان كېسەللىكلەر مەۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا. شۇڭا، دىققەت - ئېتىبار بىلەن قوزغىتىشىمىز كېرەك.

كېسەللىك سەۋەبى: كېسەل چاقىرغۇچى باكتېرىيە سۆزنەك قوش شارچە باكتېرىيىسى گرام بويىقىدا مەنپىي بولىدۇ، ناپاك جىنسىي مۇناسىۋەت ئۇنىڭ ئاساسلىق يۇقۇش يولىدۇر. ناگاندا باكتېرىيىدىن بۇلغانغان نەرسىلەر ئارقىلىق ۋاسىتىلىق يۇقىدۇ.

كېلىنىك ئىپادىلىرى

1. ئەرلەردىكى سۆزنەك: سۈيدۈك يولىدىكى ياللۇغ ئالامەتلىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ، يوشۇرۇن دەۋرى 3 ~ 2 كۈن، يېڭى باشلانغاندا ئالدى سۈيدۈك يولى كۆيۈشۈش، سانجىپ ئاغرىش، سېگەندە كۆيۈپ ئاغرىش قاتارلىق يېقىمسىزلىقلار بولىدۇ. بىرنەچچە كۈندىن كېيىن ئارقا سۈيدۈك يولىنىڭ سىرتقى ئېغىزى ۋە قېيىقسىمان ئويما نروشن ھالدا قىزىرىپ ئىششىيدۇ ھەم ساغۇچ يېشىل يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىدۇ. سۈيدۈك يولىنىڭ سىرتقى ئېغىزى ھەمىشە چاچلىشىپ قېلىپ، ئالامەتلىرى ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ (11. 2 - رەسىم). ئەگەر ئۆز ۋاقتىدا داۋالىمىسا، تەتۈر يۇقۇملىنىپ ئارقا سۈيدۈك يولى ياللۇغىنى پەيدا قىلىپ پات - پات سىيىش، سىيىش قىيىنلىشىش، ھەتتا سۈيدۈك تۇتۇلۇش ۋە ئاخىرىدا قان سىيىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ھەمدە شارچە بەزى ياللۇغى، مەزى بەزى ياللۇغى، ئۇرۇق خالىتىسى ياللۇغى ۋە يان ئۇرۇقىدا ياللۇغى قاتارلىقلار قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئۆتكۈر ياللۇغ ۋاقتىدا داۋالاپ قايتمىسا، ھەمىشە ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ، سوزۇلما سۆزنەك كە ئايلىنىپ كېتىدۇ. شۇ چاغدا ئەتىگەندە ئورۇندىن قوپقاندا ئازراق شىلمىشىق سۇيۇقلۇقنىڭ چىقىپ قالىغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ، سۈيدۈك ئاچىلىنىپ چىقىدۇ، سۈيدۈك

يولىنىڭ ئاغرىقلىقىنى ۋە سىمىگە ئىدە يېقىملىق ھېس قىلىدۇ، غىدىقلىنىشقا ئۇچرىسا ئالامىتى ھەمىشە ئېغىرلىشىدۇ. ئەڭ ئاخىرىدا سۈيدۈك يولى تارمىقىنى يان ئۇرۇق دانغا تەسىر كۆرسەتسە، تۇغما سىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

2. ئاياللاردىكى سۆزنەك: ئاساسەن سۈيدۈك يولى ۋە بالىيا تىقۇ بويىنىغا بۆسۈپ كىرىدۇ، ئاياللارنىڭ سۈيدۈك يولى قىسقا بولغاچقا، تەتۈر يۇقۇملىنىپ دوۋساق ياللىغى پەيدا بولۇپ پات - پات سىيىش، سىيىش قىيىنلىشىش، ھەتتا قان سىيىش بارلىققا كېلىدۇ. لېكىن ھېسسىي ئالامەتلەر ئەرلەرنىڭكىدىن يېنىك بولىدۇ. تەكشۈرگەندە سىرتقى جىنسسىي ئەزا ۋە سۈيدۈك يولىنىڭ سىرتقى ئېغىزىدىكى شىلىق پەردىلەرنىڭ قىزىرىپ ئىشىشىغا ئىلھىقنى كۆرگىلى بولىدۇ، جىنسسىي يولىنىڭ ئالدى دىۋارى سۈيدۈك يولىنىڭ يۆنىلىشىگە قاراپ بېسىلغاندا، يىرىڭلىق ئاجراتمىلار سۈيدۈك يول ئېغىزىدىن ئېقىپ چىقىدۇ. سۈيدۈك يولى يان بېزى ۋە دەلىز چوڭ بېزىمۇ قىزىرىپ ئىشىشىدۇ ۋە يىرىك پەيدا بولىدۇ. ھەمىشە ئۆتكۈر شەلۋەرەش خاراكتېرلىك بالىيا تىقۇ بويىنى ياللىغى، بالىيا تىقۇ ئىچكى پەردە ياللىغى ۋە تۇخۇم ئەيچىسى ياللىغى قاتارلىقلار قوشۇلىدۇ، كېيىنكىلىرى ئىككىلىمىچى تۇغما سىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: ئۇچرىشىشتىن يۇققان تارىخى، كلىنىك ئىپادىلىرى ۋە يىرىڭدىن سۇۋالما ياساپ تەكشۈرۈشلەرگە ئاساسلىنىپ دىئاگنوز قويۇش تەس ئەمەس.

سۈيدۈك يولىنىڭ باشقا ياللىقلىرىنى چىقىرىۋېتىش شەرت، ئاساسلىقى مىكروبىئولوگىيىلىك تەكشۈرۈشكە تايانغاندىلا ئاندىن پەرقلەندۈرگىلى بولىدۇ.

داۋالاش: پېنتامىن سۆزنەكنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن تاللىنىدىغان دورىدۇر. $8000000 \sim 4000000$ دىن مۇسكۇلغا ھەر كۈنى ئىككى قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ، بەش كۈن بىرداۋالاش كۈرسى بولىدۇ. ئادەتتە ئىككى داۋالاش كۈرسى ئىشلىتىلىدۇ. ئىككى كۈرسىدىن كېيىن ئەگەر ئۇنىمى ياخشى بولمىسا، سىرتىمىتسىنى قوشۇپ كۈنىگە ئىككى قېتىم، ھەرقېتىمدا $0.5 \sim 0.25$ دىن مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىشقا بولىدۇ، ئومۇمىي مىقدارى $6 \sim 3$ ، پېنتامىنلىنىغا زىيادە سىزىمچانلىقى بار ئاغرىقلارغا سۇلفادىئازىن بىر كېچە - كۈندۈزدە $4g$ دىن تۆتكە بۆلۈپ ئىچكىزۈلىدۇ. ئومۇمىي مىقدارى $20g$ ، تېتراتسىكلېن ياكى كانامېتسىن قاتارلىقلارنى بېرىشكەمۇ بولىدۇ.

سوزۇلما دەۋرىدە باكتېرىيىگە قارشى دورىلارنى ئۈنۈم بەرمىسە، $2\% \sim 0.5\%$ لىك ئارگېنتىپروپىروتېن بىلەن سۈيدۈك يولىنى چايقاشقا بولىدۇ، ئادەتتە مىقدارى $8ml \sim 6$ ، بەش مىنۇت تۇرغۇزغاندىن كېيىن چىقىرىۋېتىش، ھەر كۈنى بىر قېتىم ئىشلىتىش كېرەك. $2\% \sim 1\%$ لىك پروكايمىننى قوشۇپ دورىنىڭ غىدىقلىنىشى ئاجىزلاشتۇرۇشىمۇ بولىدۇ. ئۆتكۈر مەزگىلدە چايقاشقا بولىدۇ.

ئالدىنقى ئېلىش پرىنسىپلىرى سېلىنىشىگە ئوخشاش.

ئون ئىككىنچى باب ھاشارقاتلار پەيدا قىلىدىغان تېرە كېسەللىكلىرى

18. قوتۇر

قوتۇر — قوتۇر سالىجىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئۇچرىشىشتىن يۇقىرىدىغان بىرخىل تېرە كېسەللىكىدۇر.

كېسەللىك سەۋەبى: قوتۇر سالىجىسى ئادەملەر تىپى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كۆپىنچە ئاغرىق بىلەن بىر ئورۇندا يېتىش، قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش قاتارلىق بىۋاسىتە ئۇچرىشىشتىن، بۇلغانغان يوتقان - كۆرپە، كىيىم - كېچەك قاتارلىقلاردىن ۋاسىتىلىق يۈزىدۇ. ھايۋانات قوتۇرى تاسادىپى ئادەملەرگە يۇقىمۇ، لېكىن ئالامەتلىرى يېنىك، كېسەللىك جەريانى قىسقا ۋاقىتلىق بولىدۇ. قوتۇر سالىجىسى ئەركەك، چىشى بولۇپ ئەركىكى جۈپلەشكەندىن كېيىن ئۆلۈپ كېتىدۇ. چىشى سالىجا ئۇرۇقلانغاندىن كېيىن تۇخۇم تۇتىدۇ. تۇخۇمى گۆدەك قۇرتتىن ئۆسۈپ يېتىلىپ يېتىلىگەن قۇرتقا ئايلىنىش ئۈچۈن تەخمىنەن 15 ~ 8 كۈن كېتىدۇ.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: يوشۇرۇن دەۋرى (ئالامەتسىز دەۋرى) تەخمىنەن 15 ~ 10 كۈن. قول بارماقلىرى ئارىسى، بىلەيزۇك — جەينەكلەرنىڭ پۈكۈلۈش تەرىپى، قولتۇق، بەل، قورساق، يوتا ئىچكى تەرىپى ۋە سىرتقى جىسمى ئەزا قاتارلىق تېرىنىڭ چۈرۈك، نېپىز ۋە قاتلىنىدىغان ئورۇنلىرى كۆپرەك زەخىملىنىدۇ. (1.12 - رەسىم).

بوۋاقلارنىڭ باش قىسمىنى چىقىرىدۇ. زەخمە كۆپىنچە تارقاق تارقالغان دۆڭچە ئەسۋە، سۇلۇق قاپارتقۇ، تونىل ۋە تۈگۈنچىلەردىن ئىبارەت. دۆڭچە ئەسۋە سۇس سېرىق، تېرىقچىلىك، سۇلۇق قاپارتقۇ يىغىنىدەك ياكى گۈرۈچتەك بولىدۇ. كۆپۈپرەك تۇرىدۇ، دۆڭچە قا - پارتقۇلۇق ئەسۋە چىقىرىدۇ. تونىل ئالاھىدە خاراكتېرگە ئىگە زەخىملىنىش، ئاچ كۈل رەڭ ياكى تېرە رەڭگىدە بولىدۇ، ئازراق كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدۇ، تۈز، ئەگرى ياكى توچكىسىمان ئۈزۈك سىزىق، تېرە جىمىقلىرى بىلەن تىك كېسىشىدۇ (2.12 - رەسىم). ئۈزۈنلۈكى نەچچە mm دىن ئون نەچچە mm غىچە، ئاخىرقى ئۇچىدا سۇلۇق قاپارتقۇ ياكى دۆڭچە ئەسۋە بار، ئۇ قوتۇر سالىجىسىنىڭ قوناغۇسىدۇر. زەكەر، خەت - نىلىك، ئۇرۇقدان خالىتىسى، چوڭ جىسمى. لەۋ قاتارلىق ئورۇنلاردا پۇرچاق چوڭلۇقىدىكى يەلتاشىمىدەك قىزىل تۈگۈنچىلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ، مەزكۇر كېسەلنىڭ ئالاھىدىلىكلىرىنىڭ بىرىدۇر (3.12 - رەسىم). قاتتىق قىچىشىدۇ، قىچىشىش بولۇپمۇ كېچىسى ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ. قاتلىمغا ئىلىقتىن ھەمىشە ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىپ، ھۆل تەم رەتكىدەك ئۆزگىرىش ياكى لىشا يىلىشلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سىلاشتۇرما دىئاگنوزى: ئۇچرىشىش تارىخى، ئەسۋە ئالاھىدىلىكى، كۆپ چىقىرىدىغان ئورنى ۋە كېچىدە قاتتىق قىچىشىش قاتارلىق ئالاھىدىلىكلىرىگە ئاساسلىنىپلا دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ. زۆرۈر تېپىلسا، قوتۇر سالىجىسىنى تەكشۈرۈپ كۆرۈشنىڭ ئېنىق

دەئاگنوز قويۇشقا ياردىمى بار. يىرىڭلىق قاپارتقۇ، ھۆل تەمرەتكە ۋە تۈگۈنلۈك قىمە چىشقاق ئەسۋە قاتارلىقلار بىلەن پەرقلەندۈرۈش شەرت. مەزكۇر بايىنىڭ ھەر قايسى پا-
راگرافلىرىغا قارالسۇن.

داۋالاش

1. سىرتقا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىل دورا دائىم ئىش-
لىتىلىدۇ:

(1) 10~20% لىك گۈڭگۈرت مەلھىمى (بالىلارغا 5% لىكى ئىشلىتىلىدۇ) ياكى 25% لىك بېنزىل بىنزوات ئىمۇلىسىمىنى سۈركىلىدۇ. دورا سۈركەشنىڭ ئالدىنقى ئاخىمىنى يۇيۇنۇش، بويۇندىن تۆۋەنكى ھەممە يەرگە سۈركەش، ئەسۋە بار ئورۇنغا كۆپ سۈركەش كېرەك. ھەر كۈنى بىر - ئىككى قېتىمدىن، ئۇدا ئۈچ قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. دورا سۈركەۋاتقان مەزگىلدە يۇيۇنۇشقا، كىيىم ئالماشتۇرۇشقا بولمايدۇ. 4-كۈنى يۇيۇنۇپ كىيىم ئالماشتۇر-سا بولىدۇ. ئالماشتۇرۇلغان كىيىم - كېچەكلەرنى قاينىتىۋېتىش ياكى كۈنگە سېلىپ سالىشنى يوقىتىش شەرت. داۋالاپ بولغاندىن كېيىن، ئىككى ھەپتە كۆزىتىش، ساقايىمغا ئىلگىرى بولسا، يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچە قايتا داۋالاش لازىم.

(2) 40% لىك ناترىي تېپىئۇ سۇلفات ئېرىتمىسىنى سۈركىسىمۇ بولىدۇ. 10 مىنۇتتىن كېيىن 4% تۇز كىسلاتا ئېرىتمىسىنى سۈركەش، ھەر كۈنى بىر - ئىككى قېتىمدىن ئۇدا ئۈچ كۈن ئىشلىتىلىدۇ. دورا ئىشلىتىشنىڭ ئالدى - كەينىدىكى بىر تەرەپ قىلىش يۇقىرىقى بىلەن ئوخشاش.

(3) 1% لىك لىندەن زىماتى (1% لىك بىنزىن ھېكسا كلورىد) نىڭ قىچىشقاق سالى-جىمىنى ئۆلتۈرۈش تەسىرى نىسبەتەن كۈچلۈك بولۇپ، بىر قەدەر كۆڭۈلدىكىسىدەك قىچىشقاق سالىجىمىغا قارشى دورا. لېكىن كۆپ مىقداردا شۇمۇرۇۋېلىنسا، مەركىزىي نېر-ۋا سىستېمىسىنى زەھەرلىشى مۇمكىن. شۇڭا بالىلار، ھامىلدار ئاياللار ۋە تېرىسى كەڭ كۆلەمدە زەخمىلەنگەنلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش، دورا سۈركەشتىن بۇرۇن يۇيۇنۇش، بىرلا قېتىم (تەخمىنەن 10~20g) سۈركەش لازىم، دورا سۈركىلىپ 24 سائەت-تىن كېيىن يۇيۇنۇپ كىيىم ئالماشتۇرسا بولىدۇ. باشقا بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلى يۇقىرى-قىغا ئوخشاش.

2. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ئەگەر ئېغىر دەرىجىدە ئىككىلەمچى يۇقۇملان-غان بولسا، بىرلا ۋاقىتتا دورا بېرىش شەرت. تېرە ئەسۋىسى كەڭ دائىرىدە قاتتىق قىچىشقانلارغا، ھىستامىنغا قارشى دورىلارنى قوشۇپ بېرىش لازىم.

3. ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپلىرى: ئاغرىقلارنى ئايرىپ داۋالاش، كىيىم - كېچەكلە-رىنى دېزىنفىكسىيە قىلىش - قوتۇرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئاساسىي تەدبىر دۇر.

2. ھاشارات مەنبەلىك تېرە ياللۇغلىرى

ھاشارات مەنبەلىك تېرە ياللۇغلىرى ھاشاراتلار بىلەن ئۇچرىشىشتىن پەيدا بولى-دىغان تېرە ياللۇغۇق رېئاكسىيىسىدۇر. كېسەللىك مەخا ئىزىمى، چېقىپ زەخمىلەندۈرۈش ۋە يات ماددىلارنىڭ رېئاكسىيە قىلىشىدىن باشقىلىرى، ئۇچرىشىش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغىنىڭكى بىلەن ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشاش.

گېلىنىك ئىپادىلىرى: يوشۇرۇن قاناتلىق قۇرت مەنبەلىك تېرە ياللۇغى: يوشۇرۇن قاناتلىق قۇرت بىلەن ئۇچرىشىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. يوشۇرۇن قاناتلىق قۇرت - رەڭگى قارا، چۈمۈلە شەكىللىك بىر خىل قوڭغۇز بولۇپ، ياز، كۈز پەسىللىرىدە تۇغىدۇ، كۈندۈزى ئوت - چۆپ ۋە تاشلارنىڭ ئارىلىقلىرىغا يوشۇرۇنۇۋالىدۇ، كېچىسى ھەرىكەتلىنىدۇ، يورۇقلۇققا ئىنتىلىدۇ، ئادەم بەدىنىگە قونغاندا ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلسە، بەدىنىدىكى زەھىرى ($pH 1 \sim 2$) تېرىنى غىدىقلاپ، ياللۇغلىنىش رېئاكسىيىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تېرە ئۈستى ھەمىشە ئەتىسى ئەتىگەندە پەيدا بولىدۇ. ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن يەردىكى تېرىدە تال - تال، سۇلۇق ئىشىشىغان، توق قىزىل داغ ئۈستىدە دۆڭچە ئەسۋە، سۇلۇق قاپارتقۇۋە كىچىك بىرىڭلىق قاپارتقۇلار بولىدۇ. بەزىلىرىنىڭ مەركىزى تانايىسىمان قارامتۇل قورغۇر رەڭلىك نېكرىزلىنىدۇ ($4.12 -$ رەسىم)، كۆيگەندەك ھېس قىلىدۇ، ئېغىرلىرى قاتتىق ئاغرىيدۇ، رېئاكسىيىسى كۈچلۈك بولغانلاردا باش قېيىش، قىزىش قاتارلىق پۈتۈن بەدەننىڭ ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ. ئادەتتە $1 \sim 2$ ھەپتىدىن كېيىن يوقىلىپ، ۋاقىتلىق پېگمېنت ئۆلتۈرۈشۈپ قالىدۇ.

2. ئۈچمە مىتسى ۋە تۈكلۈك قۇرت مەنبەلىك تېرە ياللۇغى: ئۈچمە مىتسى ۋە تۈكلۈك قۇرتنىڭ ھەر ئىككىسىلا ئىككى خىل كېيىنەكنىڭ لىچىنىكىسى بولۇپ، ياز - كۈز پەسىللىرىدە راسا كۆپىيىدۇ، ئۇلارنىڭ زەھەرلىك مويى تېرىگە سانجىلغاندىن كېيىن، تېرە ياللۇغلىنىش رېئاكسىيىسىنى پەيدا قىلىدۇ. بويۇن كەينى، قۇلاق تەرىپى، مۇچە ۋە گەۋدىنىڭ ئوچۇق قىسىملىرىغا كۆپرەك چىقىدۇ، ئەگەر زەھەرلىك تۈكلەرنى ئىچكى-يىمىلەرگە يېپىشىۋالسا، چوڭ دائىرىدە زەخمىلەندۈرىدۇ. ئادەتتە زەھەرلىك مويىغا ئۇچراشقاندىن كېيىن، نەچچە مىنۇت، نەچچە سائەت ئىچىدە شۇ ئورۇنغا تېرىق ياكى گۈرۈچ چوڭلۇقىدا قىزىل ئەسۋە چىقىدۇ. ئوتتۇرىسىدا يىڭىندەك قان قېيىش دېغى، بەزىدە سۇلۇق قاپارتقۇ بولىدۇ، سۇلۇق قاپارتقۇ ياكى يەلتاشمىدەك زەخمىلىنىدۇ، قاتتىق قىچىشىدۇ، بولۇپمۇ كېچىدە شۇنداق. قىسمەن رېئاكسىيىسى كۈچلۈك لەردە ھەتتا باش ئايلىنىش، باش ئاغرىش، تۆۋەن قىزىتما قاتارلىق پۈتۈن بەدەن يېتىمىزلىنىش ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ، تەخمىنەن $1 \sim 2$ ھەپتىدە ساقىيىدۇ.

3. باشقا ھاساراتلار مەنبەلىك تېرە ياللۇغى: پاشا، چۇسا، بۈرگە ۋە سالجا قاتارلىقلارنىڭ چېقىۋېلىشى، يەرلىك ئورۇندا ياللۇغلىنىش رېئاكسىيىسىنى پەيدا قىلىدۇ، دائىم كۆرۈلىدىغان تېرە ئەسۋەلىرىدىن دۆڭچە ئەسۋە، دۆڭچە قاپارتقۇلۇق ئەسۋە، سۇلۇق قاپارتقۇ، چوڭ قاپارتقۇ، قان قېيىش دېغى، قانلىق قاپارتقۇ ياكى يەلتاشما قاتارلىق زەخمىلىنىشلەر بولىدۇ، ئەڭ تىپىكلىرىدە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئەسۋەلىرىنىڭ مەركىزىدە يىڭىنە ئۈچى چوڭلۇقىدا چېقىۋالغان تاتسۇق بولىدۇ ($5.12 -$ رەسىم). يەرلىك ئورۇن قىچىشىدۇ، ئەگەر ئىككىلەمچى يۇقۇملانمىسا، كۆپىنچە نەچچە كۈن ئىچىدە ئۆز-ئارا لۈكىدىن يوقىلىپ كېتىدۇ، تارتۇق قالىدۇ، بەزىدە ۋاقىتلىق پېگمېنت چۆكىدۇ.

دىئاگنوزى: تېرە ئەسۋەلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكى، كۆپ پەيدا بولىدىغان ئورنى ۋە پەسلى قاتارلىقلارغا ئاساسلانغاندا دىئاگنوز قويۇش قىيىن ئەمەس.

داۋالاش: چېقىۋېلىنغان ئورۇنغا ئالدى بىلەن سۇپۇن سۈيى، 4% لىك ئامياك سۈيى ياكى 10% ~ 5% لىك ناترىي ھىدروكسىد رېتېنسىيىسى سۈركەپ، ئاندىن 1% لىك

مىنتول كالا مىن سۇيۇقلۇقى ياكى قىچىشىنى ئوختىتىش سۇيۇقلۇقى قاتارلىقلار سۈرگىلىدۇ. ئۆتكۈر ياللىغۇ روشەن بولمىغانلارغا، كورتمكوستروئىد زىماتىنى سۈركەشكە بولىدۇ. ئەگەر تۈكلۈك قۇرت مەنبەلىك تېرە ياللىغۇ بولسا، ئالدى بىلەن پلاستىردا زەھەرلىك مويلىرىنى يېچىشتۇرۇپ چىقىرىۋېتىپ، ئاندىن كېيىن يۇقىرىقى ئۇسۇلدا داۋالا-لاش لازىم. ئەگەر شەلۋەرەپ سۇيۇقلۇق سىرغىپ قالغان بولسا، 0.1% لىك رېۋانول ئېرىتمىسىنى ھۆل كومپرىس قىلىشقا بولىدۇ. نىسبەتەن قاتتىق قىچىشقان ياكى پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كەلگەن ئاغرىقلارغا، ھىستامىنغا قارشى دورا، ۋىستا مىن C ياكى كالىتسىي ياساللىملىرىنى قوشۇپ بېرىپ، زۆرۈر تېھپىلغاندا يەنە كورتمكوستروئىدلىق دورىلارنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

38. پىتلاش كېسىلى

پىت — باش پىتى، كىيىم پىتى ۋە دوۋسۇن پىتى دەپ بۆلۈنۈپ، ئايرىم - ئايرىم ھالدا چاچ، ئىچ كىيىم ۋە دوۋسۇن تۈكلەرىدە پارازىتلىنىدۇ، بىۋاسىتە ۋە ۋاسىتىلىق ئۇچرىشىشتىن تارقىلىدۇ. پىت قان شۈمۈرگەندە، ئېغىزنىڭ مېخا يىنىك غىدىقلىشى ۋە زەھىرىنىڭ تەسىرىدە، قىچىشقا قىلىق تېرە ياللىغۇ كېلىپ چىقىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كىيىم پىتى يەنە ئەسۋىلىك كېزىك ۋە قايتۇرما كېزىك قاتارلىق كېسەللىكلەرنى تارقىتىدۇ.

كىلىك ئېپادىلىرى: تېرە ئەسۋىسى كۆپىنچە توچكىسىمان قىزىل داغ، قان قېيىش تىچكىسى، دۆڭچە ئەسۋە ياكى تاشبا بولۇپ، قاتتىق قىچىشىدۇ، ھەمىشە تاتىلىغان ئىز، قانلىق قاقچ ۋە ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ، باش تېرىسى ۋە دوۋسۇن دۆڭچىسىدە يەنە ھۆل تەمرە تىكىدەك ئۆزگىرىش پەيدا بولىدۇ. چاچ كىرىلىشىپ چىكىشىلىپ شىپ، تاناپقا ئوخشاپ كېتىدۇ، سېسىق پۇرايدۇ، چاچ غولىنىڭ بىر تەرىپىگە سىركە چاپ - لىنىشۋالىدۇ. چاچ، كىيىم تىكىشىلىرى ۋە يوتقان - كۆرپە قاتارلىقلاردىن پىت تاپقىلى بولىدۇ.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش: باش پىتى بىلەن دوۋسۇن پىتىنى يوقىتىشتا، تۈكلەرنى قىرغىپ، ئاندىن دورا سۈركەش شەرت، ئاياللاردا باش پىتى بولۇپ، چېچىنى چۈشۈرۈۋېتىش ئەپسىز بولسا، 5% لىك سىتېمونا تىنىمىكتۇرىنى ھەر كۈنى بىر قېتىم، باش تېرىسى ۋە تۈكلەرگە سۈركەپ، ئاندىن لۆڭگە بىلەن ئوراش، ئۈچ كۈندىن كېيىن باشنى يۇيۇش، 4 -، 5 - كۈنلىرى يىللىمان سىركە ياكى 10% لىك سىركە كىسلاتاسىنىڭ ھەرقايسىسىنى بىر قېتىم سۈركەش ھەم زىچ چىشلىق سۈزگۈچ بىلەن سىركىسىنى سۈزۈ - ۋېتىش كېرەك. 1% لىك لىندەن ئىمولىسىمىسى ياكى 0.2% لىك دىغلورو بېنىزىن ئېپتېر ئىنول ئىستىم سۈركەشكە بولىدۇ. تېرە زەخىملىنە كالا مىن سۇيۇقلۇقى ياكى قىچىشقا توختا تەۋجى سۇيۇقلۇق، ئىككىلەمچى يۇقۇملانسا 0.5% ئېپترومىتسىن مەلۇمىنى سۈركەش لازىم. شەخسىي تازىلىق ۋە مۇھىت تازىلىقىنى ياخشى ئىشلەش، بالىلار كوللېكتىپلىرىدا ئەڭ ياخشى كوللېكتىپ پىت يوقىتىپ، ئاغرىق كىيىگەن كىيىملەرنى قاينىتىش كېرەك.

ئون ئۈچىنچى باب فىزىكا - خىمىيە ئامىلىرى مەنبەلىك تېرە كېسەللىكلىرى

فىزىكا - خىمىيە ئامىلىرى مەنبەلىك تېرە كېسەللىكلىرى - مېخانىكا، تېمپېراتۇرا، نۇر ياكى بەزى خىمىيەلىك ماددىلار (ياغسىزلاندۇرغۇچى ياكى سۇ شۇمۇرگۈچى) قا- تارلىق بەزى فىزىكىلىق ۋە خىمىيەلىك ئامىللار پەيدا قىلغان بىر خىل تېرە كېسەللىك- لىرىنى كۆرسىتىدۇ. تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىلى كۆپ كۆرۈلىدۇ:

18. نۇر سەزگۈرلۈكى پەيدا قىلىدىغان تېرە كېسەللىكلىرى

نۇر سەزگۈرلۈكى پەيدا قىلىدىغان تېرە كېسەللىكلىرى - مەلۇم قوزغا تىقۇچى ئامىل- لارغا نۇرنىڭ تەسىر قىلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان تېرە كېسەللىكلىرىدۇر. **كېسەللىك سەۋەبى:** مەزكۇر كېسەلنىڭ سەۋەبى ۋە تۈرلەرگە بۆلۈنۈشىگە بولغان پىكىرلەر ھازىرغىچە بىردەك ئەمەس، ئادەتتە تەسىر قىلغۇچى سىمپىكتىر، نۇرغا سەزگۈر ماددىلار، ئورگانىزم ئەھۋالى ۋە مۇھىت شارائىتى قاتارلىقلارنىڭ ئورتاق تەسىرى ئاستىدا پەيدا بولىدۇ دەپ قارىلىدۇ.

1. تەسىر قىلغۇچى سىمپىكتىر: ئادەتتە $285 \sim 450nm$ ئارىلىقىدا بولىدۇ، نۇر ئاللى- گىمىسىنىڭ تەسىر قىلىش سىمپىكتىرى ئاساسەن ئۇزۇن دولقۇنلۇق ئۇلترىا بىنەپشە نۇرىدۇر. 2. نۇرغا سەزگۈر ماددىلار: لىويلا كۆكتات، قىزىل بۇغداش، زىيۇنىڭ، پاستاق قۇلۇلىسى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى نۇرغا سەزگۈر ماددىلار دەپ قارىلىدۇ. لېكىن پى- كىر ئانچە بىردەك ئەمەس. جۇڭگىي دورىلىرىدىن جىن كېۋىزى (تەركىمدە قۇرۇك ئۇما- ردىن بار)، داغۇرداڭگۈيى ۋە سېدرومىد، ئاياللىق ھورمون، سۇلفانىلامىد، فېنوتسىازىن، ۋىنتېرمىنىگە ئوخشاش دورىلار، شۇنداقلا ئاسفالىت قاتارلىقلار چوقۇم نۇرغا سەزگۈرلۈك پەيدا قىلىدۇ.

3. ئورگانىزم ئەھۋالى: ئورگانىزمنىڭ نۇر رېئاكسىيىسىگە سەزگۈرلۈكىنىڭ ئېشىپ كېتىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن.

4. مۇھىت شارائىتى: ھاۋارايى ۋە پەسىللەرنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرۇشىمۇ، كېسەل قوز- غىلىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.

كېسەل قوزغىلىش مېخانىزمىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن، ئادەتتە نۇردىن زە- ھەرلىنىشلىك، نۇر ئاللىرىگىچە تەسىرلىك ۋە فېر مېنت ئاكتىپلىشىش رېئاكسىيىسىدىن ئىبار- رەت ئۈچ خىلغا بۆلۈنىدۇ:

كېسەللىك ئىپادىلىرى: تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىلى نىسبەتەن كۆپ ئۇچرايدۇ:

1. نىكوتمىن كىسلاتاسى يېتىشمەسلىك كېسەلىدەك زەخىملىنىش: مەھلىكىتىمىز پرو- فېسسورى يۇي گۇاڭيۈەن 1935- يىلىدىن باشلاپ بۇنى ئىنچىكىلەپ تەتقىق قىلىشقا باشلى- غان. مەزكۇر كېسەل ئوتتۇرا ياش ۋە ياش ئاياللاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. ئۇنىڭ پەيدا

بولۇش مېخانىزمى نۇردىن زەھەرلىنىش رېئاكسىيىسىگە مەنسۇپ بولۇشى مۇمكىن، كۆچە-
لۈك كۈن نۇرىغا قاتناغاندىن كېيىن يۈز، قول دۈمبىسى قاتارلىق ئورۇنلاردا تۇيۇقسىز
قوزغىلىدۇ. يېمىلما، قاتتىق سۇلۇق ئىششىقلىق، بىشەپشە رەڭلىك زەخمىلىنىدۇ، مەركىزىدە
ھەممەشە چوڭ قاپارتقۇ، قان قايغان نۇقتا ۋە داغ بولىدۇ، ئېغىرلىرىدا نېپىرۈزلىنىدۇ
ۋە يارىلىنىدۇ. تىرىناق ئاستى قىلىق قان تومۇرلىرىنىڭ كېڭەيگەنلىكىنى ۋە قان
قايغان نۇقتىلارنى كۆرگىلى بولىدۇ، كېسەللىك تېز تەرەققىي قىلىدۇ. قاپاق ۋە كالى-
چۇكلار قاتتىق ئىششىقچا، ھەممەشە كۆز بۇمۇلۇپ قالىدۇ، ئاچالمايدۇ، كالىچۇكلرى ئۆ-
رۈلۈپ، ئېغىز ئېچىش قىيىنلىشىدۇ (13. 1 - رەسىم)، چىڭقىلىپ ئاغرىيدۇ ياكى كۆيىشى-
دۇ. ئېغىرلىرىدا قىزىش، باش ئاغرىش، چارچاش قاتارلىق پۈتۈن بەدەنلىك رېئاكسى-
يىلەر كۆرۈلىدۇ. سۇلۇق ئىششىق بىر ھەپتە ئەتراپىدا يىلىنىدۇ، يارىنىڭ ساقىيىشى بەك
ئاستا بولىدۇ. يىل ئۆرۈلۈپ قايتا قوزغىلىدىغانلار دائىم دېگۈدەك كۆرۈلىدۇ.

2. كۆپ شەكىللىك كۈن نۇرى ئەسۋىسى: ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. دائىم بالاغەت-
كە يەتكەن دەۋردىن باشلاپ پەيدا بولىدۇ. ئېھتىمال نۇر ئاللىركىمىسىلىك رېئاكسىيە
بولۇشى مۇمكىن. ئەسۋە كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ، ھۆل تەمرەتكە، يەلتاشما ياكى بۆرە-
چاقسىدەك، ئاز ساندىكىلىرى ئارىلاشما تىپلىق بولىدۇ. ئوچۇق ئورۇنلارغا كۆپرەك چى-
قىدۇ، قىچىشىدۇ، كېسەللىك جەريانى سوزۇلما بولۇپ، كۈنگە قاتناغاندىن كېيىن ئېغىر-
لىشىدۇ، قىش پەسلىدە يېنىمىكلەپ قالىدۇ ياكى يوقىلىدۇ، بىر نەچچە يىلدىن كېيىن ئاستا-
ئاستا ساقىيىپ كېتىدۇ، قايتا-قايتا قوزغىلىپ سوزۇلماغا ئايلىنىپ كېتىدىغانلىرىمۇ بار. دولقۇن
ئۇزۇنلۇقى $320nm$ دىن تۆۋەن تېرىگە تەسىر كۆرسىتىلەيدىغان ئۇلترا بىشەپشە نۇرى بى-
لەن نۇرغا سەزگۈرلۈك سىنىقى ئىشلىگەندە، مۇسپىي نەتىجىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

3. دورا ئەسۋىسى شەكىللىك تېرە ئەسۋىسى: بەزى دورىلارنى ئىچكەندىن كېيىن
ماددا ئاللىشىشنىڭ مەلۇم ھالقىلىرىغا تەسىر كۆرسىتىپ، فېرمېنت ئاكتىپلىقىنى كۈچەيت-
تىش بىلەن قىسمەن نۇرغا سەزگۈر تېرە كېسەللىكلىرى (پورپورىن كېسەلى) نى پەيدا قىلىدۇ
ياكى ئۇلارنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ئالاھىدىلىكى: نۇر چۈشكەن ئورۇندا تېرە ياللۇغلى-
نىش رېئاكسىيىسى پەيدا بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇپ، قىزىل داغ، سۇلۇق ئىش-
شىق، دۆڭچە ئەسۋە ياكى سۇلۇق قاپارتقۇلار چىقىشتەك ئىپادىلىرى كۆرۈلىدۇ، پورپورىن كې-
سىلى شەكىلىدەمۇ پەيدا بولىدۇ. دورا ئەسۋىسى سۆزلەنگەن بايتا بايان قىلىپ ئۆتۈلگەن.

دېئاگنوزى: پەسىل، تېرە ئەسۋىسىنىڭ ئالاھىدىلىكى، ئورنى ۋە كۈن نۇرى
ئامىلىغا ئاساسلانغاندا ئادەتتە دېئاگنوز قويۇش ئانچە قىيىن ئەمەس، زۆرۈر تېخنىكا
نۇرغا سەزگۈرلۈك سىنىقى ئىشلەشنىڭ دېئاگنوزنى ئىنىقتاشقا ياردىمى بولىدۇ. مەزكۇر كې-
سەل بىلەن نىمكوتىن يېتىشمەسلىك كېسەلىنى پەرقلەندۈرۈش شەرت، كېيىنكىسىدەمۇ ئوچۇق
ئورۇنلاردا قاتتىق سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، لېكىن ئىچى ئۆتۈش ۋە چىرايى سو-
غۇقلىشىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ، نىمكوتىن كىسلاتاسى بەرگەندىن كېيىن ئالامەتلىرى روشەن
ھالدا ياخشىلىنىشقا يۈزلىنىدۇ، مۇشۇنىڭغا ئاساسەن پەرقلەندۈرگىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن
باشقا يەنە كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ ۋە بۆرە چاقىسىنى چىقىرىۋېتىش شەرت. مەزكۇر
بايتا بايان - ئايرىم - ئايرىم قىلىندى;

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. ئىچىدىن بېرىلىدىغان دورىلار: ۋىتامىن B گۈرۈپپىسى، ۋىتامىن C ۋە ھىستامىنغا قارشى، بېرىلىدۇ. ئېغىر كېسەللەرگە كورتىكوستېروئىد بېرىلىدۇ. نېفىزىمى يېتىشمەسلىك كېسىلىدە ئۆزگىرىش بار كېسەللەرگە سۈيۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى ئىچكۈ-زۇپ سۇلۇق ئىشلىتىش يېنىمىلىتىش كېرەك. كۆپ شەكىللىك كۈن نۇرى ئەسۋاسىگە گىرىپتار بولغانلارغا ھەر كۈنى تالىدومىدىن $300mg \sim 50$ دىن، ئۇدا ئىككى ئۈچ ئاي بېرىشكە بولىدۇ، لېكىن ھامىلدار ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ ۋە ياكى خىلوروكۋىمىدىن ھەر كۈنى ئىككى، ئۈچ قېتىم بېرىپ، ئالامىتى كونترول قىلىنغاندىن كېيىن بالداقمۇ بالداق تۆۋەنلىتىپ، ھەر كۈنى بىر قېتىمدىن بېرىش لازىم.

2. سىرتتا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: يەرلىك ئورۇننىڭ ئەھۋالىغا ئاساسلىنىپ مۇۋاپىق ياسالغىلارنى تاللاش لازىم.

3. ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپلىرى: نۇرغا سەزگۈر ماددىلار بىلەن ئۇچراشما سىلىق؛ ئوچۇق ھاۋادىكى چېنىتىشلارغا مۇۋاپىق قاتنىشىپ نۇرغا بولغان چىدا مېچانلىقىنى پەيدىن-پەي يۇقىرى كۆتۈرۈش؛ تىتىنى دىئوكسىد زىماتى ياكى پارا-ئامىنو بېنزوئىك زىماتى قاتارلىق كۈن نۇرىنى توسقۇچى ياسالغىلارنى سۈركىسە ياخشى ئاسراش رولىنى ئوينايدۇ.

28. يازلىق تېرە ياللۇغى

يازلىق تېرە ياللۇغى — ياز، كۈز پەسلىلىرىدە پەيدا بولىدىغان، قىچىشىش ۋە زىچ ئۇششاق دۆڭچە ئەسۋىنى ئاساس قىلىدىغان بىر خىل تېرە كېسەللىكىدۇر. كېسەللىك سەۋەبى: ياز، كۈز پەسلىلىرىدە تېمپېراتۇرا، نەملىك يۇقىرى بولۇش-كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى مۇھىم ئامىللاردۇر.

كامىلىك ئىپادىلىرى: ھەممە يازنىڭ ئاخىرى، كۈزنىڭ بېشىدا چوڭلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئەسۋە مۈچىلەرنىڭ تۈزلىمىدىغان تەرەپلىرىگە كۆپرەك چىقىدۇ، بولۇپمۇ پۇت-لاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ، سىمىمىتىرىك تارقىلىدۇ، ئېغىرلاشقاندا بەل، قورساق، پوتا قاتارلىق ئورۇنلارغا ئۆتىدۇ. تېرە ئەسۋىسى — قىزىل داغ ئۈستىگە چىققان زىچ ئۇششاق دۆڭچە ئەسۋىلەر ياكى دۆڭچە قاپارتقۇ ئەسۋىلەردۇر. نەسبەتەن قاتتىق قىچىشىدۇ، دائىم تاتلىمىغا ئىدىكى ئىمزالار ۋە قانلىق قاچالار قوشۇلىدۇ، كېسەللىك جەريانى ئاستا بولىدۇ، تېمپېراتۇرىنىڭ تۆۋەنلىشىگە ئەگىشىپ ئاستا-ئاستا يېنىمىكلەيدۇ ياكى يوقىلىپ كېتىدۇ، لېكىن ھەر ياز، كۈز پەسلى كەلگەندە ئاسانلا قايتا قوزغىلىدۇ.

دىئاگنوزى: ئەسۋە شەكىلىنىڭ ئالاھىدىلىكى، كۆپرەك چىقىدىغان ئورنى ۋە پەسلىگە ئاساسلىنىپ دىئاگنوز قويۇش قىيىن ئەمەس.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: سىمپىروھىمپىتادىن ياكى خىلورفېنىرامىن قاتارلىق ھىستامىنغا قارشى دورىلارنى ئىچكۈزۈشكە بولىدۇ، كالىتسىي ياسالغىلىرى ۋە ۋىتامىن C لارنىمۇ تاللاپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

2. سىرتتىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: قوغداش، قۇرۇتۇش، تازىلاش ۋە قىچىشىشنى

توختىتىش پرىنسىپ قىلىنىدۇ. ئاتىلاش، ئىسسىق سۇدا يۇيۇش قاتارلىق غىدىقلىنىشلار دىن ساقلىنىش شەرت. سىرتقا ئىشلىتىلىدىغان دورىلاردىن كالامىن سۇيۇقلۇقى ياكى باشقا قورىغۇچى، قىچىشىنى توختاتقۇچى ياسالما لار ئاساس قىلىنىدۇ. كورتىكوستروئىد مەلھىمىنى ئارىلاپ ياكى ئالماشتۇرۇپ ئىشلىتىشكەمۇ بولىدۇ.

3. ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپلىرى: تومۇز ئىسسىق پەسىللىرى خىزمەت ۋە تۇرمۇش مۇھىتىنى ئىمكانقەدەر ياخشىلاش، شامال ئۆتۈشۈپ تۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش لازىم. كىيىم - كېچەكلەر كەڭ - كۈشادە بولۇشى، ھاۋا ئۆتكۈزۈشى ياكى سۇ شۇمۇرۇشى ياخشى راق رەختلەردىن كىيىم - كېچەك كىيىپ، تېرىنىڭ غىدىقلىنىشىنى ئازايتىش كېرەك.

3.3. ئۇششۇك

ئۇششۇك — تۆۋەن تېمپېراتۇرا ئامىلى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يەرلىك تېرە قان تومۇرلىرىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشىدۇر. كۆزىتىشلەرگە ئاساسلانغاندا، 0°C ئەتراپىدا يۈز بەرگەنلىرى تۆۋەن تېمپېراتۇرىنىڭ زەخمىلەندۈرۈشىگە تەۋە بولىدۇ، دەسلەپكىدە تېرىدىكى قان تومۇرلار قىسقىرىدۇ، شۇنىڭغا ئەگىشىپلا پالە چىلىنىپ كېتىدۇ، ئەڭ ئاخىرىدا يەرلىك ئورۇندا قان ئۇيۇش ۋە سۇيۇقلۇق سىرغىپ چىقىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؛ بىراق 12°C — ئەتراپىدا يۈز بەرگەن بولسا، تۆۋەن تېمپېراتۇرىلىق ئامىللار كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاللىبىرگىيە بولىدۇ.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: سوغۇق پەسىللەردە ئاسان يۈز بېرىدۇ. دەسلەپكىدە يەرلىك ئورۇن تاقىرىپ قان قاچىدۇ، تېرە تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلەيدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن قان قېيىپ، جىگەر رەڭلىك سۇلۇق ئىششىقلىق داغ پەيدا بولىدۇ، باسما رەڭسىز يوقىلىدۇ، قويۇپ بەرگەندىن كېيىن رەڭسىز نىسبەتەن ئاستا قايتىدۇ، ئېغىر بولسا چوڭ قاپارتقۇ ۋە ئېكروزىلىنىش كېلىپ چىقىدۇ؛ ئاللىبىرگىيە مەنسۇپلىرى ھەمىشە كۆپ شەكىللىك قىزىل داغدەك زەخمىلىنىدۇ. قول - پۇت بارماقلىرىنىڭ دۈمبە تەرەپلىرى، قول دۈمبىسى، پۇت گىرۋىكى، تاپان، قۇلاق سۇپۇرىسى، قۇلاق يۇمشىقى، بۇرۇن ئۇچى، مەنىز قاتارلىق ئاخىرقى ئۇچلار ئاسان ئۇششۇيدۇ، ئازراق ئاغرىيدۇ. ئىسسىقلىق ئۇچرىسا قىچىشىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ، ھاۋا ئىسسىقلىقىدىن كېيىن ياخشىلىنىدۇ، لېكىن سوغۇق ئۇچىدا قان قوزغىلىدۇ. ساقايغاندىن كېيىن ۋاقىتلىق يېڭىمەن ئولتۇرۇشىدۇ.

دىئاگنوزى: قىش پەسلىدە قوزغىلىشى، زەخمىلىنىش ئالاھىدىلىكى، ئاخىرقى ئۇچلاردا بولىدىغانلىقى ۋە ھېسسىي ئالامەتلىرىگە ئاساسلىنىپلا دىئاگنوزنى مۇقىملاشتۇرغىلى بولىدۇ.

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش: دەسلەپكى دەۋرىدە قان قاينان قىزىل داغ پەيدا بولغاندا ئۇۋىلاپ بېرىش ياكى 10% لىك كامفورا ئىسپىرتى، 10% لىك ئىختىمۇل مەلھىمىنى سۈركەپ قان ئايلىنىشىنى ياخشىلىسلا بولىدۇ. ئەگەر تېرىسى بۇزۇلغان بولسا، جارا-ھەتلىك نەگەن ئورۇننى قوغداش كېرەك، ھەر كۈنى بىر قېتىمدىن ئەڭلىك ئوت مېيلىق داكا چاپاسا بولىدۇ. ئۇلاردىن باشقا كۈنىگە ئۈچ قېتىم ئىنكوتاسىدىن $0.18 \sim 0.05$ ، ئاللىبىرگىيەگە مەنسۇپلارغا شۇنىڭ بىلەن بىللە ھېستامىنغا قارشى دورىلارنى بېرىشكە

بولىدۇ. گېلىي - ئېئونلۇق لازېرنۇرىنى يارا يۈزىگە چۈشۈرۈپ بەرسە ئۇنىۋى ئىسسىپ تەن ياخشى بولىدۇ. ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى زىچىستان قىش پەسلىدە ئىسسىق يۈرۈشكە دىققەت قىلىش، ھەرىكەتنى كۈچەيتىش، يەرلىك ئورۇنلارنىڭ قان ئايلىنىشىنى تېزلىتىش قاتارلىق ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش لازىم.

48. قول - پۇتلار يېرىلىش

قول پۇتلار يېرىلىش - قول - پۇتلار ئۇزۇن ۋاقىت سوغۇق شامال، كۈن نۇرى ۋە نەم مۇھىتتا ئوچۇق تۇرۇش ياكى دائىم كىسلاتا - ئىشقار، ياغسىزلاندۇرغۇچى ۋە يا - كى شۇمۇرگۈچى ماددىلار بىلەن ئۇچرىشىپ تۇرۇشتىن كېلىپ چىقىدۇ. زامبۇرۇغلاردىن يۇقۇلمىش قاتارلىق ئامىللار سەۋەبىدىن تېرە قۇرغاقلىشىپ، قېلىنلاپ، ئېلاستىكىلىقىنى يوقىتىشقا مېخانىك سوزۇلۇش ۋە سۈركىلىش قوشۇلۇشىنىمۇ پەيدا بولىدۇ.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: دېھقانلار، بېلىقچىلار ۋە قۇرۇلۇش ئىشچىلىرىدا، قىش پەسلىدە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭدىكى زەخمىلىنىش - تېرە سىزىقچىلىرى بىلەن ئوخشاش بۇ - لۇنۇشلۇك، چوڭقۇر - تېپىزلىكى، ئۇزۇن - قىسقىملىقى ئوخشاش بولمىغان يېرىقتىن ئىبارەت. تېپىزلىرى يۈزەكى تېرىدىلا چەكلىنىدۇ، قانمايدۇ ۋە ئاغرىمايدۇ، چوڭقۇرلىرى ھەقىقىي تېرە ياكى تېرە ئاستىغا يېتىپ بارىدۇ ھەم قاناپ ئاغرىيدۇ، تۇتۇشقا ۋە مېڭىشقا تەس كۆرسىتىدۇ. يېرىق ئەتراپىدىكى تېرە قۇرۇيدۇ، يىرىكلىشىدۇ ۋە قېلىنلاپ ئېلاستىكىلىقىنى يوقىتىدۇ. ئالغان، بارماق ئۇچلىرى، تاپان ۋە پۇت ئەتراپلىرىدا كۆپ بولىدۇ (13، 2-رەسىم).

داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش: ئادەتتە 10% ~ 5% لىك سالتىسىيلىك كىسلاتا مەلھىمى ياكى 20% ~ 10% لىك ئورېئا زىماتى ئىشلىتىشكە بولىدۇ. قېلىن يېرىقلارنى ئالدى بىلەن قىزىق سۇغا چىلاپ، ئاندىن پىچاق بىلەن قىرىپ، ئارقىدىن يۇقىرىدا بايان قىلىنغان دورىلارنى سۈركەش لازىم. ئەگەر يېرىق بەك چوڭقۇر بولسا، پلاستىرلىق مەلھەمنى چاپلاپ، ياخشىلانغاندىن كېيىن دورا ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر زامبۇرۇغلار كەلتۈرۈپ چىقارغان بولسا، زامبۇرۇغ كېسىلىنىمۇ بىرگە داۋالاش كېرەك. ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە كەسپىي ئەمگەكچى قوغدىنىش چارىلىرىنى كۈچەيتىش، قىش پەسلىدە كىرسۇپۇننى ئاز ئىشلىتىش، ئەمگەكتىن كېيىن يىلىمان سۇدا قول - پۇتلارنى پاكىز يۇيۇپ، ئاندىن كېيىن يېرىلىشتىن ساقلىغۇچى مەلھەملەرنى سۈركەش لازىم.

ئون تۆتىنچى باب نېرۋا خاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغى ۋە تېرە قىچىشىدىغان كېسەللەكلەر

18. نېرۋا خاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغى

نېرۋا خاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغى - سوزۇلما ئاددىي لىشاي دەپمۇ ئاتىلىدىغان، تېرە لىشايىدەك ئۆزگىرىدىغان ۋە تۇتقا قىلىق دەرەخەت قىچىشىدىغان سوزۇلما ياللۇغلۇق تېرە كېسەللىكىدۇر.

كېسەللىك سەۋەبى: نېرۋا - روھىي ئىقتىدارىنىڭ توسالغۇغا ئۇچرىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. ئاغرىقتا كۆپىنچە زىيادە قوزغىلىشچانلىق، غەمكىن - لىك، ئۇيقۇسىزلىق، نېرۋا ئاجىزلىق، ئىچكى ئەزالار كېسەللىكلىرى ياكى كلىنىك تىرىيە دەۋرى قاتارلىقلاردا بولىدىغان ئالاھىدىلىك بولىدۇ. مېخانىك ئامىللار، كۈن نۇرى، كۆپ تەرلەش، يۇڭ توقۇلما مەھسۇلاتلىرى قاتارلىقلار بۇ كېسەلنى قوزغىتىدۇ.

كلىنىك ئىپادىلىرى: ياشلار ۋە ئوتتۇرا ياشلىقلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ، بالىلاردا ئادەتتە ئاز ئۇچرايدۇ. چەكلىك ۋە تارالما دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ.

1. نېرۋا خاراكتېرلىك چەكلىك تېرە ياللۇغى: نىسبەتەن كۆپ كۆرۈلىدۇ. بويۇن كەينى ياكى بويۇن يانلىرىغا كۆپرەك چىقىدۇ، جەينەك ئارقىسى، توققۇز كۆز قىسمى، قاپاق، ئاياللار سىرتقى جىنسىي ئەزاسى ياكى باشقا ئورۇنلارغىمۇ چىقىدۇ. باشلانغاندا شۇ ئورۇن ئالدى بىلەن قىچىشىدۇ. ئاندىن گۈرۈچ ۋە قوناق چوڭلۇقىدا نۇرغۇنلىغان دۈڭمەلەك ياكى كۆپ بۇرجەكلىك پارقىراق ياپىلاق دۈڭچە ئەسۋىلەر چىقىدۇ. سۇس قىزىل ياكى كى تېرە رەڭگىدە بولىدۇ، ئاستا - ئاستا كېڭىيىپ بىرىكىپ كېتىدۇ (14. 1 - رەسىم). ئۇزارغانسېرى تېرە سىرتقى قىسمى چوڭقۇرلىشىدۇ، تېرە قىرى كۆتۈرۈلىدۇ، تېرە ئىنقىلاپ تراتسىيىلىنىپ قېلىپلاپ لىشايدەك ئۆزگىرىدۇ، سىرتقى يۈزىدە قاقچ بولۇپ، تېرە رەڭگىدە ياكى ئازراق قارىداپ قالىدۇ. تۇتقا قىلىق قاتتىق قىچىشىدۇ. كېسەللىك جەريانى سوزۇلما بولىدۇ.

2. نېرۋا خاراكتېرلىك تارالما تېرە ياللۇغى: ئىپادىلىرى نېرۋا خاراكتېرلىك چەكلىك تېرە ياللۇغىنىڭكى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ، لېكىن پۈتۈن بەدەنگە تارقالىدۇ، سىمپتىرىك تارقالغان لىشايدەك داغ پارچىلىرى بولىدۇ. چىدىغۇسىز قىچىشىدۇ ھەم تۈك خالىتىسى ياللۇغى ياكى چىقان قاتارلىق ئىككىلىمچى يۇقۇملاندىلار قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: تىمپىك لىشايدەك ئۆزگىرىشى، كۆپ چىقىدىغان ئورنى، تۇتقا قىلىق قاتتىق قىچىشىدىن باشلىنىشى، كېسەللىك جەريانىنىڭ ئاستا بولىدىغانلىقىغا ئاساسلىنىپلا دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ. بەدەن تەمرە تىكىسى، سوزۇلما دۆل تەمرە تىكە، چەكلىك قىچىشقاق كېسىلى ۋە تەڭگە تەمرە تىكە قاتارلىق كېسەللىكلەر بىلەن پەرقلەندۈرۈش شەرت، ئۇلار ئايرىم-ئايرىم ھالدا مۇناسىۋەتلىك باب ۋە پاراگرافلاردا سۆزلەندى. نېرۋا خاراكتېرلىك تارقىلىشچان تېرە ياللۇغى بىلەن ياش ۋە ئوتتۇرا ياش دەۋرىدىكى ئالاھىدە رېئاكسىيىچان تېرە ياللۇغى غىنى پەرقلەندۈرۈش ھەقىقەتەن تەس، لېكىن كېيىنكىسىدە جەمەت ئىرسىيەت تارىخى روشەن ۋە باشقا ئاللىبىرگىيىلىك كېسەللىك تارىخى بولىدۇ.

داۋالاش: تۆۋەندىكى داۋالاش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ:

1. بەدەن سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: قىچىشىنى توختىتىش ۋە سويۇش ۋە ياكى مۇڭگۈزلەشتۈرۈش پرىنسىپ قىلىنىدۇ. ئوخشىمىغان ئەھۋاللارغا ئاساسەن قىچىشىنى توختاتقۇچى مۇناسىۋەتلىك دورىلار ۋە قويۇقلۇقى ھەر خىل كوكمىس (پار) مېپى تۈرىدىكى دورىلار تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ. نۆۋەتتە ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقانلىرى كورتىكوستروئىدلىق ياساللىملاردىن: ئۇنىڭ ئىمولەسىمىسى، سۇۋالىسىسى ياكى

پلاستىر قاتارلىقلار، ئەگەر ھەر خىل كوكىس (پاز) مېيىدىن ياسالغان دورىلار ياكى ئو- رېئا قوشۇپ ئىشلەتمەسە ئۇنۇمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئېئۇراكسىس (Eutrax) زىماتىدە كىچىكلىشىشنى توختاتقۇچى ياسالغانلارنىڭمۇ ئۇنۇمى ئالاھىدە ياخشى.

2. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: قىچىشىش شىددەتلىك بولۇپ، پۈتۈن بەدەن- گە يامراپ كەتكەنلەرگە، تىنچلاندىرغۇچى دورىلار ياكى ھىستامىنغا قارشى دورىلارنى ئىچكۈزۈشكە بولىدۇ.

3. يەرلىك ئورۇننى قامال قىلىش: نېرۋا خاراكتېرلىك چەكلىمىك تېرە يىللىقىغا قوللىنىلىدۇ. 0.5% لىك پروكاىمىن، 2% لىك بېنىزىل ئالكاھول، مۇرەككەپ خىمىيىنى ياكى تىرىئامىكتولۇن دۇغ لەيلىمە سۇيۇقلۇقى قاتارلىقلار يەرلىك ئورۇننى قامال قىلىشقا دائىم ئىشلىتىلىدۇ.

4. ئۇلاردىن باشقا يەنە رادىئوئاكتىپلىق ئىزوتوپلاردىن ^{32}P ياكى ^{90}Sr لارنى چاپلاشقا، توڭلىتىپ داۋالاش ئۇسۇلى ياكى مېيخۇا يىڭىسىدە ئىلىش قاتارلىقلار بىلەن داۋالاشقا بولىدۇ.

ئۇنىڭدىن سىرت، كېسەلنى روھىي يۈكتىن خالاس قىلىش، نورمال تۇرمۇش قانۇنىي- يىتىگە كاپالەتلىك قىلىش، تاتىلاش ياكى غەدىقلىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش، ئىسسىق سۇدا يۇيماسلىق، كىر سۈيۈمنى ئاز ئىشلىتىش، ئاچچىق يېمەكلىكلەرنى، قىزىق دەملەنگەن چايىنى ئىستېمال قىلماسلىق، ھاراق - تاماكنى تاشلاشقا دەۋەت قىلىش لازىم. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئىچكى ئەزالار فۇنكسىيىسى تەرتىپسىزلىنىش ۋە سوزۇلما يۈ- قۇملنىش ئوچاقلارنى ئاكتىپلىق بىلەن داۋالاش كېرەك.

2. قىچىشقا كېسىلى

قىچىشقا كېسىلى — تېرە قىچىشىدىغان، تېرىدە بىر لەمچى زەخمىلىنىش بولىدىغان تېرە كېسەللىكىدۇر، كەڭ دائىرىلىك ۋە چەكلىمىك دەپ ئىككى خىل بولىدۇ.

كېسەللىك سەۋەبى: كەڭ دائىرىلىك قىچىشقا كېسىلى — ھەمىشە روھىي ۋە نېرۋا ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش، ئىچكى ئاجراتمىلار تەرتىپسىزلىنىش (قالقانىيەز فۇنكسىيىسى كۈچىيىپ كېتىش، دېئابىت كېسىلى، ھامىلدارلىق)، جىگەر، بۆرەك سوزۇلما كېسەللىكلىرى، يامان سۈپەتلىك ئۆسۈملەر (ھودگكىن كېسىلى)، ياشانغانلار تېرىسى يىڭىلەپ قۇرغاقلى- شش، ھاراق ئىچىش ياكى ئاچچىق يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشلار بىلەن مۇناسىۋەت- لىك بولىدۇ. سوغۇق، قۇرغاقلىق، ئىشقارلىق سوپۇن، پەي ياكى خىمىيىۋى تىلالىق تو- قۇلمىلار قاتارلىق تاشقى ئامىللارنىڭ غەدىقلىشىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

چەكلىمىك قىچىشقا كېسىلى يۇقۇرقى ئامىللاردىن سىرت، كۆپىنچە يەر- لىك ئورۇننىڭ غەدىقلىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. مەسىلەن: كۆپ تەرلەش، ئاق خۇن كۆپىيىش، پارازىت قۇرت، تامچە قۇرت، زامبۇرۇغلاردىن يۇقۇملىنىش، بوۋاسىر، ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرى ۋە ئەسۋابلىرى قاتارلىقلار.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: 1. كەڭ دائىرىلىك قىچىشقا كېسىلىدە، قىچىشىش ھەمىشە بىر ئورۇندىن باشلىنىدۇ. كېيىن پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدۇ. دەسلەپتە يېنىك قىچىشىدۇ،

ۋاقىتىمۇ قىسقا بولىدۇ، تۇتقا قلىق قوزغىلىدۇ. ئادەتتە كىچىسى ئېغىرلىشىدۇ. دە-
رىجىسى ھەر قايسى كىشىلەردە ئوخشاش بولمايدۇ؛ شۇنىڭدىن كېيىن تەدرىجى ئېغىرلاپ
قوزغىلىش قېتىم سانى كۆپىيىدۇ، ۋاقتى كۆرۈنەرلىك ئۇزىرايدۇ، قاتتىق تاتىلىغا ئىلىق-
تىن، تېرىدە ئىرنىق ئىزلىرى، قانلىق قاقچىلار قالىدۇ. يۈزەكى تېرە يىمىسىمان سويۇ-
لىدۇ ياكى ھۆل تەمرە تىكىدەك ئۆزگىرىدۇ، ئۇزارغانسېرى تېرە يىرىكلەيدۇ، قېلىنلايدۇ،
لىشايدەك ئۆزگىرىدۇ ۋە پېگمېنت ئولتۇرۇشىدۇ (14 . 2 - رەسىم). دائىم تاتىلىغا چىقا تۈك
خالتا ياللىغى ياكى چىقان قاتارلىق ئىككىلىمچى يۇقۇملۇقلىقلار كېلىپ چىقىدۇ.

2. چەكلىك قىچىشقاق كېسىلى: مەقۇت، ئاياللار سىرتقى جىنسىي ئىسزالىرى، ئۇ-
رۇقدان خالىتىسى قاتارلىق ئورۇنلاردا بولىدۇ. تاتىلىغا ئىلىقتىن يەرلىك ئورۇن قېلىنلايدۇ،
لىشايدەك ئۆزگىرىدۇ، پىشلاقلىشىپ شەلۋەرەيدۇ، يېرىلىدۇ. مەقۇت قىچىشىنى ھەمىشە
مەقۇت يېرىلىش، مەقۇت يوشۇرۇن ئويىمىنى ياللىغى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قىچىش كۆ-
پىنچە مەقۇت پۇرىكىدىلا بولىدۇ. ئاياللار سىرتقى جىنسىي ئىسزاسى قىچىشى، ھەمىشە
جىنسىي لەۋ قىزىرىپ ئىشىش، ئەتراپىدىكى تېرىلەر لىشايدەك ئۆزگىرىشلەرنى كەلتۈ-
رۈپ چىقىرىدۇ ھەمدە كېسەللەندۈرگۈچى ئامىللارنىڭ بىرلىمچى كېسەللىك ئىپادىلىرى
كۆرۈلىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: بىرلىمچى تېرە زەخمىلىنىش بولمىغان ئاساس-
تا، تېرە قىچىشى مەزكۇر كېسەلنىڭ خۇسۇسىيىتىدۇر. قوتۇر، يەلتاشما ۋە نېرۋاخا -
راكتېرلىك تېرە ياللىغى قاتارلىقلار بىلەن پەرقلىنىدۇرۇش شەرت. مۇناسىۋەتلىك باب
ۋە پاراگرافلارغا قارالسۇن.

داۋالاش

1. ئادەتتىكىچە داۋالاش: سۇيۇق - سەلەك، ياغ، گۆشسىز يېمەكلىكلەر ئاساس قى-
لىنىدۇ. ھاراق ئىچمەسلىك، ئاچچىق - چۈچۈك نەرسىلەرنى يېمەسلىك، تاتىلاش، سۈر-
كەش ۋە قىزىق سۇدا يۇيۇشتىن ساقلىنىش، ئىشقارلىق كۈچلۈك سوپۇن ۋە كۈچلۈك غى-
دىقلىغۇچى دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك.

2. كېسەللىك سەۋەبىگە قارىتا داۋالاش: پۈتۈن بەدەنگە ۋە يەرلىك ئورۇنغا مۇ-
ناسىۋەتلىك سەۋەبلىرىنى تېپىش، مەسىلەن: سۇيىدۈكتىكى قەنت، جىگەر فۇنكسىيىسى، ئا-
ساسىي ماددا ئاللىشىش قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈش، ئەگەر غەيرىي نورماللىق سېزىلسە،
ئاكتىپلىق بىلەن داۋالاش لازىم.

3. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ھىستامىنغا قارشى دورىلار، كالىتسىي ياسال-
مىلىرى، پروكايمىنى ۋېنادىن قالمال قىلىش قاتارلىق قىچىشىنى توختىتىشچى ۋە
قىنچىلاندىرغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. سىمىتېدېنىنى سىناق تەرىقىسىدە ئىشلىتىشكە بۇ-
لىدۇ. ياشانغانلاردىكى قىچىشقاق كېسىلىنى قىسقا مۇددەت جىنسىي ھورمون ئىشلىتىپ دا-
ۋالاشقا بولىدۇ، ئەزلەرگە ھەر ھەپتىدە ئىككى قېتىم ھەر قېتىمدا 25mg دىن تېستوست-
تېرون پروپىئوناتتىن مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئاياللارغا سىنتوستېرونلدىن 0.5mg دىن
كۈنىگە بىر - ئىككى قېتىم ئىچكىزۈلىدۇ. جۇڭگىيى تىبابىيەتدە يەنى ھەيدەش، سىرتقى ئىل-
لەتلەرنى تازىلاش، قىزىتما قاتۇرۇش ئاساس قىلىنىدۇ. مەسىلەن: چىڭ فاڭسەن تالىمىنى

ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر ئۇزۇن ۋاقىت تېرە قۇرغاقلاشقان بولسا، قاننى قۇۋۋەتلىپ ئەمەلەشتۈرۈلىدۇ، دىخۇاگىيىسى ياكى چىڭ فېنسىن قاتلىمىغا قوشۇپ ياكى كېمە يېتىپ بېرىلىدۇ. ھۆل تەمرە تىكىدەك ئۆزگەرگەن بولسا، ھۆل ئىسسىقلىقى راۋا نلاشتۇرغۇچى دورىلاردىن لوك دەنشى گەنتاڭ قاينا تىمىسى قوشۇپ ياكى كېمە يېتىپ بېرىلىدۇ.

4. بەدەن سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: نېرۋا خاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغىنى داۋالاشتىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ. 1% لىك كاربولىك كىسلاتاسى، 1% لىك دىكلونىن سۇيۇقلۇقى ياكى ئىمولىسىمىنىمۇ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئەگەر ھۆل تەمرە تىكىدەك ئۆزگەرگەن بولسا، ھۆل تەمرە تىكىنى بىر تەرەپ قىلغاندەك بىر تەرەپ قىلىش لازىم. قەنت، كراخمال ياكى مېنېرال سۇدا يۇيۇشقىمۇ بولىدۇ.

38. تۈگۈنلۈك قىچىشقا ئەسۋەبىسى

تۈگۈنلۈك قىچىشقا ئەسۋەبىسى مۇچىلەرنىڭ سوزۇلىدىغان تەرەپلىرىگە كۆپرەك چىقىدىغان، قاتتىق قىچىش ۋە تۈگۈنلۈك زەخىملىنىش قوشۇلۇپ كېلىدىغان بىر خىل تېرە كېسەللىكىدۇر.

كېسەللىك سەۋەبى: ئانچە ئېنىق ئەمەس. پاشا، ساندېل پاشىسى، كۇمۇتا قاتارلىق ھاشاراتلارنىڭ چېقىمۇ بولىشى ۋە يەرلىك ئورۇننىڭ غىدىقلىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. بەزىلەر نېرۋا خاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغىنىڭ بىر خىل ئۆزگەرگەن تىپى دەپ جۇقارالماقتا.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. ھاشارات چېقىمۇالغان ياكى غىدىقلىنىشقا ئۇچرىغان ئورۇندا بىر نەچچە ياكى نەچچە ئون تال كۆك پۇرچاق چوڭلۇقىدا يەككە ھەم مۇستەھكەم تۈگۈنچىلەر پەيدا بولىدۇ، ئاچ قىزىل ياكى توق قىزىل رەڭلىك بولۇپ، يۈزى يىرىك، سۆڭەكلىمەن كۆپىيىدۇ، تىرناق ئىزى قالىدۇ، پېگمېنت ئولتۇرۇشىدۇ ۋە لىشايدەك ئۆزگىرىدۇ. مۇچىلەرگە كۆپرەك چىقىدۇ، بولۇپمۇ پۇت دۈمبىسى ۋە پاكالچاقنىڭ سوزۇلىدىغان تەرەپلىرىگە چىقىدۇ (14 - 3 - رەسىم). قاتتىق قىچىشىدۇ. كېسەللىك جەريانى سوزۇلما بولۇپ، داۋالاش قىيىن.

دېئاگنوزى ۋە سىڭىشتۇرما دېئاگنوزى: يەككە - يەككە سۆڭەكلىمەن تۈگۈنچە بوپ، قاتتىق قىچىشىدۇ، چوڭلار مۇچىلەرنىڭ سوزۇلغۇچى تەرەپلىرىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ، بۇ مەزكۇر كېسەلنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. ئاددىي سۆڭەك، دۆڭچە ئەسۋەبلىك يەلتاشىملار بىلەن ئۆز ئارا پەرقلىنىدۇرۇش شەرت. مەزكۇر باغنىڭ مۇناسىۋەتلىك پاراگرافلىرىغا قارالسۇن. داۋالاش: ھاشارات چېقىمۇ بىلىشتىن ساقلىنىشتا دىققەت قىلىش شەرت. داۋالاشتا تۆۋەندىكى ئۇسۇللار تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ:

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ئالامىتى ئېغىرراقلارغا ھىستامىنغا قارشى دورىلار ياكى تىنچلاندۇرغۇچى دورىلارنى بېرىشكە بولىدۇ، يېقىندىن بۇيان بەزىلەر تالىدومىد ئىشلەتمەكتە (ماخاۋ باغىغا قارالسۇن).

2. يەرلىك ئورۇنغا دورا ئىشلىتىش: قىچىشقا توختاتقۇچى مەلھەم ياكى تىمىك تۇرا ئىشلىتىش ۋە ياكى كورتىكوسىتىرونىڭ سىزىقچى ياسالمايلىرىنى سۈركەش لازىم.

ئىرىشما مەنىلۈن ياكى پىرىدنىزولون دۇغ لەيلىسە سۇيۇقلۇقىغا، تەڭ ھەقداردىكى 1% لىك پروكايمىنى قوشۇپ، زەخمىلەنگەن تېرىگە ئۈكۈل قىلىشقىمۇ بولىدۇ ۋە ياكى تىرىخلورو-ئاسېتىك كىسلاتا، كاربولىك كىسلاتالىرىنى يەرلىك ئورۇنغا سۈركىتىش بولىدۇ.

3. فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى: توڭلىتىپ داۋالاش ئۇسۇلى، لازېر نۇرىدا داۋالاش ئۇسۇلى، رادىئوئاكتىپلىق ئىزوتوپلاردىن ^{32}P ياكى ^{90}Sr لارنى چاپلاش قاتارلىقلار.

4. باشقىلار: زەخمىلىنىش ئاز بولغان جاھىل قىچىشتا قىنى ئوپىراتسىيە قىلىپ ئىسە - لىۋېتىشنى ئويلىشىپ كۆرۈشكە بولىدۇ.

ئون بەشىنچى باب قىزىل داغ، دۆڭچە ئەسۋە، تەڭگە قاسراقلىق تېرە كېسەللىكلىرى

بۇ باقتا كۆپرەك كۆرۈلىدىغان، قىزىل داغ ياكى دۆڭچە ئەسۋىلىك، تەڭگە قاسراقلىق زەخمىلىنىشنى ئاساس قىلغان بىر گۇرۇپپا تېرە كېسەللىكلىرى سۆزلىنىدۇ. سەۋەبلىرى ھازىرغىچە ئېنىقلانمىدى، ئادەتلىگەن تۈردىكى كېسەللىكلەر تەرىقىسىدە بايان قىلىنىدۇ. سەۋەبى ئېنىقراق، كلىنىكىدىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ئىسپادىلىرى بولغان باشقا تېرە كېسەللىكلىرى مۇناسىۋەتلىك بايلاردىكى پاراگرافلاردا سۆزلەپ ئۆتۈلدى.

18. تەڭگە تەمرەتكە

تەڭگە تەمرەتكە، دۆڭچە ئەسۋە ياكى داغ پارچىسىلىق تەڭگە قاسراقلىق زەخمىلىنىشنى ئاساس قىلىدىغان سوزۇلما ياللۇغلۇق تېرە كېسەلىدۇر. ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ. كېسەللىك سەۋەبى: ھازىرغىچە پۈتۈنلەي ئېنىقلانمىدى. ئادەتتە ئېرىسىيەت (ھەممىشە جەمەت تارىخى بولىدۇ، توقۇلمىلاردىكى ئۆزئارا 1 ئېرىتىكۈچى ئانتىگېنلار ئىچىدە B_{17} ، B_{18} ئانتىگېنلار كۆپىيىدۇ)، يۇقۇملىنىش (زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە ياكى ۋىرۇسلاردىن يۇقۇملىنىش)، ئىچكى ئاجراتمىلار ياكى ماددا ئالماشتۇرۇش فۇنكسىيەسى قالايمىقانلىشىش، ئىممۇنىت فۇنكسىيەسى تۆۋەنلەش، روھىي جىددىيلىك، زەخمىلىنىش قاتارلىقلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ دەپ قارىلىدۇ.

كىلىنىكىلىق ئىپادىلىرى: ئادەتتە تۆت تىنچىققا بۆلۈنىدۇ. يەنى ئىلادىي تىنچىق، يىمىرىگىلىق قاپپارتىقۇ تىنچىق، تېرە قىزىرىش كېسىلى تىپى ۋە بوغۇم كېسىلى تىپىدىن ئىبارەت. كلىنىكىدا كۆپ ساندىكى كىلىرى ئاددىي تىپىدۇر.

1. ئاددىي تەڭگە تەمرەتكە: ئەڭ كۆپ ئۇچرايدۇ. دەسلەپتە يىڭنە ۋە ماش چوڭلۇقىدا قىزىل رەڭلىك دۆڭچە ئەسۋە ياكى داغلىق دۆڭچە ئەسۋە چىقىدۇ، ئۈستىنى كۆپ قەۋەتلىك شالاڭ كۈمۈش رەڭلىك تەڭگە قاسراق ئوراپ تۇرىدۇ، چىرىمتال تاپ-لىپىتىدەك پار قىسراق چېچىگىرىسى ئېلىنىپ بولىدۇ (15، 1 - رەسىم).

ئاندىن كېيىن تېرىندىكى زەخمىلىنىش پەيدىنپەي كۆپىيىپ ۋە كېڭىيىپ، ئوچىكىسىمان، تامچىسىمان، ياماقسىمان، خەرىتىسىمان ياكى بىرىكىپ چوڭ پارچىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ. گال ئەسۋابلار بىلەن تەڭگە قاسراقنى قىرىۋەتكەندىن كېيىن، قىزىل رەڭلىك پاراقسىراق نېپىز پەردە بايقىلىدۇ، بۇ نېپىز پەردە ھادىسىسى يەنە قىرغاندا يىڭىنە بېشىچىلىك چوڭلۇقتىكى قان توچكىلىرى كۆرۈلىدۇ، بۇ توچكىسىمان قاناش ھادىسىسى (Auspitz ھادىسىسى) دېيىلىپ، مەزكۇر كېسەلنىڭ ئالاھىدىلىكى ھېسابلىنىدۇ. تېرە زەخمىلىنىشى بەدەننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئۇچرايدۇ، لېكىن مۇچىلەرنىڭ سوزۇلغۇچى تەرەپلىرى، باش تېرىسى، دۈمبە ۋە بەل توقۇز كۆز قىسمىلىرىدا كۆپ بولىدۇ. ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە قىچىشىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا-بولۇپ، نەچچە يىلدىن نەچچە ئون يىلغىچىمۇ ساقايمايدۇ. كۆپ ساندىكى كېسەللەرنىڭ ھەممەسى قىشتا ئېغىرلاپ، يازدا يېنىمىكلەيدۇ، قايتا - قايتا قوزغىلىدۇ.

باش تېرىسىگە چىققان تەڭگە تەمرە تىكىنىڭ تەڭگىسىمان قاسرىقى قېلىنراق بولۇپ، چاچ تۇتام - تۇتام بولۇپ قالىدۇ. لېكىن ئۇزۇلۇپ ياكى چۈشۈپ كەتمەيدۇ (2.15-رەسىم). پۇت - قول تىرىنا قلىرىغا بۆسۈپ كىرسە، تىرىناق ئېگىز - پەس بولۇپ «ئويما قەتەك» بولۇپ قالىدۇ، ئېغىرراقلىرىدا تىرىناق يۈزىنىڭ پاراقلىقى يوقىلىپ، قېلىنلاپ، ئاسان چۈرۈكلىشىدۇ. ئاز ساندىكى كېسەللەرنىڭ شىمالىق پەردىلىرىگە بۆسۈپ كىرىدۇ، كالىپۇك، قوۋۇز، خەتتىلىكلىكنىڭ ئىچكى تەرىپىدە كۈمۈش رەڭلىك تەڭگە قاسراق دېغى بارلىققا كېلىدۇ. ھەممىشە پىشلاقلاشقان ھالەتتە تۇرىدۇ، تەڭگە قاسراقنى قىرىۋەتكەندىن كېيىن، توچكىسىمان قان قانىغان ۋە شەلۋەرىگەن يۈزنى كۆرگىلى بولىدۇ.

كېسەلنىڭ تەرەققىياتىغا ئاساسەن ئۈچ دەۋرگە بۆلۈشكە بولىدۇ، يەنى ئىلگىرىلەش دەۋرى: ئۆتكۈر قوزغالغان باسقۇچى بولۇپ تېرىسى قېلىنلايدۇ، تەڭگە قاسراقلىرىغا يىغىلىپ قالىدۇ، ئەتراپى قىزىرىدۇ. تېرىنىڭ سەزگۈرلۈكى ئاشقانلىقتىن، غىدىقلىنىشقا ئۇچرىغان ئورۇندا ھەممىشە يېڭى زەخمىلىنىش بولىدۇ، بۇ ئوخشاش شەكىللىك رېئاكسىيە، يەنى Koebner بەلگىسى دەپ ئاتىلىدۇ. تىزراقلىق دەۋرى: كېسەللىك ئەھۋال تەرەققىي قىلىنىشىدىن توختايدۇ، ياللۇغ يېنىمىكلەيدۇ، ئاساسىي جەھەتتىن يېڭى ئەسۋە چىقمايدۇ. چېكىنىش دەۋرى: زەخمىلىنىش نېپىزلاپ، رەڭگى سۇسلىشىدۇ، ئاستا - ئاستا يوقىلىپ كېتىدۇ، سۇسلاشقان يېڭىمىنى ياكى يېڭىمىنى ئولتۇرۇشۇپ داغ قالىدۇ.

2. يىرىڭلىق قاپارتقۇ تىپى: تەڭگە تەمرە تىكە: چەكلىك ۋە كەڭ دائىرىلىكتىن ئىبارەت ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. چەكلىمى نىسبەتەن كۆپ ئۇچرايدۇ. ئالاقان ۋە تاپانغا كۆپ چىقىدۇ، ئالدى بىلەن باكتېرىيىسىز، نېپىز يىرىڭلىق قاپارتقۇ پەيدا بولىدۇ، نېپىزى ئازراق قىزىل بولۇپ، ئاسان يېرىلىپ كەتمەيدۇ. تەخمىنەن 10 كۈن ئەتراپىدا تەبىئىي قېتىشىپ، قاقچ تۇتۇپ، كېپەكلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تەڭگە قاسراق ئاستىدىن يەنە يىرىڭلىق قاپارتقۇ پەيدا بولىدۇ. شۇ تەرىقىدە قايتا - قايتا قوزغىلىۋېرىدۇ، قىچىشىدۇ ۋە ئاغرىيدۇ. پۇت - قول تىرىنا قلىرىغا ئاسان تەسىر قىلغاچقا شەكلى ئۆزگىرىپ قېلىنلاپ كېتىدۇ. باشقا ئورۇنلارمۇ دائىم تەڭگە تەمرە تىكىدىن زەخمىلىنىدۇ. كەڭ دائىرىلىكلىرى ئاز ئۇچرايدۇ. تەڭگە تەمرە تىكە ئۈستىگە يىرىڭلىق قاپارتقۇ پەيدا بولۇپ، يۈزىنى تىپىك بولمىغان تەڭگە قاسراق ئوراپ تۇرىدۇ، ئۆز ئارا بىرىكىپ كېتىدۇ. يۈرىملىك ئورۇنلار -

دىكىسى شەلۋەرەپ، سىرغىما سۇيۇقلۇق چىقىدۇ، ھەمىشە تىل ئېرىقچىغا ئوخشاپ قالىدۇ، پۇت - تىل تىرىناقلىرىمۇ قېلىنلاپ دۇغلىشىدۇ. تىترەش، قىزىش، بوغۇملىرى ئىشىشىپ ئاغرىش، ئاق قان ھۈجەيرىلىرى كۆپىيىش ۋە قاننىڭ چۆكۈش تېزلىشىشلا قوشۇلىدۇ.

دېئاگنوزى ۋە سىياسىي تۈرۈم دىئاگنوزى: ئاددىي تەڭگە تەمرە تىكىمە داغلىق توچكىمە
سىمان كۈمۈش رەڭلىك قېلىن تەڭگە قاسراق بولىدۇ، نېپىز پەردە ھادىسىسى ۋە توچكىسىمە
مان ئاناش بارلىققا كېلىدۇ. كۆپرەك چىقىدىغان ئورنى، پەسىل ۋە قايتا - قايتا قوزغىلىدۇ
غان سوزۇلما كېسەللىك جەريانغا بىرلەشتۈرۈپ دىئاگنوزى بېكىتىلىدۇ. باشقا تىپ-
لىرىنى تەڭگە تەمرە تىكىمىنىڭ خاس ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، ھەر قايسى تىپلىرى
نىڭ ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ. ئادەتتە باش تەمرە تىكىسى
ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللىغى، قىزىلگۈل رەڭلىك توپان ئەسۋە ۋە سوزۇلما ھۆل تەم-
رە تىكىلىرى بىلەن پەرقلىنىدۇرۇش شەرت، مۇناسىۋەتلىك باب، پاراگرافلاردا ئايرىم -
ئايرىم بايان قىلىندى.

كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ. مېتوتريكسات (كۈنىگە $2.5mg$)، ئېتىلمېنىوم ($0.2g$ دىن كۈنىگە ئىككى قېتىم، ھەر ھەپتىدە بەش كۈن ئىچكىۈزۈلىدۇ)، بىمىولان ($0.2g$ دىن كۈنىگە ئۈچ قېتىم بېرىلىدۇ) ياكى ھىدروكسىمۇرېئا ($0.5g$ دىن كۈنىگە ئىككى قېتىم، جەمئىي تۆت ھەپتە ئىشلىتىلىدۇ) قاتارلىق دورىلار دائىم ئىشلىتىلىدۇ. بۇ دورىلارنىڭ ھەممىسى مەلۇم دەرىجىدە ئۈنۈم بېرىدۇ، لېكىن يېنىمىكىلىتىش ۋاقتى قىسقا، قايتا قوزغىلىغاندىن كېيىن داۋالاش تېخىمۇ قىيىنلىشىدۇ، شۇنداقلا چىگەر، بۆرەك قاتارلىق ئەزالارنى ۋە قاننى كۆرۈنەرلىك زەخمىلەندۈرىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەرنى پۇختا ئىگىلەش بىلەن بىللە، دورا ئىشلىتىشتىن بۇرۇن ۋە دورا ئىشلىتىلىۋاتقان مەزگىلدە ئاق قان ھۈجەيرىلىرىنىڭ سانى ۋە چىگەر، بۆرەكلەرنىڭ فۇنكسىيەسىنى قەرەللىك تەكشۈرۈپ تۇرۇش كېرەك؛ ④ كورتىكوستېروئىدلىق ھورمونلار: گەرچە مەلۇم دەرىجىدە ئۈنۈم بەرسىمۇ، دورىنى توختاتقاندىن كېيىن ئەكسىگە يېنىپ كېتىش ھادىسىسى يۈز بېرىدۇ، شۇڭا ئادەتتە يىرىڭلىق قاپارتقۇ تىپى، تېرە قىزىرىش تىپى ۋە بوغۇم كېسىلى تىپىغا ئىشلىتىلىدۇ؛ ⑤ ئانتىبىيوتىكلار: يۇقىرىقى نەپەس يوللىرى يۇقۇلمىنىش ياكى بادام تەنچە يۇقۇلمىنىش قوشۇلۇپ كەلگەندە پېنىتسىللىن ياكى مېنىتسىللىن كۆپ-رەك ئىشلىتىلىدۇ؛ ⑥ پروكايمېنىۋېن دىن قالمىقلىق داۋالاش ئۇسۇلى - ئىلگىرىلەش دەۋرىدىكى ۋە تېرە قىزىرىش كېسىلى تىپىلىق ئاغرىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

2. قىزىڭىلىق داۋالاش ئۇسۇلى: ① فوتو خىمىيەلىك داۋالاش ئۇسۇلى (PUVA داۋالاش ئۇسۇلى): 8 - مېتوكسى پىمورالېن (*methoxypsoralin* - 8) ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $0.6mg$ دىن ئىچكىۈزۈلۈپ، ئىككى سائەتتىن كېيىن ئۇزۇن دولقۇنلۇق ياكى ئوتتۇرا دولقۇنلۇق ئۇلترا بىنەپشە نۇر چۈشۈرۈلىدۇ. ھازىر باشقا دورىلار بىر-لەشتۈرۈلۈپ داۋالاشتا ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: ئانتراىن مەلھىمى، كورتىكوستېروئىد ھورمونى مەلھەملىرى ياكى كوكىس مېيى مەلھىمى قاتارلىقلار قوشۇمچە سۈركىلىدۇ. جۇڭخىي دورىلىرىدىن بەي جى ياسالىمىنى ئىچكىۈزگەندىن كېيىن نۇر چۈشۈرسىمۇ بولىدۇ؛ ② سۇ بىلەن داۋالاش: گۇڭگۇرتلۇق مېنىرال سۇ مۇنچىسىغا چۈشۈرۈپ كوكىس مېيى مەلھىمىنى سۈركەپ ۋە ئۇلترا بىنەپشە نۇر چۈشۈرگەندىن كېيىنمۇ سۇدا يۇيۇندۇرۇپ داۋالاشقا بولىدۇ، بۇ ئۈچ بىرلەشمە داۋالاش ئۇسۇلى دەپ ئاتىلىدۇ.

3. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: 10% ~ 5% لىك دانىسكا كىسلاتا مەلھىمى، 5% لىك كوكىس مېيى مەلھىمى، 0.5% ~ 0.1% لىك ئانتراىن مەلھىمى، 1% لىك دىمېتېل سۇلفوكسىمىدكا مېتوتېتىمىن ۋە 20.000 ~ 1/10.000 مۇستارد گاز مەلھەملىرى دائىم ئىشلىتىلىدۇ. ھەر خىل كورتىكوستېروئىد ھورمون زىماتلىرى ياكى پلاستىرلار كىچىك دا - ئىرىدىكى زەخمىلەنمىشلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. ئىلگىرىلەش دەۋرىدە غىدىقلىشى كۈچلۈك بولغان دورىلارنى سۈركىمەسلىك شەرت.

4. جۇڭخىي دورىلىرىدا داۋالاش: ئىلگىرىلەش دەۋرىدە قىزىتقا قايتۇرۇش، قاننى ساقلىنىلاشتۇرۇش ۋە جانلاندۇرۇش ئاساس قىلىنىدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن خام ئەگرى سۇ - ناي، بەي - ساۋ يىملىتىمىزى، ئەگلىمىك ئىت يىملىتىمىزى، ئوسما - يوپۇرمىقى، تىخۇمەك گۈلىسى، قىمىزىل چوغلىق، چۆل ياسا - لىپۇزى يىملىتىمىزى، چىشۇنىڭ يىملىكى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ، تۇراقلىق دەۋرىدە قاننى قۇۋۋەت -

لەش، قاننى جانلايدۇرۇش ۋە ئېرىنى سېلىقلاش ئاساس قىلىنىدۇ. بۇنىڭغا پىششىق ۋە خام ئەگرى سۇناي، داڭگوي، چۆل يالپۇزى يىلتىزى، شاپتۇل مېغىزى، زاراڭزا چېچىمكى، مۇرچۇبا، مۇۋەببەل سىمپىت قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. ئۇلاردىن باشقا يەنە كامپىتوتېت سىن ئوكۇلى، ئىت يانچىقى ئوكۇللىرى ئىشلىتىلىدۇ.

5. ئادەتتىكى چارلار: چۈشەندۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، روھىي ئەندىشەدىن خالاس قىلىش، ھەرخىل گۇمانلىق قوزغاتقۇچى ئامىللار ۋە زەخمىلىنىش ياكى فىزىكا - خىمىيىلىك غىدىقلىنىشلاردىن ساقلىنىش، ھاراق ئىچمەسلىك، ئاچچىق يېمەكلىكلەردىن پەرھىز تۇتۇش، يۇقىرىقى نەپەس يوللىرى يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، پروپرانولول قاتارلىق تەڭگە تەمرەتكىنى قوزغاتقۇچى دورىلارنى ئىچمەسلىك كېرەك.

28. قىزىلگۈل رەڭلىك توپان ئەسۋەسى

قىزىلگۈل رەڭلىك توپان ئەسۋەسى — قىزىل داغلىق تەڭگە قاسراقنى ئاساس قىلىدىغان، سەۋەبى ئېنىق بولمىغان، ئۈزلۈكسىز چەكلىنىپ تۇرىدىغان ياللۇغلىق ئېرەكسىلىدۇر.

كېسەللىك سەۋەبى: ئېنىق ئەمەس. ئانا داغ بارلىقى، كېسەللىك جەريانىنىڭ ئۈز-لۈكىدىن چەكلىنىپ تۇرۇشى، قايتا قوزغىلىشى ئىنتايىن ئاز بولۇشتەك ھادىسىلەرگە ئاساسەن، كۆپىنچە ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىدۇ. بەزىلەر باكتېرىيە، زامبۇرۇغلاردىن يۇقۇملىنىش ياكى ئىممۇنىتلىق ئامىللار بىلەن مۇناسىۋەتلىككە بولىدۇ دەپ قارىماقتا.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: ياش، ئوتتۇرا ياشلىقلاردا، ئەتىياز، كۈز پەسلىرىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. قىسمەن كېسەللەر دەسلەپتە چىشىنى بۇرۇن پۈتۈن بەدىنى يېقىمسىزلىنىش، بېشى ئاغرىش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش، تۆۋەن قىزىتما قاتارلىق دەسلەپكى دەۋرلىك كېسەللىك ئالاھىدىلىكلىرى پەيدا بولىدۇ. ئارقىدىنلا گەۋدە، يۇقىرىقى بىلەك ياكى يوتا ئىچكى تەرەپ - لىرىگە ئالدى بىلەن قىزغۇچ داغ ئۆزلەيدۇ، يۈزىدە نېپىز قۇرۇق تەڭگە قاسراق بولۇپ، رادىئوسى تەخمىنەن 2~3cm بولىدۇ. بۇ ئانا داغ ياكى دەسلەپكى دەۋرلىك دېيىلىمى، ھەمىشە ئېتىبارغا ئېلىنىمايدۇ. ئانا داغ پەيدا بولۇپ، بىر - ئىككى ھەپتىدىن كېيىن، گەۋدە ياكى مۇچىلەرنىڭ يېتىن ئۇچلىرىغا ئارقا - ئارقىدىن ئانا داغدىن كىچىكرەك قىزىل داغلار چىقىدۇ. بۇ بالا داغ ياكى ئىككىلىمىچى داغ دېيىلىدۇ. دۈگىلەك ياكى ئېللىپس شەكلىدە، ئۇزۇن ئوقى قىوۋۇرغا ياكى تېرە جىمىقلىرى بىلەن پاراللېل، رەڭگى قىزىل ياكى ساغۇچ قىزىل، گىرۋەكلىرىنىڭ رەڭگى قېنىق، ئوتتۇرىسىنىڭ ئاچ ئۇششاق سىزىقچىلار بىرلىشىپ توپان دەك تەڭگە قاسراقنى پەيدا قىلىدۇ، چېگرىسى ئېنىق بولىدۇ (4. 15 - رەسىم). سەل قىچىشىدۇ ياكى قىچىشمايدۇ. كېسەللىك جەريانى تەخمىنەن 6~8 ھەپتە ئەسۋە يوقالغاندىن كېيىن، داغ قالمايدۇ، قايتا قوزغىلىشى ئىنتايىن ئاز كۆرۈلىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سىلىشتۈرما دىئاگنوزى: ئېللىپس شەكلىلىك ئۇزۇن ئوقى تېرە جىمىقلىرى بىلەن پاراللېل كەلگەن، ساغۇچ قىزىل رەڭلىك تەڭگە قاسراقلىق داغقا، گەۋدە ۋە

مۇچمەرنىڭ يۈرەككە يېقىن بۇلەكلىرىگە كۆپرەك چىقىدىغان نىلەملىرىغا، كېسەلنىڭ ئۈزلۈكسىز دىن چەكلىنىپ تۇرۇشىغا ئاساسەن دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ. بۇنى بەدەن تەمرە تەكشىسى، ياغ تەپچىسىدىن تېرە ياللۇغى، تەڭگە تەمرە تەكە ۋە ئالا - چىپار تەمرە تەكلىلەر بىلەن ئۆز ئارا پەرقلەندۈرۈش لازىم، مەزكۇر بايىنىڭ پاراگرافلىرىدا ئايرىم - ئايرىم بايان قىلىندى.

داۋالاش:

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: كالتسىي ياسالىملىرى، ۋىتامىن C، ۋىتامىن B₁₂ لەر ئىشلىتىلىدۇ ياكى ناترىي تىموسۇلفات ۋېنادىن ئوكۇل قىلىنىدۇ، قىچىش ئەھۋالىغا قاراپ ھىستامىنغا قارشى دورىلارنى بېرىشكە ياكى پروكايمىنى ۋېنادىن قامال قىلىشقا بولىدۇ.

2. فىزىكىلىق داۋالاش: جاھىل كېسەللىكلەرگە ئۆتكۈر ياللۇغلىنىش پەسەيگەندىن كېيىن ئۇلترا بىنەپشە نۇر چۈشۈرۈشكە بولىدۇ، ئادەتتە قىزىل داغ مىقدارى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ. بىر ھەپتىدە ئىككى قېتىم چۈشۈرۈلسە مەلۇم دەرىجىدە ئۈنۈمى بولىدۇ. PUVA نى قوللىنىشتىمۇ بولىدۇ. ئوكسىگېن تاغاق سۆڭەك ئاستىنى بۇرچىكىدىن تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىشىمۇ مەلۇم دەرىجىدە ئۈنۈم بېرىدۇ.

3. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: كالامىن سۇيۇقلۇقى، كورتىكوستروئىد ھورمون زىماتى ياكى يۇرېپ (Eurep) زىماتى قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. قىزىل گۈل تۈپىنى سۈيىدە يۇيۇنۇشىمۇ بولىدۇ، لېكىن بەك كۆپ يۇيۇنۇپ بېشىدىن ساقلىنىش لازىم. كۈچلۈك غىدىتىلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بەدەن سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىمۇ ئىشلىتەلەيمەنلىك كېرەك.

4. جۇڭگىي دورىلىرىدا داۋالاش: قىزىتما قايتۇرۇپ قاننى ساقلىنىلاشتۇرۇش، يەنى ھەيدەپ قىچىشىنى توختىتىش داۋالاش پرىنسىپى قىلىنىدۇ. ئادەتتە خام ئەگرى سۇ-ئاي، قالقان گۈللەرنىڭ ھەر قايسىسىدىن 50g، يىنخۇاگۈلىدىن 40g، شەن جىدىن 25g، قىزىل چوغلۇق ئوت، دەنپى، ئاق ئوغرى تىكەن، ياۋاجۇيخۇا گۈلى ۋە خام چۈچۈك بۇيا قاتارلىقلارنىڭ ھەر قايسىسىدىن 15g ئېلىپ ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر ئۈنۈمى ناچار بولسا، جۈيزە پوستى، خۇبۇ، ياچۇلار، قەۋزىيە تەكە كەندىر ئۇرۇقى، رەۋەن، ھامىلدار ئاياللارغا ئەھۋالغا قاراپ، قىزىل چوغلۇق ئوت، دەنپىلەرگە دۇجۇڭ، سان چىشىڭ ۋە فۇ-شىڭلار قوشۇپ بېرىلىدۇ.

38. ئاددىي توپان ئەسۋەسى

ئاددىي توپان ئەسۋەسى — «ئاق رەڭلىك توپان ئەسۋەسى»، «شاپتۇل چېچىمكى تەمرە تەكە» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بالىلار ۋە ئۆسۈرلەرنىڭ يۈزىگە كۆپ چىقىدىغان، رەڭگى ئۆچكەن تەڭگە قاسراقلىق داغ ئالاھىدىلىكى بولغان يۈزەكى تېرە كېسەلى.

كېسەللىك سەۋەبى: كۆپىنچە سەۋەبى ئېنىق بولمىغان غەيرىي خاس تېرە كېسەلى دەپ قارالماقتا. ئاپتاپقا قاقلىنىش، شامالداش، ۋىتامىنلار يېتىشمەسلىك، كىمىيەۋى پۇتۇمنى كۆپ ئىشلىتىش ياكى تېرە قورۇقلىشىش قاتارلىقلاردا مەزكۇر كېسەل ئاسان يۈز بېرىدۇ.

گىلىنىك ئىپادىلىرى: باھار پەسلىنىڭ ئاخىرى ۋە باش ياز پەسلىلىرىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. دەسلەپتە دۈگىلەك ياكى سوقىچاق ئاقۇش داغ پارچىلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئەسۋە گىر-ۋەكلىرىنى يەرقلەندۈرگىلى بولىدۇ، تېرىسى قارىلارنىڭ تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. سىرتقى يۈزى قۇرۇق بولۇپ، ئۇششاق تەڭگە قاسراقلار يېپىشىپ تۇرىدۇ. ئەسۋە بارغانسېرى كۆپىيىپ كېتىدۇ، يېقىنلىرى ئۆز ئارا قوشۇلۇپ، رەتسىزلىنىدۇ. كۆپىنچە ياللۇغ بولمايدۇ، بەزىدە ئازراق قان تولىدۇ، يۈز قىسمىغا كۆپ چىقىدۇ. بويۇن، تاغاق، يۇقىرىقى بىلەك قاتارلىق ئورۇنلارغىمۇ چىقىدۇ، قىچىشمايدۇ ياكى ئازراق قىچىشىدۇ. بىرنەچچە ئايدىن كېيىن ياكى ئۇزۇن ۋاقىتتىن كېيىن ئۈزلۈكسىز يوقىلىپ كېتىدۇ، لېكىن يەنىلا قايتا قوزغىلىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: بالىلارنىڭ يۈزىگە كۆپ چىقىدىغانلىقىغا دۈگىلەككە لىگەن رەڭگى ئۆچكەن تەڭگە قاسراقلىق داغنىڭ بولۇشىغا، باھار پەسلىنىڭ ئاخىرى ۋە باش ياز كۈنىلىرىدە كۆپ كۆرۈلىدىغانلىقىغا ئاساسەن دىئاگنوزنى تىكلىنىدۇ، ئاق كېسەل ۋە بەدەن تەمرەتكىسى بىلەن ئۆز ئارا يەرقلەندۈرۈش شەرت. مەزكۇر باغنىڭ ھەر قايسى پاراگرافلىرىدا ئايرىم - ئايرىم سۆزلەندى.

داۋالاش: ۋىتامىن B ياكى A، D لارنى سىناق تەرتىپىدە ئىچكۈزۈپ كۆرۈش، 5% ~ 3% لىك گۈڭگۈرت زىماتى، كورتىكوستېروئىد ھورمونى زىماتى ياكى نېومىتسىن ۋە ھىدرو كورتىزون مەلھەملىرىنى سۈركەشكە بولىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە تېرىنى ئاسراشقا دىققەت قىلىش كېرەك.

48. كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ

كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ — كۆپ شەكىللىك سىرغىما قىزىل داغ دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ، سەۋەبى ئېنىق بولمىغان ئۆتكۈر ياللۇغلۇق تېرە كېسىلى بولۇپ، ئەسۋەنىڭ كۆپ شەكىللىك بولۇشى ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر، شىللىق پەردىلەر زەخمىلىنىش ھەمىشە قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

گىلىنىك سەۋەبى: ئېنىق ئەمەس. ئېھتىمال ۋىرۇسلار، مىكوپلازمىلار ياكى باكتېرىيىلەرنىڭ يۇقۇملاندۇرۇشىدىن كېلىپ چىققان تېرە كېچىك قان تومۇرلىرىدىكى زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىيىسى بولۇشى مۇمكىن. ئۇلاردىن باشقا يەنە يېمەكلىكلەر، دورىلار، قۇشتۇچى توقۇلما كېسەللىكلىرى، يامان سۈپەتلىك ئۆسۈملۈكلەر ياكى سوغۇق قاتارلىق ئامىللار بىلەنمۇ مۇناسىۋىتى بولىدۇ، دەپ قارالماقتا.

گىلىنىك ئىپادىلىرى: ئەتىياز ۋە كۈز پەسلىلىرىدە كۆپرەك پەيدا بولىدۇ، ئالاھىدىلىرى يېنىكلەر كۆپ ئۇچرايدۇ، ئەسۋە چىتىشتىن بۇرۇن تۆۋەن قىزىتما، مۇسكۇللار ئاغرىش، چارچاش، پۇتۇن بەدەن يىتىشمەسلىنىش قاتارلىق دەسلەپكى دەۋرلىك كېسەللىك ئالاھىدىلىكلىرى كۆرۈلىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىنلا چېگرىسى ئېنىق، ئوتتۇرىسى يېغىر رەڭلىك دۈگىلەك سۇلۇق ئىششىق قىزىل داغ تېزلا پەيدا بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە دۆڭچە ئەسۋە، سۇلۇق قاپارتقۇ، چوڭ قاپارتقۇ ياكى قانلىق قاپارتقۇلار قوشۇلۇپ چىقىدۇ، تىپىكلىرىدە كۆز، رەڭدار پەردىسىدەك ئالاھىدىلىكلىرى بولىدۇ (5، 15 - رەسىم).

سۇلۇق قاپارتقۇ يېرىلىپ كەتسە شەلۋەرەيدۇ ۋە سۇيۇقلۇق سىرغىپ چىقىدۇ. پۇت، قوللارنىڭ دۈمبىسى، بېغىش، جەينەك، تىز قاتارلىق ئورۇنلارغا كۆپرەك چىقىدۇ. ئالغان، تاپان ۋە يۈز، بويۇنلارغىمۇ چىقىدۇ. ئازراق قىچىشىدۇ، كۆپ ساندىكىلىرى 2~3 ھەپتە ئىچىدە ئۈزلۈكسىز يوقىلىدۇ. ۋاقىتلىق پېگمېنت ئولتۇرۇشۇپ قالىدۇ، پەسىللىك قايتا قوزغىلىدىغانلىرى ناھايىتى كۆپ كۆرۈلىدۇ.

ئېغىرلىرى ئاز ئۇچرايدۇ، كۆپلىگەن بوشلۇقلاردىكى شىللىق پەردىلەر زەخمىلىنىش ئەھۋاللىرى، ئاتالمىش Steven - Johnson يىغىنىدى ئالامىتى قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ يەنە ئېغىر ئالامەتلىك چوڭ قاپارتقۇلۇق كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ دەپمۇ ئاتىلىدۇ. كېسەل جىددىي باشلىنىدۇ. يۇقىرى قىزىتما، سوغۇقتىن قورقۇش، باش ئاغرىش، بوغۇم ئاغرىش قاتارلىق پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلەر پەيدا بولىدۇ ھەمدە تومۇر سوقۇشى ئاجىز، ئىنچىكە بولۇش، نەپەسلىنىشى جىددىي بولۇشتەك زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، ھەتتا زەخمىلىنىش ھالىتىگىمۇ كىرىپ قالىدۇ. ئەسۋىنىڭ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئالاھىدىلىكلىرىدىن سىرت، چوڭ قاپارتقۇ، قانلىق قاپارتقۇ، قان ئۇيۇش دېغى قاتارلىق زەخمىلىنىشلەرنى ئاساس قىلىدۇ. كۆز، ئېغىز، بۇرۇن، ئاياللار سىرتقى جىنسىي ئەزاسى، مەقشەت ئەتراپى قاتارلىق ئورۇنلاردىكى شىللىق پەردىلەر ئېغىر زەخمىلىنىدۇ، كالپۇك ۋە ئېغىر شىللىق پەردىلىرى شەلۋەرەيدۇ. بىرىكتۈرگۈچى پەردە كاتارلىق ياللۇغى، مۈڭگۈز پەردە ياللۇغى، بۇرۇن شىللىق پەردىسى شەلۋەرەش، بۇرۇن قاناش، زەكەر بېشى، خەتنىلىك ياللۇغى، جىنسىي يول شىللىق پەردىسى شەلۋەرەش، سۈيدۈك يولى ياللۇغى، مەقشەت ئەتراپى شەلۋەرەش قاتارلىقلار يۈز بېرىدۇ. ئېغىرلىرىدا يەنە كۆز ئالامىتى ياللۇغى پەيدا بولىدۇ. ئاز ساندىكى كېسەللەرنىڭ ئىچىكى ئەزالىرى زەخمىلىنىدۇ، ھەتتا ئۆلۈپمۇ كېتىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سىڭىشتۇرما دىئاگنوزى: ئەتىياز ۋە باھار پەسىللىرىدە كۆپ كۆرۈلىدىغانلىقى، تېرە كۆپ شەكىللىك ۋە رەڭدار پەردىسىمان زەخمىلىنىدىغانلىقى، تۆت مۇچە بوغۇملىرىنىڭ سوزۇلغۇچى تەرەپلىرىدە كۆپ كۆرۈلىدىغانلىقى، ئېغىرلىرىدا كۆپ بوشلۇقلاردىكى شىللىق پەردىلەرنىڭ زەخمىلىنىشى ۋە پۈتۈن بەدەن ئالامەتلىرى، پەسىللىك قايتا قوزغىلىشى قاتارلىق ئالاھىدىلىكلىرىگە ئاساسلىنىپ دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ، پېمىگۇس، چوڭ قاپارتقۇلۇق يۈزەكى تېرە بوشاش تىپىلىق دورا ئەسۋىسى ۋە ئۇششۇك(قىمىش پەسىلىدىكى)دىن ئۆز ئارا پەرقلەندۈرۈش شەرت. مەزكۇر بايىنىڭ ئايرىم پاراگرافلىرىدا سۆزلەندى.

داۋالاش

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: يېنىك كېسەللەرگە ھىستامىنغا قارشى دورىلار، ۋىتامىن C ياكى كالىتسىيە ياسالغىلىرىنى بېرىش ھەم ئالامەتلىرىگە قارىتا بىر تەرىپ قىلماش لازىم. ئىككىلىمچى يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئانتىبىيوتىكىلار بىلەن داۋالاش، ئېغىر كېسەللەرگە كۈرتىمكوستروئىد ھورمونلىرىنى بېرىش شەرت ھەمدە سۇ ۋە ئېلېكترولىتلارنى تولۇقلاپ بېرىش قاتارلىق قۇۋۋەتلىپ داۋالاش ئۇسۇللىرىغا دىققەت قىلىش كېرەك.

2. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: قىچىشىنى توختىتىش، قۇرۇتۇش، ئىككىلىمچى

يۇقۇملانمىشىنى توسۇش ئاساس قىلىنىدۇ. قىزىل داغ بىلەن دۆڭچە ئەشۇلا بولسا، كالا مىن سۇيۇق-
لۇقىنى سۈركەشكە بولىدۇ؛ شەلۋەرەپ سۇيۇقلۇق سىرغىپ چىققان بولسا، 3% لىك دانىمكا
كىسلاتا ئېرىتمىسى ياكى مۇرەككەپ مىس سۇلفات ئېرىتمىسى ھۆل كومپىرس قىلىنىدۇ. ئە-
گەر ئىككىلەمچى يۇقۇملانسا ئورنىغا كالىي پېرمانگانات ئېرىتمىسىنى ئىشلىتىش كېرەك.
كۆز قىسمى زەخمىلەنسە 0.25% لىك خلورو مېتىس كۆز دورىسى ۋە كورتىكوستروئىد كۆز
مەلھىمىنى ئالماشتۇرۇپ ئىشلىتىش لازىم. ئېغىز بوشلۇقى زەخمىلەنسە 3% لىك دانىمكا
كىسلاتا ئېرىتمىسى ياكى 2% لىك ناترىي ھىدروكاربونات ئېرىتمىلىرىدە ئېغىز چايقاش
ھەم 1% لىك خلورو مېتىس گىلىتسىرىننى سۈركەشكە بولىدۇ.
3. ئېغىز كېسەللەرنى پەرۋىش قىلىش. تۆتىنچى بايىنىڭ ئىككىنچى پاراگرافىغا قارالسۇن.

ياپىلاق لىشاي

ياپىلاق لىشاي—ياپىلاق قىزىل لىشاي دەپمۇ ئاتىلىدىغان، سەۋەبى ئېنىق بولمى-
غان، كۆپ بۇرچەكلىك ياپىلاق دۆڭچە ئەسۋىنى ئالاھىدىلىك قىلغان، سۇس ئۆتكۈر ياكى
سوزۇلما ياللۇغلۇق تېرە كېسىلى بولۇپ، قاتتىق قېچىشىدۇ.
كېسەللىك سەۋەبى: ئېنىق ئەمەس. ئادەتتە روھى ۋە نېرۋا توسقۇنلۇققا ئۇچراش ياكى
ۋىرۇسلاردىن يۇقۇملانمىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىدۇ. تەخمىنەن 95% ئاغرىقلار-
نىڭ زەخمىلەنگەن ئورنىدىكى نېگىز پەردە بەلبېغىغا ئىممۇنىتېلىق شارچە ئاقسىل ۋە
كومپلېمېنت چۆكۈۋالغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ ئۆزبەدەن ئىممۇنىتېلىق مەزكۇر كې-
سەللىك سەۋەبى بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا ئىرسىيەت ۋە دورا
ئامىللىرىنىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ.

كېسەللىك ئىپادىلىرى: تىپىك ئەسۋە قالاپا قىلىق يىمگەن بېشىدەك، تېرىقتەك،
بۇرچاقتەك، تېرىدىن سەل كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدىغان، كۆپ بۇرچەكلىك، ياپىلاق دۆڭچە ئەسۋە
بولۇپ، جىگەررەك ياكى قارامتۇل قىزىل، چېگرىسى ئېنىق، جىسمى قاتتىق بولىدۇ. يۈزى
شامىدەك پارقىراق بولۇپ، نېپىز مۇڭگۈز پەردە ئوراپ تۇرىدۇ. ئوتتۇرىسى سەل ئويىغان،
ئېغىزدا كىچىك مۇڭگۈزلەشكەن نوپچا بار. چوڭايتقۇچى ئەينەك بىلەن تەكشۈرگەندە،
يۈزىدە كۈلرەك توپچىلارنىڭ ياكى تورسىمان سىزىقلار (Wickham سىزىقى) نىڭ بارلىق-
قىنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئەگەر ئانىلىق مېيى سۈركەلسە رەڭگى قىزىلدىن سۆسۈنگە ئۆز-
گىرىپ تېخىمۇ ئېنىق كۆرۈنىدۇ. ئەسۋە يەككە - يەككە ياكى توپلىشىپ چىقىدۇ. بەلباغ-
سىمان ياكى ھالقىسىمانمۇ چىقىدۇ (6.15 - رەسىم). ئوخشاش
شەكىللىك رېئاكسىيىمۇ پەيدا بولىدۇ. ئەسۋە بەدەننىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا
چىقىدۇ، لېكىن مۇچىلەرنىڭ پۈكۈلگۈچى تەرەپلىرىگىمۇ، بولۇپمۇ بىلەيزۇك ئىچكى تەرە-
پى، جەينەك ئويىمىنى، يوتا ئىچكى تەرەپى، تېقىم ئويىمىنى ۋە ھوشۇق ئەتراپى، پاكال-
چاق ئالدى، بەل، ساغرا قاتارلىق ئورۇنلارغا كۆپ چىقىدۇ، مەقئەت ئەتراپى ۋە ئايال-
لار سىرتقى جىنسسىي ئەزاسىغىمۇ چىقىدۇ، شىللىق پەردىلەرنىڭ زەخمىلىنىشى كۆپ كۆرۈل-
دۇ. بوغۇز، كالىپۇك، تىل - يۇتقۇنچاق ۋە ئاياللار سىرتقى جىنسسىي ئەزاسى قاتارلىق ئور-
ۇنلارغا ئاسان چىقىدۇ، زەخمىلىنىش سۈت رەڭلىك دۆڭچە ئەسۋە ياكى بىرىكىپ كەتكەن

تورسىمان داغ بولۇپ، بەزىدە شەلۋەرەش قوشۇلىدۇ. تىرىناقلار تەسىرىگە ئۇچرىسا (ئاز كۆرۈلىدۇ) قېلىنلايدۇ ۋە ئۇزۇنغا ئېرىقچە پەيدا بولىدۇ. دائىم تۇتقا قىلىق قاتتىق قىچىشىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ، قايتا قوزغىلىپ تۇرىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: جىگەر رەڭلىك كۆپ بۇرجەكلىك ياپىلاق دۆڭ-چە ئەسۋە، يۈزى شامدەك پاقىرايدىغانلىقىغا، تورسىمان سىزىقچىلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. خالىقلىقىغا، كۆپرەك چىقىدىغان ئورنى ھەم قاتتىق قىچىشىدىغانلىقى، كېسەللىك جەريانىنىڭ سوزۇلما بولىدىغانلىقىغا بىرلەشتۈرۈپ دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ. نېرۋا خاراك تېرىلىك تېرە ياللۇغى ۋە ياپىلاق سۆڭەك بىلەن پەرقلىنىدۇرۇش شەرت. مەزكۇر بايىنىڭ ئايرىم پاراگرافلىرىغا قارالسۇن.

داۋالاش:

1. ئىمچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ھىستامىنغا قارشى دورىلار ياكى تىنچلاندۇرغۇچى، قىچىشىنى توختاتقۇچى دورىلارنى بېرىشكە بولىدۇ. ئۆتكۈر كەڭ دائىرىدە چىققانلارغا تىنچا مۇددەت كورتىكوستروئىد ھورمونى ئىشلىتىلىدۇ. سوزۇلما كېسەللىرىگە، رېمىفون (كۈنىگە $400 \sim 300$ دىن)، گرېزىنۇ فۇلۋىن ($0.2g$ دىن كۈنىگە 3 قېتىم)، خلو-روكۋىن ($0.25g$ دىن كۈنىگە 2 قېتىم)، ئاروماتىك ۋىتامىن A كىسلاتاسى ياكى 13-پا-راۋىتامىن A كىسلاتاسى ($13\text{-Paravitamin A Acid}$) تاللاپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ (كۈنىگە $50 \sim 30$ دىن)، ئۇلاردىن باشقا ۋىتامىن A، B_{12} ، E ۋە بىسمۇت ياساللىرىنى سىناق تەرىقىسىدە ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

2. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: كورتىكوستروئىد زىماتى ياكى $0.05 \sim 0.1\%$ لىك ۋىتامىن A كىسلاتا زىماتىنى سۈركەشكە بولىدۇ، دائىرىسى كىچىك بولغانلارنىڭكىنى سۇلياۋ نېپىز پەردە بىلەن تېجىشقا بولىدۇ. باشقا قىچىشىنى توختاتقۇچى دورىلاردىن: يۇرېپ (Eurep) زىماتى ياكى كوكىس مېيى ئىمۇلىسىيىلىرىنىمۇ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

3. فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى: چەكلىك قېلىنلىغان ئەسۋىنى لازېر نۇرى، توڭلىمىش ياكى رادىئوئاكتىپلىق ئىزوتوپلاردىن ^{90}Sr ، ^{32}P نى چاپلاپ داۋالاشقا بولىدۇ.

4. باشقىلار: ئەسۋە كىچىك دائىرىدە بولسا، پېرىنېزولوننى ئەسۋە ئىمچىگە ئۆسكۈل قىلىشقا ياكى ئوپېراتسىيە قىلىپ ئېلىۋېتىشكە بولىدۇ. شىللىق پەردىلىرى زەخمىلەنگەن ئاغرىقلارنىڭ شۇ ئورۇننى پاكىز ساقلاش ھەم ئەھۋالىغا قاراپ دورا ئىشلىتىش لازىم.

ئون ئالتىنچى باب تېرە قان تومۇرلىرى ياللۇغلىرى

قان تومۇرلار ياللۇغى — تېرىدىكى، ئىچكى ئەزالاردىكى قان تومۇرلار دېۋارلىرىنىڭ نۇرغۇن سەۋەبلەر كەلتۈرۈپ چىقارغان بىرلەشمى ياللۇغلىنىش رېئاكسىيىلىرىنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشىدۇر. تېرە قان تومۇرلىرى ياللۇغى، قان تومۇرلار ياللۇغى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان بىر قىسىم تېرە كېسەللىكلىرىنى كۆرسىتىدۇ، ئۇنىڭ سەۋەبلىرى تاھازىغىچە ئېنىق ئەمەس، ئادەتتە ئاللىبىرگىيە بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىدۇ.

بۇ بايتا بىر نەچچە خىل كۆپرەك ئۇچرايدىغان تېرە قان تومۇرلىرى ياللۇغى خا-
راكتېرلىك كېسەللىكلەرنى بايان قىلىمىز.

18. تېرە قان تومۇرلىرى ئاللىبىرگىيىلىك ياللۇغى

كېسەللىك سەۋەبى: مەزكۇر كېسەل يۇقۇملانمىش (باكتېرىيە ياكى ۋىرۇسلار) ياكى دورىلار (سۇلفا نىلامىدلار، بارىتال، فېنوتىمال زىنلار، يودىتلار ۋە ئاتسېتوزال) كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تېرە كىچىك قان تومۇرلىرى ئاللىبىرگىيىلىك ياللۇغىدۇر. كېسەلنىڭ پەيدا بولۇش مېخانىزمى ئىممۇنىتەتلىق بىرىكمىلەرنىڭ چۆكۈۋېلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك، ئاساسەن ھەقىقىي تېرە ئاستى قەۋىتىدىكى كىچىك قان تومۇرلارنىڭ دىۋارىغا بۆسۈپ كىرىدۇ، ئىچىكى ئەزالارغا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.

كېلىمىك ئىپادىلىرى: چوڭلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. ساغرا قىسمى ۋە پۇتلار، بولۇپمۇ پاچاچا قىچا كۆپرەك چىقىدۇ، بەزىدە قول ۋە باشقا ئورۇنلارغىمۇ چىقىدۇ. ئۆتكۈر زەخمىلىنىش كۆپ شەكىللىك بولىدۇ. مەسىلەن: قىزىل داغ، سۆسۈن داغ، دۆڭچە ئەسۋە، تاش جا، سۇلۇق قاپارتقۇ، قانلىق قاپارتقۇ، تۈگۈنچە، نېكروز ۋە يارا قاتارلىقلار. ھەممىشە تۈركۈملەپ پەيدا بولىدۇ؛ سوزۇلمىلىرى داغ پارچىسى، ئۇششاق تۈگۈنچە ۋە يارىنى ئاساس قىلىدۇ. دائىم بىر نەچچە خىل زەخمىلىنىش بىرلىكە مەۋجۇت بولىدۇ، ئاساسلىق بىر خىل زەخمىلىنىش بىلەنمۇ ئىپادىلىنىشى مۇمكىن. كۆيۈپ ئاغرىيدۇ ياكى سانجىپ ئاغرىيدۇ، قىزىش، باش ئاغرىش، بوغۇم ئاغرىش ۋە چارچاپ بىتاپ بولۇش قاتارلىقلار قوشۇلۇپ كېلىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ، ئاساسلا قايتا قوزغىلىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: كېسەل تارىخى، كۆپ شەكىللىك زەخمىلىنىش، كۆپرەك چىقىدىغان ئورنى ۋە ھېسسىي ئالامەتلىرىگە، زۆرۈر تېپىلغاندا توقۇلمىلارنى پاتولوگىيىلىك تەكشۈرۈشنى ماتېرىياللىرىغا ئاساسلىنىپ دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ. دۆڭچە ئەسۋە نېكروزلىنىشلىق سىل ئەسۋىسى ۋە ئاللىبىرگىيىلىك سۆسۈن داغ بىلەن پەرقلىنىدۇ. شەرت مەزكۇر بايىنىڭ ئايرىم پاراگرافلىرىغا قارالسۇن.

داۋالاش: كېسەللىك ئوچىقىنى يوقىتىش ۋە گۇمانلىق دورىلارنى توختىتىشقا دىققەت قىلىش لازىم. ئادەتتىكى كېسەللەرگە ئېرۋىتىۋېتىش ياكى بېنزاتىن پېنىتسىللىن بىلەن بىللە ئېندومېتاتسىن قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئەسۋە كەڭ دائىرىدە چىققانلارغا پېرىمىزوفىدىن $40mg \sim 30$ نى كۈنىگە 3~4 قېتىم ئىچكىۈزۈشكە بولىدۇ. داپسون ($50mg \sim 25$ دىن كۈنىگە 2 قېتىم) ياكى جۇڭگىيى دورىلىرىدىن مۇرەككەپ چول ياپۇزى يىلتىزى تاپلىتىشنى سىناق تەرىقىسىدە ئىشلىتىشكەمۇ بولىدۇ.

28. تۈگۈنلۈك قىزىل داغ

تۈگۈنلۈك قىزىل داغ — ھەقىقىي تېرە ۋە تېرە ئاستى توقۇلمىلىرىدىكى قان تومۇرلار ۋە ياغ پەردىنىڭ ئاللىبىرگىيىلىك ياللۇغىلىنىشىدىن پەيدا بولغان تۈگۈنلۈك تېرە كېسىلىدۇر.

كېسەللىك سەۋەبى: كۆپ خىل ئامىللار پەيدا قىلىنىدۇ. مەلۇم بولغان كېسەللىك قوزغا تىقۇچى سەۋەبلەردىن زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە (رېماتىزم قىزىتىمىسى، يۇتقۇن-چاقىياللۇغى)، تۈبىر كۈلۈز تاياقچە باكتېرىيىسى، زامبۇرۇغ، ۋىرۇس ۋە خىلامىدىدا دىن يۇقۇلمىنىش ياكى دورا قاتارلىقلار بار. مۇشۇلار كەلتۈرۈپ چىقارغان قان تومۇرلاردىكى كېچىكىكەن ئاللىبىرگىيە ياكى ئىممۇنىتەتلىق بىرىكمىلەرنىڭ چۆكۈۋېلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. بۇ كېسەللىك باشقا قىسمەن كېسەللىكلەر (ماخاۋرېئا كىمىيىسى ۋە بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلار كېمىيىسى) نىڭ ئالامىتىمۇ بولۇپ قالىدۇ.

كلىنىك ئىپادىلىرى: ياش ئاياللاردا ۋە ئەتىياز، كۈز پەسىللىرىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئەسۋە چىقىمىدىن بۇرۇن تۆۋەن قىزىتما، ماغدۇرسىزلىنىش، مۇسكۇل ۋە بوغۇملىرى تېلىپ ئاغرىش قاتارلىق پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلىرى بولىدۇ. ئاندىن كېيىن دۈگىلەك ياكى سوقىچاق شەكىللىك ئازراق تومپىيىمىپ چىققان، قىزىل ھەم ئىشىشىپ پارقىرىغان تۈگۈنچىلەر تۈركۈم - تۈركۈملەپ پەيدا بولىدۇ، ئۇلارنىڭ چوڭلۇقى پۇرچاق ياكى قولىنىڭ چوڭلۇقىدا بولىدۇ، چېگرىسى ئېنىق ئەمەس. قاتتىقلىق دەرىجىسى ئوتتۇرا ھال، باسسا ئاغرىيدۇ. سانى ئوخشاش ئەمەس، كۆپىنچە تارقاق بولىدۇ، پاچا قىنىڭ سوزۇلمىدىغان تەرىپىگە كۆپرەك چىقىدۇ، ئاز ساندىكىلىرى يوتا ۋە بىلەككە چىقىدۇ. كۆيىشەن دۇ ۋە ئاغرىيدۇ، تەخمىنەن بىر نەچچە ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن، رەڭگى ئاستا - ئاستا قارا تۇل قىزىل، جىگەررەك، ماش رەڭلىرىگە ئۆزگىرىدۇ، بۇزۇلمايدۇ، ئاخىرى يوقاپ كېتىدۇ، كېسەللىك جەريانى ئۈزۈلۈكىدىن چەكلىنىپ تۇرىدۇ، ئاز ساندىكىلىرى قايتا قوزغىلىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: ياش ئاياللاردا كۆپ بولىدىغانلىقى، ئىككى پاچاچىقىنىڭ سوزۇلغۇچى تەرەپلىرىدە رەڭگى ھەر خىل سۇلۇق ئىشىقلىق تۈگۈنچىلەرنىڭ بولىدىغانلىقى، ئاغرىش ۋە باسسا ئاغرىش قوشۇلۇپ كېلىشىگە، كېسەللىك جەريانىنىڭ ئۈزۈلۈكىدىن چەكلىنىپ تۇرۇشىغا ئاساسەن دىئاگنوز قويۇش قىيىن ئەمەس. قاتتىق قىزىل داغ ۋە تۈگۈنلۈك قان تومۇر ياللۇغى بىلەن ئۆز ئارا پەرقلىنىدۇرۇش لازىم. مەزكۇر باشتىكى مەزمۇنلارغا قارالسۇن.

داۋالاش: ئۆتكۈر دەۋردە ئارام ئېلىشقا، ئاغرىق پۇتمىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ يېتىش ۋە كۇمانلىق بولغان سەۋەبلەرنى چىقىرىپ تاشلاشقا دىققەت قىلىش لازىم.

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: قىزىتما قايتۇرۇپ ئاغرىق توختاتقۇچى دورىلاردىن ئاسپىرىن ياكى ئىندومېتاسىن (كۈنىگە 100 ~ 150 mg دىن) لارنى بېرىش لازىم. سەۋەبىگە قارىتا ئانتىبىيوتىكلارنى تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. ئەسۋە دائىرىسى كەڭ، ياللۇغ روشەن، ئاغرىشى قاتتىقراق بولغانلارغا يۇقىرىقىلار بىلەن بىللە پېرىدنىزول ياكى كالىي يودنى ئىچكىۈزۈشكە بولىدۇ.

2. جۇڭىيى دورىلىرىدىن نەملىكنى تازىلاپ ئىسسىقلىقنى ھەيدىگۈچى دورىلارغا، قاننى جانلاندۇرۇپ ئۇيۇشمىلارنى ئېرىتىپ چىكىۋالارنى ئىچىدىغان دورىلارنى قوشۇپ بېرىشكە بولىدۇ. سىشايۇڭ ئەنتاڭ قاينىتىمىسى ۋە شىياۋچىڭ دەنگە قوشۇپ ياكى ئازايتىپ بېرىشكە بولىدۇ.

38. قان تومۇر تۈگۈنلۈك ياللۇغى

قان تومۇر تۈگۈنلۈك ياللۇغى پۇتلاردا كۆپرەك بولىدۇ. تۈگۈنچە، ئاغرىشنى ئاساسىي ئىمپادە قىلغان تېرە سوزۇلما تۈگۈنلۈك كېسىلىدۇر. كېسەللىك جەريانى ئاساسەن بولۇپ، ھەمىشە قايتا قوزغىلىدۇ.

كېسەللىك سەۋەبى: سەۋەبى ئېنىق ئەمەس، ئېھتىمال ئاللىبىرگىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. سوزۇلما كېسەللىك ئوچىقى (يۇتقۇنچاق سوزۇلما ياللۇغى، بادام تەنچە ياللۇغى، چىرىگەن چىش قاتارلىقلار)، پۇتلارنىڭ قان ئايلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش كېسەللىكىنىڭ قوزغىلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن.

كلىنىك ئىمپادىلىرى: ئاياللاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. زەخىملىنىش ساغرىدىن تۆۋەنكى ئورۇنلاردا بولىدۇ، بولۇپمۇ پاچا قىنىڭ پۈكۈلگۈچى تەرەپلىرىدە كۆپرەك، ئاسادىيىمى ھاللاردا قوللارغا چىقىدۇ. گەۋدىگە بۆسۈپ كىرمەيدۇ. ئەسۋە ئاساسەن چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان تېرە ئاستى تۈگۈنچىسى ياكى داغ پارچىسى بولۇپ، تېرە يۈزىدىن ئازراق كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدۇ. سۇس قىزىل ياكى قارامتىل قىزىل، نەچچىدىن، نەچچە ئونغىچە بولىدۇ. پۇتۇنلەي سىمىتىرىك ئەمەس، بەزىلىرى يېپىسىمان تىزىلىدۇ، ئادەتتە يېرىلىمايدۇ. ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە ئاغرىيدۇ ۋە باسقاندا ئاغرىيدۇ، تۆۋەن قىزىتما، ھېرىپ - چارچاش، بوغۇملار ئاغرىش ۋە ئىشتىھاسىزلىق ئالامەتلىرىمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ. يېتىپ ئارام ئالغاندىن كېيىن ئالامەتلىرى كۆپىنچە يېنىمىگە يىدۇ، لېكىن ھەرىكەت قىلغاندىن كېيىن ئېغىرلايدۇ. تۈگۈنچە 4 ~ 2 ھەپتە ئەتراپىدا يوقىتىلىدۇ، پېگمېنت ئولتۇرۇشۇپ قالىدۇ ياكى تالالىق تۈگۈنچىگە ئايلىنىپ كېتىدۇ. كېسەللىك جەريانى سۆرەلمە بولۇپ، ئەتىياز، ياز پەسلىلىرىدە قايتا قوزغىلىدۇ.

دىئاگنوزى: قىزلاردا كۆپ كۆرۈلۈش، تېرە ئاستى تۈگۈنى پاچا قىنلارنىڭ پۈكۈلگۈچى تەرەپلىرىگە كۆپرەك چىقىش، كېسەللىك جەريانى سۆرەلمە بولۇش، ئەتىياز، ياز پەسلىلىرىدە قوزغىلىشتەك ئالاھىدىلىكلىرى بار. قاتتىق قىزىل داغ ۋە تۈگۈنلۈك قىزىل داغ بىلەن پەرقلىنىدۇرۇش شەرت. مەزكۇر بايقا ۋە سەككىزىنچى بايقا قارالسۇن.

داۋالاش: قوزغالغان مەزگىلدە يېتىپ ئارام ئېلىش كېرەك. ئادەتتە پېرىسان تىمىدىن 50mg ~ 25 دىن، كۈنىگە ئۈچ قېتىم ياكى پرومېلىن بېرىشكە، داپسوننى سىناق تەرىقىسىدە ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ. قاتتىق ئاغرىغان ۋە تۈگۈنچە ئۇزۇن مەزگىل يوقالماغانلارغا پېرىدنىزولغا پرومېلىننى قوشۇپ قىسقا ۋاقىت ئىشلىتىشنى ئويلىشىپ كۆرۈش شەرت. مۇرەككەپ چۆل يالپۇزى يىلتىزى ياكى چۆل يالپۇزى يىلتىزى تابلېتىنى قالدۇرۇپ ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ.

ئون يەتتىنچى باب قوشقۇچى توقۇلمىلار كېسەللىكلىرى

قوشقۇچى توقۇلما كېسەللىكلىرى شالاڭ قوشقۇچى توقۇلمىلارنىڭ شىلىمىش سۇلۇق ئىشلىتىشى ۋە تالالىق ئاقسىللاردەك ئۆزگىرىشكە ئىگە بولغان بىر گۇرۇپپا كېسەللىكتۇر. ئىمىمۇنولوگىيىنىڭ ئۇچقا ئىدەك تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، بۇ تۈردىكى كېسەللىكلەرنىڭ

فېئىدىن نۇرغۇنلىغان ئۆز بەدەنلىك ئانتىتېلالار بايقاپ چىقىلدى. شۇ ئۆز بەدەن ئىمى-
مۇئەتلىق كېسەللىكلەر دېگەن نام بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ گۇرۇپپىدىكى كېسەللىكلەر
قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى، تېرە - مۇسكۇل ياللۇغى، تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى، تۈ-
گۈنلۈك كۆپ ئارتېرىيەلەر ياللۇغى، رېماتوئىدلىق بوغۇم ياللۇغى ۋە رېماتىزم قىزىت-
مىسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ باقتا قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى بىلەن
تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز.

18. قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى

قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى — بىر خىل كۆپ ئۇچرايدىغان قوشقۇچى توقۇلمىلار يال-
لۇغلۇق كېسەلىدۇر. 40~11 ياشقىچە بولغان ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە تەخ-
سىمىيان ۋە سىستېمىلىقتىن ئىبارەت ئىككى تىپقا بۆلۈنىدۇ. ئالدىنقىسىدا زەخىملىنىش
تېرە بىلەنلا چەكلىنىدۇ، ئاز ساندىكىلىرى سىستېمىلىق بۆرە چاقىسىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ؛
كېيىنكىسىدە تېرىدىكى ئالاھىدىلىكلەردىن سىرت، يەنە نۇرغۇن سىستېمىلاردىكى توقۇلما ۋە
ئەزالارغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇ ئىككى تىپنىڭ ئوتتۇرىسىدا زىچ مۇناسىۋەت بار.
بۇ يەردە تەخسىمىيان قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسىنى نۇقتىلىق تونۇشتۇرۇپ ئۆتمەكچى-
مىز. سىستېمىلىق قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان مەزمۇنلار ئىچكى
كېسەللىكلەردە تەپسىلىي بايان قىلىندى.

كېسەللىك سەۋەبى: ئانچە ئېنىق ئەمەس. ئادەتتە ئىرسىيەت ئامىللىرى ۋە يەككە تە-
دىكى ئىممۇنىت سىستېمىسىنىڭ ئۆز-ئۆزىنى كونترول قىلىپ تۇرۇشى تەرتىپسىزلىنىشى بىلەن
مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىدۇ. دورىلار كۈن نۇرى، ۋىرۇس ياكى باكتېرىيىلەردىن يۇ-
قۇلىنىش قاتارلىق قىسمەن سىرتقى ئامىللار ئىممۇنىت تۇراقلىقىغا تەسىر كۆرسىتىپ،
ئىممۇنىتلىق ئاكتىپ ھۈجەيرىلەرنىڭ تۇيۇقسىز ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، توقۇل-
ما ۋە ھۈجەيرىلەرنىڭ ئانتىگېنلىق خۇسۇسىيىتىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۆز
بەدەنلىك ئانتىتېلا ھاسىل بولۇپ، ئىممۇنىتلىق بىرىكمىنى شەكىللەندۈرىدۇ. بۇ ھەرقا-
سى ئەزالاردىكى كىچىك قان تومۇرلارنىڭ ئىچكى پەردىسى ۋە تېرە نېگىز پەردىلىرىگە
چۆكۈۋېلىپ، كومپلېمېنتلارنى ئاكتىپلاشتۇرۇش بىلەن ياللۇغلىنىش رېئاك-
سىيىسىنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئىچكى ئاجراتما ئامىللىرى
ياكى زەخىملىنىشلەرمۇ قوزغاتقۇچى ئامىل بولالايدۇ.

كىلىنىك ئىپادىلىرى

1. تەخسىمىيان قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى (DLE): ئوتتۇرا ياشلىق ئەر - ئا-
ياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. مەڭىز، بۇرۇن ئۇچى، قاڭشار، قۇلاق، كالپۇك، قول ئارقىسى
قاتارلىق ئوچۇق تۇرىدىغان ئورۇنلاردا كۆپىرەك پەيدا بو-
لىدۇ. قاڭشار ۋە مەڭىز قىسمىغا چىققىنىنى ھەمىشە
ئۆزئارا بىرىكىپ، تىپىك كېيىنكە شەكىللىك زەخىملىنىشنى ھاسىل قىلىدۇ. ئاز ساندى-
كىسى پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىپ، تارقىلىشچان تەخسىمىيان قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى
(DLED) دەپ ئاتىلىدۇ، ئاساسلىقى سىستېمىلىق قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ.

زەخمىلىنىشنىڭ ئالاھىدىلىكى — چېگرىسى ئېنىق ھەم تېرە يۈزىدىن سەل كۆتۈرۈلگەن قىزىل رەڭلىك داغ پارچىسى بولۇپ، ئەتراپىنى چۆرىدەپ يېڭىيىپ ئولتۇرىشىدۇ. ئوتتۇرىسى يىڭىلەپ سەل ئويۇلىدۇ. سىرتقى كۆرۈنۈشى تەخسىگە ئوخشايدۇ (17، 1 - رەسىم). سىرتقى يۈزىدە يېپىشقاق تەڭگە قاسراق بولىدۇ، سويۇۋەتكەندىن كېيىن يېپىشقاق يۈزىدە مۇڭگۈزلەشكەن نوپۇشلارنىڭ كېڭىيىپ كەتكەن تۈك تۆشۈكچىلىرىدە قىسىلىپ قالغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ، كېسەللىك ئېغىرلاشقاندا قىل قان تومۇرلار كېڭىيىدۇ. يېنىك دەرىجىدە ئىنفېلىتراتسىيىلىنىدۇ، ئارىلاپ قىچىشىدۇ ۋە كۆيگەندەك سېزىم بولىدۇ، ئاز ساندىكى ئاغرىقلاردا چارچاش، بوغۇملىرى تېلىپ ئاغرىشتەك پۈتۈن بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولىدۇ، ئاز بىر قىسمى سىستېمىلىققا ياكى خاگاندا رايونغا ئۆزگىرىپ كەتكەندىن سىرت، كۆپ ساندىكىلىرىنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى، ئاغرىقنىڭ نۇرغۇن بولغان سېزىمچانلىقى روشەن بولىدۇ.

لابوراتورىيىدە تەكشۈرگەندە ئاز ساندىكى ئاغرىقلارنىڭ قېنىدىن قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى ھۈجەيرىسى (LEC) تېپىلىدۇ، يادرۇغا قارشى ئانتىبىيلا (ANA) مۇسبەت، تېرە زەخمىلىنىشكەن يەردىكى ئېگىز پەردىدە ئىممۇنىتېلىق جۈلالىق نۇر بەلچىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

2. سىستېمىلىق قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى: تېرىسى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپ سىستېما، كۆپ ئەزالارغا بىرلا ۋاقىتتا تەسىر كۆرسىتىدۇ. تېرىدىكى ئىپادىلىرى مەزكۇر كېسەلنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ئالامەتلىرىدۇر. يۈز قىسمىغا كېيىنكە شەكىللىك تارقىلىغان سۇلۇق ئىششىقلىق ئىنفېلىتراتسىيىلىك قىزىل داغ، پۇت - قول بارماقلىرىنىڭ ئۇچلىرى ۋە ئالغان - تاپانلىرىدىكى قان قېيىش توچكىلىرى، تىرناق ئاستىدىكى قىل قان تومۇرلار كېڭىيىش - مەزكۇر كېسەللىكنىڭ ئەڭ تېمىك ئالاھىدىلىكىدۇر. ئۇلاردىن باشقا سۇلۇق قاپارتقۇ، قانلىق قاپارتقۇ، تۈگۈنچە، نېكروز، يارا، سۆسۈن داغ ۋە چاچ چۈشۈشلەر پەيدا بولىدۇ، لېكىن ھەممىسى ۋاقىتلىق ۋە غەيرىي خاس ئىپادىلىرىدۇر. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە يەلتاشما ياكى كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ قوشۇلۇپ كېلىدۇ، باشقا سىستېمىلار - دىكى ئىپادىلىرى ئىچكى كېسەللىكلەردە تەپسىلىي سۆزلەندى.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: تەخسىمىسىمان قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسىغا دىئاگنوز قويۇشتا مۇھىمى كېيىنكە شەكىللىك قىزىل داغ، تەخسىمىسىمان ئىنفېلىتراتسىيىلىك زەخمىلىنىش، يېپىشقاق تەڭگە قاسراق، مۇڭگۈزلەشكەن نوپۇش ۋە تۈك تۆشۈكچىلىرىنىڭ كېڭىيىشى، شۇنداقلا نۇرغۇن بەزگۈر بولۇش قاتارلىقلارغا ئاساسلىنىدۇ. نۇرغۇن بەزگۈر تېرە كېسىلى، ياغ تەپچىشلىك تېرە ياللۇغى ۋە قىزىل بۇرۇن قاتارلىقلاردىن پەرقلىنىدۇرۇش كېرەك. مەزكۇر بايىنىڭ ئايرىم پاراگرافلىرىغا قارالسۇن.

داۋالاش

1. ئادەتتىكى پرىنسىپلار: كۈن نۇرى، ئۇلترا بىنەپشە نۇر ۋە سوغۇقنىڭ غەدىقلىشىدىن ساقلىنىش؛ نەپەس يوللىرى يۇقۇملانغانلىقىنى ئېلىش ھەمدە سوزۇلما كېسەللىك ئوچاقلىرىنى داۋالاش؛ يېنىتسىللىق، سۇلقانلار، ھىدرا لازىن قاتارلىق

دورلارنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش؛ ھامىلدارلارنى ساقلىنىشتا دېتتە قىلىش، كېسەللىكنىڭ ھەرىكەتچان دەۋرىدە توي قىلما سىلىق ۋە ھامىلدار بولما سىلىق لازىم.

2. تەخسىسىمان قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسىنى داۋالاش: ئادەتتە خلورو كۇيىنىم كۈنىگە $0.25 \sim 0.5g$ ياكى ئوكسىخلورو كۇيىنىم $0.2g$ دىن كۈنىگە $3 \sim 4$ قېتىم بېرىلىدۇ. ۋىتامىن E ، B_{12} لەرنى ئىشلىتىشكىمۇ ياكى بىسىمۇت سۇپا لىتسىيىلاتنى مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىشقىمۇ بولىدۇ. يېتىندىن بۇيان تامىدومىد (*Thalidomide*) بىلەن بۇ كېسەلنى داۋالاۋاتىدۇ، دەسلەپتە كۈنىگە $100 \sim 300mg$ ، ئالامىتى ياخشىلانغاندىن كېيىن كۈنىگە $50mg$ دىن بېرىلىدۇ، تارالما كېسەللەرگە ئاز مىقداردا كورتىمكوستروئىد ھورمونى بېرىشكە، جۇڭگىي دورىلىرىدىن چىڭ ئاۋسۇ ياكى اۋۋى دىخۇاڭۋەن كۇمۇلىچىنى تاللاپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

يەرلىك ئورۇنغا 5% لىك خىمىن، 5% لىك تىمىنى دىئوكسىد ياكى 5% لىك پارا-ئامىنو بېنزوئىك كىسلاتا ئىمۇلىسىيىسى قاتارلىق نۇردىن قوغدىغۇچى ياسالما لارنى سۈر-كەشكە ياكى كورتىمكوستروئىد زىماتىنى سۈركەشكىمۇ بولىدۇ. كىچىك زەخىملىنىشلەرنىڭ ئىچىگە كورتىمكوستروئىد ھورمونىنى ئوكۇل قىلىشقا ياكى قول دۈمبىسىدىكى چەكلىمە زەخىملىنىشنى سۇيۇقلاندۇرۇلغان ئازوتتا توڭلىتىپ داۋالاشقىمۇ بولىدۇ.

28. تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى

تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى — بىر خىل تېرە ياكى ئىچكى ئەزالاردىكى قان تومۇرلار دىۋارىدا كېسەللىك ئۆزگىرىشى يۈز بېرىدىغان ۋە قوشقۇچى توقۇلمىلار تاللىنىدىغان، كلىنىكىدا تەرەققىي قىلىشچان ئىششىق، قاتتىقلىشىش، يىگىلەش ئىپادىلىنىدىغان كېسەللىكتۇر. بۇ كېسەل چەكلىمە ۋە سىستېمىلىق ئىنسىپارەت ئىككى تىپقا بۆلۈنىدۇ. ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

كېسەللىك ئەۋەدى: ئېنىق ئەمەس. كوللاگېنىننىڭ بىرىكىشى كۆپىيىش، ئىچكى ئاجراتقىچىلاردا غەيرىي نورماللىق بولۇش، قان تومۇرلار سىمپازىملىنىش، سوزۇلما يۇقۇلمىنىش ياكى ئىرسىيەت قاتارلىق ئامىللار بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. ئاغرىقنىڭ قېنىدىن يادروغا قارشى ئانتىتېلانى تاپتىلى بولىدۇ. بۇ، مەزكۇر كېسەللىكنىڭ بىر خىل ئۆز-بە-دەن ئىمۇنىتېلىق كېسەللىك ئىكەنلىكىنى ناھايەن قىلىدۇ.

كلىنىك ئىپادىلىرى: تېرە چەكلىمە قاتتىقلىشىش كېسەلى ۋە سىستېمىلىق تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلىدىن ئىنسىپارەت ئىككى تىپقا بۆلۈنىدۇ.

1. تېرە چەكلىمە قاتتىقلىشىش كېسەلى: كېسەللىك كۆپىنچە 20 ياشتىن بۇرۇن قوزغىلىدۇ، ئادەتتە داغسىمان، توچكىسىمان ۋە بەلباغسىماندىن ئىنسىپارەت ئۈچ خىل بولىدۇ (17. 2-رەسىم).

(1) تېرە داغسىمان قاتتىقلىشىش كېسەلى: كۆپ ئۇچرايدۇ. بويۇن ياكى يۈزىگە كۆپرەك چىقىدۇ، سىمپىترىيىلىك ئەمەس، دەسلەپتە سۇس قىزىل سۇلۇق ئىششىقلىق داغ پارچىسى پەيدا بولۇپ، تەدرىجى كېڭىيىدۇ، ئوتتۇرىسى قاتتىق، چىشىك پارقىرايدۇ، ئەتراپىنى جىگەر رەڭلىك ھالقا ئوراپ تۇرىدۇ، تېرىدە تەز يوقىلىپ قۇرغا قىلىشىدۇ،

ئۆلگەلەر چۈشۈپ، يۈزى ئويۇلمىدۇ، ئاسان مەدىرلاتقىلى ۋە چىمداپ تۇتقىلى بولمايدۇ، ئېرە سۆڭەككە چايلەشمىپ قالغاندەك كۆرۈنىدۇ. ئاخىرىدا شۇ ئورۇن يىگىلەپ نېپىز لەپ، پېگمېنت ئولتۇرۇشىدۇ ياكى سۇسلىنىدۇ ۋە ياكى قىل قان تومۇرلار كېڭىيىپ، غەيرىي رەڭ-لىك كېسەللىكتەك ئىپادىلەنمىدۇ.

(2) تېرە توچكىسىمان قاتتىقلىشىش كېسەلى: بۇ تىپى ئازراق ئۇچرايدۇ. بويۇن، كۆكرەك ۋە مۇرە قاتارلىق ئورۇنلاردا كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. داغسىمان تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلىگە ئوخشىمىپ كېتىدۇ، سانى نىسبەتەن كۆپ، دائىرىسى كىچىكرەك، چىشتەك پارقراق قاتتىق توچكىسىلار پەيدا بولىدۇ، ئەتراپىغا پېگمېنت ئولتۇرۇشىدۇ، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى يىگىلەش يۈز بېرىدۇ.

(3) تېرە بەلباغسىمان قاتتىقلىشىش كېسەلى: ھەمىشە بىر تەرەپ مۇچىلەر، قوۋۇر-غىلار ياكى بەل، قورساقنى بويلاپ بەلباغسىمان تارقىلىدۇ. پېشائە ئوتتۇرىسىدا كۆرۈل-سە پىچاققا كېسىۋەتكەندەك تاتۇق بولۇپ قالىدۇ، ھەمىشە يۈزىنىڭ بىر قىسمى يىگى-لەش قوشۇلىدۇ، تېرە داغسىمان قاتتىقلىشىش كېسەلىنىڭكىگە ئوخشىمىپ كېتىدۇ، لېكىن ئالاسىمان ئويۇلۇش روشەن بولىدۇ، چوڭقۇر قىسمىغا بۆسۈپ كىرىدۇ، بەزىدە مۇسكۇل، ھەتتا سۆڭەك مۇيىگىلەيدۇ، ئون ياشتىن كىچىك بالىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

2. سىستېمىلىق تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى: چوڭ ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. تېرە قاتتىقلاشقاندىن سىرت، بوغۇم ۋە ئىچكى ئەزالارمۇ زەخمىلىنىدۇ، ئەسۋە چىقىشتىن بۇرۇن تۆۋەن قىزىتىپ، كۆپ تەرلەش، كىچىك بوغۇملار ئاغرىش، رايىنا ئۇد (Raynaud) ھال-دىمىسى بولىدۇ. ئادەتتە ئىككى تىپقا بۆلىنىدۇ:

(1) مۇچە ئۇچلىرى قاتتىقلىشىش كېسەلى: كۆپىنچە پۇت - قول بارماقلىرىنىڭ يۈ-رەككە يىراق ئۇچلىرىدىن يېقىن ئۇچلىرىغا قاراپ تەرەققىي قىلىدۇ. زەخمىيە ئۇيۇل مەد-دىلىق ئىششىق، كۆكىرىش، كۆپ تەرلەشتىن ئىبارەت بولۇپ، ئاندىن كېيىن قاتتىقلىشىدۇ، رەڭ-گى قارامتۇل، ئارىلىقلىرىدا ئاق رەڭلىك داغ توچكىلىرى بولىدۇ ۋە شامدەك پارقراي-دۇ، چىمىدىغىلى بولمايدۇ؛ تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ تېرە قاتتىقلىشىدۇ، بارماقلار ئىنچىكىلەپ قاتتىدۇ، مەمىكىسى بوقىلىدۇ، بۇرنى ئۇچلىنىدۇ، كۆز يېرىقى كىچىكلەيدۇ، كالپۇكى نېپىز-لەپ، ئاغزى كىچىكلەيدۇ. ئېغىز ئېچىشى قىيىنلىشىدۇ؛ ئاخىرىدا تېرىسى يىگىلەيدۇ، ھەتتا تېرە ئاستى توقۇلمىلىرى ۋە مۇسكۇللارغىمۇ تەسىر كۆرسىتىدۇ، ئورۇقلاپ خۇددى مومىادەك بولۇپ قالىدۇ. ئاخىرقى دەۋردە قاتتىقلىشىش يېنىكىلەيدۇ، ئاز تەرلەيدۇ ۋە چېچى چۈشىدۇ. ئاز ساندىكى كېسەللەردە نېكروزلىنىش ۋە بۇزۇلۇش يۈز بېرىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ ئاقمۇدىتى ھەر ھالدا ياخشى بولىدۇ.

(2) يېپىلىما سىستېمىلىق تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلى: ئاز ئۇچرايدۇ، زەخمىلىنىش مۇ-چە ئۇچلىرى قاتتىقلىشىش كېسەلى بىلەن ئاساسەن ئوخشاش، لېكىن تېز تەرەققىي قىلى-دۇ. گەۋدە ۋە يۈز قىسمىدىن باشلىنىپ، ئاخىرىدا پۇتۇن بەدەنگە تارقالىدۇ. ئىچكى ئەزالار زەخمىلىنىدۇ، بوغۇملار، ئۆپكە ۋە قىزىلىۋاتقانچەلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ، ئۇلاردىن باشقا يۈرەك، ئاشقازان - ئۇچەي، بۆرەك ۋە مۇسكۇللارغىمۇ تەسىر كۆرسىتىدۇ، ئاقمۇدىتى ناچارراق بولىدۇ.

سىستېمىلىق تېرە قاتتىقلىشىش كېسەلىدە، قاننىڭ چۆكۈشى تېزلىشىدۇ، IGG كۆپىيىدۇ.

يادروغا قارشى ئانتىتېلا ۋە رېماتوئىد فاكتورى مۇسپى بولىدۇ، ئەگەر مۇناسىۋەتلىك ئىچكى ئەزالارغا تەسىر كۆرسەتسە، لاپوراتورىيىدە مۇناسىۋەتلىك كېلىپ چىقىدۇ. دەئاگنوزى: تېرە چەكلىك قاتتىقلىشىش كېسىلىدىكى داغسىمان ياكى بەلباغسىمان ئىشىغان قاتتىقلىشىش، جىگەر رەڭلىك ھالقا ۋە چىشتەك پارقىراش، ئاخىرقى دەۋردە يىگىلەپ نېپىز لەشلەرگە ئاساسلانغاندا، دەئاگنوز قويۇش قىيىن ئەمەس؛ سىستېمىلىق تېرە قاتتىقلىشىش كېسىلىدىكى كەڭ دائىرىلىك زەخمىلەنىش، قاتتىقلىشىپ يىگىلەش، دائىم رايىنا ئۇد ھادىسىسى پەيدا بولۇش ھەمدە ئىچكى ئەزالارغا تەسىر كۆرسىتىشلەردىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ.

داۋالاش: تېخىچە قانائەتلىنەرلىك داۋالاش ئۇسۇلى يوق. ئوزۇقلۇقنى كۈچەيتىش، ئارام ئېلىشقا دىققەت قىلىش، ئۆزىنى ئىسسىق تۇتۇش، تاماكا چەكمەسلىك، زەخمىلەنىشتىن ساقلىنىش شەرت.

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: چەكلىك تېرە قاتتىقلىشىش كېسىلىگە، تىرىشما مىكىنو-لۇن ياكى پېرىدنىزولونغا تەڭ مىقداردا پروكاينى قوشۇپ يەرلىك ئورۇننى قالمىشقا بولىدۇ. ۋىتامىن E دىن كۈنىگە 60~150mg دىن ئىچكىۈزۈش ياكى خورو كۇيىن (ئون ئۈچىنچى ۋە ئون يەتتىنچى بايلارغا قارالسۇن) ئىچكىۈزۈشكىمۇ، دەسلەپكى دەۋرلىك سىستېمىلىق تېرە قاتتىقلىشىش كېسىلىگە ۋىتامىن E قاتارلىق دورىلارنى بەرگەندىن سىرت، قىسقا ۋاقىت كورتىكوستېروئىد ھورمونىنى ئېھتىيات بىلەن ئىچكىۈزۈپ بېقىشقا ياكى ئىممۇنىت تور-مۇزلىغۇچى ياسالغىلارنى قوشۇپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. رايىنا ئۇد ھادىسىسى بارلارغا قان تومۇرلارنى كېڭەيتىشكۈچى دورىلارنى ئىشلىتىشكە، ھەسلىن: تۆۋەن مولېكۇلىلىق دېكىستېران ياكى دەنسىن ئوكۇلىنى قوشۇپ ۋېنا دىن تېمىتىشقا، نىكوتىن ھەمدە رېزېرپىن ياكى تولازولسىن قاتارلىقلارنى ئىچكىۈزۈشكە، قوشۇمچى توقۇلمىلارنى يۇمشاتقۇچى دورىلاردىن D - پېنتىسىللامىن، ناترىي ئېرېتات، ئۇروكىنازىلارنى مۇۋاپىق ھالدا ماسلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

2. جۇڭخى دورىلىرى: ئادەتتە مۇسپىيلىكنى يۆلەپ ئىللىتىش، قاننى جان-لاندۇرۇپ، ئۇيۇلمىلارنى ئېرىتىپ داۋالايدۇ. مەسىلەن: دەنسىن ئوكۇلى، تاۋخۇڭسۇۋتاڭ قاينا تىمىسى، ياڭ خېتاڭ قاينا تىمىسى قوشۇپ ياكى كېمەيتىلىپ بېرىلىدۇ.

3. باشقا داۋالاش ئۇسۇللىرى: ئاۋاز چاستوتىسى، موم بىلەن داۋالاش، ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ داۋالاش، سۇۋاننىمىدا داۋالاش، ئۇۋۇلاش قاتارلىقلارنى سىناپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ، ھىتا لۇرونىمىدا ياكى قاننى جانلاندۇرۇپ ئۇيۇلمىلارنى ئېرىتىشكۈچى جۇڭخى دورىلىرىنى ئىمۇنىلاشتۇرۇپ كىرگۈزۈش ياكى 1% لىك ناترىي نېتروگامىتېرىن ھەللىمىنى سۈر-كەش لازىم.

ئون سەككىزىنچى باب تېرە قوشۇمچە ئەزالىرىدىكى كېسەللەكلەر

18. ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللۇغى

ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللۇغى — تېرىدىن ياغ تەپچىش ئاساسىدا پەيدا بولىدىغان بىر خىل سوزۇلما تېرە ياللۇغىدۇر.

كېسەللىك سەۋەبى: ئېنىق ئەمەس. تۇغما ياغ تەپچىش تەن ساپاسىدا، تېرىدىن ياغ زىيادە تەپچىپ چىققانلىقتىن، تېرىدىكى مايفاما يىل زامبۇرۇغ (سوقىچاق كېپەكلەشتۈرگۈچى سېپو-رىلىق باكتېرىيە ۋە باكتېرىيىلەر (دانمخورەك تاياقچە باكتېرىيىسى) دىن يۇقۇملانغان ئىككىلەمچى ياللۇغ بولۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا، روھىي ئامىللار، ئىچكى ئاجراتمىلار تەرتىپسىزلىنىش، ماددا ئالماشتۇرۇش توسقۇنلۇققا ئۇچراش، تازىلىق ناچار بولۇش، ھاراق ئىچىش، مايلىق ۋە قەنىلىك يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش قاتارلىق ئامىللار مۇقۇزغىتىدۇ.

كلىنىك ئىپادىلىرى: چوڭلاردا ۋە بوۋاقلاردا كۆپ بولىدۇ. زەخمىلىنىش ھەمىشە سىمىتىر يىلىك ھالدا تېرە ياغ بەزىلىرى ئىسبەتەن كۆپ بولغان ئورۇنلاردا يۈز بېرىدۇ، مەسىلەن: باش، قاش يايى، قاپاق، بۇرۇن - كاپۇك ئېرىقچىسى، قۇلاق كەينى، قولتۇق، تۆش سۆڭىكى ئالدى، تاغاق ئارىلىق رايونى قاتارلىق ئورۇنلاردا دەسلەپتە پارچە - پارچە ياكى توپ - توپ بولۇپ تۈك خالىتىلىق دۆڭچە ئەسۋە چىقىدۇ. ئاندىن كېيىن بىرلىشىپ سۇلۇق ئىششەتلىق سۇس سېرىق قىزىل رەڭلىك داغقا ئايلىنىپ كېتىدۇ، تۆپىدە مايلىق تەڭگە قاسراق ياكى قاچ بولىدۇ، چېگرىسى ئېنىق، ئادەتتە سۇلۇق قاپارتقۇ بولمايدۇ. لېكىن مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىنمىسا، شەلۋەرەپ سىرغىما سۇيۇقلۇق چىقىپ ھۆل تەم-رەتكىدەك ئۆزگىرىپ كېتىدۇ ياكى قوشۇمچە يۈزۈملىنىدۇ. پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىپ قىلىپ زىرپ كېپەكلىشىشىمۇ مۇمكىن. بۇ، ياغ تەپچىيدىغان تېرە قىزىرىش كېسەلى دەپ ئاتىلىدۇ. قىچىشىدۇ، چوڭلاردا ھەمىشە ياغ تەپچىش خاراكتېرلىك چېچى چۈشىدۇ، بوۋاقلاردىكى ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللۇغى بەشىنچى باب بەشىنچى پاراگرافتا تەپسىلىي بايان قىلىندى.

دىئاگنوزى ۋە سېلىشتۇرما دىئاگنوزى: تېرە ياغ بەزىلىرى كۆپرەك ئورۇنلارغا ئاسان چىقىدىغانلىقى، سۇلۇق ئىششەتلىق سۇس سېرىق قىزىل رەڭلىك داغ بولىدىغانلىقى، تۆپىسىدە مايلىق تەڭگە قاسراق ياكى قاچ بولىدىغانلىقى، ياغ تەپچىش، چاچ چۈشۈش قوشۇلۇپ كېلىش، قىچىشىش قاتارلىقلارغا ئاساسلىنىپ دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ. باش تېرىسى تەڭگە تەمرەتكىسى، قىزىلگۈل توپان ئەسۋەسى، ھۆل تەمرەتكە قاتارلىقلار بىلەن پەرقلەندۈرۈش شەرت (مۇناسىۋەتلىك بازلارغا قارالسۇن).

داۋالاش

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ۋىتامىن B_{12} ، B_8 ، B_2 ياكى قىچىشىشنى ئوڭشاشقا تاقۇچى تىنچلاندۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئاساسلىقى ئىپتىدائىي قىلارغا

كورىمكوسىروئىدھورمولىمىرى ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر يۇقۇرۇقۇملىنىش قوشۇلۇپ كەلسە ئانتىبىيوتىك لارنى قوشۇپ بېرىش لازىم.

2. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ياغسىزلاندۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، مىكروب ئۆلتۈرۈش، قىچىشىنى توختىتىش پرىنسىپ قىلىنىدۇ. ئەھۋالغا قاراپ 5% لىك گۇڭگۇرت زىماتى، مۇرەككەپ گۇڭگۇرتلۇق سۇيۇقلۇق، ئاق رەڭلىك سۇيۇقلۇق، 1% لىك نېئومەتسىن مېپى، 2% لىك خلورومىتسىتەنلىق ئىسپىرت ياكى كورىمكوسىروئىد زىماتى قاتارلىقلارنى تاللاپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ، سىرغىما سۇيۇقلۇق كۆپ بولغانلارغا 3% لىك دانىكا كىسلاتا ئېرىتمىسى ھۆل كومپرىس قىلىنىدۇ. ئۇلاردىن باشقا دانىكا ئېرىتمىسى، ناترىي ھىدروكاربوناتلارنى ئىشلىتىشكە ياكى گۇڭگۇرتلۇق سوپۇندا يۇيۇنۇشقىمۇ بولىدۇ.

3. كۈتۈنۈش: تازىلىققا دىققەت قىلىش، ئاچچىق - چۈچۈك يېمەكلىكلەرنى ئازىتىش تېجىمال قىلىش، ھاراق ئىچمەسلىك، كۆكتاتلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىپ چوڭ تەرەتتىڭارا-ۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش، ئەگەر قەۋزىيەت بولسا، سانادىن 8g ~ 5 ئىچكىۈزۈلىدۇ. ئادەتتە 5 ~ 3 كۈندە بىر قېتىم باشنى يۇيسا بولىدۇ، لېكىن قاتتىق تاتىلاپ يۇيۇشقا ياكى بەك كۈچلۈك ئىشقارلىق سوپۇن ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

28. ئاددىي دانىخورەك

دانىخورەك ياشلىق دەۋرىدە كۆپ كۆرۈلىدىغان بىر خىل تۈك خالىتىمى، تېرە ياغ بەزىلىرىنىڭ سوزۇلما ياللۇغىدۇر.

كېسەللىك سەۋەبى: ئادەتتە ئىچكى ئاجراتمىلار، تېرە ياغ بەزىلىرى پائالىيىتى ۋە باكتېرىيىلەردىن يۇقۇملىنىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىدۇ. بالاغەتكە يېتىش دەۋرىدە ئەر-لىك ھورمون كۆپىيىپ، تېرە ياغ بەزىلىرىنى غىدىقلاپ يېتىلدۈرۈپ، ئاجرىتىپ چىقىرىشنى ئۇرغىتىدۇ ھەمدە تۈك خالىتىمىنىڭ تېرە ياغ بەزى كانىلى دىۋارى مۇڭگۈزلىشىپ، يېپىش قاقلىقى ئېشىپ، تېرە يېغىنىڭ چىقىرىلىشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ياغ نوڭ-چىسى (دانىخورەك) شەكىللىنىدۇ. بۇ ۋاقىتتا تۈك خالىتىمى ئىچىدىكى دانىخورەك تاياقچە باكتېرىيىسىگە نىسبەتەن ھالدا ئوكسىگېن يېتىشمەي كۆپ مىقداردا كۆپىيىپ، تېرە يېغىنى پارچىلاپ، ئەركىن ياغ كىسلاتاسىنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ تۈك خالىتىمىنى غىدىقلاپ ۋە زەخمىلەندۈرۈپ، تۈك خالىتىمى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ھەقىقىي تېرىدە ياللۇغلىنىش رېئاكسىيىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا روھىي ۋە ئىرسىي ئامىللارمۇ قىسمەن ئاغرىقلاردا مەزكۇر كېسەلنى قوزغىتىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: ياش ئوغۇل - قىزلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. يۈز، پېشانە، دۈھىمىنىڭ يۇقىرىقى قىسمى، يوتا قاتارلىق تېرە ياغ بەزىلىرى نىسبەتەن كۆپ بولغان ئورۇنلارغا كۆپرەك چىقىدۇ. دەسلەپتە نورمال تېرە بىلەن ئوخشاش رەڭدىكى تارقاق تۈك خالىتىملىق دۆڭچە ئەسۋە بارلىققا كېلىپ، ئۇچىدا سېرىق توچكا بولىدۇ، سىتسا سۇس سېرىق ياغ نوڭچىسى چىقىدۇ. ئەگەر تۈك خالىتىمىنىڭ ئېغىزى ئوچۇق بولسا، ياغ نوڭچىسىنىڭ ئۇچى ۋاقىت ئۇزارغانسېرى قۇرۇپ، ئوكسىدلىنىپ قارىيىدۇ، بۇ قارا ئۇچلۇق دانىخورەك

3) سىنىمىك فوسفات كۈنىمگە $0.4 \sim 0.6g$ دىن ئۈچ ئاي ئىچىكۈزۈلىدۇ. بۇ، قان زەردىپ
چىدا سىنىمىك مىقدارى ئاز بولغان ئاغرىقلارغا سىناق تەرتىپىدە ئىشلىتىلىدۇ.

38. قىزىل بۇرۇن

قىزىل بۇرۇن — يۈز قىسمىدا يۈز بېرىدىغان يېپىلما، قىزغۇچ، قىل قان تومۇرلار كېڭىيىپ
يېمىدىغان ۋە دۆڭچە ئەسۋە، يىرىڭلىق قاپارتقۇلارنى ئاساس قىلىدىغان سوزۇلما تېرە كېسىلىدۇر.
كېسەللىك سەۋەبى: ئېنىق ئەمەس. تېرىدىن ياغ تەپچىپ چىقىش ئاساسىدا، قان
تومۇرلارنى ھەرىكەتلىەندۈرگۈچى، نېرۋا فۇنكسىيەسى تەرتىپسىزلىنىپ، قان تومۇرلارنى داۋام
لىق كېڭەيتىش نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. ئىچكى ئاجراتمىلار تەرتىپسىزلىنىش،
كېسەللىك ئوچا قلىرى يۇقۇملىنىش، ھاراق ئىچىش، كەيپىياتى جىددىيلىشىش ۋە سوغۇق،
ئىسسىقلىقلار غىدىقلاش قاتارلىقلارمۇ بۇ كېسەلنى قوزغىتىدۇ. بەزىلەر تۈك خالتا قۇرتىنىڭ
پارازىتىلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارايدۇ.
كىلىنىك ئىپادىلىرى: كېسەللىك ئەھۋالىغا ئاساسەن ئۈچ دەۋرگە بۆلۈشكە بولىدۇ.
لېكىن ھەر قايسى دەۋرلەر ئارىسىدا ئېنىق چېگرا يوق.

1. قىزىل داغ دەۋرى: دەسلەپتە قىزىل داغ بارلىققا كېلىدۇ. بولۇپمۇ غىدىقلىغۇچى
يېپەكلىكلىرىنى ئىستېمال قىلغاندا، ھاياجانلانغاندا ياكى ھەيزنىڭ ئالدى - كەينىدە ۋە
رىدە رەڭگى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. دەسلەپتە ۋاقىتلىق، كۆپ قېتىم قوزغالغان
دىن كېيىن تۇرۇپ قالىدۇ ھەمدە قىل قان تومۇرلار شاخسىمان كېڭىيىدۇ. زەخمىلىنىش
ھەمىشە بۇرۇن ئۇچى، بۇرۇن قاناتلىرى، قوۋۇزلار ۋە ئېڭەكتە ئەڭ روشەن بولىدۇ.

2. دۆڭچە ئەسۋە يىرىڭلىق قاپارتقۇ دەۋرى: قىزىل داغ ئۈستىگە توپ - توپ دا
نىخۇرەكتەك دۆڭچە ئەسۋە، يىرىڭلىق قاپارتقۇ قايتا - قايتا چىقىدۇ. لېكىن دىنخۇرەك
شەكىللەنمەيدۇ (2.18 - رەسىم). قىل قان تومۇرلارنىڭ كېڭىيىشى ئەڭ روشەن بولىدۇ.
ئاز ساندىكى ئاغرىقلاردا قاپاق گىرۋىكى ياللۇغى، بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى، مۇڭگۈز
پەردە ياللۇغى ياكى رەڭدار پەردە ياللۇغى قاتارلىقلار قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

3. بۇرۇن سۆڭىلى دەۋرى: ۋاقتى ئۇزۇنلارنىڭ بۇرۇن قىسمىدىكى قوشقۇچى توقۇلمى
مىلىرى ۋە تېرە ياغ بەزىلىرى ئۆسۈپ، بۇرۇن ئۇچى ۋە قانىمدا چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش
بولمىغان، چىگەرە رەڭلىك تۈگۈنچە ياكى خالىملىق ئىششىق شەكىللىنىدۇ. يۈزى ئې
گىز - پەس مۇنەكسىمان بولۇپ، تۈك تۆشۈكچىلىرى كېڭىيىدۇ، سىقسا ئاق رەڭلىك يېپ
چىشقاق تېرە يېغى چىقىدۇ. بۇ تېپى دۆلىتىمىزدە ئاز ئۇچرايدۇ.

بۇ كېسەل ئوتتۇرا ياشلىق ئاياللاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. لېكىن بۇرۇن سۆڭىلى ئەر
لەردە كۆپ كۈرۈلىدۇ، ئېنىق ھىسسىي ئالامەتلىرى بولمايدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولىدۇ.
دەسلەپكى ئىپادىسى: دىئاگنوزىنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى —
ئوتتۇرا ياشلىقلاردا پەيدا بولۇش، يۈز قىسمىدىكى قىزىل داغ، قىل قان تومۇرلار كېڭىيىش،

دۆڭچە ئەسۋە ۋە يىرىڭلىق قاپار تىقۇلار پەيدا بولۇش، ھەتتا بۇرۇن قىسمى چوڭىيىش ۋە كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇشتىن ئىبارەت. دانىخورەك، قىزىل داغلىق بۇرە چاقىسى قاتارلىقلار بىلەن پەرقلەندۈرۈش شەرت. ئون يەتتىنچى، ئون سەككىزىنچى بايلارغا قارالسۇن.

داۋالاش

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ۋىتامىن B_1 ، B_2 قاتارلىق دورىلارنى ئىچكۈ-زۈشكە بولىدۇ. خاوروگۇنىن ($0.25g$ دىن كۈنىگە ئىككى قېتىم، ئىككى ھەپتىدىن كېيىن بىر قېتىمغا چۈشۈرۈپ ئۇدا 2~1 ئاي بېرىلىدۇ)، تېتراتسىكلين (ئۇسۇلى دانىخورەكنىڭ كىگە ئوخشاش) ۋە مېترونىدازول ($0.2g$ دىن كۈنىگە 3~2 قېتىمدىن 4~2 ھەپتە ئىچى-كۈزۈلىدۇ) قاتارلىقلارنىمۇ ئاللاپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ ۋە ياكى 0.25% لىك پروكاينىنى ئىككى تەرەپتىكى بۇرۇن - كاپۇك ئېرىتمىنى بويلاپ توچكىسىمان قالمىقىمۇ بولىدۇ.

2. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: دانىخورەكنى داۋالاشقا ئاساسەن ئوخشاش، 5% لىك مېترونىدازول مەلھىمىنى ئىشلەتمىمۇ بولىدۇ.

3. باشقىلار: ھاراق ۋە ئاچچىق - چۈچۈك يېمەكلىكلەردىن پەرھىز تۇتۇش، چوڭ تەرەتتىنڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش، سوغۇق ۋە ئىسسىق ئۆتۈشتىن ساقلىنىش، ئىچكى ئاجراتمىلار ۋە ئاشقازان - ئۈچەيلەرنىڭ فۇنكسىيەسىنى تەڭشەش. ئەگەر بۇرۇن سۆڭىكى پەيدا بولۇپ بولغان بولسا، جىجىپ كېلىش ئۇسۇلى بويىچە ئوپېراتسىيە قىلىش لازىم.

48. دائىرىلىك چاچ چۈشۈش

دائىرىلىك چۈچ چۈشۈش ئادەتتە «يىلپىز يالاش» دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ بىرخىل تۇيۇق-سىز يۈز بېرىدىغان چەكلىك داغسىمان چاچ چۈشۈشتۈر.

كېسەللىك سەۋەبى: تېخىچە ئېنىق ئەمەس. كەيپىيات جىددىيلىشىش، ئۆز بەدەنلىك ئىسمىنى، ئىرسىيەت ئامىلى ياكى ئىچكى ئاجراتمىلار قالايمىقانلىشىش قاتارلىقلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن.

كېلىنىك ئەپادىلىرى: ياش - ئوتتۇرا ياشلىقلاردا كۆپرەك بولىدۇ. چاچ بىلىنىمەيلا چەكلىك دائىرىدە دۈگىلەك ياكى سوقمىچاق شەكلىدە تۇيۇقسىز چۈشۈپ كېتىدۇ (18. 3 - رەسىم). ھەمىشە باشقىلار تەرىپىدىن بايقىلىدۇ. يەرلىك ئورۇن پارقراق بولۇپ، ياللۇغلىنىش ھادىسىسى بولمايدۇ. چاچ چۈشكەن دائىرى ئەتراپىدىكى چاچلار بوشاپ كېتىدۇ ياكى تېرىگە يېقىن يەر-دىن ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ، ئۈزۈۋېلىنغان بوش چاچنىڭ ئۈستى توم، ئاستى ئىنچىكە بولۇپ، ئۈندەش بەلگىسى (!) گە ئوخشاپ قالىدۇ. چاچ چۈشۈش دائىرىسى ۋە سانى ئوخشاش بولمايدۇ، ئەگەر چاچنىڭ ھەممىسى چۈشۈپ كەتسە، چاچ پۈتۈنلەي چۈشۈش دەپ ئاتىلىدۇ؛ مۇبادا قاش، ساقال - بۇرۇت، قولتۇق، جىمىسى ئەزالاردىكى تۈكلەرمۇ چۈشۈپ كەتسە، ئومۇميۈزلۈك چۈشۈش دەپ ئاتىلىدۇ. كېسەللىك جەريانى بىر نەچچە ئاي ياكى بىر نەچچە يىلغىچە داۋاملىشىدۇ، ئۈزلۈكسىز ئۆسمۈر ياكى بىر تەرەپتىن ئۆسۈپ، بىر تەرەپتىن چۈشىدۇ. يېڭىدىن ئۆسكەن چاچ دەسلەپتە ئىنچىكە، ئاقۇش كۈلرەك بولىدۇ، كېيىن ئاستا - ئاستا توملىشىپ قارىيىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە مېلېشتۇرما دىئاگنوزى: چاچ تۇيۇقسىز دۈگىلەك ۋە سوقمىچاق

شەكىلدە داغسىمان چۈشۈش، چاچ چۈشكەن ئورۇندا ياللۇغلىنىش ھادىسىسى بولماسلىقى، سىلىق، پارقمراق بولۇش، ھېچقانداق ھېسسىي ئالامەت بولماسلىقى قاتارلىقلارغا ئاساسەن دىئاگنوزنى مۇقىملاشتۇرۇشقا بولىدۇ. بۇنى سېرىق تەمرەتكە، باش تېرىسى دائىرىلىك قاتتىقلىشىش كېسىلى ۋە ياغ تەپچىلىك چاچ چۈشۈشلەر بىلەن پەرقلىنىدۇرۇش شەرت. مۇناسىۋەتلىك باب، پاراگرافلارغا قارالسۇن.

داۋالاش

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: تىنچلاندۇرغۇچى دورىلار، B گۇرۇپپىدىكى ۋىتامىنلار، سىستېمى، كالىتېمى پانتوتېنات قاتارلىقلار. چېچى پۈتۈنلەي چۈشكەن ياكى بەدەن تۈكلىرى ئومۇميۈزلۈك چۈشكەن ئاغرىقلارغا كورتىكوستېروئىد ھورمونلارنى بېرىشنى ئويلىشىپ كۆرۈشكە بولىدۇ. قالغان بەزى فۇنكسىيىسى تۆۋەنلىگەن ئاغرىقلارغا تىروپىدىن تا بېلېتى $30 \sim 60mg$ دىن كۈنىگە ئۈچ قېتىم ئىچكىزۈلىدۇ.
2. يەرلىك ئورۇنغا ئوكۇل قىلىش: دائىرىسى كىچىك بولسا، پېرىمىزولون لەيلىمە سۇيۇقلۇقىغا تەڭ مىقداردا 1% لىك پروكاىمىن ھىدروخلورىد قوشۇپ شۇ ئورۇندىكى تېرىگە ياكى تېرە ئاستىغا توپچىكىسىمان ئوكۇل قىلىنىدۇ، قاينىتىپ دېزىنېفىكسىيە قىلىنىغان يېڭى سۈتنى ئوكۇل قىلىشقىمۇ بولىدۇ. يۇقىرىدا ئېيتىلغان دورىلارنىڭ ھەرقايسىسىدىن $0.1ml$ دىن ھەپتىدە بىر قېتىمدىن ئون قېتىم ئوكۇل قىلىنسا بىر داۋالاش كۇرسى ھېسابلىنىدۇ. ۋىتامىن E ياكى B_{12} نى يەرلىك ئورۇنغا ئوكۇل قىلىشقىمۇ بولىدۇ.
3. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: يەرلىك ئورۇننىڭ قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاپ، چاچنىڭ ئۆسۈشىنى تېزلىتىشنى مەقسەت قىلىنىدۇ. 1% لىك ئالا قوڭغۇز تىنىك تۇرىسى، لازا تىنىكتۇرىسى، خام زەنجىۋىل، كورتىكوستېروئىد ھورمونلار، دېمېتېل سۇلفوكسىد، 0.5% لىك مۇستارىگېن ئىسپىرتى ياكى 1% لىك مىنوگىسىدېل مەلھىمىنى سۈركىسە بولىدۇ. دىئېتروخلورو بېنزىن يولۇقۇشتىن بولغان تېرە ياللۇغىنى ئۆزگەرتىپ، ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.
4. فىزىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى: ئۇلترا بىنەپشە نۇر، رېزونانس ئۇچقۇنى، گېلىي - نېئونى قوزغىتىلغان نۇرى قاتارلىقلار.
5. جۇڭگىيى تىبابىتىدە جىگەر - بۆرەكنى ئوزۇقلاندۇرۇش، قاننى قۇۋۋەتلەپ يەلنى ھەيدەپ داۋالاش پرىنسىپ قىلىنىدۇ. شۇۋۇپېن، شىڭيېڭ ياڭچېندەنلەر ئىشلىتىلىدۇ.

ئون توققۇزىنچى باب تېرىدىكى ياخشى سۈپەتلىك ئۆسۈملەر

18. تاتۇق ئۆسۈمچىسى

تاتۇق ئۆسۈمچىسى — تېرە زەخمىلەنگەندىن كېيىن قوشقۇچى توقۇلمىلارنىڭ زىيادە ئۆسۈشىدىن شەكىللىنىدىغان ياخشى سۈپەتلىك ئۆسۈمچىسى.

كېسەللىك سەۋەبى: ئىرسىيەت، ئۆز بەدەن ئىممۇنىتى ياكى ئىچكى ئاجراتمىلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. بىر قىسىم تاتۇق ئۆسۈمچىگە مايىل تەنلىك ئادەملەردە،

يارىلىنىش، ئوپېراتسىيە قىلىش، كېرىپ تىكىش، ئوكۇل قىلىش، يۇقۇلمىنىش، دانمخۇ-
رەكنى سىقىۋېتىش قاتارلىقلار ھەمىشە مەزكۇر كېسەلنى قوزغىتىدۇ.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: تاتۇق ئۆسمىسى ئادەتتە تاشقى يارىلىنىشتىن كېيىن يۈز بېرىدۇ. دەسلەپتە سۇس قىزىل تومپىمىپ چىققان قېلىنلاش خاراكتېرلىك تاتۇق پەيدا بولىدۇ، ئاندىن كېيىن يەنە بىر قەدەر ئىلگىرىلىگەن ھالدا كېڭىيىپ، رېزىنىكىدەك قاتتىق داغ پارچىسىغا ياكى تۈگۈنچىگە ئايلىنىدۇ. دائىرىسى ئەسلىدىكىسىدىن ئارتىپ كېتىدۇ، بىر قىسمى قىسقاچ پاقا پۇتىدەك يامرايدۇ، يۈزى سېلىق، تۈك بولمايدۇ، قىل قان تومۇرلار كېڭىيىدۇ (19-1-رەسىم). ئاخىرىدا بېغىر رەڭگە ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. تۆش سۆڭەك رايونى ۋە زەخمىلەنگەن ئورۇندا كۆپ كۆرۈلىدۇ، قىچىشىدۇ، ئاغرىيدۇ ۋە تەگسە ئاغرىيدۇ. كېسەللىك جەريانى سوزۇلما بولۇپ، مۇئەييەن دەرىجىگە يەتكەندىن كېيىن تەرەققىي قىلىشتىن توختايدۇ، لېكىن ئۈزلۈكسىز يوقاپ كېتىدىغانلىرى ئاز.

دېئاگنوزى: زەخمىلەنگەندىن كېيىن، قېلىنلىغان تالالىق سۆڭەكلىمەن ئۆسمە پەيدا بولىدۇ، جىسمى قاتتىق، ئاغرىپ قىچىشقاندا سېزىلىدۇ. قېلىنلىغان تاتۇق بىلەن پەرقلەندۈرۈش كېرەك. كېيىنكىسى زەخمىلەنگەن رايون بىلەنلا چەكلىنىدۇ، ئۈزلۈكسىز يوقىلىپ كېتىدۇ.

داۋالاش: تاتۇق ئۆسمىسى كىچىك دائىرىلىك بولسا، پرىدىمىزول لەيلىمە سۇيۇقلۇقى ياكى ترىئامىكىنولوندىن $0.04m^3 \sim 0.02$ تاتۇق ئۆسمىگە ئوكۇل قىلىنىدۇ، ھەر 2~3 ئايدا بىر قېتىم تەكرارلىنىدۇ. توغلىتىپ داۋالاش ئۇسۇلى، يۈزە قەۋەتكە رېنتگېن نۇرى چۈشۈرۈش، رادىئوئاكتىپلىق ئىزوتوپلاردىن ^{32}P ياكى ^{90}Sr لەرنى چاچلاشقا، دەسلەپكى دەۋردىكى تاتۇق ئۆسمىسىنى ئاۋاز چاستوتىسىدا سىناق تەرىقىسىدە داۋالاشقا بولىدۇ.

ئوقۇل ئوپېراتسىيە قىلىپ كېسىپ ئېلىۋېتىش، ئاسانلا قاپتا قوزغىلىدۇ، كېسىپ ئېلىش ۋە تەكەندىن كېيىن رادىئوئاكتىپلىق نۇرلار بىلەن ھەر ھەپتە بىر قېتىم 2~6 مىنىيۇت داۋالاش ياكى شۇنىڭ بىلەن بىللە كورتمىكوسترىئومىد ھورمونىنى ماسلاشتۇرۇپ ئوكۇل قىلىش لازىم. ئۇلاردىن باشقا داۋاملىق بېسىپ داۋالغاندىمۇ ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

تاتۇقلۇق ئۆسمىگە مايىل تەنلىكلەر يارىلىنىش ۋە ھاجەتسىز ئوكۇل ياكى ئوپېراتسىيەلەردىن ساقلىنىشى لازىم.

28. قان تومۇر ئۆسمىسى

قان تومۇر ئۆسمىسى — يېڭىدىن ئۆسكەن قان تومۇرلاردىن تەركىب تاپقان ياخشى سۈپەتلىك ئۆسمە. ئۇ تۇغما كېسەللىككە تەۋە بولۇپ، كۆپىنچە تۇغۇلغاندىلا بايقىلىدۇ.

كىلىنىك ئىپادىلىرى: تۈۋەندىكى تۆت تىپى دائىم ئۇچرايدۇ:

1. قىزىل داغلىق مەڭ: «يالقۇنسىمان مەڭ»، «قىل قان تومۇرلار كېڭىيىشلىك مەڭ» ياكى «ئۈزۈم ھارېقى رەڭلىك مەڭ» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. توپىلىشىپ كېڭەيگەن قىل

قان تومۇرلاردىن تۈزۈلدى. كۆپىنچە تۇغۇلغاندىلا بولىدۇ. ئەسۋىنىڭ گىرۋەكلىرى ئېنىق، چوڭ - كىچىكلىكى ۋە شەكلى ئوخشاش بولمايدۇ. ئاچ قىزىل، قارامتۇل قىزىل ياكى بېغىررەڭ بولىدۇ. بەزىلىرىگە قان تومۇر تۈگۈنلۈك سۆڭەكلىرى ئۈستىگە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. باسسا رەڭگى ئۆچىدۇ. گەجگە، بويۇن، پېشانە، قاش ۋە گەۋدە قاتارلىق ئورۇنلارغا كۆپرەك چىقىدۇ. كېسەللىك جەريانى سوزۇلما بولۇپ، ئۆسۈپ مەلۇم دەرىجىگە بارغاندىن كېيىن توختاپ قالىدۇ، گەجگە، پېشانە ۋە قانغا چىققانلىرى ئۈزلۈكسىز يول تەملىپ كېتىدۇ. زەخمىلىنىشى چوڭراق بولغان ياكى ئەسۋە كۆپ بولغانلىرى مەڭگۈ يوقالمايدۇ.

2. قان تومۇر ئاددىي ئۆسۈشى: بۇلدۇرگە ئىسمى قان تومۇر ئۆسۈشى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. كۆپىنچىلىرى تۇغۇلۇپ بىر نەچچە ھەپتە ئىچىدە بارلىققا كېلىدۇ. بىر ياكى بىر نەچچە ئاچ قىزىل ياكى قارامتۇل قىزىل بۇلدۇرگە ئىسمى ئۆسۈپ كېلىدۇ (2.19). رەسىم). تەخمىنەن سېرىق پۇرچاق، بۇلدۇرگە ئىچىدە چوڭلۇقتا ياكى ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ بولىدۇ، ئەتراپى ئېنىق، يۇمشاق بولۇپ، باسسا كىچىكلىكىدۇ. باش، يۈز ۋە بويۇنلارغا كۆپ چىقىدۇ. ئوقۇش يېشىغا توشۇشتىن بۇرۇن ئۈزلۈكسىز يوقاپ كېتىدۇ.

3. قان تومۇر بۇلۇتسىمان ئۆسۈشى: جىگەررەڭ ياكى قارامتۇل قىزىل رەڭلىك جىسمى يۇمشاق بۇلۇتسىمان ھۈرمەك بولۇپ، يېرىم شار شەكلىدە ياكى ياپراقسىمان بولىدۇ (3.19). چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمايدۇ، كۆپىنچە تاق چىقىدۇ. باسسا كىچىكلىكىدۇ، باش، بويۇن قىسمىلىرىغا كۆپ چىقىدۇ، ھەمىشە تېرە ئاستى، مۇسكۇل ياكى سۆڭەكلەرنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا جايلىنىدۇ، ئۆسۈمچەن چوڭىيىش خاھىشى بولىدۇ، لېكىن بالاغەتكە يېتىش دەۋرىدىن كېيىن توختاپ قالىدۇ، قىسمىن ئاغرىقلارنىڭ ئۈزلۈكسىز يوقىلىپ كېتىدۇ، مەزكۇر كېسەل تاساددىپىي ھاللاردا ئىچكى ئەزالاردىمۇ بولىدۇ. لېكىن كۆپىنچە ئالاھىدىلىرى بولمايدۇ، ئەگەر مۇھىم ئەزالارنى باسسا ئالامەت كۆرۈلىدۇ. ئاز ساندىكى كېسەللەردە قان پلاستىكىلىرى ئازىيىش ۋە سۆسۈن داغ قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

4. قان تومۇرلار ئارىلاش ئۆسۈشى: قان تومۇر ئۆسۈشىنىڭ ئىمىكى تېپى بىرلا ۋاقىتتا مەۋجۇت بولىدۇ.

دېئاگنوزى: تۇغۇلغاندىلا ياكى تۇغۇلۇپ ئۇزاق ئۆتمەي يۈز بېرىدىغانلىقىغا، يېرىم ئۆسكەن قان تومۇرلاردىن تۈزۈلگەن زەخمىلىنىش، باسقاندا رەڭگىنىڭ ئۆچىشى خاتالىقى ياكى كىچىكلىكىدىن ئاساسەن دېئاگنوزى بېكىتىلىدۇ.

داۋالاش: قان تومۇر ئۆسۈشىنىڭ ئوخشاش بولمىغان تىپلىرىغا ئاساسەن مۇناسىپ داۋالاش ئۇسۇللىرىنى تاللاشقا بولىدۇ. قىزىل داغلىق مەڭگۈ ھازىر ئالاھىدە داۋالاش ئۇسۇلى يوق، دەسلەپكى دەۋردە رېنتگېن نۇرىنى چۈشۈرۈشكە ياكى ^{60}Sr چا پىلاشقا بولىدۇ. ئاددىي قان تومۇر ئۆسۈشىنى 5~7 ياشقا كىرگىچە كۆزىتىپ كۆرۈش، ئەگەر يوقالماسا سۇيۇقلاندۇرۇلغان ئازوتتا توختىتىش، نېئودىمى، ئىتتىرىي، ئاليۇمىنلار ئارىلاشتۇرۇلغان گارنىت لازېر نۇرى، ^{32}P ياكى ^{60}Sr چا پىلاش ۋە رېنتگېن نۇرى چۈشۈرۈش قاتارلىقلارنى قوللىنىشقا بولىدۇ. بۇلۇتسىمان قان تومۇر ئۆسۈشىنى يۇقىرىقىدەك ئۇسۇللاردا داۋالانغاندىن سىرت، يەنە 95% لىك ئىسپىرت ياكى 5% لىك ناترىي موررۇئاس قاتارلىق قاتۇرغۇچىلارنى ئۆسۈمچە ئوكۇل قىلىشقا بولىدۇ، ئەگەر ئۆسۈمچە كىچىكرەك بولسا كېسىپ ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ئۆسۈشى تېز ھەم قان پلاستىكىلىرى ئازىيىپ كەتكەن

بوۋاقلاردىكى بۇلۇتسىمان قان تومۇر ئۆسۈمىگە، پىرىدنىزولوننى ھەر $1g$ بەدەن ئېغىرلىقىغا $4mg \sim 2$ دىن، جەمئىي $4 \sim 2$ ھەپتە ئىچىگۈزۈش ياكى پىرىدنىزولوننى ئۆسۈم ئىچىگە ئۆكۈل قىلىش لازىم.

يېڭىرىنىچى باب تېرە باشقا كېسەللەكلەرى

18. ئاق كېسەل

ئاق كېسەل (بەرەس) — يېڭىرىنىچى چەكلىك يوقىمىدىغان تېرە كېسەلىدۇر. كېسەللىك سەۋەبى: ھازىرغىچە پۈتۈنلەي ئېنىقلانمىدى. ئۆزبە دەلىللىك ئىممۇنىت-قارا يېڭىرىنىچى ھۈجەيرىلىرىنى بۇزۇۋېتىشتىن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. ئاتىپىلىخولمىن، نور ئاد-رېنالىن ۋە كاتېخولامىن قاتارلىق نېرۋا ۋاسىتىچى ماددىلىرى دوپامىن رېئاكسىيەسىنى تورمۇزلاشنىڭ نەتىجىسى بولۇشى مۇمكىن. بەزىلەر قارا يېڭىرىنىچى ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئۆز-دە شەكىللەنگەن قارا يېڭىرىنىچى ئالدىنقى گەۋدىسىنىڭ زەھەرلەش تەسىرىدىن بۇزۇۋېتىلمىدۇ ياكى قىسمەن سىرتقى مەنبەلىك خىمىيەلىك ماددىلار (تىرۇزىن فېرېمېنتىنى تور-مۇزلايدۇ): مېركاپتان، فېنول بىرىكمىلىرى، كاتېخولامىن ۋە ئۇنىڭ تۇغۇندىلىرى، تىئال-مىن ۋە ھىدروكۇينون قاتارلىقلار بىلەن ئۇچرىشىشقا مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىماقتا. ئۇلاردىن باشقا بۇ كېسەلدە ئىرسىيەت ئامىلىمۇ بار.

كىلىمات ئىپادىلىرى: سۈت رەڭلىك يېڭىرىنىچى يوقالغان داغ بولۇپ، چېگرىسى ئېنىق، گىرۋەكلىرى رەتسىز ھەم چۆرىسىگە قىزىل يېڭىرىنىچى ئولتۇرۇشىدۇ (1.20 - رەسىم). شۇرايوندىكى تۈكلەر ئاقىرىپ كېتىدۇ. لېكىن باشقىچە ئۆزگىرىش بولمايدۇ. سىزىدى نورمال بولىدۇ. كۈن نۇرىغا سەزگۈر بولۇپ، ئاپتاپقا قاقلاغاندىن كېيىن قىزىل داغ-لىق سۇلۇق قاپارتقۇ ئاسافلا پەيدا بولىدۇ. مېخانىك سۈركىلىش ياكى زەخمىلىنىش تۈ-پەيلىدىن، شۇ ئورۇن يېڭىدىن زەخمىلىنىدۇ (ئوخشاش شەكىللىك رېئاكسىيە).

ئاق كېسەل بەدەن تېرىسىنىڭ ھەممە يېرىدە پەيدا بولىدۇ، لېكىن ئوچۇق ئورۇن-لار، سۈركىلىدىغان ئورۇنلار، سۆڭەكلەر چىقىپ تۇرىدىغان ئورۇنلار ۋە بوشلۇقلار ئېغىز-لىرىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ. چەكلىك ياكى نېرۋا ۋە تېرە بۆلەكلىرىنى بويلاپ تارقىلىدۇ، پۇ-تۇن بەدەننىڭ تارقىلىدۇ. كېسەللىك چەريانى سوزۇلما، ئاز قىسمى ئۈزلۈكسىز سا-قىيىپ كېتىدۇ.

دېئاگنوزى: سۈت رەڭلىك يېڭىرىنىچى يوقالغان داغ بولۇپ، ئەتراپى ئېنىق، چۆرىس-گە يېڭىرىنىچى ئولتۇرۇشىدۇ، ھېسسىي ئالامەتلەر بولمايدۇ، بۇلار ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. ئالا - چېپار تەمرە تەك بىلەن پەرقلىنىدۇ شەرت. ئونىنچى باققا قارالسۇن.

داۋالاش: ھازىر قانائەتلىنەرلىك داۋالاش ئۇسۇلى يوق. تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىل ئۇسۇل دائىم ئىشلىتىلىدۇ:

1. سىرتىغا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: 0.05% لىك مۇستارىگىنلىق ئىسپىرت،

40% ~ 30 لىك جىن كېۋىزى تىنىكتۇرسى ياكى كورتىكوستروئىد ھورمون زىمىنى قاتارلىق-
لارنى سۈركەشكە ۋە ياكى ھورمون مەلەملىرى بىلەن تېجىشقىمۇ بولىدۇ.

2. ئىچىدىن ئىشلەتمەيدىغان دورىلار: مۇرەككەپ ۋىتامىن B ۋە نىكوتىن كىسلاتاسىنى ئىچكىۈزۈشكە بولىدۇ. تىرىئامكىنولون ياكى پىرېندىمىزولون لەيلىمە ئېرىتمىسىنى شۇ ئورۇندىكى تېرىگە ئوكۇل قىلىشىمۇ بولىدۇ، لېكىن شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتسە تېرىنى يىگىلىتىپ قويىدۇ. ئىمىجۇنت ئامىلى پەيدا قىلىغان ئاق كېسەلنى داۋالاشتا پىرېندىمىزولون ئاز مىقداردا ئىچكىۈزۈلىدۇ. ئوپتىك - خەمىيىلىك داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىشقىمۇ (تەڭگە تەمرەتكە بايىغا قارالسۇن) ياكى 0.5% ~ 0.1 لىك 8- مېتوكسى پىزۇدالىن ئېرىتمىسىنى سۈركەپ ئارقىدىن كۈن ئۇ-
دى چۈشۈرۈپ سىناپ بېقىشقا بولىدۇ.

ئۇلاردىن باشقا، بىر قىسىم سىرتقى مەنبەلىك خەمىيىلىك ماددىلار بىلەن ئۇچرى-
شىشتىن ئىمىكا نىمىيە تىنىڭ بىر نەچچە ساقلىنىش لازىم.

28. قاسراقلىق تېرە كېسەلى

قاسراقلىق تېرە كېسەلى ئىرسىيەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان، غەيرى نورمال مۇڭگۈزلىشىشنى ئالاھىدىلىك قىلغان تېرە كېسەلىدۇر، ئادەتتە ئاددىي قاسراقلىق تېرە كېسەلى، يانداشما قاسراقلىق تېرە كېسەلى، تاختا قەۋەت قاسراقلىق تېرە كېسەلى ۋە يۈزەكى تېرە بوشاش خاراكتېرلىك زىيادە مۇڭگۈزلەشكەن تېرە كېسەلىدىن ئىبارەت تۆت خىلغا بۆلۈنىدۇ. بۇ پاراگرافتا ئاددىي قاسراقلىق تېرە كېسەلى ۋە يانداشما قاسراقلىق تېرە كېسەلىنىلا تونۇشتۇرىمىز.

كېسەللىك سەۋەبى: ئىرسىيەتلىك تېرە كېسەلىگە مەنسۇپ، ئاددىي قاسراقلىق تېرە كېسەلىدە ھەمىشە دائىمىي بولغانغۇچى تەنچە ئاشكارا ئىرسىيەت، يانداشما قاسراقلىق تېرە كېسەلىدە بولسا بولغانغۇچى تەنچە يوشۇرۇن ئىرسىيەت بولىدۇ، ئۇنىڭ ئانا ئەجدادى شالغۇت زىگوتا بولۇپ، پەقەت ئەر ئەۋلاتلىرىغىلا ئىرسىيەت قالدۇرىدۇ.

كېسەللىك ئىپادىلىرى:

1. ئاددىي قاسراقلىق تېرە كېسەلى: دائىم ئۇچرايدىغان يېنىك تىپلىق قاسراقلىق تېرە كېسەلىدۇر. ئەر - ئاياللارنىڭ ھەممىسىدە بولىدۇ. دائىم گۆدەك مەزگىلدە قوزغىلىدۇ، سۇس قوڭۇر ياكى توق قوڭۇر رومبا شەكىللىك يېپىشقاق بېلىق قاسرىقىدەك بولۇپ، گىرۋەكلىرى كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدۇ (20. 2 - رەسىم). دۈمبە ۋە تىۋىت مۇچىنىڭ سوزولغۇچى تەرەپلىرىگە كۆپرەك چىقىدۇ. قول دۈمبىسى - تۈك خالىتىسى خاراكتېرلىك مۇڭگۈزلىشىپ زەخمىلىنىدۇ ھەمدە ئالغان، تاپان زىيادە مۇڭگۈزلىشىدۇ. قولتۇق ۋە ساغرا يېرىقىغا ئادەتتە تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. يېنىكلىرىدە قاسراق ئازراق بولىدۇ ياكى تېرە قۇرغاقلىشىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولىدۇ، قىشتا ئېغىرلىشىپ، يازدا يېنىكلىيدۇ، ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ كۈچىيىدۇ. چوڭايغاندىن كېيىن ئالامىتى يېنىكلىيدۇ. كۆپ ساندىكى ئاغرىقلاردا ئالاھىدە رېئاكسىيىلىك تېرە ياللۇغى قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

2. يانداشما قاسراقلىق تېرە كېسىلى: نىمىسە تەن ئاز ئۇچرايدۇ، ئەرلەردىلا بولىدۇ، ھەممىشە تۇغۇلۇپ ئۇچ ئاي ئىچىدە قوزغىلىدۇ. ئەسۋە چوڭ ھەم روشەن بولۇپ، بېلىق قاسرىقى ياكى يىلان تېرىسىدەك بولىدۇ، كەڭ دائىرىلىك بولۇپ، باش، يۈز، قۇلاق ئالدىلىرىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ، ئېغىرلىرىدا قولتۇق، جەينەك ئويىمىنى ۋە تىز ئويىمىنى قاتارلىق ئورۇنلارغىمۇ تارقىلىپ بارىدۇ. قورساق قىسمىدا ئېغىر بولىدۇ، لېكىن ئالدىنقى قان، تاپانغا بۆسۈپ كىرمەيدۇ، ئارىلاپ سەل قىچىشىپ قويمىدۇ. كېسەللىك جەريانى ئاستا بولۇپ، قىشتا ئېغىرلىشىپ، يازدا يېنىمىكلەيدۇ. ياش قورامىغا يەتكەندىن كېيىنمۇ ئالامىتى ياخشىلانمايدۇ، ھەتتا ئېغىرلىشىدۇ.

دىئاگنوزى: كېسەل گۆدەك مەزگىلىدە قوزغىلىدىغانلىقى، جەمەت تارىخى بولمىدىغانلىقى، بېلىق قاسرىقىسىمان مۇڭگۈزلەشكەن تەڭگە قاسراق بولىدىغانلىقى، تېرە قۇرۇقلىشىدىغانلىقى، قىشتا ئېغىرلىشىپ، يازدا يېنىمىكلەيدىغانلىقى قاتارلىقلارغا ئاساسەن دېئاگنوز قويۇش قىيىن ئەمەس.

داۋالاش: نۆۋەتتە قانائەتلىنەرلىك داۋالاش ئۇسۇلى يوق. تۆۋەندىكى دورىلارنى سىناق تەرىقىسىدە ئىشلىتىشكە بولىدۇ:

1. سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: دائىم $10\sim 20\%$ لىك ئۇرۇنما تى، $10\sim 20\%$ لىك بېلىق مېھى مەلھىمى ياكى 5% لىك سالىسىلىلىك كىسلاتا مەلھىمى قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. $40\sim 60\%$ لىك پروپىلېن گلىكول ئېرىتمىسى قامال قېپىدا كومپرىس قىلىنىشىمۇ ئالامىتىنى يېنىمىكلەتەلەيدۇ، ۋىتامىن A كىسلاتاسى بۇ كېسەلگە ئۈنۈم بەرمەيدۇ.
2. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: كۆپ مىقداردا ۋىتامىن A ياكى E نى سىناق تەرىقىسىدە ئىچكىزۈشكە بولىدۇ، 13 - پارا ۋىتامىن A كىسلاتاسىمۇ ئىچكىزۈلىدۇ.

33. پېمفىگۇس

پېمفىگۇس — تىكە ئىلىك ھۈجەيرىلەر قاتلىمى بوشاش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە، ئېغىر ئۆتمىدىغان، چوڭ قاپارتقۇلۇق تېرە كېسىلىدۇر. ئادەتتە ئاددىي پېمفىگۇس، كۆپىيىش خاراكتېرلىك پېمفىگۇس، ئالا - بالداق پېمفىگۇس ۋە قىزىل داغلىق پېمفىگۇستىن ئىبارەت تۆت تىپقا بۆلۈنىدۇ. بۇ بايتا ئاددىي پېمفىگۇسنى تونۇشتۇرىمىز.

كېسەللىك سەۋەبى: سەۋەبى پۈتۈنلەي ئېنىق ئەمەس. يېقىنقى يىللاردىن بېرى كېسەللىك پەيدا بولۇش مېخانىزمى ئۆز بەدەنلىك ئىممۇنىت بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارالماقتا. ئىممۇنىت جۇلالىق نۇردا، ئاغرىقنىڭ يۈزەكى تېرىسى، ئېغىز بوشلۇقى ئېپىتېلىيىسى ۋە قان زەردايمىدىكى پېمفىگېن ئانتىتېلاسى (ھۈجەيرىلەر ئارا ئانتىتېلا)، ئانتىتېلا ۋە ھۈجەيرىلەر ئارىسىدىكى يېپىشقاق ماددىلار بىرلىشىپ، كومپلېمېنتنى ئاكتىپلاشتۇرۇپ، تىكە ئىلىك ھۈجەيرىلەر قەۋىتىنى بوشاشتۇرۇش بىلەن يۈزەكى تېرە ئىچىدە سۇلۇق قاپارتقۇنى شەكىللەندۈرىدۇ، شۇنداقلا ئايلىنىۋاتقان ئانتىتېلانىڭ تېپىلىرىدە رېجىمى بىلەن كېسەللىكنىڭ ھەرىكەتلىنىشى ئۆز ئارا پاراللىل بولىدىغانلىقى ئىسپاتلاندى.

كەينى ئىپادىلىرى: ئاددىي پېمفىگۇس ئوتتۇرا ياشلىقلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئەس

ۋە - چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان شىرىلىك سۇلۇق، بوشاشلىق سۇلۇق قاپارتقۇ بولۇپ، سۇلۇق قاپارتقۇنى بېسىپ تەكشۈرگەندە، ئەتراپىغا تارىلىدىۇ ياكى نورمال كۆرۈنگەن تېرىنى سەل - پەل ئۇۋىلىسا يۈزەكى تېرە دەرھاللا سويۇلۇپ چۈشىدۇ، بۇ خىل ھادىسە تىكەنلىك قەۋەت بوشاش بەلگىسى ياكى *Nikolsky* بەلگىسى دەپ ئاتىلىدۇ. دەسلەپتە سۇلۇق قاپارتقۇنىڭ سانى ئازراق بولىدۇ. تەخمىنەن يېرىم يىل ئىچىدە پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىلىدۇ (20 . 3 - رەسىم). دىۋارى نېپىز، ئاسان يېرىلىپ كېتىدۇ، يېرىلغاندىن كېيىن شەلۋەرەيدۇ، ئازراق شىلىشىق سۇيۇقلۇق ياكى قان سىرغىپ چىقىدۇ، ھەمدە ئۈزلۈكسىز ئەتراپقا كېڭىيىدۇ، بەك تەستە ساقىيىدۇ. مۇبادا ئىككىلەمچى يۇقۇملانسا، يىرىشلىق قاپارتقۇ ۋە يىرىشلىق قاقچا پەيدا بولۇپ، بېلىقتەك پۇرايدۇ، زەخمىلىنىش ئالدى بىلەن ئېغىزدىن باشلىنىدۇ، ئاندىن كېيىن باشقا ئورۇنلاردىكى تېرە ۋە شىلىشلىق پەردىلەرگە ئارقا - ئارقىدىن تارقىلىپ بارىدۇ، سۈركىلىپ ۋە بېسىلىپ تۇرىدىغان ئورۇنلاردا كۆپ بولىدۇ، قورۇق بار ئورۇندىكى كونا شەلۋەرەش ئالدى بىلەن يېنىنىڭ دەرىجىدە ئۆسىدۇ. ئېغىر ئاغرىقلاردا قىزىش، ئورۇقلاش قاتارلىق ئالامەتلەر پەيدا بولىدۇ. قارشىلىق كۈچى تۆۋەنلەپ كەتكەنلىكتىن، ئىككىلەمچى ئۆپكە ياللۇغى ۋە سېپىتسىيە بارلىققا كېلىدۇ، ئاقمۇتى ناچارراق، كۆرتىمكۈ ستروئىدھورمونى ئىشلەتمە ئاقمۇتىدە بىر ئاز ياخشىلىنىش بولىدۇ.

لابۇراتورىيەلىك تەكشۈرۈش: يېڭى سۇلۇق قاپارتقۇ ئاستىدىن ئازراق توقۇلما قىرىپ ئېلىپ، *Giemsa* ئۇسۇلىدا بويلاپ مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە، تىكەنلىك قەۋەتتىكى ھۈجەيرىلەرنىڭ بوشاپ كەتكەنلىكىنى، تېرە كەسىمىنى ئىممۇنىتلىق جۇلالىق نۇردا بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق تەكشۈرگەندە، تىكەنلىك ھۈجەيرىلەر ئارىسىغا ئىمۇنىتشار - ئاقىلىنىڭ چۆكۈۋالغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. قان زەردابىدىكى ئاقىلىنىلا (ئاساسلىق *IGG*) تېتىر دەرىجىسىنىڭ ئۆزگىرىشى (1:20 بولسا مۇسپىي بولىدۇ) كېسەللىك ئەھۋالىغا ھۆكۈم قىلىشقا ۋە داۋالاش ئۇنۋىمىنى پەرەز قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ.

دىئاگنوزى ۋە دىئاگنوزى: بۇ كېسەللىكنىڭ ئوتتۇرا ياش - لىمقلاردا كۆپ بولىدىغانلىقى، بوشاشلىق سۇلۇق قاپارتقۇ پەيدا بولىدىغانلىقى، شەلۋەرەگە ئىمۇنىت ئاساسلىقچە ساقايىدىغانلىقى، ئېغىز شىلىشلىق پەردىلىرى ھەم شەلۋەرە زەخمىلىنىدىغانلىقى، *Nikolsky* بەلگىسى مۇسپىي بولىدىغانلىقى ۋە مۇناسىۋەتلىك تەجرىبىخانىمدا تەكشۈرۈشلەرگە ئاساسەن دىئاگنوز قويۇشقا بولىدۇ. تۆۋەندىكى كېسەللىكلەر بىلەن پەرقلەندۈرۈش شەرت:

1. ئېغىر ئۆتمىدىغان كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ ۋە چوڭ قاپارتقۇلۇق يۈزەكى تېرە بوشاش تىپىلىق دورا ئەسۋابى: مەزكۇر بايىشلىق ئايرىم پاراگرافلىرىغا قارالسۇن.

2. بېيىنىڭ ئىسمى: تەرەڭلىك چوڭ قاپارتقۇ بولۇپ ئاسان يېرىلمايدۇ، شەلۋەرىگە نىسبەتەن كېيىن ئاسانراق پۇتمىدۇ، *Nikolsky* بەلگىسى مەنپەي بولىدۇ. شىمالىي پەرىدەلەر يېڭىدىن زەخمىلىنىدۇ.

3. قاپارتقۇ ئىسمى: تېرە ياللىغى، توپاللىشىپ چىقىدىغان كۆپ شەكىللىك يۈزەكى تېرە ئاستى تەرەڭلىك سۇلۇق قاپارتقۇسى بولۇپ، قاپارتقۇ دىۋارى قېلىنراق، ئاسان يېرىلمايدۇ، *nikolsky* بەلگىسى مەنپەي بولىدۇ، قايتا - قايتا قوزغىلىدۇ، قاتتىق قىچىشىدۇ.

داۋالاش

1. ئىچىدىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار:

(1) كورتىكوستىروئىد ھورمون: بۇ كېسەلنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن تاللىنىدىغان دورا بولۇپ، دەسلەپكى مىقدارى كۆپ بولىدۇ. پېرىدنىزىن كۈنىگە $100\text{mg} \sim 60$ بېرىلىپ، كېسەللىك ئەھۋالى كونترول قىلىنىپ، ساقىيىشقا باشلىغاندىن كېيىنكى ئىككى ھەپتىدىن باشلاپ پەيدىنپەي تۆۋەنلىتىپ، قامداش مىقدارىغا يەتكۈزۈلىدۇ. كۆپ ساندىكى ئاغرىقلارغا $3 \sim 5$ يىل ياكى ئۇنىڭمۇ ئۇزۇن ۋاقىت ئىشلىتىلىدۇ، ئىچىش ۋاقتى ئۇزۇن بولغاچقا، ئاچار تەسىرىنىڭ يۈز بېرىشىگە دىققەت قىلىش ھەم مۇناسىپ بىر تەرەپ قىلىش شەرت.

(2) ئىمىونىتېنى تورمۇزلاش دورىلىرى: ئادەتتە كېسەللىك ئەھۋالى تورمۇزلىنىپ، ھورمونلارنى ئازايتقاندىن كېيىن بېرىلسە، ھورمونلارنىڭ قامداش مىقدارىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. ئازاتىمۇپرىن (چوڭلارغا كۈنىگە $100\text{mg} \sim 60$ دىن بېرىلىدۇ) ياكى ئېندوكسان (كۈنىگە $100\text{mg} \sim 50$ دىن بېرىلىدۇ) قاتارلىقلار كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ.

(3) باشقىلار: ئىككىلىمچى يۇقۇملانغاندا ئانتىبىيوتىك ياكى زامبۇرۇغلارغا قارشى ياسالما قوشۇپ بېرىلىدۇ. جۇڭخىيى تىبابىيىتىدە قىزىتما قايتۇرۇپ نەملىكنى تازىلاش ۋە قاننى ساقىيىلاشتۇرۇپ ئوزۇقلۇقنى كۈچەيتكۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. مەسىلەن: چىڭ ۋېن مەي دۈيىن ئىچىملىكى، چىڭ يىڭ جې دۇئاڭ قاينا تىمىسى قوشۇپ ياكى كېمە يىتمەپ بېرىلىدۇ.

2. سىرتىغا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار: ئالامەتلىرىگە قارشى بىر تەرەپ قىلىشنى كۈچەيتىش كېرەك. ئېغىر كېسەللەرنى پەرۋىش قىلىش بايىغا قارالسۇن.

3. ئادەتتىكى داۋالاش: قۇۋۋەتلىپ داۋالاشقا دىققەت قىلىش شەرت، يۇقىرى ئاقسىللىق، يۇقىرى ۋىتامىنلىق ئوزۇقلۇقلارنى بېرىش، سۇ ۋە ئېلېكترولىتلار تەڭپۇڭلۇقىغا دىققەت قىلىش، زۆرۈر تېپىلسا قان ياكى قان پلازما ئاقسىلى بېرىش لازىم. كۈچلۈك كۈن ئۇرغۇ قاقلىنىشتىن، ئىككىلىمچى يۇقۇملانۇش ۋە ياتاق يارىسى يۈز بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

پەسل	ياز پەسلدە كۆپ كۆرۈلىدۇ	ياز پەسلدە كۆپ كۆرۈلىدۇ	ياز پەسلدە كۆپ كۆرۈلىدۇ	مۇناسىۋەتسىز
ئەسۋە	ئالغان ۋە تاپانغا توپ-توپ بولۇپ چىقىدۇ ياكى بىرلا ئورۇن بىلەن چەكلىنىدۇ، كىرۈشكەن ئېنىق، يالغۇزلىق دۆڭچە ئەسۋە ۋە كېچە كىلىشىنى كۆرگەن بولسا، قول دۈمبىسى سەركەزدىن قېچىش خاراكتېرىلىك ھالەتتە بولۇپ خىمىلىنىدۇ	ئالغان ۋە بارماق لايىھىسى ياكى بارماق ئۇچىدا چوڭ-چوڭ يالغۇزلىق بولۇپ، قاسراق تاشلايدۇ، زىيادە مۇشۇنداقلىقىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ	تېرە كۆپ شەكىللىك ۋە خىمىلىنىدۇ، سۈرۈلۈپ قۇرۇپ قاسراق تاشلايدۇ، زىيادە مۇشۇنداقلىقىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ	تەر قاپارتمىسىغا ئوخشىشىپ كېتىدۇ
ئاللاھىدىلىكى	ئالغان ۋە تاپانغا توپ-توپ بولۇپ چىقىدۇ ياكى بىرلا ئورۇن بىلەن چەكلىنىدۇ، كىرۈشكەن ئېنىق، يالغۇزلىق دۆڭچە ئەسۋە ۋە كېچە كىلىشىنى كۆرگەن بولسا، قول دۈمبىسى سەركەزدىن قېچىش خاراكتېرىلىك ھالەتتە بولۇپ خىمىلىنىدۇ	ئالغان ۋە بارماق لايىھىسى ياكى بارماق ئۇچىدا چوڭ-چوڭ يالغۇزلىق بولۇپ، قاسراق تاشلايدۇ، زىيادە مۇشۇنداقلىقىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ	تېرە كۆپ شەكىللىك ۋە خىمىلىنىدۇ، سۈرۈلۈپ قۇرۇپ قاسراق تاشلايدۇ، زىيادە مۇشۇنداقلىقىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ	تەر قاپارتمىسىغا ئوخشىشىپ كېتىدۇ
تارقىلىش	ئاسپىتىرىيىلىك سىمپتىرىك	ھەمىشە سىمپتىرىك	ھەمىشە سىمپتىرىك	تېگىش ئورنى
باشقا زەخمىلىنىشلەر	ھەمىشە تىرىق ۋە پۇت تەمرە تىكىسى بولىدۇ	باشقا ئورۇنلاردا پۇت ۋە باش تەمرە تىكىسى ئالامىتى بولۇپ كۆرۈلىدۇ	باشقا ئورۇنلاردا پۇت ۋە باش تەمرە تىكىسى ئالامىتى بولۇپ كۆرۈلىدۇ	تەككەن باشقا ئورۇنلاردا ئوخشاش زەخمىلىنىش بولىدۇ
ئاغرىق ئورۇندىن زام بۇرۇغ تەكشۈرۈش	ھەمىشە مۇسسى بولىدۇ	ھەمىشە مۇسسى بولىدۇ	ھەمىشە مۇسسى بولىدۇ	ھەمىشە مۇسسى بولىدۇ

3 - جەدۋەل . گەۋدە قىسمىدىكى قىزىل داغلىق تەڭگە قاسراقنى ئاساس قىلغان تېرە كېسەللىكلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك كېسەللىكلەرنى پەرقلەندۈرۈش

دورا ئەسۋىسى	قىزىل ماسكۇل توپان ئەسۋىسى	ئاللا - چىپار تەمرە تىكىسى	قىزىل	ئىسكارلاتىنا
دورلار كەلتۈرۈپ ئېنىق ئەمەس چىقىرىدىغان ئالامىتى	ئېنىق ئەمەس	زامبۇرۇغ	ۇمۇش	زەنجىرىسىمان شارچە باكتېرىيە
پەرقى روشەن ئەمەس	ياش - ئوتتۇرا ياشلىقلار	ياشلار	ئاساسەن گۆدەك لەردە	بالىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ
پەسلگە باقمايدۇ	باھار ۋە كۈز پەسللىرى	ياز پەسلى	قىشنىڭ ئاخىرى ۋە باش ئەتىياز	باھار پەسلى
دورا ئىشلەتكەن تارمىقى ۋە يوشۇرۇن بولمايدۇ دەۋرى بولىدۇ	ئۇچرىشىش تارمىقى ئېنىق ئەمەس	ئۇچرىشىش تارمىقى ئېنىق ئەمەس	قىزىل بىلەن ئۇچىراشقان تارمىقى بولىدۇ	ئۇچرىشىش تارمىقى بولىدۇ

[illegible]

4 - جەدۋەل. سۇلۇق قاپارتقۇ ۋە چوڭ قاپارتقۇنى ئاساس قىلىغان قېرە
كېسەللىكلەرنى پەرقلەندۈرۈش

ئاددىي پېمەنگۇس	چوڭ قاپار توقۇلۇق كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ	چوڭ قاپار توقۇلۇق يۈزەكى تېرە بوشاشماق دورا ئەسۋاسى	ئۇچىرىشەشتىن بىر ئىدىغان قېرە يالماق	چوڭ قاپار توقۇلۇق زەكى تېرە بوشاش كېسىلى (ئاددىي تېھلىق)
كۆپىنچە چىقىدىغان يېشى	ئوتتۇرا ياشلىقلار	بالىلار، ياشلار	چوڭلار	چوڭلار
ئەسۋە ئالاھىدىلىكى	بوشاشلىق سۇلۇق قاپار توقۇ	كۆپ شەكىللىك قىزىل داغ قىلىستىمىگە سۇلۇق قاپار توقۇياكى چوڭ قاپار توقۇ چىقىدۇ، رەڭدار بولۇپ ئاساسەن يېرىلىدۇ	بوشاشلىق سۇلۇق قاپار توقۇ بولۇپ ۋە چوڭ قاپار توقۇ بولۇپ ئاساسەن يېرىلىدۇ	بوشاشلىق سۇلۇق قاپار توقۇ قىزىرىپ ئىشىشىدۇ يار توقۇياكى تانلىق قاپار توقۇ بولۇدۇ
شىللىق پەردە زەخمىلىشىش	ئالدىدا ئېغىز بوشاقتىغا چىقىدۇ	بار، كۆپ بوشاقتىلاردا بولىدۇ	ئېغىز بوشاقتى	بولمايدۇ
Nikolsky ئالاھىتى	مۇسەپسى	مەنەپسى	مۇسەپسى	مەنەپسى
				كۆپىنچە مەنەپسى بولىدۇ

كۆپرەك چىقىدىغان باش، گەۋدە	مۈچە، گەۋدە	كۆكرەك	ئۇچراشقان ئورۇن پۇت-قول ۋە سۈركىلىدىغان ئورۇن	بۆلەيدۇ
پۇت-ئۆسۈمۈك ئالاھىدىلىرى	ئاخىرقى دەۋرىدە ئورۇنلايدۇ، قىزىدۇ	ئېغىر تېمىدا پۇت-ئۆسۈمۈك ئالاھىدىلىرى بولۇپ قالىدۇ	يوق	بۆلەيدۇ
قىچىشىش	بۆلەيدۇ ياكى سەل قىچىشىدۇ	يېنىك قىچىشىدۇ ياكى ئاغرىيدۇ	يېنىك قىچىشىدۇ، كۆيۈپ ئاغرىيدۇ	بۆلەيدۇ

2- قوشۇمچە. سىرتىغا دائىم ئىشلىتىلىدىغان دورىلار رېتسىپلىرى

1. ئېرىتمىلەر

(1) 4% ~ 2% لىك دانىكا كىسلاتا ئېرىتمىسى ۋە 1:8000 — 1:5000 كالىي پېرمانگانات

ئېرىتمىسى.

ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئېھتىياجلىق دانىكا كىسلاتا پاراشوكى ۋە كالىي پېرمانگانات كىسلاتا پاراشوكىنى ئۆلچەپ ئېلىپ نىسبەت بويىچە سۇدا ئېرىتىپ ياسىلىدۇ. ھۆل كومپىرىس قىلىنىش ۋە جاراھەتنى يۇيۇشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(2) 0.1% لىك رېۋانول ئېرىتمىسى، 0.1% لىك كۈمۈش نېپىترات ئېرىتمىسى ۋە 0.05% ~ 0.1% لىك رېزورېتىن ئېرىتمىسى.

ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئېھتىياجلىق بولغان رېۋانول، كۈمۈش نېپىترات ۋە رېزورېتىننى ئۆلچەپ ئېلىپ، نىسبەت بويىچە سۇدا ئېرىتىپ ياسىلىدۇ. كۈمۈش نېپىترات ئېرىتمىسىنى چىگەرەك بوتۇلكىلاردا ساقلاش كېرەك.

ھۆل كومپىرىس قىلىشقا ۋە ئۆتكۈر سىرغىشقا يۇقۇملانغان ئەگىش كەلگەن ئەھۋالداردا ئىشلىتىلىدۇ.

(3) مۇرەككەپ مىس سۇلفات ئېرىتمىسى.

1.0 مىس سۇلفات

3.5 سىنىك سۇلفات

10.0 كامفۇرا ئىسپىرىتى

100.0 دېستىللەنگەن سۇ

ھۆل كومپىرىس قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ، ئۆتكۈر سىرغىشقا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

(4) ئىشقارلىق ئاليومىن ئاتىپات ئېرىتمىسى.

16.0 ئاليومىن سۇلفات

16.0 سىركە كىسلاتاسى

7.0 كالىيى كاربونات

100.0 دېستىللەنگەن سۇ

ئۆتكۈر قىزىرىپ ئىششىق روھەن بولسا ياكى سىرغىپ چىقىش بولسا ھۆل كومپىرىس قىلىنىدۇ. ئىشلەتكەندە 20 ھەسسە سۇ قوشۇپ سۇيۇلدۇرۇلىدۇ.

(5) 40% لىك ناترىي تىموسۇلفات ئېرىتمىسى ۋە 4% لىك تۇز كىسلاتاسى ئېرىتمىسى.

ئايرىم - ئايرىم ھاۋا ئاترىي تىئوسۇلفاتىتىن 40g ۋە سۇيۇق تۇز كىسلاتاسىدىن* 4ml ئۆلچەپ ئېلىپ، ھەر قايسىسىنى 100ml سۇدا ئېرىتىپلا پۈتىدۇ.

ئالا - چىپار تەمرەتكە ۋە قىچىشقا قارغا ئىشلىتىلىدۇ.

2. پاراشوكلار

(6) ئاددىي پاراشوك.

10.0

دانىكا كىسلاتاسى

20.0

سىنىك ئوكسىدى

100.0 غىچە قوشۇلىدۇ.

تالىك تالىقىنى

شەلۋەرىمىگەن، ئۆتكۈر ۋە سۇس ئۆتكۈر سىرغىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ. يەنە پاراشوك

لار، يۇيغۇچى ياسالغۇچى ياكى پاستىلارنىڭ ئاساسىي ماددىسى قىلىنىدۇ.

(7) ئىسسىقلىق پاراشوكى.

1.0

كامفور پاراشوكى

1.0

مېنتول

5.0

دانىكا

0.1

فۇراتسىللىن

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

ئاددىي پاراشوك

ئۇنىڭ نەملىكىنى شۇمۇرۇش رولى بولۇپ، ئىسسىقلىققا ئىگە ۋە قاتلىنىپ تەرلەيدىغان

تورۇنلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

(8) پۇت تەمرەتكىسى پاراشوكى.

5.0

سالىسىلىك كىسلاتا

8.0

دانىكا كىسلاتاسى

3.0

كۇمىك ئالومىن

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

ئاددىي پاراشوك

يەنە 2% لىك ئىمىنازول، 1% لىك ئىمىنازولۇ قوشۇلىدۇ.

پىشلاقلىشىپ شەلۋەرىش تىپلىق پۇت تەمرەتكىسىگە ئىشلىتىلىدۇ.

(9) باش يۇيۇش پاراشوكى.

10.0

ئاترىي ھىدروكاربونات

5.0

دانىكا

ياغ تەپچىيدىغان تېرە ياللۇغى ۋە ياغ تەپچىيدىغان چاچ چۈشۈشلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

1000ml يىلغىمان سۇدا ئېرىتىپ باش يۇيۇلىدۇ.

(10) مۇرەككەپ زەمچە پاراشوكى.

20.0

كۆيدۈرۈلگەن زەمچە

2.0

كامفور

20.0

سىنىك ئوكسىدى

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

تالىك تالىقىنى

پىشلاقلىشىپ شەلۋەرىش تىپلىق شاللىق تېرە ياللۇغىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

* سۇيۇق تۇز كىسلاتاسى «جۇڭگو دورا قامۇسى» دا 10% لىك تۇز كىسلاتاسى دەپ بەلگىلەنگەن.

3. يۇيۇشقا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار (لوتسىيىلەر)

(11) كالامىن لوتسىيىسى.

10.0	كالامىن
5.0	سىنىك ئوكسىد
1.0	سۇيۇق فېنول
5.0	گلىتسېرىن
100.0	دېستىللەنگەن سۇ

دەسلەپكى مەزگىلدىكى شەلۋەرەش -- سىرغىش بولىدىغان، ئۆتكۈر ۋە سۇس ئۆتكۈر تېرە ياللۇغى ۋە ئېگىز ماھەمدە قىچىشىدىغان تېرە كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

(12) گۇڭگۇرت - كالامىن لوتسىيىسى.

5.0	گۇڭگۇرت چۆكمىسى
100.0	كالامىن لوتسىيىسى

ئاددىي دانىخورەك، ياغ تەپچىدىغان تېرە ياللۇغى ۋە يىرىڭلىق تېرە كېسەلى قا-
تارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

(13) مۇرەككەپ گۇڭگۇرت لوتسىيىسى.

5.0	گۇڭگۇرت چۆكمىسى
3.0	سىنىك سۇلفات
10.0	10% لىك كامفۇرا ئىسپىرىتى
10.0	گلىتسېرىن
100.0	تويۇنغان ئاھاك سۈيى

مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر 11-رېتسىپتىكىگە ئوخشاش، يەنە قىزىل بۇرۇن، مايلىق ئەسۋىلەرنىمۇ داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(14) ئاق لوتسىيە.

6.0	گۇڭگۇرتلۇق كالىي
6.0	سىنىك ئوكسىد

دېستىللەنگەن سۇ 100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

ئاددىي دانىخورەك، مايلىق ئەسۋە، ماي تەپچىدىغان تېرە ياللۇغى، قىزىل بۇ-
رۇن قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

(15) مۇرەككەپ نېئوتىسىن لوتسىيىسى

2.0	نېئوتىسىن سۇلفاس
0.2	پرىدنىزول
1.0	سۇيۇق فېنول
5.0	سىنىك ئوكسىد
10.0	95% لىك ئىسپىرىتى
10.0	گلىتسېرىن
100.0	دېستىللەنگەن سۇ

ئىسسىقلىق، يازلىق تېرە ياللىغى، ماي تەپچىمىدىغان تېرە ياللىغى ۋە يېنىك يۈ-
قۇملانغان ئەھۋاللاردا ئىشلىتىلىدۇ.

4. مايلاز

16) سىنىك ئوكسىد مېيى.

20 ~ 40.0

سىنىك ئوكسىد

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

ئۆسۈملۈك مېيى

سىرغىش روشەن بولمىغان، سۇس ئۆتكۈر ئەھۋاللاردا ئىشلىتىلىدۇ.

17) مۇرەككەپ نېئومىتسىن سىنىك مېيى.

20.0

نېئومىتسىن

0.1

پىرىدنىزولون

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

سىنىك ئوكسىد مېيى

سىرغىش ئاز بولغان سۇس ئۆتكۈر تېرە ياللىغى، ئېگىز، ماي تەپچىمىدىغان تېرە

ياللىغى ۋە يېنىك يۇقۇلمىنىش بولغان ئەھۋاللاردا ئىشلىتىلىدۇ.

18) مۇرەككەپ شېچۇاڭزى مېيى.

15.0

شېچۇاڭزى پاراشوكى

1.0

سۇيۇق فېنول

سىنىك ئوكسىد مېيى 100.0 غىچە قوشۇلىدۇ.

مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەل 17 - رېتسىپىتىكىگە ئوخشاش.

19) ئەڭلىك ئوت مېيى.

25.0 ~ 50.0

ئەڭلىك ئوت

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

ئۆسۈملۈك مېيى

ئۆسۈملۈك مېيىنى 120°C قىچە قىزىتىپ، ئۈستىگە ئەڭلىك ئوتنى قوشۇپ، دەرھال

سۈزىلا پۈتىدۇ. ئۇششۇكنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

5. ئېمولىسىيە (زىمات)

20) ئاددىي زىمات (سۇلۇق ماي).

0.1

ئاق موم

1.5

سېتانول

0.5

ئاتىرىي لا ئۇرىل سۇلفات

مۇۋاپىق مىقداردا

گلىتسىرىن

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

دېستىللىنىگەن سۇ

ئېمولىسىيە ئاساس ماددىسى قىلىنىدۇ.

21) ئاددىي ماي (مايلىق سۇ).

10.0

ئاق موم

40.0

سۇيۇق پارافىن

8.0

لانولېن

15.0

ئاق ۋازېلىن

1.5

دانىكا

سپان ⁸⁰	1.0
دېستىللىگەن سۇ	100.0 بولغىچە قوشۇلمىدۇ.
ئېمۇلىسىيە ئاساس ماددىسى قىلىنىدۇ.	
(22) مۇرەككەپ كورتىمكوسىتروئىد زىماتى.	0.025
بېككولمېتا زون	1.0
دېئومېتسىن	
ئاددىي زىمات	100.0 بولغىچە قوشۇلمىدۇ.
سۇس ئۆتكۈر ياكى سوزۇلماھۇل تەمرەتكە، نېرۋا خاراكىتېرلىك تېرە ياللۇغى، ياپىلاق لىشاي، قىچىشىدىغان كېسەللىكلەر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.	
(23) فلۇراتسىل زىماتى.	5.0
فلۇراتسىل	100.0 بولغىچە قوشۇلمىدۇ.
ئاددىي زىمات	
ياشلاردىكى ياپىلاق سۆگەل ۋە ئاددىي سۆگەللەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.	
(24) ھىدروكۇينۇن زىماتى	3.0 ~ 5.0
ھىدروكۇينۇن	1.0
سۇسىز ناترىي سۇلفۇر	100.0 بولغىچە قوشۇلمىدۇ.
ئاددىي زىمات	
سېرىق داغ ۋە قارىداش كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ.	
(25) گۇڭگۇرت زىماتى.	3.0 ~ 6.0
گۇڭگۇرت چۆكىمىسى	100.0 بولغىچە قوشۇلمىدۇ.
ئاددىي زىمات	
ئاددىي دانىخورەك، ماي تەپچىمىدىغان تېرە ياللۇغى ۋە ئاددىي توپان ئەسۋىسى	
قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ.	
(26) ئۇرېئا زىماتى	10.0 ~ 20.0
ئۇرېئا	100.0 بولغىچە قوشۇلمىدۇ.
ئاددىي زىمات	
تېرە يېرىلىش، تەڭگە قاسراقلىق مۇڭگۈزلەشكەن پۇت - قول تەمرەتكىسى ۋە تەڭگە قاسراقلىق تەمرەتكە قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.	
(27) 5% لىك تىمتانى دىئوكسىد زىماتى ۋە 5% لىك پارا - ئامىنو بېنزويىك كىسلاتا زىماتى.	
ئايىر - ئايىر ھالدا ئېھتىياجلىق - تىمتانى دىئوكسىد ۋە پارا - ئامىنو بېنزويىك كىسلاتاسىنى ئۆلچەپ ئېلىپ، نىسبەت بويىچە ھەر قايسىسىنى ئاددىي زىمات ئۈستىگە قۇيساقلا پۈتمىدۇ.	
نۇر قوسقۇچى دۇرا بولۇپ، نۇرغا سېزىمچان تېرە كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ.	
6. تىنكىتورلار: ئىسپىرتلىق ياسالما ۋە سۇيۇق مەلھەم.	
(28) 5% لىك سالىسىلىك كىسلاتا ئىسپىرتى.	
سالىسىلىك كىسلاتا	5.0

95% لىك ئىسپىرت 100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

تېرە تەمرە تىكىلىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(29) پىمىپىئۇدولارىكىس تىنىكتۇرىسى.

پىمىپىئۇدولارىكىس 20.0

75% لىك ئىسپىرت 100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

تېرە تەمرە تىكىسىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(30) مۇرەككەپ بېنزويىك كىسلاتا تىنىكتۇرىسى.

بېنزويىك كىسلاتا 6.0 ~ 12.0

سالىسىلىك كىسلاتا 3.0 ~ 6.0

گلىتسىرىن 6.0

75% لىك ئىسپىرت 100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

تەڭگە قاسرا قىلىق بەدەن تەمرە تىكىسى ۋە پۇت تەمرە تىكىسىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(31) سالىسىلىك كىسلاتا — خلورومىتسىتېن تىنىكتۇرىسى.

سالىسىلىك كىسلاتا 2.0

خلورومىتسىتېن 1.0

75% لىك ئىسپىرت 100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

تۈك خالىتا ياللۇغى ۋە باش تېرىسىنىڭ ماي تەپچىپ تۇرىدىغان تېرە ياللۇغىنى دا-

ۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

(32) مۇرەككەپ كامفۇرا تىنىكتۇرىسى.

كامفۇرا 5.0

سۇيۇق فېنول 2.0

95% لىك ئىسپىرت 100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

قىچىشقا ياكى باشقا تېرە كېسەللىكلىرىدىكى قىچىشىنى توختاتقۇچى دورا سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ.

(33) مۇرەككەپ مۇستارگېن ئىسپىرتى

مۇستارگېن 0.05

پرومېتازىن 0.025

پرىدنىزولون 0.1

95% لىك ئىسپىرت 100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

ئاق كېسەل ياكى دائىرىلىك چاچ چۈشۈشلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(34) جىن كېۋىزى ئىسپىرتى.

جىن كېۋىزى 30.0

75% لىك ئىسپىرت 100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

ئاق كېسەلنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(35) مۇرەككەپ رېزورىنسىن سۇيۇق مەلھىمى.

رېزورىنسىن 10.0

سۇيۇق فېنول 2.0

پروپانول 5.0

8.0	95% لىك ئىمىپىرت
100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.	دېستىللىگەن سۇ
	ھەر خىل تەمرە تىكلەر ۋە تەشۋىسچان باكتېرىيىلىك تېرە كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ.
0.3	(36) مۇرەككەپ فۇكسىن سۇلۇق مەلھىمى.
1.0	بازىك فۇكسىن
5.0	دانىكا كىسلاتاسى
10.0	سۇيۇق فېنول
5.0	رېزورىتسىن
10.0	پروپانول
	95% لىك ئىمىپىرت
100ml بولغىچە قوشۇلىدۇ.	دېستىللىگەن سۇ
	تېرىدىكى ھەر خىل تەمرە تىكلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.
3.0	(37) چاچ ئۆستۈرگۈچى سۇيۇق مەلھىم.
5.0	خلورال ھىدرات
20.0	ئابدېمىلىك مېيى
0.1	خىمىيەن تىنىكتۇرسى
100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.	سىياپ دىخلور
	75% لىك ئىمىپىرت
	ياغ تەپچىش خاراكتېرلىك چاچ چۈشۈش ۋە دائىرىلىك چاچ چۈشۈشلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.
	(38) قىچىشىشنى توختاتقۇچى سۇيۇق مەلھىم.
1.0	تىمول
1.5	مېنتول
5.0	سىنىك ئوكسىد
6.0	گلىتسېرىن
100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.	10% لىك ئىمىپىرت
	قىچىشىدىغان تېرە كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.
	(39) ھورمون سۇيۇق مەلھىمى.
0.1	پرىدنىزولون
(0.025)	(تريامىتسىنولون)
100.0 نېرۋا خاراكتېرلىك تېرە	60% ~ 30 دىئېتىل سۇلفوكسىد ئىمىپىرت نېرۋىسى
	رەياللۇغى ۋە سوزۇلما ھۆل تەمرە تىكلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.
	(40) قاقچ چۈشۈرگۈچى سۇيۇق مەلھىم.
1.0	فىنول
2.5 ~ 5.0	مالتىمىلىك كىسلاتا
100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.	ئۆسۈملۈك مېيى
	قاقچ چۈشۈرۈشكە ئىشلىتىلىدۇ.
	7. پاستىلار

41) سىنىك ئوكسىد پاستىسى،

سىنىك ئوكسىد

25.0

كراخمال

25.0

لانولىن

مۇۋاپىق مىقداردا

ۋازېلىن

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

42) ئېمۇلسىيە تېپىندىكى پاستا.

سىنىك ئوكسىد

12.5

كراخمال

12.5

ھېكسادىكا نول

3.0

سىپان 60

1.0

ئاليۇمىن ئاتسپىتات سۇيۇقلۇقى

16.0

ۋازېلىن

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

يۇقىرىقى ئىككى خىل پاستا، پاستا ئاساسىي قىلىنىدۇ، ئۇنىڭغا ئانتىبىيوتىك، كورتم-
كوستروئىد ھورمونى ياكى باشقا ئېھتىياجلىق دورىلارنى قوشۇشقا بولىدۇ. سىرغىش روشەن
بولمىغان سۇس ئۆتكۈر ئەھۋاللاردا ئىشلىتىلىدۇ.

43) مېتىل ۋىئولېت پاستىسى.

مېتىل ۋىئولېت

1.0

گلىتسېرىن

9.0

سىنىك ئوكسىد پاستىسى

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

يۇقۇلمىنىش قوشۇلۇپ كەلگەن سۇس ئۆتكۈر كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

44) گۇڭگۇرتلۇق كوكۇس مېيى پاستىسى.

گۇڭگۇرت پاراشوكى

5.0

كوكۇس مېيى

5.0

سالتسىيلىك ئاتسېد

2.0

سىنىك ئوكسىد پاستىسى

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

يۇقۇلمىنىش ئەگىشىپ كەلگەن سۇس ئۆتكۈر خاراكتېرلىك كېسەللەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

لېكىن تۈك خالتا ياللۇغىغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك.

8. مەلەملەر

45) گۇڭگۇرت مەلھىمى.

گۇڭگۇرت پاراشوكى

10.0 ~ 20.0

ۋازېلىن

100.0 بولغىچە قوشۇلىدۇ.

3 - قوشۇمچە. مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگەن تەجرىبىدىن

ئۆتكەن جۇڭگىي دورىلىرى قەدىمكى رېتسىپلىرى

1. شىجياۋدىخۇاڭشاڭ قاينا تىمىسى (« جىددىي ئىشلىتىلىدىغان بىمباھا مۇھىم رېتسىپلار » دىكى رېتسىپ): كەركىمدان مۇڭگۈزى $0.6g$ (سوقۇپ ئىچكۈزۈلگۈدۇ)، خام ئەگرى سۇناي $30g$ ، قىزىل چوغلۇق $12g$ ، دەن پى $9g$ ، سۇدا قاينىتىپ كۈنىگە بىر قېتىم، ئېغىر ۋە ئۆتكۈر كېسەللەرگە كۈنىگە ئىككى قېتىم بېرىلىدۇ.

2. لوڭدەن شېگەنتاڭ قاينا تىمىسى (« تىبابەت پېشىۋالىرى گۆھەر مەجمۇئەسى » - دىكى رېتسىپ): جىنتىيا $12g$ ، جىزى $9g$ ، قالقانگۈل $6g$ ، پەربۇن $6g$ ، خام ئەگرى سۇناي $18g$ ، پا قا يوپۇرماق ئۇرۇقى $6g$ ، ياۋا كەشمر $12g$ ، داڭگۈي $6g$ ، مۇتوڭ $9g$ ، چۈچۈك بۇيا $3g$. سۇدا قاينىتىپ كۈنىگە بىر قېتىم تېرە ياللۇغى ۋە ھۆل تەمرە تىكىنى داۋالاشقا ئىچكۈزۈلگۈدۇ.

3. سەيخۇ شۇگەنسەن تالقىنى (« جىڭيۇي قامۇسى » دىكى رېتسىپ): پەر- بۇن $9g$ ، ئاق چوغلۇق $12g$ ، جۇچاۋ $9g$ ، چۈەن چوڭ $9g$ ، سوھىدى ھىندى $9g$ ، قورۇلغان چۈچۈك بۇيا $6g$ ، سۇدا قاينىتىپ ئىچكۈزۈلگۈدۇ.

4. چۈشىۋېي جىنتاڭ قاينا تىمىسى (« تىبابەت پېشىۋالىرى گۆھەر مەجمۇئەسى » دىكى رېتسىپ): سانجۇ (قورۇلگۈدۇ)، خۇپۇ (تېز قورۇلگۈدۇ)، جۈزە پوستى، جۈلەڭ، ياۋا كەشمر، جى فۇلەڭ، بەيجۇ (توپا بىلەن قورۇلگۈدۇ)، كۆك سېغىز، فاڭ فېڭ، شەنجىزى (خام پېتىمچە يەنجىلىگۈدۇ)، مۇتۇڭلارنىڭ ھەرقايسىسىدىن $3g$ ، گۈلدارچىن، خام چۈچۈك بۇ- يىلارنىڭ ھەرقايسىسىدىن $0.9g$ دىن ئېلىپ سۇدا قاينىتىپ ئىچكۈزۈلگۈدۇ. بەلباغسىمان قوقاق، ھۆل تەمرە تىكە ۋە تەڭگە تەمرە تىكىلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

5. جىڭ - فاڭ رېتسىپى (مۇجەرىپ رېتسىپلار): جىڭ جى $10g$ ، فاڭ فېڭ $10g$ ، پىلە قۇرتى $10g$ ، ئۇچقات $20g$ ، قېرىق $15g$ ، دەن پى $15g$ ، سەي فۇپىڭ $10g$ ، خام ئەگرى سۇناي $15g$ ، يالپۇز $7.5g$ ، قالقانگۈل $15g$ ، دەن پى $7.5g$ ، خام چۈچۈك بۇيا $10g$. سۇدا قاينىتىپ كۈنىگە بىر قېتىمدىن ئىچكۈزۈلگۈدۇ، ئاساسەن يەلتاشمىنى داۋالايدۇ.

6. دىي خۇاڭ يىن ئىچكىلىكى (« تىبابەت پېشىۋالىرى گۆھەر مەجمۇئەسى » دىكى رېتسىپ): خام ئەگرى سۇناي، پىشىق ئەگرى سۇناي، خېشۇۋۇلارنىڭ ھەرقايسىسىدىن $9g$ ، داڭگۈي، دەن پى، چۇفا، ئاق ئوغرى تىكەن، پىلە قۇرتلارنىڭ ھەرقايسىسىدىن $4.5g$ ، زاراڭزا چېچىكى، خام چۈچۈك بۇيىلارنىڭ ھەرقايسىسىدىن $1.5g$ ئېلىپ سۇدا قاينىتىپ

كۈنىگە بىر قېتىمىدىن بېرىلىدۇ. تىنچ دەۋرلىك تەڭگە تەمرەتكە، قىچىشقا قىچىشقا كېسىلى ۋە سوزۇلما مۆل تەمرەتكەلەرنى داۋالايدۇ.

7. شاۋبېك سەن تاللىنى: چىڭ چې 6g، فاڭ پېڭ 9g، داڭگۈي 9g، خام ئەگرى سۇناي 12g، كۈشك 9g، ساڭجۇ 9g، دەن تۇي 3g، زېتىر 9g، قېرىقىز ئۇرۇقى 9g، جى مۇ 9g، گەج 15g، خام چۈچۈك بۇيا 4.5g، مۇتوڭ 9g. سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ ياكى تېرە يۇيۇلىدۇ. تاشما، ھۆل تەمرەتكە ۋە تېرە ياللۇغلىرىغا ئىشلىتىلىدۇ.

8. سى مياۋ بۇڭ ئەنتاڭ قاينىتىمىسى («مۇجەررىپ رېتسېپلار يېڭى توپلىمى» دىكى رېتسېپ): چۇقا، داڭگۈي، يىن خۇالارنىڭ ھەر قايسىسىدىن 30g، چۈچۈك بۇيىدىن 9g ئېلىپ سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

9. شىئاۋجىن دەن («تاشقى كېسەللىكلەر قامۇسى» دىكى رېتسېپ): بەي جياۋشياڭ، بۇۋانە، ئۇچار چاشقان مايىقى، سازاڭ، مۇبې ھەر قايسىسىدىن 45g، مەستىكى رۇمى (ياغسىزلاندۇرۇلغان)، مېي ياۋ (ياغسىزلاندۇرۇلغان)، گۈي شېنلارنىڭ ھەر قايسىسىدىن 22.5g، ئىپار 9g، مۇتەن 3.6g. تەخمىنەن 250 دانە كىچىك كۇمۇلاچ ياسىلىپ، ھەر قېتىمىدا 2~3 دىن، كۈنىگە 1~2 قېتىم ئىچىلىدۇ. لىمفا تىۋېر كۈلۈزى، سوزۇلما يىملىك ياللۇغلىرىنى داۋالايدۇ.

10. لۇۋېي دىخۇاڭ ۋەن كومۇلىچى («بالمىلار كېسەللىكلىرى ھەققىدىكى دورا نەزەرىيەسى» دىكى رېتسېپ): پىششىق ئەگرى سۇناي 24g، پىچەكگۈل 12g، شەن كىرۇ 12g، فۇلىك 9g، ياۋا كەشىمىر 9g، دەن پى 9g، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. كۇمۇلىچىنى ھەر قېتىمىدا 9g دىن كۈنىگە 2~3 قېتىم ئىچىلىدۇ. پىچەكگۈل ئۆلتۈرۈشۈشنى داۋالايدۇ.

11. تاۋخۇاڭ سەۋۋۇتاڭ قاينىتىمىسى («تەبىئىي سەركەردىسى» دىكى رېتسېپ): پىششىق ئەگرى سۇناي 15g، داڭگۈي 12g، چوغلۇق 9g، چۈەن چۇڭ 6g، شاپتۇل مېنىزى 9g، زاراڭزا چېچىكى 6g. سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

12. ياڭ خېتاڭ («تاشقى كېسەللىكلەر قامۇسى»): پىششىق ئەگرى سۇناي 30g، ئاق قىچا ئۇرۇقى 6g، پاۋ چياڭ تەن 1.5g، چاكاندا 3g، چۈچۈك بۇيا 3g، دارچىن 3g (چېلىمىنىمىدۇ)، بۇغا مۇڭگۈز يېلىمى 9g (ئېرىتىلگەن) سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. تېرە قات تىنچلىتىش كېسىلى ۋە قان تومۇر ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

13. شىن يېڭياڭ جىن دەن («تەبىئىي سەركەردىسى» دىكى رېتسېپ): چياڭخۇ، سىچۈەن يېمىسى، تىيەنماغولى، داڭگۈي، چوغلۇق، سېرىق يۈگەي، پىششىق ئەگرى سۇناي، چۈەن چۇڭ. يۇقىرىقى دورىلاردىن ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ، ئېزىپ، ئەگرى سۇناي مەجۈنىنى ئاساس دورا قىلىپ، ئۇششاق تاتلىق كۇمۇلاچ ياساپ، كۈنىگە ئىككى قېتىم ھەر قېتىمدا 9~6 دىن بېرىلىدۇ.

14. چىڭ ۋىن بەي دۇيىن ئىچىملىكى («ۋا با ئەسۋىسى ھەققىدىكى تەسىرات»- دىكى رېتسېپ): گەج 30g (بالىدۇر قاينىتىلىدۇ)، جى مۇ 9g، چۈچۈكبۇيا 3g، خام ئەگرى سۇناي 24g، مامۇرانچىن 6g، چىزى 6g، ئالقانگۈل 9g، قىزىل چوغىلۇق 9g، چۇقا 9g، لىيەنچىياۋ 12g، كەركىدان مۇڭگۈزى 0.6g (سوقۇپ ئىچكىزۈلىدۇ)، دەن جۇ-يە 12g، قوڭغۇراق گۈل 6g، دەن بى 6g سۇدا قاينىتىپ ئىچىملىدۇ، كېسىملى ئېغىرلارغا كۈنىگە 3~2 قېتىم ئىچكىزۈلىدۇ.

15. چىڭ يىڭتاڭ قاينىتىمىسى («ئىسسىق كېسەللىكلەرنىڭ تۈرلەر بويىچە ئالامەتلىرىنى ئىلغاش» تىمى رېتسېپ): كەركىدان مۇڭگۈزى 0.9g (سوقۇپ ئىچىملىدۇ)، چۇقا 9g، خام ئەگرى سۇناي 24g، مۇۋەببەل سىمپىت 9g، مامۇرانچىن 6g، چۆل يالپۇز يىمىلىتىمىزى 12g، يىڭخۇا 12g، لىيەنچىياۋ 9g، دەن جۇبى 12g سۇدا قاينىتىپ ئىچكىزۈلىدۇ.



1.5 - رەسىم.
تېگىشلىكتىن بول-
غان تېرە ياللۇغى
(دېدا جۇ ھارەقە
نى سۇرتۇشتىن
پەيدا بولغان)

2.5 - رەسىم. دورا ئەسۋەسى (مۇقىم
قىزىل داغ تىپلىق)



3.5 - رەسىم.
چوڭ قاپار تىمە-
لىق يۈزە تېرە
پوشىش تىپلىق
دورا ئەسۋەسى
(يۈزە تېرە زە-
ھەردىن ئىككىرۈز-
لىنىمى ئېرىش
تىپلىق دورا
ئەسۋەسى)



5.5 - رەسىم . ئۆتكۈر ئېكزېما




4.5 - رەسىم . دورا ئەسۋەسى (سويۇلۇش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغى تەپى)



7.5 - رەسىم . سوزۇلما ئېكزېما



6.5 - رەسىم . سۇس ئۆتكۈر ئېكزېما



5. 10 - رەسىم. قان تومۇرلۇق سۇلۇق 5. 11 - رەسىم. تېرىگە سىزىق چۈشۈش كېسىلى
ئىشلىق



5. 12 - رەسىم. دۆڭچە ئەسۋىلىك ئېشەك يېمى 7. 1 - رەسىم. چوڭ پۇۋەكچە تېمىلىق يىرىك
قاپار تېمىلىق يارا

7. 2 - رەسىم. ئاددىي
تېمىلىق يىرىك قا-
پار تېمىلىق يارا






8. 2 - رەسىم. قۇلاق چوڭ نېرۋىسىنىڭ
توملىشىپ كېتىشى




8. 1 - رەسىم. سىلىسىمان ماخاۋ



8. 4 - رەسىم. سىلىسىمان ماخاۋ
(تاپان يارىسى)




8. 3 - رەسىم. قارچۇغا پەنجىسىمان قول



8. 6 - رەسىم. ئۆسمەسەنجان ماخاۋ
(«شەش يۈز» گە ئوخشاپ قالغان)



8. 5 - رەسىم. ئۆسمەسەنجان ماخاۋ
(تۈگۈنچىلىك زەخمىلەندىش)



8. 8 - رەسىم. سۆگەلىسىمان تېرە سىلى



8. 7 - رەسىم. ئاددىي بۆرە چاقىسى



9. 1 - رەسىم. ئاددىي قوقاق



9. 8 - رەسىم. دۆڭچە ئەسۋە نىكروزلىنىش -
لىق سىل ئەسۋەسى



9. 3 - رەسىم ئاددىي سۆڭەل



9. 2 - رەسىم. بەلباغسىمان قوقاق




9. 4 - دەسىم، ئۇ-
چلۇق ھۆل سۆگەل




9. 6 - دەسىم، ياپىلاق سۆگەل




9. 5 - دەسىم، تاپان سۆگەلى



9. 7 - دەسىم، يۇ-
قۇملىق يۇمشاق
سۆگەل



10. 2 - رەسىم . باش تەمرە تېكىسى
(ئاق تەمرە تېكە)



10. 1 - رەسىم . باش تەمرە تېكىسى (سېرىق تەمرە تېكە)





10. 3 - رەسىم . يىرىڭلىق تەمرە تېكە



10. 4 - رەسىم . پۇت قەمرە تېكىسى
(پىشلا قىلىشىپ شەلۋەرەش تىپى)

10. 5 - رەسىم . پۇت تەمرە تېكىسى (زىيا-
دە مۇڭكۈزلىشىش تىپى)





10 . 7 - رەسىم. تىرىناق تەمرە ئىككىسى
(زامبۇرۇغلۇق ئاق تىرىناق)



10 . 6 - رەسىم. تىرىناق تەمرە ئىككىسى



10 . 8 - رەسىم. بەدەن تەمرە ئىككىسى



10 . 9 - رەسىم. يوتا تەمرە ئىككىسى



10.10 - رەسىم. تېرە تەسۋىسىمان زامبۇ-
دۇغ كېسىلى



12. 2 - رەسىم. قوتۇر
تونىلى (سىيا سىنمىقى
مۇسپى)

12. 1 - رەسىم. قوتۇر



12. 3 - رەسىم. قوتۇر (ئۇرۇقدان
خالىمىسى تۈگۈنچىلىمىرى)



12. 5 - رەسىم. ھاشارات مەنبەلىك تېرە
يالىۇغى



12. 4 - رە-
سىم. يوشۇرۇ
ن قاناتلى-
مىق قۇرت مە
نبەلىك تېرە
يالىۇغى
←



14. 1 - رەسىم. نېرۋا خاراكتېرلىك
تېرە ياللۇغى




14. 2 - رەسىم. كەڭ دائىرىلىك
قىچىشقا كېسىلى



14. 3 - رەسىم. تۈگۈنلۈك قىچىشقا
ئەسۋىسى



15. 1 - رەسىم. ئاددىي تەڭگە تەمرەتكە



15. 2 - رەسەم.
تەڭگە تەمرە تەكە
(باش قىسىدا)


15. 3 - رەسەم.
بوغۇم كېسىلى
تېپىلىق تەڭگە
تەمرە تەكە

15. 4 - رەسەم.
قىزىلگۈل رەڭلىك
توپان ئەۋىسى

2	1
	3



15. 5 - رەسىم. كۆپ شەكىللەنك قىزىل داغ



15. 6 - رەسىم. يېنىسىمان ياپىلاق لىشاي



17. 1 - رەسىم. تەخىمىسمان قىزىل
داغلىق بۆرە چاقىمىسى




↑ 17. 2 - رەسىم. چەكلىك تېرە قاتتىقلىق
شەش كېسىلى



18. 1 - رەسىم. ئاددىي دانىخورەك



→ 18. 2 - رەسىم. قىزىل بۇرۇن



18. 3 - رەسەم. دائىرىلىك چاچ
چۈشۈش

19. 1 - رەسەم. تاتۇق
ئۆلچەمىسى

19. 2 - رەسەم. قان تومۇر
ئاددىي ئۆلچەمىسى



19. 3 - رەسەم. قان تومۇر
بۇلۇتسىمان ئۆلچەمىسى



20. 1 - ره سیم، ثاق کپسېل

20. 2 - ره سیم، ئاددسي قاسرا
قلمق تېره کپسېلی



20. 3 - ره سیم، ئاددسي پېمفېگوس