

شىپالىق قول

3

كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنى يۇتىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالاش

شىنجاڭ خەلق باش نەشرىياتى
شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

مۇقاۋا لايىھەلىگۈچى : ئەنۋەر قاسىم

شىپالىق قول



3



شىنجاڭ ئۇلۇغ ئىشلىرى شىنجاڭ ئۇلۇغ ئىشلىرى

ISBN 978-7-5372-6456-3



9 787537 264563 >

شىمالىق قول

— كۆپ كۆرۈلىدىغان كىسەللەكلەرنى يېتتى ئۆزۈڭلار ئارقىلىق داۋالاش

(3)



شىنجاڭ خەلق باش نەشرىياتى
شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

图书在版编目(CIP)数据

手到病自除.3: 维吾尔文 / 杨奕著; 阿迪力·奥布力喀斯木译. — 乌鲁木齐: 新疆人民卫生出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5372-6456-3

I. ①手… II. ①杨… ②阿… III. ①反射疗法 - 基本知识 - 维吾尔语(中国少数民族语言) IV. ①R244.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第296988号

书 名: 手到病自除.3
翻 译: 阿迪力·奥布力喀斯木
责任编辑: 谢米西卡麦尔·阿布都热合曼、拜尔娜·安尼瓦尔
责任校对: 早热古丽·司地克
封面设计: 艾尼瓦·卡森木
制 版: 阿卜杜艾尼·阿巴斯
出 版: 新疆人民出版总社
新疆人民卫生出版社
地 址: 乌鲁木齐市龙泉街196号
网 址: <http://www.xjpsp.com>
印 刷: 乌鲁木齐八家户彩印有限公司
发 行: 新疆新华书店
版 次: 2015年12月第1版
印 次: 2015年12月第1次印刷
开 本: 710×1000毫米 1/16开本
印 张: 14.125
书 号: ISBN 978 - 7 - 5372 - 6456 - 3
印 数: 1—2000
定 价: 30.00元

发行科联系电话: (0991)2823055 邮编: 830001

ئاپتوردىن

«شىپالىق قول» ناملىق يۈرۈشلۈك كىتابنىڭ 3 - قىسمى توغرىسىدا

بۇ يىل 8 - ئايدا بېيجىڭدا بالدۇرلا كۈز كەلگەنلىكىدىن بېشارەت بولدى، 2009 - يىلى 8 - ئايدا، «شىپالىق قول» ناملىق يۈرۈشلۈك كىتابنىڭ 1 - قىسمى رەسمىي نەشر قىلىندى، بەش ئايدىن كېيىن بۇ كىتابنىڭ 2 - قىسمى نەشرىدىن چىقتى. كۆزنى يۇمۇپ - ئاچقۇچە يەنە ئۈچ يىل ئۆتۈپ كەتتى، ماڭا ئوخشاش ھاياتىنىڭ 72 يىللىق مۇساپىسىنى بېسىپ بولغان، ۋاقىتنىڭ تېز ئۆتۈپ كېتىشىدىن ئانچە بەك خۇرسىنىپمۇ كەتمەيدىغان مومايغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بۇ ئۈچ يىلدا ماڭا يەنىلا ئېيتىپ تۈگەتكۈسىز بەخت - تەلەي بېسىپ يولدى. ئۈچ يىلدىن بۇيان، «شىپالىق قول» ناملىق بۇ كىتاب ئارقىلىق مەن بىلەن تونۇشقان دوستلار، ھەممىڭلار ياخشى تۇرۇۋاتامسىلەر؟

ئىلگىرى مەن «بۇ ئۆمرۈمدە قايغۇ ۋە خۇشاللىقلارنى، كىشىلىك تۇرمۇشنىڭ ئىسسىق - سوغۇقلىرىنىڭ ھەممىسىنى باشتىن كەچۈرۈپ بولدۇم، بۇنىڭدىن كېيىنكى ئۆمرۈمدە ئەمدى بەزى چوڭ ئۆزگىرىشلەر ياكى چوڭ خۇشاللىق، چوڭ خاپىلىق ئىشلار بولماسلىقى مۇمكىن» دەپ قارايتتىم. ئەمما ئويلىمىغان يەردىن 70 ياشقا كىرگەن شۇ يىللىرى، مەن ئۆزۈم 30 يىل قىلغان ئىشىمنى ۋە تەجرىبىلىرىمنى كۆپچىلىككە تونۇشتۇردۇم، مۇشۇ بىر كىتابنىڭ سەۋەبى بىلەن تۇرمۇشىمدا شۇنداق چوڭ ئۆزگىرىشلەر بولدى.

تۇنجى قېتىم نەشرىيات بىلەن ئۇچراشتىم، تۇنجى قېتىم ئۆز تەجرىبىلىرىمنىڭ كىتاب بېتىگە تىزىلغانلىقىنى كۆردۈم، تۇنجى قېتىم باشقىلارغا ئىمزا قويۇپ بەردىم ھەم تۇنجى قېتىم يولدا كېتىۋاتقىنىمدا ئوقۇرمەنلەر مېنى تونۇۋېلىپ چاقىردى... تۇرمۇشىمدا كۆرۈلگەن بۇ يېڭىلىقلار تۇرمۇشقا بولغان مىننەتدارلىق ھېسسىياتلىرىنى يەنىمۇ ئۇرغۇتتى.

دەرەخ چوڭ بولسا شامال ئاسان تېگىدىكەن، ئادەم سېمىز بولسا ئاسانلا مۇدۈرۈپ يىقىلىدىغان گەپكەن (چاقچاق)... ماڭا ئوخشاش بىر سېمىز مومايمۇ مۇشۇنداق ئىشلاردىن مۇستەسنا قالمايدىم. «شىپالىق قول» ناملىق بۇ يۈرۈشلۈك كىتابلارنى سۇندۇرغانلارمۇ ۋە ماختىغانلارمۇ بولدى، بۇ ئىشلارغا

نەسبەتەن، مەن پەقەت بۇ كىتابنى تۈز كۆڭۈللۈك بىلەن يازدىم دېيەلەيمەن، ئۆمرۈمدە باشقا چوڭ نەرسىلەرنى قالدۇرالمىغان بولساممۇ، ئەمما «ۋىجدان» دېگەن بۇ سۆزنى ئەسلا يادىمدىن چىقارمىدىم، شۇڭا ھاياتىمدىن ئۆكۈنمەيمەن ھەم پۇشايمان قىلمايمەن.

«شىپالىق قول» ناملىق يۈرۈشلۈك كىتابنىڭ 1 - ۋە 2 - قىسمى نەشر قىلىنغاندىن كېيىن، مەن كۆپچىلىكنىڭ بەزى مەسىلىلەرنى تېزلىكتە ھەل قىلىشىغا قولايلىق يارىتىش ئۈچۈن مىكرو بىلوگنى ئاچتىم، ئېلېكترونلۇق خەت ساندۇقى ۋە تېلېفون نومۇرۇمنى ئاشكارا ئېلان قىلىپ، خېلى ئۇزاق ۋاقىتلارغىچە ئوقۇرمەنلەر بىلەن ئوچۇق ئالاقە قىلدىم، ئوقۇرمەنلەر بەس-بەستە مىكرو بىلوگىمغا سۆز قالدۇردى، ماڭا تېلېفون قىلدى، قىسقا ۋاقىت ئىچىدىلا تۈرلۈك ئۇچۇرلار يىغىلىپ كەتتى. بەزىلەر ماختاپ ئۇچۇر ئەۋەتسە، بەزىلەر كىتابتىكى مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ، بەزىلەر ئۆزىنىڭ بۇ ئۇسۇلنى قوللانغاندىن كېيىن كۆرۈلگەن نەتىجىلەرنى سۆزلىسە، يەنە بەزىلەر بۇ ئۇسۇلنى قوللانسىمۇ ئۈنۈمى كۆرۈلمىگەنلىكىنى ھەم ئۆزىنىڭ بۇنىڭغا بولغان گۇمانلىرىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ.

تور دەۋرىدە ئۇچۇرلارنىڭ دەل ۋاقتىدا ئەۋەتىلىدىغانلىقى ۋە ئاشكارىلىنىدىغانلىقى سەۋەبىدىن، مەندەك بىر ياشانغان موماينىڭ ھەر كۈنى نۇرغۇنلىغان ئۇچۇرلارنى بىر تەرەپ قىلىشىغا توغرا كەلدى. راستىنى ئېيتسام، بۇ ئىشلار مېنى بىر ئاز چارچاتقان بولسىمۇ، لېكىن كۆڭلۈم خۇشال ئىدى. بۇ ئاممىنىڭ ئېھتىياجىنى چۈشىنىدىغان، ئۆزۈمنىڭ تەتقىقات ۋە ئۇۋۇلاش تېخنىكاغا نىسبەتەن باشقىلارنىڭ باھاسىنى ئاڭلايدىغان ياخشى پۇرسەت بولغاچقا، بۇنى تەلەپسىز ئوڭىدىن كەلدى دېسەممۇ بولىدۇ، چۈنكى باشقىلارنىڭ ماڭا بەرگەن باھاسىنى تور ئارقىلىق ئاڭلاشتەك بۇ خىل ئۇسۇل ئىلگىرىكى بىمارلار بىلەن بىرمۇ بىر ئۇچرىشىدىغان ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدىن كۆپ ياخشى ئىدى.

ئۈچ يىلدىن بۇيان، مەن ھەر كۈنى ئېلېكترونلۇق پوچتا يوللانمىسى ئارقىلىق ئوقۇرمەنلەر بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلدىم، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەمەلىي مەشغۇلات قىلىشتىن ۋاز كەچمەي، رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كىشىلەرنىڭ بەدىنىنى تەڭشەشكە ئىزچىل ياردەم بەردەم. چۈنكى يۈرىكىمگە پۈت قىسمى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ پېشۋاسى خاڭ شيوڭۋېن ئەپەندىنىڭ «500 جۈپ پۈتنى ئۇۋۇلاپ باقمىغان ئادەم پۈتنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنى بىلمەيدۇ، 1000 جۈپ

پۇتنى تۇتۇپ باقمىغان ئادەم دىياگنوز قويۇپ بەدەننى تەڭشەش ئۇستىسى ھېسابلانمايدۇ» دېگەن بۇ سۆز چوڭقۇر ئورنىغان ئىدى. مەن ھەر قېتىم باشقىلارغا بۇ سۆزنى دېگەن چېغىمدا، قىزىم ھەمىشە ماڭا: «سىز 1000 جۈپ پۇتنى، ھەتتا ئونمىڭ جۈپ پۇتنى سىيلاپ تۇتۇپ بولغانسىز» دەيدۇ. ئەمما مەن ئۇۋۇلاش خىزمىتىگە كىرىشسەم زادىلا ھارغىنلىق ھېس قىلمايمەن. خۇددى پۇت قىسمى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىغا مەپتۇن بولۇپ قالغاندەكلا، خاك شىوڭۇپ، مېڭ جاۋى قاتارلىق پېشقەدەم ئۇستازلارنىڭ تەجرىبىلىرىنى ئۆگىنىش ۋە ئوقۇرمەنلەر يوللىغان ئۇچۇرلارنى بىر تەرەپ قىلىش بىلەن ئالدىراش يۈرۈم، بۇ ئەنئەنىۋى داۋالاش ئۇسۇلىنى ئۆزۈڭىز تۈردە ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈپ، تۈزىتىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىشقا تىرىشتىم.

«شىپالىق قول» ناملىق بۇ يۈرۈشلۈك كىتابنىڭ 3 - قىسمىنى يېزىشتىن ئىلگىرى، تەھرىرلەر ماڭا بۇ كىتابنىڭ 1 - ۋە 2 - قىسىملىرىنىڭ سېتىلىش مىقدارىنىڭ بىر مىليوندىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى ئېيتتى، بۇنى ئاڭلاپ سەل ئالاقىدە بولدۇم. مەن تورغا چىقىپ بۇ ئىككى قىسىم كىتاب توغرىسىدىكى باھا سۆزلىرىگە كۆز يۈگۈرتتۈم، مېنى خۇشال قىلغىنى شۇكى، بۇ كىتابنى سېتىۋالغان كىشىلەرنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى بۇ كىتابنى ياشانغانلارغا، ئۆيىدىكىلەرگە سوۋغا قىلغانلىقىنى، بۇ كىتابنى سوۋغا قىلىش ئارقىلىق ھەقىقىي بىر ساغلاملىق سوۋغا قىلماقچى بولغانلىقىنى يېزىپتۇ. مېنى ئەپسۇسلاندۇرغان ئىش بولسا، بۇ ئىككى كىتابىم نەشر قىلىنغان بولسىمۇ، ئەمما بەزى ئوقۇرمەنلەر بۇ كىتابتىكى مەزمۇننىڭ ئانچە ئېنىق ئەمەسلىكىنى، ئۇۋۇلاش ماھارىتى توغرىسىدا كۆرسەتمە رەسمىنىڭ يوقلۇقىنى ئېيتىپتۇ، بەزىلەر ماڭا: «ئەگەر كىتابقا ئۇۋۇلاش ئەمەلىي مەشغۇلات رەسىملىرىمۇ قوشۇپ بېرىلگەن بولسا تېخىمۇ قولايلىق بولغان بولاتتى» دەپ سۆز قالدۇرۇپتۇ.

ئويلاپ كۆرۈپ ئوقۇرمەنلەرنىڭ سۆزلىرىنىڭ ئاساسى بارلىقىنى ھېس قىلىدىم، ئىلگىرىكى ئۇ ئىككى كىتابتا بېرىلگەن رەسىملەرنىڭ ھەممىسى سىزما رەسىم بولغاچقا، كۆرۈش تۇيغۇسى نەق مەيداندا كۆرگەندەك بولمايتتى، بەت يۈزىنىڭ چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن ھەربىر يۈرۈش ھەرىكەتنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئاساسلىق قەدەم - باسقۇچنىڭ رەسىمىنىلا كىتابقا تاللاپ كىرگۈزۈپ، بەزى قوشۇمچە ھەرىكەتلەرنى پەقەت يېزىق ئارقىلىق ئىپادىلەشكە توغرا كەلگەن،

بۇنى ھەقىقەتەنمۇ ئالدىنقى ئىككى قىسىم كىتابىنىڭ ئەڭ چوڭ يېتەرسىز تەرىپى ياكى ئەپسۇسلىنىدىغان ئىش دېيىشكە بولىدۇ. ئەگەر «شىپالىق قول» ناملىق يۈرۈشلۈك كىتابىنىڭ ئالدىنقى 1 - ۋە 2 - قىسمىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئۇسۇللار ئاساسەن ماڭا ئوخشاش رېفلىكسىلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاپ بەدەننى تەڭشەش ئۇستىسىنىڭ تەجرىبىلىرى دېيىلسە، ئۇنداقتا بۇ قېتىم مەن باشقىلارنىڭ مەيدانىدا تۇرۇپ، يەنى ئۆزۈمنى ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئورنىغا قويۇپ پىكىر يۈرگۈزۈپ، دەسلەپكى ئۆگەنگۈچىلەرگە، ئائىلىدە ساقلىق ساقلاشقا، ئۆزىنى ئۆزى ئۇۋۇلاپ بەدەننى تەڭشەشكە ماس كېلىدىغان بەزى ئۇسۇللار ئۈستىدە ئىزدەندىم. ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئېھتىياجى ۋە ئەمەلىي ئەھۋالىغا ماس كېلىدىغان بولۇشنى، رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنى كېڭەيتىش ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپلىگەن ئائىلىلەرگە ھەقىقىي مەنپەئەت يەتكۈزۈشنى مەقسەت قىلدىم.

يۇقىرىقى مەقسەتنى چىقىش قىلىپ، «شىپالىق قول» ناملىق يۈرۈشلۈك كىتابىنىڭ 3 - قىسمىنى يېزىشتا، مەن مۇھەررىرلەر بىلەن پىكىرلەشكەندىن كېيىن بۇ قىسىمنىڭ مەزمۇنى لايىھە جەھەتتە تۆۋەندىكىچە ئالاھىدىلىككە ئىگە قىلىندى: بىرىنچى، ئۈچ يىلدىن بۇيانقى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق بەدەننى تەڭشەش جەھەتتىكى يېڭى تەجرىبىلىرىمگە ئاساسەن، ھازىر كۆپ كۆرۈلۈۋاتقان 80 خىل ئىككىلەمچى ساغلاملىق ئالامىتى ۋە سوزۇلما كېسەللىكلەرنى تاللاپ كىرگۈزۈپ، ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىنى ئەڭ زور دەرىجىدە قاندۇرۇشقا تىرىشىش؛ ئىككىنچى، ئۇۋۇلاش ئارقىلىق بەدەننى تەڭشەش ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇشتا ئاددىي ۋە ئۈنۈملۈك بولۇشنى تەكىتلەپ، بارلىق ئۇسۇللارنى تەكرار تەكشۈرۈپ سېلىشتۇرۇپ كۆرۈپ، ئالدىنقى ئىككى قىسىم كىتابىنى تېخىمۇ تولۇقلاپ، بۇ كىتابنىڭ سەۋىيەسىنى يەنىمۇ بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈش؛ ئۈچىنچى، ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن، باشتىن - ئاخىرغىچە ھەقىقىي ئادەملەرنىڭ يېتەكچىلىك قىلىۋاتقان ھالىتىنى سۈرەتكە ئېلىپ، ھەربىر يۈرۈش ئۇۋۇلاش ھەرىكىتىنىڭ قەدەم - باسقۇچلىرىدىكى ھەرىكەتلەرنى رەسىم ئارقىلىق ئايرىم-ئايرىم ھالدا تەپسىلىي تونۇشتۇرۇپ، ئوقۇرمەنلەر بۇ كىتابتىكى رەسىملەرگە بىر قارىسىلا چۈشىنەلەيدىغان ھەم ئاسان ئۆگىنەلەيدىغان قىلىپ تۈزۈش؛ تۆتىنچى، بۇ قىسىمدا رېفلىكسىلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ يادرۇلۇق ئىدىيەسىنى تۇنجى قېتىم ئاشكارىلاش، ئاساسىي رېفلىكس رايونلىرى، كېسەللىك رېفلىكس رايونلىرى ۋە

ئۆزئارا باغلىنىشلىق بولغان رېفلىكس رايونلىرىنى ماسلاشتۇرۇپ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى چۈشەندۈرۈپ، ئۇۋۇلاش ئورنى ۋە ئۇ ئورۇننى ئۇۋۇلاشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئوقۇرمەنلەرگە بىلدۈرۈش؛ بەشىنچى، مۇندەرىجىنى بىۋاسىتە كېسەللىكلەرنىڭ ئىسمى ئارقىلىق رەتكە تۇرغۇزۇپ، ئوقۇرمەنلەرنىڭ تېزلىكتە مەزمۇنىنى ئىزدەپ دەرھال پايدىلىنىشىغا قولايلىق يارىتىش. مۇھەررىرلەر بىلەن سۆزلىشىش ئارقىلىق يۇقىرىقىدەك پىكىر يولى مۇقىملاشتۇرۇلغاندىن كېيىن، مەزكۇر كىتابنىڭ كونكرېت مەزمۇنىنى مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇم:

بىرىنچى بابتا رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ رولى، ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى، ئۇۋۇلاش ئاساسىي ماھارىتى ۋە ئۇۋۇلاش جەريانىدا دىققەت قىلىدىغان ئىشلار قاتارلىقلارنى ئومۇمىي جەھەتتىن تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم. بۇ قىسمى بىلىملەرنى سىستېمىلىق رەتلەش جەريانى، شۇنداقلا مۇھىم بولغان تەييارلىق باسقۇچى بولۇپ، بۇ مەزمۇنلارنى ئەستايىدىل ئوقۇپ ئىگىلىسە، ئاز كۈچ بىلەن كۆپ ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ؛ ئىككىنچى بابتا پۈتتى ئۇۋۇلاشتىن بۇرۇنقى تەييارلىق ئۇسۇللىرى ۋە پۈت قىسمىدىكى 63 رېفلىكسىلىق رايوننىڭ ئورنى، ئۇۋۇلاش ئۈنۈمى ۋە ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى قاتارلىقلار سىستېمىلىق چۈشەندۈرۈلگەن بولۇپ، بۇ ئۇسۇللاردىن پايدىلىنىپ پۈتتى ئۇۋۇلاشقا بولىدۇ؛ ئۈچىنچى بابتا نېرۋا خاراكتېرلىك باش ئاغرىقى، بۇرۇن ياللۇغى، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەر ۋە ئىككىلەمچى ساغلاملىق ئالامەتلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەم ئۆز-ئۆزىنى تەڭشەش ئۇسۇللىرى كۆرسەتمە رەسىملەر ئارقىلىق چۈشەندۈرۈلدى. نۇرغۇنلىغان تەڭشەش ئۇسۇللىرى چۈشەندۈرۈلگەندىن كېيىن، بۇلارنىڭ ئارقىسىغا مەن ئۆزگىچە بولغان تەۋسىيەلىك مەزمۇننى قوشۇپ قويدۇم؛ تۆتىنچى بابتا ئاساسەن يۇقىرى قان بېسىم، قاندىكى ماي مىقدارى ئېشىپ كېتىش، دىيابېت قاتارلىق قوزغىلىش نىسبىتى يۇقىرى بولغان سوزۇلما كېسەللىكلەرنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ داۋالاپ تەڭشەش ئۇسۇللىرى تونۇشتۇرۇلدى، بۇ كېسەللىكلەر بىر - ئىككى كۈندىلا پەيدا بولمىغان بولغاچقا، ئۇنى ئۈزۈل - كېسىل ساقايتىشمۇ بىر - ئىككى كۈندىلا ئىشقا ئاشمايدۇ، بۇ كېسەللىكلەرنى رېفلىكسىلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى ئارقىلىق داۋالاشنى ئۇزاققىچە داۋاملاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ.

كىتابنىڭ مەزمۇنىدا مۇھىم ئورۇن تۇتىدىغان رەسىملەرنى سۈرەتكە ئېلىشقا ئىككى ھەپتىدىن كۆپرەك ۋاقىت كەتتى، 2000 پارچىدىن كۆپرەك رەسىم ئىچىدىن ئەڭ ئاخىرىدا 800 پارچە رەسىم ئىنچىكىلىك بىلەن تاللاندى. مەن كەسپىمنى 24 يىل داۋاملاشتۇردۇم. ھازىرغىچە بولغان ئىشلارنى ئەس-لەپ باقسام، تىنچ ھالدا باشقىلارنىڭ پۈتمىنى رېڭلىكسىز ئۇۋۇلاپ داۋالىغان ۋاقتىمدا ئۆزۈمنى ئەڭ خۇشال ھېس قىلىدىكەنمەن. مېنىڭ ئىككى قولۇم بىلەن ئۇۋۇلىشىم نەتىجىسىدە، ئاشقازان ئاغرىقى بىمارنىڭ كېسىلى ئاستا-ئاستا ياخشىلاندى، زىققە كېسىلى بىمارى يېتىپ ئۇخلىلايدىغان بولدى ۋە ھا-كازالار ... بۇ ئىشلارنىڭ ھەممىسى ماڭا ھەقىقەتەنمۇ بىر مۇۋەپپەقىيەت تۇي-غۇسى ھېس قىلدۇردى. مەن ھەر قېتىم پۇت ئۇۋۇلاش ئۈچۈن قولۇمنى ئاپارغان ۋاقتىمدا، كۆڭلۈم شۇ ھامان تىنچلىنىدۇ، ئىككى قولۇم بىلەن كېسەلنىڭ ئورنىنى ئىزدەپ، پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلەن بېرىلىپ ئۇۋۇلاپ، ئۇنىڭدىكى ئۆزگە-رىشنى ھېس قىلىمەن.... ماڭا نىسبەتەن بۇ خىل كۆڭۈل تىنچلىقى ئىچىدە باشقىلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشتىن، باشقىلارغا ياردەم بېرىشتىن ئېرىشكەن رازى-مەنلىك تۇيغۇسى ۋە مۇۋەپپەقىيەت تۇيغۇسىنىڭ ئورنىنى باشقا ھېچقانداق نەرسە ئالمايدۇ.

مەن نەچچە ئون يىللىق تەجرىبىلىرىم ئاساسىدا، ئائىلىدە ساقلىق ساقلاشقا ۋە ئۆز-ئۆزىنى تەڭشەشكە ئىشلىتىلىدىغان بۇ بىر يۈرۈش ئۇسۇللارنى خۇلاسەلەپ چىقتىم، بۇ ئۇسۇللارنى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە تەۋسىيە قىلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۆزىڭىز ۋە ئائىلىڭىزدىكىلەرگە كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈشىڭىزنى، شۇنداقلا ئۇلارنى پەرۋىش قىلىپ ساغلام قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن. ئىشىنىمەنكى، سىزنىڭ مېھىر - مۇھەببەتلىك پەرۋىشكار قولىڭىز سىزگە پەقەت رازىمەنلىك تۇيغۇسى ۋە مۇۋەپپەقىيەت تۇيغۇسىنى ئاتا قىلىپلا قالماستىن، چوقۇم يەنە تېخىمۇ كۆپ بەخت تۇيغۇسى ئاتا قىلالايدۇ.

بۈگۈندىن باشلاپ ئائىلىڭىزدىكىلەرنىڭ پۇتغا كۆڭۈل بۆلۈپ، ساغلاملىق ۋە مېھىر-مۇھەببەتنى يېنىڭىزدىن ئايرماڭ. قولىڭىز شىپالىق، قەلبىڭىز مېھىر-مۇھەببەتلىك، باسقان ئىزلىرىڭىز مۇۋەپپەقىيەتلىك بولسۇن.

ياڭ يى

2012-يىلى 9 - ئاينىڭ 15 - كۈنى

مۇندەجە

1. پۇت رېفلىكس رايونىدىكى پەللىلەرنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى بىلەن تونۇشۇش 1
2. پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى — تەن ساغلاملىقىنىڭ بارومېتىرى 2
- پۇت رېفلىكس رايونىدىكى پەللىلەر ئارقىلىق كېسەللىكلەرگە «قاراش،
پۇراش، سۇراش، تۇتۇش» ئۇسۇلىدا دىياگنوز قويۇش 13
- پۇتنى ئۇۋۇلاشنىڭ ئاساسلىق ئۇسۇلى ۋە تەرتىپى 21
2. پۇت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى 34
- پۇت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاشتىن بۇرۇنقى قول ئۈگىلىرىنى بوشىتىش
ئۇسۇلى 35
- سول پۇت بارماقلىرىدىكى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش 41
- سول تاپان ئالدى يېرىم قىسمىنىڭ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش 47
- سول تاپان كەينى يېرىم قىسمىنىڭ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش 51
- سول پۇت ئىچكى يان تەرەپىنىڭ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش 54
- سول پۇت دۈمبىسىنىڭ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش 60
- ئوڭ پۇت ئاستى كەينىكى يېرىم قىسمىدىكى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ... 63
3. دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنى داۋالاش 67
- زۇكام 69
- قىزىتما 71
- باش قېيىش، كۆز تورلىشىش 73
- نېرۋا مەنبەلىك باش ئاغرىقى 75
- كۆز ئاغرىقى 77
- بۇرۇن ياللۇغى 79
- قۇلاق غوغۇلىداش 81
- چىش ئاغرىش 83
- ئېغىز پۇراش 84
- يۈز پالىچى، ئۈچلۈك نېرۋا ئاغرىقى 86
- ھېق تۇتۇپ قېلىش 88
- يۆتەل، زىققە كېسىلى 89
- يۇتقۇنچاق — بوغۇز ياللۇغى 91

93	خورەك تارتىش
95	سېسىق كېكىرىش
97	بويۇنغا يەل تۇرۇپ قېلىش
99	مۈرە ئەتراپى ياللۇغى
101	يۈرەك سېلىش
103	كۆكرەك قوۋۇرغىسى چىڭقىلىپ ئاغرىش
104	ئاشقازان بىئارام بولۇش
106	دېمى سىقىلىش، كۆكرەك چىڭقىلىش، نەپەس راۋان بولماسلىق
108	قورساق غورۇلداش
110	قورساق كۆيۈش، قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش
112	قورساق سېلىش
113	جىگەرنى ماي قاپلاش، جىگەر ئىسپىرتتىن - دورىدىن زەھەرلىنىش
114	بەل ئاغرىش، بەل چىم بولۇش
116	ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىش
117	يانتاش بوغۇمى ئاغرىش
119	بوۋاسىر
121	قەۋزىيەت
	پات - پات سىيىش، سۈيدۈك قىستاش، سۈيدۈك ئاغرىتىپ كېلىش،
122	سۈيدۈك يىغىلىپ قېلىش (دوۋساق ئۇنىۋېرسال كېسەللىكى)
124	تىز بوغۇمى ياللۇغى
126	يەللىك بوغۇم ئاغرىقى
129	پاچاق ئاغرىش
131	تاپان ئاغرىش
133	بېرىيېرى كېسىلى (پۇت تەمرەتكىسى)، پۇت تەرلەش
135	پۇت - قول مۇزلاش
137	پۇت - قول تىترەش
139	قول قوللىشىش
141	چاچ چۈشۈش، مايلىشىش خاراكتېرلىك چاچ چۈشۈش
143	قاتتىق تەرلەش، ئوغرى تەر چىقىش
145	ئۇيقۇسىزلىق
147	ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، تاماقتىن سەسكىنىش
149	ھاراق چىشلىۋېلىش
151	ئىسسىق ئۆتۈپ كېتىش

153	 كوللاپس (ئېغىر زەئىپلىك)
155	 تېرە ياللۇغى
156	 ھەيز قالايمىقانلىشىش، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش
158	 سېمىزلىك
160	 4. سوزۇلما كېسەللىكلەرنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش
161	 يۇقىرى قان بېسىم
164	 قاندىكى ماي مىقدارى ئېشىپ كېتىش
166	 دىيابېت كېسەللىكى
168	 بويۇن ئومۇرتقا كېسەللىكى
170	 قالدانبەز كېسەللىكى
172	 ئۆپكە كېسەللىكلىرى
174	 يۈرەك كېسەللىكى
176	 جىگەر ياللۇغى
177	 ئۆت ياللۇغى
178	 ئۆتكە تاش چۈشۈش
179	 ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش
180	 بۆرەككە تاش چۈشۈش
182	 بۆرەك ياللۇغى
183	 دوۋساق ياللۇغى
184	 ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى
186	 تۈز ئۈچەي ياللۇغى
188	 ئىنچىكە ئۈچەي چۇقۇقى
190	 مەزى بېزى ياللۇغى
191	 تۇخۇمدان خالتىلىق ئىششىقى
193	 سەكتە
195	 لىمفا تۈگۈنى ئىششىقى
197	 نېرۋا ئاجىزلىقى
199	 قان ئازلىق
201	 ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك
203	 تۇتقاقلىق كېسەللىكى
205	 كىلىماكتېرىيە يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى
207	 ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسەللىكى

1

CHAPTER

پۇت رېڭلېكس رايونىدىكى پەللىلەرنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى بىلەن تونۇشۇش

بەدىنىمىزدە ھېسسىيات ۋە تۇيغۇلار بولىدۇ. بەدىنىمىز سىرتقى دۇنيادىن كەلگەن ھەممە نەرسىنى ھېش قىلىدۇ، شۇنداقلا سىرتقى دۇنيانىڭ ئوخشاش بولمىغان غىدىقلاشلىرىغا قارىتا ئوخشاش بولمىغان ئىنكاسلارنى قايتۇرىدۇ. شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، پۇت رېڭلېكس رايونىدىكى پەللىلەرنى ئۇۋۇلاش پەقەتلا بىر خىل تەڭشەپ داۋالاش ئۇسۇلى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى ئادەم بىلەن ئادەم ئوتتۇرىسىدىكى مېھرى - مۇھەببەتنى ئىپادىلەش ۋە ھېس قىلىشتىكى ئەڭ ياخشى ئۇسۇلدۇر.

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى — تەن ساغلاملىقىنىڭ بارومېتىرى

«شىپالىق قول» ناملىق يۈرۈشلۈك كىتابىنىڭ 1 - ۋە 2 - قىسمى نەشر قىلىنغاندىن كېيىن، نۇرغۇن دوستلار تۈرلۈك ئۇسۇللار ئارقىلىق مەن بىلەن ئالاقىلىشىپ، مەندىن مەسلىھەت سورىدى، مەن بىلەن پىكىر ئالماشتۇردى ياكى گۇمانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى، مەن ھەممىسىگە سەۋرچانلىق بىلەن بىر - بىرلەپ جاۋاب بەردىم. ئەمما دائىم دېگۈدەك بەزى ئامالسىز قالدىغان ئەھۋاللارغىمۇ يولۇقتۇم. مەسىلەن: مەن تۆۋەندىكىدەك ئېلېكتىرونلۇق پوچتا يوللانما خېتىنى تاپشۇرۇپ ئالدىم:

«ياڭ مۇئەللىم، مومام راك كېسىلى بولۇپ قالدى، جىگەر راكىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچى ئىكەن، سىزنىڭچە قانداق قىلساق مومامنى قۇتقۇزۇپ قالالايمىز؟»

بۇ پوچتا يوللانمىسىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن تۈرلۈك خىياللار كۆڭلۈمدىن كەچتى، خېتىمدىن قارىغاندا بۇ بالا تولمۇ ۋاپادار ئىدى، ئەمما راكىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىغا بېرىپ قالغان كېسەلنىڭ «سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش» كە ئامال يوق بولۇپ، رېفلىكسلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشمۇ بۇ كېسەلگە شىپا بولمايتتى. مەن بۇنىڭغا ئامال قىلالمايدىغان بولغاچقا ناھايىتى ئەپسۇسلاندىم. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب يازدىم: «مومىڭىز قالغان ئۆمرىنى خۇشال - خۇرام ئۆتكۈزسۇن»

ئويلىمىغان يەردىن ئىككىنچى كۈنى ئۇنىڭ ئەۋەتكەن پوچتا يوللانمىسىنى تاپشۇرۇپ ئالدىم، ئۇ ناھايىتى ئاچچىقلانغان ھالدا ماڭا: «مومامنىمۇ قۇتقۇزالمىسىڭىز سىز ئۇۋۇلاش ئۈستىسى دېگەن نامغا قانداقمۇ مۇناسىپ كېلىسىز؟» دېگەن سوئالنى قويۇپتۇ.

بۇ سوئالغا مەن سوغۇققانلىق بىلەن: «مەن ئۇۋۇلاش ئۈستىسى ئەمەس، مېنىڭ باشقىلارنى داۋالاپ قۇتقۇزۇش نىيىتىم بولسىمۇ، ئەمما مەن ئادەمنى مەڭگۈ ھايات تۇرغۇزالمىمەن، مېنىڭ قىلالايدىغىنىم پەقەت كۆپچىلىككە ئالدىنى ئېلىش ۋە ساقلىقنى ساقلاش ئۇسۇللىرىنى كۆپرەك ئۆگىتىپ، راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىشتىن ئىبارەت. ساقايماس ئېغىر كېسەلگە گىرىپتار بولغان بىمارلارنى ئۆلۈم گىردابىدىن قۇتۇلدۇرۇش

راستلا قولۇمدىن كەلمەيدۇ. قەدىمدىن تارتىپ ھېچقانداق بىر تېببىي داۋالاش ئۇسۇلى ھەممىلا كېسەلنى داۋالىغان ئەمەس، رېفلېكسلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا ئەمەس، ئەمما بۇ ئۇسۇل باشقا داۋالاش ئۇسۇللىرى ئورنىنى باسالمايدىغان ئەۋزەللىككە ئىگە» دەپ جاۋاب بەردىم.


رېفلېكسلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ ئەۋزەللىكى: كېسەللىكلەرنى ئالدىن توغرا مۆلچەرلەپ، بەدەننىڭ ئۆزلۈكىدىن ساقىيىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

بىزدە: «سۇ كەلگۈچە توغان سال» دەيدىغان بىر ماقال بار، بۇ سۆز جۇڭگولۇقلارنىڭ ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى يۈكسەك ئەقىل - پاراستىنى نامايان قىلغان، ھالبۇكى، رېفلېكسلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى دەل مۇشۇ يۈكسەك ئەقىل - پاراسەتكە تولغان جۇڭگوچە ساقلىقنى ساقلاش ئۇسۇلىنى نامايان قىلغان. ئۇنىڭ يادرولۇق قىممىتى ئۆزىنىڭ كېسەلنى ئۆزى مۆلچەرلەش، ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاپ تەكشۈشتىن ئىبارەت. مېنىڭ رېفلېكسلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى ئۈستىدە ئۇزاق مۇددەت ئىزدىنىپ، ئۇنى نۇرغۇن كىشىلەرگە كېڭەيتىشنىڭ سەۋەبى شۇكى، بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ئۆزىدىكى كېسەللىكلەرنى دەل ۋاقتىدا، توغرا مۆلچەرلىگىلى ۋە كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ، بۇ ئۇسۇلغا ھازىرقى دەۋردىكى كىشىلەر جىددىي ئېھتىياجلىق.

ھازىر ئەتراپىمىزدىكى نۇرغۇن كىشىلەر كېسەلگە گىرىپتار بولغاندىن كېيىن سالامەتلىكىنى تەكشۈرتىدۇ، تەكشۈرۈش نەتىجىسى چىققاندىن كېيىن ئاندىن ئۆزىنىڭ سالامەتلىكىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە باشلايدۇ، بۇ چاغدا كېسەل ئېغىرلاشقان ياكى ئاخىرقى باسقۇچقا بېرىپ قالغان بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە، ئادەم بەدىنىدە روشەن كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلۈپ، تېببىي تەكشۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق تەكشۈرۈپ چىققان چاغدا، كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلاشقانلار ئاز دېگەندە 70% كە يېتىدۇ. بۇ چاغدا دورا يەپ، ئوكۇل ئاستۇرغاندا، پەقەت قوي يىتكەندىن كېيىن قوتاننى رېمونت قىلغاندەك ئىش بولىدۇ، بۇ چاغدا دورا - ئوكۇل بىلەن داۋالاش ئۇسۇللىرىنىڭ جىگەر، بۆرەكنى زەخمىلەندۈرۈشىنى دېمەي تۇرايلى، ئەڭ قورقۇنچلۇقى داۋالاشنىڭ ئەڭ ياخشى پەيتى ئۆتۈپ كېتىپ، كېسەللىك تەرەققىي قىلىپ ئېغىرلايدۇ، خۇددى بايا سۆزلەپ ئۆتكەن

ھېلىقى پوچتا يوللانمىسىدا دېيىلگەن موماينىڭ ئەھۋالىدەك قۇتقۇزغىلى بولمايدىغان دەرىجىگە بېرىپ قالىدۇ.

پۇت قىسمىدىكى رېفلېكسلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى ئارقىلىق بۇنداق ئەھۋال يۈز بېرىشتىن تامامەن ساقلىنىشقا بولىدۇ. چۈنكى بەدەندە كېسەللىك ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، بۇ ئۆزگىرىش ئەمدىلا 10% كە يەتكەندە، يەنى ئادەم بەدىنىدە ھېچقانداق ئىنكاس كۆرۈلمىگەن چاغدىلا، بىز پۇتتىكى رېفلېكس رايونلىرىدىن بەزى ئالامەتلەرنى بالدۇر بايقىيالايمىز. نۇرغۇن كېسەللىكلەرنى بالدۇر بايقىغاندىن كېيىن، دەل ۋاقتىدا رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالاش ئېلىپ بارساق، بۇ كېسەللىكلەر ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ.



ئەگەر بىز پۇتمىزغا تەپسىلىي زەن سالىدىغان بولساق، پۇتنىڭ ئاستى قىسمىدىكى رېفلېكسلىق رايونلارنىڭ بىر ئادەمنىڭ كىچىكلىتىلگەن شەكلىگە ئوخشايدىغانلىقىنى ھەيرانلىق ئىچىدە بايقايمىز.

2006 - يىلى، بىر قېتىملىق ئاسادىيىي پۇرسەتتە مەن ئىككى پۈتۈمدىكى بۆرەك رېفلىكس رايونىدا جىگەر رەڭلىك داغلارنىڭ پەيدا بولغانلىقىنى بايقاپ قالدىم، بۇ داغ قارىماققا تېرىنى تاماكا بىلەن كۆيدۈرگەندە قېپقالغان ئىزغا ئوخشايتتى، تۇتۇپ باقسام بىر نەچچە قاتتىق مونەك قولۇمغا ئۇرۇندى. ئۇزاق مۇددەتلىك تەڭشەپ داۋالاش تەجرىبەمگە ئاساسەن، مەن ئۆزۈمنى مەلۇم خىل بۆرەك كېسىلىگە، ھەتتا بۆرەك راكىغا گىرىپتار بولغان ئوخشىمەن دەپ ئويلىدىم.

بۇ ھادىسىنى بايقىغاندىن كېيىن، مەن ھەر كۈنى ئۇۋۇلاش تايىقى بىلەن تا- پىنىمدىكى بۆرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ بەردەم. سەككىز كۈن داۋاملاش- تۇرغاندىن كېيىن ھېلىقى جىگەر رەڭلىك داغلار ئاستا - ئاستا يوقىلىپ كەت- تى، سالامەتلىكىمدىمۇ باشقا نورمالسىزلىق كۆرۈلمىدى. شۇنداق دېيىشكە بو- لىدۇكى، مەن تاپىنىمدىكى جىگەر رەڭلىك داغلارنى بالدۇر بايقىغان بولغاچقا، ھازىرغىچە ساغلام ياشىيالىدىم. بەدەندە روشەن ھالدا نورمالسىزلىق كۆرۈلۈپ، سۈيۈكتە زور مىقداردا قىزىل قان ھۈجەيرىسى پەيدا بولغاندا دوختۇرخانىغا بېرىپ تەكشۈرتسە ئاندىن بۆرەكتە مەسىلە بارلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ، ئەمما بۇ چاغدا بەدەننىڭ فۇنكسىيەسى ناھايىتى زور زىيانغا ئۇچرايدىغانلىقتىن، سالا- مەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ناھايىتى ئۇزاق ۋاقىت كېتىدۇ.

پۇت قىسمىدىكى رېفلىكس رايونلىرى رېفلىكسلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاشتىكى ئالدىن تاللاش بولالايدۇ

بەدىنىمىزدىكى نۇرغۇن ئورۇنلارغا ئىچكى ئەزالارغا ماس كېلىدىغان رېفلىكس رايونلىرى تارقالغان بولىدۇ، بۇ رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ھەممىسىگە ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللانسا بولىدۇ، ئەمما ئۆز - ئۆزىنى تەڭشەپ داۋالاشنىڭ قولايلىقلىقى ۋە ئۈنۈملۈكلىكى نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، شۈبھىسىزكى، پۇت قىسمى رېفلىكس رايونى بىزنىڭ ئالدىن تاللىشىمىز بولالايدۇ.

نېمە ئۈچۈن بۇنداق دەيمىز؟

ئالدى بىلەن قول قىسمىدىكى رېفلىكس رايونىنى ئېلىپ ئېيتساق، ئوخشاش بولمىغان خىزمەت بىلەن شۇغۇللىنىدىغان كىشىلەرنىڭ ئىككى قولىدا ئوخشاش بولمىغان ئالامەتلەر بولىدۇ، مەسىلەن: سىز دوختۇر

بولسىڭىز، ئىككى قولىڭىز ئادەتتە ناھايىتى يۇمشاق بولىدۇ، ئەگەر سىز ياغاچچى بولسىڭىز، قوللىرىڭىز ناھايىتى يىرىك بولىدۇ. يەنى ئادەمنىڭ قولى ناھايىتى ئاسانلا تاشقى شارائىتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ، شۇڭلاشقا قولغا قاراپ بەدىنىنىڭ ساغلاملىق ئەھۋالىغا توغرا ھۆكۈم قىلىش مۇمكىن بولمايدۇ.

قۇلاق قىسمى ۋە كۆز قىسمىدىكى رېفلىكس رايونلىرىنى ئېلىپ ئېيتساق، گەرچە بۇلار ئارقىلىق كېسەللىكلەرنى بايقىغىلى ۋە تەڭشىگىلى بولىمۇ، ئەمما مەزكۇر رايوننىڭ دائىرىسى بەك كىچىك بولغاچقا، بۇ ئۇسۇلنى ئىگىلەش ۋە ئىشلىتىش تەسەرەك بولىدۇ.

دۈمبە قىسمى رېفلىكس رايونى گەرچە يۇقىرىدا دېگەندەك ئىككى خىل يېتەرسىزلىكتىن مۇستەسنا بولىمۇ، ئەمما ئورۇننىڭ چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن كۆزىتىش ۋە مەشغۇلات قىلىشتا باشقىلارغا تايىنىشقا توغرا كېلىدۇ.

ۋاھالەنكى، پۇت بولسا ئادەم بەدىنى ئىچىدىكى يەرگە ئەڭ يېقىن تۇرىدىغان ئەزا بولۇپ، يەر مەركىزىنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە، ئادەم بەدىنى مېتابولىزم جەريانىدا قويۇپ بەرگەن ماددىلارنىڭ ھەممىسى ئىككى پۇتنىڭ ئاستىغا يىغىلىدۇ. ئۇزاق ۋاقىت يىغىلىپ قالغان ماددىلار يەللىك ئىششىق، ھۈررەك، ئۇششاق مونەك، قاتتىق دانچە قاتارلىق مۇسبەتلىك ماددىلارنى پەيدا قىلىپ، شۇ سەۋەبتىن پۈتۈن بەدەننىڭ قان ئايلىنىشى راۋان بولماي بىئاراملىق كۆرۈلىدۇ. بەدىنىمىز سەللا بىئارام بولغاندا، ئاۋۋال بەلگە بېرىدىغىنى دەل بىزنىڭ بىر جۈپ پۇتىمىزدۇر. پۇتنىڭ رەڭگى ۋە شەكلىنى كۆزىتىش، پۇتنى تۇتقاندىكى ئەھۋالنى ھېس قىلىش ئارقىلىق، نۆۋەتتىكى سالامەتلىك ئەھۋالنى ۋاقتىدا چۈشەنگىلى ھەمدە ئۈنۈملۈك تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

پۇت پۈتۈن بەدەننىڭ
ئېغىرلىقىنى كۆتۈرىدۇ، ئۇ
تاشقى شارائىتنىڭ تەسىرىگە
بىر قەدەر ئاز ئۇچرايدىغان
بولغاچقا، بىر ئادەمنىڭ
ساغلاملىق ئەھۋالىنى
بىر قەدەر توغرا ئەكس
ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ.

رېفلىكسىلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى بىرقەدەر كۈچلۈك نىشان خاراكتېرىگە ئىگە. بىز بەدىنىمىزنىڭ مەلۇم بىر رېفلىكسى رايونىنى غىدىقلىغاندا، بۇ خىل غىدىقلاش نېرۋىنلارنىڭ رېفلىكسىلىق رولى ئارقىلىق، ئاشۇ رېفلىكسىلىق پەللىگە ماس كېلىدىغان ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەپ، شۇ ئارقىلىق ساقلىق ساقلاش ۋە تەڭشەش ئۈنۈمىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. بۇنىڭ ئەكسىچە، مەلۇم بىر رېفلىكسىلىق پەللى رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا ئاغرىق سېزىمىنى ھېس قىلساق، بولۇپمۇ دانچە، ھۆررەك ياكى باشقا غەيرىي نەرسىلەر قولغا ئۇرۇنسا، بۇ شۇ پەللىگە ماس كېلىدىغان ئىچكى ئەزادا مەسىلە كۆرۈلگەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. بۇ چاغدا رېفلىكسى رايونىدىكى پەللىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق يوشۇرۇن ئاپەتنى تۈگەتكىلى بولىدۇ، ئەگەر كېسەللىك بىر قەدەر ئېغىر بولسا، باشقا داۋالاش ئۇسۇللىرىنىمۇ بىرلەشتۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال داۋالاشقا توغرا كېلىدۇ.

كۆپچىلىككە ئەسكەرتىپ قويۇشقا تېگىشلىك بىر نۇقتا شۇكى، پۇت قىسمىنى رېفلىكسىلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى گەرچە ياخشى بولسىمۇ، ئەمما بۇ ئۇسۇل ھەممىلا كېسەلگە ماس كەلمەيدۇ، مەسىلەن: يۈرەك زەئىپلىشىش، يۈرەك ئاجىزلاش، جىگەر توقۇلمىلىرى نېكروزلىنىش، ئۆپكە گازلىق ئىششىقى، راك كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى باسقۇچى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ماس كەلمەيدۇ. ئەگەر رېفلىكسىلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللانغاندا، ئەكسىچە قاننىڭ ئايلىنىشى تېزلىشىپ، بۇ خىل كېسەللىكلەر ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ (پۇت قىسمىنى رايونى رېفلىكسىلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كەلمەيدىغان كونكرېت كېسەللىكلەر توغرىسىدا مەزكۇر كىتابنىڭ 32 - بېتىگە قارالسۇن). ئەمما پۇت قىسمىنى نەچچە ئون مىنۇت ئۇۋۇلىغاندا، كىشىلەرنىڭ ئاغرىق ئازابىنى ۋاقىتلىقچە يېنىتىپ بېرىشكە ياردەم بەرگىلى بولىدۇ، بۇنىڭدا كېسەل ۋە ئاجىز بەدەن بىردەم بولسىمۇ بوشىشىپ ئارام تېپىپ قالىدۇ، بۇنى كېسەلگە جان ئۇزۇشتىن بۇرۇن قىلىنغان غەمخورلۇق دېسەكمۇ بولىدۇ. ئەمما بۇنداق ئەھۋالدا، مەخسۇس كەس-پىي ئۇۋۇلاش خادىملىرىنىڭ مەشغۇلات قىلىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ، ئۆزى خالىغانچە مەشغۇلات قىلىشتىن قاتتىق ساقلىنىش زۆرۈر.

يۇقىرىدا بىرمۇنچە مەزمۇنلارنى سۆزلەپ ئۆتتۇق، ئۇنداقتا رېفلىكسى رايونىلىرى زادى كونكرېت قانداق جايلاشقان؟ پۇت قىسمىنى رېفلىكسىلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاشنىڭ كونكرېت ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇشتىن بۇرۇن، بىز ئالدى بىلەن پۇت قىسمى رېفلىكسى رايونلىرىنىڭ ئورنى بىلەن تونۇشۇپ چىقايلى.

پۇت رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ئورنى

پۇت بارماقلىرى — ئادەم بەدىنىنىڭ باش قىسمىغا ماس كېلىدۇ.
پۇتنىڭ ئالدى قىسمى — ئادەم بەدىنىنىڭ كۆكرەك قىسمى (يۈرەك،
ئۆپكە) غا ماس كېلىدۇ.

پۇتنىڭ ئوتتۇرا قىسمى — ئادەم بەدىنىنىڭ قورساق قىسمى (ئاشقا-
زان، تال، بۆرەك، جىگەر، ئۇيغۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، چوڭ
ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي) غا ماس كېلىدۇ.


ئۆكچە — ئادەم بەدىنىنىڭ كۆپىيىش ئەزالىرى (باليئاتقۇ، تۇخۇم-
دان، مەزى بېزى، ئۇرۇقدان)، سۈيدۈك يولى، جىنسىي يول، مەقئەت قا-
تارلىقلارغا ماس كېلىدۇ.


پۇتنىڭ ئىچكى يان تەرىپى، تاپان يايى — ئادەم بەدىنىدىكى ئومۇرتقا
تۈۋرۈكى (بويۇن ئومۇرتقىسى، كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى،
قۇيرۇق سۆڭىكى، توققۇز كۆز سۆڭىكى)، دوۋساق، بالياتقۇ، مەزى بې-
زى، تۈز ئۈچەي، مەقئەت قاتارلىقلارغا ماس كېلىدۇ.

پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپى — ئادەم بەدىنىنىڭ مۈرە، جەينەك، تىز
قاتارلىق بوغۇملىرى، تۇخۇمدان ياكى ئۇرۇقدان، تۆۋەنكى قورساق قىس-
مى قاتارلىقلارغا ماس كېلىدۇ.









پۇت رېفلىپكىس رايونىدىكى پەللىلەر ئارقىلىق كېسەللىكلەرگە «قاراش، پۇراش، سوراڭ، تۇتۇش» ئۇسۇلىدا دىياگنوز قويۇش

بىزدە ئادەتتە چۈشكۈرىدىغان ۋە بۇرنىمىزدىن سۇ ئاقىدىغان ئەھۋاللار كۆرۈلۈشكە باشلىسا، ئۆزىمىزنىڭ شامال تېگىپ زۇكام بولۇپ قالغانلىقىمىزنى ھېس قىلىمىز. بۇ چاغدا تەجرىبىلىك ئادەملەر دەرھال قىزىق زەنجىۋىل سۈيىگە پۇتىنى چىلايدۇ، بۇنىڭ بىلەن بەدەندىكى سوغۇق چىقىپ كېتىپ، ساقسىزلىق ئوڭشىلىپ كېتىدۇ. پۇت قىسمىنى رېفلىپكىسلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈپ كۆرۈش ۋە داۋالاپ تەڭشەش يولىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بولىدۇ. كېسەللىكنىڭ پۇت قىسمىدا ئىپادىلەنگەن كېسەللىك ئالامەتلىرىنى بىخ ھالىتىدە ئېنىقلاش ئۈچۈن، پۇت قىسمى رېفلىپكىسلىق رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنىڭ قاراش، پۇراش، سوراڭ، تۇتۇشتىن ئىبارەت دىياگنوز قويۇش تېخنىكىسىنى ئىگىلەشكە توغرا كېلىدۇ. قاراش — بۇ پۇت قىسمىنىڭ تاشقى شەكلى ۋە رەڭگىنى كۆزىتىشنى كۆرسىتىدۇ.

پۇراش — بۇ بىمارنىڭ ئېغىزى، بەدىنىنى پۇراپ كۆرۈشنى كۆرسىتىدۇ. سوراڭ — بىماردىن كېسەللىك تارىخى، گىرسيەت تارىخىنى سوراشنى كۆرسىتىدۇ.

تۇتۇش — قول ئارقىلىق بىمارنىڭ پۇت قىسمىنى تۇتۇپ كۆرۈپ، قولىنىڭ تېگىش سېزىمى ئارقىلىق سالامەتلىك ئەھۋالىغا ھۆكۈم قىلىشنى كۆرسىتىدۇ. تۆۋەندە، مەن قاراش، پۇراش، سوراڭ، تۇتۇش قاتارلىق تۆت جەھەتتىن ئۆزۈمنىڭ پۇت قىسمىنى رېفلىپكىسلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاشتىكى تەجرىبە ۋە تەسىراتلىرىمنى كۆپچىلىككە تونۇشتۇرۇپ ئۆتمەن.

قاراش — پۇت قىسمىدىكى ئالتە چوڭ نورمالسىز ئەھۋال ۋە پۇت بارمىقى، تىرناق قاتارلىقلارغا قاراپ ئۆزىدىكى كېسەللىككە ھۆكۈم قىلىش بىر قېتىم تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىغا بېرىپ پروگرامما ئىشلەشكە قاتناشتىم، پروگرامما باشلىنىشتىن بۇرۇن رىياسەتچى ئەمدىلا يېنىمدا ئولتۇرۇشىغا مەن ئۇنىڭدىن: «پۇتىڭىز قايرىلىپ كېتىپتىكەن — دە، قايرىلىپ كەت-

كىلى تەخمىنەن بىرەر ئاي بويىچە، تېخى تولۇق ئوڭشالماپتۇ» دېدىم. رىياسەتچى ناھايىتى ئەجەبلەنگەن ھالدا مەندىن: «سىز قانداق بىلىڭىز» دەپ سورىدى. مەن ئۇنىڭغا: «پۈتۈڭىزدىكى ئىششىقتىن بىلىدىم» دېدىم. ئۇنىڭ سول پۇتى قايرىلىپ كەتكەن بولغاچقا، مەن سول تەرەپتىكى كېسەلنى ئوڭ تەرەپتىن داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئۇنىڭ ئوڭ پۇتىنىڭ مۇناسىۋەتلىك يەرلىرىنى ئۇۋۇلاپ قويىدىم، بىردەمدىن كېيىن پۇتىدىكى ئىششىق ئازراق ياندى. ئۇۋۇلاشتىن بۇرۇن ئۇ يەرگە ناھايىتى ئاۋايلاپ دەسسەپ ماڭغان ئىدى، ئەمما ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن، ئۇ يەرگە خاتىرجەم دەسسەپلا قالماستىن، يەنە كۈچەپ دەسسەپ سىناپ كۆردى، پۇتى ئىلگىرىكىدەك ئاغرىمىغاندىن كېيىن ھەيران قالغان ھالدا: «بۇنداق تېز ئۈنۈمى كۆرۈلىدىغانلىقىنى ئويلايمۇ باقماپتەنمەن» دېدى.

قاراپ دىياگنوز قويۇشتا كۆپ يىل تەجرىبە توپلاشقا توغرا كېلىدۇ، شۇڭا ھەممىلا ئادەم قاراپلا تېز ۋە توغرا دىياگنوز قوياالمايدۇ. تۆۋەندە «پۇت قىسمىدا دائىم كۆرۈلىدىغان ئالتە چوڭ نورمالسىزلىق» ۋە «پۇت بارىمىقى ۋە پۇت تىرىقىغا ئاساسەن كېسەللىكنى كۆزىتىپ تەكشۈرۈش جەدۋىلى» كۆپچىلىكنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن بېرىلدى. بۇ جەدۋەلدە پۇت قىسمىدا دائىم كۆرۈلىدىغان نورمالسىزلىقلار ۋە شۇنىڭغا مۇناسىپ بولغان بەدەندىكى ئوخشىمىغان كېسەللىكلەر چۈشەندۈرۈلدى. ئائىلىدە ساقلىق ساقلاش ۋە كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە، بۇ ئۇسۇللارنى ئىگىلەش بىرقەدەر ئاسان، سىز يېڭىدىن ئۆگەنگۈچى بولغان تەقدىردىمۇ بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كېسەلگە ھۆكۈم قىلالايسىز.

پۇتتىكى ئالتە چوڭ نورمالسىز ئەھۋال

ئىششىق، سۇ-لۇق ئىششىق	يېنىك دەرىجىدىكى ئىششىق پۇت قىسمىدا قان ئايلىنىشنىڭ راۋان ئەمەلىيىتى بىلدۈرىدۇ، ئېغىر بولغاندا كۆپىنچە ياللۇغ، قىزىش بولىدۇ. ئەگەر پۇتنىڭ ئوشۇقى ئىششىغان بولسا، بۇ لىمفا ياللۇغى، بۆرەك ياللۇغى، يانباش بوغۇمى ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئالامىتى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ؛ پۇت بارىمىقى ئىششىسا، بۇ شېكەر مېتابولىزىمىنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ؛ پۇتنىڭ باش بارىمىقى كۆپچىگەن ۋە رەڭگى قىزغۇچ بولۇپ، قالغان تۆت بارماقتا ئاقارغان سۇلۇق ئىششىق بولسا، بۇ بۇقىرى قان بېسىم ياكى قاندىكى ماي ئېشىپ كېتىش كېسەللىگە گىرىپتار بولۇش مۇمكىنچىلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.
سىزىقچىلار	پۇتنىڭ ئاستى تېرىسىدا توغرا سىزىق، تىك سىزىق، يانتۇ سىزىقلار پەيدا بولسا، ھەمدە قولنىڭ ئالدىنىدا تىك سىزىق پەيدا بولغان بولسا، بۇ دىئاپىت كېسەللىگە گىرىپتار بولۇش مۇمكىنچىلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

تېرە يىرىك بولۇش	پۇت بارماقلىرىنىڭ تېرىسى بىرقەدەر ئاسان يىرىگىلىشىدۇ، ئەگەر بۇ سۈركىلىش سە- ۋەبىدىن پەيدا بولغان بولسا نورمال ئىش، ئۇنداق بولماي پۇتنىڭ بارماقلىرىدا قورۇق ياكى تېرە تاشلاش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە، بۇ مېڭە كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولۇش مۇمكىنچىلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.
قاداق ياكى غوزەك	پۇتنىڭ ئاستى قىسمىدىكى قاداق ۋە غوزەكمۇ بەدەندىكى كېسەللىكتىن دېرەك بېرىدۇ، ئەگەر سول پۇتنىڭ 4 - بارمىقىغا قاداق چىققان بولسا، بۇ ئۆتتە مەسىلە يولۇشى مۇمكىنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ؛ ئۆپكە رېفلىكس رايونىدا غوزەك پەيدا بولسا، بۇ ئۆپكە ۋە كانايچىدىكى سوزۇلما كېسەللىكلەردىن دېرەك بېرىدۇ؛ قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېف- لېكس رايونىدا غوزەك پەيدا بولسا، مۇرە ۋە دۈمبىدە ساقسىزلىق بارلىقىنى بىلدۈر- دۇ؛ پۇت باش بارمىقىنىڭ سىرتقى تەرىپى بىلەن پۇتنىڭ ئالدىقى تۇتاشقان جايدا غو- زەككە ئوخشايدىغان قىزىق سىزىق پەيدا بولسا، بۇ كىچىك مېڭىنىڭ يىگىلىگەنلىك- ى، ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسەللىگە گىرىپتار بولۇش مۇمكىنچىلىكىنى چۈشەن- دۈرىدۇ.
تېرە كۆپۈپ چىقىش	تېرە كۆپۈپ چىقسا، بۇ بەل ئومۇرتقا تەخىسى پۇلتىيىپ چىقىش ياكى سۆڭەك ئۆ- سۈكچىسى كېسەللىگە گىرىپتار بولغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. تېرە كۆپۈپ چىقسا ئا- دەتتە سۆڭەك تۈرىدىكى رېفلىكس رايونىدىن ئاسانلا مەسىلە چىقىدۇ، مەسىلەن: بەل ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىدىكى تېرە.
تېرە ئويما- لىشىش	پۇت قىسمى رېفلىكس رايونىدىكى تېرە ئويمانلاشقان بولسا، شۇ رېفلىكس رايونىغا ماس كېلىدىغان ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى ئاجىزلىغانلىقى ياكى يىگىلىگەنلىكىنى چۈشەندۈر- دۇ، ئەگەر بۆرەك رېفلىكس رايونىدىكى تېرە ئولتۇرۇشقان بولسا، بۇ سۈيۈكتىن زە- ھەرلىنىش كېسەلى، پۇقىرى قان بېسىم، جىنسىي ئەزا يىگىلەش قاتارلىق كېسەللىك- لەرگە گىرىپتار بولغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.

پۇتنىڭ بارمىقى ۋە پۇت تىرىقىغا قاراپ كېسەلنى كۆزىتىپ تەكشۈرۈش جەدۋىلى

پۇتنىڭ بارمىقى ياكى پۇت تىرىقىدىكى نور- مالىسىز ئەھۋال	كېسەللىكلەرنىڭ ئەسكەرتىلىشى
پۇتنىڭ باش بارمىقىنىڭ رەڭگى قىزىل ۋە تول- غان، پۇت تىرىقى سۆزۈك، پارىقراق بولسا	ناھايىتى ساغلام ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
پۇتنىڭ باش بارمىقى پىلان بېشى شەكلىدە بولسا	ئىرسىيەت خاراكتېرلىك يۈرۈن ياللۇغى ئىكەنلىك- نى بىلدۈرىدۇ
باش بارماقنىڭ بارماق بېشى يۇمىلاق شەكلىدە بولسا	قۇلاق - بۇرۇن - كېكىرەكنىڭ تۇتاشقان جايىدا تو- سالغۇ، يىغىلغان سۇ قاتارلىقلار بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ
باش بارماق ئۈستىگە كۆتۈرۈلگەن بولسا	مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرىدىن دېرەك بېرىدۇ
كىچىك بارماقلار ئېگىلىگەن ھەم تۇت كىچىك بارماق قىسىلغاندەك كۆرۈنسە	قۇلاق ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچرىغانلىقىنى بىلدۈ- رىدۇ

پۇتنىڭ تىرناقلىرى ئېچىز، يۇمشاق بولسا، تىك ئېرىقچىلار بولسا	ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچار بولۇشىنى بىلدۈرىدۇ
پۇتنىڭ تىرناقلىرى قېلىنلىغان بولسا	بېرىبېرى كېسىلى ۋە تىرناق تەمرەتكىسىنى بىلدۈرىدۇ
پۇتنىڭ تىرناقلىرىدا تىك يېرىقلار بولسا	ئەگەر يۈرەك - مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرىگە گە- رىيەتار بولغان بولسا، بۇ مېڭە قان چۈشۈش ئېھتىمال- لىقىنى بىلدۈرىدۇ
پۇت تىرىقىنىڭ ئاستىدا توغرا قارا سە- زىقچىلار بولسا	ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ قالايمىقانلاشقانلىقىنى، ئاياللاردا ئاسانلا ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش ۋە ھەيز قالايمىقانلىشىش ئەھۋالى كۆرۈلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
پۇت تىرىقى گۆشنىڭ ئىچىگە ئۆسۈپ كەتكەن بولسا، يەنى سەينەك بولسا	جىگەرگە قان چىگىلىپ قالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

پۇتنىكى ھەر خىل «پۇراقلارنى» پۇراش ئارقىلىق، تۈرلۈك يوشۇرۇن كېسەللىكلەرنى بىلگىلى بولىدۇ

بىر موماي يارتا پالەچ بولۇپ قېلىپ، مېڭىش ئىقتىدارى ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن، ئۇ پەقەتلا بىر پۇتنى سۆرەپ ماڭالايدىغان بولۇپتۇ. سالامەتلىكىنى تېزەرەك ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن، ئېرى ئۇ موماينى ئېلىپ قېشىمغا ئەكەلدى. ئارقا - ئارقىدىن ئىككى قېتىم ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئەھۋالىدا ياخشىلىنىش بولدى. ئۈچىنچى قېتىم ئۇ موماينىڭ پۇتنى ئۇۋۇلاۋاتقاندا، موماينىڭ ئېرى بىر چەتتە تۇرۇپ تۇيۇقسىز مەندىن: «لاۋياڭ، بۇ نېمە پۇراق؟ نىمانچە سېسىق پۇراق بۇ؟» دەپ سورىدى. مەن ئۇنىڭغا ئايالىنىڭ پۇتنى كۆرسىتىپ كۈلۈپ تۇرۇپ: «مەن گەپ قىلماي ئۇۋۇلاۋاتسام، سىز بۇ پۇراقتىن سەسكىنىپ كەتتىڭىزمۇ؟ ئۆزىڭىز كېلىپ پۇراپ بېقىڭ» دېدىم. ئۇ يېقىن كېلىپ پۇتنى پۇراپ كۆرۈپلا دەرھال بۇرنىنى توسىۋېلىپ موماينىڭ قېشىدىن ئېرى كەتتى. مەن ئۇنىڭغا: «سىزنىڭ ھەمراھىڭىزنىڭ پۇتىدىن چىققان سېسىق پۇراق بۇ، چۈنكى ئۇ دورىنى كۆپ يېگەچكە بەدىنىگە يىغىلغان زەھەرلىك ماددىلار بەك كۆپ ئىكەن، ھازىر زەھەرنى سىرتقا ھەيدەۋاتىمەن، ئۇۋۇلىغاندا سېسىق پۇراقنىڭ چىقىشى ياخشى ئىش، مەن بۇنىڭدىن خۇشال بولۇپ ئۈلگۈرەلمەيۋاتىمەن تېخى» دېدىم.

پۇتتىن چىققان پۇراق بىلەن بەدەننىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى ئۆزئارا زىچ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. پۇت قىسمىدىكى رېفلىكسلىق رايونلارنى ئۇۋۇلىغاندا، قان ئايلىنىشنىڭ تېزلىشىشىگە ئەگىشىپ، بەدەندىكى كېرەكسىز ھەم زەھەرلىك ماددىلار پۇتنىڭ ئاستىدىن چىقىپ كېتىدۇ، پۇتتىن چىققان پۇراققا ئاساسەن بىر ئادەمنىڭ بەدەن سۈپىتى، كېسەللىك ئۆزگىرىش ئەھۋالى قاتارلىقلارنى بىلگىلى بولىدۇ. ھازىر تىلغا ئالغان موماينىڭ پۇتىدىن چىققان ئاچچىق پۇراق، ئۇنىڭ بەدىنىدە دورا زەھىرىنىڭ ناھايىتى كۆپ يىغىلىپ قالغانلىقىنى، بۇلار جىگەرنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىنىڭ چەكلىمىسىدىن زور دەرىجىدە ئارتىپ كېتىپ، جىگەرنى مەلۇم دەرىجىدە زەخمىلەندۈرگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

پۈتتىكى پۇراقلار ۋە شۇنىڭغا ماس كېلىدىغان كېسەللىكلەر جەدۋىلى

پۈت قىسمىدىكى پۇراق	ماس كېلىدىغان كېسەللىكلەر
ئاچچىق سېسىق پۇراق	ئۆپكە كېسەللىرىگە گىرىپتار بولغان بولۇشى مۇمكىن
بەتبۇي سېسىق پۇراق	ھەزىم قىلىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى
تۈزلۈك سېسىق پۇراق	سۈيۈك يولى سىستېمىسى ياكى ئاياللار كېسەللىكلىرى
كىسلاتالىق سېسىق پۇراق	جىگەر، ئۆت ساقسىز بولۇش

ئەسكەرتىشكە تېگىشلىك بىر ئىش شۇكى، سىز ئۆيىڭىزدىكىلەر ياكى دوستلىرىڭىزنىڭ كېسەللىگە دىياگنوز قويغان ۋاقتىڭىزدا، سىزدە تېببىي خادىمغا خاس بىر مېھرىبان قەلب بولۇشى كېرەك، ئۇلارنىڭ پۈتىدىكى سېسىق پۇراقنى پۇراپلا بۇنىڭدىن يىرگەنگەنلىكىڭىزنى ئىپادىلىسىڭىز بولمايدۇ، ئەكسىچە قارشى تەرەپنىڭ بەدىنىدە مەۋجۇت بولۇش ئېھتىماللىقى بولغان كېسەللىكنى ئىنچىكىلىك بىلەن پەرقلەندۈرۈشىڭىز لازىم. بۇنداق ئەھۋالغا يولۇققاندا، قارشى تەرەپ ئەسلىدىنلا ئوڭايىسىزلىنىپ تۇرىۋاتقان بولغاچقا، بىز بىر تەرەپتىن پۇراقنى پۇراپ، بىر تەرەپتىن كېسەللىك ئەھۋالىنى سوراپ، ئۇنىڭ ئەندىشىسىنى تۈگىتىپ، توغرا دىياگنوز قويۇشقا قولايلىق يارىتىشىمىز كېرەك.

«سوراش» ئارقىلىق قەلب دېرىزىسىنى ئېچىش كېسەللىگە دىياگنوز قويۇشنىڭ بىرىنچى قەدىمى

«قاراش»، «پۇراش» ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، ئۇلاپلا «سوراش»نى باشلاش لازىم. نېمىنى سورايىمىز؟ بۇ ئاددىيلا سوئال سوراش بولماستىن، بەلكى ئەھۋال سوراشنى، پىكىر ئالماشتۇرۇشنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، «سوراش» ماھارىتى ۋە ئۇسۇلغا دىققەت قىلىش كېرەك.

مەسىلەن: بىر ئادەمنىڭ پۈتىنىڭ ئۆكچىسى قۇرغاق يېرىلىپ كەتكەن بولسا، بىز بۇنى بۆرەك ئاجىزلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ بىلىمىز، ئەمما قارشى تەرەپكە «بۆرەك ئاجىزلىقى كېسەللىگە گىرىپتار بولۇپسىز» دەپ بىۋاسىتە دېيىش مۇۋاپىق بولمايدۇ، ئەكسىچە ئۇنىڭدىن: «يېقىندىن بۇيان نەرسىڭىز بىئارام بولۇۋاتىدۇ؟ بەل تېلىپ ئاغرىش، ئۇيقۇسىزلىق، قۇلاق غوغۇلداش قاتارلىق بۆرەك ئاجىزلاش سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدىغان مەسىلىلەر بارمۇ - يوق» دېگەنلەرنى سورىساق بولىدۇ. پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق، ئۇنىڭ كېسەللىكىنىڭ ئېغىر -

لىق دەرىجىسىنى چۈشەنگىلى، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە كېسەللىكنىڭ پەيدا بو-
لۇشتىكى ئىرسىيەت ئامىلىنى، تۇرمۇش ئادىتى ھەتتا پىسخىك سەۋەبى قاتار-
لىقلارنى كۆپرەك ئىگىلەش زۆرۈر. قارشى تەرەپ بىلەن سۆزلەشكەندە «سىزنىڭ
نەرىڭىزدە كېسەل بار» دەپ سورىماي، بەلكى «سىزنىڭ قايسى ئەزايىڭىز ئىك-
كىلەمچى ساغلاملىق ھالىتىدە تۇرىۋاتىدۇ؟» دەپ سورىساق، قارشى تەرەپ ئاندىن
تېخىمۇ ئاسان قوبۇل قىلالايدۇ.

كونىلاردا: «كېسەل ئېغىزدىن كېرىدۇ» دىگەن گەپ بار. ئەمما نۇرغۇنلىغان
سوزۇلما كېسەللىكلەر، بولۇپمۇ بەزى ئاسان بايقالمايدىغان سوزۇلما كېسەللىك-
لەر كۆپىنچە «پىسخىك سەۋەبتىن پەيدا بولىدۇ»، پىسخىك جەھەتتىكى مەسىل-
لەر توپلىنىپ نۇرغۇن كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئالدى بىلەن
قارشى تەرەپنىڭ قەلب دېرىزىسىنى ئېچىپ، ئۇنىڭ قەلبىگە ساپ ھاۋانى ۋە
ئىللىق قۇياش نۇرىنى باشلاپ كىرىش — كېسەلگە ئاكتىپ ھالدا قارشى تۇ-
رۇشنىڭ تۇنجى قەدىمى، شۇنداقلا ئاچقۇچلۇق قەدىمى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

تۇتۇش — پۇتتىنى سىيلاپ كېسەلنى بىلىشتىكى ئۇسۇلدۇر

جۇڭخىي تېبابىتىدىكى «تۇتۇش» ئۇسۇلىنىڭ ئەسلىي مەنىسى تومۇر تۇتۇش-
تىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ پۇت قىسمى رېفلىكسىلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىدا
قوللىنىلغاندا پۇتتىنى سىيلاپ تۇتۇشنى كۆرسىتىدۇ، بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق پۇت-
نىڭ تېرىسى ئاستىغا يىغىلىپ قالغان ماددىلارنىڭ شەكلى، پۇت قىسمى تېرى-
سىنىڭ تېمپېراتۇرىسى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ بىلگىلى بولىدۇ.

مەن ئىلگىرى نۇرغۇن زىققە كېسەللى بىمارلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋا-
لىغان، ئۇلار ئىچىدىكى بىر بىمارنىڭ كېسەللىك تارىخى 30 يىلغا يېتىدىغان
بولۇپ، دەسلەپتە ئۇ ئېفېدىرىن پۈركۈگەندىن كېيىنلا ئاندىن نورمال نەپەس
ئالالايدىكەن، كېيىن دائىم دورا يېگەنلىكتىن بەدەندە دورىغا قارشىلىق پەيدا
بولۇپ، پەقەت نەپەسلىنىش ئاپپاراتىغا تايىنىپلا نەپەسلىنىپتۇ. ئۇنىڭ كېسەل-
لىك تارىخىنى ئاڭلاپ بولغاندىن كېيىن، مەن ئۇنىڭ پۇتتىنى تۇتۇپلا پۇت ئاس-
تىدىكى كانايچە ۋە ئۆپكە قىسمى رېفلىكس رايونىدا ھۈررەك ۋە يول - يول
سىزىقچىلارنىڭ ئىنتايىن كۆپ ئىكەنلىكىنى بايقىدىم.



بەدىنىدە كېسەل يوق ساغلام
ئادەمنىڭ پۇتى يۇمشاق، پارقە -
راق بولۇپ، خۇددى بوۋاقنىڭ
پۇتىغا ئوخشاش بولىدۇ.

پۇت ئاستىدىكى كانايچە رېفلىكس رايونى ۋە ئۆپكە رېفلىكس رايونى زىققە كېسە -
لىگە دىياگنوز قويۇپ داۋالاشتىكى مۇھىم ئورۇن ھېسابلىنىدۇ. ئادەتتە نەپەس يولى
سىستېمىسىدا كېسەل بار ئادەمنىڭ بولۇپمۇ زىققە كېسەلى بىمارنىڭ پۇتىدىكى بۇ
ئىككى رېفلىكس رايونىنى سىيلىساق، قوللىمىزغا داشقال ياكى قۇمنى تۇتقاندەك
سېزىم بولىدۇ. پۇتتىكى بۇ ئەھۋاللاردىن قارىغاندا، ئۇ بىمارنىڭ كېسەلى خېلىلا
ئېغىر ئىدى.

بۇنىڭغا قارىتا، مەن ئۇنىڭ ئىككى پۇتىدىكى كاناي، كانايچە ۋە ئۆپكە رېفلىكس
رايونى ئارقىلىق تەڭشەپ داۋالاشنى مۇھىم نۇقتا قىلدىم ھەمدە ئۇنىڭغا: «ئۆيگە
قايتقاندىن كېيىن ھەر كۈنى قىرغۇچ تاختا بىلەن ئاۋۋال ئىككى پۇتنىڭ ئاستىدىكى
كانايچە ۋە ئۆپكىدىن ئىبارەت ئىككى كېسەللىك رېفلىكس رايونىنى تۆۋەندىن يۇقى -
رىغا قارىتىپ تەرتىپ بويىچە 100 قېتىم قىرىشنى، ئاندىن يەنە كۆكرەك لىمفا بې -

زى، قىزىلىۋىگەچ، كاناي، تال، ھىپوفىز، بۆرەك ئۈستى بېزى
قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى بىرلىكتە ئۇۋۇلاپ
راۋانلاشتۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق پۈتكۈل نەپەس سىستېمىسىنى ئو -
مۇميۈزلۈك تەڭشەش» نى تاپىلدىم. بىر مەزگىللىك داۋالاپ
تەڭشەشتىن كېيىن، ئۇنىڭ كېسەلىدە كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىش
بولدى، ئاخىرىدا ئۇ نەپەس ئېلىش ئاپپاراتىدىن تامامەن قۇتۇلدى.

كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش ۋاقتى ۋە ئېغىر - يېنىكلىك
دەرىجىسىگە ئاساسەن، پۇت قىسمىنى تۇتۇش ئارقىلىق بايقىغىلى
بولىدىغان مۇسبەتلىك ماددىلارنىڭ شەكلىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ.
مەن تۆۋەندە پۇتنى تۇتقاندا بىلىنىدىغان، ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان
بەزى ئەھۋاللارنى كۆپچىلىكنىڭ دىياگنوز قويۇشتا پايدىلىنىشى
ئۈچۈن تەييارلىدىم.



پۇت قىسمىنى تۇتقاندا بىلىنىدىغان ئەھۋال ۋە بۇنىڭغا ماس كېلىدىغان كېسەللىكلەر جەدۋىلى

پۇتنى تۇتقاندىكى ئەھۋال	ماس كېلىدىغان كېسەللەر
يەللىك ئىششىق (قول بىلەن باسقاندا يىغىندى ماددىلار يۆتكىلىدۇ ئەمما بەرەر شەكىلگە ئىگە بولمايدۇ)	رېفلىكس رايونىغا ماس كېلىدىغان ئىچكى ئەزالاردا چۆكۈندىلەر، يەل ۋە قانلىق يىغىندى ماددىلار پەيدا بولغان ياكى بۇ ئەزالار يېنىك دەرىجىدە ياللۇغلانغان
قاتتىق ھۇررەك (قول بىلەن باسقاندا يىغىندى ماددىلار بىرقەدەر قاتتىق بىلىنىدۇ ھەم مىدىرلىمايدۇ)	رېفلىكس رايونىغا ماس كېلىدىغان ئىچكى ئەزالارغا كېرەكسىز ماددىلار زىيادە كۆپ يىغىلغان بولۇپ، بۇ مۇنچاق گۆشسىمان كېسەللىك ئۆزگىرىشىدىن دېرەك بېرىدۇ
سىزىقسىمان مۇسبەتلىك ماددىلار (يەنى يىغىندى ماددىلار خۇددى ئىنچىكە ئۆمۈر سىمغا ئوخشايدۇ ھەمدە تېرىنىڭ ئاستىدىكى ئورنى روشەن بىلىنىدۇ)	رېفلىكس رايونىغا ماس كېلىدىغان ئىچكى ئەزالارغا يىغىلغان كېرەكسىز ماددىلار بىرقەدەر كۆپ ۋە قاتتىق بولۇپ، بۇنىڭدىكى كېسەللىك ئاددىيلا مۇنچاق گۆشسىمان كېسەللىك بولماستىن، بەلكى خالتىلىق ئىششىق ۋە ئۆسمە بولۇشى مۇمكىن
قۇم - شېغىلدەك بىلىنىدۇ (يىغىندى ماددىلار خۇددى گۈرۈچنىڭ شەكلىگە ئوخشاش بولۇپ، مىدىرلىمايدۇ، ئەمما قولغا ئۇنىڭ قىرلىرى ئۇرۇنىدۇ)	كېسەللىك ئەھۋالى ئەڭ ئېغىر بولىدۇ ياكى راك كېسەلى بولۇش مۇمكىنچىلىكى بولىدۇ

پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلغاندا، ئەگەر بىمار روشەن ئاغرىقنى ھېس قىلسا، بۇ بىمارنىڭ جىگەر ۋە بۆرىكىدە مۇسبەتلىك ئاجىزلىشىش بولغانلىقىنى، قان ئايلىنىشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. بىز بۇ چاغدا ئۇۋۇلاشنى ناھايىتى ئاستا ۋە دائىملىق ئېلىپ بېرىپ، يىغىندى ماددىلارنى تەدرىجىي چىقىرىپ تاشلىساق بولىدۇ؛ ئەگەر بىمارنىڭ بەدىنىدە توڭلىغاندەك سېزىم بولسا، بۇ كۆپىنچە ھالدا سوغۇق شامال تەگكەنلىكىنىڭ ئالامىتى بولۇپ، يېنىك بولغاندا سوغۇق بەدەنگە ئۆتكەن، ئېغىر بولغاندا سوغۇق سۆڭەككە ئۆتكەن بولىدۇ؛ ئەگەر ئۇۋۇلغاندا بىمارنىڭ پۇتىدىن دائىم تەر چىقسا، بۇ جىگەر ۋە بۆرىكىنىڭ مەنپىيلىكى زەئىپلەشكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ، شۇ سەۋەبتىن تەر كۆپ چىقىدۇ.

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قول بىلەن تۇتقاندىكى بارلىق ئەھۋاللارنى بىز ئەستايىدىللىق بىلەن ھېس قىلىشىمىز كېرەك، بەزى ئىنچىكە ھالقىلار ھەمىشە كېسەلگە ھۆكۈم قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئومۇملاشتۇرغاندا، يۇقىرىدا ئېيتىلغان «قاراش، پۇراش، سوراش، تۇتۇش» تىن ئىبارەت كونكرېت

ئۇسۇللار مېنىڭ 30 يىللىق تەجرىبەمنىڭ يەكۈنى بولۇپ، بۇنى كۆپچىلىكنىڭ كۈندىلىك ساقلىق ساقلاش ۋە ئۆز - ئۆزىگە دىياگنوز قويۇشتا پايدىلىنىشى ئۈچۈن سۈندۈم، ئەگەر كۆپچىلىك ھەقىقەتەن كېسەل بارلىقىنى تەكشۈرۈپ بايقىسا، ئالدى بىلەن دوختۇرخانىغا بېرىپ دىياگنوزنى مۇقىملاشتۇرۇپ ۋاقتىدا داۋالاشنى، ئۆزىنىڭ ھۆكۈمىگە تايىنىپلا رېفلىكسلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنى قالايمىقان قوللانماستىقىنى تەۋسىيە قىلىمەن. كۆپچىلىكنىڭ تەجرىبىسى بولمىغاچقا، ئۆز - ئۆزىگە قويغان دىياگنوز ئانچە توغرا بولماسلىقى مۇمكىن، شۇڭا يەنىلا دوختۇرخانىغا بېرىپ ئېنىق دىياگنوز قويدۇرۇپ، داۋالاشنى كېچىكتۈرمىگىنى ياخشى.

پۈتتى ئۇۋۇلاشنىڭ ئاساسلىق ئۇسۇلى ۋە تەرتىپى

«بېسىش، ئۇۋۇلاش، سىيرىش، قىرىش» تىن ئىبارەت تۆت بىرلەشمە ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى پۈت قىسمىنى رېفلىكسلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى بىز كۈندىلىك تۇرمۇشتا دائىم قوللىنىلىدىغان تۈرلۈك ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىغا ئوخشاپ كېتىدۇ، بۇ ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، «بېسىش، ئۇۋۇلاش، سىيرىش، قىرىش» تىن ئىبارەت تۆت خىل ئۇسۇل دائىم قوللىنىلىدۇ. بۇ ئۇسۇللارنى قوللانغان ۋاقىتتا ئادەتتە رېفلىكس رايونىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى ۋە ئورنىغا ئاساسەن، ئەڭ قولايلىق بولغان مەشغۇلات ئۇسۇلىنى ئىشلەتسە بولىدۇ، ئومۇمەن ئەڭ ياخشى غىدىقلاش ئۇنۇمىگە يەتسەلا كۈ - پايە. ئۇۋۇلغۇچى ئۆزىنىڭ ئادىتىگە ئاساسەن ماس ئۇسۇلنى تاللىسا بولىدۇ.

دائىم قوللىنىلىدىغان ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرى:

دائىرىسى بىرقەدەر چوڭراق بولغان رېفلىكس رايونلىرىنى باش بارمىقىمىز بىلەن ئۇۋۇلايمىز ياكى قولىمىزنىڭ ئالغىد - نى بىلەن سىيرىپ ئۇۋۇلايمىز؛

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
كۆرسەتمە رەسىمى

ئايلىندۇرۇش ياكى چۆرۈش

تەۋرىتىپ ئۇۋۇلاش

بىرلەشتۈرۈپ ئۇۋۇلاش

بېسىش

سىيرىش

قىرىش

كېرىپ تارتىش

دائىرىسى بىرقەدەر كىچىكرەك بولغان رېفلېكس رايونلىرىنى بىۋاسىتە بارماقنىڭ يۈزى (يۇمشىقى) بىلەن باسقۇچ بىر ئاز قولايلىق بولىدۇ؛
 بىرقەدەر تارراق بولغان رېفلېكس رايونلىرىنى، مەسىلەن: پۇتنىڭ دۈمبە -
 سىدىكى 4 - ، 5 - بارماق ئوتتۇرىسىدىكى ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى رېفلېكس
 رايونىنى باش بارماقنىڭ ئىچكى يۈزىنى تىك تۇتۇپ ياكى كۆرسەتكۈچ بارماق
 بوغۇمىنىڭ يان تەرىپى ئارقىلىق باسقۇچ بىرقەدەر ئوڭۇشلۇق بولىدۇ.
 كۆپچىلىك مەشغۇلات قىلغاندا مەزكۇر كىتابتىكى كۆرسەتمە رەسىملەردىن
 پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئادىتىگە ئاساسەن ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى تاللىسا بولىدۇ.
 ئەسكەرتىمە: ئۇۋۇلغاندا قوشۇمچە ياردەمچى قوراللاردىن پايدىلىنىش تەۋسىيە
 قىلىنىدۇ.

ئۇۋۇلغاندا كۆپ ساندىكى كىشىلەر مەشغۇلاتنى قولى بىلەن ئېلىپ بېرىش -
 قا ئادەتلەنگەن. باش بارماقنىڭ پۈتكۈل بارماق يۇمشىقى مېڭىنىڭ رېفلېكس را -
 يونى بولغاچقا، ئەگەر مەشغۇلات قىلغۇچىنىڭ ئەسلىدىنلا يېشى بىر ئاز چوڭ
 ياكى قان بېسىمى يۇقىرى بولسا، باش بارماققا چۈشىدىغان بېسىم زىيادە ئار -
 تىپ كېتىپ، مېڭە قان تومۇرلىرى غىدىقلىنىدۇ - دە، قان بېسىمى ئۆرلەپ
 كېتىدۇ. باش بارماق ئارقىلىق ئۇۋۇلاشنىڭ يۇقىرىقىدەك كەمچىلىكى بولغاچ -
 قا، مەن كۆپچىلىكنىڭ ئىمكانقەدەر ياغاچ تاياق، كالا مۇڭگۈزىدىن ياسالغان تا -
 ياق، تاش يىڭنە تايىقى قاتارلىق ئۇۋۇلاش قوراللىرىنى ئىشلىتىشنى تەۋسىيە
 قىلىمەن. ئۆزۈمنىڭ تەجرىبىسىگە ئاساسەن، تاش يىڭنە، كالا مۇڭگۈزى قاتار -
 لىق ماتېرىياللاردىن ياسالغان ئۇۋۇلاش تايىقى، قىرىش تايىقى قاتارلىق قو -
 شۇمچە قوراللارنى ئىشلىتىپ ئۇۋۇلغاندا، بۇ قوراللار ئادەم بەدىنىگە پايدىلىق
 بولغان يىراق ئىنفىرا قىزىل نۇر قويۇپ بېرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن داۋالاپ تەڭشەش
 ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ، شۇڭا مەن كۆپچىلىكنىڭ بۇ خىل ئۇسۇلنى
 كۆپرەك قوللىنىشىنى تەشەببۇس قىلىمەن، ئەمما ئۇۋۇلاش (بېسىش) تا كۈچ -
 نىڭ دەرىجىسىگە دىققەت قىلىش كېرەك.

ئۇۋۇلاش تايىقى، ئۇۋۇلاش مېيى
 ۋە سۇ قاتارلىقلار رېفلېكسلىق ئۇ -
 ۋۇلاپ داۋالاشتا كەم بولسا بولمايدۇ -
 خان بۇيۇملاردۇر.



ساقلىقنى ساقلاش مەقسىتىدە پۈتكۈل پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلغاندا ئاۋۋال سول پۇت ئۇۋۇلىنىدۇ.

پۈتكۈل پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ كۈندىلىك ساقلىق ساقلاشتا، ئاۋۋال سول پۇت، ئاندىن ئوڭ پۇتنى ئۇۋۇلاش تەرتىپى بويىچە مەشغۇلات قىلىش كېرەك، چۈنكى يۈرەكنىڭ رېفلىكسلىق رايونى سول پۇت تەرەپتە بولىدۇ، ئادەم بەدىنىدىكى قانلار يۈرەكتىن ئېقىپ چىقىپ، بەدەندە ئايلىنىشنى تاماملاپ بولغاندىن كېيىن يەنە يۈرەككە ئېقىپ كېلىدۇ، ئالدى بىلەن يۈرەك رېفلىكس رايونىدىن باشلاپ ئۇۋۇلغاندا قاننىڭ ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ماددا ئالمىشىشنى تېزلەتكىلى بولىدۇ، بۇ كېسەللىكنىڭ ساقىيىشىغا پايدىلىق. پۈتكۈل پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش تەرتىپىنى بىز ئىككىنچى بابتا كۆنكرېت چۈشەندۈرىمىز (34 - بەتكە قارالسۇن).

كېسەللىكنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشتا «ئاساسىي رېفلىكس رايونى — كېسەللىك رېفلىكس رايونى — مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى — ئاساسىي رېفلىكس رايونى» دىن ئىبارەت تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

بەدەندىكى مەلۇم خىل ساقسىزلىققا نىسبەتەن ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئېلىپ بارغاندىكى، توغرا بولغان ئۇۋۇلاش تەرتىپى: ئاساسىي رېفلىكس رايونى — كېسەللىك رېفلىكس رايونى — مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى — ئاساسىي رېفلىكس رايونىدىن ئىبارەت.

ئالدى بىلەن بىر نەچچە ئاساسىي چۈشەنچىلەرنى تونۇشتۇرىمەن.

ئاساسىي رېفلىكس رايونى — بۆرەك ئۈستى بېزى، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى، بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى، دۈۋساق، سۈيدۈك يولى رېفلىكس رايونى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇۋۇلاشنىڭ مەقسىتى پۈتۈن بەدەندىكى زەھەرنى چىقىرىپ تاشلاش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشتىن ئىبارەت.

كېسەللىك رېفلىكس رايونى كېسەللىك ئالامەتلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان رېفلىكس رايونىدىن ئىبارەت. يۆتەلنى ئېلىپ ئېيتساق، بۇ خىل كېسەللىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك مۇناسىۋەتلىك بولغىنى دەل نەپەسلىنىش سىستېمىسى رېفلىكس رايونىدىن ئىبارەت، يەنى كاناي رېفلىكس رايونى، كانايچە رېفلىكس رايونى، ئۆپكە رېفلىكس رايونى قاتارلىقلار، بۇلار كېسەللىك رېفلىكس رايونى دېيىلىدۇ.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى. يەنە يۆتەلنى مىسالغا ئالساق، يۆتەل ئادەتتە نەپەسلىنىش سىستېمىسىدا ياللۇغ بارلىقىنى ئىپادىلەيدۇ، بۇنىڭدا ياللۇغنى قايتۇرىدىغان ئەڭ چوڭ ئەزا تالدىن ئىبارەت، يەنە بۆرەك ئۈستى بېزى ۋە ھەرقايسى لىمفا بەزلىرىمۇ بار. شۇڭا يۆتەلنى داۋالاپ ساقايتىش ئۈچۈن ھەم يۇقىرىدا ئېيتىلغان كېسەللىك رېفلىكس رايونلىرىنى ھەم نەپەسلىنىش سىستېمىسى بىلەن ئالاقىدار بولغان مۇشۇ مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشقا توغرا كېلىدۇ.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن، بەدەندىكى زەھەرنى ئۈزۈل - كېسىل تازىلاپ چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن، ئاساسىي رېفلىكس رايونىنى يەنە بىر قېتىم ئۇۋۇلاش كېرەك.

بۇ پۈتكۈل جەرياننى مەن ئوبرازلاشتۇرۇپ «چوڭ تازىلاش» دەپ ئاتىدىم. بىرىنچى قەدەمدە، ئالدى بىلەن ھەربىر ئۆينىڭ ئىشىكى ئالدىدىكى كارىدور پاكىز تازىلىنىپ، كېيىنكى قەدەمدە ئۆيدىن سۈپۈرۈلۈپ چىقىدىغان ئەخلەت (ئاساسىي رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش) ئۈچۈن ئورۇن بىكارلىنىدۇ؛ ئىككىنچى قەدەمدە، ھەربىر ئۆي يۇغۇشتۇرۇلۇپ، ئەخلەتلەر بايا پاكىز تازىلانغان ئىشىك ئالدىدىكى كارىدورغا سۈپۈرۈپ چىقىرىلىدۇ (كېسەللىك رېفلىكس رايونى ۋە مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرى ئۇۋۇلىنىدۇ)؛ ئۈچىنچى قەدەمدە، ئىشىك ئالدى كارىدوردىكى ئەخلەتلەر پاكىز تازىلىنىدۇ (ئاساسىي رېفلىكس رايونى ئۇۋۇلىنىدۇ). مېنىڭچە بۇنى مۇشۇنداق چۈشەنسەك ناھايىتى ئاسان بولىدۇ.

ئەسكەرتىمە: مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونىنى قانداق تاللاش كېرەك؟

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى تاللاش ئانچە ئاسان ئەمەس، شۇڭا بۇنى كۆپچىلىككە چۈشەندۈرۈپ ئۆتەي. مەن رېفلىكسلىق رايونلارنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كېسەل داۋالىغاندا، جۇڭگىيى تېبابىتىدىكى بەزى نەزەرىيەلەردىن پايدىلىنىمەن، مەسىلەن: ئۆپكەنى ئىللىتىش دېگەندەك، جۇڭگىيى تېبابىتىدىكى «ئۆپكە بىلەن چوڭ ئۈچەي ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ» دېگەن نەزەرىيەگە ئاساسەن، ئۆپكە رېفلىكس رايونىغا قارىتا تەڭشەپ داۋالاش ئېلىپ بارغاندا چوڭ ئۈچەي رېفلىكس رايونىغىمۇ تەڭشەش ئېلىپ بېرىش كېرەك؛ ئۇنىڭدىن باشقا ئۆپكە مېتاللىق خۇسۇسىيەتكە ئىگە، جۇڭگىيى تېبابىتىدىكى بەش خىل ئېلېمېنت قائىدىسىگە ئاساسەن، توپىدىن مېتال پەيدا بولىدۇ، ئادەم بەدىنىدىكى بەش ئەزا ئىچىدە تال بىلەن ئاشقازان توپا خۇسۇسىيىتىگە ئىگە،



پۇت قىسمى رېفلىكسىلىق رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، بەش بارماق پايپىتى ھەم يېڭى ئۆگەنگۈچىلەرنىڭ رېفلىكسىلىق رايونلارنىڭ ئورنىنى توغرا ئىگىلىشىگە ياردەم بېرەلەيدۇ ھەم ئۇۋۇلىغاندا پۇتنى ئىسسىق ساقلاش رولىنى ئۆتەيدۇ، شۇڭا مەن كۆپچىلىكنىڭ بۇ قوشۇمچە قورالنى ئىشلىتىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.

ئەگەر «مېتال»نى تولۇقلىماقچى بولغاندا، «توپا» (تال بىلەن ئاشقازان رېفلىكسى رايونى)نى تەڭشەشنى كۈچەيتىش لازىم. جۇڭخىي تېبابىتى نەزەرىيەسىدىن پايدىلانغاندا، رېفلىكسىلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ.

پۇتنى ئۇۋۇلاشتىكى زۆرۈر تەييارلىق

پۇت قىسمىنى رېفلىكسىلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش بەدەننى تەڭشەپ داۋالاشتىكى ئۈنۈمۈرسال ئۇسۇل بولۇپ، پەقەت ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى ئىگىلىسلا يېتەرلىك بولمايدۇ. ئۇۋۇلاشتىن بۇرۇنقى بەزى تەييارلىق خىزمەتلىرى، ئۇۋۇلاش جەريانىدىكى بەزى مەنى قىلىنىدىغان ۋە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار پۈتكۈل ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۈنۈمىگە ئىنتايىن مۇھىم تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئەگەر بۇ ئىشلار ياخشى قىلىنمىسا، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولماي ئەجرى بىكار كېتىشى، ھەتتا بۇ ئۇۋۇلاش ئەكسىچە تەسىر كۆرسىتىشىمۇ مۇمكىن. شۇڭا، بۇ پاراگرافتا سۆزلەنگەن مەزمۇنلارنى كۆپچىلىك چوقۇم ئېسىدە چىڭ ساقلىشى زۆرۈر.

تۆۋەندە قەدەم - باسقۇچلار بويىچە سۆزلەيمەن:

پۇتنى سۇغا چىلاش

پۇتنى سۇغا چىلغاندا تەر تۆشۈكچىلىرى ئېچىلىپ، جىڭلۇلار جانلىنىپ، قان ئايلىنىش ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، پۇت قىسمىنىڭ سەزگۈرلۈكى ئېشىپ، ئۇۋۇلاش ئۈنۈمى ئەڭ ياخشى بولىدۇ.

پۇتنى سۇغا چىلغاندا دىققەت قىلىدىغان ئىشلار

سۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى 42 — 45 گىرادۇسقىچە بولسا مۇۋاپىق.

چىلاش ۋاقتى 20 مىنۇت بولسا بولىدۇ. تېنى سەل ئاجىز كىشىلەر پۇتنى چىلاش ۋاقتىنى مۇۋاپىق قىسقارتىشى كېرەك، بولۇپمۇ 65 ياشتىن

ئاشقانلارنىڭ پۇتىنى چىلاش ۋاقتى 15 مىنۇتتىن ئېشىپ كەتسە بولمايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، تاماقتىن بۇرۇن ۋە تاماقتىن كېيىنكى 30 مىنۇت ئىچىدە پۇتىنى چىلسا مۇۋاپىق بولمايدۇ. پۇتىنى چىلاش جەريانىدا، ئەگەر پۇتىنى چىلىغان سۇ سوۋۇپ كەتسە، بۇنىڭغا داۋاملىق قىزىق سۇ قۇيۇپ تەڭشەسە بولىدۇ، پۇتىنى پۈتۈن بەدەن سەل قىزىغىچە چىلىساق بولىدۇ. سۇنىڭ مىقدارى: پۇتىنى چىلايدىغان سۇ مىقدارى، يەنى سۇنىڭ چوڭقۇرلۇقى پاقالچاقنىڭ بولجۇڭ گۆشىگىچە بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ.

پۇتىنى چىلايدىغان چېلەك: مەن كۆپچىلىكنىڭ پۇتىنى چىلاشقا سولياۋ چېلەك ئىشلىتىشنى تەۋسىيە قىلىمەن، چۈنكى بىرىنچىدىن سولياۋ چېلەك ئەرزىن، ئىككىنچىدىن يېنىك ھەم قولايلىق. بولۇپمۇ ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا سۇنى تۆكۈش تېخىمۇ قولايلىق. بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، سوغا (ياغاچ چېلەك) بىر ئاز ئېغىر بولۇپ، ئۇنىڭ مۇھىتىنىڭ نەملىكىگە بولغان تەلىپىمۇ يۇقىرى، شىمال تەرەپلەرنىڭ كىلىماتى قۇرغاق بولغاچقا، ئاسراش مۇۋاپىق بولمىغاندا سوغىدىن ناھايىتى ئاسانلا سۇ ئاقىدۇ. پۇت چىلايدىغان توكلۇق داسنى ئىشلەتكەندە، ئۇنىڭدا پەيدا بولغان ئېلېكتىر ماگنىتى پۇتىنى چىلاش جەريانىدا ئادەم بەدىنىگە تەسىر كۆرسىتىپ، باش قېيىش، ئىشتىھا ناچارلىشىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۇنى توكتىن ئاجرىتىۋېتىپ ئىشلىتىش لازىم.

پۇت چىلاشقا ئىشلىتىلىدىغان ماتېرىياللار

ئەگەر پەقەت كۈندىلىك ساقلىقنى ساقلاش ئۈچۈنلا پۇتىنى چىلايدىغان بولساق، مەن كۆپچىلىكنىڭ ئىسسىق سۇغا ئازراق تۇز ياكى ئاچچىقسۇ قۇيۇۋېتىپلا پۇتىنى چىلىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.

تۇز قوشۇلغان سۇغا پۇتىنى چىلىغاندا سىرتقى چىلاش سۈيۈقلۈكى بىلەن بەدەننىڭ ئىچكى سۈيۈقلۈكىنىڭ ئوسموس (سىڭىش) بېسىمىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇپ، بەدەندىكى كالتسىي بىلەن فوسفورنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلىغىلى بولىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە دېزىنېكسىيە قىلىش رولىنى ئوينايدۇ. ئاچچىقسۇ قوشۇلغان سۇغا پۇتىنى چىلىغاندا دېزىنېكسىيە قىلىپ مىكروب ئۆلتۈرىدۇ، بېرىبېرى كېسىلى، پۇتى يېرىلىش، تىرىناق تەمرەتكىسى بىمارلىرى دائىم تۇز قوشۇلغان سۇغا پۇتىنى چىلاپ بەرسە بولىدۇ. ئاچچىقسۇ بىلەن تۇزنى كۆپ سېلىشنىڭ ھاجىتى يوق، يېرىم داس سۇغا بىر قوشۇق تۇز ياكى 1 — 2 قوشۇققىچە ئاچچىقسۇ قۇيسا بولىدۇ.

ئائىلىدە پۇتنى چىلىغاندا، ساقلىق ساقلاش ئېھتىياجىمىزغا ئاساسەن، ئوخشاش بولمىغان جۇڭىي دورىلىرىدىن پۇت چىلاش دورىلىقى تەييارلاپ ئىشلەتسەك بولىدۇ، ئىسسىق سۇنىڭ رولى ئارقىلىق، جۇڭىي دورىسى تەركىبىدىكى ئۈنۈملۈك تەركىبلەر تېرىگە سىڭىپ، پۇتنىڭ قىل قان تومۇرلىرى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىپ، ئادەم بەدىنىنىڭ قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا كىرىدۇ، شۇ ئارقىلىق بەدەن سۈپىتىنى ياخشىلاش ۋە بەدەننى تەڭشەش ئۈنۈمىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. پۇت چىلاش دورىلىقىنى ياسىغاندا، بۇنىڭغا ئىشلىتىلگەن دورىلار ئۈچ خىلدىن ئېشىپ كەتسە ياخشى بولمايدۇ.

پۇت چىلاش چەكلىنىدىغان كىشىلەر

بوۋاقلار ۋە كىچىك بالىلار، ئېغىر يۈرەك كېسىلى، يۇقىرى قان بېسىم كېسىلى بىمارلىرى ئۇزۇن مۇددەت پۇتنى چىلىسا بولمايدۇ.

ئۇۋۇلاش تەييارلىقى

قوشۇمچە سايىمان ۋە ئۇۋۇلاش مېيى تەييارلاش
ئۇۋۇلاش تايىقى، كالا مۇڭگۈزىدىن ياسالغان تاياق قاتارلىق قوشۇمچە سايىمانلاردىن پايدىلانغاندا، ئاز كۈچ بىلەن كۆپ ئۈنۈمگە ئېرىششكە بولىدۇ. بەزى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشتا چوقۇم قۇرۇق قول مەشغۇلات قىلىش كېرەك، بۇ چاغدا ئۇۋۇلاش مېيىدىن پايدىلانسا، ئۇۋۇلاش جەريانىدا تېرىنىڭ سۈركىلىپ زەخمىلىنىشىدىن ئۈنۈملۈك ساقلىنىشقا بولىدۇ.



تىرناقنى ئالغاندا رەسىمدىكى گە ئوخشاش تىرناق بارماق گۆشىدىن سەل قىسقا بولسا بولىدۇ، ئۆزى ئەڭ ئازادە ھېس قىلىدىغان ھا- لەتتە ئولتۇرۇپ، ئۆز - ئۆزىنى ئۇ- ۋۇلاشنى باشلىسا بولىدۇ.

تىرناقنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى مۇۋاپىق قالدۇرۇپ ئېلىش
تىرناق زىيادە ئۇزۇن بولسا، ئۇۋۇلىغاندا بىمارنىڭ تېرىسىنى زەخمىلەندۈرىدۇ؛ تىرناق بەك قىسقا بولسا، ئۇۋۇلاش جەريانىدا تىرناق گۆشىدىن ئاجراپ كېتىپ زەخمىلىنىدۇ. تىرناقنىڭ ئۇزۇنلۇقى بارماقنىڭ گۆشىدىن سەل قىسقا بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ.

مۇۋاپىق مۇھىتنى تاللاش

ئۇۋۇلىغاندا ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە تىنچ، ئازادە، تېمپېراتۇرىسى مۇۋاپىق بولغان، كۈن نۇرى ياخشى چۈشىدىغان جايىنى تاللاش لازىم. ئادەمگە ئەركىن - ئازادلىك تۇيغۇسى بېرىدىغان بۇنداق مۇھىت بەدەندىكى قاننىڭ يۈرۈشۈشىگە پايدىلىق بولۇپ، ساقلىق ساقلاش ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆيىچىنىڭ ھاۋا ئۆتۈشچانلىقى ياخشى بولۇشى، ئەمما سوغۇق شامال ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ پۇتىغا بىۋاسىتە تەگمەسلىكى كېرەك.

ئۇۋۇلانغۇچى ئەڭ ياخشى بولغان بەدەن ھالىتىدە تۇرۇشى لازىم

ئەڭ توغرا ھەم راھەت بولغان بەدەن ھالىتى «يېتىش» تۇر، چۈنكى بەدەن مۇشۇنداق ھالەتتە تۇرغاندا قاننىڭ ئايلىنىشى راۋان بولىدۇ، يۆلىنىپ ئولتۇرۇش ھالىتىدە تۇرغاندا ئولتۇرغۇچ سۆڭەك ئېرۋىلىرى بىلەن قان تومۇرلار بېسىلىپ، قان سۇيۇقلۇقىنىڭ مۇقىم ۋە تۇراقلىق ھالەتتە يۈرەككە يېتىپ بارالماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن بەدەن ئۇيۇشۇش، پۇت - قوللار سوۋۇش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. ئۆزىنى ئۆزى ئۇۋۇلىغۇچىلار كۆرىپ، كارىۋات ياكى ئۈزۈن ئورۇندۇقتا بەداشقان قۇرۇپ ئولتۇرۇپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش جەريانىدا بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلار

پۇتىنى سۇغا چىلاپ بولۇپ ۋە باشقا ئۇۋۇلاش تەييارلىقلىرى پۈتكەندىن كېيىن، پۇتىنى ئۇۋۇلساق بولىدۇ. كونكرېت ئۇسۇلنى مەن كېيىنكى مەزمۇندا تەپسىلىي چۈشەندۈرىمەن. ھازىر بىز تۆۋەندىكى بىرقانچە ئەسكەرتىمىلەر ئارقىلىق، ئۇۋۇلاش جەريانىدا ۋە ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن دىققەت قىلىدىغان بەزى ئىشلارنى چۈشىنىپ ئۆتەيلى.

ئائىلىدە بەدەننى ئۇۋۇلاپ داۋالاش 1 — ئۇۋۇلاش كۈچى، ئۇۋۇلاش ۋاقتى،

ئۇۋۇلاش قېتىمى

ئۇۋۇلاش كۈچى

ئۇۋۇلىغاندا چۈشۈرگەن كۈچ بەك چوڭ بولسا، ئۇۋۇلىغان ئورۇن ئاغرىپ كېتىپ ئۇۋۇلاش ئۈنۈمى تۆۋەنلەيدۇ؛ ئۇۋۇلاش كۈچى بەك ئاجىز بولسا، بۇ كۈچ رېفلىكس رايونىغا، قان تومۇر ئورۇنلىرىغا چوڭقۇرلاپ تەسىر قىلالمايدۇ. ئەگەر

ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ بەدىنى سەل ئاجىز بولسا، ئۇۋۇلاش كۈچىنى مۇۋاپىق تۈۋەنلىتىش، شۇنداقلا سۆڭەكنى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، سۆڭەك كۆتۈرۈلۈپ چىققان ياكى تېرە ئاستى توقۇلمىلىرى گازراق بولغان ئورۇنلارنى ئۇۋۇلماسلىق لازىم، بولۇپمۇ سۆڭەك ۋە بوغۇملىرى بىر ئاز چۈرۈك بولغان ياشانغانلارنى ئۇۋۇلىغاندا ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.

ئۇۋۇلىغاندا تېرە قانچە ئاغرىسا شۇنچە ياخشى بولىدۇ دېيىش توغرا ئەمەس، ئۇۋۇلانغۇچى ئاغرىق ھېس قىلمىسا ياخشى، ئۇۋۇلاش كۈچى جەھەتتە ئالدىرماي ئاستا - ئاستا باشلاش، تۇراقلىق ھالەتتە ئۇۋۇلاش كۈچىنى ئاشۇرۇش پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىش زۆرۈر.

ئۇۋۇلاش ۋاقتى

پۇتنىڭ ئاستى قىسمىدىكى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ۋاقتى ئادەتتە بىر ئادەمنىڭ بەدەن سۈپىتى، سالامەتلىك ئەھۋالى ۋە رېفلىكس رايونغا ئاساسەن بېكىتىلىدۇ. ئادەتتە ئېلىپ ئېيتقاندا، پۇتنى بىر قېتىم ئۇۋۇلاپ چىقىش ئۈچۈن 30 — 40 مىنۇتقىچە ۋاقىت كېتىدۇ، تېنى ئاجىز كىشىلەر ياكى كېسەللىك ئېغىر كىشىلەر ئۇۋۇلاش ۋاقتىنى مۇۋاپىق قىسقارتسا بولىدۇ. 65 ياشتىن ئاشقانلار، بەدىنى ئاجىز كىشىلەر ۋە بالىلارنى ئۇۋۇلاش ۋاقتى ئەڭ ياخشىسى 30 مىنۇت ئىچىدە كونترول قىلىنسا بولىدۇ.

ئادەتتىكى ئەھۋالدا، ھەر بىر رېفلىكس رايوننى 3 — 5 قېتىمغىچە ئۇۋۇلىسا بولىدۇ، بەزى ئاسادىيىي كېسەللىكلەر (مەسىلەن: پۇت قايرىلىپ كېتىش قاتارلىق) گە نىسبەتەن، كېسەللىك ئالامىتىنى تېزىرەك يېنىكىلىتىش ئۈچۈن، ئۇۋۇلاش ۋاقتىنى مۇناسىپ ئۇزارتساق بولىدۇ. ئوخشاش بىر رېفلىكس رايوننى كۈچەپەرەك بېسىش ۋاقتى ئۈچ مىنۇتتىن ئېشىپ كەتسە بولمايدۇ.

ئۇۋۇلاش قېتىمى

ئۇۋۇلاش قېتىم سانى ئادەمگە قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ، بۇ ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ بەدەن سۈپىتى، كېسەللىك ئەھۋالى، كېسەللىك تارىخى قاتارلىقلارغا ئاساسەن بەلگىلىنىدۇ. ساقلىقنى ساقلاش مەقسىتىدە پۇتنى ئۇۋۇلىغاندا ھەر كۈنى ئۇۋۇلاشقا بولمايدۇ، ھەر ھەپتىدە 1 — 2 قېتىم ئۇۋۇلىسا مۇۋاپىق. يېنىك دەرىجىدىكى كېسەللىكنى ئۇۋۇلاپ تەڭشەپ داۋالاشتا كۆپىنچە 7 — 10 قېتىمغىچە

ئۇۋۇلاشنى بىر داۋالاش باسقۇچى قىلىپ،
 ھەر قېتىم 45 مىنۇت ئۇۋۇلسا مۇۋاپىق
 بولىدۇ، يەنە باشقا تەبىئىي داۋالاش
 ئۇسۇللىرىنى، مەسلەن: سىرىپ داۋالاش،
 لوڭقا قويۇش قاتارلىق داۋالاش ئۇسۇللىرىنى
 قوشۇمچە قىلىشقا بولىدۇ.



ئائىلىدە ئۇۋۇلاپ داۋالاش 2 — ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن بەدەندە كۆرۈلىدىغان نورمال ئىنكاسلار

پۇت قىسمى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش تاماملانغاندىن كېيىن، قان
 ئايلىنىش راۋانلىشىپ، ماددا ئالماشتىش تېزلىشىش، قاننىڭ قويۇقلۇقى
 ئېشىش قاتارلىق ئامىللار سەۋەبىدىن، بەزى كىشىلەرنىڭ بەدىنىدە تەر كۆپ
 چىقىش، سۈيدۈك كۆپىيىش، ئۇيقۇسى كۆپىيىش قاتارلىق ئادەتتىكىگە
 ئوخشىمايدىغان ئىنكاسلار ياكى بەزى كېسەللىكلەر ئېغىرلاپ كېتىشتەك
 ئەھۋاللار كۆرۈلۈشى مۇمكىن. كىلىنىكا تەجرىبىسى ئىسپاتلىدىكى، بۇلارنىڭ
 ھەممىسى نورمال بولغان ياخشى سۈپەتلىك ئىنكاستىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ
 ئىنكاسلار ئادەتتە 4 — 5 كۈن ئىچىدە تەدرىجىي يوقايدۇ، مۇشۇ ئىنكاسلار
 سەۋەبىدىن پۇت قىسمى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنى ئارىلىقتا
 توختىتىپ قويماسلىق لازىم.

پۇتنى ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن بەدەندە كۆرۈلىدىغان نورمال ئىنكاس ۋە ئۇنىڭ سەۋەبلىرى

ئېغىزى قۇرۇش	قاننىڭ ئايلىنىشى تېزلىشىش سەۋەبىدىن ئېغىز ئاسان قۇرۇيدۇ، سۇ ئىچسلا بۇ ئەھۋال تۈگەيدۇ.
ئۇيقۇسى كۆپىيىش	ئورگانىزىملارنىڭ فىزىيولوگىيەلىك ئىقتىدارى ئۆز - ئۆزىنى تەننىش ئېلىپ بېرىۋاتقان بولغاچقا، «ئۆزىنى قوغداش خاراكتېرلىك تورمۇزلىنىش» ھالىتىدە تۇرۇۋاتقان بولىدۇ.
ھارغىنلىق ھېس قىلىش	قاننىڭ ئايلىنىشى ۋە ئېقىش مىقدارى كۈچەيگەچكە، پۈتۈن بەدەندىكى ھەرقايسى ئەزالارنىڭ پاسسىپ ھەرىكىتى كۈچىيىدۇ، بۇ خۇددى ئۇزۇنغا يۈگۈرگەندىن كې - يىنكى ھارغىنلىق ئەھۋالىغا ئوخشايدۇ.

بەدەنى يوشاپ ئۇيقۇسىراش	قاننىڭ ئايلىنىشى راۋانلىشىپ، ئادەتتىكى جىددىيلىك بېسىمى ۋە گې-خىر يۈك پەسەيگەن بولغاچقا، ئۇيقۇنىڭ سۈپىتى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ.
ئاغرىق	بەدەننىڭ مەلۇم قىسمىدا يوشۇرۇن كېسەللىك بولۇپ، قان راۋان بولمىغانلىقتىن ئاغرىق بىلىنىدۇ، يەنى بىز دائىم دەيدىغان «راۋان بولسا ئاغرىمايدۇ، ئاغرىسا راۋان بولمىغانلىقنىڭ ئالامىتى» دېگەن سۆزنىڭ ئۆزى شۇ.
ئىشتىھاسى ياخشىلىنىش	ئۇۋۇلاش جەريانىدا ماددا ئالمىشىش تېزلىشىدۇ، تالنىڭ ھەرىكەت ئىتتىدارى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ.
قولنىڭ ئالقىنى ياكى پۇ-تۇن بەدەن تەرلەش	جىگەر ۋە بۆرەك مۇسبەتلىكى ئاجىزلىغانلاردا تەرنىڭ چىقىشى كۆپىيىدۇ.
يەل(ئوسۇرۇق) كۆپىيىش ياكى سۈيۈك ۋە چوڭ تە-رەتنىڭ رەڭگى ئۆزگىرىش	ئۇۋۇلاش جەريانىدا ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنىڭ غىدىقلىنىشى سەۋەبىدىن، بەدەندىكى توكسىن ۋە چۆكمە ماددىلار مېتابولىزم ھاسىلاتلىرىغا ئەگىشىپ ئوختىماستىن سىرتقا چىقىرىلىدۇ.
سۈيۈك مىقدارى كۆپىيىش	پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش جەريانىدا، بىمارلاردا سۈيۈك كۆپىيىدۇ، ئەگەر بۇ سۈيۈكنى مەلۇم ۋاقىت تىنچ قويۇپ قويغاندىن كېيىن قارىساق، ئۇ-نىڭدا چۆكمە ماددىلار پەيدا بولىدۇ، بۇ بەدەندىكى توكسىننىڭ مېتابولىزم ھاسىلاتلىرىغا ئەگىشىپ سۈيۈك بىلەن سىرتقا چىقىرىلىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.
جىگەر ۋە بۆرەك مۇسبەتلىكى ئاجىزلىغانلار، قول-پۇتى مۇزلايدىغانلارنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى نورمال ھا-لەتكە قايتىش	ماددا ئالمىشىش ۋە قاننىڭ ئايلىنىشى نورمال ھالەتكە كەلگەن بولىدۇ
پۇتنىڭ ئوشۇق بوغۇمى ئىششىش	پۇتۇن بەدەندىكى چوڭ قان تومۇر ۋە لىمفا كاناللىرى راۋانلىشىپ، قىل قان تومۇرلار ۋە قىلدام لىمفا كاناللىرى راۋانلاشمىغاچقا، پۇتنىڭ ئو-شۇق بوغۇمىدا ئىششىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ. قىل قان تومۇرلار ۋە قىل-دام لىمفا كاناللىرىنىڭ راۋانلىشىشىغا ئەگىشىپ، پۇتنىڭ ئوشۇق بو-غۇمىدىكى ئىششىق ئاستا - ئاستا يوقايدۇ.
پۇتنىڭ تېرىلىرى يۇمشاپ كېتىش	قان ئايلىنىش راۋانلاشقان بولغاچقا، مۇڭگۈزلەشكەن تېرىنىڭ ئاستا - ئاستا سۈيۈلۈپ چۈشكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
پۇتنىڭ تېرىلىرى يۇمران ھالەتكە كېلىش	ماددا ئالمىشىشنىڭ نۇرماللىشىشىغا ئەگىشىپ، ۋېنا تومۇرلىرىنى كۆرگىلى بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.

ئائىلىدە ئۇۋۇلاپ داۋالاش 3 — پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش چەكلىنىدىغان كىشىلەر

كۆپ قىسىم كىشىلەر پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنى قوبۇل قىلسا بولىدۇ، ئەمما بەزى ئالاھىدە توپقا تەۋە كىشىلەر پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كەلمەيدۇ. رەسمىي ئۇۋۇلاشنى باشلاشتىن بۇرۇن، كۆپچىلىك تۆۋەندىكى مەزمۇنلارغا ئاساسەن، ئۆزىنىڭ ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كېلىدىغان ياكى كەلمەيدىغانلىقىنى مۇقىملاشتۇرۇۋالسا بولىدۇ.

1. ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى ئاياللارنىڭ بالىياتقۇ، تۇخۇمدان، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېگىشى قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشقا بولمايدۇ. ھەيز مەزگىلىدىكى ئاياللار پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كەلمەيدۇ. ئەمما ھەيز مىقدارى ئازلاپ، ھەيزنىڭ رەڭگى قارايدىغان چاغدا، پۇت قىسمىدىكى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كېسەللىك ئالامىتىنى يېنىكلەتسە بولىدۇ.

2. قان تۈكۈرۈش، تەرەت قان ئارىلاش كېلىش، مېڭىگە قان چۈشۈش، ئاشقازان قاناش، بالىياتقۇ قاناش قاتارلىق تۈرلۈك ئېغىر قاناش ئالامىتى كۆرۈلگەن بىمارلار پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كەلمەيدۇ.

3. بۆرەك زەئىپلىشىش، يۈرەك زەئىپلىشىش، يۈرەك مۇسكۇل تەقلىمىسى، جىگەر توقۇلمىلىرى نېكروزلىنىش، راك كېسىلى ۋە يۇقۇملۇق كېسەللىككە گىرىپتار بولغان بىمارلار ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كەلمەيدۇ.

4. مەست بولۇپ قالغانلار، روھىي كېسەللەر ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كەلمەيدۇ.

5. ئۇزۇن مۇددەت ھورمۇنلۇق دورىلارنى ئىستېمال قىلغانلار داۋالاشقا ماس كەلمەيدۇ.

6. زىيادە ھېرىپ - چارچاش ھالىتىدە تۇرغانلار داۋالاشقا ماس كەلمەيدۇ.

7. پۇتىدا يىرىڭلاش، قان چىقىش قاتارلىق سىرتقى يارا بار كىشىلەر داۋالاشقا ماس كەلمەيدۇ.

باشقا دىققەت قىلىدىغان ئىشلار:

1. تاماقتىن كېيىنكى بىر سائەت ئىچىدە ئۇۋۇلاش مۇۋاپىق ئەمەس، قورساق ئاچ ۋاقىتتا ئۇۋۇلىسىمۇ مۇۋاپىق بولمايدۇ.

2. ئۇۋۇلاشتىن بۇرۇن، ئۇۋۇلانغۇچى ئاۋۋال ئىسسىق سۇ بىلەن پۇت - قولنى پاكىز يۇيۇپ، ئاندىن لوڭگە بىلەن پۇتىنى ئوراپ ئىسسىق ساقلىشى كېرەك.



ئالاھىدە ئەسكەرتىمە: بەدىنى بەك ئاجىز كىشىلەر ياكى دىيابېت بىمارلىرىنىڭ پۇتىنى ئۇۋۇلىغاندا ئۇۋۇلاش كۈچى بەك چوڭ بولۇپ كەتمەسلىك، بولۇپمۇ دىيابېت بىمارلىرىنى ئۇۋۇلىغاندا ئۇۋۇلاش مېيى ئىشلىتىشكە دىققەت قىلىپ، تېرىنىڭ سۈرۈلۈپ زەخمىلىنىشىدىن، يارا ئېغىزىنىڭ ۋاقتىدا سا- قايماي ئاسارەتلىك پۇتقا ئايلىنىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش زۆرۈر.

3. ئۇۋۇلاش جەريانىدا، ئۇۋۇلانغۇچى ئاغزى قۇرىغانلىقىنى سەزسە ۋاقتىدا 500 مىللىلىتىر ئىلمان قايناق سۇ ئىچسە بولىدۇ، سوغۇق سۇ، دەملىگەن چاي، ئىچىملىك قاتارلىقلارنى ئىچمەسلىك لازىم. بۆرىكى ساغلام بولمىغانلار ھەر قېتىمدا پەقەت 150 مىللىلىتىر سۇ ئىچسە بولىدۇ.

4. بەدەنگە سوغۇق ئۆتۈپ، قان ئايلىنىشقا تەسىر يېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن، ئۇۋۇلانغۇچى دەرھال سوغۇق سۇ بىلەن قولىنى يۇسا بولمايدۇ.

5. ئەگەر ئۇۋۇلانغۇچى دورا بىلەن داۋالانىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان بولسا، دەرھال دورا يېيىشنى توختىتىپ، پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنى قوبۇل قىلسا بولمايدۇ، بەدەن ئەھۋالى تەدرىجىي ياخشىلانغاندىن كېيىن ئاندىن ئاستا - ئاستا دورىنى مۇۋاپىق ئازايتسا ياكى توختاتسا بولىدۇ.

يۇقىرىدا دېيىلگەن دىققەت قىلىدىغان ئىشلار قارماققا ئارتۇقچە گەپتەك بىلىنسىمۇ، ئەمما ئىنتايىن مۇھىم، شۇڭا كۆپچىلىك ئېسىدە چىڭ ساقلىشى كېرەك.



CHAPTER 2

پۇت رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى

خېلى كۆپ كىشىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، پۇتنى رېڧلېكسلىق ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلىنى بىردەمدىلا ئۆگىنىۋېلىش ئانچە ئاسان ئەمەس. مۇشۇ ئەھ-
ۋالنى كۆزدە تۇتۇپ، مەن پۇتتىكى سەككىز چوڭ رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلىنى تەرتىپ بويىچە ئۈلگە ئارقىلىق كۆرسىتىپ ئۆتىمەن. يەنە سىزنىڭ
ئىگىلىشىڭىزگە ياردەمى بولۇشى ئۈچۈن، ئۇۋۇلاشتىن بۇرۇن بەدەننى بوشى-
تىش ئۇسۇلىنى قوشاق قىلىپ تۈزۈپ چىقتىم. ئەسكەرتىشكە ئېگىشلىك بىر
ئىش شۇكى، ئىككى پۇتتىكى رېڧلېكس رايونىنىڭ كۆپ قىسمى ئۆزئارا سىم-
مېتىرىك كېلىدۇ، يالغۇز سول پۇت ۋە ئوڭ پۇت ئاستىنقى قىسمىغىلا ئايرىم-
جايلاشقان رېڧلېكس رايونلىرىنىڭ ھەممىسىگە يېزىق ئارقىلىق ئەسكەرتىمە
بەردەم، بۇنىڭدىن پايدىلانغاندا دىققەت قىلىشىڭلارنى سورايەن. بۇ بىر يۈرۈش
ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى ئىشلىتىشنى داۋاملاشتۇرسىڭىز، ئۆزىڭىز ۋە ئائىلى-
ڭىزدىكىلەرنىڭ ساغلاملىقىنى قوللىغىزدا مەھكەم تۇتۇپ تۇرالايسىز.

پۇت رېفلىپكىس رايونىنى ئۇ- ۋۇلاشتىن بۇرۇنقى قول ئۈگىلىرىنى بوشتىش ئۇسۇلى



پۇتكۈل پۇتنىڭ رېفلىپكىسلىق رايون-
نىنى ئۇۋۇلاشتىن بۇرۇنقى قول ئۈگە-
لىرىنى بوشتىش ئۇسۇلىنىڭ قايىيە-
لەشكەن قائىدىسى

جۇڭگوچە ئۇۋۇلاپ داۋالاش ئۇسۇلى بەك ياخشى،
بۇ ئۇسۇل بىلەن داۋالاش ئومۇملاشۇن ھەممە
ئائىلىلەرگە.
پۇتنى داۋالاشتىن بۇرۇن قەلبىنى داۋالاش بەك
زۆرۈر،
يېنىك، ئوتتۇرا ھال، كۈچەپ بېسىپ سېيرىيە-
مىز تۆۋەنگە.

1. يۈرەك رېفلىپكىس رايونى (سول پۇتنىڭ
ئاستىنى) نى يېنىك، ئوتتۇرا ھال ۋە كۈچەپ بې-
سىشتىن ئىبارەت ئۈچ خىل ئۇۋۇلاش كۈچى ئار-
قىلىق ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئۈچ قېتىم سېيرىپ
باسىمىز، ئەگەر ئەڭ يېنىك كۈچ بىلەن باسقاندا
ئۇۋۇلانغۇچى ئاغرىغانلىقىنى ھېس قىلسا، ئۇ-
ۋۇلاشنى توختىتىمىز؛ ئەگەر ئۇۋۇلانغۇچى بىئا-
راملىق ھېس قىلمىسا، ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ ئىنكا-
سىغا ئاساسەن ئۇۋۇلاش كۈچى دەرىجىسىنى مۇ-
قىملاشتۇرۇپ، مۇشۇ ئۆلچەم بويىچە ئۇۋۇلايمىز.



3. پۇت بارماقلىرىنى تارتىپ سوز-
غاندا بارماقنىڭ بىر قىسىم مۇسكۇللىرى
ۋە نېرۋىلارنى بوشتاقىلى بولىدۇ. بېگىز
بارماق ۋە ئوتتۇرا بارماق ئارقىلىق پۇت-
نىڭ بارماقنى قىسىپ تۇرۇپ، بىر -
بىرلەپ ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ تەك-
رار 3 — 5 قېتىمغىچە تارتىمىز.

2. پۇتنى تۆت تەرەپتىن يېنىك ئۇۋۇلىغاندا، پۇتنىڭ
دۈمبىسى ۋە ئاستى قىسمىدىكى نېرۋا ۋە مۇسكۇللار بو-
شاپ ئۇۋۇلاشقا ماسلىشىدۇ. مەشغۇلات قىلغاندا، پۇتنىڭ
دۈمبىسى، ئاستى ۋە ئالدى تەرىپىنى يېنىك بېسىپ،
ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ سەل كۈچەپ ئۇۋۇلىساق بولىدۇ.



5. ئىككى قولنىڭ ئالدىنى بىلەن پۇتنىڭ ئىچى ۋە سىرتقى ئوشۇق بوغۇمىنى تۇتۇپ كۈ-چەپ قىسىمىز، مۇشۇ ئۇسۇلدا پۇتنى توققۇز قېتىم سىلكىپ ئۇۋۇلساق، ئوشۇق قىسمىنىڭ قان ئايلىنىشى تېزلىشىدۇ.

4. ئاندىن كېيىن بىر قولىمىزدا پۇت-نىڭ ئوشۇقنى تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن بەش بارماقنى يېنىك تۇتۇپ، ئاۋۋال سائەت ئىستىرىلكىسى يۆنىلىشى بويىچە توققۇز قېتىم تەۋرىتىپ ئايلاندۇرىمىز، ئاندىن يەنە سائەت ئىستىرىلكىسىغا قارشى يۆنىلىشتە توققۇز قېتىم يېنىك تەۋرىتىپ ئايلاندۇرىمىز، بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ئوشۇق بوغۇمى مۇسكۇلىدىكى قان ئايلىنىش جانلىنىدۇ.

6. بىر قولىمىز ياكى ئىككى قولىمىز بىلەن ئاستىدىن ئۈستىگە قارىتا، پاقالچاقنىڭ ھەممە يېرى-نى سېپىرىپ ئۇۋۇلساق، پاقالچاق قىسمىنىڭ قان ئايلىنىشى راۋانلىشىپ، جىڭلۇ يوللىرى ئېچىلىدۇ، بۇنىڭ بىلەن پۇتكۈل پۇت قىسمىنىڭ ئۆگىلىرىنى بوشىتىش ئاخىرلىشىدۇ.



سول پۇت ئاساسىي رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش

ئاساسىي رېفلىكس رايونى ئادەم بەدىنىنىڭ سۈيدۈك ئاجرىتىپ چىقىرىش سىستېمىسىغا ماس كېلىدۇ، بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا، مەشغۇلاتنىڭ ئىلگىرى - كېيىنلىك تەرتىپى مۇنداق بولىدۇ: يەنى بۆرەك ئۈستى بېزى، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېگىشى، بۆرەك، سۈيدۈك نەچچىسى، دوۋساق، سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول رېفلىكس رايونلىرى تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلىنىدۇ. پۈتكۈل پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاشنىڭ ئالدى - كەينىدە سۈيدۈك ئاجرىتىپ چىقىرىش ئاساسلىق رېفلىكس رايونلىرىنى ئايرىم - ئايرىم ھالدا بىر قېتىمدىن ئۇۋۇلد. خاندان، بەدەننىڭ سۈيدۈك ئاجرىتىپ چىقىرىش سىستېمىسىنى راۋانلاشتۇرغىلى بولىدۇ، بۇنىڭ بىلەن ماددا ئالمىشىش جەريانىدا پەيدا بولغان كېرەكسىز قال - دۇق ماددىلار سۈيدۈك بىلەن سىرتقا چىقىرىلىپ، رېفلىكسلىق ئۇۋۇلاش ۋە تەڭشەش ئۈنۈمى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ.



1. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ دۈمبىسىنى تۇتۇپ، يەنە بىر قولىمىزغا تاش يىڭىنى ئېلىپ، بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنى غىدىقلىد. خاندان بەدەندە ئادىرېنالىن پەيدا بولىدۇ، بۇنىڭ بىلەن كۆپ خىل دىسمۇ - تازا بارلىققا كېلىپ، ئادەم بەدىنىنىڭ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ.

ئۇۋۇلاشنىڭ ئۇنۇمى

بۆرەك ئۇستى بېزى: بۇ رېفلىكس رايونى ھورمۇن سەۋىيەسىنى تەڭشەيدۇ، ئادەتتە ياللۇغ قايتۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، قىزىتما ياندۇرۇش، يۆتەل توختىتىش، رېئاكسىيەگە قارشى تۇرۇش رولى بار.

قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى: بۇ رېفلىكس رايونىنىڭ دائىرىسى يۇمىلاق شەكىلگە ئوخشايدۇ، مەزكۇر رېفلىكس رايونىنى غىدىقلىغاندا، قورساق ئاغرىقى، قورساق كۆپۈش، ئىچى سۈرۈش قاتارلىق قورساق قىسمى كېسەللىكلىرىنى داۋالىغىلى، يەنە ئاياللاردىكى ھەيزنىڭ ئاغرىتىپ كېلىشىنى پەسەيتكىلى بولىدۇ.

بۆرەك: بۆرەك رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، بۆرەك ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى، بۆرەك ياللۇغى، بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇش قاتارلىق بۆرەك كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

سۈيدۈك نەپچىسى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، سۈيدۈك چىقىرىش يوللىرىنىڭ راۋانلىقىنى ساقلاپ، سۈيدۈك يولىدا تاش پەيدا بولۇش ۋە ياللۇغلىنىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

دوۋساق: دوۋساق رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، دوۋساق ياللۇغى، دوۋساق ئۇنىۋېرسال كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ۋە كېسەللىكنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ. ياشانغانلار بۇ رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسە بولىدۇ.

سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول: بۇ رېفلىكس رايونىنى دائىم سېيرىپ بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، سۈيدۈك قېتىم سانى كۆپ بولۇش، سۈيدۈك قىستاش، سۈيدۈك ئاغرىتىپ كېلىش ۋە ئەرلەردىكى ئىسپېرما بالدۇر كېتىش، مەزى بېزى ياللۇغى كېسەللىكلىرى، شۇنداقلا ئاياللاردىكى جىنسىي يول، سۈيدۈك يولى كېسەللىكلىرىنىڭ يوشۇرۇن خەۋپلىرىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ.



3. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ دۈمبىسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىزغا تاش يىڭىنىنى ئېلىپ، بۆرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇستىدىن ئاستىغا قاراپ يەنە بىر قېتىم يېرىم چەمبەر شەكىلدە ئۇۋۇلايمىز.

2. تاش يىڭىنىنى قويۇپ قويغاندىن كېيىن، ئىككى قولىنىڭ باش بارمىقى بىلەن قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى رېفلىكس رايونىنى تۇتۇپ، تۆۋەندىن يۇقىرىغا قاراپ رېفلىكس رايونىنىڭ سىرتىنى بويلاپ ئۇدا 3 — 5 قېتىمغىچە بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. ئەگەر مۇشۇنداق ئۇۋۇلاۋاتقان چاغدا، ئۇۋۇلانغۇچى دەل ھەيز مەزگىلىدە بولۇپ، قورسىقى ھەيز سەۋەبىدىن ئاغرىۋاتقان بولسا، ئۇنداقتا ئۇۋۇلاش قېتىم سانىنى مۇۋاپىق كۆپەيتسە بولىدۇ.

رېفلېكس رايونىنىڭ جايلىشىش ئورنىنى كۆرسىتىش رەسىمى

4. قولنىڭ ئورنىنى ئۆزگەرتىمەي تۇرۇپ، ئېغىرلىق كۈچىدىن بۆرەك رېفلېكس رايونىدىن تۆۋەنگە قاراپ سۈرۈپ، سۈيدۈك نەيچىسى رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلساق، سۈيدۈك يولىنى راۋانلىشىپ، كېرەكسىز ماددىلارنىڭ چىقىپ كېتىشى تېزلىشىدۇ.



بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلېكس رايونى ① بىرىنچى، ئىككىنچى تاپان سۆڭىكى ئارىسىدىكى بىرىنچى تاپان سۆڭىكىگە يېقىنراق ئورۇنغا جايلاشقان بو-لۇپ، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى رېفلېكس رايونى ②نىڭ ئۈستىدە بو-لىدۇ، بۆرەك رېفلېكس رايونى ③ قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى رېفلېكس رايونى تەرىپىدىن قورشىلىپ تۇرىدۇ. بۆرەك ۋە دوۋساق رېفلېكس رايونى ⑤ بىلەن تۇتىشىپ تۇرغان ياي سىزىق بولسا سۈيدۈك نەيچىسى رېفلېكس رايونى ④ تىن ئىبارەت. دوۋساق رېفلېكس رايونى ⑤ ئوشۇق سۆڭىكى ئاستى ئىچكى يېنىغا جايلاشقان بولۇپ، بۇ جاي ئۈستىگە سەل سوزۇلسلا سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول رېفلېكس رايونى ⑥ بىلەن تۇتىشىدۇ.

ئەسكەرتىمە

سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي يول رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا ئەڭ ياخشىسى ئۇۋۇلاش مېيىنى ئىشلىتىپ، قول بىلەن (ئۇۋۇلاش تايىقى ئىشلەتمەي) ئۇۋۇلاش كېرەك.



6. ئەڭ ئاخىرىدا سۈيدۈك يولى، جىنسىي يول رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۇۋۇلىغان چاغدا، ئەگەر ئۇۋۇلانغۇچى ئاغ-رىقنى سەزسە ياكى ئۇۋۇلىغۇچى مۇسبەتلىك ماددىلارنى سىيلاپ بايقىسا، بۇ ئۇۋۇلانغۇچى-نىڭ مەزى بېزى ياللۇغى ياكى سۈيدۈك يولى، جىنسىي يول كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولۇش مۇمكىنچىلىكىنى ئىپادىلەيدۇ، بۇ-نىڭغا قارىتا مەزكۇر رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاشنى كۈچەيتىش كېرەك.

5. سۈيدۈك نەيچىسى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، پۇتنى سىرتقى تەرەپكە سەل يان-تۇقىلىپ تۇرۇپ، دوۋساق رېفلېكس رايونىنى تاپقاندىن كېيىن، ئەھۋالغا قاراپ تاش يىغىنىنى تاشلاپ، موشتۇ-مىمىزنى سەل تۈگۈپ، كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بوغۇمى ئارقىلىق ئۈستىدىن ئاستىغا سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.

سول پۇت بارماقلىرىدىكى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش

پۇت بارماقلىرىنىڭ رېفلىكس رايونلىرى باشتىڭ شۇ تەرىپىدىكى تەشكىلىي ئەزالارغا ماس كېلىدۇ، بۇ رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلغاندا پېشانە، ھېپوفىز، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، ئۇچلۇك نېرۋا، بۇرۇن، چوڭ مېڭە، بويۇن، كۆز ۋە قۇلاق رېفلىكس رايونلىرىنى تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلساق بولىدۇ. بۇ رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلغاندا، باش قىسمىدىكى ئەزالارنىڭ ۋە نېرۋا سىستېمىسىدىكى نىڭ ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك ياخشىلاپ تەڭشىگىلى، شۇنداقلا يۈرەك - مېڭە قان تومۇرلىرىنىڭ راۋانلىقىنى ساقلىغىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاشنىڭ ئۈنۈمى

پېشانە: مەزكۇر رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا، يۇقىرى قان بېسىم، قاندىكى ماي ئېشىپ كېتىش، ئۇيقۇسىزلىق ۋە تۈرلۈك بەش ئەزا كېسەللىك ئالامەتلىرىنى يېنىكلەتكىلى، روھىي كەيپىياتنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ.

ھېپوفىز: ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ قالايمىقانلىشىشىنى تەڭشەپ، ئادەم بەدىنىنىڭ ھەرىكەت، ھەزىم قىلىش، نەپەسلىنىش، قان ئايلىنىش، سۈيدۈك ئاجرىتىپ چىقىرىش ۋە كۆپىيىش، نېرۋا، ئىچكى ئاچ-راتما، سەزگۈ ئەزالار ۋە ئىممۇنىتېت سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ.

كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسەلى، يۇقىرى قان بېسىم، قاندا ماي ۋە شېكەر مىقدارى يۇقىرى بولۇشنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالىدۇ، پار-كىنىس كېسەللىكنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ ۋە تەڭشەپ، مېڭىنى قان بىلەن تەمىنلەشنى مەلۇم دەرىجىدە كۈچەيتىدۇ.

ئۇچلۇك نېرۋا: بۇ رېفلىكس رايونىنى داۋاملىق ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، يۈز قىسمى مۇسكۇلى قېتىپ قېلىش، كۆز قۇرغاقلىشىش ۋە كۆز ئاغرىقى، كۆز مۇسكۇللىرى تارتىشىپ قېلىش، سەكتە، يۈز پالدى-لىنىش، ئېغىزى مايماق بولۇپ قېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش - تەڭشەشتە ياخشى ئۈنۈم بىرىدۇ.

بۇرۇن رايونى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا، زۇكام، بۇرۇن ياللۇغى، بۇرنى پۈتۈپ قېلىش، خورەك تارتىش، بۇرۇن مۇنچاق گۆشى، بۇرۇن ئوتتۇرا پاسىلى بىر تەرەپكە قىيىسىپ قېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ھەممىسىگە ئۈنۈم بېرىدۇ.


چوڭ مېڭە: بۇ رېفلىكس رايونىنى غىدىقلىغاندا، باش قېيىش، باش ئاغرىقى قاتارلىق باش كېسەللىكلىرىنى ئۈنۈملۈك ياخشىلايدۇ، يەنە قان بېسىمىنى ئۈنۈملۈك تەڭشەيدۇ.

بويۇن: بويۇن كېسەللىكلىرىنى مەلۇم دەرىجىدە داۋالاش ۋە تەڭشەش رولى بار.

كۆز: كۆز چارچاش، گىلاۋكوما، كۆزىگە ئاق چۈشۈش، بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى قاتارلىق كۆز كېسەللىكلىرىنى يېنىكلەيتىدۇ. كۆز ئاستى قاناش ئەھۋالى كۆرۈلگەن بىمارنىڭ بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاشقا ھەرگىز بولمايدۇ.

قۇلاق: بۇ رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، گاسلىق، قۇلاق غوغۇلداش، ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغى قاتارلىق تۈرلۈك قۇلاق كېسەللىكلىرى ياخشىلىنىدۇ.

1. ئاۋۋال ئوخشاش يۆنىلىش بويىچە باش بارماقنىڭ ئالدى ئۈچىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى توغرا يۆنىلىشتە سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز؛ ئاندىن تەرتىپ بويىچە باشقا تۆت بارماق- نىڭ ئالدى ئۈچىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلايمىز. پۈتنىڭ بەش بارماقنى قو- لىمىز بىلەن تۇتۇپ توختىماستىن بىرلىكتە ئۇۋۇلايمىز، پېشانە رېفلېكس رايونىنى ئاد- دىي ئۇسۇلدا غىدىقلىساقمۇ ياكى تولۇق ئۇۋۇلاپ غىدىقلىساقمۇ بولىدۇ.



2. قولنىڭ ئورنىنى مەدەلەتمەي تۇرۇپ، پۇت باش بارماق يۇمشىقى مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تەرىپىدىكى ھىپوفىز رېفلېكس رايونىنى كۈچەپ بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئورۇننى ئۇۋۇ- لىغاندا، چىقىرىش يوللىرىنى را- ۋانلاشتۇرۇپ، ئىممۇنىتېت ئىقتىدا- رىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.





رېفلېكس رايونىنىڭ جايلىنىش ئورنىنى كۆرسىتىش رەسمىي پېشانە رېفلېكس رايونى ① بەش بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، ئادەم بەدىنىدىكى چوڭ مېڭە ۋە ئاداشقان نېرۋا قىسمىغا ماس كېلىدۇ. ھىپوفىز رېفلېكس رايونى ② باش بارماقنىڭ پېشانە رېفلېكس رايونىغا يېقىن بولۇپ، باش بارماق يۇمىشىقنىڭ دەل ئوتتۇرىسىغا توغرا كېلىدۇ. باش بارماق يۇمىشىقنىڭ سىرتقى تەرىپىنىڭ تۈۋىگە يېقىن جايدا كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلېكس رايونى ③ بار، ئۇنىڭ ئۈستى تەرىپىدە بولسا ئۇچلۇك نېرۋا رېفلېكس رايونى ④ بار. بۇرۇن رېفلېكس رايونى ⑤ بولسا ئۇچلۇك نېرۋا رېفلېكس رايونىغا ماس كېلىدىغان باش بارماقنىڭ ئىچكى تەرىپىنىڭ تىرىق قايىلىدىغان يېرىگە جايلاشقان بولىدۇ.

4. كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلېكس رايونىنىڭ سەل ئۈستى تەرىپى — دەل ئۇچلۇك نېرۋا رېفلېكس رايونىدىن ئىبارەت. ئۇۋۇلغان چاغدا، ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلساقلا بولىدۇ. سېپىرىپ ئۇۋۇلاش جەريانىدا، ئەگەر ئۇۋۇلغۇچى رېفلېكس رايونىدا ئولتۇرۇشۇپ كەتكەن ئەھۋالنى ياكى مۇسبەتلىك ئۆزگىرىشنى سىيلاپ بايقىسا، بۇ ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ ئۇچلۇك نېرۋا ئاغرىقىغا گىرىپتار بولغانلىقىنى ھەم ئۇنىڭدا يەنە كۆز قۇرغاقلىق شىش، قاش قىرى سۆڭىكى ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ بارلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

3. ئەھۋالغا قاراپ، ئوخشاش يۆنىلىش بويىچە پۇت باش بارماق يۇمىشىقنىڭ سىرتقى يان تەرىپىدىكى كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلېكس رايونىنى سېپىرىپ ئۇۋۇلساق، بۇ ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسەلنى تەڭشەپ داۋالايدۇ ھەم بۇ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالىدۇ. ئەگەر باش بارماقنىڭ سىرتقى يان تەرىپىدىكى كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلېكس رايونىدا لوكسىمان ئۆزگىرىش بايقالسا، بۇ دەل دېۋەڭلىك كېسەلنىڭ ئالامىتىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، كىچىك مېڭىنىڭ يىگىلىگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

5. ئىككى قولىنىڭ ھالىتىنى ئالماشتۇرۇپ، بىر قولىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن پۇت باش بارمىقىنىڭ ئېگىلىگەن يېرىنى داۋاد-لىق بويلاپ، تىرىناق يىلتىزى قىسمىدىكى بۇرۇن رېفلىكس رايونىنى سېپىرىپ ئۇلايمىز. بۇرۇن كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا سول تەرەپتىكى كېسەلنى ئوڭ تەرەپتىن داۋالاش پىرىنسىپى بويىچە تەڭ-شەش ئېلىپ بېرىلىدۇ.



ئەسكەرتىمە

كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا، ئۇۋۇلاش كۈچىنى كونترول قىلىشقا دىققەت قىلىش لازىم. ئەگەر ئۇۋۇلغۇچى بەكرەك كۈچەپ ئۇۋۇلسا، قان سۇيۇقلۇقى مېڭىنى غىدىقلاپ، ئاسانلا مېڭە قىل قان تومۇرلىرىنىڭ يېرىملىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ھەتتا تومۇرلار توسۇلۇپ قېلىپ، قان نۆكچىسىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن.



6. رەسىمدە كۆرسىتىلگەن يۆنىلىش بىلەن بىر نەرسەنى ئاستىغا قارىتىپ، چوڭ مېڭە رېڭلىق رايونىنى قىزىتىپ ئۇۋىلايمىز. قىزىتىپ ئۇۋىلانغاندا، غەيرىي ئەھۋالنىڭ بارلىقى بايقالماي، ئۇۋىلاش كۈچىنى تەدرىجىي ئاشۇرىمىز. ھەمدە ئۇۋىلاش قېتىم سانىنى كۆپەيتىمىز.

7. كۆرسەتكۈچ بارماق ۋە ئوتتۇرا بارماق ئارقىلىق پۇتنىڭ باش بارماقىنىڭ تۈۋى قىسمىنى قىسىپ تۇرۇپ، بۇ ئىككى بارماقنى ئايلاندۇرىمىز، باش بارماقنى بېسىپ ئۇۋىلايمىز. ھەم تارتىمىز.



8. قولىمىزنىڭ ئىككى بارماقى ئارقىلىق پۇتنىڭ باش بارماقىنىڭ ئىچى تەرىپىدىكى بويۇن رېڭلىق رايونىنى ئايلاندۇرىمىز، بىر نەرسەنى ئۇۋىلايمىز ھەم سوزۇپ تارتىمىز.



رېفلىكس رايونىنىڭ جايلىشىش ئورنىنى كۆرسىتىش رەسىمى



9. ئاندىن يەنە ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئىككىنچى، ئۈچىنچى بارماقنىڭ تۈۋى قىسمىدىكى كۆز رېفلىكس رايونىنى داۋاملىق ئۇۋۇلايمىز. دىققەت: كۆز قىسمىدا قاناش كېسەللىك ئالامەتلىرى بار بولسا، بۇ رايوننى ئۇۋۇلاشقا ھەرگىز بولمايدۇ.

چوڭ مېڭە رېفلىكس رايونى
⑥ پۇتنىڭ باش بارماق يۇمشىقىدە -
دىكى ھىپوفىز رېفلىكس رايونى -
نىڭ ئەتراپىدا بولۇپ، باش بارما -
قى تۈۋىدىكى بويۇن رېفلىكس را -
يونى ⑦ دىن ئىبارەت، ئىككىنچى -
چى، ئۈچىنچى بارماقنىڭ يىلتىز
قىسمىغا كۆز رېفلىكس رايونى
⑧ جايلاشقان، تۆتىنچى، بەشىنچى
بارماقنىڭ تۈۋىگە قۇلاق رېفلىكس
رايونى ⑨ جايلاشقان.



10. كۆز رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىغا ئوخشاشلا، ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ تۆتىنچى، بەشىنچى بارماقنىڭ تۈۋىدىكى قۇلاق رېفلىكس رايونىنى سىپىرىپ ئۇۋۇلايمىز، قۇلاق كېسەل -
لىكلىرىنى داۋالاشتا ئوخشاشلا سول تەرەپتىكى كېسەلنى ئوڭ
تەرەپتىن داۋالاش پىرىنسىپى بويىچە تەڭشەش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

ئەسكەرتىمە

1. چوڭ مېڭە رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىش شۇكى، ئىككى پۇتنىڭ باش بارماق -
قىنىڭ تۈۋىدىكى ئىككىنچى توغرا سىزىقنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىدىكى تىك يۆنىلىشلىك كېسىشمە جاي پۇت ئاستى قان
بېسىمىنى چۈشۈرۈش سىزىقى دېيىلىدۇ. مۇشۇ ئورۇننى بېسىپ ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، قان بېسىمىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەت -
كىلى بولىدۇ، ئەمما تۆۋەن قان بېسىمى بىمارلىرىغا بۇ جايىنى ئۇۋۇلاش ماس كەلمەيدۇ.
2. قۇلاق رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، تۆتىنچى، بەشىنچى بارماقنىڭ بارماق پەردىسىنىڭ ھالىتىنى كۆزىتىش
ئارقىلىق ساغلاملىق ئەھۋالىغا ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ. ئادەتتە بارماق پەردىسى ناھايىتى نېپىز بولسا، بۇ قۇلاقنىڭ
ئاڭلاش ئىقتىدارىنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ؛ ئەگەر بارماق پەردىسى بىرقەدەر قېلىن بولسا، بۇ قۇلاق
غوغۇلداش، قۇلاق ئاڭلىماسلىق قاتارلىق ئاڭلاش ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش كېسەللىكلىرىدىن دېرەك بېرىدۇ.
- ۋاھالەنكى، قېرىلاردىكى گاسلىق ئادەتتە كۆپ يىللىق بۆرەك ئاجىزلىقى سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدىغان بولغاچقا،
ئاڭلاش ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە، ئەڭ ياخشىسى ئىشنى ئاۋۋال بۆرەك قۇۋۋەتلىشىنى باشلاش كېرەك.

سول تاپان ئالدى يېرىم قىسمىنىڭ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلاش

قالقانبەز، قالقان يان بېزى، قىيپاش چاسا مۇسكۇل، يۈرەك، ئۆپكە، كانايچە رېفېلىكىس رايونلىرىنىڭ ھەممىسى سول تاپاننىڭ ئالدى يېرىم قىسمىغا جايلاش-قان بولۇپ، بۇ بىرقانچە رېفېلىكىس رايونلىرىنى تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلىغاندا، نەپەس سىستېمىسىنىڭ راۋانلىقىنى ساقلىغىلى، يەنە چوڭ ئۆچەينىڭ كېرەك-سىز ماددىلارنى چىقىرىش رولىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ. ساقلىقنى ساقلاش ئۈنۈمى جەھەتتىن ئېيتقاندا، بۇ رايونلارنى ئۇۋۇلىغاندا، ئىچكى ئاجراتمىلارنى تەڭشەپ، بەدەننىڭ ئىچكى قىسمىدىكى كالتىسى ۋە فوسفورنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

يۈرەك رېفېلىكىس رايونىدىن باشقا، ئوڭ - سول پۇتنىڭ ئالدى يېرىم قىسمىغا ماس كېلىدىغان رېفېلىكىس رايونلىرى تامامەن ئوخشاش بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۈنۈمى

قالقان يان بېزى: بۇ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، بەدەندىكى كالتىسى بىلەن فوسفورنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى تەڭشەپ، قالقان يان بېزىنىڭ ئىقتىدارى چېكىنىش سەۋەبىدىن كېلىپچىققان مۇسكۇل ۋە سۆڭەك ئاغرىش، سۆڭەك شالاڭلىشىش كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ. بۇ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلساق، تۇتاقلىق كېسىلى قوزغالغان چاغدا جىددىي قۇتقۇزۇش رولىنى ئوينايدۇ.

قالقانبەز: بۇ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئىچكى ئاجراتمىلار قالايمىقانلىشىش سەۋەبىدىن كېلىپچىققان سېمىزلىك، باش ئاغرىقى، باش قېيىش، يۈرەك ئېغىش، ئۇخلىماسلىق، خامۇشلىق، رو-ھىي كەيپىياتى تۆۋەنلەش، قالقانبەز ئىقتىدارى كۈچىيىپ كېتىش، قالقانبەز ئىقتىدارى تۆۋەنلەش، كىلىماكتېرىيە دەۋرىدىكى ئۈنۈپەر سال كېسەللىك قاتارلىقلارنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ ۋە تەڭشەپ داۋالايدۇ.

قىيپاش چاسا مۇسكۇل: قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېفېلىكىس رايونىنى غىدىقلىغاندا، بويۇن، مۇرە قىسمى تېلىپ ئاغرىش، مۇرە ئەتراپى ياللۇغى، بويۇنغا يەل تۇرۇپ قېلىش، يۇقىرىقى مۇچە كۈچسىزلىنىش ۋە پالەچلىنىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئۈنۈم بىرىدۇ.

ئۆپكە ۋە كانايچە: بۇ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا ئۆپكە ياللۇغى، كانايچە ياللۇغى قاتارلىق نەپەس يولى كېسەللىكلىرىنى ئۈنۈملۈك تەڭشەپ داۋالايدۇ. بۇ رايوننى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، يۆتەل، دېمى سىقىلىش، ئۆپكە ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

يۈرەك: يۈرەك رېفېلىكىس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلاپ بەرگەندە، سىنوسىسمان يۈرەك رىتىمى سىزلىقى، يۈرەككە قان يېتىشمەسلىك، يۈرەك قوزغىلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.



1. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ بارمى - قىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىزنىڭ باش بارماق ئۇچىنى قالقان يان بېزى رېف - لېكس رايونىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ بې - سىپ ئۇۋۇلاپ غە - دىقلايمىز.



2. رەسىمدە كۆرسىتىلگەن يۆنىلىش بويىچە قالقانبەز رېف - لېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلاي - مىز. ئۇۋۇلاش جەريانىدا، ئەگەر ئۇۋۇلىغۇچى قاتتىق ھۈررەك قا - تارلىق مۇسبەتلىك ئۆزگىرىشنى بايقىسا، ئۇۋۇلاشنى ئاشۇ قاتتىق ھۈررەكنى ئۇۋۇلاپ يۇمشاتقانغا قەدەر داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. ئەگەر رېفلىكس رايونىنىڭ يۇقە - رى تەرىپىدىكى ئۈچتىن بىر قىسىم ئارىلىقتا قاتتىق ماددا بايقالسا، بۇ نورمال ھادىسىگە تە - ۋە بولىدۇ.



3. قولنى قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېفلىكس رايونىغا يۆتكەپ، ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇمىيۈز - لۈك ئۇۋۇلايمىز.



4. قولىمىزدىكى تاش يىغىنىنى سەل تۆۋەن تەرەپتىكى ئۆپكە رېفلىكس رايونىغا يۆتكەپ، ئىچىدىن سىرتىغا قارىتا تەكشى سېپىرىپ ئۇ-ۋۇلايمىز. ئەگەر ئۇۋۇلىغۇچى ئۇۋۇلاش جەريانىدا تېرە ئاستىدا سىزىقچىلارنى ياكى باشقا مۇسبەتلىك ئۆزگىرىشلەرنى بايقىسا، بۇ ئۇ-ۋۇلانغۇچىنىڭ ئۆپكە كېسەللىكلىرىگە گەرىپتار بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.



6. ئەڭ ئاخىرىدا، بىر قول بىلەن پۇتنى مۇقىملاپ تۇتۇپ، يەنە بىر قول-مىزدىكى تاش يىغىنە ئارقىلىق ئاستىدىن ئۈستىگە قارىتا يۈرەك رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز، ئۇۋۇلىغاندا دەسلەپتە يېنىك كۈچ بېرىپ، ئاندىن ئاستا-ئاستا كۈچنى ئاشۇرۇش لازىم.

5. قولنىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرۇپ، ئىككى قولنىڭ باش بارمىقىنى ئۈستى تەرەپكە قارىتىپ، كانايچە رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلايمىز. كانايچە ۋە زىققە كېسىلى بىمارلىرىنى ئۇۋۇلاپ داۋالىغاندا، قىرغۇچى تاختا (ئۇۋۇلاش قورالى) ئارقىلىق كانايچە رېفلىكس رايونىنى تەكرار ئۇۋۇلايمىز.

رېڧلېكس رايونىنىڭ جايلىشىش ئورنىنى كۆرسىتىش رەسىمى



قالقان يان بېزى رېڧلېكس رايونى ① پۇت -
نىڭ ئىچكى تەرىپىدىكى باش بارماق بىلەن تاپان
سۆڭىكى تۇتاشقان بوغۇمنىڭ ئۈستىدە بولۇپ،
بۇ باش بارماق بىلەن ئىككىنچى بارماق ئارىسىدە -
نىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى قالقانبەز رېڧلېكس را -
يونى ② بىلەن بىر - بىرىگە قارشىپ تۇرىدۇ.
قالقانبەز رېڧلېكس رايونىغا يېقىن تۇرىدىغىنى
بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى، تۆتىنچى بار -
ماقنىڭ بارماق ئارىلىقىدىن تۆۋەنگە بىر سانتىم -
مېتىر كېلىدىغان ئورۇنغا جايلاشقان قىيپاش
چاسا مۇسكۇل رېڧلېكس رايونى ③ دىن ئىبار -
رەت، ئۇ ئۆپكە رېڧلېكس رايونى ④ تەرىپىدىن
قورشىلىپ تۇرىدۇ، ئۆپكە رېڧلېكس رايونىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىنىڭ ئۈستى تە -
رىپىگە، يەنى ئوتتۇرا بارماقنىڭ ئىككىنچى بوغۇمىغا كانايچە رېڧلېكس رايونى
⑤ ئورۇنلاشقان. يۈرەك رېڧلېكس رايونى ⑥ سول پۇت تاپىنىنىڭ تۆتىنچى،
بەشىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئارىسىدا بولۇپ، ئۆپكە ۋە كانايچە رېڧلېكس رايونى -
نىڭ ئاستى تەرىپىگە يېقىن ئورۇنلاشقان.

ئەسكەرتىمە

يۈرەك رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا، ئەگەر ئۇۋۇلغۇچى ئۇۋۇلاش جەريانىدا تېرە ئاستىدا قاتتىق ھۈررەكلەرنىڭ بارلىقىنى بايقىسا، بۇ ئۇۋۇلانغۇچىدە -
نىڭ يۈرەك ئىقتىدارىدا مەسىلە بولۇشى مۇمكىنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ؛ ئەگەر
بىرقەدەر قاتتىق مۇسبەتلىك ئۆزگىرىش بايقالسا، بۇ ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ ئورگان
خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇش مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

سول تاپان كەينى يېرىم قىسمىنىڭ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلاش

سول پۇت تاپىنىنىڭ كەينى يېرىم قىسمىدىكى رېفېلىكىس رايونى تال، ئاش-قازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي (توغرا بوغماق ئۈچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، S سىمان بوغماق ئۈچەي، تۈز ئۈچەي، مەقەت) قاتارلىق ھەزىم قىلىش سىستېمىسى ۋە كۆپىيىش سىستېمىسىغا ماس كېلىدىغان بولۇپ، ئۇۋۇلاشتا تال، ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، كۆپىيىش سىستېمىسى قاتارلىق رېفېلىكىس رايونلىرى ئايرىم - ئايرىم ھالدا تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلىنىدۇ. بۇ رايونلارنى ئۇۋۇلىغاندا، ئاشقازان ئاغرىقى، قورساق كۆپۈش، ئۈچەي يال-لۇغى قاتارلىق ھەزىم قىلىش كېسەللىكلىرىنى ناھايىتى ياخشى تەڭشەپ داۋالاپ، بەدەننىڭ ھەزىم قىلىش ۋە ئوزۇقلۇق قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆز-لۈكىسىز كۈچەيتىدۇ، يەنە تۈرلۈك كۆپىيىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى كەل-تۈرۈپ چىقارغان ساقسىزلىقنى ياخشىلايدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇنۇمى

تالنىڭ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، قان ئازلىق، مۇسكۇل كۈچىمىزلىنىش قاتارلىق كېسەللىكلەر كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىدۇ، يەنە پۈتۈن بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ.

ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي: بۇ رېفېلىكىس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئاشقازان ئاغرىش، ئاشقازان كۆپۈش، ئاشقازان ئېچىش قاتارلىق ئاشقازان كېسەللىكىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتىدۇ؛ دىيابېت، ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما ئۇيقۇلۇق ياللۇغى، ئۇيقۇلۇق ئۆسمىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش، سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان يارىسى، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالايدۇ. ئاشقازاننى تۆۋەنلەپ كەتكەن بىمارلار ئۆزىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئاستىدىن ئۈستىگە ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللانسا، شۇنداقلا تاماقنى يەپ بولۇپ، يېرىم سائەت تۈز ياتقاندىن كېيىن ئاندىن ئۇۋۇلاشنى باشلىسا بولىدۇ.

ئىنچىكە ئۈچەي: بۇ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئىنچىكە ئۈچەي كۆپۈش، ھېق تۇتۇش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئۈنۈم بېرىدۇ، يەنە سوزۇلما ئۈچەي ياللۇغى، ئوزۇقلىنىش ناچارلىشىش سەۋەبىدىن كېلىپچىققان كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاش رولى بار.

چوڭ ئۈچەي: بۇ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، قورساق ئاغرىقى، ئىچ سۈرۈش، قورساق كۆپۈش، قەۋزىيەت، ئۈچەي ياللۇغى، شۇنىڭدەك بوۋاسىر، سوغى چىقىپ قېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى مەلۇم دەرىجىدە تەڭشەپ داۋالايدۇ.

كۆپىيىش رايونى: بۇ رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئەر - ئاياللاردىكى جىنسىي ئىقتىدار تۈزىتىش، سالىنىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرىنى پەسەيتىش ۋە داۋالاش ئۇنۇمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. ياش - ئۆسمۈرلۈك مەزگىلىدە كۆپىيىش بەزىلىرىنى ئۇۋۇلاپ غەدىقلىغاندا ھەمدە ھىپوفىز رېفېلىكىس رايونىنى ئۇۋۇلاشنى ماسلاشتۇرغاندا، ئۆستورگۇچى ھورمۇنلارنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئۈنۈم-لۈك تېزلىتىپ، سۆڭەكنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.



3. ئىنچىكە ئۈچەي رېف-
لېكىس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇ-
لىغاندا، قولنىڭ تۆت بارمىقى-
نىڭ بارماق بوغۇمى ئارقىلىق،
يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قاراپ بې-
سىپ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قول-
لىنىپ مەشغۇلات قىلىشنى
تەۋسىيە قىلىمىز. بۇنىڭدا ئۇ-
ۋۇلاش قوراللىرىدىن پايدىلىد-
ىنىپ ئۇۋۇلىغانغا قارىغاندا تې-
خىمۇ ياخشى ئۈنۈم ھاسىل
قىلغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلىغاندا
تەكشى كۈچ بېرىشكە دىققەت
قىلىش كېرەك.

2. ئىككى قولنىڭ ئورنىنى
ئالماشتۇرۇپ، تاش يىغىنە بىلەن
يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قارىتا ئاشقا-
زان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق
ئۈچەي قاتارلىق بۇ ئۈچ رېفلىكس
رايونلىرىنى تەرتىپ بويىچە قىرىپ
ئۇۋۇلايمىز. ئاشقازىنى تۆۋەنلەپ
كەتكەن بىمارلار تۆۋەندىن يۇقىرىغا
قارىتا ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللىد-
ىشى لازىم، يەنە بېسىپ ئۇۋۇلاش
ئۇسۇلى ئارقىلىق تەڭشەپ داۋالاش
ئېلىپ بارىمۇ بولىدۇ.

1. بىر قولىمىز بىلەن
پۇتنىڭ ئالدىقىنى تىرەپ
تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قو-
لىمىزدا تاش يىغىنەنى يەڭ-
گىل تۇتۇپ، تال رېفلىكس
رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلاي-
مىز.

4. تەرتىپ بويىچە توغرا بوغماق ئۈچەي رېفلىكس
رايونى، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونى،
S سىمان بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايون-
لىرىنى ئىتتىرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئەڭ ئاخىرىدا مەقۇت
رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.



5. ئۇۋۇلاش ئاخىرلاشقاندا، كۆپىيىش بەزىلىرى رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلساق، بۇنىڭ تۈرلۈك كۆپىيىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى ۋە ئىقتىدار توسالغۇ كېسەللىكلىرىنى تۈگىتىشكە ياردەمى بولىدۇ.

رېفلېكس رايونىنىڭ جايلىشىش ئورنىنى كۆرسىتىش رەسىمى



تال رېفلېكس رايونى ① سول پۇت تۆتىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدا بولۇپ، بۇنىڭ ئاستى تەرىپىدە ھالقىسىمان شەكىلدىكى چوڭ ئۇچەي رېفلېكس رايونى ⑤ (بۇ توغرا بوغماق ئۇچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۇچەي، S سىمان بوغماق ئۇچەي، تۈز ئۇچەي، مەقۇت رېفلېكس رايونى-لىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) بار، ئاشقازان ② ئۇيقۇلۇق ③، ئون ئىككى بارماق ئۇچەي ④ قاتارلىق بۇ ئۈچ رېفلېكس رايونى چوڭ ئۇچەي رېفلېكس رايونىنىڭ ئۈستى يان تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، بۇلار ئۈستىدىن ئاستىغا تەرتىپ بويىچە ئۆز ئارا تۇتىشىپ تۇرىدۇ، ئىنچىكە ئۇچەي رېفلېكس رايونى ⑥ چوڭ ئۇچەي رېفلېكس رايونى تەرىپىدىن قورشىلىپ تۇرىدۇ، بۇ پۇت ئاستىدىكى بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى شىناسىمان سۆڭەك بىلەن ئاز بىر قىسىم كۈبىكىسىمان سۆڭەك ۋە ئۆكچە سۆڭەك ئارىسىدىكى ئويمان جايغا ئورۇنلاشقان. كۆپىيىش بەزىلىرى رېفلېكس رايونى پۇت ئۆكچىسىنىڭ دەل ئوتتۇرىسىغا جايلاشقان.

ئەسكەرتىمە

بەدنى ئاجىز كىشىلەر، ئاشقازىنى تۆۋەنلەپ كەتكەن بىمارلار ئاشقازان رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، تۆۋەندىن يۇقىرىغا قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىشى لازىم. ئۇۋۇلاش جەريانىدا، ئەگەر ئاشقازان رېفلېكس رايونىدا بىغىرەك كىچىك چېكىتلەر بايقالسا، بۇ ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ ئاشقازان كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

سول پۇت ئىچكى يان تەرىپىنىڭ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش

سول پۇتنىڭ ئىچكى يان تەرىپى بەدەننىڭ ئومۇرتقا، يانباش بوغۇمى ۋە قىسمەن كۆپىيىش بەزىلىرى رېفلىكس رايونلىرىغا ماس كېلىدۇ. ئۇۋۇلىغاندا ئومۇرتقا، ئىچكى تەرەپتىكى ئولتۇرغۇچ نېرۋىلار، بالىياتقۇ، مەزى بېزى، ئىچكى يانباش، تۈز ئۈچەي، مەقئەت، چات رېفلىكس رايونلىرىنى تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلاش لازىم. بويۇن ئومۇرتقىسى كېسىلى، بەل ئومۇرتقىسى ئاغرىش، مەزى بېزى ياللۇغى، بالىياتقۇ ياللۇغى قاتارلىق كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكلەرگە مۇمىن رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق بىخ ھالىتىدە خاتىمە بەرگىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلىغان چاغدا، قول ئارقىلىق مەشغۇلات قىلىنسا، ئۇۋۇلاش قوراللىرى ئارقىلىق مەشغۇلات قىلغانغا قارىغاندا ئورۇننى تېخىمۇ توغرا تاپقىلى ۋە ئۇۋۇلاش كۈچىنى مۇۋاپىق تەڭشىگىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇنۇمى

ئومۇرتقا: ئومۇرتقا رېفلىكس رايونى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ئومۇرتقا كېسەللىكلىرى، باش قەيىش، قول ئۇيۇشۇش، بەل ئاغرىش، بەل ئومۇرتقا ئارىلىق تەخسىسى پۇلتىيىپ چىقىش، ئومۇرتقا نەپەس تارىيىش، توققۇز كۆز ئومۇرتقىسىدا ئۆزگىرىش بولۇش، توققۇز كۆز سۆڭىكى بىرلەشمە كېسەللىكى، توققۇز كۆز - قۇيرۇق سۆڭىكىنىڭ يۇمشاق توقۇلمىلىرى زەخمىلىنىش، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا ئۇنۇمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.

ئىچكى يان تەرىپتىكى ئولتۇرغۇچ نېرۋا: بۇ رېفلىكس رايونى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، پۇت ئۆكە چىسى ئاغرىش، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى كېسىلىنى ئۈنۈملۈك داۋالىغىلى بولىدۇ.

بالىياتقۇ، مەزى بېزى: بۇ رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىسا، مەزى بېزى چوڭىيىش، مەزى بېزى ياللۇغى، بالىياتقۇ ئۆسمىسى، بالىياتقۇ ئىچكى پەردە ياللۇغى ۋە باشقا ئەرلەر كېسەللىكى، ئاياللار كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋالاشتا ئۇنۇمى ياخشى بولىدۇ.

ئىچكى يانباش: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، يانباش بوغۇمى كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى، يانباش بوغۇمىنىڭ يۇمشاق توقۇلمىلىرى زەخمىلىنىش، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، مۇرە بوغۇمى كېسەللىكى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

تۈز ئۈچەي، مەقئەت: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، بوۋاسىر، مەقئەت يېرىلىش، قەۋزىيەت، تۈز ئۈچەي ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەر ياخشىلىنىدۇ.

چات: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ئەرلەر كۆپىيىش سىستېمىسىدىكى تۈزلۈك كېسەللىكلەر، جىنسىي ئىقتىدارى تۆۋەن بولۇش، ئاياللاردىكى ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش، ئۇغماسلىق، تۇخۇم چىقىرىش نورمال بولماسلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا ئۇنۇمى ئالاھىدە ياخشى بولىدۇ.



3. قولنىڭ ئورنىنى ئۆز-
گەرتىمەي، بىر قولنىڭ بارماق
بوغۇمى بىلەن ئوخشاش بىر يۆ-
نىلش بويىچە بالىياتقۇ، مەزى
بېزى رېفلېكس رايونىنى ئۆ-
ۋۇلايمىز.



2. ئومۇرتقا رېفلېكس رايونى-
نىڭ ئاخىرقى نۇقتىسىغىچە
ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن، تەر-
تىپ بويىچە ئۇنىڭ ئارقا تەرە-
پىگە جايلاشقان ئىچكى يان تەرە-
پىتىكى ئولتۇرغۇچ نېرۋا رېف-
لېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلاي-
مىز. ئۇۋۇلىغاندا، كۆرسەتكۈچ
بارماقنى سەل ئېگىپ، بارماق
بوغۇمى ئارقىلىق ئارقىدىن ئال-
دىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ.



1. بىر قول بىلەن
پۇت بارماقنى تۇتۇپ
تۇرۇپ، يەنە بىر قول بى-
لەن ئالدىدىن ئارقىغا قا-
راپ كۆكرەك ئومۇرتقىسى،
سى، بەل ئومۇرتقىسى،
قۇيرۇق سۆڭىكى، توققۇز
كۆز سۆڭىكىنى ئۆز ئى-
چىگە ئالغان ئومۇرتقا
رېفلېكس رايونىنى سېپ-
رىپ ئۇۋۇلايمىز.

4. ئىككى قولنىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرۇپ، باش
بارماق بىلەن ئالدىدىن ئارقىغا قارىتىپ يېرىم ئاي
شەكلىدە ئىچكى يانپاش بوغۇمى رېفلېكس رايونىنى
سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.






6. چات رېڧلېكس رايونىنى تېخىمۇ تولۇق ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئورۇننى بېسىپ ئۇۋۇلاشنى ئۇزۇن مۇددەت داۋاملاشتۇرغاندا، چات يانتۇ چۇقۇقى، تۈز چۇقۇقى ۋە ئاياللار كېسەللىكلىرىنىڭ يوشۇرۇن خەۋپلىرىنى تۈگەتكىلى بولىدۇ.

5. باش بارماقنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، تۈز ئۈچەي، مەقئەت رېڧلېكس رايونلىرىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قارىتا تەكشى ھالەتتە سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

ئومۇرتقا رېڧلېكس رايونى ① بويۇن، كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، توققۇز كۆز سۆڭىكى، قۇيرۇق سۆڭىكى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالدىغان بولۇپ، بۇ ئايرىم - ئايرىم ھالدا باش بارماق ئاستى تەرپىنىڭ سىرتقى تەرىپى، پۇتنىڭ ئىچى يان تەرىپىدىكى ئېگىلگەن جايدا بولىدۇ، پۇت ئۆكچىسىدىن پۇت ئاللىقىنىڭ ئىچكى تەرىپى گىرۋىكىگىچە بولغان جاي ئىچكى تەرىپى ئولتۇرغۇچ نېرۋا رېڧلېكس رايونى ②دىن ئىبارەت. ئومۇرتقا رېڧلېكس رايونى ۋە ئىچكى تەرىپى ئولتۇرغۇچ نېرۋا رېڧلېكس رايونىنىڭ ئارىلىقىدىكى ئۈچ بۆلۈڭلۈك رايونغا مەزى بېزى ۋە بالىياتقۇ رېڧلېكس رايونى ③ ئورۇنلاشقان. ئىچكى يانپاش بوغۇمى رېڧلېكس رايونى ④، تۈز ئۈچەي، مەقئەت رېڧلېكس رايونى ⑤، چات رېڧلېكس رايونى ⑥ ئوشۇقنىڭ ئەتراپىنى چۆرىدەپ ئورۇنلاشقان، ئۇنىڭ ئىچىدە، ئىچكى يانپاش بوغۇمى رېڧلېكس رايونى ئوشۇقنىڭ ئىچكى تەرىپىنىڭ ئاستى يۈزىگە جايلاشقان. تۈز ئۈچەي مەقئەت رېڧلېكس رايونى (پۇت قىسمى) ئوشۇق بوغۇمىنىڭ ئارقا تەرىپى ئۈستىگە جايلاشقان، چات رېڧلېكس رايونى ئىچكى ئوشۇقنىڭ ئۈچلىك ئۈستىگە، پاقالچاق سۆڭەك سىرتىدىن نېرىدىكى ئويماغا جايلاشقان.

رېڧلېكس رايونىنىڭ جايلىشىش ئورنىنى كۆرسىتىش رەسىمى



ئەسكەرتىمە

بالىياتقۇ، مەزى بېزى رېڧلېكس رايونى ئىككى ئۆكچىنىڭ ئىچكى تەرىپىگە جايلاشقان. ھەر كۈنى ئۇخلاشتىن بۇرۇن، ئىككى پۇتنى ئۆزئارا سۈركەش ھەرىكىتىنى داۋاملاشتۇرغاندا، بۇ بالىياتقۇ، مەزى بېزىگە قارىتا ساقلىق ساقلاش رولىنى ئوينايدۇ.

سول پۇت تاشقى يان تەرىپىنىڭ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش

سول پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپى رېفلىكس رايونى بەدەندىكى نۇرغۇن بوغۇملار، تۆت مۇچە ۋە كۆپىيىش ئەزالىرىغا ماس كېلىدۇ. بۇ رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندا، تاشقى يان تەرىپى ئولتۇرغۇچ نېرۋا، كۆپىيىش بەزلىرى، تىز بوغۇمى، جەينەك بوغۇمى، مۈرە بوغۇمى، تاغاق سۆڭىكى، تاشقى يانپاش بوغۇمى، قورساق تۆۋەنكى قىسمى قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرى تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلىنىدۇ. دائىم پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپى رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، مۇناسىۋەتلىك بوغۇملارنىڭ ئاغرىقىنى پەسەيتىپلا قالماستىن، يەنە سۆڭەكنى چىڭىتىپ، بوغۇملارنى ئۈزۈكسىز كۈچلەندۈرىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇنۇمى

تاشقى تەرىپى ئولتۇرغۇچ نېرۋا: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقىنى پەسەيتىپ، قۇيرۇق سۆڭىكى زەخىملەنگەندىن كېيىنكى كېسەللىك ئاسارەتلىرىنى مەلۇم دەرىجىدە ئەسلىگە كەلتۈرۈش رولىنى ئوينايدۇ.

كۆپىيىش بەزلىرى: كۆپىيىش بەزلىرى ئەرلەردىكى ئۈرۈقدان، ئاياللاردىكى تۇخۇمداننى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ، بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ئەر - ئاياللاردىكى جىنسىي ئىقتىدار توسالغۇغا ئۇچراش، كۆپىيىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى، ئەزالارنىڭ يېتىلىشى توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ.

تىز بوغۇمى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، تىز بوغۇم كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ۋە تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

جەينەك بوغۇمى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، جەينەك بوغۇمى زەخىملىنىش، بىلەك سىر - قىراپ ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ.

مۈرە بوغۇمى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، مۈرە ئەتراپى ياللۇغى، مۈرە تېلىپ ئاغ - رىش، بىلەك كۈچسىزلىنىش، قول ئۇيۇشۇش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى پەسەيتىش رولى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.

تاغاق سۆڭىكى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، مۈرە ئەتراپى ياللۇغى، مۈرە تېلىپ ئاغرىش، قول ئۇيۇشۇش ۋە كۈچسىزلىنىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى ئۈنۈملۈك تەڭشەپ داۋالايدۇ.

تاشقى يانپاش بوغۇمى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، يانپاش بوغۇمى كېسەللىك ئۆزگىرىشى، يانپاش بوغۇمى يۇمشاق توقۇلمىلىرى زەخىملىنىش، يوتا سۆڭەك بېشى چىرىش، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغ - رىقى، مۈرە ئەتراپى كېسىلى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ.

تۆۋەنكى قورساق قىسمى: بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ھەيز تەرتىپسىز كېلىش، ئاغرىتىپ كېلىش ۋە باشقا تۆۋەنكى قورساق قىسمى كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.



3. قولىمىزغا تاش يىڭ-
نىنى ئېلىپ، تىز بوغۇمى
رېفلېكس رايونىنى كۈچەپ
قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېف-
لېكس رايونىنى ئومۇميۈزلۈك
غىدىقلىغاندا، تىنىپ قالغان
كېرەكسىزلەر (ئۇيۇپ قالغان
قان) نى چىقىرىپ تاشلاپ،
تىز بوغۇمىنىڭ ئىقتىدارىنى
كۈچەيتكىلى بولىدۇ.



2. قولنى كۆپىيىش بەز-
لىرى رېفلېكس رايونىغا يۆت-
كەپ، رەسىمدە كۆرسىتىلگەن
يۆنىلىش بويىچە كۈچەپ قى-
رىپ ئۇۋۇلايمىز.



1. بىر قولىمىز بى-
لەن پۇتنى چىڭ تۇتۇپ،
يەنە بىر قولنىڭ كۆر-
سەتكۈچ بارمىقىنىڭ بار-
ماق بوغۇمى بىلەن تاشقى
ئولتۇرغۇچ ئېرۋا رېف-
لېكس رايونىنى قىرىپ
ئۇۋۇلايمىز.



6. قولنىڭ ئورنىنى ئال-
ماشتۇرۇپ، ئىككى قولنىڭ
باش بارمىقى ئارقىلىق، رە-
سىمدە كۆرسىتىلگەن يۆند-
لىش بويىچە بىرلا ۋاقىتتا تا-
غاق سۆڭەك رېفلېكس رايونى-
نى تەكشى كۈچ بىلەن سېي-
رىپ ئۇۋۇلايمىز.



5. كۆرسەتكۈچ بارماقنى
مۇرە بوغۇمى رېفلېكس رايونى-
غا يۆتكەپ، بۇ جايىنى بارماق
بوغۇمى بىلەن بېسىپ ئۇ-
ۋۇلايمىز.



4. كۆرسەتكۈچ بار-
ماق ۋە ئوتتۇرا بارماق
ئارقىلىق جەينەك بوغۇمى
رېفلېكس رايونىنى قىرىپ
ئۇۋۇلايمىز.



رېفلېكس رايونىنىڭ جايلىشىش ئورنىنى كۆرسىتىش رەسىمى



7. پۇتنىڭ ئالدى يان تەرىپىنى
چىڭ تۇتۇپ سەل ئىچىگە مايىل قە-
لىپ، قولىنىڭ باش بارمىقى بىلەن
ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ، پۇتنىڭ
ئوشۇق سۆڭىكىنىڭ سىرتىنى
ساق قىسمى رېفلېكس
بويلاپ، تاشقى يانپاش بوغۇمى رېف-
لېكس رايونىنى يېنىك سېيرىپ ئۇ-
ۋىلايمىز. بىلەن سېيرىپ ئۇ-
ۋىلايمىز.

تاشقى تەرەپ ئولتۇرغۇچ نېرۋا رېفلېكس رايونى ① پۇتنىڭ ئاستى تەرىپى بىلەن
ئۆكچە پەينىڭ ئالدى تەرەپتىكى ئۇچبۇلۇڭلۇق رايونغا جايلاشقان كۆپىيىش بېزى رېف-
لېكس رايونى ② نى قورشاپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستى تەرىپى بولسا ئۆكچە سۆڭىكىنىڭ
ئالدى گىرۋىكىگە جايلاشقان تىز بوغۇمى رېفلېكس رايونى ③ دىن ئىبارەت. جەينەك بو-
غۇمى رېفلېكس رايونى ④، مۇرە بوغۇمى رېفلېكس رايونى ⑤ ئايرىم - ئايرىم ھالدا تۆ-
تىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭەك بىلەن كۈبىكسىمان سۆڭەك ئارىسىدىكى تاغاق سۆڭەك
رېفلېكس رايونى ⑥ نىڭ ئاستى يان تەرىپىگە جايلاشقان، ئۇنىڭ ئىچىدە جەينەك بوغۇمى
رېفلېكس رايونى پۇتنىڭ تاشقى يان تەرىپىدىكى بەشىنچى تاپان سۆڭىكى دۈمباق يۈزىنىڭ
ئالدى - كەينى ئىككى يېنىغا جايلاشقان، مۇرە بوغۇمى رېفلېكس رايونى پۇتنىڭ تاشقى يان تە-
رىپىدىكى بەشىنچى تاپان - بارماق سۆڭەك بوغۇمى ئورنىنىڭ ئويما يېرىگە جايلاشقان.
تاشقى يانپاش بوغۇمى رېفلېكس رايونى ⑦ بىلەن تۆۋەنكى قورساق رېفلېكس رايونى ⑧
ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئوشۇق بوغۇمىنىڭ تۆۋەن تەرىپى ۋە ئارقا تەرەپ ئۈستىگە جايلاشقان.

ئەسكەرتىپە

نوقۇل بوغۇم ياللۇغىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشتا، مەسىلەن: تىز بوغۇمى ياللۇغىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشتا،
ئاساسىي رېفلېكس رايونىنى غىدىقلىماي، بىۋاسىتە كېسەللىك رېفلېكس رايونىنىلا ئۇۋۇلاپ تەڭشە-
بولىدۇ (تەپسىلىي ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى 124 - بەتتىن كۆرۈڭ).

سول پۇت دۈمبىسىنىڭ رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلاش

سول پۇت دۈمبىسىگە ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى ئېگەك، بادامبەز، كاناي، قىزىل-ئۆڭگەچ، يۇتقۇنچاق، بوغۇز، كۆكرەك لىمفاسى، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى، كۆك-رەك، ئەمچەك قاتارلىق 11 رېفلىكسى رايونى جايلاشقان. مەزكۇر رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى ئېگەك، بادامبەز، كاناي، قىزىلئۆڭگەچ، يۈت-قۇنچاق، كۆكرەك لىمفاسى، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى، كۆكرەك قىسمى، ئەم-چەك، دىياگرامما، قوۋۇرغا، ئۈستۈنكى، ئاستىنقى بەدەن لىمفاسى قاتارلىق رېف-لىكسى رايونلىرى تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلىنىدۇ. مۇناسىپ رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇ-لىغاندا بەدەندىكى ھەرقايسى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇنۇمى

ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى ئېگەك: بۇ رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئېغىز بوشلۇقى يارىسى، چىش ئاغرى-قى، چىش ئەتراپى ئاغرىش، شالۋاق ئېقىش، خورەك تارتىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى پەسەيتكىلى بولىدۇ.

بادامبەز: بۇ رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، بادامبەز ياللۇغلىنىش، ئىششىش، يىرىڭلاش، بادامبەز چوڭىيىش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالدىنى ئالغىلى ۋە تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

كاناي، قىزىلئۆڭگەچ، يۇتقۇنچاق، بوغۇز، كۆكرەك لىمفا بېزى: بۇ رېفلىكسى رايونىنى ئۇزۇن مۇددەت ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، يۆتەل، دەم سىقىلىش (زىققە)، كاناي ياللۇغى، زۇكام، قىزىلئۆڭگەچ ياللۇغى، يۇتقۇنچاق ياللۇغى، ئۆتكۈر سۈت بېزى ياللۇغى، سۈت بېزى ئۆسۈپ قېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى ئۈنۈملۈك تەڭ-شەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى: بۇ رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، باش قېيىش، ماشىنىدا باش قېيىش، يۇقىرى قان بېسىمى، تۆۋەن قان بېسىمى، مىنىل ئۇنىۋېرسال كېسىلى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى ئۈنۈملۈك داۋالىغىلى بولىدۇ.

كۆكرەك قىسمى، ئەمچەك: بۇ رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، كۆكرەك ئاغرىقى، مەيدىسى چىڭ-قىلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى ۋە داۋالىغىلى، سۈت بېزى ياللۇغى، سۈت بې-زى ئۆسۈپ قېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ.

دىياگرامما: بۇ رېفلىكسى رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسە، خورەك تارتىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، مەيدى-سى چىڭقىلىش، قورساق ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك ياخشى بولىدۇ.

قوۋۇرغا: بۇ رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، مەيدە چىڭقىلىش، سانجىق تۇرۇپ قېلىش، كۆكرەك پەر-دىسى ياللۇغى، قوۋۇرغا كۆمۈرچىكى ياللۇغى، قوۋۇرغا ئارىلىق نېرۋا ئاغرىقى، مۇرە - دۈمبە تېلىپ ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى پەسەيتكىلى بولىدۇ.

ئۈستۈنكى، ئاستىنقى بەدەن لىمفا بېزى: بۇ رېفلىكسى رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، تۆۋەنكى قورساق قىسمى-دىكى تۈرلۈك ياللۇغلىنىش، قىزىتما، خالتىلىق ئىششىق، ئۆسمە، ھەرە كۆنىكىسىمان توقۇلما ياللۇغى، ئىممۇنىتەت كۈچى تۆۋەنلەش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى مەلۇم دەرىجىدە تەڭشەپ داۋالاش رولىنى ئوينايدۇ.

1. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئالدىنى تۇتۇپ،
يەنە بىر قولىمىزنىڭ باش بارماق يۇمشىقى بىلەن ئى-
چىدىن سىرتىغا قاراپ، ئۈستۈنكى، ئاستىنقى ئېغەك
رېڧلېكس رايونىنى تەرتىپ بويىچە تەكشى كۈچ بىلەن
سېيرىپ ئۇۋۇلساق، ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرى-
نىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.



3. قولىمىزنىڭ بى-
غىشىنى ئايلاندۇرۇپ پۇت-
نىڭ ئالدىنى چىڭ تۇ-
تۇپ، كاناي، قىزىلئوڭ-
گەچ، يۇتقۇنچاق، كۆكرەك
لىمفا بېزى رېڧلېكس را-
يونلىرىنى سېيرىپ ئۇ-
ۋۇلايمىز.

2. ئىككى قول-
مىزنىڭ كۆرسەتكۈچ
بارمىقى بىلەن پۇتنىڭ
باش بارمىقىنىڭ تۈۋد-
ىدىكى بادامبەز رېڧلېكس
رايونىنى بىرلا ۋاقىتتا
بېسىپ ئۇۋۇلايمىز،




5. ئىككى قول-
مىزنىڭ باش بارمى-
قىنى پۇتنىڭ بارمى-
قىدىن پۇت تاپىنىغا
قارىتا سۈرۈپ، كۆك-
رەك ۋە ئەمچەك رېڧ-
لېكس رايونىنى ئۇ-
مۇمىۈزلۈك سېيرىپ
ئۇۋۇلايمىز.

4. ئوخشاش ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى
بويىچە، داۋاملىق پۇتنىڭ ئالدىنى-
نى بويلاپ پۇتنىڭ بارمىقى تەرەپكە
سىلجىپ، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ
يولى رېڧلېكس رايونىنى سالماقلىق
بىلەن سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.



رېفلىپكس رايونىنىڭ جايلىشىش ئورنىنى كۆرسىتىش رەسىمى



6. ئىككى قولىمىز - نى تەرتىپ بويىچە دىياف- راگما رېفلىپكس رايونىغا يۆتكەپ، كۆرسەتكۈچ بار- ماقنى ئېگىپ، بارماق بوغۇمى بىلەن بىرلا ۋا- قىتتا ئىككى يان تەرەپنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.
7. قولىنىڭ ئورنى - نى ئۆزگەرتىپ، ئىككى قولىمىزنىڭ كۆرسە- كۈچ بارماق بوغۇمى بى- لەن، ئۈستۈنكى، ئاس- تىنقى بەدەن لىمفا رېف- لىپكس رايونىنى تەكشى- ۋى بىلەن قوۋۇرغا سۆ- ۋى ئىككى رېفلىپكس رايونى- نى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.
8. ئاخىرىدا، ئىككى قولىمىزنىڭ كۆرسە- كۈچ بارماق بوغۇمى بى- لەن، ئۈستۈنكى، ئاس- تىنقى بەدەن لىمفا رېف- لىپكس رايونىنى تەكشى- ۋى بىلەن قوۋۇرغا سۆ- ۋى ئىككى رېفلىپكس رايونى- نى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

ئۈستۈنكى، ئاستىنقى ئېڭەك رېفلىپكس رايونى ① ئىككى پۇت باش بارماق بوغۇمىنىڭ ئۈس- تىدە بولىدۇ، بادامبەز رېفلىپكس رايونى ② پۇت باش بارماقنىڭ تۆۋىدىكى بارماق مۇسكۇل پې- يىنىڭ ئىككى تەرىپىگە جايلاشقان. كاناي، قىزىلئۆڭگەچ، يۇتقۇنچاق، كۆكرەك لىمفا بېزى رېف- لىپكس رايونى ③ ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى رېفلىپكس رايونى ④ كۆكرەك - ئەمچەك رېفلىپكس رايونى ⑤ نى ئوراپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭ ئىچىدە كاناي، قىزىلئۆڭگەچ، يۇتقۇنچاق، كۆكرەك لىمفا بې- زى رېفلىپكس رايونى ئىككى پۇتنىڭ دۈمبە قىسمىدىكى بىرىنچى، ئىككىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ يېرىقىغا جايلاشقان ھەمدە بىرىنچى، ئىككىنچى بارماق سۆڭىكىنىڭ تۈۋىگىچە سوزۇلغان بولىدۇ، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى رېفلىپكس رايونى پۇتنىڭ دۈمبە قىسمىدىكى تۆتىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ يېرىقىغا جايلاشقان. دىيافراگما رېفلىپكس رايونى ⑥ پۇتنىڭ دۈمبىسىدىن توغرى- سىغا كېسىپ ئۆتىدۇ ھەمدە بىر كەڭ بەلباغ شەكلىدىكى رايوننى ھاسىل قىلىدۇ. بۇنىڭ يەنىمۇ ئۈستىدە قوۋۇرغا رېفلىپكس رايونى ⑦ بولۇپ، بۇ ئىككى پۇتنىڭ دۈمبىسىدىكى بىرىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ كىچىك بېشىنىڭ ئىچى تەرىپى بىلەن بەشىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ كىچىك بېشى- نىڭ سىرتىقى تەرىپىگە جايلاشقان. ئۈستۈنكى، ئاستىنقى بەدەن لىمفا بېزى رېفلىپكس رايونى ⑧ ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئىككى پۇتنىڭ ئۈستىدىكى تاشقى ئوشۇق سۆڭىكىنىڭ ئالدى تەرەپ ئاس- تىغا، ئىچكى ئوشۇق سۆڭىكىنىڭ ئالدى تەرەپ ئاستىدىكى ئويمان ئورۇنغا جايلاشقان بولىدۇ.

ئەسكەرتىمە

ئۈستۈنكى، ئاستىنقى بەدەن لىمفا بەزىلىرى چېگراسى: ئۈستۈنكى بەدەن لىمفا بېزى، يەنى ئۈستۈنكى قورساق قىسمى لىمفا بېزى كىندىكىنىڭ ئۈستى تەرىپى، كۆكرەك قىسمىنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى ئورۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؛ ئاستىنقى بەدەن لىمفا بېزى، يەنى تۆۋەنكى قورساق قىسمى لىمفا بېزى كىندىكىنىڭ ئاستىدىكى داس بوشلۇقى رايونلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئوڭ پۇت ئاستى كېيىنكى يېرىم قىسمىدىكى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش

ئىككى پۇتتىكى رېفلېكس رايونلىرىنىڭ ھەممىسىلا ئوڭ - سول پۇتلارغا سىممېترىك ھالدا جايلاشقان ئەمەس، مەسىلەن: جىگەر، ئۆت، سوقۇر ئۈچەي سازاڭسىمان ئۆسۈكچە، يانپاش - سوقۇر ئۈچەي كىلاپانى، چوڭ ئۈچەي رېفلېكس رايونىدىكى يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي ۋە قىسمەن توغرا بوغماق ئۈچەينىڭ قىسمەن رېفلېكس رايونلىرى پەقەت ئوڭ پۇتنىڭ ئاستى قىسمىغا جايلاشقان. ئوڭ پۇتنىڭ ئاستى تەرىپىنىڭ كېيىنكى يېرىم قىسمىدىكى رېفلېكس رايونلىرى ئوزۇقلۇقلارنى ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش، كېرەكسىزلەرنى چىقىرىش ۋە كۆپىيىش ئەزالىرىغا ماس كېلىدۇ. بۇ رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندا، جىگەر، ئۆت، ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، سوقۇر ئۈچەي، سازاڭسىمان ئۆسۈكچە، يانپاش - سوقۇر ئۈچەي كىلاپانى، يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي، توغرا بوغماق ئۈچەي ۋە كۆپىيىش بەزىلىرى رېفلېكس رايونى (سول پۇت ئاستى تەرىپىنىڭ كېيىنكى يېرىم قىسمىدىكى ئوخشاش بولغان رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىغا قارالسا، 51 - بەت) تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلىنىدۇ.


ئۇۋۇلاش ئۇنۋى

جىگەر ئۆت: دائىم جىگەر ۋە ئۆت رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، جىگەر ياللۇغى، سېرىقلىق چۈشۈش، جىگەر ئىستىسقاسى، جىگەر قېتىش، جىگەر يىرىڭلىق ئىششىقى قاتارلىق جىگەر كېسەللىكلىرىنى، شۇنىڭدەك ئۆت ياللۇغى، ئۆت تېشى، سېرىقلىق چۈشۈش ۋە باشقا ئۆت كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋالاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

سوقۇر ئۈچەي سازاڭسىمان ئۆسۈكچە: بۇ رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ بەرسە، سازاڭسىمان ئۆسۈكچە چە ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ۋە داۋالىغىلى بولىدۇ.

يانپاش - سوقۇر ئۈچەي كىلاپانى: بۇ رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، ئاشقازان ۋە ئۈچەينىڭ لۇمبۇلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قەۋزىيەت ۋە ئىچ سۈرۈش ئالامەتلىرىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ.

يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي - توغرا بوغماق ئۈچەي: بۇ رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ بەرسە، قەۋزىيەت، ئىچ سۈرۈش، قورساق ئاغرىش، ئۈچەي ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى ساقايتىپ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ياردەمى بولىدۇ.



1. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىزغا تاش يىڭىنى ئېلىپ، ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ جىگەر رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۇۋۇلاپ ئۆت رېفلېكس رايونىغا كەلگەندە، بېسىپ ئۇۋۇلاپ غىدىقلايمىز.



2. قولىڭ ئورنىنى ئۆزگەرتىمەي، تاش يىڭىنى پۇتنىڭ ئالدىقىندىكى ئۆكچە سۆڭىكى گىرۇۋىكىنىڭ سىرتقى قىسمىدىكى سوقۇر ئۈچەي سازاڭسىمان ئۆكچە رېفلېكس رايونىغا يۆتكەيمىز، بۇ ئورۇننى بېسىپ ئۇۋۇلاپ غىدىقلىساق، سازاڭسىمان ئۆكچە ياللىغى، تۆۋەنكى قورساق كۆپۈش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاپ، سوقۇر ئۈچەينىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

3. ئوخشاش ئۇسۇل ئارقىلىق يانپاش - سوقۇر ئۈچەي كىلاپانى رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلاپ غىدىقلايمىز.



4. ئاخىرىدا، يۇقىرىلىد.

غۇچى بوغماق ئۈچەي، توغرا
بوغماق ئۈچەي رېفلېكس را-
يونىنى تولۇق ئۇۋۇلاپ غە-
دىقلايمىز؛ سائەت ئىستىرىپ-
كېسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە،
ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ
يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي
رېفلېكس رايونىنى تەرتىپ
بويىچە سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز،
سولدىن ئوڭغا قاراپ توغرا
بوغماق ئۈچەي رېفلېكس را-
يونىنى سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.

رېفلېكس رايونىنىڭ جاي-
لىشىش ئورنىنى كۆرسەت-
مەش رەسىمى



جىگەر رېفلېكس رايونى ① ئوڭ پۇت تاپىنىڭ تۆتىنى-
چى، بەشىنچى تاپان سۆڭىكى ئارىسىغا جايلاشقان بولۇپ،
ئوڭ پۇت تاپىنىڭ ئۈچىنچى، تۆتىنچى تاپان سۆڭىكى
ئارىسىغا جايلاشقان ئۆت رېفلېكس رايونى ② بىلەن قوش-
نا كېلىدۇ.

پۇتنىڭ تاشقى گىرۋىكىنىڭ يان تەرىپىدىكى دائىرىسى بىرقەدەر چوڭ ئو-
رۇنغا جايلاشقان يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي رېفلېكس رايونى ③ يانپاش -
سوقۇر ئۈچەي كىلاپانى رېفلېكس رايونى ④ بىلەن سوقۇر ئۈچەي سازاڭسىمان
ئۆسۈكچە رېفلېكس رايونى ⑤ نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، شۇنداقلا ئۇ يەنە توغرا
بوغماق ئۈچەي رېفلېكس رايونى ⑥ بىلەن بىر - بىرىگە تۇتىشىپ تۇرىدۇ.

ئەسكەرتىمە

پۈتكۈل پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش تاماملانغاندىن كېيىن، چوقۇم رەتلەشكە ئەھمىيەت بېرىش كې-
رەك.

رەتلىگەن چاغدا، ئالدى بىلەن پاقالچاقنىڭ ئالدى - كەينى ۋە ئوڭ - سول تەرىپىنى بىر قېتىم
ئومۇميۈزلۈك مۇجۇپ، مۇسكۇللارنى بوشىتىش لازىم. ئاندىن باش بارماق ئارقىلىق پۇتنىڭ زۇسەنلى
پەللىسى، سەينىنچىياۋ پەللىسى، شۈنجۇڭ پەللىسى بېسىپ ئۇۋۇلىنىدۇ. ئوشۇقنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ،
پاقالچاقنى بوشلۇققا يېنىك سىلكىپ بەدەن بوشىتىلىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا، 300 — 500 مىللىمېتىرغىچە قايناق سۇ ئىچىپ، قان ئايلىنىشقا زۆرۈر بولغان
سۈنى تولۇقلاش كېرەك. پۇتنى ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن قاننىڭ ئايلىنىشى تېزلىشىدۇ، شۇڭا غۇۋۇلاپ
بولغاندىن كېيىنلا تاماكا چېكىشكە، يېمەكلىك يېيىشكە بولمايدۇ، بولمىسا نەپەس سىستېمىسى، ھەزىم
قىلىش سىستېمىسى يېڭىدىن زەخمىگە ئۇچرايدۇ.

ئەسكەرتىمە

پۇتنى ئۇۋۇلىغاندا،
 ۋاقتىنچە ئۇۋۇلىمايدىغان
 پۇتنى ئىسسىق لۆڭگە بىلەن
 ئوراپ قويسا بولىدۇ، بۇنداق
 قىلغاندا پۇت ئىسسىق تۇ-
 رىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە
 پۇت قىسمىنىڭ قان ئاي-
 لىنىشىنى ئىلگىرى سۈ-
 رۇپ، تومۇزلارنىڭ قېتىۋې-
 لىشىنى تۈگىتىپ، پۇتنى
 ئەرەك - ئازادە ھالەتكە
 كەلتۈرىدۇ. پۇتنى ئورنىغاندا
 پاكىز بولغان ھەم ئۆزى
 خاس ئىشلىتىدىغان لۆڭگە-
 نى ئىشلەتسە ياخشىراق بو-
 لىدۇ، گەرچە بىر ئۆيدىكى-
 لەر ئىشلىتىدىغان لۆڭگە
 بولسىمۇ، ئەڭ ياخشى
 لۆڭگىنى ئورتاق ئىشلەت-
 مەسلىك كېرەك. پۇتنى
 كونكرېت ئوراش ئۇسۇلى
 جەھەتتە كۆپچىلىك تۆۋەن-
 دىكى كۆرسەتمە رەسىمىدىن
 پايدىلانسا بولىدۇ.





دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنى داۋالاش

مەن دائىم ئەتراپىمدىكى كىشىلەرگە: «بىرەر ئۆزگىرىش بولسۇن ياكى بولمىسۇن، ئۆزىدىكى بەزى ساقسىزلىق مەسىلىلىرىنى كۆپرەك ئىزدەپ بېقىش كېرەك» دەيمەن. بۇ دېگەنلىك، ھەممىمىز دائىم پۈتىمىزدىكى رېڭلېكىس را-يونلىرىنى بېسىپ، سېيرىپ ۋە قىرىپ ئۇۋۇلاپ بېرىشىمىز لازىملىقىنى، ئۇ-ۋۇلاش ئارقىلىق بەدەندىكى كېسەللىكنى ياخشىلاپ، ئۆزىمىزدە بەدىنىمىز بىلەن «سۆزلىشىدىغان» بىر خىل ئادەت يېتىلدۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ. بۇ خىل «مەسە-لىلەرنى ئىزدەش» ئۇسۇلى قارىماققا ھېچقانچە چوڭ ئىش ئەمەستەك بىلىنىدۇ، ئەمما بۇ سىزنىڭ ئىككىلەمچى ساغلاملىق ھالىتىدىن قۇتۇلۇپ، كېسەللىكنى بىخ ھالىتىدە يوقىتىشىڭىزغا ناھايىتى كۆپ ياردەم بېرەلەيدۇ.

دققەت:

1. مەيلى بېسىپ ئۇۋۇلاش، مۇجۇش ياكى سېيرىپ ئۇۋۇلاش بولسۇن، بۇلارنىڭ ھېچقايسىسىدا ئۇۋۇلاش ۋاقتى توغرىسىدا ياكى ئۇۋۇلىغاندا كۈچ بېرىش جەھەتتە چوقۇم رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك قاتتىق بەلگىلىمە ۋە چەكلىمە يوق، بۇلارنى بىمار قوبۇل قىلالىغۇدەك دەرىجىدە مۇۋاپىق تەڭشىسە بولىدۇ.

2. ئاساسىي رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇ - لىغاندا 37 - ، 38 - بەتلەردىكى كۆرسەت - مىدىن پايدىلانسا بولىدۇ.

3. ھەر بىر خىل كېسەللىكنى تەڭشەپ داۋالاشتا، ئاساسىي رېفلېكس رايونى، كېسەللىك رېفلېكس رايونى، مۇناسىۋەت - لىك رېفلېكس رايونىنىڭ تەرتىپى بويىچە مەشغۇلات قىلىش لازىم.

4. ئادەم بەدىنىدىكى ھەرقايسى ئە - زالارنىڭ پۇت ئاستىدىكى رېفلېكس رايون - لىرىنىڭ ھەممىسى ئىككىلا پۇتتا تولۇق سىممېتىرىك ھالەتتە بولۇپ كەتمەيدۇ، سىممېتىرىك ھالەتتە جايلاشقان ئوخشاش بىر رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئىك - كى پۇتنى بىرلەشتۈرۈپ ئۇۋۇلاش لازىم.

5. ھەرقانداق بىر ساقسىزلىق كۆرۈل - گەن ئەزانى ئۇۋۇلاپ تەڭشەشتىن بۇرۇن، ھىپوفىز رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇ - ۋۇلىغاندا، ئادەم بەدىنىدىكى توققۇز چوڭ سىستېمىنىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشىگىلى بولىدۇ.



1. بىر قول بىلەن پۇتنى تىك ھالەتتە تۇ - تۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن ئىچىدىن سىرتىغا ياكى سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ، ئوخ - شاش بىر يۆنىلىشتە پۇتنىڭ باش بارمىقىنىڭ ئالدىنقى ئۇچىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى توغرىسىغا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز؛ قولىنىڭ ئورنى - نى ئۆزگەرتىپ تۇرۇپ، باشقا تۆت بارماقنىڭ ئالدىنقى ئۇچىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى تەرتىپ بويىچە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا، زۇكام كەلتۈرۈپ چىقارغان بۇرۇن ۋە كېكىردەك بىئارام بولۇش - نى پەسەيتكىلى بولىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: پېشانە، چوڭ مېڭە، ھىپوفىز، كېكىردەك.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: بۇرۇن، كا - ناچە، ئۆپكە.

زۇكام

زۇكام ئادەتتە سوغۇق شامالدىن بولغان زۇكام، قۇرۇق ئىسسىقلىقتىن بولغان زۇكام ۋە ۋىرۇسلۇق زۇكامدىن ئىبارەت ئۈچ خىلغا ئايرىلىدۇ، زۇكامدا ئادەتتە بۇرنى پۇتۇش، چۈشكۈرۈش، بۇرنىدىن سۇ ئېقىش، گال قىمىلداش، بوغۇزى ئىششىپ قېلىش، قىزىش ۋە باش ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. قۇرۇق ئىسسىقلىقتىن بولغان زۇكامنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە، بىمار گېلىنىڭ ئاغرىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىدۇ.



2. ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ چوڭ مېڭە رېڭلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇ. لىساق، زۇكام كەلتۈرۈپ چىقارغان باش قېيىش، باش ئاغرىش قاتارلىق باش قىسمى بىئارام بولۇشنى ئۈنۈملۈك پەسەيتىدۇ. قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا ئىگەر غەيرىي ئەھۋاللار بايقالمىسا، ئۇۋۇلاش كۈچىنى تەدرىجىي ئاشۇرۇشقا ھەمدە ئۇۋۇلاش قېتىم سانىنى مۇۋاپىق كۆپەيتىشكە بولىدۇ.



3. باش بارماق يۇمشىقىنىڭ سەل ئىچى تەرىپىدىكى ھىپوفىز رېڭلىك رايونىنى بېسىپ ئۇ-ۋۇلساق، كېرەكسىز ماددىلارنىڭ بەدەن سىرتىغا چىقىرىلىشى راۋانلىشىپ، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت كۈچى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ.

4. پۇتنىڭ ئۆكچىسىدىن بارمىغا قاراپ، كاناي رېڭلىك رايونىنى تەكشى كۈچ بىلەن سېيرىپ ئۇۋۇلد-ساق، يۆتەلنىڭ ئالا-مەتلىرىنى يېنىك-لەتكىلى بولىدۇ.

5. پۇتنىڭ باش بارماق تىرىقىسىنىڭ ئىچكى گىرۋىكى ۋە ئاستى گىرۋىكىدىكى بۇرۇن رېڭلىك رايونىنى قولىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن بىلەن سېيرىپ ئۇۋۇلساق، زۇكامدىن كېلىپچىققان بۇرۇن پۈتۈش، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى يېنىكلىيدۇ.

6. ئىككى قولىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن ئۆپكە رېڭلىك رايونىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى ۋە ئاخىرلىرىنى شىش نۇقتىسىنى بېسىپ تۇرۇپ ئۈستىگە قارىتىپ سېيرىپ، ئۈچىنچى بارماقنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى كانايچە رېڭلىك رايونىنى ئۇۋۇلايمىز.

7. ئۆپكە رېڭلىك رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئەگەر ئۆپكە قىسمىدا بىئاراملىق بولسا، قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا تېرە ئاستىدا قۇمىمان توسالغۇ ماددىلارنىڭ بارلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ.

پېشانە، چوڭ مېڭە، ھىپوفىز ۋە كاناي قاتارلىق كېسەللىك رېڭلىك رايونلىرىدىن باشقا، يەنە يۈرەك (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى 49 - بەتتىن كۆرۈڭ)، تال، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڭلىك رايونلىرىنى (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى 52 -، 53 بەتتىن كۆرۈڭ) قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، قان ئايلىنىشى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاشقازان ۋە ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، ئورگانىزىمىنىڭ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، زۇكامنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ، سالامەتلىكىنى تېزلىكتە ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

TIPS

1. ھىپوفىز بىلەن تال رېڭلىك رايونى بىرقەدەر سىزگۈر كېلىدىغان بولغاچقا، بۇ ئىككى رېڭلىك رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، بىمارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ، ئۇۋۇلاش كۈچىنى ۋاقىتدا تەڭشەپ تۇرۇش لازىم.
2. چوڭ ئۈچەي رېڭلىك رايونىنى ئۇۋۇلاشتىن ئىلگىرى، ئەڭ ياخشىسى يانباش سوقۇر ئۈچەي كىلاپانى رېڭلىك رايونى (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى 65 - بەتتىن كۆرۈڭ)نى بېسىپ ئۇۋۇلاش لازىم، بۇنداق قىلىش ھەزىم قىلىنغان يېمەكلىكلەرنىڭ ئىدىيەگە ئۈچەيدىن بوغىناق ئۈچەيگە ئۆتۈشكە پايدىلىق.



قىزىتما

قىزىتما فىزىيولوگىيەلىك قىزىش ۋە كېسەللىك سەۋەبىدىن قىزىش دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. فىزىيولوگىيەلىك قىزىش كۆپىنچە جىددىي ھەرىكەت قىلغاندىن كېيىن ھەمدە ئاياللاردىكى ھامىلدارلىق مەزگىلى، ھەيز مەزگىلى قاتارلىق ئەھۋاللاردا كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە بەدەن تېمپېراتۇرىسى 37°C — 38°C قىچە بولغاندا تۆۋەن قىزىتما بولىدۇ، 38°C تىن ئېشىپ كەتسە يۇقىرى قىزىتما بولىدۇ. قىزىغاندا باش ئاغرىش، باش قېيىش ۋە پۈتۈن بەدەندىكى بوغۇملار ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەرمۇ تەڭ كۆرۈلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، ئۆپكە.

مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: چوڭ ئۈچەي.



2. تال رېفلېكس رايونى (سول پۇت ئاستىدىكى) نى بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، بەدەننىڭ يېمەكلىكلىرىنى ھەزىم قىلىش، سۈمۈرۈش ۋە توشۇش ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ، شۇ ئارقىلىق قىزىتما مەزگىلىدە بەدەننىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچى ئېشىپ، ئەسلىگە كېلىشى تېزلىشىدۇ.

1. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلېكس رايونى - نى بېسىپ ئۇۋۇلساق، ياللۇغ قايتۇرۇپ قىزىتمىنى پەسەيتىشكە پايدىلىق.



4. سول پۇتىنىڭ ئاستىدىكى توغرا بوغماق ئۈچەي رېفلېكس رايونىنى سېيرىپ ئۇۋۇلغاندا، ئاشقازان ۋە ئۈچەينىڭ لۆمۈلدۈشۈش ئىلگىرى سۈرۈپ، بەدەندىكى توكسىننىڭ چىقىرىلىشىنى تېزلەتكىلى بولىدۇ.



3. ئۆپكە رېفلېكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلغاندا، نەپەس سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، بەدەننىڭ قىزىشى سەۋەبىدىن نەپەس سىستېمىسىنىڭ زەخمىگە ئۇچرىشىنى ئازايتىدۇ.



6. مەقئەت رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلغاندا، توكسىننى ھەيدەپ ئىسسىقنى قايتۇرىدۇ، سول پۇتىنىڭ چوڭ ئۈچەي رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن، ئوڭ پۇتىنىڭ رېفلېكس رايونى داۋاملىق ئۇۋۇلىنىدۇ (كونكرېت ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى 65 - بەتتىن كۆرۈڭ).



5. قوللىرىڭىزنىڭ تاش يىڭىنى بۆتكەپ، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، S سىمان بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېفلېكس رايونىنى سېيرىپ ئۇۋۇلغاندا، ئۈچەي يوللىرىنى راۋانلاشتۇرغىلى بولىدۇ.

TIPS

يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرىدا بۆرەك ئۈستى بىزى رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلغاندا، ئۇۋۇلاش كۈچىنىڭ مۇۋاپىق بولۇشىغا دىققەت قىلىش، بەك كۈچەپ ئۇۋۇلاشتىن، ئۇۋۇلاش ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن بولۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىش كېرەك.

باش قېيىش، كۆز تورلىشىش

باش قېيىش ۋە كۆز تورلىشىش كۆپ خىل سەۋەبلەردىن كېلىپچىقىدۇ، ئا-
دەتتە قىزىتما كېسەللىكلىرى، يۇقىرى قان بېسىم، مېڭە قان تومۇرلىرى قې-
تىش، نېرۋا كېسىلى، قان ئازلىق قاتارلىق كېسەللىكلەر باش قېيىپ كۆز
تورلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ ئادەتتىكى ئالامىتى باش ئېغىرلى-
شىش، باش چىڭقىلىش، باش قېيىپ دەلدەڭشىپ مېڭىش، كۆزى تورلىشىش
قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: قۇلاق، كۆز، ئۇيۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي،
تال، جىگەر، ئۆت، چوڭ ئۈچەي.



1. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنى تىك ھالەتتە
تۇتۇپ يەنە بىر قولىمىزدا تاش يىڭىنىڭ ئۇ-
چى ئارقىلىق ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ياكى
سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ، ئوخشاش بىر يۆنى-
لىش بويىچە باش بارماقنىڭ ئالدى ئۇچىدىكى
پېشانە رېفلېكس رايونىنى توغرىسىغا ئۇۋۇلاي-
مىز، قولىنىڭ ئورنىنى ئۆزگەرتىپ تۇرۇپ،
باشقا تۆت بارماقنىڭ ئالدى ئۇچىدىكى پېشانە
رېفلېكس رايونىنى داۋاملىق ئۇۋۇلايمىز.

2. باش بارماق يۇمشىقى مەركىزىنىڭ سەل
ئىچى تەرىپىدىكى ھىپوفىز رېفلېكس رايونىنى بى-
سىپ ئۇۋۇلايمىز.



4. تاش يىغىنە ئارقىلىق پۇتنىڭ ئاللىقىنىدىن بارماق تەرەپكە قاراپ، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى رېڧلىكس رايونىنى سېيرىپ ئۇۋۇلساق، باش قېيىش، ماشىنىغا ۋە كېمىگە چىققاندا باش قېيىش، مېنىئېر ئۇنىۋېرسال كېسەللىكى قاتارلىقلارنى تەڭشەپ داۋالاشقا ئالاھىدە ئۈنۈم بىرىدۇ.

3. ئىككى قولنىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرۇپ، بىر قول بىلەن پۇتنىڭ ئاللىقىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، تاش يىغىنە بىلەن ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ چوڭ مېڭە رېڧلىكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۇ ۋۇلىغاندا سەل كۈچەپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى قاتارلىق كېسەللىك رايونلىرىنى ئۇ ۋۇلاشتىن باشقا، يەنە قۇلاق، كۆز، ئاشقازان، ئۇيغۇرلۇق ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، تال، جىگەر، ئۆت، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڧلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلساق بولىدۇ (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مەزكۇر كىتابىنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، بۇنداق قىلىش كۆزنى روشەنلەشتۈرۈپ مېڭىنى سەگىتىشكە، شۇنداقلا ئورگانىزىمنىڭ كېرەكسىزلىرىنى چىقىرىپ تاشلاش ۋە توشۇش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشكە پايدىلىق.

TIPS

1. بېغىشنىڭ بۈرەك قېپى رېڧلىكس رايونىنىڭ ئۈستىدىكى نېيگۈەن پەللىسىنى بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا (رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك)، ماشىنىدا بېشى قېيىش ۋە قۇسۇشنى ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولىدۇ.



نېرۋا مەنبەلىك باش ئاغرىقى

نېرۋا مەنبەلىك باش ئاغرىقى كۆپىنچە نېرۋا زەئىپلىشىش، چارچاش، ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش قاتارلىق سەۋەبلەردىن كېلىپچىقىدۇ، ئادەتتە باش قىسمى چىڭقىلىپ ئاغرىش، باش ئېغىرلىشىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە، مېڭە غولى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: ئۆپكە، بۆرەك، جىگەر، ئۆت.



1. پېشانە رېفلېكس رايونى باش ۋە يۈز قىسمىدىكى بىئارامەلىقنى پەسەيتىشتە زۆرۈر رول ئوينايدىغان رايوندىن ئىبارەت. ئۇۋۇلغاندا بىر قولىمىز بىلەن پۇتنى تىك ھالەتتە چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىزدا تاش يىڭنە بىلەن باش بارماقنىڭ ئۈچى قىسمىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى ئوخشاش پۇنىلىشتە توغرىسىغا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئارقىدىن يەنە توغرا پۇنىلىشتە باشقا تۆت بارماقنىڭ ئۈچى قىسمىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى توغرىسىغا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



2. باش بارماق يۇمشىقنىڭ سەل ئىچى تەرىپىدىكى ھىپوفىز رېفلېكس رايونىنى بىپسپ ئۇۋۇلساق، ئۇيقۇغا ئۈنۈملۈك ياردەم بەرگىلى بولىدۇ.



4. پۇتنىڭ باش
بارماق يۇمشىقىنىڭ
سىرتقى قىسمىدىكى
كىچىك مېڭە ۋە مېڭە
غولى رېڭلېكس رايونىدە.
نى ئوخشاش يۆنىلىش.
تە قىرىپ ياكى بېسىپ
ئۇۋۇلساق، مېڭىنى
قان بىلەن تەمىنلەشنى
كۈچەيتكىلى بولىدۇ.



3. چوڭ مېڭە رېڭلېكس
رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا
قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. سەل
كۈچەپەرەك ئۇۋۇلساق بولىدۇ.
بىر نەچچە قېتىم تەكرار ئۇۋۇ.
لساق، باشنىڭ بىئارام بولۇ-
شى ئۈنۈملۈك ياخشىلىنىدۇ.

پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ
مېڭە، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غو-
لى قاتارلىق رېڭلېكس رايونىدە.
رنى ئۇۋۇلاشتىن باشقا، يەنە
ئۆپكە، بۆرەك، جىگەر، ئۆت قا-
تارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڭلېكس
رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ
غىدىقلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىدە-
نى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىدە-
ۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)،
باش قىسمىدىكى ئاغرىقنى يو-
قىتىشقا پايدىلىق بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: ئۆپكە
(49 - بەت)، بۆرەك (37)، جىد-
گەر (64)، ئۆت (64)



TIPS

1. ئەگەر پېشانىنىڭ ئاغرىغانلىقىنى ھېس قىلسا، كۆرسەت-
كۈچ بارماقنىڭ ئاللىقان بارماق بوغۇمىغا يېقىن يان بىلەك تەردە-
پىنى بېسىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ؛ ئەگەر باشنىڭ چوققىسى ئاغرىدە-
سا، ئوتتۇرا بارماقنىڭ ئاللىقان - بارماق بوغۇمىغا يېقىن يان بى-
لەك تەرىپىنى بېسىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ؛ ئەگەر باشنىڭ يېرىمى
ئاغرىسا، نامىسىز بارماقنىڭ بارماق ئارىلىق بوغۇمىنىڭ بىلەككە
يېقىن تەرىپىنى بېسىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ؛ ئەگەر باشنىڭ ئارقا
تەرىپى ئاغرىسا، چىمچىلاقنىڭ بارماق ئارىلىق بوغۇمىنىڭ بى-
لەككە يېقىن تەرىپىنى بېسىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ. كېسەللىكنى
كونكرېت تەڭشەپ داۋالىغاندا، سول تەرەپتىكى كېسەللىكنى ئوڭ
تەرەپتىن داۋالاش پىرىنسىپى بويىچە مەشغۇلات ئېلىپ بېرىلىدۇ.
ئەگەر باش ئاغرىقىنىڭ كونكرېت ئورنىغا ھۆكۈم قىلىشقا مۇم-
كىن بولمىسا، تۆت بارماقنىڭ بارماق ئارىلىق بوغۇمىنى بېسىپ
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق تەڭشەپ داۋالاشقىمۇ بولىدۇ.
2. باشنىڭ يېرىمى ئاغرىغان بىمارلار، ياڭلىقچۇەن پەللىسىنىڭ
ئاستى تەرىپىدىن بىر سۆڭ تۆۋەنكى ئورۇنغا جايلاشقان ئۆت پەللىدە-
سىنى بېسىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ (ئۈستىدىكى رەسىمگە قاراڭ).

كۆز ئاغرىقى

كۆز ئاغرىقى كۆپىنچە كۆزنىڭ زىيادە چارچىشى، كۆزنى ئاسراش يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىقلاردىن كېلىپچىقىدۇ. ئادەتتە كۆز ئېچىشش، كۆز چار-چاش، كۆز قىزىرىپ قېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: كۆز، پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە.


مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: جىگەر، ئۆت.



2. باش بارماقنىڭ بارماق ئۇچىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى توغرا يۆنىلىشتە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز؛ ئاندىن يەنە باشقا تۆت بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىگە جايلاشقان پېشانە رېفلېكس رايونىنى داۋاملىق توغرا يۆنىلىشتە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.


1. پۇت ئىككىنچى، ئۈچىنچى بارماقنىڭ تۈۋىدىكى كۆز رېفلېكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. كۆزدە قاناش ئەھۋالى كۆرۈلسە، قاننىڭ كۆپ چىقىپ كېتە-شىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، كۆز رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلاشقا بولمايدۇ.

3. ھېپوفىز رېفلېكس رايونىنى كۈچەپ بېسىپ ئۇ-
ۋۇلايمىز، مەشغۇلات قىلغاندا ئازراق ئاغرىغاندەك تۇيغۇ
بولۇشى مۇمكىن، بۇ نورمال ئەھۋال بولۇپ، بۇنىڭغا ئا-
مالنىڭ بارىچە چىداش لازىم.



4. رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك يۆنىلىش
بويىچە چوڭ مېڭە رېفلېكس رايونىنى قىرىپ
ئۇۋۇلايمىز. ئۇۋۇلغاندا، ئۇۋۇلاش كۈچىنى
سەل ئاشۇرساق بولىدۇ.

5. جىگەر ۋە ئۆت رېفلېكس رايونى
ئوڭ پۇت ئاستىغا جايلاشقان. ئۇۋۇلغاندا
ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ ئۇۋۇلاش تەرتىپى
بويىچە، ئاۋۋال جىگەر رېفلېكس رايونىنى
يېرىم چەمبەر شەكىلىدە قىرىپ ئۇۋۇلاي-
مىز، ئاندىن ئۆت رېفلېكس رايونىنى تەك-
شى كۈچ بىلەن بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.



TIPS

كۆز قىسمى بىئارام بولغانلار كۆزنىڭ ئەتراپى-
دىكى زەنجۈ پەللىسى، يۇياۋ پەللىسى، سىجۇكۇڭ
پەللىسى، چىڭمىڭ پەللىسى، توغزىلياۋ پەللىسى،
چىڭچىشۋ پەللىلىرىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسە بولىد-
ۇ، ئەگەر پەللە ئورنىنى توغرا تاپالماسلىقىدىن
ئەنسىرىسە، ئۇنداقتا ئۆزى پىششىق بىلىدىغان كۆز
ئاسراش گىمناستىكىسىنى ئويناپ بەرسىمۇ ئۈنۈمى
كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.

بۇرۇن ياللۇغى

بۇرۇن ياللۇغى بىمارلىرىدا ھەمىشە بۇرۇندىن سۇ ئېقىش ئەھۋالى كۆرۈلۈپ-
دۇ، بۇرۇن ياللۇغىنىڭ ئادەتتىكى ئالامىتى بۇرۇن ئىچى قۇرۇش، ئوتتەك قىزىش
ياكى قىچىشىش، بۇرۇن پۈتۈپ قېلىش، كۆپ چۈشكۈرۈش، پۇراش سېزىمى
تۆۋەنلەش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت، يەنە ماغدۇرسىزلىنىش، قىزىش، باش ئاغرىش
قاتارلىق ئالامەتلەرمۇ قوشۇلۇپ كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: بۇرۇن، ئۆپكە، كاناي، كانايچە.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى ئېغەك، بادام-
جەز، بەدەننىڭ ئۈستۈنكى قىسمىدىكى لىمفا بېزى رېفلىكس رايونى.



2. ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى ئومۇميۈزلۈك
قىرىپ ئۇۋۇلساق، نەپەس يوللىرىنى تەڭشەپ
راۋانلاشتۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ.

1. قولنىڭ باش بارمىقى بىلەن پۇت
باش بارمىقىنىڭ تىرىناق سىرتىنى بويلاپ
بۇرۇن رېفلىكس رايونىنى سېيرىپ ئۇ-
ۋۇلايمىز.



4. ئىككى قولىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن ئۆپكە رېڧلىكىس رايونىنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىر - لىشىش نۇقتىسىنى ئايرىم - ئايرىم ھالدا بېسىپ تۇرۇپ، بىرلا ۋاقىتتا ئۈچىنچى بارماقنىڭ ئاستى تەرىپىگە قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئاندىن ئۈستىگە قاراپ كانايچە رېڧلىكىس رايونىنى سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېڧلىكىس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىساق ئۆپكەنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشكە پايدىسى بار.

3. بىر قولىمىز بىلەن تاپاننى تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئالدىدىن پۇت بارمىقىغا قاراپ كاناي رېڧلىكىس رايونىنى ئومۇميۈزلۈك سېيرىپ ئۇۋۇلساق، مەيدىنى بوشتىپ نەپەسنى تەڭ - شىگىلى بولىدۇ.

TIPS

قولىدىكى بۇرۇن رېڧلىكىس رايونى باش بارمىقىمىزنىڭ تىرىناق ئۈچىگە جايلاشقان. ئۆك ۋە سول قول ئۈستى - تىنىدىكى بۇرۇن رېڧلىكىس رايونىنى ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئون نەچچە قېتىم چىمىدىپ باسقاندا، بۇرۇن پۇ - تۈپ قىلىش، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش قاتارلىق ئالامەتلەرنى ئۈنۈملۈك پە - سەيتكىلى بولىدۇ.

بۇرۇن، ئۆپكە، كاناي، كانايچە قاتارلىق كېسەل - لىك رېڧلىكىس رايونلىرىدىن باشقا، يەنە بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى ئېڭەك، بادامبەز، بەدەننىڭ ئۈستۈنكى قىسمىدىكى لىمفا بېزى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڧلىكىس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ بەرگەندە (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مەزكۇر كىتاب - نىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ) ياللۇغ قا - تۇرۇپ ئاغرىق توختىتىش، ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارىنى ياخشىلاش ۋە بەدەننىڭ ئىم - مۇنتىزىپ كۈچىنى ئاشۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ.


ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، تال (52)، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى ئېڭەك (61 - بەت)، بادامبەز (61 - بەت)، بەدەننىڭ ئۈستۈنكى قىسمىدىكى لىمفا بېزى (62 - بەت).

قۇلاق غوڭغۇلداش

قۇلاق غوڭغۇلداش كۆپىنچە بۆرەك ئا -
جىزلىقىدىن كېلىپچىقىدىغان بولۇپ، بۇ
تاشقى دۇنيادىكى ھېچقانداق نەرسىلەرنىڭ
غىدىقلىشىغا ئۇچرىمىغان ئەھۋالدا قۇلاق
ئىچىدە غەيرىي ئاۋاز چىققانداك ھېس قىلىنىشنى كۆرسىتىدۇ، بۇ ئادەتتە قۇلاق ئىچىدە تۈرلۈك ئاۋاز، شاۋقۇن پەيدا بولۇش -
تەك ئالامەتلەر بىلەن ئىپادىلىنىپ، نورمال
تۇرمۇشقا چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: قۇلاق، ھىپوفىز، پە -
شانە، چوڭ مېڭە.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك، بۆرەك
ئۈستى بەزى، تال.



4. بىر قولىمىز بىلەن
پۇتنىڭ ئالدىقىنى تۇتۇپ تۇ -
رۇپ، يەنە بىر قولىمىزدا
ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ چوڭ
مېڭە رېفلىكس رايونىنى قى -
رىپ ئۇۋۇلساق، باش قىسمى
بىئارام بولۇشنى ئۈنۈملۈك
ياخشىلىغىلى بولىدۇ.

3. پېشانە رېفلىكس رايونىنى
قىرىپ ئۇۋۇلساق، بەش ئەزا كې -
سەللىكلىرىنى ياخشىلىغىلى بول -
دۇ. مەشغۇلات قىلغاندا، بەش بارماق -
نىڭ ئۇچى قىسمىغا جايلاشقان پېشا -
نە رېفلىكس رايونلىرى تەرتىپ بو -
يىچە توغرىسىغا قىرىپ ئۇۋۇلىنىدۇ.

2. پۇت بارماق
يۈمشىقلىكىنىڭ سەل ئى -
چى تەرىپىدىكى ھىپو -
فىز رېفلىكس رايونىنى
بېسىپ ئۇۋۇلساق،
ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ
قالايمىقانلىشىشىنى
تەڭشەشلىكى بولىدۇ.

قۇلاق، ھېپوفىز، پېشانە، چوڭ مېڭە قاتارلىق رېڭلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلغاندىن باشقا، يەنە بۆرەك، بۆرەك ئۈستى بېزى، تال قاتارلىق رېڭلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، كېسەللىكنىڭ ساقىيىشىنى تېزلەتكىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى بۆرەك (38 - بەت)، بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، تال (52 - بەت).

TIPS

1. مىڭتيەنگۇ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى. بۇنىڭ كونكرېت ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە:

ئىككى قولىدىكى شوۋلاۋگوك پەللىسى (手劳宫) ئىككى قۇلاققا ماس كېلىدىغان بولۇپ، كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن باشنىڭ ئارقا قىسمىنى 20 — 40 قېتىمغىچە يېنىك باسىمىز، باسقاندىكى كۈچ بەك چوڭ بولۇپ كەتسە بولمايدۇ. دائىم بۇ ئورۇننى يېنىك بېسىپ بەرگەندە، باش ئاغرىش، باش قېيىش، بويۇن ئومۇرتقىسى كېسىلى، گاسلىق، قۇلاق غوغۇلداش قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. دىققەت: ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغلانغان ياكى قۇلاق ناغرا پەردىسى تېشىلگەن بىمارلارغا بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىشقا بولمايدۇ.

2. ئالقات، كۈنجۈت، پىچەكگۈل، ياڭاق، كاشتان، دېڭىز ئادەمگىياھى، قاتارلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش ئۈنۈمىگە ئىگە يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش كېرەك.

چىش ئاغرىش

چىش ئاغرىقى كۆپىنچە چىشنى قۇرت يېيىش ۋە چىش مىلىكى يۇقۇملىنىپ ياللۇغلىنىش سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ، بۇلار چىش تۈۋىنىڭ قىزىرىپ ئىشىش- شىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا چىش ئەتراپى ياللۇغى، ئەقىل چىش تاجى ئەتراپى ياللۇغى، چىش ماددىسى زىيادە سېزىمچانلىقى قاتارلىق ئامىللارمۇ چىش ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. جۇڭخىي تېبابىتىدە، چىش ئاغرىقى ھەقى- قى ۋە ساختا چىش ئاغرىقى دەپ ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ، ھەقىقى چىش ئاغرىقى كۆپىنچە ئاشقازاننىڭ ئىسسىقلىقى ئېشىپ كېتىش سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ، ساختا چىش ئاغرىقى بولسا كۆپىنچە بۆرەك ئاجىزلىقى سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئۇچلۇك نېرۋا.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك ئۈستى يېزى، تال.



1. پۇت باش بارماق يۇمشىد.

2. بۆرەك ئۈستى يېزى رېف.

3. تال رېفلىكس رايونى.

قىزىق سىرتى تەرىپىدىكى ئۇچ

لېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلد.

ساق، ياللۇغنى قايتۇرۇپ ئاغرىق.

لىغاندا، ئىممۇنىتېت ئىقتىد.

نى توختىتىشقا پايدىسى بار.

دارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

خېگۇ پەللىسىنى توققۇز قېتىم بېسىپ ئۇۋۇ- لىساق (سول تەرەپ رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك)، شياگۇن پەللىسى (يۈز قىسمىدا بولۇپ، قۇلاقنىڭ ئالدىغا جايلاشقان، چىشىمىزنى چاڭ چىشلەپ تۈر- غاندا، يۈزنىڭ ئىككى تەرىپىدە بۆلىنىپ چىققان مۇسكۇل ئورنى) نى ئۆز يۆنىلىشى بويىچە 36 قې- تىم، تەتۈر يۆنىلىش بويىچە 24 قېتىم ئۇۋۇلساق، چىش ئاغرىقىنى تېزلىكتە پەسەيتكىلى بولىدۇ.



ئېغىز پۇراش

ئېغىز پۇراش كۆپىنچە تال ئاجىزلىقى سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدىغان بولۇپ، بىمارنىڭ ئېغىزىدىن دائىم سېسىق پۇراق چىقىدۇ، شۇنداقلا يەنە شۆلگەي كۆپىيىش، ئېغىز يارىسى قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى دائىم دېگۈدەك قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئۆپكە، تال، ئاشقازان.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: چوڭ ئۇچەي، مەقئەت.



2. تال رېفلىكس رايونىنى (سول پۇت ئاستىدا) بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، ئوزۇقلۇقنىڭ ھەزىم بولۇشى ۋە بەدەنگە قوبۇل قىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.



1. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئالدى-قىيىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلساق، نەپەسنىڭ راۋان بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ناچار خىلىتلارنىڭ بەدەندە تۇرۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

4. سول پۇتقا جايلاشقان توغرا بوغماق ئۈ - چەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، S سىمان بوغماق ئۈچەي، تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ۋە ئوڭ پۇتتىكى يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي، توغرا بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى سائەت ئاستىرىلىكسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە بىر - بىر - لەپ تەرتىپلىك ئۇۋۇلساق، چوڭ ئۈچەينىڭ لۆ - مۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۈچەي يوللىرىنى راۋانلاشتۇرغىلى بولىدۇ.



3. ئىككى پۇتنىڭ بىرىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىكى ئاشقازان رېفلىكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق، ئاشقازاننىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارىنى نورمال ھالەت - كە قايتۇرغىلى بولىدۇ.



5. ئەڭ ئاخىرىدا مەقۇت رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.



TIPS

1. جىش مىلىكىدىن مەسىلە چىققاندا ياكى باشقا ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولغاندا، بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىشقا بولىدۇ.
2. ئېغىز يۇراشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ داۋالاشتا، ئاۋۋال پۈتكۈل پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن كېسەللىك رېفلىكس رايونىنى نۇقتىلىق ئۇۋۇلاش لازىم.
3. خام گەجىدىن 10 گىرام ئېلىپ سۇغا دەملەپ، قاينى - قاينا تەڭشەپ ئىستېمال قىلسا، يەنى ئۇدا ئۈچ كۈن ئىچىپ بەرسە بولىدۇ.
4. ھەر كۈنى ئەتىگەندە بىر ئىستاككان لىمون سۈيى ئىچىپ بەرسە بولىدۇ.

يۈز پالچى، ئۈچلۈك نېرۋا ئاغرىقى

يۈز پالچى يۈز نېرۋىلىرى تارتىشىپ قېلىش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئادەتتىكى ئالامەتلىرى: ئاغزى ۋە كۆزى مايماق بولۇپ قېلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بىمار قاش، كۆز ۋە ئاغزىنى نورمال مىدىرلىتىش ھەرىكەتلىرىنى قىلالمايدۇ، بۇ كېسەللىك ئوخشاش بولمىغان ياش قاتلىمىدىكىلەردە ئوخشاشلا كۆرۈلىدۇ. ئۈچ-دۆڭلۈك نېرۋا ئاغرىقى بولسا، يۈز قىسمىدىكى ئۈچلۈك نېرۋىنىڭ بىر ياكى ئىككى شاخچە نېرۋا تارقالغان ئورۇندا تۇيۇقسىز توك سوققانداك سېزىم پەيدا بولۇش-نى ياكى يىڭنە سانجىغانداك، پىچاق سانجىلغانداك، يىرتىلغانداك ۋە ياكى كۆي-گەندەك قاتتىق ئاغرىق پەيدا بولۇشنى كۆرسىتىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئۈچلۈك نېرۋا، كۆز، قۇلاق.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، قان بېسىمىنى تۈۋەنلىتىش سەزگۈ نۇقتىسى سىزىقى.



TIPS

1. يۈز قىسمىدىكى ئۈچلۈك نېرۋا جايلاشقان ئورۇندا دانخورەك پەيدا بولسا، قول بىلەن سىقىمىسلىق كېرەك.
2. يۈز قىسمىدىكى ئۈچلۈك نېرۋا رېفلىكس رايونىدا ئويما پەيدا بولغان بولسا، بۇ كۆپىنچە ئەھۋالدا ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ يۈزى تارتىشىپ قېلىش ياكى ئۈچلۈك نېرۋا ئاغرىقىغا گىرىپتار بولغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئەگەر ئويما جايدا قاتتىق ھالەتتىكى مۇسبەتلىك ماددا قولغا ئۇرۇنسا، بۇ كېسەللىكنىڭ بىرقەدەر ئېغىر ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.

ئۈچلۈك نېرۋا، كۆز، قۇلاق قاتارلىق رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلغاندىن باشقا يەنە، پېشانە، ھى-
چوفىز، چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونىنى قوشۇمچە
ئۇۋۇلغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، تەڭشەپ دا-
ۋالاش رولىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ. ئەگەر بىمار بىرلا ۋاقىتتا يۇقىرى قان بېسىم كېسىلگە گىرىپتار
بولغان بولسا، ئۇنداقتا ئىككى پۇتنىڭ باش بارماق تۈۋىدىكى ئىككىنچى توغرا ۋە تىك سىزىق كېسىش-
كەن ئورۇندىكى قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش سەزگۈ نۇقتىسىنى يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قاراپ ئۇۋۇلساق
بولىدۇ (ئۈستىدىكى رەسىمگە قاراڭ). تۆۋەن قان بېسىم كېسىلى بىمارلىرىنىڭ قان بېسىمىنى تۆۋەن-
لىتىش سەزگۈ نۇقتىسىنى ئۇۋۇلاشقا بولمايدۇ.
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: پېشانە ۋە ھىپوفىز (42 - بەت)، چوڭ مېڭە (45 - بەت)، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە
غولى (43 - بەت).



3. تۆتىنچى، بەشىن-
چى پۇت بارمىقىدىكى
قۇلاق رېفلېكس رايونىنى
قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



2. ئىككىنچى، ئۈچىنچى
پۇت بارمىقىدىكى كۆز رېفلېكس
رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قا-
راپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



1. ئۈچ ئاچا نېرۋا رېفلې-
كس رايونىنى ئۈستىدىن ئاس-
تىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق،
يۈز قىسمى تارتىشىپ قېلىشنى
ياخشىلىغىلى بولىدۇ.

ھېق تۇتۇپ قېلىش

ھېق تۇتۇش — ئىقتىدار خاراكتېر -
لىك ھەزىم قىلىش ناچارلىشىشنىڭ ئىدى-
پادىسى بولۇپ، بۇ كېسەللىك ئالامىتىنى
پەسەيتىشتە ئېگىزىدىن قول سېلىپ،
ھەزىم قىلىش ناچارلىشىشنى تەڭشەپ
داۋالاش كېرەك.

رېفلىكس رايونلىرى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: دىياگرامما، ئاشقا-
زان، تال.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: جىگەر، ئون
ئىككى بارماق ئۇچى، ئىنچىكە ئۇچى، چوڭ ئۇچى.

1. ئىككى قولنىڭ كۆرسەتكۈچ بارماق
بوغۇمىنى دىياگرامما رېفلىكس رايونىنىڭ
مەركىزىي ئورنىغا قويۇپ، بىرلا ۋاقىتتا
رېفلىكس رايونىنى بويلاپ، ئىككى يان تە-
رەپنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



2. ئاشقازان
رېفلىكس رايونىنى
ئۈستىدىن ئاستى-
غا قاراپ قىرىپ
ئۇۋۇلايمىز.



3. تال رېفلىكس رايونى (سول پۇتە-
نىڭ ئاستىدا) نى بېسىپ ئۇۋۇلساق،
ھەزىم قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھە-
زىم قىلىش سىستېمىسىدىكى كېسەل-
لىكنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

TIPS

بويۇن تۆتىنچى ئومۇرتقىسىنى بېسىپ ئۇۋۇلە-
ساق ھەم قۇلاقنىڭ كەينى تەرىپىدىكى يىڭىڭ پەللى-
سى، تىيەنتۇ پەللىسىنى بېسىپ ئۇۋۇلساق، ئوخ-
شاشلا ھېق تۇتۇشنى تېزلىكتە توختاتقىلى بولىدۇ.

يۆتەل، زىققە كېسىلى

يۆتەل بىلەن زىققە ئوخشاشلا نەپەس سىستېمىسىغا تەۋە كېسەللىكتىن ئىبارەت. يۆتەل نەپەس سىستېمىسى كېسەللىكلىرى ئىچىدىكى ئاساسلىق كېسەللىك بولۇپ، ئۇزۇن مۇددەت يۆتىلىش باشقا كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؛ زىققە كېسىلى ئادەتتە نەپەس تېزلىشىش، مەيدىسى چىڭقىلىش، نەپەس چىقىرىش تەسلىشىش، ھاسىراش قاتارلىق ئالامەتلەر بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: كاناي، قىزىلىۋىڭگەچ، يۇتقۇنچاق، كۆكرەك لىمفا بېزى، ئۆپكە ۋە كانايچە. **مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى:** بۆرەك ئۈستى بېزى، ئال، بەدەننىڭ ئاستىنقى قىسمىدىكى لىمفا بېزى.



2. ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايدىمىز. ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلاپ بەرگەندە، يۆتەل، زىققە، ئۆپكە ياللۇغى قاتارلىق نەپەس يولى كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

1. كاناي، قىزىلىۋىڭگەچ، يۇتقۇنچاق، كۆكرەك لىمفا بېزى رېفلىكس رايونلىرى ئۆز-ئارا تۇتاش بولۇپ، بۇلار بىرقەدەر چوڭ بولغان بىر رېفلىكس رايونىنى ھاسىل قىلىدۇ، ئۇۋۇلىغان چاغدا پۇتنىڭ يۈزىدىن بارماق ئارىلىقىغا قاراپ، بۇ ئۈچ رېفلىكس رايونىنى ئومۇم-يۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



4. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلساق، غىدىقلىدەن ئىش ئارقىلىق ئادرېنالىن پەيدا بولۇپ ياللۇغنى پەسەيتىدۇ.



6. بەدەننىڭ ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى قىسمىدىكى لىمفا بېزى رېفلېكس رايونى ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئىككى پۈتۈن تاشقى ئوشۇق ئىچكى - تاشقى ئوشۇق سۆڭىكىنىڭ ئالدى تەرەپ ئاستىدىكى ئوي - مان جايدا بولۇپ، ئۇۋۇلىغاندا، ئىككى قولىنىڭ كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمى بىلەن تەكشى كۈچ بېرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.



3. ئىككى قولىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن ئۆپكە رېفلېكس رايونىدىن باشلاپ كانايچە رېفلېكس رايونىغىچە بولغان ئورۇنلارنى ئۇۋۇلايمىز. ئۆپكە رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاش بىلەن بىر ۋاقىتتا كانايچە رېفلېكس رايونىنى ماسلاشتۇرۇپ ئۇۋۇلساق، ئۆپكەنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.



5. تال رېفلېكس رايونى(سول پۇت ئاستىدا) نى بېسىپ ئۇۋۇلدەن ساق، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

TIPS

1. ياقالچاق بىلەن پۈتۈننىڭ دۈمبىسى تۇتاشقان جايدىكى توغرا يول ھېرىقىنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان جېشىشۇ پەللىسى(ئوڭ تەرەپتىكى رەسىمگە قارالغۇ)نى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرسە، يۆتەلىش توختىتىپ، زىنقىنى يېنىكلىتىشتە مەلۇم دەرىجىدە قوشۇمچە رول ئوينايدۇ.
2. ئەگەر يۆتەل بەكرەك ئېغىر بولسا، قولىنى سۇغا تەگكۈزۈپ، فېنجىك(ئۆپكە رايونى) پەللىسىگە يېنىك ئۇرسا بولىدۇ.

يۇتقۇنچاق - بوغۇز ياللۇغى

يۇتقۇنچاق - بوغۇز ياللۇغى ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك دەپ ئىككى خىلغا ئايرىلىدىغان بولۇپ، بۇ كۆپىنچە نەپەس يوللىرى ياللۇغلىنىش سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ، ئەتىياز ۋە كۈز پەسىللىرى يۇتقۇنچاق ياللۇغى ئەڭ كۆپ قوزغىلىدىغان مەزگىلدۇر. يۇتقۇنچاق - بوغۇز ياللۇغىدا دائىم يۇتقۇنچاق قۇر-غاقلىشىش، قىزىپ كۆيگەندەك بولۇش، ئاغرىش، غەيرىي پۇراق پەيدا بولۇش، ئاۋازى پۈتۈش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، يەنە پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلىنىش، بوغۇملار تېلىپ ئاغرىش، باش ئاغرىش، قىزىش، ئىشتىھاسى تۈتۈلۈش قاتارلىق ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

رېفلىكس رايونلىرى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: كاناي، قىزىلئۆڭگەچ، كۆكرەك لىمفا بېزى، ئۆپكە، بۆرەك ئۈستى بېزى، تال.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، قان بېسىمىنى تۈۋەنلىتىش سەزگۈ نۇقتىسى / سىزىقى.



1. پۇتنىڭ دۈمبە يۈزىدىن بارماق ئارىلىقىغا قاراپ كاناي، قىزىلئۆڭگەچ، يۇتقۇنچاق، كۆكرەك لىمفا بېزى رېفلىكس رايونلىرىنى سېيرىپ ئۇ-ۋۇلايمىز.



2. ئۆپكە رېڧلېكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئەگەر ئۆپكە كېسەللىك بولسا، قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا قولغا قۇمىسمان نەرسە ئۇرۇدۇ. غاندەك بىلىنىدۇ.

3. بۆرەك ئۈستى بېزى رېڧلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، بەدەننىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشىنى كۈچەيتىپ، ياللۇغ قايتۇرۇپ يۇتقۇنچاقنى سىلىقلىغىلى بولىدۇ.

4. تال رېڧلېكس رايونى(سول پۇتنىڭ ئاستىدا) نى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. تال رېڧلېكس رايونىنى ئۇزۇن مۇددەت ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ.

TIPS

قارىتىرۇكنى ھۆل لۆڭگە بىلەن ئۇراپ 24 سائەت تۇرغۇزۇپ، قارىتىرۇكنىڭ ئېتى بىلەن ئۇرۇقى ئاجرىغاندا، قارىتىرۇك ئېتىنى ھەسەلگە چىلاپ يەتتە كۈن قويغاندىن كېيىن، ھەر كۈنى بىر تالدىن ئىستېمال قىلسا، يۇتقۇنچاق ياللۇغغا شىپا قىلىدۇ.

كاناي، قىزىلئۆڭگەچ، يۇتقۇنچاق، كۆكرەك لىمفا بېزى، ئۆپكە، بۆرەك ئۈستى بېزى، تال قاتارلىق كېسەللىك رېڧلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش سەزگۈ نۇقتىسى / سىزىقى (پەقەت قان بېسىمى يۇقىرى بولغان ئەھۋالدا ئۇۋۇلىنىدۇ) قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڧلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلساق (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، تەڭشەپ داۋالاش ئۈنۈمىنى نىخسۇمۇ كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى

پېشانە (42 - بەت)، ھىپوفىز (42 - بەت) چوڭ مېڭە (45 - بەت)، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى (43 - بەت)، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش سەزگۈ نۇقتىسى سىزىقى (86 - بەت).

خورەك تارتىش

ئاستى - ئۈستى ئېڭەك مۇسكۇلى ئېلاستىكىلىقىنى يوقاتسا، نەپەسلىنىشكە ئەگىشىپ ئۇنىڭدا تىترەش ھادىسىسى پەيدا بولىدۇ، بۇنى بىز ئادەتتە خورەك تارتىش دەيمىز. سېمىزلىك خورەك تارتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان مۇھىم سەۋەبتىن ئىبارەت. ئۇنىڭدىن باشقا، بۇرۇن ياللۇغى، بۇرۇن مۇنچاق گۆش ئۆسمىسى، بۇرۇن كاۋىكى ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغان بىمارلاردىمۇ ئۇخلىغاندا خورەك تارتىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئۈستۈنكى ئېڭەك ۋە ئاستىنقى ئېڭەك.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ئۆپكە، كاناچە، بۇرۇن.



1. قولىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى ئېڭەك رېفلىكس رايونىنى ئىچىدەدىن سىرتىغا قاراپ تەرتىپ بويىچە سېپىرىپ ئۇۋۇلساق، ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرىنىڭ ئالامىتىنى ئېلىشقا پايدىلىق.



2. ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇ-لىساق، نەپەس سىستېمىسىدىكى كېسەللىكنى پەسەيتىشكە پايدىلىق.

3. ئەھۋالغا قاراپ كا-نايچە رېفلىكس رايونىنى ئۈستىگە قارىتىپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.

4. قوللىرىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن بۇرۇن رېفلىكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ياكى سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇرۇن رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاشتا، سول تەرەپتىكى كېسەلنى ئوڭ تەرەپتىن داۋالاش پىرىنسىپى بويىچە مەش-خۇلات قىلىمىز، يەنى سول تەرەپتىكى بۇرۇن پۈتۈپ قالسا، ئوڭ پۈتۈن بۇرۇن رېفلىكس رايونىنى، ئوڭ تەرەپتىكى بۇرۇن پۈتۈپ قالسا، سول پۈتۈن بۇرۇن رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلايمىز.



TIPS

قولدىكى بۇرۇن رېفلىكس رايونى باش بارماقنىڭ بارماق ئۇچىغا جايلاشقان. سول ۋە ئوڭ قولدىكى بۇرۇن رېفلىكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئون نەچچە قېتىم (سول تەرەپ رەسىمگە قاراڭ) چىمىدىپ ئۇۋۇلساق، خورەك ئارتىش كېسەللىكىنى پەسەيتىپلا قالماستىن، يەنە بۇرۇن پۈتۈپ قېلىش، بۇرۇن ئىچىدىن سۇ ئېقىش قاتارلىقلارنىمۇ ئۈنۈملۈك پەسەيتىدۇ (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مەزكۇر كىتابىمىز 80 - بېتىدىن كۆرۈڭ).

سېسىق كېكرىش

قىزىلىۋاتىدىغان بىئارام بولۇش، ھېق تۇتۇش، ئاچچىق سۇيىنىش قاتارلىقلار سېسىق كېكرىشنىڭ ئاساسلىق ئالامىتىدىن ئىبارەت. بۇ ئادەتتە كۈندىلىك يېمەك - ئىچمەك تەرتىپىنى بولۇش، ئاچچىق - چۈچۈك غىدىقلىغۇچى يېمەكلىكلەرنى كۆپ يېيىش، ئۇزۇن مۇددەت كۆپ ھاراق ئىچىش، تاماكنى كۆپ چېكىش، ئاشقا - زاننى غىدىقلىغۇچى دورىلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىش سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: قىزىلىۋاتىدىغان، ئاشقازاننىڭ كىرىش ئېغىزى، ئاشقازان، تال.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: جىگەر، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي.





2. سول پۇتىمىزدىكى ئاشقازان رېفلىكس رايونى -
نىڭ سول تەرەپ ئۈستىگە جايلاشقان ئاشقازان كىرىش
ئېغىزى رېفلىكس رايونىنى تەكشۈرۈپ كۆچ بىلەن سېسىق
ئۇۋۇلساق، ئاشقازاندىكى يېمەكلىك ۋە ئاشقازان سۇ -
يۇقلۇقىنى ئۈنۈملۈك توسۇپ قالغىلى بولىدۇ.



1. پۇتنىڭ دۈمبىسىدىن پۇت بار -
مىنىغا قارىتىپ قىزىلىۋاتىدىغان رېفلىكس
رايونىنى سېرىپ ئۇۋۇلايمىز.

4. تال رېفلىپكىس رايونى (سول پۇتنىڭ ئاستىدا) نى بېسىپ ئۇۋۇلساق، ياللۇغنى قايتۇرۇپ، ھەزىم قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.



3. ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي رېفلىپكىس رايونلىرىنى تەرتىپ بويىچە بېسىپ ۋە سېپىرىپ ئۇۋۇلساق، ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنى ئومۇميۈزلۈك تەڭشەپ دۆلىتى بولىدۇ.

TIPS

سېسىق كېكىرىپ قالغاندا، قۇلاق قىسمىدىكى قىزىلئۆڭگەچ، ئاشقازان كىرىش ئېغىزى قاتارلىق رېفلىپكىس رايونلىرىغا قۇلاق دورىلىق چاپلىمىسى (جۇڭگىي دورىسى بولۇپ، قارىمۇق ياكى ئاق قىچا ئۇرۇقى) نى چاپلىسا ھەمدە ھەر كۈنى بۇ ئىككى يەللە ئورنىنى ئاز دېگەندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 20 — 30 نى بېسىپ ئۇۋۇلاپ بەرسە بولىدۇ.



بويۇنغا يەل تۇرۇپ قېلىش

بۇنىڭ ئادەتتىكى ئالامىتى بويۇن ئاغرىش، بويۇن قېتىۋېلىش، باشنى بۇ - راش قىيىن بولۇش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: بويۇن ئومۇرتقىسى، بويۇن، قىيپاش چاسا مۇسكۇل. مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك، ئومۇرتقا تۇۋرۇكى (كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، قۇيرۇق سۆڭىكى، توققۇز كۆز سۆڭىكى)، مۇرە بوغۇمى.

2. بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى بارماقنىڭ بارماق ئارىلىقىدىن بىر سانتىمېتىر كېلىدىغان جاي قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېفلىكس رايونىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ رايوننى ئۇۋۇلدغاندا ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.



3. بۆرەك رېفلىكس رايونى ئۈچىنچى تاپان سۆڭەك ئوتتۇرىسىنىڭ تۆۋەنرەك قىسمىغا جايلاشقان، شۇنداقلا ئۇ ئىككىنچى، ئۈچىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىققا سوزۇلغان بولىدۇ، ئۇۋۇلىغاندا رېفلىكس رايونىنى بويلاپ يېرىم چەمبەر شەكلىدە قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

1. بويۇن ۋە بويۇن ئومۇرتقا رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىساق، بويۇن ۋە مۇرە قىسمىدىكى ئاغرىقلارنى پەسەيتكىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلىغاندا، كۆرسەتكۈچ بارماق ۋە ئوتتۇرا بارماق ئارقىلىق پۇتنىڭ باش بارمىقىنى تۇۋىدىن قىسىپ تۇرۇپ ئىچى تەرەپكە ئايلاندۇرىمىز، باش بارماقنى ئىچى تەرەپكە ئايلاندۇرغاندا، پۇت بارمىقى بېسىپ ئۇۋۇلىنىدۇ ھەم سوزۇلىدۇ.

4. بىر قولىمىزدا پۇت بارماقلىرىنى مىدىرلات.

ماي چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن پۇت بارمىقىدىن ئۆكچە يۆنىلىشىگە قاراپ، كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، قۇيرۇق سۆڭىكى ۋە توققۇز كۆز سۆڭىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئومۇرتقا تۈۋرۈكى رېفلىكس رايونىنى ئالدىدىن ئارقىسىغا قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلىغاندا، بويۇن ئومۇرتقا كېسىلى، بەل ئومۇرتقا تەخسىسى پۇلتىيىپ چىقىش ۋە ئومۇرتقا تۈۋرۈكى زىيانغا ئۇچراش سەۋەبىدىن كېلىپچىققان باش قېيىش، قول ئۇيۇشۇش قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك ئەگەشمە كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.



5. ئوڭ قولىمىزنىڭ كۆرسەتكۈچ بار -
مىقىنى ئېگىپ تۇرۇپ، كۆرسەتكۈچ بارماق -
نىڭ بوغۇملىرى بىلەن مۇرە بوغۇمى رېف -
لىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

گەجگە، بويۇن ۋە مۇرە مۇسكۇللىرىنى بېسىپ مۇجۇپ ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، بويۇن تېلىپ ئاغ -
رىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلاش جەريانىدا ئەگەر ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ بويۇن مۇسكۇلى -
دا قاتتىق ھۆررەك بارلىقى بايقالسا، ئۇۋۇلاشنى تاكى قاتتىق ھۆررەك تۈگىگەنگە قەدەر داۋاملاشتۇر -
رۇش لازىم.

مۈرە ئەتراپى ياللۇغى

مۈرە ئەتراپى ياللۇغىنىڭ ئاساسلىق كېسەللىك ئالامىتى مۈرە قىسمى ئاغ-
رىشتىن ئىبارەت. بۇ خىل كېسەللىك تۇيۇقسىز قوزغىلىدىغان ياكى ئىزچىل
داۋاملىشىدىغان ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇپ، كېچىدە ئېغىرلىشىدۇ، كېسەللىك
قوزغالغاندا ئاغرىق سەۋەبىدىن ئادەم چىلىق - چىلىق تەرگە چۆمۈپ، خاتىرجەم
ئۇخلىيالمايدۇ، مۈرە بوغۇملىرىنىڭ ھەرىكىتى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ، شۇنداقلا
كۈندىن - كۈنگە ئېغىرلاپ كېتىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: مۈرە بوغۇملىرى، تاغاق سۆڭىكى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بويۇن ئومۇرتقىسى، قىيپاش چاسا مۇسكۇل.

1. كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بارماق بوغۇمى بى-
لەن مۈرە بوغۇملىرى رېفلىكس رايونىنى بېسىپ
ئۇۋۇلايمىز.



2. ئىككى قولنىڭ باش بارمىقى بىلەن تاغاق سۆڭىكى رېڧلېكس رايونىنىڭ ئىككى باشلىنىش نۇقتىسىنى بىرلا ۋاقىتتا بېسىپ تۇرۇپ، ئالدىدىن ئارقىغا قاراپ تەكشى كۈچ بىلەن سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



3. بويۇن ئومۇرتقىسى رېڧلېكس رايونى پۇت باش بارمىقىنىڭ ئىچى تەرىپىدە بو-لۇپ، ئۇۋۇلىغاندا، بىر قولىمىزدا پۇتنىڭ ئالدىقىنى چىڭ تۇتىمىز، يەنە بىر قولىمىزنىڭ كۆرسەتكۈچ بارماق ۋە ئوتتۇرا بار-مىقى بىلەن پۇتنىڭ باش بارمىقىنى تۇۋىدىن قىسىپ تۇرۇپ، ئىچى تەرەپكە ئايلاندۇرىمىز، باش بارماقنى ئىچى تەرەپكە ئايلاندۇرساق، بارماقنى بېسىپ ئۇۋۇلاش ھەم سوزۇش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.



4. قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېڧلېكس را-يونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىساق، بويۇن، مۇرە ئاغرىقلىرىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلەتكىلى بولىد-دۇ، ئۇۋۇلىغاندا ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئو-مۇمىۋىزلىك قىرىپ ئۇۋۇلىساق بولىدۇ.

يۈرەك سېلىش



يۈرەك سېلىش ئادەتتە يۈرەك زى-
يادە تېز سوقۇش، سىنوسسىمان يۈ-
رەك رېتىمىسىزلىقى، يۈرەك ئېغىش
قاتارلىق ئالامەتلەر بىلەن ئىپادىلە-
نىدۇ. بىمار يۈرىكىنىڭ گۈپۈلدەپ
سوقۇۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىدۇ.
بۇنداق ئەھۋال كۆپىنچە ھەرىكەت
قىلغاندا ياكى ھاياجانلانغان چاغلاردا
يۈز بېرىدۇ.

2. بەش بارماقنىڭ ئالدى ئۇچىغا جايلاشقان
پېشانە رېفلىكس رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىش بى-
يىچە ئايرىم - ئايرىم ھالدا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

رېفلىكس رايونى



كېسەللىك رېفلىكس رايونى: يۈرەك.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: پېشانە،
چوڭ مېڭە، ھىپوفىز، پۇتنىڭ ئاستىدىكى قان
بېسىمىنى تۈۋەنلىتىش سىزىقى، قالقانبەز.

1. ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ يۈرەك
رېفلىكس رايونى(سول پۇتنىڭ ئاستىدا) نى
سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۇۋۇلىغاندا ئۇۋۇلاش
كۈچىنى تەدرىجىي ئاشۇرىمىز.



3. چوڭ مېڭە رېفلىكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاس-
تىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا،
ئەگەر بىنورمال ئەھۋال بايقالمىسا، ئۇۋۇلاش كۈچىنى
ئاشۇرۇپ، ئۇۋۇلاش قېتىم سانىنى كۆپەيتىشكە بولىدۇ.



5. ئىككى پۇت باش بارمىقىنىڭ بار - ماق تۇۋىدىكى ئىككىنچى توغرا سىزىقنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بىلەن تىك كېسىشكەن جايدىكى قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىش سە - رىقىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



4. ھىپوفىز ئادەم بەدىنىدىكى توققۇز چوڭ سىستېمىنىڭ قوماندانى بولۇپ، بۇ رېفلېكس را - يونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ئۇيقۇ، يېمەك - ئىچمەك، ھەزىم قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردىكى رولى ناھايىتى چوڭ بولىدۇ. ئۇۋۇلىغاندا، پۇتنىڭ باش بارماق يۈمشىقى مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تە - رەپتىكى ئورۇننى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.



6. قالقانبەز رېفلېكس رايونىنى سېپىرىپ ئۇۋۇلىغاندا، ئىچكى ئاج - راتىلار تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش سە - ۋەبىدىن كېلىپچىققان باش ئاغ - رىش، باش قېيىش، يۈرەك ئېغىپ ئۇخلىيالماسلىق قاتارلىق كېسەل - لىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ۋە داۋا - لىغىلى بولىدۇ.

① سول قولنىڭ چوڭ بېلىقسىمان مۇسكۇلى كۈچلۈك ئۇۋۇلاپ غىدىقلىنىدۇ (سول تەرەپتىكى رە - سىمگە قاراك)، يەنى بارماق ئۇچى ئارقىلىق سول قولنىڭ بىرىنچى ئاللىقان سۆڭىكىنىڭ سۆڭەك ئار - لىقى توققۇز قېتىم كۈچەپ بېسىلىدۇ، غىدىقلاش جەريانىدا ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ قول ئورنى يۈرەك بىلەن ئوخشاش ئېگىزلىكتە بولۇشى كېرەك.

② قۇلاق سۇپۇرىسىنىڭ ئارقىسىدىكى قۇلاق سۇپۇرىسى بىلەن باش تۇتاشقان جايدىكى چېكىتىدە - مان ئويماق ئورۇننى، يەنى قان بېسىمىنى تۆۋەنلە - تىش ئېرىقچىسىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ ئۇۋۇ - لىغاندىمۇ قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش ئۈنۈمىگە ئې - رىشكىلى بولىدۇ.

كۆكرەك چىڭقىلىپ ئاغرىش

1. پۇتنىڭ دۈمبىسىدىكى بىرىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ كىچىك بېشىنىڭ ئىچى تەرىپى بىلەن بېشىنىچى تاپان سۆڭىكىنىڭ كىچىك بېشىنىڭ سىرتقى تەرىپى بويلاپ قوۋۇرغا رېفلىكس رايونىنى تېپىپ، ئىككى قولىمىز بىلەن بۇ رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.



رېفليکس رايونى

كېسەللەك رېفلىكس رايونى: قوۋۇرغا.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: دىئافراگما، ئاش-
قازان، ئۆپكە.



2. ئىككى قولىمىزنىڭ كۆر- سەتكۈچ بارمىقىنى ئېگىپ، بارماق بوغۇمى بىلەن بىرلا ۋاقىتتا دە- يافراگما رېفلىپكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلساق، كۆكرەك قىسمى چىڭ- قىلىش، قورساق كۆپۈش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى ئۈنۈملۈك يەسەيتكىلى بولىدۇ.

3. ئاۋۋال جىگەر رېفلىپ- كىس رايونى (ئوڭ پۇتىنىڭ ئاستىدا) نى تۆۋەندىن يۇقىر- رىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلاي- مىز، ئاندىن ئۆت رېفلىپكس رايونى (ئوڭ پۇتىنىڭ ئاستى- دا) نى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

4. ئۆپكە رېفلىپكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۆپكە رېفلىپكس رايونى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، يۆتەل، دەم سىقىلىش، ئۆپكە ياللۇ- غى قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئۇ- نۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

TIPS

ئاشقازان بىئارام بولۇش

ئاشقازان كۆپۈش، ئاشقازان ئاغرىش، ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان كىسلاتاسى ئېشىپ كېتىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئاشقازان بىئارام بولۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ كۆپىنچە ناچار يېمەك - ئىچمەك ئادىتى سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ. بىمار كۈندىلىك تۇرمۇشتا يېمەك - ئىچمەك تازىلىقىغا دىققەت قىلىشى كېرەك.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، قىزىلئۆڭگەچ. **مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى:** جىگەر، ئۆت، تال، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي (يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي، توغرا بوغماق ئۈچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، S سىمان بوغماق ئۈچەي، تۈز ئۈچەي).



1. ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇس - تىدىن ئاستىغا قاراپ تەرتىپ بويىچە ئۇ - ۋۇلاپ غىدىقلىساق، ئاشقازان بىئارام بولۇشنى ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولىدۇ.



2. پۇت بارمىقىدىن پۇتنىڭ دۈمبىسى يۆنىلىد -
شېگە قاراپ قىزىلئۆڭگەچ رېفلېكس رايونىنى سېيە -
رىپ ئۇۋۇلايمىز .

ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي ۋە قىزىلئۆڭگەچ كېسەللىك رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشتىن باشقا، يەنە جىگەر (ئوڭ پۇتنىڭ ئاستىدا)، ئۆت (ئوڭ پۇتنىڭ ئاستىدا)، تال (سول پۇتنىڭ ئاستىدا)، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مۇشۇ كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، ئاشقازاننىڭ ھەرىكىتىنى ئۈنۈملۈك كۈچەيتكىلى بولىدۇ.
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

جىگەر (64 - بەت)، ئۆت (64 - بەت)، تال (52 - بەت) ئىنچىكە ئۈچەي (52 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەت، ئوڭ پۇت 65 - بەت).

TIPS

1. قۇلاق قىسمىدىكى ئاشقازان رېفلېكس رايونىنى ئۆزىمىز بېسىپ ئۇۋۇلاپ سىناپ باقساق بولىدۇ. بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا ئاغرىقنى ھېس قىلساق ھەمدە قوللىمىزغا غەيرىي نەرسىلەر ئۇرۇنسا، بۇ چاغدا ئاشقازاننى ئاسراشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.

2. ئىككى - ئۈچ قوشۇق گۈرۈچ ھارىقىنى ئېلىپ، سۇس ئوتتا قايناتقاندىن كېيىن، تۇخۇمنىڭ ئېقىنى ئۇنىڭغا قۇيۇپ، ھەر كۈنى ئەتىگەندە بىر چىنىدىن ئىچسە بولىدۇ.

دېمى سىقىلىش، كۆكرەك چىڭقىلىش، نەپەس راۋان بولماسلىق



1. يۈرەك رېفلىكس رايونى
سول پۇتنىڭ ئالدى يېرىمى قىس-
مىغا جايلاشقان بولۇپ، ئۇۋۇلىغان
ۋاقىتتا ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ
ئاستا - ئاستا ئۇۋۇلايمىز.



3. كاناي رېفلىكس رايونى پۇتنىڭ دۈم-
بىسىدىكى بىرىنچى، ئىككىنچى تاپان سۆ-
ڭىكىنىڭ ئارىلىقىغا جايلاشقان ھەمدە بى-
رىنچى، ئىككىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئۆزگىچە
قىسمىدىكى رايونغا سوزۇلغان. ئۇۋۇلىغاندا
پۇتنىڭ دۈمبىسىنى بويلاپ پۇتنىڭ بارمىقىغا
قاراپ سېرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

دېمى سىقىلىش، كۆكرەك چىڭقىلىش، نە-
پەس راۋان بولماسلىق قاتارلىقلار سۈيىيىكتىپ
تۇيغۇدىن ئىبارەت. بۇلار ھاۋا ياخشى ئۆتۈش-
مەسلىك، يۈرەك ياكى ئۆپكەننىڭ ئىقتىدارى
چېكىنىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن كېلىپچىقىد-
ىدىغان بولۇپ، ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالارنىڭ
ئىقتىدار خاراكتېرلىك ئىپادىسى، شۇنداقلا
ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالاردا كېسەللىك ئۆزگى-
رىشى يۈز بەرگەندە كۆرۈلىدىغان دەسلەپكى
كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ بىرى.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: يۈرەك، ئۆپكە، كاناي، كا-
نايچە.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: جىگەر، چوڭ ئۇچەي
(يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۇچەي، توغرا بوغماق ئۇچەي، S
سىمان بوغماق ئۇچەي، تۈز ئۇچەي).



2. ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى ئىچىدىن
سىرتىغا قاراپ ئاستا - ئاستا ئۇۋۇلايمىز.
ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ
غىدىقلاپ بەرگەندە، دېمى سىقىلىش، يۆتەل،
ئۆپكە ۋە نەپەس يوللىرى كېسەللىرىنى
ئۈنۈملۈك داۋالىغىلى بولىدۇ.



4. ئىككى قولىمىزنىڭ باش بارمىدىكى بىلەن بىرلا ۋاقىتتا كانايچە رېڭلەپ-كەس رايونىنى يۇقىرىغا قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.



5. ئۇۋۇلىغان ۋاقىتتا، ئوڭ پۇتنىڭ ئاستىغا جايلاشقان جىگەر ۋە ئۆت رېڭلەپكەس رايونىنى بىرلىكتە ئۇۋۇلاپ تەڭ-شەش لازىم. ئالدى بىلەن جىگەر رېڭلەپكەس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئاندىن ئۆت رېڭلەپكەس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.



6. سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە، ئاۋۋال سول پۇتنىڭ ئاستىغا جايلاشقان توغرا بوغماق ئۈچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، S شىمان بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېڭلەپكەس رايونلىرىنى سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئاندىن ئوڭ پۇتنىڭ ئاستىدىكى يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي رېڭلەپكەس رايونى ۋە توغرا بوغماق ئۈچەي رېڭلەپكەس رايونىنى سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.

قورساق غورۇلداش

ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشى كۈچىيىپ كېتىپ قورساقتىن غورۇلدىغان ئاۋاز چىقىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە قورساق كۆپۈۋالىدۇ، ئۈچەينىڭ ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىش، قورساق ئاغرىش، قەۋزىيەت، ئىشتىھا تۆۋەنلەش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ئاشقازان، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى.




1. ئىنچىكە ئۈچەي رېفلىكس رايونى 1 -
2. شىناسمان سۆڭەك ۋە كۈبىكىسىمان سۆڭەك بىلەن ئۆكچە سۆڭىكى ئارىسىدىكى ئويىمان ئورۇنغا جايلاشقان، ئۇۋۇلىغاندا، قوللىرىنىڭ تۆت بارمىقىنىڭ بوغۇمى بىلەن ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلىساق بولىدۇ.



2. چوڭ ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىساق، ئاشقازان ۋە ئۈچەيدىكى بىئاراملىقنى پەسەيتىشكە مەلۇم دەرىجىدە ئۈنۈم بېرىدۇ. ئۇۋۇلىغان چاغدا، ئاۋۋال سول پۇتنىڭ ئاستىدىكى توغرا بوغماق ئۈچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، S سىمان بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونلىرىنى تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلايمىز، ئاندىن يەنە ئوڭ پۇتنىڭ ئاستىدىكى يۇقىرىلىگۈچى بوغماق ئۈچەي ۋە توغرا بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونلىرىنى تەرتىپ بويىچە ئۇۋۇلايمىز.



3. ئاشقازان، ئۇيغۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي قاتارلىق ئۈچ رېڭلېكس رايونى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ بىر - بىرىگە تۇتىشىپ كەتكەن بولۇپ، ئۇۋۇ - لىغاندا ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ تەرتىپ بويىچە قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.



4. قولنىڭ باش بارمىقىنى بىرلا ۋاقىتتا قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېگىشى رېڭلېكس رايونىنىڭ تۆۋەن تەرىپىگە قويۇپ، رەسىمدە كۆرسىتىلگەن يۆنىلىش بويىچە ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئەگەر كېسەللىك ئېغىر بولسا، ئۇۋۇلاش قېتىم سا - نىنى مۇۋاپىق كۆپەيتسەك بولىدۇ.

قورساق كۆپۈش، قورساق ئاغ- رىش، ئىچ سۈرۈش

بۇ خىل كېسەللىك ياز ۋە كۈز پە-
سىللىرىدە كۆپ كۆرۈلىدىغان بولۇپ،
كۆپىنچە ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىش ياكى
ئاشقازان - ئۈچەينىڭ ئىقتىدارى تو-
سالغۇغا ئۇچراش سەۋەبىدىن كېلىپچە-
قىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئاشقازان، ئۇيقۇ-
لۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي،
چوڭ ئۈچەي.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: قورساق بوش-
لۇقى نېرۋا چىگىشى، تۆۋەنكى قورساق بوشلۇقى.



1. ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق
ئۈچەيدىن ئىبارەت بۇ رېفلىكس رايونلىرى ئايرىم -
ئايرىم ھالدا قالقانبەز رېفلىكس رايونىنىڭ ئاس-
تىدىكى بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى توغرا
بارماق رايونلىرىغا جايلاشقان، ئۇۋۇلىغاندا ئۈس-
تىدىن ئاستىغا قاراپ تەرتىپ بويىچە قىرىپ ئۇ-
ۋۇلساقلا بولىدۇ.



3. چوڭ ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ئۇ-
ۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، قورساق ئاغرىقى، ئىچ
سۈرۈشنى ئۈنۈملۈك داۋالىغىلى بولىدۇ. بۇ
رېفلىكس رايونىنى سائەت ئىستىرپلىكىسىنىڭ
يۆنىلىشى بويىچە سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.



2. قولىمىزنىڭ تۆت بارمىقىنىڭ بوغۇمى بىلەن
ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ ئىنچىكە ئۈچەي رېفلىكس
رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا ئۇ-
ۋۇلاش كۈچىنىڭ تەكشى چۈشۈشىگە دىققەت قىلىش-
مىز كېرەك.

4. قولىمىزنىڭ باش بارمىقىنى قورساق بوشلۇقى ئېرۇا چىگىشى رېڭلېكىس رايونىنىڭ باشلىنىش ئورنىغا قويۇپ، رە- سىمدە كۆرسىتىلگەن يۆنىلىش بويىچە 3 — 5 قېتىمغىچە ئۇۋۇلايمىز. ئەگەر كېسەللىك ئېغىر بولسا، ئۇۋۇلاش قېتىم سانىنى مۇۋاپىق كۆپەيتسەك بولىدۇ.

TIPS

1. ئۈچەي چاپلىشىپ قېلىش، ئۈچەي كەپلىشىپ قېلىش كېسەللىكىگە گىرىپتار بولۇش مۇمكىنچىلىكىنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق لازىم، ئەگەر بىماردا ئۇزۇن مەزگىل قور- ساق ئاغرىش، قورساق كۆپۈش ئەھۋالى كۆرۈلگەن بولسا، دەل ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا بېرىپ مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈشلەرنى ئېلىپ بېرىشى.

2. ئىچى سۈرگەندە، چۈكىنى ئېلىپ ئۆكچە سىڭىرىنىڭ يان تەرىپىدىكى ئاغرىققا سەزگۈر نۇقتىسىغا ئۇرىمىز، ئادەتتە 18 قېتىم ئەتراپىدا ئۇرۇپ قويسا، ئىچ سۈرۈشنى ئۈنۈملۈك توختاتقىلى بولىدۇ.



5. ئىككى پۇتنىڭ تاشقى بو- غۇمىدىن ئۈستىگە سەككىز ساند- تىمپىتىر كېلىدىغان ئورۇندىكى تۆۋەنكى قورساق قىسمى رېڭلېكىس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



قورساق سېلىش

بەدەندىكى ماينىڭ قورساق قىسمىغا يىغىلىپ قېلىشىنى كىشىلەر دائىم «قورساق سېلىش» دەپ ئاتايدۇ، يېمەك - ئىچمەكنى كۆپ مىقداردا ئىستېمال قىلىش، مايلىق يېمەكلىكلەرنى كۆپ يېيىش، ھەرىكەت ئاز بولۇش قاتارلىقلار - نىڭ ھەممىسى قورساق سېلىپ سەمرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: قالقانبەز.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ئاشقازان، ئۇيغۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، تال، جىگەر، ئۆت، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، تۆۋەنكى قورساق بوشلۇقى.

قالقانبەز رېفلىكس رايونى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ ئۇۋۇلىنىدۇ. ئەگەر بۇ رايوننى ئۇۋۇلاش جەريانىدا قاتتىق ھۇررەك قاتارلىق مۇسبەتلىك ئۆزگىرىشلەر بايقالسا، ئۇۋۇلاشنى تاكى ئاشۇ قاتتىق ھۇررەك يۇمشىغانغا قەدەر داۋاملاشتۇرۇش لازىم.

قالقانبەز رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە ئاشقازان، ئۇيغۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، تال، جىگەر، ئۆت، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، تۆۋەنكى قورساق بوشلۇقى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاش (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ) ئارقىلىق ئاشقازان بىلەن ئۈچەينىڭ ھەزىم قىلىش ۋە ئوزۇقلۇق قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى

ئاشقازان (52 - بەت)، ئۇيغۇلۇق (52 - بەت)، 12 بارماق ئۈچەي (52 - بەت)، تال (52 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، ئۆت (64 - بەت)، ئىنچىكە ئۈچەي (40 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەت، ئوڭ پۇت 65 - بەت)، تۆۋەنكى قورساق بوشلۇقى (59 - بەت).

TIPS

1. يۇقىرىقى قورساق قىسمىدىكى ئارتۇقچە گۆش ئوڭ - سولغا مۇجۇپ ئۇۋۇلىنىدۇ، تۆۋەنكى قورساق قىسمىدىكى ئارتۇقچە گۆش ئوڭ يۆنىلىشتە 100 قېتىم، تەنۇر يۆنىلىشتە 100 قېتىم مۇجۇپ ئۇۋۇلىنىدۇ.
2. تېلۇپەر يوپۇرمىقى ۋە لۇڭبەندىس مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيى ئىچىپ بەرسە، ماينى تۈتۈملۈك سېيرىدۇ.



جىگەرنى ماي قاپلاش، جىگەر ئىسپىرتتىن - دورىدىن زەھەرلىنىش

جىگەرنى ماي قاپلاش، جىگەر ئىسپىرتتىن - دورىدىن زەھەرلىنىش قاتار - لىقلارنىڭ كېسەللىك ئالامىتى كۆپىنچە ئاسان چارچاش ھەمدە جىگەر ئاغرىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. مايلىق يېمەكلىكنى كۆپ يېگەندە ئاسانلا جىگەرنى ماي قاپلايدۇ، ھاراقنى كۆپ ئىچسە ئاسانلا ئىسپىرتتىن زەھەرلىنىش كېلىپچىقەدۇ، دورىلارنى ئىستېمال قىلغاندا دىققەت قىلىمسا، جىگەر ھۆجەيرىلىرى بۇز - غۇنچىلىققا ئۇچراپ، دورىدىن زەھەرلىنىش كېلىپچىقىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: جىگەر، ئۆت.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بەزى، تال، ئاشقازان، ئۇيۇقلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، ئۈستۈنكى بەدەن لىمفا بەزى.

جىگەر بىئارام بولسا ئوڭ پۇتنىڭ ئاستىدىكى جىگەر رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق تەڭشەپ داۋالاش ئېلىپ بارساق بولىدۇ. ئۇۋۇلغان چاغدا، بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ بارماق قىسمىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىزدا ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ جىگەر رېفلىكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئاندىن ئۆت رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

جىگەر، ئۆت قاتارلىق كېسەللىك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندىن باشقا، يەنە بۆرەك ئۈستى بەزى - زى، تال، ئاشقازان، ئۇيۇقلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، ئۈستۈنكى بەدەن لىمفا بەزى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاش ئارقىلىق (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابىنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، بەدەننىڭ يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جىگەرنىڭ يۈكىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى

بۆرەك ئۈستى بەزى (38 - بەت)، تال (52 - بەت)، ئاش - قازان (52 - بەت)، ئۇيۇقلۇق (52 - بەت)، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي (52 - بەت)، ئىنچىكە ئۈچەي (52 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت قىسمى 53 - بەت، ئوڭ پۇت قىسمى 65 - بەت)، ئۈستۈنكى بەدەندىكى لىمفا (62 - بەت).

TIPS

كۈندىلىك تۇرمۇشتا جىگەرنى ئاسراش ۋە يەرۈش قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم. ھاراقنى ئاز قىچىش، ئەخەت يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىش ياكى يېمەكلىك زۇرۇر. بەدەندە ساقسىزلىق كۆرۈلسە، دورىنىڭ بەدەنگە بولغان زىيىنىنى ئازايتىش ئۈچۈن - ئامالنىڭ بارىچە دورىنى ئاز يېيىش كىرەك.

بەل ئاغرىشى، بەل چىم بولۇش

بەل ئاغرىش، بەل چىم بولۇش كېسەل -
لىكى قايتا - قايتا قوزغىلىدىغان بولۇپ،
بىمارنىڭ بەل قىسمىنىڭ ھەرىكىتى
چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ، بۇ كېسەللىك كۆ -
پىنچە ھېرىپ - چارچىغاندىن كېيىن ئې -
غىرلايدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئومۇرتقا تۇۋرۇكى
(كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، قۇيرۇق سۆ -
ڭىكى، توققۇز كۆز سۆڭىكى).
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك، جىگەر،
تال، پاقالچاق قىسمىدىكى ئارقا دۈمبە رېفلىكس رايونى



2. بۆرەك رېفلىكس رايونى پۇت ئاستىدىكى
ئۈچىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرىسىنىڭ تۆۋەن
تەرىپىگە جايلاشقان ھەمدە ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى
تاپان سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىققىچە سو -
زۇلغان بولۇپ، يېرىم چەمبەر شەكلىدە كۆرۈنىدۇ.
ئۇۋۇلىغان چاغدا، ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ ئۇۋۇ -
لساقلا بولىدۇ.

1. پۇت بارماقلىرىدىن پۇت
ئۆكچىسى يۆنىلىشىنى بويلاپ،
ئالدىدىن ئارقا تەرەپكە قاراپ،
كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئو -
مۇرتقىسى، قۇيرۇق سۆڭىكى،
توققۇز كۆز سۆڭىكى قاتار -
لىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئو -
مۇرتقا تۇۋرۇكى رېفلىكس رايو -
نىنى سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.



4. بىر قولىمىزدا پۇتنىڭ ئالدىنى چىڭ تىرەپ تۇتۇپ، يەنە بىر قولىمىزدا تال رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.



3. جىگەر رېفلېكس رايونى ئوڭ پۇت تۆتىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭەك-كىنىڭ ئارىسىغا جايلاشقان بولۇپ، ئۇۋۇلغان چاغدا، ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.



TIPS

ئىككى قولىدىكى ئىككىنچى ئالدىن سۆڭەك (ئۈستىدىكى رەسىمگە قاراڭ) نى سېپىرىپ ئۇۋۇ - لىسىمۇ بەل ئاغرىش، بەل چىم بولۇشنى داۋالىغىلى بولىدۇ. ئىككىنچى ئالدىن سۆڭەكنى بېسىپ ئۇۋۇلغان چاغدا، قول دۈمبىسىدىكى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ تۈۋىنى بويلاپ ئاستا - ئاستا بېغىش قىلىنغىچە سېپىرىپ ئۇۋۇلساق، بۇ ۋاقىتتا بىر پۈتۈن سۆڭەك ئېنىق ھالدا ئۇۋۇلغان قولغا بىلىنىدۇ. بۇ دەل ئىككىنچى ئالدىن سۆڭەكتىن ئىبارەت. ئۇۋۇلغان جايدا ئەگەر قاتتىق ھۆررەك بايقالسا، ئۇنى ئاستا - ئاستا ئۇۋۇلاپ بۇشىتىش لازىم.

5. ئۇۋۇلانغۇچىنى ئوڭىدىسىغا ياتقۇزۇپ، پاقالچاق قىسمى (ئۈستى تەرىپى، ئىچى تەرىپى، سىرتقى تەرىپى) دىكى دۈمبە رېفلېكس رايون-لىرىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىش

ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغ-
رىش ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىلىرىدا
كېسەللىك ئۆزگىرىشى يۈز بېرىشنى
كۆرسىتىدۇ، كېسەللىك قوزغالغان
ئورۇن كۆپىنچە ساغرا قىسمى، يوتە-
نىڭ ئارقا تەرىپى، پۈتتىڭ سىرتقى
تەرىپى، پاچاقنىڭ ئارقا سىرتقى
تەرىپى قاتارلىق جايلاردا بولىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: ئولتۇرغۇچ
سۆڭەك نېرۋىسى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: بۆرەك.



3. بۆرەك رېفلېكس رايونىنى ئۈستىدىن
ئاستىغا قاراپ ناھايىتى تەبىئىي ھالدا يېرىم
چەمبەر شەكلىدە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، بۇ ئۇسۇل
ئارقىلىق بۆرەك ۋە باشقا ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى
كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

1. كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمى بىلەن
سىرتقى تەرەپتىكى ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋى-
سى رېفلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قا-
راپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



2. ئىچكى تەرەپتىكى ئولتۇرغۇچ سۆڭەك
نېرۋىسى رېفلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا
قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

قول بارمىقىنىڭ تىرىقى بىلەن قۇلاق قىسمىدىكى ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى رېفلېكس رايونى-
نى يېمىپ ئۇۋۇلىغاندا، ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىقىنى تېز سۈرئەتتە پەسەيتكىلى بولىدۇ.

يانپاش بوغۇمى ئاغرىش

يانپاش بوغۇمى ئادەتتە سۆڭەكچى بوغۇمى دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ئۇ ئىككى پۇت بىلەن بەدەننى تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان ئورۇنغا جايلاشقان بولۇپ، ئادەم بەدىنىدىكى ئەڭ مۇھىم بوغۇمدۇر، بۇ بوغۇمنىڭ تاشقى زەخمىگە ئۇچراش ۋە كېسەللىك قوزغىلىش نىسبىتى بىرقەدەر يۇقىرى بولىدۇ. يانپاش بوغۇمى ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكلەر يانپاش بوغۇمى كېسەللىك ئۆزگىرىشى، يوتا سۆڭىكى بوغۇمى ياللۇغى، يوتا سۆڭەك بېشى چىرىش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: سىرتقى يانپاش بوغۇمى، ئىچكى يانپاش بوغۇمى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك، ئومۇرتقا تۈۋرۈكى.



2. باش بارىمقىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئىچكى تەرىپىدىكى ئوشۇق سۆڭىكىنىڭ ئاستىغا جايلاشقان يېرىم چەمبەر شەكىلىدىكى ئىچكى يانپاش بوغۇمى رېفلىكس رايونىنى رەسمىدىكى كۆرسەتكۈچ ئىستىرىپلىكىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.

1. باش بارىمقىمىز بىلەن پۇتنىڭ سىرتقى ئوشۇق سۆڭىكىنىڭ ئۈستىنى بويلاپ، سىرتقى يانپاش بوغۇمى رېفلىكس رايونىنى يېنىك سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. سىرتقى يانپاش بوغۇمى رېفلىكس رايونىنى ئۇزۇن مۇددەت ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، بەل ئاغرىقى، ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى ئاغرىش، يانپاش بوغۇمى ئاغرىقى قاتارلىقلارنى ئۈنۈملۈك ياخشىلىغىلى بولىدۇ.



3. بۆرەك رېڭلىق رايونىنى ئۇۋۇلد-
غان چاغدا، ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ يې-
رىم چەمبەر شەكلىدە ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

4. باش بارمىقىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئىچى تەرىپىدىكى ئو-
مۇرتقا تۇۋرۇكى رېڭلىق رايونىنى بويلاپ ئالدىدىن ئارقىغا قا-
راپ، كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، توققۇز كۆز سۆ-
ڭىكى، قۇيرۇق سۆڭىكى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئو-
مۇرتقا تۇۋرۇكى رېڭلىق رايونىنى تەكرار سېرىپ ئۇۋۇلايمىز.
بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلىغاندا، بەل ئومۇرتقا تەخسىسى پۇلتىيىپ چى-
قىش، بويۇن ئومۇرتقا كېسەللىكى ۋە ئومۇرتقا تۇۋرۇكى زەخمى-
لىنىشتىن كېلىپچىققان باش قېيىش، قول ئۇيۇشۇش قاتارلىق
ئالاقىدار ئەگەشمە كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاشتا ئۈنۈمى كۆ-
رۈنەرلىك بولىدۇ.



TIPS

بەدەندە كېسەللىك كۆرۈلۈپ، ھورمۇن تۈرىدىكى دورىلارنى ئىستېمال قىلغاندا سۆڭەك شالاڭلىشىشى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ چاغدا پانچاش بوغۇمى رېڭلىق رايونىنى كۆپرەك ئۇۋۇلاپ بېرىشكە توغرا كېلىدۇ.

بوۋاسىر

ئىچكى بوۋاسىر كۆپىنچە چوڭ تەرەتكە ئاغرىتماي قان ئارىلاش كېلىش، ئارىلاپ قان ئارىلاش كېلىش، قاننىڭ رەڭگى توق قىزىل بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر بىلەن ئىپادىلىنىدۇ، ياكى سۈرتكەن تازىلىق قەغىزى قانغا بويدىلىپ، قەغەز دە قان يۇقى بولىدۇ؛ تاشقى بوۋا - سىردا كۆپىنچە مەقئەت تۆۋەنگە ساڭگىلاپ قېلىش، مەقئەتتە غەيرىي نەرسە باردەك ھېس قىلىش، قىسمەن جايلىرى قىچىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ، مەقئەتتە قان مونەكچىلىرى، سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولغاندا ئاغرىق ھەسسەلەپ كۈچىيىدۇ.



1. باش بارماق بىلەن پۇتنىڭ ئىچكى تەرىپىدىكى ئوشۇقنىڭ ئۈستى تەرىپىگە جايلاشقان تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى سېيرىپ ئۇ-ۋۇلايمىز.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: مەقئەت، تۈز ئۈچەينىڭ مەقئەت قىسمى (سول ئىچكى تەرەپ).
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ئۆپكە، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي.

2. سول پۇت ئۆكچە سۆڭىكىنىڭ ئالدى گىرۋىكى، تۈز ئۈچەي ۋە S سىمان بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونىنىڭ ئاخىرقى ئۈچىدىكى مەقئەت رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.





3. ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇ-
ۋۇلايمىز. بۇ رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇ-
ۋۇلاپ بەرگەندە نەپەس يولى كېسەللىكلەردە-
نىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.



4. قولنىڭ تۆت بارمىقىنى ئېگىپ،
قول بوغۇمى ئارقىلىق ئىنچىكە ئۈچەي
رېفلىكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قا-
راپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئۇۋۇلاش ئۇسۇ-
لىنى يەنە ئاستا خاراكتېرلىك ئۈچەي يال-
لۇغى ۋە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن كې-
لىپچىققان كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ دا-
ۋالاشقا ئىشلىتىشكەمۇ بولىدۇ.

5. سول پۇتتىكى توغرا بوغماق ئۈچەي رېف-
لىكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ تەرتىپ
بويىچە سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق
ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ
سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز، S شىمان بوغماق ئۈچەي بىلەن
تۈز ئۈچەي رېفلىكس رايونىنى سىرتىدىن ئىچىگە
قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئەڭ ئاخىرىدا مەقئە
رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. ئارقىدىنلا
ئوڭ پۇتقا جايلاشقان يۇقىرىلىگۈچى بوغماق ئۈچەي
ۋە توغرا بوغماق ئۈچەي رېفلىكس رايونلىرىنى
سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

1. ئوتتۇرىسىدا ئۆشۈكى بار ئورۇندۇقنى تېپىپ، ئورۇندۇقنىڭ ئاستىغا چوڭ - كىچىكلىكى مۇ-
ۋاپىق بولغان بىر چېلەكنى قويۇپ، بىر تال قاتتىق قەغەزنى چېلەكنىڭ تەگلىكىگە مۇقىملاشتۇرغاندىن
كېيىن چېلەكنى سەل ئۈستىگە كۆتۈرۈپ، چېلەكنىڭ گىرۋىكى بىلەن ئورۇندۇق ھېم كەلتۈرۈلىدۇ،
ئاندىن بىر سۇڭ ئۇزۇنلۇقتىكى موكسا (تېمىي دورا) تايىمىغا ئوت تۇتاشتۇرۇلۇپ، بۇ تاياق قاتتىق قە-
غەزگە سانجىلىدۇ. بىمارنى ئورۇندۇقتا ئولتۇرغۇزغاندىن كېيىن، دورا ئىسى بىلەن مەقئە قىسمى
ئىسلىنىدۇ، بۇ ئۇسۇل ئىچكى ۋە تاشقى بوۋاسىرنى تەڭشەپ داۋالاشقا ئوخشاشلا ئۈنۈم بىرىدۇ.
2. ھەر كۈنى 3 — 4 ئال ئىنجۇر يوپۇرمىقىنى سۇدا قاينىتىپ، مەقئە قىسمىنى دورا سۈيىگە
چىلاپ ۋاننا قىلسا ياكى يۇسا بولىدۇ.

قەۋزىيەت

قەۋزىيەت ئادەتتە چوڭ تەرەتنىڭ قېتىم سانى ۋە مىقدارى ئازىيىش، چوڭ تەرەت قۇرغاق كېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. چوڭ تەرەت قىلىمىغان ۋاقىت 24 سائەتتىن ئېشىپ كەتكەن بولسا، بۇنى قەۋزىيەت بولغان دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئەگەر ئۇزۇن مۇددەت چوڭ تەرەت راۋان بولمىسا، بۇ ئادەت خاراكەت تېرىلىك قەۋزىيەت دەپ ئاتىلىدۇ.

رېڭلىك رايونى

كېسەللىك رېڭلىك رايونى: چوڭ ئۇچەي، مۇناسىۋەتلىك رېڭلىك رايونى، ئۆپكە، ئاشقازان، ئون ئىككى بارماق ئۇچەي، ئىنچىكە ئۇچەي، مەقئەت، تۈز ئۇچەينىڭ مەقئەت قىسمى (پۇتنىڭ ئىچكى تەرىپىدە)، تۆۋەنكى قورساق قىسمى (پۇتنىڭ ئىچكى تەرىپىدە)، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى.

بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ بارماق قىسمىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە چوڭ ئۇچەي رېڭلىك رايونى (سول پۇتنىڭ توغرا بوغماق ئۇچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۇچەي، S سىمان بوغماق ئۇچەي، تۈز ئۇچەي رېڭلىك رايونلىرى، ئوڭ پۇتنىڭ توغرا بوغماق ئۇچەي، يۇقىرىلىگۈچى بوغماق ئۇچەي رېڭلىك رايونلىرى) نى تەرتىپ بويىچە سېرىپ ئۇ-ۋۇلايمىز، چوڭ ئۇچەي رېڭلىك رايونىنى دائىم غىدىقلاپ ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، قەۋزىيەتنىڭ كېسەللىك ئالاھىدىلىكلىرىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولىدۇ.

چوڭ ئۇچەينىڭ كېسەللىك رېڭلىك رايونىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە ئۆپكە، ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۇچەي، ئىنچىكە ئۇچەي، مەقئەت، تۈز ئۇچەينىڭ مەقئەت قىسمى، تۆۋەنكى قورساق قىسمى، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڭلىك رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇ-ۋۇلاپ غىدىقلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، ئاشقازان ۋە ئۇچەينىڭ لۇمبۇلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قەۋزىيەتنى داۋالاش رولىنى ئوينايدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى :

ئۆپكە (49 - بەت)، ئاشقازان (52 - بەت)، ئاشقازان ئاستى بېزى (52 - بەت)، ئون ئىككى بارماق ئۇچەي (52 - بەت)، ئىنچىكە ئۇچەي (52 - بەت)، مەقئەت (52 - بەت)، پۇتنىڭ ئىچكى تەرىپىدىكى تۈز ئۇچەينىڭ مەقئەت قىسمى (56 - بەت)، پۇتنىڭ تاشقى تەرىپىدىكى تۆۋەنكى قورساق قىسمى (59 - بەت)، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چىگىشى (38 - بەت).

TIPS

قورساققا بىر قەۋەت رەخنى بېسىپ، ئوتتۇرا بارماقنى شېنجۇ پىللىسى (يەنى كىندىك ئورنى، بۇ يەنە كىندىك مەركىزى دېيىلىدىغان) بولۇپ، ئادەم يەنىدىكى پىللىلەر ئىچىدە مۇھىم پەللە ھېسابلىنىدۇ (ئورنىغا قويۇپ، ئارراق ئۇۋۇلاپ غىدىقلىسا بولىدۇ).

پات - پات سىيەش، سۈيدۈك قىستاش، سۈيدۈك ئاغرىتىپ كېلىش، سۈيدۈك يىغىلىپ قېلىش (دوۋساق ئۈنۈپرسال كېسەللىكى)

بۇنىڭدا پات - پات سىيەش، كىچىك تەرەت قېتىم سانى كۆپ بولۇش، سۈي-
دۈك قىستاش ياكى چوڭ - كىچىك تەرەتنى تۇتالما سلىق قاتارلىق ئەھۋاللار
كۆرۈلىدۇ، بۇلارغا قوشۇلۇپ يەنە سۈيدۈك ئاغرىتىپ كېلىدۇ؛ كىچىك تەرەت
قىلغاندا ئاغرىيدۇ، ھەتتا پۈتۈن بەدەن توڭلىغاندەك بولۇپ، سۈيدۈك مىقدارى
ئازلايدۇ؛ سۈيدۈك يىغىلىپ قېلىپ، كىچىك تەرەت قىلىش قىيىنلىشىدۇ ياكى
سۈيدۈك تامچىلاپ راۋان بولمايدۇ، ئېغىر بولغاندا سۈنئىي ئۇسۇلدا سۈيدۈك
ھەيدەشكە توغرا كېلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: دوۋساق، سۈيدۈك يولى، جىنسىي يول.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك ئۈستى يېزى، قورساق بوشلۇقى نېرۋا چېگىشى.

1. كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمى بى-
لەن ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ دوۋساق
رېفلىكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

1. مەقشەتنى كۆتۈرۈش
ھەرىكىتىنى داۋاملىق ئىشلەپ
بەرگەندە، قورۇغۇچى مۇم-
كۈلنىڭ ئىقتىدارىنى كۈ-
چەيتكىلى بولىدۇ.
2. ئىسسىق سۇدا ئەۋرەت-
نى ۋاننىلاش ياكى چىلاپ بى-
رىش لازىم. ۋاقىتنى بىمار
ئۆزىنىڭ ئەھۋالىغا قارىتا
بېكىتسە بولىدۇ.





2. پۇتنىڭ ئىچى تەرد -
چىدىكى دوۋساق رېڭلېكس
رايونىدىن يانپاش بوغۇمى
رېڭلېكس رايونىنىڭ يان
ئۈستى يۆنىلىشىنى بويلاپ،
سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي
يول رېڭلېكس رايونىنى
سېرىپ ئۇۋۇلايمىز.

3. ئىككى قولىنىڭ ئور -
نىنى ئالماشتۇرۇپ، بۆرەك
ئۈستى بېزى رېڭلېكس رايونى -
نىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

4. قولىنىڭ باش بارمىقىنى
بىرلا ۋاقىتتا قورساق بوشلۇقى
نېرۋا چېگىشى رېڭلېكس رايونى -
نىڭ ئاستى تەرىپىگە قويۇپ،
رەسىمدە كۆرسىتىلگەن يۆنىلىش
بويىچە ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ
3 — 5 قېتىمغىچە ئۇۋۇلايمىز.
ئەگەر كېسەللىك ئېغىر بولسا،
ئۇۋۇلاش قېتىم سانىنى مۇۋاپىق
كۆپەيتسەك بولىدۇ.

تىز بوغۇمى ياللۇغى

تىز بوغۇمى ياللۇغىدا ئاساسەن تىز بوغۇمى ئىششىپ قىزىپ ئاغرىش، تىز بوغۇمىنىڭ ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ياش-لىق دەۋرىدە تىز بوغۇمى كۆپىنچە ئىششىمايلا ئاغرىيدۇ، بۇ بىر خىل ئۆسۈپ يېتىلىش دەۋرىدىكى ئاغرىق بولۇپ كېسەللىك ئالامىتى ئەمەس؛ قېرىلىق دەۋرىگە يەتكەندە چېكىنىش خاراكتېرلىك كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى يۈز بېرىدۇ، مەسىلەن: سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقى خالتىسى ياللۇغى، سۆڭەك ئۆسۈكچىسى چوڭىيىش، بوغۇملار ئىششىش قاتارلىق كېسەللىكلەر كۆرۈلۈپ، بىمارنىڭ ھەرىكىتى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: تىز بوغۇمى.

مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: بۆرەك، يانپاش بوغۇمى، ئومۇرتقا تۈۋرۈكى.

1. تىز بوغۇمى رېفلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.





3. بىر قولىمىز بىلەن پۇتىنىڭ بارمىقىنى سەل بوش ھالەتتە تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىزنىڭ باش بارمىقى بىلەن يېرىم ئاي شەكلىدىكى ئىچكى يانپاش بوغۇمى رېفلېكس رايونىنى ئالدىدىن ئارقىغا قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئارقىدىنلا رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك يۆنىلىش بويىچە باش بارمىقىمىز بىلەن سىرتقى يانپاش بوغۇمى رېفلېكس رايونىنى ئاستا - ئاستا سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.



4. باش بارماق ئارقىلىق ئو- مۇرتقا تۇۋرۇكى رېفلېكس رايونىنى ئالدىدىن ئارقىغا قاراپ داۋاملىق سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئورۇننى ئو- ۋۇلساق، بويۇن ئومۇرتقا ۋە بەل ئو- مۇرتقا كېسەللىكىنى تەڭشەپ دا- ۋالاشتا ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.



2. پۇتىنىڭ ئالدىقىنىغا جايلاشقان «人» خەت شەكىللىك كېسىشمە جاي- نىڭ ئاستىدىكى ئويىمان ئورۇنغا جايلاشقان بۆرەك رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

1. تىز بوغۇمى رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئەگەر ئو- ۋۇلانغۇچى رېفلېكس رايونىنىڭ ئالدى تەرىپىنىڭ ئاغرىۋاتقانلىقىنى سەزسە، بۇ ئۇنىڭ تىز بوغۇمىنىڭ ئىچى تەرىپىدە ياللۇغ بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ؛ ئەگەر رېفلېكس رايونىنىڭ ئوتتۇرىسىنىڭ ئاغرىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلسا، تىز بوغۇمىنىڭ ئالدى تەرىپىدە ياللۇغ بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ، ئەگەر رېفلېكس رايونىنىڭ ئارقا تەرىپى ئاغرىسا، تىز بوغۇمىنىڭ سىرتقى تەرىپىدە ياللۇغ بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. تىز بوغۇمىدا سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلگەندە، سۇنى تارتىپ ئېلىۋېتىپ داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىش تەشەببۇس قىلىنمايدۇ، بۇ چاغدا پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنى ئاساس قىلىپ، سۇلۇق ئىششىقنى تۈگىتىش كېرەك.

2. ئىككى پۇتنى جۈپلەپ زوڭغىزىپ ئولتۇرۇپ، ئىككى قولىنى تىزنىڭ ئۈستىگە ئاستا قويۇپ، تىزنى مەركەز قىلىپ، سولغا 12 قېتىم، ئاندىن ئوڭغا 12 قېتىم ئايلاندۇرۇلىدۇ. تىزنى ئايلاندۇرغاندا ساغرا قىسمى مىدىرلىماسلىقى لازىم. تىزنى ئايلاندۇرۇش ھەرىكىتىنى داۋاملىق ئىشلەپ بەرگەندە، تىز بوغۇمىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، توسالغۇلارنى راۋانلاشتۇرغىلى، بوغۇم ياللۇغى ۋە سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقى پەردىسى ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ھەم ئۇنى داۋالغىلى بولىدۇ.

يەللىك بوغۇم ئاغرىقى

بەدەندىكى سۈيدۈك كىسلاتاسىنىڭ مىقدارى زىيادە ئېشىپ كېتىش يەللىك بوغۇم ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بىۋاسىتە سەۋەبتىن ئىبارەت. سۈي-دۈك كىسلاتا ئاساسەن مېتابولىزم جەريانىدا يېمەكلىكلەر تەركىبىدىكى پۇرىن-دىن پەيدا بولىدۇ، دائىم دېڭىز مەھسۇلاتلىرى، يەلقازان شورپىسى، ھايۋانات جىگىرى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىدىغانلارنىڭ بەدىنىدە زور مىقداردا پۇرىن پەيدا بولىدۇ. بۇخىل يۇقىرى پۇرىنلىق يېمەكلىكلەر ھەزم قىلىنىش جەريانىدا ئەڭ ئاخىرىدا سۈيدۈك كىسلاتاسىغا ئايلىنىدۇ. ئادەم بەدىنىنىڭ سىرتقا چىقىرىۋېتىش ئىقتىدارى دائىرىسىدىن ئېشىپ كەتكەن ئارتۇقچە سۈيدۈك كىسلاتا سى يىغىلىپ تۇرۇپ قالىدۇ، قاننىڭ ئايلىنىشىغا ئەگىشىپ بۇ كىسلاتا كىچىك بوغۇملار ئورنىغا ۋە بۆرەككە چاپلىشىپ، شۇنىڭ بىلەن سۈيدۈك كىسلاتا چۆكمىسىنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ئۆزىگە كىسلاتا چۆكمىلىرى مەلۇم سەۋەبلەر-نىڭ تۈرتكىسى بىلەن بوغۇم ئاغرىقىنى، يەنى يەللىك بوغۇم ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

رېئۇماتىك رايونى

كېسەللىك رېئۇماتىك رايونى: قاننىڭ ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ تەڭشەش لازىم، كېسەللىك ئوچىقى رايونىنى نۇقتىلىق ئۇۋۇلاپ تەڭشەش زۆرۈر. مۇناسىۋەتلىك رېئۇماتىك رايونى: بۆرەك، سۈيدۈك توشۇش نەيچىسى، دۇۋساق، سۈيدۈك يولى، تىز بوغۇمى.



1. پۇت رېفلىكس رايونىنى (ئۇۋۇلاش ئۇسۇ - لىنى 35 - بەتتىن 65 - بەتكىچە بولغان جايلاردىن كۆرۈڭ) قىرىپ ئۇۋۇلاپ بولغاندىن كېيىن، ئاندىن بۆرەك رېفلىكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا، بەدەننىڭ مېتابولىزم جەريانىدا قېپقالغان قالدۇق كېرەكسىزلەرنىڭ بەدەن سىرتىغا ۋاقتىدا چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.



2. سۈيدۈك نەيچىسى رېفلىكس رايونىنى ئۇس - تىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئورۇننى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، سۈيدۈك يوللىرىنى را - ۋانلاشتۇرۇپ، كېرەكسىزلەرنىڭ چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۇۋۇلىغاندا رېفلىكس رايونىغا يې - قىن 1 - 2 ئورۇندىكى تېرە ئاستىدا مونەكچىلەر باي - قالسا، بۇ نورمال ھادىسە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.



4. باش بارماق بىلەن سۈيدۈك يولى رېفلېكس رايونىنى ئاستىدىن ئارقىغا قاراپ قىيپاش ھالەتتە سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا دوۋساق ئۇ- نىۋېرسال كېسەللىكى ۋە مەزى بېزى ياللۇ- غىغا گىرىپتار بولغان بىمارلار بەكرەك ئاغرىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىشى مۇمكىن، شۇڭا ئۇۋۇلىغاندا ئاستا مەشغۇلات قىلىش زۆرۈر.



3. كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بوغۇمى بىلەن دوۋساق رېفلېكس رايونىنى ئۇس- تىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلاي- مىز. بۇ رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇ- ۋۇلىغاندا ئەڭ ياخشىسى قۇرۇق قول مەشغۇلات قىلىش لازىم.

5. تىز بوغۇمى رېفلېكس رايونى ئۆك- چە سۆڭىكىنىڭ ئالدى گىرۋىكىگە جايلاش- قان بولۇپ، بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلىغاندا، ئالدى- دىن ئارقىغا قاراپ تولۇق ئۇۋۇلساق، تىز بوغۇمىنى ئومۇميۈزلۈك ئەسلىگە كەلتۈر- گىلى بولىدۇ.



TIPS

پاقيويۇرمىقىدىن 50 گىرام ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ، سۈيگە پۇنىنى 20 — 30 مىنۇتقىچە چىلىسا بولىدۇ ياكى پاقيويۇر- مىقىنى قاينىتىپ سۇۋۇغاندىن كېيىن سۇ- يىنى دورا ئورنىدا 3 — 5 كۈنگىچە ئىچسە بولىدۇ.

2. ئەگەر يەللىك بوغۇم ئاغرىقى بىر قەدەر ئېغىر بولسا، پاقيويۇرمىقىنى ئې- زىپ ئۇۋۇغاندىن كېيىن ئۇنى مۇۋاپىق مىقدارىدىكى گۈرۈچ ئاچچىقسۇيى بىلەن ئا- رىلاشتۇرۇپ پۇنىنىڭ ئالمىقان مەركىزىگە چاپسا بولىدۇ.

پاچاق ئاغرىش

2. پۇتنىڭ ئاستىدىكى يۇقىرىدە -
لىغۇچى (تۆۋەنلىگۈچى) بوغماق ئۇ -
چەي رېفلېكس رايونىنىڭ سىرتىدىن
تەخمىنەن بىر سانتىمېتىر كېلىدە -
غان ئورۇنغا جايلاشقان ئۈستۈنكى ۋە
ئاستىنقى مۇچە رېفلېكس رايونىنى
ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ ئايرىم -
ئايرىم ھالدا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز .



3. بۆرەك رېفلېكس رايونىنى
ئۈستىدىن ئاستىغا قارىتىپ يېرىم
چەمبەر شەكلىدە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز .
بۆرەك رېفلېكس رايونى دائىم ئۇۋۇلاپ
غىدىقلىغاندا بۆرەكنىڭ ئىقتىدارىنى
كۈچەيتىپ، بۆرەك كېسەللىكىنىڭ
ئالدىنى ئالغىلى ۋە سۆڭەكنى چىڭىتە -
قىلى بولىدۇ .

ئۇزۇن مۇددەت ھەرىكەت قىلماسلىق، ياكى
ئېغىر ھەم جىددىي ھەرىكەت قىلىش ۋە رېما -
تىزم كېسەلى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى پاچاق
ئاغرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: تىز بوغۇمى، ئۈستۈنكى ۋە
ئاستىنقى مۇچە (پۇت - قوللارنىڭ) رېفلېكس رايونلىرى (ئوڭ
پۇت ئاستىدىكى يۇقىرىلىغۇچى بوغماق ئۈچەي بىلەن سول پۇت
ئاستىدىكى تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي رېفلېكس رايونىنىڭ
سىرتىدىن تەخمىنەن بىر سانتىمېتىر كېلىدىغان ئورۇن
ئۈستىدىن ئاستىغا تەرتىپ بويىچە ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى
مۇچە رېفلېكس رايونىدىن ئىبارەت).
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: بۆرەك، جىگەر، ئوت،
تال، تاشقى ئولتۇرغۇچ سۆڭەك نېرۋىسى.



1. تىز بوغۇمى رېفلېكس رايونى ئۆكچە سۆڭىكىنىڭ ئال -
دى گىرۋىكىگە جايلاشقان، تەڭشەپ داۋالغاندا، پۇت بارمىقىدە -
دىن پۇت ئاللىقىنى يۆنىلىشىگە قاراپ، تىز بوغۇمى رېفلېكس
رايونىنى ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز .

6. سىرتقى ئولتۇرغۇچ نېرۋا رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، قویرۇق سۆڭىكى زەخىملىنىشتىن قېپقالغان كېسەللەك ئاسارىتى قاتارلىقلارنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلغاندا، كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمى بىلەن پۇت ئۆكچىسىدىن پۇت بارمىقى يۆنىلىشىگە قاراپ پۇت-كۆل رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



4. ئۆت رېفلېكس رايونىغا يېقىن ئو-رۇندا جىگەر رېفلېكس رايونى بار. ئۇۋۇلغاندا ئاۋۋال جىگەر رېفلېكس رايونى(ئوڭ پۇت ئاستىدا)نى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلاپ، ئۆت رېفلېكس رايونىغا بارغاندا بې-سىپ ئۇۋۇلايمىز.



5. تال رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇ-ۋۇلايمىز. تال رېفلېكس رايونىنى دائىم ئۇ-ۋۇلاپ بەرگەندە، مۇسكۇل كۈچىسىز بولۇشنى تەڭشەپ داۋالاشتا ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك ياخشى بولىدۇ.

TIPS

1. ھەرىكەتنى كۈچەيتىش، ئەمما ھەرىكەت مۇۋاپىق بولۇش، بەك جىددىي ھەرىكەتلەرنى قىلماسلىق لازىم.
2. پەلەمپەيدىن مېڭىپ چۈشۈش بوغۇملار-غا زىيانلىق. پۇت بوغۇمىدا مەسىلە بار كىشى-لەر پەلەمپەيدىن مېڭىپ چۈشۈشتىن ئىمكانقە-دەر ساقلىنىشى كېرەك.


تاپان ئاغرىش


تاپان ئاغرىش — تاپان سۆڭىكى، بوغۇم، سىلىقلاشتۇرۇش سۈيۈقلۈقى خالتىسى، سېرىقئەت قاتارلىق جايلاردا كېسەللىك ئۆزگىرىشى يۈز بېرىشى سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ. جۇڭخىي تېبابىتىدە تاپان ئاغرىش كۆپىنچە بۆرەك ئاجىزلىقىدىن كېلىپچىقىدۇ، دەپ قارىلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: پۇتنىڭ تاپان قىسمى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك، بۆرەك ئۈستى بېزى.

1. تاپاننىڭ ئەڭ ئاغرىغان نۇقتىسىنى تېپىپ، ئاۋۋال ئاغرىق نۇقتىسىنىڭ ئەتراپىنى ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئاستى - ئۈستى، ئوڭ - سول تۆت تەرەپتىن ئۇۋۇلاپ، كېسەللىك ئۈچىدىن قىمىنىڭ ئەتراپىنى راۋانلاشتۇرۇپ، بەش ئېلىپ - مېنىتى بىر خىل تەڭشۈپ ھالەتكە كەلتۈرىمىز، ئاندىن ئاخىرىدا ئوتتۇرىدىكى ئەڭ ئاغرىغان نۇقتىنى كۈچەپ بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.





3. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز، بۇ ئادەتتە ياللۇغ قايتۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ.



2. پۇتنىڭ ئالقىنىدىكى «人» خېتى شەكىللىك كېسىشمە ئورۇننىڭ ئويماق يېرىگە جايلاشقان بۆرەك رېفلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ يېرىم چەمبەر شەكلىدە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

ئىسسىقلىق ئاچچىق سۇغا پۇتنى چىلىغاندا ناپان ئاغرىقىنى پەسەيتكىلى بولىدۇ. ھەر قېتىمدا بەش جىڭ ئاچچىق سۇغا پۇتنى تەخمىنەن 20 مىنۇت، ئەتىگەن - كەچتە بىر قېتىمدىن چىلىسا مۇۋاپىق. ئەگەر ناپان ئاغرىقى بېگىلا بەيدا بولغان بولسا، ئۇدا ئىككى كۈن چىلىسلا ئوڭشىلىدۇ؛ ئەگەر ئاغرىق باشلانغىلى يېرىم ئاي ئەتراپىدا بولغان بولسا، ئۇنداقتا پۇتنى ئۇدا ئون نەچچە كۈن چىلاشقا توغرا كېلىدۇ؛ ئەگەر ئاغرىق داۋاملاشغىلى ئۈچ ئايدىن ئاشقان بولسا، ئۇنداقتا پۇتنى ئۇدا چىلاش ۋاقتى بىر ئاي بولسا بولىدۇ.

بېربېرى كېسىلى (پۇت تەمرەتكىسى)، پۇت تەرلەش

بېربېرى كېسىلى مىكروبتىن يۇقۇملىنىش سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدىغان بىر خىل دائىم ئۇچرايدىغان كېسەللىك بولۇپ، كۆپىنچە تالنىڭ ھۆللۈكى ئې-شېپ كېتىش سەۋەبىدىن پەيدا بولىدۇ. بىمارنىڭ پۇت قىسمىنىڭ تېرىسى ئا-قىرىدۇ ياكى كىچىك سۇلۇق قاپارتما چىقىش، قىچىشىش، يېرىلىش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلۈپ قاپتا - قاپتا قوزغىلىدۇ. بېربېرى كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلاردا ئاسانلا تىرناق تەمرەتكىسى ياكى ئاللىقان تەمرەتكىسى قاتار-لىق ئەگەشمە كېسەللىكلەر كۆرۈلىدۇ. پۇتتىن ئاسانلا تەر چىقىش پۇت تەرلەش دېيىلىدۇ.


رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: تال.

مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: ئۆپكە، بۆرەك.

1. سول پۇتنىڭ ئاستىغا جايلاشقان يۈرەك رېفلېكس رايونىدىن تۆۋەنگە بىر سانتىمېتىر كېلىدىغان ئورۇندى-كى تال رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلساق، تالنى ساغلاملاشتۇرۇپ ھۆللۈكنى يوقىتىدۇ





3. بۆرەك رېفلىېكس رايونىنى پۇت بارمىقىدىن پۇت ئاللىقىنىغا قاراپ يېرىم چەمبەر شەكىلىدە قىرپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئۇسۇلنى بۆرەك ئىقتىدارى تو- لۇق بولماسلىقتىن كېلىپچىققان ئالاقىدار كېسەل- لىكلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىشكەمۇ بولىدۇ.

2. پۇت ئاستىنىڭ ئالدى گىرۋىكىدە- دىكى ئۆپكە رېفلىېكس رايونىنى ئومۇم- يۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

1. كۆپ تەرلەيدىغان پۇتنى دورىغا چىلاش رېتسېپى: ئاق تۇرۇپتىن 500 گىرامنى پاكىز يۇيۇپ، يالپاق قىلىپ توغراپ، سۇدا قاينىتىپ، سۈيىگە پۇت چىلىنىدۇ، ھەر كۈنى 2 — 3 قېتىمدىن، ھەر قېتىمدا 10 — 30 مىنۇتقىچە چىلىسا بولىدۇ.
2. پۇت تەمرەتكىسى بولغان پۇتنى دورىغا چىلاش رېتسېپى: يېڭى كۈدىدىن 300 — 500 گىرام- غىچە ئېلىپ پاكىز يۇيۇپ، توغراپ، سۇدا قايناتقاندىن كېيىن، سۈيىنى قىزىق سۇ بىلەن تەڭشەپ پۇت چىلىنىدۇ، ھەر كۈنى 2 — 3 قېتىمغىچە، ھەر قېتىم 10 — 30 مىنۇتقىچە چىلىنىدۇ.
3. پۇتنىڭ ئاللىقىنىغا لوڭغا قويغاندا، ھۆللۈكنى ھەيدەشكە پايدىسى بولىدۇ.

پۇت - قول مۇزلاش

پۇت - قولى مۇزلايدىغان بىمارلاردا كۆپىنچە جىگەر ۋە بۆرەكتە مۇسبەتلىك ئاجىزلىشىش كۆرۈلىدۇ، بۇ خىل كېسەللىك كۆپىنچە بەدەن ئاجىز بولۇش، قان زەئىپلىشىش، قاننىڭ ئايلىنىشى راۋان بولماسلىق سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: جىگەر، بۆرەك.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ئۆپكە، ئۆت، يۈرەك.



2. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونى
ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى تاپان سۆڭىكى ئارد-
سىدا بولۇپ، ئىككىنچى تاپان سۆڭىكىگە يې-
قىنراق ئورۇنغا جايلاشقان. تەڭشەپ داۋالىغاندا،
دا، بۇ رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلساق
بولىدۇ.

1. جىگەر رېفلىكس رايونى ئولك پۇت ئالدى-
قىنىدىكى تۆتىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭىكى-
نىڭ ئارىسىغا جايلاشقان، ئۆت رېفلىكس رايونى
ئولك پۇت ئالدىقىنىدىكى ئۈچىنچى، تۆتىنچى تا-
پان سۆڭىكى ئارىسىغا جايلاشقان. ئۇۋۇلىغاندا،
ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ جىگەر رېفلىكس را-
يونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئۇدا ئۇۋۇلاپ ئۆت
رېفلىكس رايونىغا كەلگەندە، بۇ رايونى بې-
سىپ ئۇۋۇلاپ غىدىقلايمىز.



4. ئۆت رېفلېكس رايونى (ئوڭ پۇت ئاستىدا) نى بېسىپ ئۇۋۇلايدۇ.



3. ئۆپكە رېفلېكس رايونىنى ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا، قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.



5. يۈرەك رېفلېكس رايونى (سول پۇتنىڭ ئاستىدا) ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلىغاندا، ئۇۋۇلاش كۈچى يېنىك ھالەتتىن ئاستا - ئاستا كۈچەيتىلىدۇ، ئۇۋۇلاش كۈچىنى يۈرەكنىڭ ساغلاملىق ئەھۋالىغا قاراپ مۇۋاپىق تەڭشەش لازىم.

TIPS

ئالامەت بەلگىلەنگەن شېڭۋېن پەللىسى (تېمپېراتۇرا ئۆزلىتىش پەللىسى) نى بېسىپ ئۇۋۇلاش ئىككى كۆزنىڭ كۆز قارىچۇقى مەركىزىدىن تىك چۈشكەن تۈز سىزىق بىلەن ئوقۇرەك سۆڭىكىنىڭ تۇتاش قان ئىككى كېسىشمە نۇقتىسى دەل ئالامەت بەلگىلەنگەن تېمپېراتۇرا ئۆزلىتىش پەللىسىدىن ئىبارەت. ئۇۋۇلىغاندا سەل كۈچەپ بېسىش، ئەمما ئۇۋۇلاش كۈچىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى بىمار قوبۇل قىلالايدىغان دەرىجىدە بولۇشى كېرەك.

بىردەم ئۇۋۇلىغاندىن كېيىنلا بىمار بىلەك، ئالغان، بارماق، ساغرا، يوتا، پاقالچاق، پۇت قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ ئاستا - ئاستا قىزىغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ. 2 - 5 قېتىمغىچە ئۇۋۇلىغاندا ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.

پۇت - قول تترەش

بۇ كۆپىنچە كىچىك مېڭىنىڭ ھەرىكەت تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدىغان بولۇپ، بىمارنىڭ پۇت - قولى تترەپ ئۆزىنى كونترول قىلالمايدۇ. سەكتە كېسىلىنىڭ ئاسارىتىدىمۇ مۇشۇ خىل كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: ھىپوفىز ئېگەك، چوڭ مېڭە.



2. باش بارماق يۇمشىقى مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تەرىپىدىكى ھىپوفىز رېفلېكس رايونى بېسىپ ئۇۋۇلساق، ئادەم بەدىنىدىكى توققۇز چوڭ سىستېمىنىڭ ئىقتىدارىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ.

1. باش بارماق يۇمشىقىنىڭ سىرتقى تەرىپىدىكى كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلېكس رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىش بويىچە قىرىپ ياكى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى، مېڭىنى قان بىلەن تەمىنلەشنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.



4. باش بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىدىكى پە-
شانە رېفلېكس رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىش بو-
يىچە توغرىسىغا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز؛ ئاندىن يە-
نە باشقا تۆت بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىدىكى پە-
شانە رېفلېكس رايونىنى تەرتىپ بويىچە قىرىپ
ئۇۋۇلايمىز.

3. چوڭ مېڭە رېفلېكس رايونى باش بارماق
يۇمشىقىغا جايلاشقان بولۇپ، بۇ ئورۇننى پۇتنىڭ
بارمىقىدىن پۇتنىڭ ئالدىقىغا قاراپ قىرىپ ئۇ-
ۋۇلايمىز.

TIPS

1. ئوڭ - سول تاپاننىڭ سىرتقى تەرىپىدىكى ئۈستۈنكى مۇجە رېفلېكس رايونىنى (ئۇۋۇلاش ئۇسۇ-
لىنى مۇشۇ كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ) قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا، كوللاپىسى (سۆسۈزلى-
نىش، قانسىراش، يۇقۇملۇق كېسەل بىلەن ئاغرىش نەتىجىسىدە يۈرەك ۋە قان ئايلىنىشنىڭ ئۈشتۈمۈت
زەئىپلىشىشى) كېسەللىك ئالامىتى تېزلىكتە ياخشىلىنىدۇ.
2. ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسەللى مىزىقى ئارقىلىق كىچىك مېڭە يىگىلەش ئالامەتلىرىنى بال-
دۇر بايىغىلى بولىدۇ (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مۇشۇ كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ).

قول قولشش

جىڭلۇ راۋان بولماسلىق، قان ئايلىنىش راۋان بولماسلىق، بويۇن - مۈرە كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى قول (ئۈستۈنكى مۇچە) نىڭ قولىدە شىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: بويۇن، بويۇن ئومۇرتقىسى، قىيپاش چاسا مۇسكۇل.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: ھىپوفىز، بۆرەك، جىگەر، تال، ئومۇرتقا تۈۋرۈكى.



1. قولىمىزنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقى ۋە ئوتتۇرا بارمىقى بىلەن پۇتنىڭ باش بارماق تۈۋىنى قىسىپ تۇتۇپ تۇرۇپ، باش بارماقنىڭ ئىچى تەرىپىدىكى بويۇن ئومۇرتقىسى رېفلېكس رايونىغا قارىتىپ ئايلاندۇرىمىز، مۇشۇ ئارقىلىق پۇت بارمىقىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز ۋە سوزۇپ تارتىمىز. بۇ رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، بويۇن ئومۇرتقىسى كېسەللىكلىرىنى مەلۇم دەرىجىدە تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

2. قىيپاش چاسا مۇسكۇل رېف-
لېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا،
دا، بويۇن - مۇرە كېسەللىكلىرىنى
ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولىدۇ. ئۇۋۇ-
لىغاندا ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئو-
مۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.



بويۇن، بويۇن ئومۇرتقىسى، قىيپاش چاسا مۇسكۇل قاتارلىق كېسەللىك رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇ-
ۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە ھىپوفىز، بۆرەك، جىگەر، تال، ئومۇرتقا تۈۋرۈكى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېف-
لېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مۇشۇ كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەت-
لىرىدىن كۆرۈڭ)، باش قىيىش، قول قوللىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تەڭشەپ داۋالاشتا ئۈنۈملۈك رول
ئوينايدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى

ھىپوفىز (42 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، تال (52 - بەت)، ئومۇرتقا تۈۋ-
رۈكى (55 - بەت).

چاچ چۈشۈش، مايلىشىش خاراكتېرلىك چاچ چۈشۈش

نورمال ئادەملەرنىڭ ھەر كۈنى ئادەتتە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 50 تالدىن چېچى چۈشىدۇ، بۇ نورمال بولغان ماددا ئالمىشىشقا تەۋە، ئەگەر ھەر كۈنى چۈشىدىغان چاچ 50 تالدىن ئېشىپ كەتسە، بۇنى كېسەللىك خاراكتېرلىك چاچ چۈشۈش دەيمىز. مايلىشىش خاراكتېرلىك چاچ چۈشۈش تېرىدىن ياغ تەپچىرەپ چىقىش ئاساسىدا كېلىپچىقىدىغان بىر خىل چاچ چۈشۈشنى كۆرسىتىدۇ، بۇ - نىڭدا دائىم باشتا كېپەك كۆپىيىش، چاچ تېرىسى مايلىشىش، باش ئاغرىپ قە - چىشىش قاتارلىق ئەھۋاللارمۇ كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: چاچ.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك، جىگەر.



1. بىر قولىمىزنىڭ باش بارمىقى ۋە كۆرسەت - كۈچ بارمىقى بىلەن پۇتنىڭ باش بارمىقىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىزغا تاش يىڭىنى ئېلىپ، پۇتنىڭ باش بارماق تىرىقىنىڭ ئالدى گىرۋىكىنى بويلاپ، باش بارماققا جايلاشقان پېشانە رېفلىكس را - يونىغا يېقىن بولغان بارماق تىرىقى ئورنىدىكى چاچ رېفلىكس رايونىنى ئاستا - ئاستا قىرىپ ئۇ - ۋۇلايمىز.



3. جىگەر، ئۆت رېفلىكس رايونىنى دائىم بىرلىكتە تەڭشەشكە توغرا كېلىدۇ. مەشغۇلات قىلغاندا ئاۋۋال ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ جىگەر رېفلىكس رايونى (ئوڭ پۇت ئاستىدا) نى قىرىپ ئۇۋۇلاپ، ئۆت رېفلىكس رايونىغا كەلگەندە (ئوڭ پۇت ئاستىدا) بېسىپ ئۇۋۇلاپ غىدىقلايمىز.

2. بۆرەك رېفلىكس رايونى پۇتنىڭ ئاستىدا - دىكى ئۈچىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرا - تۆۋەن قىسمىغا جايلاشقان ھەمدە ئىككىنچى، ئۈچىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئارىسىغا سوزۇلغان بولۇپ، يېرىم چەمبەر شەكلىدە كۆرۈنىدۇ. بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلغاندا، ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

TIPS

1. يېڭى زەنجىۋىلىنى چاچ يىلتىزىغا تەكرار سۈركىگەندە، چاچ چۈشۈشىنى ئۈنۈملۈك تىزگىنلىگىلى بولىدۇ.

2. ھەر كۈنى چاچنى تاراشنى داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. پىلاستىك ماتېرىيال (سولىياۋ) دىن ياسالغان تارغاق بىلەن چاچنى تارىغاندا، چاچ زەرەتلىنىپ چاچنى زەخمىلەندۈرىدىغان ئىستانىك ئېلېكتىر ھا-سىل بولىدۇ، شۇڭا چاچنى پىلاستىك ماتېرىيال (سولىياۋ) دىن ياسالغان تارغاق بىلەن تاراساي، تاش تارغاق، كالا مۆڭگۈزىدىن ياسالغان تارغاق، ياغاچ تارغاق قاتارلىقلار بىلەن تاراش لازىم.

قاتتىق تەرلەش، ئوغرى تەر چىقىش

بۇلار كۆپىنچە جىگەر ۋە بۆرەكنىڭ مەنپىيلىكى ئاجىزلاش سەۋەبىدىن كېلىپ چىقىدۇ. قاتتىق تەرلەش بەدەننىڭ ئاجىزلىقى، مۇسبەتلىك ئاجىزلىشىش قاتارلىق سەۋەبلەر كەلتۈرۈپ چىقارغان تەبىئىي تەرلەشنى كۆرسىتىدۇ؛ ئوغرى تەر چىقىش دېگەندە، بىمار ئۇخلىغاندىن كېيىن تەر چىقىپ، ئويغانغاندىن كېيىنلا تەرلەش توختايدۇ، تەرنى سۈرتىۋەتكەندىن كېيىن يەنە ئۇخلىسا تەر قايتىدىن چىقمايدۇ. كىلىماكتېرىيە مەزگىلىدە بۇ خىل كېسەللىك تېخىمۇ ئاسان كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك، جىگەر.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: يۈرەك، ئۆپكە، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي.



2. بۆرەك رېفلىكس رايونىنى ئۈس-تىدىن ئاستىغا قاراپ تەبىئىي ھالدا يېرىم چەمبەر شەكلىدە قىرىپ ئۇۋۇلساق، بۇ رەكنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

1. بىر قولىمىزدا پۇت قىسمىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن جىگەر رېفلىكس رايونى (ئوڭ پۇت ئاستىدا) نى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ ئۇدا قىرىپ ئۇۋۇلاپ، ئۆت رېفلىكس رايونىغا كەلگەندە، بۇ يەرنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. جىگەر ۋە ئۆت رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ئادەم بەدىنىنىڭ مېتابولىزىمىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.



4. ئۆپكە رېفلىكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇ-
ئۇلايمىز. ئەگەر ئۆپكە قىسمىدا كېسەللىك
بولسا، ئۇۋۇلىغاندا قولغا قۇمىسمان ماد-
دىلار ئۇرۇنىدۇ. دائىم ئۆپكە رېفلىكس رايو-
نىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، يۆتەل، دەم سى-
قىلىش، ئۆپكە ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىك-
لەرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

3. سول پۇت ئاستىدىكى يۈرەك رېفلىكس
رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قارىتىپ سېي-
رىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۇۋۇلىغاندا دەسلەپ يېنىك
كۈچ بىلەن ئۇۋۇلاپ ئاندىن ئۇۋۇلاش كۈچىنى
تەدرىجىي ئاشۇرىمىز.



6. ئوڭ سول پۇت قىسمى-
دىكى چوڭ ئۇچەي رېفلىكس را-
يونىنى سائەت ئىستىرىلەكسىنىڭ
يۆنىلىشى بويىچە ئۇۋۇلايمىز.
پۈتكۈل ئۇۋۇلاش جەريانى بىر -
بىرىگە ئۇلىنىپ بىر قېتىمىدىلا
تاماملىنىدۇ.

5. قولنىڭ تۆت بارمىقىنى ئې-
گىپ، بارماق بوغۇمى بىلەن ئىنچىكە
ئۇچەي رېفلىكس رايونىنى ئۈستىدىن
ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلىساق،
ئۇۋۇلاش سايماڭلىرىنى ئىشلىتىپ
ئۇۋۇلىغاندىنمۇ ياخشىراق بولغان ئۇ-
ۋۇلاش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.
ئەمما قول بىلەن قىرىپ ئۇۋۇلاش
جەريانىدا ئۇۋۇلاش كۈچىنىڭ تەكشى
چۈشۈشىگە دىققەت قىلىش لازىم.

TIPS

1. كۈركۈمىدىن 10
گرام ئېلىپ، قايىناق
سۇغا چىلىغاندىن كې-
يىن. ئۇنىڭ سۈيى پەل-
كۈچ ئارقىلىق ئىككى
تەرەپتىكى ئەمچەك توپ-
چىسىغا ئۇدا 15 مىنۇت
سۈركىلىدۇ.
2. ياۋا چىلان مە-
ھىزى ۋە جۇڭگو موزى-
نىنىڭ ھەرقايسىسىدىن
20 گرامدىن ئېلىپ
سوققاندىن كېيىن،
ئۇخلاشتىن ئىلگىرى
پۇتنىڭ مەركىزىدىكى
بوغۇچەن پەللىسىگە
سۈركەپ ئەتىسى ئېل-
ۋېتىلىدۇ. بۇ ئۇسۇلنى
3 - 7 كۈنگىچە دا-
ۋاملاشتۇرغاندا ئۈنۈمى
كۆرۈلىدۇ.

ئۇيقۇسىزلىق

بىمار ئۇخلىيالمايدۇ ياكى ئۇخلاش ھالىدە-
تىنى ساقلىيالمايدۇ، بىماردا ئۇيقۇ يېتەرلىك
بولماسلىق، باش قېيىپ كۆزى قاراڭغۇلدە-
شىش، يۈرىكى ئېغىش، چارچاش، ھارغىنلىق
ھېس قىلىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.
بۇ كىلىنىكىدا كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەل-
لىكلەرنىڭ بىرى بولۇپ، كۆپىنچە جىگەر بى-
لەن بۆرەكنىڭ مەنپىيلىكى ئاجىزلىشىش
سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدۇ.

رېفلىكس رايونى

گىبەللىك رېفلىكس رايونى: ئۇيقۇسىزلىق نۇقتىسى،
ئۇيقۇسىزلىق بېزى (كىچىك بارماق تۈۋىدە).
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: پېشانە، ھىپوفىز،
كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، يۈرەك، پېشانە.

1. ئۇيقۇسىزلىق نۇقتىسى ئۈچە
ئالدى تەرىپى ئوتتۇرا قىسمىنىڭ سەل
ئىچى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ،
نۇقتىنى توغرا تاپقاندىن كېيىن، تاش
يىڭنە بىلەن بۇ نۇقتىنى بېسىپ ئۇ-
ۋۇلايمىز، ئۇۋۇلاش كۈچى ۋە ئۇۋۇلاش
ۋاقتىنى ئۇيقۇسىزلىق دەرىجىسىگە
ئاساسەن بەلگىلىسەك بولىدۇ. ئۇيقۇ-
سىزلىق نۇقتىسىنى ئۇزۇن مۇددەت
غىدىقلاپ ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ئۇخلاش
سۈپىتىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق.



3. باش بارماقنىڭ ئالدى ئۇچى تەرەپتىكى
پېشانە رېفلىكس رايونىنى سولدىن ئوڭغا ياكى
ئوڭدىن سولغا قارىتا، ئوخشاش بىر يۆنىلىش-
تە توغرىسىغا قارىتىپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز؛
ئاندىن قالغان تۆت بارماقنىڭ ئالدى ئۇچى تە-
رىپىدىكى پېشانە رېفلىكس رايونىنى تەرتىپ
بويىچە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

2. ئۇيقۇسىزلىق بېزى چىمچىلاق بارماق-
نىڭ توغرا سىزىقلىق قىسمىغا جايلاشقان. ئۇ-
ۋۇلىغاندا تاش يىڭنە بىلەن پۇت بارماق تۈۋە-
نىڭ بىر ئۇچىنى تىرەپ، رەسىمدە كۆرسە-
تىلگەندەك يۆنىلىش بويىچە ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

1. ئېۋودىيە دەرىخى ئۇرۇقىدىن 50 گىرام ئېلىپ، سۇغا 20 — 30 مىنۇتقىچە چىلاپ، ئاندىن قاينىتىپ، سۈيى سوۋۇغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا پۇتنى چىلىسا بولىدۇ، ھەر قېتىم 20 — 30 مىنۇتقىچە چىلىنىدۇ، ھەر قېتىم 3 — 5 كۈنگىچە ئىشلەتكىلى بولىدۇ. پۇتنى چىلىغاندا سۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى 45 سېلسىيە گىرادۇس تىن تۆۋەن ھالەتتە كونترول قىلىنىدۇ، بەك يۇقىرى بولۇپ كەتسە، قاننىڭ ئايلىنىشى تېزلىشىپ، ئەكسىچە ئۇرغۇسىزلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

2. ئېۋودىيە دەرىخىنىڭ ئۇرۇقىنى ئېرىپ ئۇۋاقلاپ، سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، پۇت ئاللىقىنىڭ ئوتتۇرىسىغا چاپسا بولىدۇ.



5. باش بارماق يۇمشىقى مەركىزىنىڭ سىرتى-قى تەرىپىدىكى كىچىك مېڭە، مېڭە غولى رېڭ-لېكس رايونىنى ئوخشاش پۇتلىش بويىچە قىرىپ ياكى بېسىپ ئۇۋۇلساق، مېڭىنى قان بىلەن تەمىنلەشنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.



7. پۇتنىڭ بەش بارماقنى قوللىرىڭىزنىڭ ئاللىقىنى بىلەن، ھەممىسىنى بىرلىكتە ئۇۋۇلاپ پېشانە رېڭلېكس رايونىنى غىدىقلايمىز.



4. ھىپوفىز رېڭلېكس رايونى باش بارماق يۇمشىقىنىڭ سەل ئىچى تەرىپى-گە جايلاشقان بولۇپ، ئۇۋۇلغان چاغدا، ئاۋۋال بۇ رېڭلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز، ئاندىن چوڭ مېڭە رېڭلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



6. قان ئايلىنىش سىستېمىسىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى يۈرەكتە بولۇپ، ئۇۋۇلغان چاغدا، سول پۇتنىڭ ئاستىدىكى يۈرەك رېڭلېكس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.

ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، تاماقتىن سەسكىنىش

ئاشقازاننىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى ۋە تالنىڭ ھەرىكەت ئىقتىدارى ياخشى بولمىسا ئاسانلا ئىشتىھاسىزلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەتتە ئىككى خىل ئەھۋال كۆڭلى تاماقتىن سەسكىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، بۇنىڭ بىر خىلى روھىي جەھەتتىكى پاتولوگىيەلىك ئامىل، يەنە بىر خىلى بولسا ھەزىم قىلىش ئىقتىدارىنىڭ تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇشتىن ئىبارەت.

رېڧلېكس رايونى

كېسەللىك رېڧلېكس رايونى: ئاشقازان، ئۇيۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، جىگەر، ئۆت.
مۇناسىۋەتلىك رېڧلېكس رايونى: يۈرەك، ئۆپكە، بۆرەك، ھىپوفىز، تال.



2. ئىنچىكە ئۈچەي رېڧلېكس رايونىنى تۆت بارماقنىڭ بارماق بوغۇمى بىلەن ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، قول بىلەن ئۇۋۇلىغاندا سايماننى ئىشلىتىپ ئۇۋۇلىغانغا قارىغاندا تېخىمۇ جايىنى تاپقىلى بولىدۇ. ئەمما ئۇۋۇلاش كۈچىنى تەكشى ھالەتتە ئىشلىتىشكە دىققەت قىلىش لازىم.

1. ئاشقازان، ئۇيۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەيدىن ئىبارەت بۇ ئۈچ رېڧلېكس رايونىنى دائىم بىرلىكتە ئۇۋۇلاپ تەڭشەشكە توغرا كېلىدۇ. ئۇۋۇلىغان چاغدا، ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ تەرتىپ بويىچە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



4. جىگەر، ئۆت رېڧلېكس رايونىنى (ئوڭ پۇت تاپىنىدا) دائىم بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، جىگەر ۋە ئۆتتىكى كېسەللىكنى تەڭشەپ داۋالاغىلى بولىدۇ. جىگەر بىلەن ئۆت رېڧلېكس رايونىنى ئادەتتە بىرلىكتە ئۇۋۇلاپ تەڭشەش لازىم. مەشغۇلات قىلغاندا، بىر قولىمىز بىلەن ئوڭ پۇتنىڭ بارماق قىسمىنى مۇقىم تىرەپ، يەنە بىر قولىمىزغا تاش يىڭىنىنى ئېلىپ، ئاۋۋال جىگەر رېڧلېكس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئاندىن ئۆت رېڧلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

3. چوڭ ئۈچەي رېڧلېكس رايونى يۇقىرىدا لىغۇچى بوغماق ئۈچەي، توغرا بوغماق ئۈچەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، S سىمان بوغماق ئۈچەي، تۈز ئۈچەي، مەقەت قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تەڭشەپ داۋالغاندا، تەرتىپ بويىچە سول پۇتتىكى توغرا بوغماق ئۈچەي رېڧلېكس رايونىنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي رېڧلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز، S سىمان بوغماق ئۈچەي ۋە تۈز ئۈچەي رېڧلېكس رايونىنى سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئوڭ پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلىغاندىمۇ سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە، يۇقىرىدا لىغۇچى بوغماق ئۈچەي، توغرا بوغماق ئۈچەي رېڧلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

ئاشقازان، ئۇيغۇلۇق، ئون ئىككى باماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، جىگەر، ئۆت قاتارلىق كېسەللىك رېڧلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە يۈرەك، ئۆپكە، بۆرەك، ھىپوفىز، تال قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڧلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا (كونكرېت ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، بەدەننىڭ ھەرىكەتلىنىش (توشۇش) ئىقتىسادى رىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: يۈرەك (49 - بەت)، ئۆپكە (39 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت)، ھىپوفىز (42 - بەت)، تال (52 - بەت).



TIPS

بەدەننى ئاجىز نەپىسى سىڭىلىدىغان كىشىلەر دولانا كۆمىلىچى (جىيەن پىۋەن) نى ئىستېمال قىلىا بولمايدۇ. ئالدى ساغلاشتۇرۇش كۆمىلىچىنى بۇۋايىق ئىستېمال قىلىا، ئىستېھائى ئاچىدۇ.

ھاراق چىشلىۋېلىش

ھاراقنى مەست بولغۇدەك ئىچكەندىن كېيىن، ھېرىپ - چارچاش، باش ئاغ-رىش، ئېغىز قۇرۇش، باش قېيىش، ئاش-قازان ئاغرىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇ-سۇش، ئۇيقۇسىزلىق، ئۇيقۇسىراش، قولى تىترەش، قان بېسىمى ئۆرلەش ياكى قان بېسىمى تۆۋەنلەش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆ-رۈلىدۇ بۇنى ئادەتتە ھاراق چىشلىۋېلىش دەپ ئاتايمىز.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بېزى. مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: پېشانە، چوڭ مې-ڭ، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، ھىپوفىز، جىگەر.



1. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلېكس را-يونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. ئەگەر ئۇۋۇلا-غۇچىنىڭ قان بېسىمى نۇرمال بولسا، كۈچ بىلەن بېسىپ ئۇۋۇلاپ غىدىقلىسا ق بولىدۇ، بۇ ئۇسۇل قۇسۇشنى تېزلىتىش رولىنى ئويناپ، ئىسپىرتنىڭ جىگەرنى زەخمىلەندۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.



3. پۇتنىڭ بارمىقىدىن پۇتنىڭ ئا-لىقىنى يۆنىلىشىگە قاراپ چوڭ مېڭە رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا، باش قېيىش، باش ئاغرىش ئالامەتلىرىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولىدۇ.



2. ئوخشاش يۆنىلىش بويىچە باش بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى تۇغ-رىسىغا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز؛ ئارقىدىنلا تەرتىپ بو-يىچە باشقا تۆت بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىدىكى پې-شانە رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، بۇنداق قىلغاندا روھنى ئۇرغۇتقىلى بولىدۇ.

4. باش بارماق يۇمشىقىنىڭ سىرتقى تەرىپىدىكى كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلېكس رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىش بويىچە قىرىپ ياكى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئۇۋۇلاش كۈچىنى كونترول قىلىشقا دىققەت قىلىش لازىم.



TIPS

ئادەتتە 40 - 50 ئاچچىقسۇغا 10 - 20 گىرام ئاق شېكەر ۋە مۇۋاپىق مىقداردا قايناقسۇ قوشۇپ ئىچىپ بەرسە دەرھال مەستلىكنى يېشىدۇ.

6. جىگەر رېفلېكس رايونى ئوڭ پۇت ئاللىقىنىدىكى تۆتىنچى تاپان سۆڭىكى بىلەن بەشىنچى تاپان سۆڭىكى ئارىسىغا جايلاشقان، ئۆت رېفلېكس رايونى بولسا ئوڭ پۇت ئاللىقىنىدىكى ئۈچىنچى تاپان سۆڭىكى بىلەن تۆتىنچى تاپان سۆڭىكى ئارىسىغا جايلاشقان. ئۇۋۇلىغان چاغدا، جىگەر ۋە ئۆت رېفلېكس رايونىنى بىرلىكتە تەڭشەشكە توغرا كېلىدۇ. ئۇۋۇال ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ جىگەر رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئاندىن يەنە ئۆت رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

5. باش بارماق يۇمشىقىنىڭ سەل ئىچى تەرىپىنى بويلاپ ھىپوفىز رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېفلېكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.



ئىسسىق ئۆتۈپ كېتىش

بىماردا كۆپىنچە باش ئاغرىش، باش قېيىش، كۆڭۈل ئىلىشىش، ئېغىزى قۇرۇش، كۆپ تەرلەش، پۇت - قوللىرى ماغدۇرسىزلىنىش، چىرايى تاتىرىش، دىققىتى چېچىلىش، ھەرىكىتى ماسلاشماسلىق قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: چوڭ مېڭە، پېشانە، ھىپوفىز، يۈرەك، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: تال، ئاشقازان.



2. پېشانە رېفلېكس رايونى ئادەم بەدىنىدىكى چوڭ مېڭە ۋە ئاداشقان نېرۋا قىسمىغا ماس كېلىدۇ. ئۇۋۇلىغان چاغدا باش بارماقنىڭ ئالدى ئۇچى تەردە - پىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ياكى سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ ئوخشاش يۆنىلىش بويىچە توغرىسىغا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز، ئارقىدىنلا باشقا تۆت بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



1. پۇتنىڭ باش بارماق يۇمشىقى ئادەمنىڭ چوڭ مېڭىسى بىلەن ماس كېلىدۇ، بۇ ئورۇنغا جايلاشقان چوڭ مېڭە رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىمىز.



4. سول پۇتتىكى يۈرەك رېفلىكس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايدىمىز. يۈرەك رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، سىنوسىسمان يۈرەك رىتمىسىزلىقىنى تەڭشەپ، يۈرەكنى قان بىلەن تەمىنلەشنى كۈچەيتىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.



3. ھىپوفىز رېفلىكس رايونى باش بارماق ئۈستىدىكى پېشانە رېفلىكس رايونىغا يېقىن ئورۇنغا جايلاشقان. بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلىغاندا 3 — 5 قېتىمغىچە بېسىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

چوڭ مېڭە، پېشانە، ھىپوفىز، يۈرەك، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى قاتارلىق كېسەللىك رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشتىن باشقا، يەنە تال، ئاشقازان قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى مەزكۇر كىتابنىڭ 52 - بېتىدىن كۆرۈڭ)، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.



TIPS

1. ئىسسىق ئۆتۈپ كېتىپ جىددىي قۇتقۇزۇشقا توغرا كەلگەندە، دەرھال رېنچوڭ پەللىسى (ئۈستۈنكى كالىپۇك ئېرىقچىسىنىڭ مەركىزىدە) ۋە يوڭچۈەن پەللىسىنى بېسىپ ئۇۋۇلاپ كېرەك.

2. ئىسسىق ئۆتۈپ كەتكەن بىمار سۇس تەڭشەلگەن تۈز سۈيى ئىچىپ بىرسە بولىدۇ. بۇنداق قىلغاندا كۆپلەپ تەر چىقىش سەۋەبىدىن بەدەندە كالىتسىي ۋە فوسفور كېمىيىپ كېتىشتىن ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

3. يۈت قىسمى رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاش ئىسسىق ئۆتۈپ كەتكەن بىمارنى جىددىي قۇتقۇزۇشقا ماس كەلمەيدۇ، كېسەللىك ئەھۋالى يېنىكلىگەندىن كېيىن ئاندىن بۇ مەشغۇلاتنى قىلىشقا بولىدۇ.

5. ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى پۈتۈن بەدەننىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئىدارە قىلىدۇ، ئۇۋۇلىغان چاغدا، تاش يىڭنە بىلەن پۇتنىڭ دۈمبىسىدىن باشلاپ بارماق يۆنىلىشىنى بويلاپ ئالدىرىماي پۇختا ئۇۋۇلساق، ئادەمنى روھلاندۇرۇپ مېخنى سەگىتىش رولىنى ئوينايدۇ.

كوللاپس (ئېغىر زەئىپلىك)

كوللاپس بىر خىل كېسەللىك بولۇپ، بۇ ئادەتتە زىيادە سۇسىزلىنىش، ھەد-دېدىن ئارتۇق چارچاش، ئاچ قېلىش، قورقۇپ كېتىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن پەيدا بولىدۇ، بىماردا كۆپىنچە كۆپ تەرلەش، پۇت - قولى ماغدۇرسىزلىنىش، چىرا-يى ئاقىرىپ كېتىش، كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: كۆز، قۇلاق، ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۇچى، جىگەر، ئۆت، تال، ئىنچىكە ئۇچى، چوڭ ئۇچى.



2. ھىپوفىز رېفلېكس رايونى باش بارماق يۇمشىقى مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، بۇ رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا كوللاپس كېسەللىك ئالامەتلىرىنى ئۈنۈملۈك ياخ-شىلىغىلى بولىدۇ.



1. باش بارماقنىڭ ئالدى ئۇچى تەرىپىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىشتە توغرىسىغا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز؛ ئاندىن باشقا تۆت بارماق-نىڭ ئالدى ئۇچى تەرىپىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى تەرتىپ بويىچە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۇنىڭدىن باشقا، بەش بارماقنىڭ ھەممىسىنى قوللىمىز بىلەن بىرلىكتە سۈركەپ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللانماق مۇمكىن.



4. ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى رېفلېكس رايونى پۇتنىڭ دۈمبىسىدىكى تۇتىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭىكى ئارىسىغا جايلاشقان بولۇپ، ئۇۋۇلىغاندا پۇت دۈمبىسىدىن پۇت بارمىقىغا قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

3. باش بارماق يۇمشىقىغا جايلاشقان چوڭ مېڭە رېفلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. تەڭشەپ داۋالاش ئۇ- نۇمىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش ئۈچۈن بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلىغاندا سەل كۈچەپرەك ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

پېشانە، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، ئىچكى قۇلاق ئېزىتقۇ يولى قاتارلىق كېسەللىك رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە كۆز، قۇلاق، ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، جىگەر، ئۆت، تال، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاشقا بولىدۇ (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى كۆز (46 - بەت)، قۇلاق (46 - بەت)، ئاشقازان (52 - بەت)، ئۇيقۇلۇق (52 - بەت)، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي (52 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، ئۆت (64 - بەت)، تال (52 - بەت)، ئىنچىكە ئۈچەي (52 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەتتە، ئوڭ پۇت 65 - بەتتە).

TIPS

كوللاپس كېسەللىك ئەھۋالى كۆرۈلگەندە، رېنجوڭ پەللىسى (ئۈستۈنكى كاپۇك ئېرىقچىسىنىڭ مەركىزىدە)، نېيگۈەن پەللىسى (سول تەرەپ رەسىمگە قاراڭ)، يوڭچۈەن پەللىسى (پۇتنىڭ ئالدى تەرەپ ئويماق ئورۇندىكى ئىككىنچى، ئۈچىنچى بارماق ئارىلىقىدىكى يول سىزىقىنىڭ ئۈچى بىلەن ئۆكچە سۆ- ئىكى تۇتاشقان جايىنىڭ ئالدى ئۈچتىن بىر قىسمى ئورنىدا) نى بېسىپ ياكى چىمدىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ.

تېرە ياللۇغى

بۇ، تېرە ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش خاراكتېرلىك كېسەللىك بولۇپ، تېرىگە روشەن دەرىجىدە زىيان يەتكۈزۈش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. قىزىل داغ، سۇلۇق قاپارتما، ھەتتا تېرىنىڭ يۇمشاق توقۇلمىلىرى چىرىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى تېرە ياللۇغىغا تەۋە بولغان كېسەللىكلەردىن ئىبارەت.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: پۈتكۈل پۇت قىسمى، تېرە كېسىلى ئېففېكتى رايونى (پۇتنىڭ ئارقا ئۆڭچە سىڭىرىغا جايلاشقان)
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ئۆپكە، تال، جىگەر، ئۆت، ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي.



پۈتكۈل پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى - لىنى مەزكۇر كىتابنىڭ 35 - ، 65 بەتلەردىن كۆرۈڭ)، ئۇۋۇلا - غۇچىنى دۈم ياتقۇزۇپ، قولىمىزنىڭ باش بارماق، كۆرسەتكۈچ بار - ماق ۋە ئوتتۇرا بارماقلىرى بىلەن پۇتنىڭ ئارقا ئۆڭچە سىڭىرىغا جايلاشقان تېرە كېسىلى ئېففېكتى رايونىنى ئىككى تەرەپتىكى مۇ - ناسىپ ئورۇندىن كېرىپ سوزىمىز.

تېرە كېسىلى ئېففېكتى رايونىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە ئۆپكە، تال، جىگەر، ئۆت، ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاش لازىم (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، بۇ ئورۇنلارنى ئۇۋۇلىغاندا تېرە كېسىلىنى ئۈنۈملۈك داۋالىغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

ئۆپكە (49 - بەت)، تال (52 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، ئۆت (64 - بەت)، ئاشقازان (52 - بەت)، ئۇيقۇلۇق (52 - بەت)، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي (52 - بەت)، ئىنچىكە ئۈچەي (52 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەتتە، ئوڭ پۇت 65 - بەتتە).

ھەيز قالايمىقانلىشىش، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش

ھەيز قالايمىقانلىشىش دائىم ئۇچرايدىغان ئاياللار كېسەللىكى بولۇپ، بۇ - نىڭدا ھەيز دەۋرى قالايمىقانلىشىش، ھەيزنىڭ مىقدارى نورمالسىز بولۇش ياكى ھەيزدىن بۇرۇن ۋە ھەيز مەزگىلىدە قورساق ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: بالىياتقۇ، تۇخۇمدان، تۇخۇم توشۇش نەيچىسى، تۆۋەنكى قورساق قىسمى.

مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، جىگەر، ھىپوفىز، قالدانبەز.

1. بالىياتقۇ رېفلېكس رايونى
پۇتنىڭ ئىچكى تەرىپىدىكى ئولتۇر -
غۇچ نېرۋا رېفلېكس رايونىنىڭ ئالدى
تەرىپىگە جايلاشقان. ئۇۋۇلىغان چاغ -
دا كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمى بىلەن
ئارقىدىن ئالدىغا قاراپ قىرىپ ئۇ -
ۋۇلايمىز.



2. كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمى بىلەن پۇتنىڭ سىرتى قى تەرىپى، تاشقى ئوشۇقنىڭ ئارقا تەرەپ ئاستىغا جايلاشقان ئۈچبۇلۇڭ شەكىللىك تۈ - خۇمدان رېڭىلىك رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قارىتا قىرىپ ئۇۋۇلايمىز .
3. ئۇۋۇلىغاندا تۇخۇمداندىن بالىياتقۇغا تۇتاشقان سىزىقنى بويلاپ، باش بارماق بىلەن تۇخۇم توشۇش نەيچىسى رېڭىلىك رايونىنى سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز .
4. تۆۋەنكى قورساق رېڭى - لېكس رايونى پاقالچاقنىڭ سىرتى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، ئۇۋۇلىغان چاغدا ئۆك - چىدىن پاقالچاق يۆنىلىشىگە قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز .

بالىياتقۇ، تۇخۇمدان، تۇخۇم توشۇش نەيچىسى قاتارلىق بۇ كېسەللىك رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، جىگەر، ھىپوفىز، قالقانىز قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڭىلىك رايونلىرىنىمۇ ئۇۋۇلىغاندا، ئاياللاردىكى ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى پەسەيتكىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى : بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، تال (52 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، ھىپوفىز (42 - بەت)، قالقانىز (48 - بەت).

TIPS

1. بالىياتقۇ مۇسكۇل ئۆسمىسىگە ھەيز زىيادە كۆپ كېلىش كېسەللىك ئالامىتى قوشۇلۇپ كەلگەن بىمارلارنىڭ پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلسا بولمايدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا، ھەيز مەزگىلىدىمۇ پۇت ئاستىنى ئۇۋۇلاشقا بولمايدۇ، بۇ ۋاقىتتا ئۇۋۇلسا ھەيزنىڭ مىقدارى كۆپىيىپ كېتىدۇ.
2. ھەيز مەزگىلىدە، ئەگەر ھەيزنىڭ مىقدارى ئاز، رەڭگى قارامتۇل بولسا، بالىياتقۇ مۇسكۇل ئۆسمىسىگە گىرىپتار بولمىغانلارنى يېنىك ئۇۋۇلاشقا بولىدۇ.
3. جات رېڭىلىك رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا بەزىدە ئوخشاش بولمىغان مۇسبەتلىك ماددىلار بايقىلىشى مۇمكىن ياكى پۇت ئۆكچىسىدىكى كۆپىيىش بەزىلىرى رېڭىلىك رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا ئويما - دۆڭ نەرسىلەر قولغا ئۇرۇنسا، بۇ ئاياللار كېسەللىككە گىرىپتار بولغانلىقىنى ياكى كېسەللىك يوشۇرۇن خەۋ - پىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.
4. ھەيزنىڭ مىقدارى ئاز، رەڭگى قارامتۇل بولسا، بۇ بالىياتقۇ دىۋارىدا چاپلىشاڭغۇ نەرسىلەرنىڭ بار - لىقىنى ئەسكەرتىدۇ، بۇنداق ئەھۋالدا ھەيزنىڭ ئىككىنچى كۈنى قارا شېكەر سۈيى ئېچىپ تەڭشەش ئېلىپ بېرىش لازىم.

سېمىزلىك


يېمەكلىكنىڭ زىيادە كۆپ قوبۇل قىلىنىشى ياكى ئورگانىزمنىڭ ماددا ئال-
مىششىنىڭ قالايمىقانلىشىشى بىلەن بەدەندە ماي كۆپلەپ يىغىلىپ قالىدۇ، بۇ
بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق ئېشىپ كېتىشىنى، شۇنداقلا ئادەم بە-
دىنىدىكى پاتولوگىيەلىك ئۆزگىرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: قالقانبەز.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ھېپوفىز، ئاشقازان، ئۇيۇقلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، تال،
جىگەر، ئۆت، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي.

قالقانبەزدىن ئىبارەت بۇ
كېسەللىك رېفلىكس رايونىنى
ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە ھە-
پوفىز، ئاشقازان، ئۇيۇقلۇق،
ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، تال،
جىگەر، ئۆت، ئىنچىكە ئۈچەي،
چوڭ ئۈچەي قاتارلىق مۇناسى-
ۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى
قوشۇمچە ئۇۋۇلىغاندا (ئۇۋۇلاش
ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتاب-
نىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن
كۆرۈڭ)، مىكرو قان ئايلى-
نىشىنى ياخشىلاپ، بەدەندە ماي-
نىڭ يىغىلىشىنى ئازايتىدۇ.





قالقانبەز رېڧلېكس رايونى باش بارماق ۋە ئىككىنچى بارماق ئارىلىقىنىڭ تۆۋەن تەرىپىگە جايلاش-
قان. ئۇۋۇلىغاندا، ئۇۋۇل سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ، ئاندىن يەنە بارماق يۆنىلىشىنى بويلاپ ئاستىدىن
ئۈستىگە قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئەگەر سېپىرىپ ئۇۋۇلاش جەريانىدا بۇ ئورۇندا قاتتىق ھۈررەك قا-
تارلىق مۇسبەتلىك ماددىلار بايقالسا، بۇ نورمال ئەھۋال ھېسابلىنىدۇ.
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

ھىپوفىز (42 - بەت)، ئاشقازان (52 - بەت)، ئۇيۇلۇق (52 - بەت)، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي
(52 - بەت)، تال (52 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، ئۆت (64 - بەت)، ئىنچىكە ئۈچەي (52 - بەت)،
چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەت، ئوڭ پۇت 65 - بەت)

4

CHAPTER

سوزۇلما كېسەللىكلەرنى ئۇۋۇلاپ داۋالاش

رېفلېكس رايونىدىن پايدىلىنىپ داۋالاش ئۇسۇلى ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، دەس-
لەپكى ساۋاتقا ئىگە بولۇش تەس ئەمەس، ئەمما بۇنى پىششىق ئىگىلەشكە بىرقەدەر
ئۇزۇن جەريان كېتىدىغان بولۇپ، بىراقلا تولۇق بىلىۋالغىلى بولمايدۇ. بىرمۇبىر
تۇتۇش ۋە ئۇۋۇلاپ، كۆپلىگەن ئەمەلىيەت تەجرىبىلىرىدىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق،
ئاندىن پىشپى يېتىلگىلى ۋە قاراتمىلىق ھالدا كېسەللىكنى تەڭشەپ داۋالغىلى
بولىدۇ. مەن ئۆزۈم يىغىنچاقلاپ چىققان — ئۆگىنىش، ئومۇمىيلاشتۇرۇش، ئىش-
لىتىش، كېڭەيتىشتىن ئىبارەت يېتەكچى پىرىنسىپ دەل بۇ سۆزنىڭ دەلىلىدۇر.
بۇ خىل ئەمەلىيەت ئارقىلىق پىشپى يېتىلىش جەريانى ئۆزىڭىزگە ساغلاملىق ئې-
لىپ كېلىپلا قالماستىن، بەلكى سىزنى ئازادە قەلبىگە ئىگە قىلىدۇ.

يۇقىرى قان بېسىم

دەسلەپكى باسقۇچىدا بۇ خىل كېسەللىكنىڭ ئالامىتى روشەن بولمايدۇ، كېسەللىكنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، باش قېيىش، باش ئاغرىش، يۈرەك سېلىش، دەم سىقىلىش، كۆكرەك ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، ئەڭ ئاخىرىدا ئېغىر بولغان يۈرەك، مېڭە ۋە بۆرەك ئەگەشمە كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ئۇ يەنە مېڭە سەكتىسى، تاجسىمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسىلىنى پەيدا قىلغۇچى ئاساسلىق سەۋەب ھېسابلىنىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: يۈرەك، پېشانە، چوڭ مېڭە، ھېپوفىز.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: جىگەر، ئۆت.

1. يۈرەك رېفلىكس رايونى سول پۇت ئالدى-قىيىنىڭ تۆتىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭىكىنىڭ ئارىسىغا جايلاشقان بولۇپ، بۇ ئورۇننى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز.





4. ھىپوفىز رېڭلېكىس رايونى باش بارماق يۇمشىقىدىن ئىككى سەل ئىچى تەرەپكە جايلاشقان بولۇپ، بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلىغاندا 3 — 5 قېتىم غىچە بېسىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

3. چوڭ مېڭە رېڭلېكىس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىساق، قان بېسىمىنى ئۈنۈملۈك تەڭشىگىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلىغان چاغدا ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

2. ئوخشاش يۆنىلىشتە باش بارماق ۋە باشقا تۆت بارماقنىڭ ئۈچى تەرىپىدىكى پېشانە رېڭلېكىس رايونىنى تەرتىپ بويىچە قىرىپ ئۇۋۇلساق، يۇقىرى قان بېسىمى، قاندىكى ماي مىقدارى ئېشىپ كېتىشنى ئۈنۈملۈك تىزگىنلىگىلى بولىدۇ.



6. سول پۇت ئاستىدىكى تال رېڭلېكىس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. تال رېڭلېكىس رايونىنى دائىم غىدىقلىغاندا، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

5. ئوڭ پۇتنىڭ ئاستىدىكى جىگەر رېڭلېكىس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن، ئاندىن يەنە ئۆت رېڭلېكىس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. جىگەر رېڭلېكىس رايونىنى دائىم غىدىقلىغاندا، جىگەر ياللۇغى، سېرىقلىق چۈشۈش، جىگەرگە سۇ چۈشۈش، جىگەر قېتىش، جىگەر خالتىلىق ئىششىق قاتارلىق جىگەر كېسەللىكلىرىنى داۋالىغىلى بولىدۇ.



TIPS

1. كىچىك سىناق

(1) ئەگەر باش بارماق بوغۇمى بىلەن بارماق - ئاللىقان بوغۇمى ئارىسىدا بىر توغرا سىزىق بولسا، بۇ بىمارنىڭ تۇغما يۇقىرى قان بېسىمى ياكى تۆۋەن قان بېسىمىغا گىرىپتار بولغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.

(2) باشقىلارنى تەكشۈرۈپ كۆرگەندە، قولىنىڭ باش بارماقنى ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق يۇمشىقى بىلەن ئۇنىڭ سول قولىنىڭ ئوتتۇرا بارماقنى قىسىمىز، باش بارماق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ قىسىش كۈچى بىردەك بولغان چاغدا، ئەگەر چىمچىلاق تەرەپكە يېقىن تەرەپ ئاغرىسا، بۇ تۆۋەن قان بېسىمى ئىكەنلىكىنى، ئەگەر باش بارماققا يېقىن تەرەپ ئاغرىسا، بۇ يۇقىرى قان بېسىمى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

2. پۇتنىڭ ئاستىدىكى قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش سىزدە قىنى (سول تەرەپتىكى رەسىمگە قاراڭ) دائىم قىرىپ ئۇۋۇلدغاندا، يۇقىرى قان بېسىمىنى تەڭشەپ داۋالاش رولىنى ئوينايدۇ.

3. تۈز ئولتۇرۇپ ئۆيىچىدىكى تامنى پايدىلىنىش ئوبىكتى قىلىمىز. ئالدىمىزغا قاراپ ئاستا - ئاستا بېشىمىزنى كۆتۈرۈپ، كۆزىمىز كۆرەلگۈدەك دەرىجىدە قىيپاش ھالەتتە ئۆيىنىڭ بۇلۇڭىغا قارايمىز، ئاندىن باشنى تۆۋەن قىلىمىز، مۇشۇنداق ھالەتتە باشنى بىر كۆتۈرۈپ بىر پەس قىلىپ جەمئىي توققۇز قېتىم داۋاملاشتۇرىمىز. بەدەن سەل كۆنگەندىن كېيىن باشنى كۆتۈرۈپ ئۆيىنىڭ تۈرۈسىغا قارىساق بولىدۇ. ئەگەر بىئاراملىق ھېس قىلىمىسا، ئارقا تەرەپتىكى تامغا قاراشنى داۋاملىق مەشىق قىلسا بولىدۇ.

4. 50 گىرام ئاچچىقسۇغا يەر ياڭىقى مېغىزنى تەخمىنەن يەتتە كۈن چىلاپ قويۇپ، ئەتىگەندە، چۈشتە ۋە كەچتە ھەر قېتىمدا يەتتە تالدىن، تاماقتىن كېيىن ياكى تاماقتىن بۇرۇن ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

قاندېكى ماي مىقدارى ئېشىپ كېتىش

قاندېكى ماي مىقدارى ئېشىپ كەتكەندە قان تومۇرلار قېتىش، قان پىلاز - مىسى ياكى قان زەردابى دۇغلىشىش، قان تومۇرلارنىڭ مەلۇم قىسمىدا كىچىك دانچىسىمان داغلار پەيدا بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: يۈرەك، پېشانە، چوڭ مېڭە، ھېپوفىز.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: تال، جىگەر، ئۆت.



2. باش بارماقنىڭ ئالدى ئۇچى تەرەپتىكى پېشانە رېفلىكس رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىش بىلەن بىر قېتىم ئۇۋلايمىز، ئاندىن يەنە باشقا تۆت بارماقنىڭ ئالدى ئۇچى تەرەپتىكى پېشانە رېفلىكس رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىشتە تەرتىپ بىلەن بىر قېتىم ئۇۋلايمىز. بۇ رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلساق، قاندېكى مايىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەتكۈزۈش بولىدۇ.

1. سول پۇتنىڭ ئاستىدىكى يۈرەك رېفلىكس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېيرىپ ئۇۋلايمىز. بۇ رېفلىكس رايونىنى غىدىقلىغاندا، سىنوسىسىمان يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، يۈرەككە قان يېتىشمەسلىك قاتارلىق كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاش مەقسىتىگە يەتكۈزۈش بولىدۇ.



3. چوڭ مېڭە رېڧلېكس رايونىنى ئۈس -
تىدىن ئاستىغا قاراپ تىك يۆنىلىشتە قىرىپ
ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ
غىدىقلىساق، باش قېيىش، باش ئاغرىش قا -
تارلىق باش قىسمىدىكى كېسەللىكلەرنى ئۇ -
نۇملۇك ياخشىلىغىلى بولىدۇ
4. ھىپوفىز رېڧلېكس رايونى باش بارماق يۇمشىقى
مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، بۇ
ئورۇننى بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، قاندىكى ماي مىقدارى
ئېشىپ كېتىش كېسەللىكىنى ئۇنۇملۇك تەڭشەپ داۋا -
لىغىلى بولىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىچكى ئاچ -
راتمىلارنىڭ قالايمىقانلىشىشىنىمۇ تەڭشەيدۇ.

يۈرەك، پېشانە، چوڭ مېڭە، ھىپوفىز قاتارلىق كېسەللىك رېڧلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندىن
باشقا، يەنە، جىگەر، ئۆت، تال قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڧلېكس رايونلىرىنىمۇ قوشۇمچە ئۇۋۇلاش زۆ -
رۈر (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ).
ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: جىگەر (64 - بەت)، ئۆت (64 - بەت)، تال (52 - بەت).

TIPS

1. ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش: قاندىكى ماي مىقدارى يۇقىرى بولغان بىمارلارنىڭ قوللىرى قىزىرىپ
كېتىدۇ. قولنىڭ ئالدىقىدا ئاق رەڭدىكى ماي دانچىلىرى بولىدۇ؛ قاندىكى ماي بەك يۇقىرى بولسا،
قولنىڭ ھەممە يەرلىرى قىزىرىپ كېتىدۇ. قولنىڭ بارماق ئۇچىمۇ چىڭقىلىدۇ، چوڭ - كىچىك بىر -
لىقىسىمان مۇسكۇل ۋە بارماق يۇمشىقىمۇ كۆيۈپ قىزىرىدۇ.
2. ھەر كۈنى سەھەردە ئاچ قورساققا بىر ئىستاكىن سۇ ئىچىش لازىم. يەنى ئالدىنقى كۈنى تولۇق
فاينىغان سۈنى ئىسسىقلىق ساقلاش ئىستاكىنىغا قۇيۇپ، ئاغزىنى ھىم ئېتىپ قويۇپ بىر كېچە قويۇپ
قويسا، بۇ دەل «مۇسبەتلىكىنى قايتۇرۇش سۈيى»گە ئايلىنىدۇ. بۇ «مۇسبەتلىكىنى قايتۇرۇش سۈيى»نى
داۋم ئىچىپ بەرگەندە «ئۈچ يۇقىرى بولۇش» كېسەللىكلىرىگە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. مۇۋاپىق مىقداردىكى بىيازنى پاكىز يۇيۇپ توغرىغاندىن كېيىن، ئۇنى ساپ ئۇزۇم ھارىقىغا
چىلاپ، ھەر كۈنى 50 - 100 مىللىلىتىرغىچە ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.
4. رەۋەن تالقىنىنى كاپۇلىنىڭ ئىچىگە 0.5 گىرامدىن قاچىلاپ، ھەر كۈنى ئۈچ ۋاق، ھەر قېتىم -
دا بىر تالدىن ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.
5. چوڭ - كىچىك تەرەتلىك راۋان بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش لازىم.
6. مايسىز، سۇيۇق - سەلەك تاماقنى كۆپرەك يېيىش لازىم.

دىيابېت كېسەللىكى

دىيابېت كېسەللىكىدە ئاساسەن كۆپ يېمىش، كۆپ ئىچىش، كۆپ سىيىش، بە - دەن ئېغىرلىقى تۆۋەنلەش (ئۈچ كۆپ بىر تۆۋەن بولۇش)، قان شېكېرى ئۆرلەش قا - تارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىللە قاندىكى ماي يۇقىرى بولۇش، يۇقىرى قان بېسىم قاتارلىق كېسەللىكلەر بىرگە قوشۇلۇپ كېلىدۇ



رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئۇيقۇلۇق، پاقالچاق قىسمىدىكى شېكەر مېتابولىزمى رېفلىكس رايونى. **مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى:** بۆرەك، تال، ئاش - قازان، پۇت.

1. ئۇيقۇلۇق رېفلىكس رايونى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، دىيابېت كېسەللىكىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلىغان چاغدا پۇتنىڭ بارمىقىدىن ئۆكچە تەرەپكە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

2. پاقالچاقتىكى شېكەر مېتابولىزمى رېفلىكس رايونى پۇتنىڭ ئىچى تەرىپىدىكى پاقالچاق سۆڭە - كىنىڭ يېنىغا جايلاشقان بولۇپ، پاقالچاق بۇلجۇڭ گۆشىنىڭ ئەڭ يۇقىرى نۇقتىسىدىن تۆۋەن تەرەپكە 3 — 4 سانتىمېتىر كېلىدىغان ئورۇندا بولىدۇ، ئورۇننى توغرا تاپقاندىن كېيىن، بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئالدىقىدىن چىڭ تىرەپ پۇتنىڭ ئورنىنى مۇقىملاشتۇرىمىز، يەنە بىر قولىمىزنىڭ بارمىقى بىلەن شېكەر مېتابولىزمى رېفلىكس رايونىنى پۇتنىڭ ئۆكچىسىدىن پاقالچاق يۆنىلىشىگە قاراپ سەل كۈچەپ ئاستا - ئاستا سېرىپ ئۇۋۇلايمىز.





4. تال رېڭلېكس رايونى سول پۇت ئالغىنىدە -
نىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تۆتىنچى بارماقنىڭ ئارقا
تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، بۇ رېڭلېكس رايونىنى
بېسىپ ئۇۋۇلغاندا ئۇيقۇلۇقنىڭ ئىقتىدارىنى
ئۈنۈملۈك ياخشىلىغىلى، دىيابېت كېسەللىكىنىڭ
ئالامەتلىرىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ.



5. ئاشقازان رېڭلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غە -
دىقلىغاندا بەدەننىڭ شېكەر مېتابولىزىمىنى تەڭ -
پۇڭلاشتۇرۇپ، دىيابېت كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى
ئالغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلغان چاغدا، ئۈستىدىن
ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ. ئەڭ ئا -
خىرىدا پۈتكۈل پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ (ئۇۋۇلاش
ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ 35 -، 65 - بەت -
لىرىدىن كۆرۈڭ) ئۇۋۇلاشنى ئاخىرلاشتۇرىمىز.



3. بۆرەك رېڭلېكس رايونىنى ئۈستە -
دىن ئاستىغا قاراپ، يېرىم چەمبەر شەك -
لىدە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

1. ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش: پۇتنىڭ
ئاستىدىكى ئۇيقۇلۇق رېڭلېكس رايونىنىڭ
تېرىسى سەل قاتتىق بولىدۇ، شۇنداقلا بۇ
ئورۇندا روشەن مۇسبەتلىك ماددىلار بولە -
دۇ؛ پاقالچاق سۆڭىكى بىلەن پاقالچاق
بۆلجۈڭ گۆشى ئارىسىغا جايلاشقان شېكەر
مېتابولىزىم رېڭلېكس رايونىنى سىيلىمە -
غاندا ناھايىتى ئاغرىيدۇ.

2. ھەر كۈنى پۇتنى ئومۇميۈزلۈك
ئۇۋۇلغاندا ھەمدە دىيابېت كېسەللىكىگە
مۇناسىۋەتلىك رېڭلېكس رايونلىرىنى نۇق -
تىلىق ھالدا سېيرىپ ئۇۋۇلاشنى دا -
ۋاملاشتۇرغاندا، كېسەللىك ئەھۋالى مەلۇم
دەرىجىدە ياخشىلىنىدۇ.

بويۇن ئومۇرتقا كېسەللىكى

بويۇن - مۈرە ئاغرىقىغا ھەمىشە باش قېيىش، پۇت - قوللار ئۇيۇشۇش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كېلىدۇ، ئېغىر بولغاندا پۇتنى تارتىشىپ قېلىش، مېڭىشى قىيىن بولۇش، ھەتتا چوڭ - كىچىك تەرىتتىن تۇتالما سىلىق ۋە پالەچ بولۇپ قېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: بويۇن، بويۇن ئومۇرتقا - قىسى، ئومۇرتقا تۈۋرۈكى، قىپاش چاسا مۇسكۇل. **مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى:** بۆرەك، جىگەر، تال.



3. قولنى قىپاش چاسا مۇسكۇل رېفلىكس رايونىغا يۆتكەپ، بۇ ئورۇننى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



1. بويۇن رېفلىكس رايونى باش بار - ماقنىڭ تۈۋىدىكى توغرا سىزىق ئورنىغا جايلاشقان. ئۇۋۇلىغاندا، بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئالدىنقىنى چىڭ تۇتۇپ تە - رەپ، يەنە بىر قولىمىزنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقى ۋە ئوتتۇرا بارمىقى بىلەن باش بارماقنىڭ تۈۋىدىن قىسىپ تۇرۇپ، باش بارماقنى ئىچى تەرەپكە ئايلاندۇرىمىز، باش بارماقنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز ھەم تارتىپ سوزىمىز.



2. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنى مىدىرلات - ماي چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىز - نىڭ باش بارمىقى بىلەن پۇت ئۆكچىسىدىن پۇت بارمىقىغا قاراپ كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بەل ئومۇرتقىسى، توققۇز كۆز سۆڭىكى، قۇيرۇق سۆڭىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ۋە - مۇرتقا تۈۋرۈكى رېفلىكس رايونىنى ئالدىدىن ئارقىغا قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



TIPS

1. ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش: ئىككىنچى ئا-
لىقان سۆڭىكىنى باسقاندا (ئۈستىدىكى رەسىمگە
قاراڭ) سىز قىراپ ئاغرىغاندەك سېزىم پەيدا بو-
لىدۇ؛ بويۇن ئومۇرتقىسى رېفلىكس رايونىنى
باسقاندا يىڭنە سانجىغاندەك ئاغرىيدۇ.

2. قولنىڭ ئوتتۇرا بارىقىنىڭ ئاستىدىكى
ئاللىقان سۆڭىكىدىن ئاغرىغان ئورۇننى تېپىپ،
شۇ ئورۇن بېسىپ ئۇۋۇلىنىدۇ ياكى ئىككى دانە
ئۇۋۇلاش تايىقى بىلەن بىرلا ۋاقىتتا بېسىپ ئۇ-
ۋۇلاپ غىدىقلىنىدۇ.

3. بويۇن، مۇرە ئاغرىسا، تازىلانغان يىرىك
تۈزىنى سېلىپ ياستۇق ياساپ، ئۇنى مىكرو دول-
قۇنلۇق ئوچاقتا قىزىتقاندىن كېيىن بويۇننىڭ
ئاستىغا قويسا، بويۇن ئومۇرتقا ئاغرىقىنى ئۇ-
نۇملۇك پەسەيتىدۇ.

4. بۆرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا،
ئۇۋۇلاش كۈچى ئۇۋۇلانغۇچى قوبۇل قىلالىغۇ-
دەك دەرىجىدە بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ.



6. تال رېفلىكس رايونى (سول پۇتنىڭ
ئاستىدا) نى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. تال رېفلىكس
رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، ھەزىم نا-
چارلىشىش، قان ئازلىق، مۈسكۈل كۈچسىز-
لىنىش قاتارلىق كېسەللىكلەر كۆرۈنەرلىك
ياخشىلىنىدۇ.



5. ئوڭ پۇت ئاستىدىكى جىگەر ۋە ئۆت
رېفلىكس رايونىنى ئادەتتە بىرلىكتە ئۇ-
ۋۇلايمىز. ئاۋۋال جىگەر رېفلىكس رايونىنى
ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ يېرىم چەمبەر
شەكلىدە قىرىپ ئۇۋۇلاپ، ئاندىن يەنە ئۆت
رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

قالقانبەز كېسەللىكى

قالقانبەزنىڭ ھورمۇن ئاجرىتىپ چىقىرىش تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلسا، قالقانبەز ئىششىش، قالقانبەز مۇسكۇل ئۆسمىسى، قالقانبەز ياللۇغى، قالقانبەز ئىقتىدا-رى كۈچىيىپ كېتىش، قالقانبەز ئىقتىدارى تۆۋەنلەش قاتارلىق كېسەللىكلەر كېلىپچىقىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: قالقانبەز.

مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: قالقان يان بېزى، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە، بۆرەك، جىگەر، ئۆپكە، تال.



قالقانبەز رېفلېكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، ئىچكى ئاجرات-مىلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش سەۋە-بىدىن كېلىپچىققان قالقانبەز ئىقتىدا-رى كۈچىيىپ كېتىش، قالقانبەز ئىق-تىدارى تۆۋەنلەش قاتارلىق كېسەللىك-لەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇ-لىغاندا ئاۋۋال ئىچىدىن سىرتىغا، ئان-دىن ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئەگەر ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ ئۈچتىن بىر قىسىم ئورۇننى سېيرىپ ئۇۋۇلاپ بولغاندا، بەزى مو-نەكسىمان ھۆررەك قاتارلىق مۇسبەتلىك ئۆزگىرىشلەر قولىمىزغا ئۇرۇنسا، بۇ نورمال ھادىسە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

قالقانبىز كېسەللىك رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندىن باشقا، يەنە قالقان يان بېزى، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە، بۆرەك، جىگەر، ئۆپكە، تال قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، قالقان يان بېزىنىڭ ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىشى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

قالقان يان بېزى (48 - بەت)، ھىپوفىز (42 - بەت)، چوڭ مېڭە (45 - بەت)، پېشانە (42 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، ئۆپكە (49 - بەت)، تال (52 - بەت)

TIPS

1. ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش: گەپ قىلغاندا بوغۇزىدا غەيرىي نەرسە باردەك بىلىنىدۇ، بۇنىڭغا قوشۇلۇپ يۈرەك ئېغىش، ھەيز قالايمىقانلىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. قالقانبىز ئىقتىدارى كۈچىيىپ كەتكەن بىمارلار تاماقتىن كۆپ يەيدۇ، ئۆزى ئورۇق تۇرىدۇ، كۆز قارىچۇقى پۇتلىنىپ چىقىدۇ، قالقانبىز ئىششىيدۇ، بۇنىڭغا قوشۇلۇپ يۈرەك قوزغىلىش، ئىچى تىتىلداش، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. قالقانبىز ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ كەتكەن بىمارلارنىڭ نامىقى ئارىيىپ، ئاسان سەمرىپ كېتىدۇ ھەمدە كۆپ ئۇخلايدۇ.


2. يۈنەن بەيياۋغا ئاچچىقسۇ قوشۇپ مەلھەم قىلىپ، بويۇن ۋە پۇت ئاستىدىكى قالقان بېزى رېفلېكس رايونىغا چېپىپ، 12 سائەتتىن كېيىن ئېلىۋېتىلىدۇ، 12 سائەت ئۆتكەندىن كېيىن مەلھەمنى يەنە يەنە بىر قېتىم چاپىدۇ. ئاچچىقسۇنىڭ چىرىتىشچانلىقى كۈچلۈك بولغاچقا تېرىگە زىيان قىلىدۇ، بۇنىڭ ئورنىدا ھەسەل ياكى كۈنجۈت يېغىنى ئىشلىتىپ دورا تەڭشىسىمۇ بولىدۇ.

ئۆپكە كېسەللىكلىرى

ئۆپكە كېسەللىكلىرى ئۆپكە ياللۇغى، ئۆپكە گازلىق ئىششىقى، كانايچە يال-
لۇغى، ئۆپكەگە كىرىمىنى تۈزەتلىرى ئولتۇرۇشۇش قاتارلىق تۈرلۈك كېسەل-
لىكلەر ۋە ئۆپكە يېقىمىسىزلىنىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئۆپكە، كانايچە، كاناي.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بەزى، تال، چوڭ مېڭە، ھىپوفىز، پېشانە، بۇرۇن،
چوڭ ئۈچەي.



3. كاناي، قىزىلئۆڭ-
گەچ، يۇتقۇنچاق ۋە كۆك-
رەك لىمفا بەزى رېفلىكس
رايونلىرىنى رەسىمدە
كۆرسىتىلگەن يۆنىلىش
بويىچە سېيرىپ ئۇۋۇلايد-
مىز. بۇ رايونلارنى ئۇزۇن
مۇددەت ئۇۋۇلىغاندا نەپەس
سىستېمىسى كېسەللىك-
لىرىنى ئۈنۈملۈك داۋالە-
غىلى بولىدۇ.

2. ئىككى قولىنىڭ باش بارمىقى
بىلەن پۇتنىڭ ئۈچىنچى بارمىقى ئوت-
تۇرسىنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى كانايچە
رېفلىكس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە
قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۆپكە رېف-
لىكسى رايونىنى ماسلاشتۇرۇپ ئۇۋۇلە-
غاندا، ئۆپكە قىسمىنىڭ ئىقتىدارىنى
كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

1. ئۆپكە رېفلىكس
رايونىنى ئىچىدىن سىر-
تىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك
قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

ئۆپكە، كانايچە، كاناي قاتارلىق كېسەللىك رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلغاندىن باشقا، يەنە بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، چوڭ مېڭە، ھىپوفىز، پېشانە، بۇرۇن، چوڭ ئۇچەي قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلسا بولىدۇ (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ).

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، تال (52 - بەت)، چوڭ مېڭە (45 - بەت)، ھىپوفىز (42 - بەت)، پېشانە (42 - بەت)، بۇرۇن (44 - بەت)، چوڭ ئۇچەي (سول پۇت قىسمى 53 - بەت، ئوڭ پۇت قىسمى 65 - بەت).

TIPS

1. ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش: قول قىسمى رېفلىكس رايونى (تۆتىنچى، بەشىنچى ئاللىقان سۆڭىكىنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆ-تۈپ، ئاللىقان مەركىزىنىڭ ئوڭ تەرەپ ئۈستىگە جايلاشقان. كۆنك-رەت ئورنىنى ئوڭ تەرەپتىكى رەسىمدىن كۆرۈڭ)دىكى پۈرۈم ئىزلار روشەن ھالدا كۆيىدۇ ھەم ئاق چېكىتلەر بولىدۇ.
2. قولنى جۈپلەپ ئۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۆپكە كېسەللىكىنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ. ھەممە بارماقنى تولۇق ئېچىپ، ئاللىقان ۋە بارماقلارنى يېقىن تەڭكۈزۈپ تولۇق جىپىلاشتۇرۇپ كۈچەپ ئۇرما بولىدۇ. ئەڭ ياخشىسى تاماقتىن بۇرۇن ياكى تاماقتى يەپ بولۇپ بىر سائەتتىن كېيىن بۇ مەشغۇلاتنى ئىشلىسە بولىدۇ. قولنى جۈپلەپ ئۇرۇش قېتىم سانى بەدەننىڭ كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ 200 قېتىمدىن 1000 قېتىمغىچە بولسا بولىدۇ. ئەڭ ياخشىسى بىر تەرەپتىن ماڭغاچ، بىر تەرەپتىن قولنى ئۇرما ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.
3. پۇت ئاستىدىكى چېشى پەللىسىنى بېسىپ ئۇۋۇلغاندا، بىلغەمنى بوشتىتىپ يۆتەلنى ئوخشىتىدۇ.



يۈرەك كېسەللىكى

يۈرەك كېسەللىكى — يۈرەك كېسەللىكلىرىنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى بو-
لۇپ، بىماردا يۈرەك سېلىش، مەيدە قىسمى ئاغرىش، مەيدىسى چىڭقىلىش، يۈ-
رەك ئېغىش، يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، نەپەس يېتىشمەسلىك قاتارلىق كېسەللىك
ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: يۈرەك.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: پېشانە، چوڭ مېڭە، ھېپوفىز، پۇت ئاستىدىكى قان بېسىمىنى
تۆۋەنلىتىش سىزىقى.



2. پۇت بارمىقىنىڭ ئالدى ئۇچىغا جايلاش-
قان پېشانە رېفلىكس رايونىنى توغرىسىغا قى-
رىپ ئۇۋۇلايمىز، كونكرېت ئۇۋۇلاش يۆنىلىش-
نى خالىغانچە تاللايمىز، پەقەت ئوخشاش بىر
يۆنىلىشتە ئۇۋۇلساقلا بولىدۇ. ئاۋۋال باش بار-
ماقنىڭ ئۈچى تەرىپىگە جايلاشقان پېشانە رې-
فلىكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلاپ، ئاندىن يەنە
باشقا تۆت بارماقنىڭ ئۈچى تەرىپىگە پېشانە
رېفلىكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

1. يۈرەك رېفلىكس رايونىنى ئاستىدىن ئۇس-
تىگە قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز. يۈرەك رېفلىكس
رايونىنى ئۇۋۇلىغاندا، ئۇۋۇلاش ھەرىكىتى ئاستا ۋە
يېنىك بولۇشى، يۈرەكنىڭ ساغلاملىق ئەھۋالىغا
قاراپ ئۇۋۇلاش دەرىجىسىنى مۇۋاپىق تەڭشەش كې-
رەك. دائىم يۈرەك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غە-
دىقلىغاندا، يۈرەك كېسەللىكىگە گىرىپتار بولۇش
نەسبىتىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ.



3. بارماقنىڭ ئۇچى تەرەپتىن بار -
ماق تۈۋىگە قاراپ چوڭ مېڭە رېڧلېكس
رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز .

4. باش بارماق يۇمشىقى مەركىزىنىڭ
سەل ئىچى تەرىپىدىكى ھېپوفىز رېڧلېكس
رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز . ھېپوفىز رېڧ -
لېكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا،
پۈتكۈل بەدەننىڭ ئاساسلىق توققۇز چوڭ
سىستېمىسىدىكى كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ
داۋالىغىلى بولىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە يە -
نە ۋاقىت پەرقىنى كەينىگە قايتۇرۇشتا كۆ -
رۈنەرلىك ئۈنۈم بىرىدۇ .

5. ئىككى پۇت باش بارماقنىڭ تۈۋىدىكى
ئىككىنچى توغرا سىزىق مەركىزىنى نۇقتىسى بى -
لەن تىك كېسىشكەن جايغا ئورۇنلاشقان پۇت ئاس -
تى قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش سىزىقىنى ئاس -
تىدىن ئۈستىگە قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز .



TIPS

1. ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش: ئوڭ ۋە سول قولنىڭ چوڭ بېلىقىمىن مۇسكۇلىدا نۇرغۇنلىغان كۆك
سىزىقلار پەيدا بولسا، بۇ يۈرەك كېسەللىكىگە گىرىپتار بولۇش ئېھتىماللىقىدىن بېشارەت بېرىدۇ؛ ئە -
گەر تاجىمىن ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسەللىكى بولسا، سول قول باش بارماقنىڭ تۈۋىدە ئۆزئارا تىك
كېسىشكەن بىر سىزىقنى، يەنى تاجىمىن ئارتېرىيە سىزىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ، قۇلاق قىسمىدىكى
يۈرەك رېڧلېكس رايونىدىمۇ بۇ سىزىقنى كۆرگىلى بولىدۇ .

2. مۆجىزىلىك تەڭشەپ داۋالاش ئۇسۇلى: كۆرسەتكۈچ بارماق ئۇچى بىلەن سول قولنىڭ بىرىنچى
ئالغان سۆڭىكىنىڭ سۆڭەك تۇتىشىش ئورنى كۈچەپ توققۇز قېتىم تاتىلاپ ئۇۋۇلىنىدۇ، غىدىقلاش
جەريانىدا ئۇۋۇلانغۇچىنىڭ قولىنى يۈرەك بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويۇشقا دىققەت قىلىش لازىم .
دىققەت: ئۇۋۇلاپ تەڭشەش جەريانىدا بىمارنىڭ قان تومۇرلىرى غىدىقلانغاندىن كېيىن كېڭىيىدۇ،
بۇنىڭ بىلەن قان ئايلىنىش تېزلىشىپ، كۆپ تەرلەشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ . 5 — 6 مىنۇتتىن كې -
يىن، كۆكرەك چىڭقىلىش ئەھۋالى مەلۇم دەرىجىدە ياخشىلىنىدۇ . يۈرنى زەئىپلەشكەن ياكى ئوپىرات -
سىيە قىلىنغان بىمارلارنى بۇ ئۇسۇل بىلەن داۋالاشقا بولىمايدۇ .

جىگەر ياللۇغى

جىگەر ياللۇغىنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، چىرايى سارغىيىش، كۆز قۇرغاقلىشىش، جىگەر ئاغ-رىش، جىگەر ئىششىش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت (B) تىپلىق جىگەر ياللۇغى يۈ-قۇملۇق بولۇپ، بۇ خىل كېسەللىك ئۇۋۇلاپ داۋالاش دائىرىسىگە كىرمەيدۇ).

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: جىگەر.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ئۆت، يۈرەك، كۆز، چوڭ مېڭە، ھىپوفىز، پېشانە، ئاشقازان، ئۆد-قۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، بۆرەك.

جىگەر رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە ئۆت، يۈرەك، كۆز، چوڭ مېڭە، ھىپوفىز، پېشانە، ئاشقا-زان، ئۇيۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈ-چەي، چوڭ ئۈچەي، بۆرەك قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇ-سۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، جىگەر ياللۇغى، جىگەر قېتىش، جىگەر يىرىڭلىق ئىششىق قاتارلىق جىگەر كېسەللىكلىرىنى داۋالىغىلى بو-لىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

ئۆت (64 - بەت) يۈرەك (49 - بەت)، كۆز (46 - بەت)، چوڭ مېڭە (45 - بەت)، ھىپوفىز (42 - بەت)، پېشانە (42 - بەت)، ئاشقازان (52 - بەت)، ئاشقازان ئاستى بېزى (52 - بەت)، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي (52 - بەت)، ئىن-چىكە ئۈچەي (52 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەت، ئوڭ پۇت 65 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت).

جىگەر ۋە ئۆت رېفلىكس رايونى
ئوڭ پۇت ئاستىدىكى بىر - بىرىگە يې-قىن ئورۇنغا جايلاشقان بولۇپ، بۇ ئىك-كىسىنىڭ ئىقتىدارى بىر - بىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك، ئادەتتە بىرلىكتە ئۇۋۇلاپ تەڭشەش ئېلىپ بارىمىز. ئالدى بىلەن جىگەر رېفلىكس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلاپ، ئاندىن ئۆت رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇ-ۋۇلايمىز. بۇنداق ئۇۋۇلىغاندا تۈرلۈك جىگەر كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋال-غىلى بولىدۇ.



TIPS

ئۆزىنى ئۆزى دىكسورۇش: ئەگەر ئىككى قولىنىڭ چوڭ بېلىقىمىز مۇسكۇل قىسمى بىخىرەرەك كۆرۈنسە، يەنە ئو-جۇق قىزىل داغىمىز چىكىنلەر بولسا (كىشىلەر ئىلگىرى-ئۆزى جىگەر ئالىغان دەپ ئاتىغان)، بۇ جىگەر رايونىغا گىد-رېمىتار بولۇش خەۋپىنىڭ يارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

ئۆت ياللۇغى

ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئۆت ياللۇغىدا ئاساسەن قورساقنىڭ ئوڭ تەرەپ ئۈستى ئاغرىدۇ، يەنە كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق كۆپۈش، ئىشتىھا تۈتۈلۈش ۋە قىزىش قاتارلىق ئالامەتلەر بىللە كۆرۈلىدۇ؛ سوزۇلما خاراكتېرلىك ئۆت ياللۇغى كۆپىنچە تەكرار قوزغىلىدۇ ۋە مۇجۇپ ئاغرىدۇ، ئادەتتە كۆپىنچە قورساقنىڭ ئوڭ تەرەپ ئۈستى ئاغرىش، قورساق كۆپۈش، كېكىرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئۆت.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ھىپوفىز، بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، جىگەر، ئاشقازان، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، ئاستىنقى بەدەن ۋە ئۈستۈنكى بەدەن لىمفا بېزى.

ئۆت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندىن باشقا، يەنە ھىپوفىز، بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، جىگەر، ئاشقازان، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، ئاستىنقى بەدەن ۋە ئۈستۈنكى بەدەن لىمفا بېزى قاتارلىق رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، ھەر خىل ئۆت كېسەللىكلىرىنى داۋالىغىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

ھىپوفىز (42 - بەت)، بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، تال (52 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، ئاشقازان (52 - بەت)، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي (52 - بەت)، ئىنچىكە ئۈچەي (52 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەت، ئوڭ پۇت 65 - بەت)، ئاستىنقى بەدەن ۋە ئۈستۈنكى بەدەن لىمفا بېزى (62 - بەت).

TIPS

1. ئۆزىنى تۈزى تەكشۈرۈش: پۇت قىسمىدىكى ئۆت رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا غەيرىي نەرسىلەر قولغا يىلىنىدۇ. شۇنداقلا رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندا ئۇۋۇلانغۇچى ئاغرىقنى ھېس قىلىش بىلەن بىرگە، تۆۋەنكى قورساق قىسمىنىڭ ئاغرىقلىقلىرىنى ھېس قىلىدۇ؛ سول يۈزىنىڭ تۆتىنچى بارمىقىدا قانداق يەيدا بولىدۇ.

2. ھەر كۈنى ئۆت پەللىسىنى (ئۈستىدىكى رەسىمگە قاراڭ) 36 — 100 قېتىمغىچە سېپىرىپ ئۇۋۇلسا بولىدۇ. تۈنجى قېتىم ئۇۋۇلغاندا ئۇۋۇلانغۇچى قاتتىق سىزىقراپ ئاغرىغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ، شۇنداقىمۇ ئۇۋۇلاشنى داۋاملاشتۇرغاندا كېسەللىك ئەھۋالى ئاستا - ئاستا ياخشىلىنىدۇ.



ئوڭ پۇت ئالدىنقىنىڭ ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى ئالدىنقى سۆڭەك ئارىسىدىكى ئۆت رېفلىكس رايونىنى دائىم بېسىپ ئۇۋۇلساق، ئۆت ياللۇغى، ئۆتكە تاش چۈشۈش، سېرىقلىق ۋە باشقا ئۆت يولى كېسەللىكلىرىنى ئۈنۈملۈك داۋالىغىلى بولىدۇ.

ئۆتكە تاش چۈشۈش

ئۆتكە تاش چۈشۈش دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىك بولۇپ، بىماردا كۆپىنچە ئۆت سانجىلىپ ئاغرىش، ئۈستۈنكى قورساق يېنىك ئاغرىش قاتارلىق ئالامەت-لەر كۆرۈلۈپ، ئاغرىق ئادەتتە سەھەر سائەت 1 — 3 كىچە (بېيجىڭ ۋاقتى) بولغان ۋاقىتتا قوزغىلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: جىگەر، ئۆت.

مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: ھىپوفىز، جىگەر، ئاشقازان، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي.

جىگەر ۋە ئۆت رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندىن باشقا، يەنە ھىپوفىز، جىگەر، ئاشقازان، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، ئۆت سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاچىرىلىپ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆت ياللۇغى، ئۆتكە تاش چۈشۈش ۋە باشقا ئۆت كېسەللىرىنى تەڭشەپ داۋالاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

ھىپوفىز (42 - بەت)، ئاشقازان (52 - بەت)، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي (52 - بەت)، ئىنچىكە ئۈچەي (52 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەت، ئوڭ پۇت 65 - بەت).

جىگەر رېفلېكس رايونى ئوڭ پۇت ئال-قىمىدىكى تۆتىنچى ۋە بەشىنچى ئالمىقان سۆڭىكى ئارىسىدا بولىدۇ، ئۆت رېفلېكس رايونى جىگەر رېفلېكس رايونى بىلەن قوشنا بولۇپ، ئوڭ پۇت ئالمىقىدىكى ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى ئالمىقان سۆڭىكى ئارىسىغا جايلاشقان. جىگەر ۋە ئۆت رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، كۆپ خىل جىگەر ۋە ئۆت كېسەللىكلىرىنى ئۈنۈر-سال داۋالىغىلى بولىدۇ.

TIPS

1. ئۆتكە چۈشكەن تاشنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە داۋاملىق دىققەت قىلىش لازىم. ئەگەر ئۆتكە چۈشكەن تاشنىڭ چوڭلۇقى 0.6 مىللىمېتىرغا يەسە، ئۆت رېفلېكس رايونىنى مەجبۇرىي ئۇۋۇلاپ غىدىقلاشقا بولمايدۇ، چۈنكى ئۆت غول نەچچىسىنىڭ دىئامېتىرى پەقەت 0.5 مىللىمېتىرلا كېلىدۇ. ئۆتكە چۈشكەن تاشنىڭ چوڭلۇقى ئۆت غول ئەمەس، جىسىمنىڭ دىئامېتىرىغا يېقىن بولسا، تاش ئاسانلا غول تىزىپ چىقىلىۋالىدىغان ئەھۋال كېلىپچىقىدۇ.

2. ھەر كۈنى مۇۋاپىق مىقداردىكى ياقىمپۇرماقنى دەملىگەن جاي ئورنىدا ئىچىد بولىدۇ.



ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش

بىماردا ئادەتتە قورساق كۆپۈش، قورساق ئاغرىش ۋە ئۈستۈنكى قورساق قىسمى بىئارام بولۇش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قەۋزىيەت قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئاشقازان، ئۇيۇقلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، تال. مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: قىزىلتۇڭگەچ، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي.



1. ئاستىدىن ئۈستىگە قارىتا ئون 2. تال رېفلىكس رايونى سول پۇت ئالغىنىنىڭ ئوتتۇرا ئىككى بارماق ئۈچەي، ئۇيۇقلۇق ۋە ئاش - قىسمىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدە بولۇپ، يۈرەك رېفلىكس رايونىنىڭ قازان رېفلىكس رايونلىرىنى تەرتىپ بويىچە بىر سانتىمېتىر تۆۋەندىكى ئورۇنغا جايلاشقان. ھەر قېتىم بۇ جاينى 3 — 5 قېتىمغىچە بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، ئاشقازان - يىچە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. نىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشى ئۈنۈملۈك ياخشىلىنىدۇ.

ئاشقازان، ئۇيۇقلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، تال قاتارلىق كېسەللىك رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندىن باشقا، يەنە قىزىلتۇڭگەچ، ئىنچىكە ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىسا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش، ئاشقازان ئاغرىش، ئاشقازان ئېچىد - شىش، سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان يارسى قاتارلىق ئاشقازان كېسەللىكلىرىنى ئۈنۈملۈك تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

قىزىلتۇڭگەچ (61 - بەت)، ئىنچىكە ئۈچەي (52 - بەت)، چوڭ ئۈچەي (سول پۇت 53 - بەت، ئوڭ پۇت 65 - بەت).

TIPS

1. ئاشقازاننىڭ تۆۋەنلەپ كېتىش ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، ئۇۋۇلىغاندا ئۈستىگە قاراپ كۈچ بېرىپ (ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېرىپ)، ئاشقازاننىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.
2. ناھايىتى ئاجىز (ئورۇق) ياكى ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغان بىمارلار تاماقنى كېيىنلا دەرھال ھەرىكەت قىلىشقا، تاماقنى يېيىپ بولۇپ، كارىۋاتىغا (30 مىنۇت ئۆز ياتقانىدىن كېيىن) ئاندىن ھەرىكەت قىلىشى كېرەك.

بۆرەككە تاش چۈشۈش

بىماردا تۇيۇقسىز پىچاق بىلەن تىلغاندەك ئاغرىق سېزىمى پەيدا بولىدۇ، ھەم بۇ ئاغرىق بەل ياكى تۆۋەنكى قورساق قىسمى، پاقالچاقنىڭ ئىچى تەرىپى ۋە ئەۋرەت قىسمىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كۆڭۈل ئىشلىتىش، قۇسۇش، قانلىق سۈيدۈك قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: بۆرەك، سۈيدۈك توشۇش نەيچىسى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: تال، ئۆپكە، دوۋساق، سۈيدۈك يولى.



1. بۆرەك رېفلېكس رايونى پۇت ئالغىد -
ئىنساننىڭ مەركىزىي قىسمىدىكى «人» خېتى
شەكلىنىڭ كېسىش نۇقتىسىنىڭ تۆۋەن
تەرىپىدىكى ئويمان ئورۇنغا جايلاشقان بولۇپ،
ئۇۋۇلىغان چاغدا، پۇت ئالغىنىنىڭ مەركىزى -
زىدىن ئۆتكۈچە يۆنىلىشنى بويلاپ، بۆرەك رېف -
لېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.
2. سۈيدۈك توشۇش نەيچىسى رېفلېكس رايونى
بۆرەك، دوۋساق رېفلېكس رايونىنى تۇتاشتۇرۇپ تۇردى -
دىغان كۆۋرۈك بولۇپ، ئۇۋۇلىغان چاغدا بۆرەك رېف -
لېكس رايونىدىن دوۋساق رېفلېكس رايونى يۆنىلىشىگە
قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق، سۈيدۈك نەيچىسى يولىنى
راۋانلاشتۇرۇپ، كېرەكسىزلىرىنى چىقىرىپ تاشلاشنى
ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.

5. كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بارماق بوغۇمى بىلەن ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ دوۋساق رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلساق، سۈيدۈك يوللىرى راۋانلىشىدۇ.



4. ئۆپكە رېفلېكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا قاراپ ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



3. تال رېفلېكس رايونى سول پۇت ئاستىدا بولۇپ، چوڭلۇقى تەخمىنەن كۆرسەتكۈچ بارماق يۇمشىقىغا تەڭداش كېلىدۇ، شۇڭا ئۇۋۇلىغاندا بېسىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.



6. بىر قولىمىز بىلەن پۇت ئالقىنىنىڭ ئالدى تەرىپىنى سەل ئوڭغا سىلجىتىپ تۇتىمىز، يەنە بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئىچى تەرىپىدىكى سۈيدۈك يولى، جىنسىي يول رېفلېكس رايونىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسىنى بېسىپ تۇرۇپ، دوۋساقىتىن يانپاش بوغۇمىنىڭ ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



TIPS

1. سەھەردە ئاچ قورساققا سۇ ئىچىش لازىم، قاينىتىپ سۈۋۈتقان سۇنى ئىچسە ئەڭ ياخشى بولىدۇ.
2. پاقىيويۇرمىقى ئۈتىنى دەملەپ چاي ئورنىدا ئىچسە تاشنى ئېرىتىشكە پايدىلىق.
3. تۇنجى قېتىم ئۇۋۇلىغاندا، رېفلېكس رايونىنى بەك كۈچەپ غىدىقلاشقا بولمايدۇ، بۆرەككە چۈشكەن تاش بەك چوڭ بولسا، كۈچەپ ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا بۇ تاش سۈيدۈك يولىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويىدۇ. ئۇدا 10 كۈن ئۇۋۇلىغاندىن كېيىن، يەنە ئۇۋۇلساق چى بولغاندا كۆپ مىقداردا سۇ ئىچسە ياكى سەكرەش ھەرىكەتلىرىنى ئىشلىسە، يىغىلغان تاشنى بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشلاشقا پايدىلىق.

بۆرەك ياللۇغى

بۆرەك ياللۇغىدا كۆپىنچە قان سىيىش، ئاقسىل سىيىش، سۇلۇق ئىششىق، يۇقىرى قان بېسىمى قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، ئۆپكە، سۈيۈك نەيچىسى، دوۋساق، سۈيۈك يولى، جىگەر.

بۆرەكتىن ئىبارەت بۇ كېسەللىك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلغاندىن باشقا، يەنە بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، ئۆپكە، سۈيۈك نەيچىسى، دوۋساق، سۈيۈك يولى، جىگەر قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، بۆرەكنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، بۆرەك ياللۇغى قاتارلىق بۆرەك كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ۋە تەخشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، تال (52 - بەت)، ئۆپكە (49 - بەت)، سۈيۈك نەيچىسى (39 - بەت)، دوۋساق (40 - بەت)، سۈيۈك يولى (40 - بەت)، جىگەر (64 - بەت).

بۆرەك رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، بۆرەكنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ، يەنە بۆرەك ياللۇغى، بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇش قاتارلىق بۆرەك كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇلغان چاغدا، بۆرەك رېفلىكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ يەلپۈگۈچ شەكىلدە ئۇۋۇلداساقلا بولىدۇ.

TIPS

1. پاقىيويۇرمىقىدىن 30 — 60 گىرامغىچە، سۇغىپىياز بېشىدىن بىر تال ئالىمىز، پاقىيويۇرمىقىنى پاكىز يۇيۇپ ئۇششاق توغراپ، سۇغىپىياز بېشى بىلەن قوشۇپ پىشۇرغاندىن كېيىن تىرىپىلىرىنى سۈزۈۋېتىپ، ئاندىن سۈيىگە يۇمىلاق گۈرۈچنى سېلىپ قاينىتىپ شۇۋىگۈرۈچ ئېتىلىدۇ. بۇ رېتسېپنىڭ كىچىك تەرەت راۋان بولماسلىق، قان سىيىش، سۇلۇق ئىششىق قاتارلىق ئۇۋۇلاش كۈر خاراكتېرلىك بۆرەك ياللۇغىنى داۋالاشتىكى ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى. ئەمما بۇ رېتسېپ ئۇيۇقلۇقتا سىيىپ قويىدىغان ۋە ئېھتىلام بولىدىغان كىشىلەرگە ماس كەلمەيدۇ.

2. قۇرۇتۇلغان كۆممىقوناق ساقلىمىدىن 50 گىرام تېلىپ، 600 مىللىلىتىر سۇغا سېلىپ سۇس ئوتتا 20 — 30 مىنۇت قاينىتىپ، تىرىپىلىرىنى سۈزۈۋېتىپ، ۋەتكەندىن كېيىن ھەر كۈنى بىر ياكى ئىككى قېتىم ئىچىپ بەرسە، سۈيۈكلىرى راۋانلاشتۇرۇپ، ئىششىقنى ياندۇرۇپ، بۆرەكنىڭ ئىقتىدارىنى ياخشىلايدۇ.

3. سۆسۈن شۆيۈكلۈك ساقلىمىدىن بىر باش، ئايدىمىلىك ئۇرۇقىدىن 60 تال تېلىپ، ئېزىپ مەلھەم قىلىپ، تەكشى ھالەتتە پۇتنىڭ ئالدىنقىغا سۈركەپ ئۈستىدىن تېپىر داكا بىلەن تېگىپ قويۇپ، بىر ھەپتىدىن كېيىن ئېلىۋەتسە، سۈيۈكلىرى راۋانلاشتۇرۇپ ئىششىقنى ياندۇرىدۇ. ئادەتتە تۈزۈنى ئاز ئىستېمال قىلىش لازىم.



دوۋساق ياللۇغى

دوۋساق ياللۇغى ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك دەپ ئىككى خىلغا ئايرىلىدۇ، ئۆتكۈر دوۋساق ياللۇغى تۇيۇقسىز قوزغىلىدىغان بولۇپ، سىيگەندە كۆيۈشكەندەك سېزىم بولىدۇ ھەمدە سۈيدۈك يولى ئاغرىيدۇ؛ سوزۇلما دوۋساق ياللۇغى بىمارلىرىدا بەدەن ماغدۇرسىزلىنىش، دوۋسۇن سۆڭىكى ئاغرىش، بەل ئاغرىش ۋە سۈيدۈك يىغىلىپ قېلىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

دوۋساق رېفلىكس رايونىنى دا-ئىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، دوۋساق ياللۇغى، دوۋساق ئۇنىۋېرسال كېسەللىك قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ۋە داۋالىغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇ-لىغاندا كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمىنىڭ يان بىلەك تەرىپى بىلەن ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: دوۋساق.

مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ھىپوفىز، بۆرەك، بۆرەك ئۈستى بېزى، ئال، سۈيدۈك نەيچىسى، سۈيدۈك يولى.

دوۋساق كېسەللىك رېفلىكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندىن باشقا، يەنە ھىپوفىز، بۆرەك، بۆرەك ئۈستى بېزى، ئال، سۈيدۈك نەيچىسى، سۈيدۈك يولى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمە-چە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەز-كۈر كىتابىنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، دوۋساقنى ساغلاملاشتۇرۇپ، دوۋساقنىڭ ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

ھىپوفىز (42 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت)، بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، ئال (52 - بەت)، سۈيدۈك نەيچىسى (39 - بەت)، سۈيدۈك يولى (40 - بەت).

TIPS

1. كۆمىقوناق كېپىكى ياكى كۆمىقوناق ئۈستىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سۇغا سېلىپ پىشۇرۇپ ئوماچ قىلغاندىن كېيىن، ئازراق تۇز سېلىپ ئاچ قورساق ئىچىدە بولىدۇ.

2. زەمچىدىن 31 گىرام ئېلىپ، بۇنىڭغا گۈرۈچ سىركىسىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئوماچسىمان ھالەتكە كەلتۈرۈپ، ئۇنى كۈندە بىر قېتىم پۇتنىڭ ئالدىدىكى بوغۇز پەللىسى ئورنىغا چېپىپ، ئۈستىدىن داكا بىلەن تېگىپ قويۇپ، 24 سائەتتىن كېيىن پاكىز يۇيۇۋەتسە بولىدۇ.

ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى

ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى ھەزىم قىلىش يوللىرى يارىسى ئىچىدە - كى دائىم ئۇچرايدىغان بىر خىل كېسەللىك بولۇپ، بۇنىڭ كىلىنىكىدىكى ئالامەت - تى شۇكى، تاماقتى يەپ 2 — 4 سائەتكىچە بولغان ۋاقىتتا قورساقنىڭ ئۈستى قىسمى ئاغرىيدۇ ھەمدە ئاغرىق خېلى ئۇزۇن داۋام قىلىدۇ، يەنە تاماق يېگەندىن كېيىن ئاغرىق مەلۇم دەرىجىدە پەسىيدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ئون ئىككى بارماق ئۈچەي.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ئاشقازان، ئۇيۇلۇق، جىگەر، ئۆت، تال، ئىنچىكە ئۈچەي، چولغۇ ئۈچەي.

1. تاپان يايىنىڭ ئىچى تەرىپىنى بويلاپ، ئاشقازان، ئۇيۇلۇق، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي رېفلىكس رايونلىرىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ تەرتىپ بويىچە قىرىپ ئۇۋۇلساق، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، ئاشقازان يارىسى، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى، تال، ئاشقازان ۋە ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى ناچار بولۇش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى مەلۇم دەرىجىدە تەڭشەپ داۋالاش رولىنى ئوينايدۇ.



3. سول پۇتنى ئالماشتۇرۇپ، پۇتنىڭ ئاستىدىكى تال رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئورۇننى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، بەدەننىڭ كېسەللىكىگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

2. ئولغۇ پۇتنىڭ ئاستىدىكى ئۆت رېفلىكس رايونى بىلەن جىگەر رېفلىكس رايونى ئۆزئارا تۇتاش بولۇپ، بۇنى ئۆزئارا ماسلاشتۇرۇپ ئۇۋۇلاشقا توغرا كېلىدۇ. ئۇۋۇلىغان چاغدا، ئاۋۋال جىگەر رېفلىكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلاپ، ئاندىن يەنە ئۆت رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

4. ئىنچىكە ئۇچەي رېفلىكس رايونى بىر-
رىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى شىناسىمان
سۆڭەك ۋە ئاز بىر قىسىم كۈبىكسىمان سۆ-
ڭەك بىلەن ئۆكچە سۆڭىكى ئارىسىدىكى ئويمان
ئورۇنغا جايلاشقان. ئىنچىكە ئۇچەي رېفلىكس
رايونىنىڭ ئورۇنلىشىش ئالاھىدىلىكىگە ئا-
ساسەن، تۆت بارماقنىڭ بوغۇمى بىلەن ئۈس-
تىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



5. ئوڭ - سول پۇت ئاستىدىكى توغرا
بوغماق ئۇچەي، ئوڭ پۇت ئاستىدىكى يۇقىرىد-
ىلىغۇچى بوغماق ئۇچەي ۋە سول پۇت ئاستىد-
ىكى تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۇچەي، S سىمان
بوغماق ئۇچەي، تۈز ئۇچەي، مەقئەت قاتارلىق
رېفلىكس رايونلىرىنىڭ ھەممىسى چوڭ ئۇچەي
رېفلىكس رايونىغا تەۋە بولىدۇ. ئون ئىككى بار-
ماق ئۇچەي يارىسىنى تەڭشەپ داۋالىغاندا، ئىك-
كى پۇتتىكى ئورۇننى بىرلىكتە ئۇۋۇلاپ تەڭ-
شەشكە توغرا كېلىدۇ. ئۇۋۇلىغان چاغدا، سائەت
ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە ئاۋۋال
سول پۇتنى ئاندىن ئوڭ پۇتنى ئۇۋۇلايمىز.



TIPS

1. ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش: چوڭ تەرەتكە ئاساسەن
ئۆزىنى تەكشۈرگىلى بولىدۇ، ئەگەر چوڭ تەرەتنىڭ
رەڭگى قارا بولسا، ئون ئىككى بارماق ئۇچەي يارىسى
بولۇشتىن دىققەت قىلىش زۆرۈر.
2. ئىككى - ئۈچ چۆمۈچ گۈرۈچ ھارلىقى (يېپىش-
قاق گۈرۈچتىن ئېچىتىلغان ھاراق) نى سۇس ئوتتا
قاينىتىپ، ئۇنىڭغا بىر تال تۇخۇمنى چېقىپ ئارىلاش-
تۇرغاندىن كېيىن، ھەر كۈنى ئەتىگەندە بىر پىيالىدىن
ئىچسە بولىدۇ.
3. يۈننەن بەيياۋ ھەر كۈنى تۆت ۋاق، ھەر قېتىم
0.75 گرامدىن تاكى يارا ياخشىلانغىچە ئىچسە بولىدۇ.



1. سول پۇتنىڭ ئىچى تەرد-
پىدىكى ئۆكچە سۆڭىكىنىڭ ئالدى
گىرۋىكىگە بەلباغسىمان ھالەتتە
جايلاشقان تۈز ئۈچەي رېفلىكس
رايونىنى سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ
قىرىپ ئۇۋۇلساق، ئاغرىقنى
پەسەيتكىلى بولىدۇ.

تۈز ئۈچەي ياللۇغى

تۈز ئۈچەي ياللۇغىدا ئىچى سۈ-
رۇش، قورساق ئاغرىش ۋە قورساق
كۆپۈش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، بۇنىڭ-
غا قوشۇلۇپ يەنە مەقئەت قىسمى قات-
تىق ئاغرىش، قەۋزىيەت ياكى ئىچى
سۈرۈش، تۆۋەنكى قورساق قىسمى كۆ-
پۈپ ئاغرىش، ئىشتىھا تۇتۇلۇش، ئو-
رۇقلاش، پۈتۈن بەدەن بىئارام بولۇش
قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: تۈز ئۈچەي (پۇتە-
نىڭ ئىچى تەرىپىدە).
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك ئۈس-
تى بېزى، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، ئىنچىكە
ئۈچەي، چوڭ ئۈچەي، تۈز ئۈچەي، مەقئەت.

2. بۆرەك ئۈستى بېزى رېفلىكس رايونىنى
بېسىپ ئۇۋۇلساق ياللۇغنى قايتۇرىدۇ.





4. قولنىڭ تۆت بارمىقىنىڭ بو -
غۇمى ئارقىلىق پۇتنىڭ بارمىقىدىن
ئۆكچە يۆنىلىشىگە قاراپ، ئىنچىكە
ئۈچەي رېڭلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇ -
ۋۇلايمىز.



3. تاپان يايىنىڭ ئىچى تەرىپىدىكى
ئاشقازان، ئۇيۇلۇق، ئون ئىككى بارماق
ئۈچەي قاتارلىق رېڭلېكس رايونلىرىنى تە -
تىپ بويىچە قىرىپ ئۇۋۇلساق، ھەزىم قى -
لىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

5. سول پۇت ئاستىدىكى توغرا بوغماق ئۇ -
چەي، تۆۋەنلىگۈچى بوغماق ئۈچەي، S سىمان
بوغماق ئۈچەي، تۈز ئۈچەي - مەقۇت رېڭلېكس
رايونلىرىنى ۋە ئوڭ پۇت ئاستىدىكى يۇقىرىلىد -
خۇچى بوغماق ئۈچەي، توغرا بوغماق ئۈچەي رېڭلېكس رايون -
لىرىنى تەرتىپ بويىچە سېرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۇۋۇلىغان چاغ -
دا، سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە مەشغۇلات
قىلىساق بولىدۇ، بۇ ئورۇنلارنى ئۇۋۇلساق، ھەزىم قىلىش
سىستېمىسى كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.



TIPS

1. ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش: چوڭ تەرەتكە ئاساسەن ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرگىلى بولىدۇ. ئە -
گەر چوڭ تەرەتنىڭ شەكلى نورمالسىز بولۇپ، بىر تەرىپى بىر يۈمىلاق ھالەتتە، يەنە بىر تەرىپى ياي -
پاڭ بولسا، بۇ تۈز ئۈچەينىڭ ئىچى تەرىپىدىكى ئورۇندا كېسەللىك ئۆزگىرىشى يۈز بەرگەنلىكىنى چۈ -
شەندۈرىدۇ.
2. ئۇزۇن مۇددەت قەۋزىيەت بولغانلار تۈز ئۈچەي رېڭلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاشنى كۈچەيتىپ، تۈز
ئۈچەي كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.
3. رەۋەندىن ئۈچ گىرام، ئاش تۈزىدىن ئۆت گىرام ئېلىپ، بۇلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ئۇششاق سوققان -
دىن كېيىن كىندىك ئۈستىگە قويۇپ، ئۈستىدىن داكا ياكى پىلاستىر بىلەن چاپلاپ قويسا، ئۈچەينى
سېلىقلاپ تەرەتنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

ئىنچىكە ئۈچەي چۇقۇقى

ئىنچىكە ئۈچەي چۇقۇقىدا دائىم چات ئېرىقچىسىدا مونەك پەيدا بولۇپ قېلىش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ، كېسەللىكنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، بۇ مونەك بارغانسېرى چوڭىيىپ، قىسمەن ئورۇنلار كۆپۈپ ۋە تارتىشىپ ئاغرىيدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىر بولغان بىمارلاردا ئۈچەي چىرىش، ئۈچەي ئاق-مىسى قاتارلىق ئەگەشمە كېسەللىكلەر كۆرۈلىدۇ.

رېڧلېكس رايونى

كېسەللىك رېڧلېكس رايونى: ئىنچىكە ئۈچەي، جىنسىي بېزى.
مۇناسىۋەتلىك رېڧلېكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى بەدەن لىمفا بېزى، چات ئېرىقچىسى.



2. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ دۈمبە قىسمىنى تۈز تۇتۇپ، يەنە بىر قولىمىزنىڭ باش بارمىقىنى تاشقى ئۇشۇق سۆڭىكىنىڭ ئارقا تەرىپىنىڭ ئاستىدىكى ئۇچبۇلۇڭ شەكلىگە ئوخشايدىغان كۆپىيىش بېزى رېڧلېكس رايونىغا قويۇپ، باش بارماق يۇمشىقى بىلەن ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

1. ئىنچىكە ئۈچەي رېڧلېكس رايونىنى داۋاملىق ئۇۋۇلىغاندا كىندىك ئاستى سانجىد-قى، كېكىرىش، سوزۇلما ئۈچەي ياللۇغى قا-تارلىقلارنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ. ئۇۋۇ-لىغان چاغدا، قولنىڭ تۆت بارماق بوغۇمى بى-لەن ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ قىرىپ ئۇ-ۋۇلايمىز.



3. قولنىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرۇپ، بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ بارماق قىسمىنى چىڭ تۇتۇپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن بۆرەك ئۈستى بېزى رېڭلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

1. دىيابت بىمارلىرىنىڭ ئىنچىكە ئۈچەي جۇقۇقىنى ئويپىراتىسىيە قىلىشقا بولىدۇ.
2. سوغۇق سۇدا يۇيۇنغاندا ياكى قىشنى سۇ ئۈزگەندىن كېيىن، پەقەت بەدەننىڭ سىرتىنىلا سۈرتۈپ ئىسسىق بولمايدۇ، بەدەندىكى ئىچكى ئەزالارنى ئىسسىتىش كېرەك، مەسىلەن: قىزىق زەنجۈل شورپىسى ئىچسە بەدەن ئىسسىدۇ.
3. ئادەتتە جۇقۇق بەلبېغى تاقاش ئارقىلىق تەڭشەش ئېلىپ بارسا بولىدۇ.



6. چات ئېرىقچىسى رېڭلېكس رايونى ئىچكى ئوشۇق بوغۇمىنىڭ يېنىدىكى پۇت يۈزىگە جايلاشقان. ئۇۋۇلىغان چاغدا، ئۆكچىدىن پاقالچاق يۆنىلىشىگە قاراپ سېيرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

5. ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى بەدەنلىمىغا بېزى ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئىككى پۇتنىڭ تاشقى ئوشۇق سۆڭەكى ۋە ئىچكى ئوشۇق سۆڭەكىنىڭ ئالدى تەرەپ ئاستىدىكى ئويما ئورۇنغا جايلاشقان بولۇپ، ئورۇننى توغرا تاپقاندىن كېيىن، ئىككى قولنىڭ كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمى بىلەن بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.

4. تال رېڭلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلىغاندا، تالنىڭ ئۆزىدىكى كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاپلا قالماستىن، يەنە تېرە كېسەللىكى، ياللۇغلىنىش، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالاش رولىنى ئوينايدۇ.

مەزى بېزى ياللۇغى

بىماردا سوغۇقتىن قورقۇش، قىزىش، ماغدۇرسىزلىنىش، سىيگەندە كۆي-
گەندەك سېزىم بولۇش، سۈيدۈك قىستاش، سۈيدۈك ئاغرىتىپ كېلىش، سۈيدۈك
تامچىلاش، سۈيدۈك راۋان بولماسلىق، سۈيدۈك قېتىم سانى كۆپىيىش، چات
ئارىلىقى ياكى دوۋسۇن سۆڭىكىنىڭ ئۈستى تەرىپى بېسىلغاندەك بىلىنىش قا-
تارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، ئۇزۇن ئولتۇرغاندا ياكى تەرەت قىل-
غاندا ئاغرىق ئېغىرلاپ كېتىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: مەزى بېزى، ئۇرۇقدان.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: بۆرەك ئۈستى بېزى، بۆرەك، تال، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق،
سۈيدۈك يولى، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى بەدەن لىمفا بەزلىرى.

2. تاشقى ئوشۇق-
نىڭ ئارقا تەرەپ ئاستى-
غا جايلاشقان ئۇرۇقدان
رېفلىكس رايونىنى باش
بارماق يۇمشىقى بىلەن
ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ
سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



1. كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمىنىڭ يان تەرىپى بىلەن مەزى بېزى رېفلىكس رايونى (پۇتنىڭ ئىچى
تەرىپىدە) نى ئارقىدىن ئالدىغا قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ
بەرگەندە، مەزى بېزى چوڭىيىش ۋە مەزى بېزى ياللۇغى كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋالاش ۋە ساق-
لىق ساقلاش رولى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.

مەزى بېزى ۋە ئۇرۇقدان رېفلىكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندىن باشقا، يەنە بۆرەك ئۈستى بې-
زى، بۆرەك، تال، سۈيدۈك نەيچىسى، دوۋساق، سۈيدۈك يولى، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى بەدەن لىمفا بېزى قا-
تارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتاب-
نىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، مەزى بېزى ياللۇغىنىڭ ساقىيىشىنى مەلۇم دەرىجىدە ئىلگىرى
سۈرۈش رولىنى ئوينايدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت)، تال (52 - بەت)، سۈيدۈك نەيچىسى (39 -
بەت)، دوۋساق (40 - بەت)، سۈيدۈك يولى (40 - بەت)، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى بەدەن لىمفا (62 - بەت).

TIPS

ئۇزۇن ئولتۇرۇشقا، سۈيدۈك ساقلاشقا بولمايدۇ، جىنسى تۇرمۇشقا چىڭ قويۇلىدۇ.

تۇخۇمدان خالتىلىق ئىششىقى

تۇخۇمدان خالتىلىق ئىششىقى تۇخۇمدان ئۆسمىسىنىڭ بىر خىلى بولۇپ، بۇ ئاياللارنىڭ كۆپىيىش ئەزاسىدىكى دائىم ئۇچرايدىغان كېسەللىكتىن ئىبارەت، بۇ خىل كېسەللىك 20 — 50 ياشقىچە بولغان ئاياللاردا ئەڭ كۆپ ئۇچرايدۇ. كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە دىياگنوز قويۇش قىيىن بولۇپ، دىياگنوز قويۇلغان ۋاقىتتا بۇنىڭ 70% ى ئاخىرقى باسقۇچقا بېرىپ قالغان بولىدۇ. كىلىنىكىدا كۆپىنچە قورساقنىڭ تۆۋەن تەرىپى ئاغرىش، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، ئاق خۇن نورمالسىز كېلىش، ھەيز قالايمىقانلىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، قورساقنىڭ تۆۋەن قىسمىدىكى تېرە ئاستىدا قاتتىق ھەم ئاغرىمايدىغان مونەك قولغا ئۇرۇنىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: تۇخۇمدان، بالىياتقۇ، بۆرەك.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: ھېپوفىز، بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، جىگەر، سۈت بېزى.

1. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ دۈمبىسىنى چىڭ تۇتۇپ، يەنە بىر قولىمىزنىڭ باش بارماق يۇمشىقى بىلەن ئىككى پۇتنىڭ تاشقى ئوشۇقىنىڭ ئارىسىغا تەرەپ ئاستىغا يېقىن بولغان ئۇچبۇلۇڭ شەكلىگە ئوخشايدىغان تۇخۇمدان رېفلىكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.





2. كۆرسەتكۈچ بارماق بوغۇمىنىڭ يان تەرىپى بىلەن بالىياتقۇ رېڭلىق رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىشتە قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلىغاندا بالىياتقۇ مۇسكۇل ئۆسمىسى، بالىياتقۇ ئىچكى پەردە ياللۇغى ۋە باشقا ئاياللار كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋالاش ھەم ساقلىقنى ساقلاش رولى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.
3. بۆرەك رېڭلىق رايونى پۇت ئالغىنى مەركىزىدىكى «人» خېتى شەكىللىك سىزىقنىڭ كېسىشمە نۇقتىسىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى ئويما ئورۇنغا جايلاشقان، ئۇۋۇلىغان چاغدا، پۇتنىڭ ئالدى قان مەركىزىدىن ئۆتكۈچ يۆنىلىشىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلساق، ياللۇغنى قايتۇرغىلى بولىدۇ.

تۇخۇمدان، بالىياتقۇ، بۆرەك قاتارلىق كېسەللىك رېڭلىق رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە ھىپوفىز، بۆرەك ئۈستى بېزى، تال، جىگەر، سۈت بېزى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڭلىق رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، ئاياللار كېسەللىكلىرىگە نىسبەتەن تەڭشەپ داۋالاش ۋە ساقلىق ساقلاشتا ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

ھىپوفىز (42 - بەت)، بۆرەك ئۈستى بېزى (38 - بەت)، تال (52 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، سۈت بېزى (61 - بەت)

TIPS

يۈنەن بەيياۋغا ئاچچىقسۇنى تەڭشى ئارىلاشتۇرۇپ، پۇتنىڭ سىرتقى تەرىپىدىكى تۇخۇمدان رېڭلىق رايونىغا چېپىپ، 12 سائەتتىن كېيىن ئېلىۋەتسە بولىدۇ. 12 سائەت ئۆتكەندىن كېيىن يۈنەن بەيياۋنى ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، يەنە بىر قېتىم يۈنەن ئاستىدىكى تۇخۇمدان رېڭلىق رايونىغا چېپىپ، 12 سائەتتىن كېيىن ئېلىۋەتسە بولىدۇ. مۇشۇنداق ئۇسۇلدا ئۈچ قېتىم دورا چېپىلىدۇ، ھەر قېتىم ئىككى خىل دورىنى ئايرىم - ئايرىم چاپقاندىكى ئارىلىق 12 سائەت بولىدۇ.

سەكتە

- مېڭىگە قان چۈشۈش ۋە مېڭە كەپلەشمىسى ئوخشاشلا سەكتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، سەكتىدە تۇيۇقسىز ھوشىدىن كېتىش، يارتا پا- لەچ، ئېنىق سۆزلىيەلمەسلىك ياكى سۆزدىن قېلىش، ئېغىزى مايماق بو- لۇپ قېلىش، بەدەننىڭ يېرىمى ئۇيۇ- شۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلېكس رايونى

- كېسەللىك رېفلېكس رايونى: يۈرەك، پېشا- نە، چوڭ مېڭە.
- مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: ئۆپكە، جىگەر، تال، مۇرە بوغۇمى، جەينەك بوغۇمى، يانپاش بوغۇمى، تىز بوغۇمى.



1. يۈرەك رېفلېكس رايونى سول پۇت ئاللىقىنىڭ تۆتىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭىكى ئارىسىغا جايلاشقان بولۇپ، ئۆپكە ۋە كانايچە رېف- لېكس رايونلىرىنىڭ ئاستى تەرىپىدە بولىدۇ. سەكتىنى تەڭشەپ داۋالاشتا، يۈرەك رېفلېكس رايونىنى ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ سېيرىپ ئۇ- ۋۇلساق بولىدۇ.

2. باش بارماق ۋە باشقا تۆت بار- ماقنىڭ ئۈچى تەرىپىدىكى پېشانە رېف- لېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.
3. باش بارماق يۇمشىقىنى بويلاپ ئۆكچە تەرەپكە قاراپ چوڭ مېڭە رېف- لېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.

يۈرەك، پېشانە، چوڭ مېڭە قاتارلىق كېسەللىك رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلغاندىن باشقا، يەنە ئۆپكە، جىگەر، تال، مۈرە بوغۇمى، جەينەك بوغۇمى، يانپاش بوغۇمى، تىز بوغۇمى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى - لىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، سەكتە كېسەللىكنى ئۇ - نۇملۇك داۋالىغىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى :

ئۆپكە (49 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، تال (52 - بەت)، مۈرە بوغۇمى (58 - بەت)، جەينەك بوغۇمى (58 - بەت)، يانپاش بوغۇمى (59 - بەت)، تىز بوغۇمى (58 - بەت).

TIPS

1. قاناش كۆرۈلگەندە كېسەللىكنىڭ ئېغىرلاپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، رېف - لېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاشقا بولمايدۇ.
2. بىمار ئورۇن تۇنۇپ يېتىپ قالغان مەزگىلدە ئۈستۈنكى، ئاستىنقى مۇچىلەرنى ئاسراشقا دىققەت قىلىش، تۈز ياتقاندا قولىنى ئۈستىگە قويۇش لازىم. مۇناسىۋەتلىك رېف - لېكس رايونلىرىنى كۆپرەك ئۇۋۇلاپ، ئۇزۇن مەزگىل كارىۋاتتا يېتىش سەۋەبىدىن بوغۇملارنىڭ قېتىپ قېلىشى، مۈرە سۆڭەك بوغۇملىرىنىڭ ئورنىدىن چىقىپ كېتىشى قاتارلىق ئەھۋاللارنىڭ كۆرۈلۈشىدىن ساقلىنىش كېرەك.

لىمفا تۈگۈنى ئىششىقى

لىمفا تۈگۈنى ئىششىقى كۆپىنچە بويۇن قىسمى، قولتۇق ئاستى، چات يىرى - قى ۋە ئوشۇق بوغۇمى لىمفا ئورۇنلىرىدا كۆرۈلىدۇ. بىمار كېسەللىك ئورنىنىڭ ئاغرىغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ، كېسەللىك ئورنىدا روشەن ئىششىق بولىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: بويۇن لىمفاسى، كاناي، قىزىلتۇڭگەچ، كۆكرەك لىمفاسى، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى بەدەن لىمفاللىرى.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: تال، بۆرەك ئۈستى بېزى، بويۇن.



2. ئىككى قولىنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقىنىڭ بوغۇمى بىلەن ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى بەدەن لىمفا رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۈستۈنكى بەدەن لىمفا ئۈستۈنكى قورساق قىسمى لىمفاسىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ئۈستۈنكى بەدەن لىمفا ئۈستى بىلەن كۆكرەكنىڭ ئاستىدىكى رايونى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؛ ئاستىنقى بەدەن لىمفا ئۆۋەنكى قورساق قىسمى لىمفاسىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، بۇ كىندىكىنىڭ ئاستىدىكى داس بوشلۇقى رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.



1. ئۇۋۇلىغان چاغدا ئاۋۋال ئىككى پۇتنىڭ دۈمبىسى ۋە پۇتنىڭ ئاستىدىكى بارماق پەردىسى ئارىسىغا جايلاشقان لىمفا رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلاپ، ئاندىن پۇت ئۆكچىسىدىن بارماق يۆنىلىشىگە قاراپ كاناي، قىزىلتۇڭگەچ، يۇتقۇنچاق، كۆكرەك لىمفا رېفلېكس رايونىنى ئومۇميۈزلۈك سېپىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



4. باش بارماق يۇمشىقى بىلەن يا-
كى ئۇۋۇلاش تايىقى بىلەن بۆرەك ئۈستى
بېزى رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇ-
ۋۇلايمىز.



3. تال رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.
تال بەدەندىكى ئەڭ چوڭ ئىممۇنىتېت ئەزا بولۇپ،
تال رېفلېكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە،
ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.



5. پۇتنىڭ باش بارماقنىڭ تۈۋىدىكى توغرا سىزىق ئورنى
دەل بويۇن رېفلېكس رايونىدىن ئىبارەت. ئۇۋۇلىغان چاغدا، ئوڭ
قولنىڭ كۆرسەتكۈچ بارماقى ۋە ئوتتۇرا بارماقى بىلەن باش بار-
ماقنى قىسىپ تۇرۇپ، كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارماقنى
باش بارماقنىڭ ئىچى تەرەپكە ئايلاندۇرىمىز، ئايلاندۇرۇش جەريا-
نىدا بويۇن رېفلېكس رايونى بېسىپ ئۇۋۇلىنىدۇ ھەم تارتىپ سو-
زۇلىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقى

نېرۋا ئاجىزلىقى نېرۋىنىڭ ئىقتىدار خاراكتېرلىك توسالغۇغا ئۇچرىشىنى كۆرسىتىدۇ، كىلىنىكىلىق ئىپادىسى ھاياجانلىنىش، ئاسان چارچاش، كەيپىيا - تى تۇراقسىز بولۇش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. كۆپ ساندىكى بىمارلاردا ئېغىر دەرىجىدىكى ئۇيقۇسى توسالغۇغا ئۇچراش ۋە ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارى چېكىنىش ئالاھىدىلىرى كۆرۈلىدۇ. ئۇزۇن مۇددەت نېرۋىنى تورمۇزلايدىغان دورىلارنى يېگەندە ئەسەبىيلىشىش كېسەلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: قالقانبەز، ئاشقازان، تال، جىگەر، ئۆت، ئۆپكە، بۆرەك، ئۇيقۇسىز - لىق نۇقتىسى، ئۇيقۇسىزلىق بەزى.



3. پېشانە رېفلېكس رايونى - نى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېف - لېكس رايونى پۇتنىڭ بەش بار - مىقنىڭ ئۇچى تەرەپكە جايلاشقان بولۇپ، بۇ رېفلېكس رايونىغا چوڭ مېڭە ۋە ئاداشقان نېرۋا قىسمى ماس كېلىدۇ.

2. چوڭ مېڭە رېفلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قارىتا قىرىپ ئۇۋۇلىغاندا، باش ئاغرىشىنى يېنىكلەتكە - لى بولىدۇ.

1. ھىپوفىز رېفلېكس رايونى باش بارماق يۇمشىق مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تەرەپكە جايلاشقان. بۇ رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇ - ۋۇلغاندا، ھىپوفىزنىڭ ئىقتىدا - رى بۇزۇلۇش سەۋەبىدىن كېلىپ - چىققان كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

ھېپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە قاتارلىق كېسەللىك رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندىن باشقا، يەنە قالقانبەز، ئاشقازان، تال، جىگەر، ئۆت، ئۆپكە، بۆرەك، ئۈي-قۇسزلىق نۇقتىسى، ئۇيقۇسىزلىق بېزى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىقلىسا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەرىدىن كۆرۈڭ)، مېڭە قىسمىنىڭ قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

قالقانبەز (48 - بەت)، ئاشقازان (52 - بەت)، تال (52 - بەت)، جىگەر (64 - بەت)، ئۆت (64 - بەت)، ئۆپكە (49 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت)، ئۇيقۇسىزلىق نۇقتىسى (145 - بەت)، ئۇيقۇسىزلىق بېزى (145 - بەت).

TIPS

1. بىمار بېلىقنى كۆپ يەپ بەرسە بولىدۇ، بېلىق گۆشى ئېرۋىنى تىنچلاندۇرۇشقا پايدىلىق، كەيپىيات زىيادە جىددىيلەشسە، مېڭىنىڭ ھۈجەيرىلىرى زەخمىلىنىدۇ، شۇڭا كەيپىياتنى كونترول قىلىشقا دىققەت قىلىش لازىم.
2. ئېۋودىيە دەرىخىنىڭ ئۇرۇقىدىن 50 گىرام ئېلىپ قايناتقاندىن كېيىن، سۈيىنى سوۋۇتۇپ، ئۇنىڭغا پۇتنى پاقالچاقنىڭ بۇلجۇڭ گۆشىگە كەلگىچە چىلىسا بولىدۇ، سۇنىڭ ئېمپىراتۇرىسى 42 — 45 گىرادۇسقىچە كونترول قىلىنىدۇ.


قان ئازلىق

قان ئازلىق كېسىلىدە قان ئايلىنىش جەريانىدا قان تەركىبىدىكى قىزىل قان ھۈجەيرىسى زىيادە ئازىيىدۇ، بۇنىڭغا قوشۇلۇپ يۈرەك رىتىمى نورمال بولماسلىق، بېشى قېيىش، ماغدۇرسىزلىنىش، نەپەس تېزلىشىش، يۈرەك سېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېڧلېكس رايونى

كېسەللىك رېڧلېكس رايونى: تال، جىگەر، ئۆت.
مۇناسىۋەتلىك رېڧلېكس رايونى: يۈرەك، ئۆپكە

1. جىگەر رېڧلېكس رايونى ئوڭ پۇت ئالدىقىدىكى تۆتىنچى، بەشىنچى تاپان سۆڭەك ئارىسىغا جايلاشقان. ئۇۋۇلىغان چاغدا، ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. جىگەر رېڧلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلاش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆت رېڧلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز.





4. ئۆپكە رېفلىپكىس رايونىنى توغرا يۆنىلىش- تە ئومۇميۈزلۈك قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېفلىپكىس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلد- خاندان نەپەس سىستېمىسى كېسەللىكلىرىنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

3. يۈرەك رېفلىپكىس رايونىنى ئۆكچىدىن بارماق يۆنىلىشىگە قاراپ سېرىپ ئۇۋۇلايمىز. ئۇۋۇلىغان چاغ- دا، ئۇۋۇلاش كۈچىنى يېنىك ھالەتتىن ئاستا - ئاستا ئاشۇرۇپ، تاكى بىمار قوبۇل قىلالىغۇدەك دەرىجىگىچە كۈ- چەيتىمىز.

2. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ ئالدىقىنى تىرەپ تۇتۇپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن تال رېفلىپكىس رايونى- نى ئۇۋۇلايمىز.

TIPS

ئۆزىنى ئۆزى تەكشۈرۈش

1. بىمارنىڭ پۇتىنىڭ ئاستىدىكى باش بارماق تۈۋىدىكى توغرا سىزىق بىر قەدەر چوڭقۇر بولىدۇ، شۇنداقلا بۇ يەردە پەقەت بىر تال توغرا سىزىق بولىدۇ، قاپاقنى ئۇرۇپ قارىغاندا، ئەگەر قاپاقنىڭ ئى- چىدىكى تېرە ئاقارغان بولسا، بۇ بىمارنىڭ قان ئازلىق كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
2. بىمار ھەر كۈنى باش بارماق ئۈستىدىكى تال تومۇرلىرى، يەنى شۆخەي پەللىسىنى ئۆزى ئۇ- ۋۇلاپ غىدىقلاپ بەرسە بولىدۇ.
3. قان تولۇقلايدىغان يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يېيىش، مەسىلەن: يەر ياغىقى (خاسىك) پوستى، چىلان، لۇغىيەن، كۈنجۈت، قارا قېرىنقىۋلاق، قارا شېكەر قاتارلىقلارنى كۆپرەك يېيىش لازىم.

ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك

ئوزۇقلۇق يېتىشمىگەن بىمارلار كۆپىنچە ئورۇق، چىرايى ياداڭغۇ كېلىدۇ، بۇنىڭغا قوشۇلۇپ تېرە ئاستىدا ماي يوق بولۇش، بەدىنى ئاجىز، ماغدۇرسىز بولۇش، روھىي ھالىتى تۆۋەن بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

رېفلىكس رايونى

كېسەللىك رېفلىكس رايونى: ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە، ئاشقازان، ئۇيقۇلۇق، ئون ئىككى بار. ماق ئۈچەي، تال، ئىنچىكە ئۈچەي.
مۇناسىۋەتلىك رېفلىكس رايونى: جىگەر، ئۆت، چوڭ ئۈچەي.



2. بارماقنىڭ ئۇچى تەرەپتىن بارماق يىلتىزى تەرەپكە قاراپ چوڭ مېڭە رېفلىكس رايونىنى قىلىپ رىپ ئۇۋۇلايمىز. چوڭ مېڭە رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا، قان بېسىمى ئۈنۈم-لۈك تەڭشىگىلى بولىدۇ، شۇنداقلا يەنە باش ئاغ-رىشىنى يېنىكلىتىدۇ.

1. باش بارماق يۇمشىقى مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تەرەپىگە جايلاشقان ھىپوفىز رېفلىكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلايمىز. بۇ رېفلىكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلاپ بەرگەندە، توق-قۇز چوڭ سىستېمىنىڭ ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ.

ھېپوفىز، چوڭ مې-
ئە، پېشانە، ئاشقازان،
تال، ئىنچىكە ئۈچەي قا-
تارلىق كېسەللىك رېف-
لېكس رايونلىرىنى ئۇ-
ۋۇلىغاندىن باشقا، يەنە
جىگەر، ئۆت، چوڭ ئۈچەي
قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك
رېفلىكس رايونلىرىنى
قوشۇمچە ئۇۋۇلاپ غىدىق-
لىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇل-
لىرىنى مەزكۇر كىتاب-
نىڭ مۇناسىۋەتلىك بەت-
لىرىدىن كۆرۈڭ)، ئۈچەي
ۋە ئاشقازان كېسەللىك-
لىرىنى ياخشىلاپ، ھەزىم
قىلىش - سۈمۈرۈش
ئىقتىدارىنى ئىلگىرى
سۈرگىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:
جىگەر (64 - بەت)،
ئۆت (64 - بەت)، چوڭ
ئۈچەي (سول پۇت 53 -
بەت، ئوڭ پۇت 65 -
بەت).



4. ئاشقازان، ئۇيۇقلۇق، ئون
ئىككى بارماق ئۈچەيدىن ئىبارەت بۇ
رېفلىكس رايونلىرىنى ئۈستىدىن
ئاستىغا قاراپ تەرتىپ بويىچە قىرىپ
ئۇۋۇلايمىز. ئاشقازاننى تۆۋەنلەپ
كەتكەن بىمارلارنىڭ بۇ ئورۇنلىرىنى
ئۇۋۇلىغاندا ئاستىدىن ئۈستىگە قاراپ
قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



6. تۆت بارماقنىڭ بارماق
بوغۇمى بىلەن پۇت بارمىقىدىن
ئۆتكۈچە يۆنىلىشكە قاراپ
ئىنچىكە ئۈچەي رېفلىكس رايون-
ىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز.



3. پېشانە رېفلىكس رايون-
نى ئىككى پۇتنىڭ ھەرقايسى
بارماقلىرىنىڭ ئۈچى تەرەپكە
جايلاشقان. ئۇۋۇلىغان چاغدا،
ئوخشاش بىر يۆنىلىشتە قى-
رىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.



5. تال رېفلىكس رايونىنى
بېسىپ ئۇۋۇلساق، ئوزۇقلۇق-
نىڭ قوبۇل قىلىنىشى ۋە يۆتكە-
لىشىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ.

تۇتقاقلىق كېسەللىكى

تۇتقاقلىق كېسەللىكى قوزغالغاندا بىمار تۇيۇقسىز سېزىمىنى يوقىتىدۇ، ئارقىدىنلا بەدەنلىرى تارتىشىپ قالىدۇ. بۇنىڭغا قوشۇلۇپ چىرقىراش، چىرايى كۆكرىپ كېتىش، سۈيدۈك تۇتالماسلىق، تىلىنى چىشلەپ يارىلاندىرىۋېلىش، ئېغىزىدىن كۆپۈك ياكى قان ئارىلاش كۈپۈك كېلىش، كۆز قارىچۇقى كېڭىيىپ كېتىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. نەچچە ئون سېكۇنت ياكى نەچچە مىنۇتتىن كېيىن تارتىشىپ قېلىش پەسىيىپ، بىمار ھوشسىزلىنىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، ھېپوفىز، پېشانە، قالدانبەز. **مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى:** جىگەر، بۆرەك، تال، ئۆپكە.



3. ھېپوفىز رېفلېكس رايونى باش بارماق يۇمشىقى مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، بۇ ئورۇننى بېسىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

1. چوڭ مېڭە رېفلېكس رايونى باش بارماق يۇمشىقىغا جايلاشقان بولۇپ، ئۈستىدىن ئاستىغا قىرىپ ئۇۋۇلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ مەشغۇلات قىلدۇرۇش، بۇ رېفلېكس رايونىنى دائىم ئۇۋۇلاپ بەرگەندە، مېڭىنى قان بىلەن تەمىنلەشنى ياخشىلاپ، مېڭىنى سەگەتتەپ روھنى ئۇرغىتىدۇ.



2. باش بارماق يۇمشىقىنىڭ سىرتقى تەرىپىدىكى كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېفلېكس رايونىنى ئوخشاش يۆنىلىش بويىچە قىرىپ ياكى بېسىپ ئۇۋۇلساق، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى ئىقتىدارىنىڭ بۇزۇلۇشى سەۋەبىدىن كېلىپچىققان كېسەللىكلەرنى تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ، شۇنداقلا تۇتقاقلىقنىڭ قوزغىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، تۇتقاقلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەسەيتىشتە ناھايىتى ياخشى ئۇسۇل بېرىدۇ.



5. باش بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپى بىلەن قالغان يان بېزى رېڧلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلساق، ئۇۋۇلاش كۈچىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بىر قولىمىز بىلەن پۇتنىڭ بارماق قىسمىنى چىڭ تۇتۇپ، پۇتنى سەل سىرتقا يانتۇ قىلىپ، يەنە بىر قولىمىز بىلەن بۇ رېڧلېكس رايونىنى كۈچەپ ئۇۋۇلايمىز، بۇ ئۇسۇل سەككىز ۋە تۇتقاقلىق بىمارلىرىنى جىددىي قۇتقۇزۇشتا ناھايىتى ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.

4. پېشانە رېڧلېكس رايونى بەدەننىڭ چوڭ مېڭە ۋە ئاداشقان نېرۋا قىسمىغا ماس كېلىدۇ، پېشانە رېڧلېكس رايونى دائىم ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندا روھىي ھالەتنى ياخشىلىدىغانلىقى بولىدۇ. بۇ ئورۇننى ئۇۋۇلغاندا ئىككى پۇتنىڭ ھەرقايسى بارماقلىرىنىڭ ئۇچى تەرىپىدىكى پېشانە رېڧلېكس رايونلىرىنى ئوخشاش يۆنىلىشتە قىرىپ ئۇۋۇلساق بولىدۇ.

چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، ھىپوفىز، پېشانە، قالغان يان بېزى قاتارلىق كېسەللىك رېڧلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندىن باشقا، يەنە جىگەر، بۆرەك، تال، ئۆپكە قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابىنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ) داۋالاش ئۇنۇمىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

جىگەر (64 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت)، تال (52 - بەت)، ئۆپكە (49 - بەت)

TIPS

1. تۇتقاقلىق كېسەللىكى قوزغالغان چاغدا، قالغان يان بېزى رېڧلېكس رايونىنى كۈچەپ بېسىپ ئۇۋۇلغاندا، ئىككى - ئۈچ سېكۇنتتىن كېيىنلا كېسەللىك ئالامىتى پەسلىنىدۇ.
2. چاچنى تارىغاندا تاش تارغاق ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ، ھەر كۈنى چاچنى قەرەلىمىز تاراپ بىرىپ، چوڭ مېڭىنىڭ زەرەت قويۇپ بىرىش قېتىم سانىنى ئازايتىپ، تۇتقاقلىق كېسەللىكىنىڭ ئۇۋۇلغۇن ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

كىلىماكتېرىيە يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى

2. بۆرەك ئۈستى بېزى رېڭ-
لېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلد-
غاندا، بۆرەك ئۈستى بېزىنىڭ
ھورمۇن ئاجرىتىپ چىقىرىش
ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، قېرىش-
نى كېچىكتۈرگىلى بولىدۇ.



3. باش بارماق يۇمشىقىنىڭ
سىرتقى تەرىپىدىكى كىچىك مېڭە ۋە
مېڭە غولى رېڭلېكس رايونىنى ئوخ-
شاش يۆنىلىشتە قىرىپ ياكى بېسىپ
ئۇۋۇلىغاندا، كىچىك مېڭىنىڭ ئىق-
تىدارىنى كۈچەيتىپ، مېڭە يىگىلەش-
نىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

بىماردا دائىم يۈرەك سېلىش، ئۇيقۇسىزلىق،
ماغدۇرسىزلىق، خامۇشلۇق، كۆپ غەم قىلىش،
كەيپىياتى تۇراقسىز بولۇش، ئاسان ھاياجانلىق-
نىش، دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرەلمەسلىك قاتار-
لىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، بۇ كۆپىنچە ئاياللار تو-
پىدا كۆرۈلىدۇ، ئومۇمىي جەھەتتىن قارىغاندا بۇ
خىل ئالامەتلەر ئەرلەردە ئاياللاردىن بەش يىل
كېيىن كۆرۈلىدۇ.

رېڭلېكس رايونى

كېسەللىك رېڭلېكس رايونى: قالقانبەز، بۆرەك ئۈستى بېزى،
كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە.
مۇناسىۋەتلىك رېڭلېكس رايونى: جىگەر، بۆرەك، تال، ئۆپكە،
كۆپىيىش بەزىلىرى.



1. قالقانبەز رېڭلېكس رايونىنى سېيرىپ ئۇۋۇلد-
غاندا، كىلىماكتېرىيە يىغىندى كېسەللىك ئالامەتلىرى-
نى مەلۇم دەرىجىدە يېنىكلەتكىلى بولىدۇ.



5. چوڭ مېڭە رېفلېكس رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپ ئۇۋۇلىغاندا، كەيپىياتنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ.



قالقانبەز، بۆرەك ئۈستى بېزى، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە قاتارلىق كېسەللىك رېفلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندا باشقا، يەنە جىگەر، بۆرەك، ئال، ئۆپكە، كۆپىيىش بەزىلىرى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونلىرىنى قوشۇمچە ئۇۋۇلىغاندا (ئۇۋۇلاش ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، كىلىماكتېرىيە يىغىندى كېسەللىك ئالامەتلىرىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

جىگەر (64 - بەت)، بۆرەك (38 - بەت)، ئال (52 - بەت)، ئۆپكە (49 - بەت)، كۆپىيىش بەزىلىرى (53 - بەت).



4. ھىپوفىز رېفلېكس رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلىدۇ. خاندا كىلىماكتېرىيە يىغىندى كېسەللىك ئالامىتىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئادەم بەدىنىنىڭ ئىچكى ئاجراتمىلىرى قالايمىقانلىشىش سەۋەبىدىن كېلىپچىققان كېسەللىكلەرنىڭ ھەممىسىنى ھىپوفىز رېفلېكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلاش ئارقىلىق تەڭشەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

6. باش بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى ئىچىدىن سىرتىغا ياكى سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ ئوخشاش بىر يۆنىلىشتە توغرىسىغا قىلىپ ئۇۋۇلايمىز؛ ئاندىن يەنە باشقا تۆت بارماقنىڭ ئۇچى تەرىپىدىكى پېشانە رېفلېكس رايونىنى قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. پېشانە رېفلېكس رايونىنى غىدىقلىغاندا، باش ئاغرىش، باش قېيىش، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالىغىلى بولىدۇ.

TIPS

كۈندىلىك تۇرمۇش ئادەتلىرى تەرتىپلىك بولۇش، مۇۋاپىق ئەمگەك قىلىش ۋە چىنىقىشنى داۋاملاشتۇرۇش لازىم.

ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسەللىكى

بۇ كېسەللىكنىڭ ئاساسلىق ئالا-
مىتى بىلىش ۋە ئەستە تۇتۇش ئىقتى-
دارى چېكىنىش، كۈندىلىك تۇرمۇش
ئىقتىدارى تۆۋەنلەشتە ئىپادىلىنىدۇ.

رېفلېكس رايونى

كېسەللىك رېفلېكس رايونى: كىچىك مېڭە ۋە
مېڭە غولى، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە.
مۇناسىۋەتلىك رېفلېكس رايونى: جىگەر،
ئال، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى مۇچە.

1. باش بارماق يۇمشىقنىڭ تاشقى تە-
رىپىدىكى كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى رېف-
لېكس رايونىنى ئوخشاش بىر يۆنىلىشتە
قىرىپ ياكى بېسىپ ئۇۋۇلساق، ياشان-
غانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسەللىكى تەڭشەپ
داۋالىغىلى ۋە ئۇنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى
ئالغىلى بولىدۇ.



4. پېشانە رېفلېكس رايونى-
نى ئادەم بەدىنىدىكى چوڭ مې-
ڭە ۋە ئاداشقان نېرۋا قىسمى
بىلەن ئۆزئارا ماس كېلىدۇ.
ئۇۋۇلغان چاغدا، ھەرقايسى
بارماقلارنىڭ ئۈچىنى ئوخشاش
يۆنىلىش بويىچە قىرىپ ئۇۋۇ-
لساق بولىدۇ.

3. چوڭ مېڭە رېفلېكس
رايونىنى ئۈستىدىن ئاستىغا
قاراپ قىرىپ ئۇۋۇلايمىز. قە-
رىپ ئۇۋۇلغاندا، تەڭشەپ دا-
ۋالاش ئۈنۈمىنى تولۇق جارى
قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇۋۇلاش
كۈچىنى مۇۋاپىق ئاشۇرساق
بولىدۇ.

2. باش بارماق يۇمشىقى
مەركىزىنىڭ سەل ئىچى تەرىپى-
پىدىكى ھىپوفىز رېفلېكس
رايونىنى بېسىپ ئۇۋۇلساق،
ھىپوفىزنىڭ ئىقتىدارى بۇزۇ-
لۇش سەۋەبىدىن كېلىپچىققان
تۈرلۈك كېسەللىكلەرنى تەڭ-
شەپ داۋالىغىلى بولىدۇ.

كىچىك مېڭە ۋە مېڭە غولى، ھىپوفىز، چوڭ مېڭە، پېشانە قاتارلىق كېسەللىك رېڭ-
لېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلاپ غىدىقلىغاندىن باشقا، يەنە جىگەر، ئۆت، ئۈستۈنكى ۋە ئاس-
تىنقى بەدەن مۇچە قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك رېڭلېكس رايونلىرىنى ئۇۋۇلىغاندا (ئۇۋۇلاش
ئۇسۇللىرىنى مەزكۇر كىتابنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەتلەردىن كۆرۈڭ)، كېسەللىكنى ئۇ-
نۇملۇك داۋالىغىلى بولىدۇ.

ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى:

جىگەر (64 - بەت)، ئۆت (52 - بەت)، ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى بەدەن مۇچە
(129 - بەت).

TIPS

40 ياشلارغا كىرگەن چاغدا، پۇتنىڭ ئاستى قىسمىدا دېۋەڭلىك سىزىقىنىڭ كۆ-
رۈلگەن ياكى كۆرۈلمىگەنلىكىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇش لازىم، ئائىلىسىدىكىلەر ئىچىدە دې-
ۋەڭلىك كېسەللىك ئىرسىيەت تارىخى بار كىشىلەر بۇ كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا
تېخىمۇ دىققەت قىلىشى كېرەك. 50 — 60 ياشلارغا كىرگەندە، كىچىك مېڭە ۋە مېڭە
غولى رېڭلېكس رايونىنى كۆپرەك ئۇۋۇلاپ، مېڭە يىگىلەشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

بىلىشكە تېگىشلىك بىر قىسىم مەسىلىلەر

پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ داۋالغاندا قانچە ئۇزۇن ۋاقىتتا ئۈنۈمى كۆرۈلىدۇ؟

پۇت قىسمى رېفلىپكس رايونىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى بىمارنىڭ بەدەن ئەھۋالىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا، كېسەللىكنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇۋۇلاش ئۈنۈمى يەنە بىمارنىڭ يېشى، جىنسى، بەدەن سۈپىتى، تۇرمۇشقا تۇتقان پوزىتسىيەسى، تۇرمۇش مۇھىتى، يېمەك - ئىچمەك ئا - دىتى قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. پەقەت ئۇزۇن مۇددەت داۋاملاشتۇر - غاندىلا، ئاندىن ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

قانداق ئادەملەر پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كېلىدۇ؟

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقتىن تارتىپ ياشانغان كىشىلەرگىچە، ئاساسەن ھەممە ئادەم پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاپ داۋالاشنى قوبۇل قىلسا بولىدۇ، بۇ ئائىلىدىكى ھەممە كىشى - لەرگە ماس كېلىدىغان، ساقلىقنى ساقلاشقا پايدىلىق داۋالاش ئۇسۇلىدىن ئىبارەت. ئوخشىمىغان ياشتىكى كىشىلەر توپى ئىچىدىكى ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كېلىدى - غان ئاساسلىق كېسەللىكلەر

ياش قاتلىمىدىكى كىشىلەر توپى	ئۇۋۇلاپ داۋالاشقا ماس كېلىدىغان ئاساسلىق كېسەللىكلەر
بوۋاقلار (0 — 3 ياشقىچە)	ئۆسۈپ يېتىلىشى ئاستا بولۇش، ئال ۋە ئاشقازاننىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى ياخشى بولماسلىق.
سەبىي بالىلار (3 — 6 ياشقىچە)	سىرتقى زەخم، چۇقۇق، كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچى ئاجىز بولۇش، ئۆسۈپ يېتىلىشى ئاستا بولۇش، جىم تۇرالماسلىق كېسەللىكى، ئورنىغا سىيىپ قويۇش.
بالىلار (6 — 12 ياشقىچە)	يېقىننى كۆرەلمەسلىك، بالدۇر يېتىلىش، ئىشتىھاسىزلىق، سىيىگەكلىك، سىرتقى زە - خىم، ئولتۇرۇش - يېتىش ھالىتى توغرا بولماسلىقتىن كېلىپچىققان كېسەللىكلەر.
ياش - ئۆسمۈرلەر (12 — 20 ياشقىچە)	بالاغىتكە يېتىش دەۋرىدىكى ئالاقىدار كېسەللىكلەر (پۇتى ئاغرىش، ئۆسۈپ يېتىلىش دەۋ - رىدىكى ئاغرىق).
ياشلار (20 — 40 ياشقىچە)	نېرۋا، مۇسكۇل، سۆڭەك، قان ئايلىنىش، سۈيدۈك ئاجرىتىپ چىقىرىش، ھەزىم قىلىش، نەپەس يولى، ئىچكى ئاجراتما، كۆپىيىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى.
ئوتتۇرا ياشلىقلار (40 — 60 ياشقىچە)	كىلىماتېرىيە دەۋرىدىكى ئۇنىۋېرسال كېسەللىكلەر، ئۇيغۇنسىزلىق، يۈرەك رېتىمىمىز - لىقى، قان ئازلىق، يارا كېسەللىكى، جەينەك بوغۇمى ئاغرىقى، تېرە ياللۇغى، بەش ئەزا كېسەللىكلىرى، بوغۇم قاپرىلىپ كېتىش، ياللۇغ، ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى يۈزۈلۈش قاتارلىق كېسەللىكلەر.
ياشانغانلار (60 ياشتىن يۇقى - رى)	رېماتىزم ئاغرىقى، بوغۇم ئاغرىقى، ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك كېسەللىكى، سۆڭەك بوشاپ كېتىش، دىيابېت، يۇقىرى قان بېسىم، قاندىكى ماي يۇقىرى بولۇش، ئەزالارنىڭ ئىقتى - دارى چېكىنىش.

رېفلىكسى رايونىنىڭ پۇت قىسمىغا ماس كېلىدىغان نۇقتىسىنىڭ سانى؟

كۆپ ساندىكى رېفلىكسى رايونىنىڭ يەككە پۇتنىڭ ئاستى تەرىپىدە پەقەت بىرلا ماس كېلىدىغان نۇقتىسى بولىدۇ، ئاز ساندىكى رېفلىكسى رايونىنىڭ يەككە پۇتنىڭ ئاستىدا ئىككى ياكى ئىككىدىن ئارتۇق ماس كېلىدىغان نۇقتىسى بار، مەسىلەن: كۆز، قۇلاق، كۆپىيىش بەزلىرى قاتارلىق رېفلىكسى رايونلىرى. ئۇزۇن مۇددەت كارىۋاتتىن قوپالماي يېتىپ قالغان سوزۇلما كېسەللىك بىمارلىرى پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاشقا ماس كېلىمدۇ؟

پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش سوزۇلما كېسەللىك بىمارلىرى ئۈچۈن ئەڭ ياخشى بولغان ھەرىكەت ئۇسۇلىدۇر، ئۇزۇن مۇددەت كارىۋاتتا يېتىپ ھەرىكەت يېتەرلىك بولمىغاچقا، بەدەندىكى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى چېكىنىپ كېتىدۇ. ۋاھالەنكى، پۇت قىسمىنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق بۇنداق بىمارلارنىڭ بەدەن سۈپىتىنى كۈچەيتكىلى، قاننىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇپ، پۈتۈن بەدەننىڭ ھۈجەيرىلىرىنى جانلاندۇرغىلى بولىدۇ. ئەمما سوزۇلما كېسەللىك بىمارلىرىنى ئۇۋۇلاپ داۋالغاندا، ئۇۋۇلاش ۋاقتى ۋە ئۇۋۇلاش كۈچىنى ئازايتىشقا توغرا كېلىدۇ.

پۇت قىسمىنىڭ ساغلاملىقى ئاياغ بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولامدۇ؟

سۈپىتى ياخشى، كىيسە كىشىگە راھەت بېغىشلايدىغان ئاياغ پۇت قىسمىنىڭ قېرىشى، شەكىل ئۆزگىرىشى ۋە پۇت قىسمىنىڭ تەكشى بولمىغان كۈچكە ئۆچرىشى سەۋەبىدىن كېلىپچىقىدىغان پۇت ئاغرىقلىرىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، پايپاقنىڭ سۈپىتىمۇ ناھايىتى مۇھىم بولۇپ، تەرسۇ-مۈرىدىغان، ھاۋا ئۆتۈشچان پايپاق پۇت تېرىسىنى قوغداش رولىنى ئوينايدۇ.

本书根据江西科学技术出版社, 2012年11月第1版, 2014年11月第20次印刷版本翻译出版。

بۇ كىتاب جياڭشى پەن - تېخنىكا نەشرىياتىنىڭ 2012 - يىلى 11 - ئاي 1 - نەشرى، 2014 - يىلى 11 - ئاي 20 - باسمىغا ئاساسەن تەرجىمە ۋە نەشر قىلىندى.

شېئالىق قول (3)

(كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكلەرنى پۇتنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق داۋالاش)

تەرجىمە قىلغۇچى: ئادىل ئوبۇلقاسىم

مەسئۇل مۇھەررىرى: شەمشەق مەر ئابدۇراخمان، بەرنا ئەنۋەر

مەسئۇل كوررېكتورى: زۆھرەگۈل سىدىق

مۇقاۋا لايىھەلىگۈچى: ئەنۋەر قاسىم

بەت ياسىغۇچى: ئابدۇغېنى ئابباس

شىنجاڭ خەلق باش نەشرىياتى

نەشر قىلغۇچى: شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

ئادرېسى: ئۈرۈمچى شەھىرى بۇلاقبېشى كوچىسى 196 - قورۇ

تور ئادرېسى: <http://www.xjpsp.com>

باسقۇچى: ئۈرۈمچى باجياخۇ رەڭلىك مەتبەئەچىلىك چەكلىك شىركىتى

تارقاقچۇچى: شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى

نەشرى: 2015 - يىلى 12 - ئاي 1 - نەشرى

بېسىملىشى: 2015 - يىلى 12 - ئاي 1 - باسمىسى

فورماتى: 1000 × 710 م م 1/16 كەسىلمە

باسما تاۋىقى: 14.125

كىتاب نومۇرى: ISBN 978 - 7 - 5372 - 6456 - 3

تىراژى: 2000 - 1

باھاسى: 30.00 يۈەن

ئارقىتىش بۆلۈمى تېلېفون نومۇرى: 2823055 (0991) پوچتا نومۇرى: 830001