


كامللاردا بولدىغان كېلىشكەنلىك
ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش



مىللەتلەر نەشرىياتى

كالىلاردا بولمىغان كېسەللەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش

مىللەتلەر نەشرىياتى

مۇندەرىجە

1. كالا كېسەللىكلىرىگە دىئاگنوز قويۇش.....1
1. كالىنى بېكىتىش ئۇسۇللىرى.....1
2. كالا كېسەللىرىگە دىئاگنوز قويۇشتىكى مۇھىم نۇقتىلار.....10
2. يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر.....54
- ئاقسىل.....54
- كالا ۋاباسى.....61
- تارقىلىشچان زۇكام.....66
- كۆيدۈرگە.....70
- قانغا سېتىشچىيە.....78
- تۈپەر كۈليوز.....84
- برۇتسېللىوز.....95
- قاراسان.....106
- قاتما.....113
- ئالا تۈپكە.....120
3. پارازىت قۇرۇت كېسەللىكلىرى.....127
- جىگەر شەرتىغۇچ قۇرۇت كېسەللىكى.....127
- قېرىن شەرتىغۇچ قۇرۇت كېسەللىكى.....140
- ئاشقازان ئامىتى بېزى كەك تەخسىلىك شەرتىغۇچ قۇرۇتى

- 145..... كېسەللىكى
- 150..... ئۈچەي لېنتىسىمان قۇرۇت كېسەللىكى
- 159..... قاپلىق قۇرۇت كېسەللىكى
- 166..... ئاشقازان - ئۈچەي يىپچە قۇرۇت كېسەللىكى
- 173..... ئۆپكە قىل قۇرۇت كېسەللىكى
- 179..... قوتۇر
- 188..... سايغاق
- 194..... تېلېرىئوز
- 203..... تامچە قۇرۇت كېسەللىكى
- 209..... 4. ئىچكى كېسەللىكلەر
- 209..... يۈرەك مۇسكۇلى ياللۇغى
- 211..... يۈرەك قېپى ياللۇغى
- 213..... كىكىرتەك ياللۇغى
- 216..... كانايچە ياللۇغى
- 219..... كانايچە - ئۆپكە ياللۇغى
- 222..... ئېغىز ياللۇغى
- 226..... قىزىل ئۆڭگەچ توسىلىپ قېلىش
- 228..... چوڭ قېرىنغا ئوزۇق تىقىلىش
- 233..... چوڭ قېرىن كۆپۈش
- 236..... ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشىشىپ قېلىشى
- 239..... توققۇز تورلۇقنىڭ توسىلىپ قېلىشى
- 242..... تورلۇق قېرىنىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغى
- 244..... ئۈچەي تىقىلىشى
- 247..... ئۈچەي - قېرىن ياللۇغى
- 251..... ماھىيەتلىك ئۆتكۈر سىگەر ياللۇغى

- 253.....بۆرەك جامى - بۆرەك ياللۇغى.
- 255.....دوۋساق ياللۇغى.
- 258.....سۆڭەك يۇمشاش كېسەللىكى.
- 263.....ئاتىپتونىمىيە.
- 265.....ئاپتاپ ئۆتۈش ۋە ئىسسىق ئۆتۈش.
- 268.....مىڭە ياللۇغى ۋە مىڭە پەردىسى ياللۇغى.
- 270.....زەھەرلىنىش.
- 273.....سۇكانتىن زەھەرلىنىش.
- 275.....ھىدرو سىئاندىكى سىلاتاسىدىن زەھەرلىنىش.
-ئابدېمىلىك ئۇرۇغى ۋە ئابدېمىلىك كۈنجۈرىسىدىن زەھەرلىنىش
- 278.....

ئورگانىك فوسفور تەركىپلىك دىخانىچىلىق دورىلىرىدىن

- 281.....زەھەرلىنىش.
- 284.....5. تاشقى كېسەللىكلەر.
- 284.....جاراھەت.
- 295.....يېرىڭلىق ئىششىق.
- 300.....ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغى.
- 305.....رېجاتىزىم.
- 311.....بوغۇم سىلىقلاتقۇچى پەردە ياللۇغى.
- 315.....شىللىق خالتا ياللۇغى.
- 319.....بوغۇم قايرىلىپ كېتىش.
- 323.....لىپەك چىقىپ كېتىش.
- 326.....كۆزنىڭ مۇڭگۈز پەردىسى ياللۇغى.
- 331.....6. تۇغۇت كېسەللىكلىرى.
- 331.....قىيىن تۇغۇت.

346..... تۆرەلمىنى پارچىلاپ ئېلىش

349..... يۇقۇمسىز بالا تاشلاش

352..... جىنىس يولىنىڭ چىقىپ قېلىشى

354..... ھەمىيى چۈشمەسلىك

357..... بالىياتقۇنىڭ چىقىپ قېلىشى

362..... تۇغۇت پالچى

365..... جىنىس يول ياللۇغى

367..... بالىياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغى

371..... يىلىن ياللۇغى

381..... ئەمچەك توپچىسى تۆشۈگىنىڭ تارىيىپ قېلىشى

384..... سۈت ئېقىپ تۇرۇش

386..... سۈت سوغىلىپ كېتىش ۋە تارتىلىپ كېتىش

388..... قىسرلىق

394..... 7. موزاي كېسەللىكلىرى

394..... يېڭى تۇغۇلغان موزايىنىڭ تۇنجۇقۇپ قېلىشى

397..... كىندىك ياللۇغى

399..... موزاي ئىچ ئۆتكۈسى

404..... موزاي ئۆپكە ياللۇغى

407..... موزاي پاراتىفى

411..... موزايىلاردا كۆرۈلىدىغان راخت كېسەللىكى

8. كۆپ ئىشلىنىدىغان تاشقى كېسەللىك ئوپېراتسىيەلىرى

415.....

415..... مۇڭگۈز كېسىش

418..... قىزىل ئۆگەچ ئوپېراتسىيىسى

425..... چوڭ قېرىن ئوپېراتسىيىسى

- 434.....قوساقنى يېرىپ تۇغدۇرۇش
- 437.....ئەمچەك توپچىسى ئوپىراتسىيىسى
- 440.....پىچىش
- 444.....ئۇرۇق نەيچىسىنى بوغۇۋېتىش

1. كالا كېسەللىكلىرىگە دىئاگنوز قويۇش

1. كالىنى بېكىتىش ئۇسۇللىرى

1. ئۆرە تۇرغۇزۇپ بېكىتىش

بۇرنىنى قىسىپ بېكىتىش: بۇرۇن پاسلى بۇرۇن ئامبۇرى (ياكى بارماق) بىلەن قىسىلىپ، بۇرۇن يۇقۇرى كۆتىرىلىدۇ. بۇرنىغا چۈلۈك ئۆتكۈزۈلگەن كالىنىڭ چۈلۈگىدىن تارتىسىمۇ بولىدۇ. بۇ ئۇسۇل تولاراق ئوكۇل قىلغاندا ۋە ئادەتتىكى تەكشۈرۈشلەردە قوللىنىلىدۇ.

مۈڭگۈزىدىن باغلاپ بېكىتىش: كالىنىڭ مۈڭگۈزى ئۇزۇن ئاغامچا بىلەن تۈۋرۈك (ياكى دەرەخ) كە باغلىنىپ، كالىنىڭ بېشى بېكىتىلىدۇ. مۈڭگۈزى سۈنۈپ كەتمەسۇن ئۈچۈن، يەنە بىر ئاغامچا كالىنىڭ ساغرىسىدىن ئايلاندۇرۇپ ئېلىنىپ، كالا تۈۋرۈككە باغلاپ قويۇلىدۇ. بۇ ئۇسۇل كالا كېسەللىكلىرىنى تەكشۈرۈش، ئوكۇل سېلىش ۋە تاشقى جاراھەتلەرنى داۋالاشتا قوللىنىلىدۇ.

ئارقا ئاياقلىرىنى بېكىتىش: قىسقا ئاغامچا بىلەن كالىنىڭ ئارقا ئىككى ئايىغى ئوشۇق بوغۇمنىڭ ئۈستىدىن چېتىپ باغلىدۇ.



1-رەسىم بۇرنىنى قىسىپ
بېكىتىش


2-رەسىم مۇڭگۈزدىن
باغلاپ بېكىتىش

نىدۇ، تېپىپ قويىمىسۇن ئۈچۈن، يان پاقالچاق مۇسكۇلى ۋە تاپان سىڭىرىدىن بېسىپ تۇرۇلىدۇ. بۇ ئۇسۇل يىلىن، ئارقا ئاياق ۋە جىنىسى يول كېسەللىكلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە داۋالاشقا قوللىنىلىدۇ.

2. يېنىچە ياتقۇزۇپ بېكىتىش

ئايىغىنى كۆتىرىپ يىقىتىش: كالنىڭ چۇلۇۋۇرى ياكى چۇلۇ-گىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ، 8~9 مېتىر ئاغامچىنى بىر ئۇچىنى ئۇزۇن، بىر ئۇچىنى قىسقا قىلىپ قاتلاپ، قاتلانغان قىسمىغا قوزۇق بېغى چىقىرىپ، كالنىڭ سول ئالدى باقايدىن باغلاش، ئاغامچىنىڭ قىسقا ئۇچىنى كالنىڭ كۆكرەك ئاستىدىن ئېلىپ، ئوڭ تەرىپىدىن ئايلاندۇرۇپ كېلىپ سەرىدىن ئارتىلدۇرۇپ سول تەرىپىگە چۈشۈرۈش لازىم، ئاغامچىنىڭ بۇ ئۇچىنى بىر ئادەم تۇتۇپ تۇرىدۇ. ئاندىن ئاغامچىنىڭ ئۇزۇن ئۇچىنى ئارقا تەرىپىگە تارتىپ بەلدىن ئارتىلدۇرۇپ چۈشۈرۈپ، قوساق ئاستىغا كەل-

گەندە ئاغامچىنى كىرىشتۈرۈپ ئېلىپ كەينىگە تارتىپ تۇرۇش لازىم. كالىنىڭ ئالدىدا تۇرغان كىشى بىر قولىدا كالىنىڭ بېشىنى تۇتۇپ تۇرىدۇ، يەنە بىر قولىدا ئاغامچىنىڭ قىسقا ئۇچىنى چىڭ تارتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن كالىنىڭ سول ئالدى ئايىقى كۆتىرىلىدۇ؛ كالىنىڭ كەينىدە تۇرغان كىشى بەلىدىن ئېلىنغان ئاغامچىنى كىرىست قىسمى ئارقىلىق ساغرىسىنى بويلىتىپ تارتىپ، ئوشۇق بوغۇمىنىڭ ئۈستىگە كەلتۈرۈپ، ئاغامچىنى كەينىگە كۈچەپ تارتىش بىلەن كالىنىڭ ئارقا ئىككى ئايىقىنى مەھكەم چاتىدۇ، بۇنىڭ بىلەن كالا زوڭزايغان تۇرۇقتا يېقىتىلىدۇ-دە، ئاندىن تۆت ئايىقى باغلىنىدۇ. بۇ ئۇسۇل پىچىش، يىملىنىش ئوپىراتسىيە قىلىش ۋە تۇيۇق كېسەللىكلەرنى داۋالاشقا قوللىنىلىدۇ.




3-رەسىم ئايىقىنى كۆتىرىپ يېقىتىش

بېلىدىن بېسىپ يېقىتىش: 10 مېتىر توم ئاغامچىنىڭ بىر ئۇچى بىلەن كالىنىڭ ئىككى مۇڭگۈزىنى چېتىپ باغلاپ، يەنە بىر ئۇچىنى ئۈستى تەرىپىدىن (كالا يېقىتىلغاندا يەرگە تەگمەيدىغان تەرىپىدىن) كەينىگە تارتىپ، كۆكرەك قىسمىدىن بىر،

قوساق قىسمىدىن بىر كىرىشتۈرۈپ ئورنىتىلىپ، ئىككى كىشى كەينىگە كۈچەپ تارتىدۇ. بىر كىشى كالىنىڭ چۈلۈكى (ياكى بۇرۇن پاسلى)دىن ۋە مۈڭگۈزىدىن تۇتۇپ، بېشىنى يىقىتىلدىغان تەرەپكە باسىدۇ؛ يەنە بىر كىشى كالىنىڭ قۇيرۇقىنى يىقىتىلدىغان تەرەپكە تارتىدۇ. دىمەك، 4 كىشى مۇشۇنداقسىگە بىرلا ۋاقىتتا كۈچەپ تارتىپ كالىنى يىقىتىدۇ، ئاندىن بېشىنى مەھكەم بېسىپ تۇرۇپ، ئاياقلىرىنى چېتىپ باغلايدۇ. بۇ ئۇسۇل پىچىش، يىلمىنى ئوپىراتسىيە قىلىش ۋە تۇياق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشقا قوللىنىلىدۇ.


3. داردا بېكىتىش



4-رەسىم بېلىدىن بېسىپ يىقىتىش

ئىككى تۈۋرۈكلۈك داردا بېكىتىش: كالا چۈلۈۋىرىدىن ئالدى تۈۋرۈككە باغلىنىدۇ، بىر تال توم ئاغامچىنىڭ بىر ئۇچىغا تۆمۈر ھالقا بېكىتىلىپ، ئالدى تۈۋرۈكتىكى "L" شەكىللىك تۆمۈر ئىلمەككە ئېلىپ قويۇلىدۇ، ئاندىن ئاغامچا ئارقا تۈۋرۈكتىكى "L" شەكىللىك تۆمۈر ئىلمەك تەرەپكە تارتىلىپ، ئىككى ئايلا-

دۇرۇلىدۇ۔ دە، كالا ئىككى تۇۋرۇكنىڭ ئوتتۇرىسىغا باغلىنىدۇ، ئاندىن كۆكرەكتىن ئېلىنغان ۋە قوساقتىن ئېلىنغان ياغاچلار بىلەن ئاسماققا چىقىرىلىدۇ. دالدا داۋالاشتا يېقىن تۇرغان ئىككى كى دەرەختىن پايدىلانىسمۇ بولىدۇ، لېكىن بۇنىڭغا يەنە بىر تال توغرا ياغاچ كېرەك بولىدۇ. بۇ ئۇسۇل دورا ئىچكۈزۈش، ئوكۇل سېلىش، پىچىش ۋە دىئاگنوز قويۇش، داۋالاشتا قوللىنىلىدۇ.




5-رەسىم ئىككى تۇۋرۇكلۇك داردا بېكىتىش

تۆت تۇۋرۇكلۇك داردا بېكىتىش: ئالدى ئىككى تۇۋرۇكنىڭ ئۇزۇنلۇقى 2.8 مېتىرچە، ئارقا ئىككى تۇۋرۇكنىڭ ئۇزۇنلۇقى 2.4 مېتىر بولىدۇ، بۇلار يەرگە 1 مېتىر كۆمۈلىدۇ، ئىككى ياندىكى تۇۋرۇكلەرنىڭ يەر يۈزىگە 80 س م چە كېلىدىغان يېرىگە يان بالداق، ئالدى ئىككى تۇۋرۇكنىڭ ۋە ئارقا ئىككى تۇۋرۇك-نىڭ يەر يۈزىگە 50 س م كېلىدىغان يېرىگە ھەرگەتچان توغرا بالداق ئورنىتىلىدۇ. كالا سولىۋېلىنغاندىن كېيىن بالداق ئۆتكۈ-


زۈپ قويۇلىدۇ ھەمدە كالىنىڭ بىر كەينى پۇتى بالداقنىڭ تېشىدا تۇرىدۇ. بۇ ئۇسۇل دورا ئىچكۈزۈش، ئوكۇل سېلىش، پىچىش، تەكشۈرۈش ھەم داۋالاشتا قوللىنىلىدۇ.

كاتەكسىمان داردا بېكىتىش: ئاۋال ئالدى ئىشك تاقىلىدۇ، باش-بويۇن بالدىغى ئېچىلىدۇ. بويۇننى بېسىپ تۇرىدىغان بال-داق ۋە يان ئىشكىنىڭ تەڭشەك شادىسى كۆتىرىپ قويۇلىدۇ، ئىككى قات ئارقا ئىشك ئوك-سولغا ئېچىپ قويۇلىدۇ، ئىچكى ئارقا ئىشكىنىڭ يۇقۇرى-تۆۋەن قەۋىتى بىرلىكتە ئېتىلىدۇ، ئارقا




6-رەسىم تۆت تۈۋرۈكلىك داردا بېكىتىش

ئىشىگىدىن كالا كىرگۈزۈلىدۇ. كالىنىڭ بېشى چىققان ھامان، بويۇن قىسقۇچ بالدىغى ئىچىگە ئىتىرىلىپ، ئىلمەك بىلەن بېك-تىلىدۇ، بويۇننى بېسىپ تۇرىدىغان بالداقنىڭ يۇقۇرى-تۆۋەن-لىكى مۇۋاپىق تەڭشىلىپ، ئارقا ئىشكى ئېتىپ قويۇلىدۇ. تەك-شۈرۈش ۋە داۋالاشتا تەڭشەك شادا ياكى يان ئىشكىتىن پايدى-



- 1-7 رەسىم كاتەكسىمان دارىنىڭ ياندىن كۆرۈنۈشى
1. قۇتا ئاسقۇچ
 2. ياردەمچى ئىشك
 3. كۆتىرپ
 4. ئارقا يان ئىشك
 5. تەڭشەك شادا
 6. ئالدى يان ئىشك
 7. ئالدى ئىشك

لىنىلىدۇ. ئىش تۈگىگەندىن كېيىن، بويۇننى بېسىپ تۇرىدىغان بالداقنى كۆتىرىپ، بويۇن قىسقىچ بالىدىغىنى ئېلىۋېتىپ، ئالدى ئىشك ئېچىۋېتىلسە، كالا چىقىپ كېتىدۇ.




بىرىگى: م.م

7-2-رەسىم كاتەكسىمان

دارنىڭ ئالدىدىن كۆرۈنۈشى


1. ئىلمەك 2. تەكشۈش دائىرىسى
3. بويۇننى بېسىپ تۇرىدىغان بالداق
4. ماركا 5. بويۇن قىسقىچ بالىدىغى

تار يوللۇق قاشدا بېكە-
تىش: بۇ ئۇسۇل پادا بويىچە
يۇقۇم تەكشۈرۈشتە قوللىنىدۇ.
قاشنىڭ ئۇزۇنلۇغى
ۋە چوڭلۇغى كالىلارنىڭ
سانغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ،
ئادەتتە 30~50 تۇياق كالا
سىققۇدەك بولسا بولىدۇ.
قاشدىن پايدىلانغاندا،
ئۇنىڭ يۇقۇرى ۋە تۆۋەن
توغرا بالىدىغىنىڭ ئۈستىگە
ئىككى تال ياغاچ قويۇلىدۇ،
كالىلار قاشقا تۈركۈمىگە
بۆلۈپ كىرگۈزۈلگەندىن
كېيىن، ئىككى دانە
بالداق بىلەن توساپ
قويۇلىدۇ.



بىرلىكى: م.م

- 7-3-رەسىم كاتەك-
سىمان دارىنىڭ ئارقىدىن
كۆرۈنۈشى
1. قۇتا ئاسقۇچ
 2. يۇقۇرقى ئارقا ئىشىك
 3. تۈۋەنكى ئارقا ئىشىك
 4. تەڭشەك شادا
 5. ياردەمچى ئىشىك



بىرلىكى: س.م

8-رەسىم تار يوللۇق قاشا

2. كالا كېسەللىكلىرىگە دىئاگنوز

قويۇشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

كالا كېسەللىكلىرىگە دىئاگنوز قويۇش باشقا چارۋا ماللار كېسەللىكلىرىگە دىئاگنوز قويۇشقا ئاساسەن ئوخشايدۇ، لېكىن كالا ئورگانىزىمىنىڭ ئاناتومىيىلىك تۈزۈلۈشى باشقىچە بولغاچقا، ئۇنىڭمۇ بەزى ئالاھىدىلىكلىرى بولىدۇ. مەسىلەن، كالا ئۇزۇق يىگەندە يۇمشاق چاينىمايدۇ، يات نەرسىلەرنى يۇتۇۋالىدۇ، بۇ ھال ئۇلاردا ئاسانلا جاراھەتلىك تورلۇق قېرىن ياللۇغى، جارا-ھەتلىك يۈرەك قېپى ياللۇغى ۋە جاراھەتلىك ھەزىم توسقۇنلۇغى قاتارلىق ئالاھىدە كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىدۇ. سېغىن سىيىرلار بوغازلىق، تۇغۇت ۋە سۈت بېرىش مەزگىللىرىدە، بېقىش-باشقۇرۇشنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىغىدىن، كۆپىنچە، تۇغۇت كېسەللىكلىرى ياكى سۈت بېزى كېسەللىكلىرىگە دۇچار بولىدۇ. سېغىن سىيىرلارنى نورمال كۆپەيتىش، ئۇلارنىڭ سۈت مىقدارىنى ئاشۇرۇش نىيىتىدە، ئۇلارغا يەم-بوغۇز نامۇۋاپىق ھالدا كۆپ بېرىلسە، ئۇلاردا ئاسانلا ھەزىم قىلىش ئەزالىرى كېسەللىكلىرى كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، تۇبېركۇلىوز، برۇتسېللو، تېلېرىئوز، جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت كېسەلى ۋە بەزى يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر ھەم پارازىت قۇرۇت كېسەللىكلىرىمۇ ئۆلكىمىزدە

كۆپرەك كۆرۈلىدۇ، شۇڭا كالا كېسەللىكلىرىگە دىئاگنوز قويۇش نۇقتىلىرىنى ئىگەللەش تېخىمۇ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

1. ئادەتتىكى تەكشۈرۈش

1. تاشقى قىياپىتىنى تەكشۈرۈش:

روھىي ھالىتى: كاللىنىڭ روھىي ھالىتى ئۇنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنىڭ خىزمىتىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ. كېسەل كالا-نىڭ روھىي ھالىتىنى كۈزەتكەندە، ئاساسلىقى، ئۇنىڭ رەڭگى-روھى، كۆز-قۇلاق ھەرىكىتى ۋە قوغدىنىش ئىنكاسى قاتارلىقلارغا دىققەت قىلىش كېرەك. كالا كېسەل بولغاندا، كۆپىنچىسىنىڭ روھى چۈشكۈن، ئىنكاس قايتۇرۇشى گال بولىدۇ، بەزىلىرىدە تىنىمىسىزلىق، ئۇدۇل كەلگەن يەرگە ئۆزىنى ئۇرۇش ئىپادىلىرىدە مۇ كۆرۈلىدۇ.

سېمىزلىقى: كاللىنىڭ سېمىزلىقى، ئاساسەن، يۇڭى ۋە مۇس-كۈلنىڭ تولۇش دەرىجىسىگە قاراپ، ياخشى، ئوتتۇرا ھال ۋە ناچار دەپ 3 خىلغا ئايرىلىدۇ. كاللىلارنىڭ ئورۇق-سېمىز بولۇشى ئۇلارنىڭ نەسلى، بېقىلىش شارائىتى ۋە ئىشلىتىلىشى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ، تېز ئورۇقلاش ھەر خىل يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر ۋە ئاغرىتىدىغان كېسەللىكلەر، مەسىلەن، كالا ۋاباسى، جاراھەتلىك تورلۇق قېرىن ياللۇغى، قوساق پەردىسى ياللۇغى، جاراھەتلىك يۈرەك پەردىسى ياللۇغى قاتارلىقلارنىڭ ئالامىتىدۇر؛ ئاستا ئورۇقلاش، كۆپىنچە، سوزۇلما كېسەللىكلەر، تۇپىر كۈلىيوز، پارازىت قۇرۇت كېسەللىكلىرى، مىنېرال ماددا

يېتىشمەسلىك كېسەللىكى، بۆرەك جامى ياللۇغى، ھەزىم توس-
قۇنلۇغى ياكى ئوزۇقلىنىش-يۇتۇش قىيىنلىقى قاتارلىقلارنىڭ
ئالامىتىدۇر.

تۇرقى: كالا مەلۇم كېسەلگە گىرىپتار بولغاندا، ئۇنىڭ تۇر-
قىدا كۆپىنچە ئالاھىدە ئۆزگىرىشلەر پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن،
ئۈچەينىڭ كىرىشىپ قېلىشى، بالىياتقۇنىڭ تولغىشىپ قېلىشى ۋە
سۈيىدۈك يولىدا تاش تۇرۇپ قېلىش كېسەللىكلەرگە گىرىپتار
بولغان كالا تىنچسىزلىنىدۇ، ئارقا پۇتى بىلەن قوسىغىنى تېپىدۇ،
كەينىگە بۇرۇلۇپ قارايدۇ. سېغىن سىير تۇغۇت پالچى بولۇپ
قالغاندا، ئاتىپتون كېسىلىگە گىرىپتار بولغاندا قوپماي يېتىۋا-
لىدۇ، بېشىنى بىر يېقىغا قىسايىپ غەلىتە تۇرۇقتا تۇرىدۇ. جارا-
ھەتلىك يۈرەك قېپى ياللۇغى بولغان كالا كۆپىنچە جەينەك
قىسمىنى كېرىپ تۇرۇش بىلەن كۆكرىگىنىڭ قىسلىشىنى يەڭگىل-
لىتىدۇ. جاراھەتلىك تورلۇق قېرىن ياللۇغى، جىنىسى ئەزا
كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغان كالا تولاراق دۈمچىيىپ تۇرىدۇ.
جاراھەتلىك قوساق پەردىسى ياللۇغى بولغان كالا ئاغرىق ئازا-
ۋىدىن كۆپىنچە زورىغا قەدەم تاشلايدۇ.

2. تېرىسىنى تەكشۈرۈش: تېرىنىڭ پارىراقلىغى، سېزىمى،
تېرىدە ئىششىق-زەخمىلىنىشلەرنىڭ بار-يوقلۇغى، تېرىنىڭ
تېمپېراتۇرىسى ۋە ئەۋرىشىملىكى قاتارلىقلارغا دىققەت قىلىنىدۇ.
جاراھەتلىك يۈرەك پەردىسى ياللۇغى، ئورگان خاراكتېر-
لىق يۈرەك كېسىلى، سوزۇلما كۆكرەك پەردىسى ياللۇغى،

ئېغىر پارازىت قۇرۇت كېسەللىكلىرى قاتارلىقلاردا، كالىنىڭ تۆش قىسمىدا ئىششىق پەيدا بولىدۇ. ئافسۇسكىچە، كالى ئۆلگەندىن كېيىن، كۆيدۈرگە قاتارلىقلاردا، تېرىدە قىسمەن ياكى ئومۇمىي يۈزلۈك كېسەللىك ئۆزگىرىشى كۆرۈلىدۇ. تېرىنى تۇتۇپ تەكشۈرگەندە، ئىگەك ئاستى، قۇلاق ئاستى، مۇرە ئالدى لىمفا تۈگۈنلىرىدە، يانپاش ئالدى، يىرىق ۋە يىللىق لىمفا تۈگۈنلىرىدە ئىششىق، قىزىش ھەم ئاغرىش ئالامەتلىرىنىڭ بار-يوقلۇقىغا دىققەت قىلىش لازىم.

3. بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەكشۈرۈش: تەكشۈرگەندە كالىنىڭ كەينىدە تۇرۇپ، تېرمومېتىرنىڭ سىمپ تۇۋرۇگىنى سىلكىپ 35°C تىن تۆۋەن چۈشۈرگەندىن كېيىن، سول قول بىلەن كالىنىڭ قۇيرۇقىنى كۆتىرىپ، ئوڭ قول بىلەن تېرمومېتىرنى سەل يۇقۇرىغا قارىتىپ بۇراپ كالىنىڭ كۆتىگە كىرگۈزدۈرسىز ۋە ئۇنى قۇيرۇق تۈۋىگە قىستۇرۇپ قويىسىز. 5 مىنۇت ئۆتكەندىن كېيىن تېرمومېتىرنى چىقىرىۋېلىپ، سىمپ تۇۋرۇگىنى كۆرسەتكەن ساننى كېسەللىك تارىخىغا يېزىپ قويىسىز. شارائىت يار بەرسە، تېمپېراتۇرا خاتىرىلەش دەپتىرىگە تېمپېراتۇرىنىڭ ئۆزگىرىش ئەگرى سىزىغىنى سىزىپ چىقىپ، ئۇنى قىزىتما تىپىنى تەھلىل قىلىش ۋە كېسەللىككە دىئاگنوز قويۇشتا ئاساس قىلىش لازىم.

كالىنىڭ نورمال تېمپېراتۇرىسى $37.5^{\circ}\text{C} \sim 39.5^{\circ}\text{C}$ ، موزاينىڭكى $38.5^{\circ}\text{C} \sim 40.5^{\circ}\text{C}$ بولىدۇ. تېمپېراتۇرىنىڭ نورمالسىزلىقى ئورگا-

نەزىم خىزمىتىنىڭ قالايمىقانلاشقانلىغىنىڭ مۇھىم بىر ئالامىتى. شۇڭا كالىنىڭ تېمپېراتۇرىسىغا ھۆكۈم قىلىشتا، تېمپېراتۇرىنىڭ ئۆزگىرىشىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان ئامىللارنى ھەسابقا ئېلىش كېرەك. ئادەتتە كالىنىڭ يېشى، جىنسى، نەسلى ۋە ياشىغان مۇھىتىنىڭ ئوخشاش بولماسلىغىدىن، بەدەن تېمپېراتۇرىسىدىمۇ پەرقلەر بولىدۇ.

بەدەن تېمپېراتۇرىسىنىڭ ئەڭ يۇقۇرى فىزىئولوگىيىلىك دائىرىدىن ئېشىپ كېتىشى كېسەللىك ھالەت بولۇپ، قىزىتما دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە تېمپېراتۇرا ئۆرلەش، شۈكلەپ قېلىش، ھەزىم قىلىش قالايمىقانلىشىش، قاتتىق توڭلاپ تىترەش، تېرە تېمپېراتۇرىسى نورمال بولماسلىق، نەپەس ئېلىش ۋە تومۇر سوقۇش ئىتتىكىلەش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كۆپ ساندىكى كېسەللىكلەردە، قىزىتما تېمپېراتۇرا ئۆرلەش مەزگىلى، تېمپېراتۇرا چېكىگە يېتىش مەزگىلى، تېمپېراتۇرا تۆۋەنلەش مەزگىلى دېگەن بىرنەچچە مەزگىلگە بۆلۈنىدۇ. تېمپېراتۇرىنىڭ ئىتتىك چۈشۈشى تېز تۆۋەنلەش، ئاستا چۈشۈشى ئاستا تۆۋەنلەش دىيىلىدۇ. تېمپېراتۇرا ئاستا تۆۋەنلەپ نورماللىشىپ، باشقا كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ يېنىكلىشى ياكى يوقىلىشى كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ياخشىلانغانلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ. تېمپېراتۇرا نورماللاشقان بولسىمۇ، باشقا كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ يېنىكلىشى مەسىلىگە ھەتتا ئېغىرلىشىپ كېتىشى كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ يامانلاشقانلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ. تېمپېراتۇرىنىڭ تۇيۇقسىز

تۆۋەنلەپ نورمال چەكتىن ئېشىپ كېتىشى بىلەن تەڭ يۈزەك-
نىڭ بەك ئاجىزلاپ كېتىشى ئۆلۈمدىن دېرەك بېرىدۇ.
تېمپېراتۇرىنىڭ ھەددىدىن زىيادە تۆۋەنلەپ كېتىشى (نورمال
چەكتىن ئېشىپ كېتىشى) گە، ئومۇمەن، نېرۋا ئۇچلىرىنىڭ
مۇزلاپ قېلىشى، قان ئايلىنىشنىڭ ئاجىزلىشىشى ھەمرا بولۇپ
كېلىدۇ، بۇ تولاراق تۇغۇت پالسىچى ۋە ئاتسېتون كېسىلىدە
كۆرۈلىدۇ، شۇنداقلا ئوزۇقتىن زەھەرلىنىش، قاتتىق قانسىراش
ۋە ماددا ئالمىشىش ھەم نېرۋا خىزمىتىنىڭ قالايمىقانلىشىشى
قاتارلىقلارنىمۇ كۆرۈلىدۇ.

4. تومۇر سوقۇشنى تەكشۈرۈش: كالىنىڭ تومۇر سوقۇشى
ئۇنىڭ قۇيرۇق قىزىل تومۇرىدىن تەكشۈرۈلىدۇ. تەكشۈرگۈچى
كالىنىڭ كەينى تەرىپىدە تۇرۇپ، سول قولى بىلەن قۇيرۇق
تۈۋىدىن سەل كۆتىرىپ تۇرۇپ، ئوڭ قولىنىڭ بىگىزى ۋە ئوتتۇرا
بارماقلىرى ياكى بىگىز، ئوتتۇرا ۋە نامسىز بارماقلىرى بىلەن
قۇيرۇق ئاستى ئوتتۇرىسىدىكى قىزىل تومۇرىنى بوش بېسىپ،
تومۇرنىڭ 1 مىنۇتتا قانچىلىك سوقىدىغانلىقىنى تەكشۈرىدۇ.
ساغلام كالىنىڭ تومۇرى مىنۇتغا 40~80 قېتىم، موزايىنىڭكى
70~100 قېتىم سوقىدۇ.

تومۇر سوقۇشنى تەكشۈرگەندە، ئۇنىڭ قېتىم سانى، رېتىمى
ۋە خۇسۇسىيىتىگە دىققەت قىلىش كېرەك.

5. نەپەس ئېلىش ۋە يۇقۇرقى نەپەس يولىنى تەكشۈرۈش:
بۇنىڭدا نەپەس سانىغا دىققەت قىلىش لازىم. كالا نەپەس

ئالغاندا، كۆكرەك ۋە قوسىغىنىڭ كۆتىرىلىش-پەسلەش ھەرىكىتى ئېنىق بىلىنمەيدۇ، شۇڭا نەپەس سانىنى بىلىشتە، ئاساسەن، ئۇنىڭ تىنىشىغا قاراپ ياكى بۇرۇندىن چىققان تىنىققا قولنىڭ كەينىنى تۇتقاندا بىلىنگەن سېزىمگە قاراپ، 1 مىنۇت-1.5 مىنۇت نەپەس سانى ھىساپلىنىدۇ. ساغلام كالا مىنۇتغا 10~30 قېتىم، موزاي 30 قېتىمدىن ئارتۇق نەپەس ئالىدۇ.

يىللىق ياللۇغى ۋە زەھەرلىنىش كۆرۈلگەندە نەپەس ئاستىلايدۇ، بۇنداق ئەھۋالدا نەپەس سانىنى تەكشۈرۈش قىيىنراق بولىدۇ. ئۆپكە يەللىك ئىششىقى كۆرۈلگەندە نەپەس چىقىرىش ۋاقتى ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ. نەپەس قىيىنلاشقاندا كۈچەپ نەپەس ئېلىش، نەپەس سانى، فورمىسى ۋە رېتىمىمۇ ئۆزگىرىش ئالا-مەتلىرى كۆرۈلىدۇ. جاراھەتلىك تورلۇق قېرىن ياللۇغىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئىنچىقلاش، قىيىنلىپ نەپەس ئېلىشتەك ئاغرىق ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

بىر ياق بۇرۇن بوشلۇغى (ياكى ئىككى ياق بۇرۇن بوش-لۇغى)دىن سېسىق تىنىق چىقىش تولاراق بۇرۇن كاۋىكى ياللۇغىدا، پىشانە كاۋىكى ياللۇغىدا، بۇرۇن بوشلۇغى ئىشىش-غان ۋە يارىلانغاندا ھەم نېكروزلۇق ئۆپكە ياللۇغىدا كۆرۈلىدۇ. كالا ئاتسېتون كېسىلىگە گىرىپتار بولغاندا، تىنىغىدىن ئاتسېتون پۇرىغى كېلىدۇ، موزاي سالاڭ مەدەدە كېسىلىگە گىرىپتار بولغاندا، تىنىغى ئېغىر پۇرايدۇ.

تىنىقنىڭ پۇرىغىغا ھۆكۈم قىلىشتا، ئۇنىڭ پەيدا بولۇش

مەنبەسىگە دىققەت قىلىش كېرەك. سېسىق پۇراق چىشى ئوقۇ-
رىدىن ياكى چىش كېسەللىكىدىن پەيدا بولغان بىر تىپتىكى
بوشلۇغنى تەكشۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. بۇرۇن يولغا كېسەل
تەككەندە، بىر ياق بۇرۇن بوشلۇغىدىن سېسىق پۇراق كېلىدۇ
غال، كاناي ۋە ئۆپكە كېسەللىكلىرى پەيدا بولغاندا، ئىككى
ياق بۇرۇن بوشلۇغىدىن سېسىق پۇراق كېلىدۇ. پەشە كاۋىكى
ياكى سۆڭەك كېسەللىكلىرى پەيدا بولغاندا، تولاراق يۈز
قىسمىدا ئۆزگىرىش بولىدۇ.

6. كىكرتەك ۋە كانايىنى تەكشۈرۈش: بۇنى تەكشۈرگەندە،
تولاراق تۇتۇپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى بىلەن ئۇنىڭدىكى ئىششىق،
قىزىش ۋە سەزگۈرلۈك ئەھۋاللىرى ئېنىقلىنىدۇ. بەزىدە كىكر-
تەكنى تىڭشاش ئارقىلىق كىكرتەك بوشلۇغى ۋە ئاۋاز قاپقە-
غىنىڭ ئەھۋالى ئېنىقلىنىدۇ.

سۈنئىي يۆتەلدۈرگەندە يۆتىلىش تولاراق يۇقۇرقى نەپەس
يولى، كانايچە، ئۆپكە پۈۋەكچىلىرى ۋە كۆكرەك پەردىسى
قاتارلىقلارنىڭ ياللۇغلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

7. كۆرۈنىدىغان شىلىق پەردىلەرنى تەكشۈرۈش: بۇنى
تەكشۈرۈش ئارقىلىق جۈزئى شىلىق پەردىلەردىكى كېسەللىك
ئۆزگىرىشىنى بايقىغىلى بولىدۇ، شىلىق پەردىلەرنىڭ رەڭگىمۇ
پۈتۈن بەدەننىڭ قان ئايلىنىش ئەھۋالىدىن دېرەك بېرىدۇ.
كۆرۈنىدىغان شىلىق پەردىلەرگە كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى
پەردىسى، ئېغىز بوشلۇغىنىڭ شىلىق پەردىسى، بۇرۇن شىلىق

پەردىسى ۋە جىنسى يول شىللىق پەردىسى قاتارلىقلار كىرىدۇ.
كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسىنى تەكشۈرۈش: تەكشۈ-
رۇشتىن بۇرۇن كۆزنىڭ ھالىتىگە دىققەت قىلىش كېرەك،
ساغلام كالىنىڭ كۆزى نەم، سۈزۈك ۋە پارىراق تۇرىدۇ.
كۆزنىڭ پارىراق تۇرماسلىقى، كۆز ئالمىسىنىڭ ئولتۇرۇشۇپ
كېتىشى تولاراق سوزۇلما جۈدەش كېسىلى ۋە ئېغىر كېسەللىك-
لەردە كۆرۈلىدۇ. ئورگانىزىم سۇسىزلانغاندا، كۆزنىڭ پارىراق-
لىقى ۋە نەملىكى يوقىلىدۇ. تەكشۈرگەندە، ئىككى قول بىلەن
مۈڭگۈزدىن تۇتۇپ، باش بىر تەرەپكە قايرىلسا، كۆز ئېقى
كۆرۈنىدۇ. ياكى بىر قول بىلەن مۈڭگۈزدىن، يەنە بىر قول
بىلەن بۇرۇن پاسىلىدىن تۇتۇپ، باش بىر تەرەپكە قايرىلىدۇ.
زۆرۈر تېپىلغاندا، قول بىلەن قاپاقنى ئېچىپ كۆرسىمۇ بولىدۇ.
كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسىنىڭ نورمال رەڭگى سۇس
ھال رەڭدە بولىدۇ. تەكشۈرگەندە، كەمقانلىق، قان چۈشۈش
ۋە قاناش ئەھۋاللىرىنىڭ بار-يوقلۇغىغا دىققەت قىلىش كېرەك.
شىللىق پەردىلەرنى تەكشۈرۈش پارازىت قۇرۇت كېسەللىكلىرى،
ئاناپىلازموز، پىروپىلازموز ۋە كەمقانلىق كېسەللىكلىرىگە دىئاگ-
نوز قويۇشتا ناھايىتى ئەھمىيەتلىك. شىللىق پەردىلەرنىڭ
ئاقىرىپ كېتىشى جۈدەش خاراكتېرلىق كېسەللىكلەردە ياكى قان
ئىشلەش پائالىيىتىنىڭ ناچارلىغىدىن كېلىپ چىققان كەمقانلىقتا
كۆرۈلىدۇ. ئېغىر دەرىجىدە قان چۈشۈش يۇقۇملۇق كېسەل-
لىكلەر، ئۆپكە ياللۇغى، ئۈچەي ياللۇغى ۋە زەھەرلىنىش قاتار-

لىقلاردا كۆرۈلىدۇ. شىلىق پەردىلەرنىڭ كۆكسىپ قېلىشى، ئاساسەن، نەپەس ئېلىش ۋە قان ئايلىنىش قالايمىغانلىقى، ئوكسىگېن بىلەن كاربوننىڭ ئالمىشىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراپ قاندا كاربون IV ئوكسىدى توپلىنىپ قالغانلىقتىن ۋە ئورگانىزىمغا ئوكسىگېن يېتىشمەسلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ. شىلىق پەردىلەرنىڭ سارغىيىشى سېرىق چۈشۈش ئالامىتى بولۇپ، ئۇ جىگەر ياللۇغى، جىگەر قېتىش، قان يۇقۇلمىنىش خاراكتىرلىق كېسەللىكلەر، پىروپىلازموز، ئاناپىلازموز ۋە باكتېرىيە خاراكتىرلىق قىزىل قان ئاقسىللىق سۈيدۈك كېسەلى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ، بۇ ھال جىنىسى يول شىلىق پەردىسىدە تېخىمۇ روشەن كۆرۈلىدۇ.

ئېغىز بوشلۇغىنى تەكشۈرۈش: بۇ كالىپۇك، چىش مىلكى، تىل، تىل ئاستى ۋە شىلىق پەردىلەرنى تەكشۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنى تەكشۈرگەندە، شىلىق پەردىلەرنىڭ رەڭگىنى تەكشۈرگەندىن باشقا، ئېغىزنىڭ تېمپېراتۇرىسى، نەملىكى، پۇرىغىغا، كۆپۈك ۋە تاشقى جاراھەتنىڭ بار-يوقلۇقىغا، چىشتا غەيرى ئالامەتنىڭ بار-يوقلۇغىغا، تىلدا ئىششىق، قېتىش ۋە گەزنىڭ بار-يوقلۇغىغا دىققەت قىلىش كېرەك. تەكشۈرۈشتىن ئىلگىرى، ئېغىزدىن شال ئېقىش ئەھۋالىغا دىققەت قىلىش كېرەك، چۈنكى كالا ۋاباسى، ئاقسىل، قىزىل ئۆڭگەچ توسىلىپ قېلىش، ئېغىز شىلىق پەردىسى زەخمىلىنىش ۋە ئېغىز ياللۇغى پەيدا بولغاندا شۆلگەي كۆپىيىپ كېتىدۇ.

ئۇنىڭدىن قالسا، بۇرۇن ئەينىگىنىڭ ھالىتىگە دىققەت قىلىش لازىم، نورمال ئەھۋالدا، بۇرۇن ئەينىگىدە سۇ تامچىلىرى كۆپ بولىدۇ، ئۇ سىرتتىن قارىغاندا نەم تۇرىدۇ، قولغا سوغاق بىلەن ئىندۇ. بۇرۇن ئەينىگىنىڭ قۇرغاق ۋە قىزىق بولۇشى، كۆپىنچە، كېسەللىكتىن دېرەك بېرىدۇ.

تەكشۈرگۈچى بىر قولى بىلەن كالنىڭ بۇرۇن پاسىلىدىن تۇتۇپ، يەنە بىر قولى بىلەن كالنىڭ تىلىنى تارتىپ چىقىرىپ، تۆۋەنكى جاغىنى تۆۋەنگە باسسا، كالنىڭ ئېغىز بوشلۇغى ئېچىلىدۇ. تەكشۈرگەندە، بىرىنچىدىن، شىلىق پەردىنىڭ رەڭگىگە، ئۇنىڭدا يارىلىنىش ئەھۋالىنىڭ بار-يوقلۇغىغا دىققەت قىلىش كېرەك، چۈنكى كالا ۋاباسى، جاراھەتلىك ئېغىز ياللۇغى، ئاكتىنومىكوز (نۇر چاچار زامبۇرۇغ كېسىلى) پەيدا بولغاندا، ئېغىز بوشلۇغىنىڭ ئۇ يەر-بۇ يەردە يارا پەيدا بولىدۇ؛ ئىككىنچىدىن، قاپارتمىنىڭ بار-يوقلۇغىغا دىققەت قىلىش لازىم، چۈنكى ئاقسىل ياكى فىزىكىلىق-خىمىيىلىك تەسىرلەردىن ئېغىز ياللۇغلىنىپ، قاپارتما پەيدا بولىدۇ؛ ئۈچىنچىدىن، ئېغىزدا غەيرى نەرسىلەر ۋە زەخمىلىنىشلەرنىڭ بار-يوقلۇغىغا دىققەت قىلىش لازىم. كالا ئاكتىنومىكوز بولغاندا، تىلى ياغاچتەك قېتىپ قالىدۇ، يوغاناپ قالىدۇ.

ئېغىز بوشلۇغىنىڭ رەڭگى ئورگانىزىمنىڭ قان ئايلىنىش ئەھۋالىنىڭ تاشقى ئىپادىسى ھىساپلىنىدۇ. ئېغىز رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كۆزىتىش جۇڭگىيى مال دوختۇرلۇغىدا كېسەللىك-

لەرگە دىئاگنوز قويۇشتىكى ئاساسىي ئۇسۇللارنىڭ بىرى،
شۇنداقلا كېسەلنىڭ ئاقۇتىسىگە ھۆكۈم قىلىشتىكى مۇھىم
ئاساس.

كالىنىڭ ئېغىز رەڭگى ئەتىيازدا خۇددى شاپتۇل چېچىكى
رەڭگىدەك، يازدا نىلۋېر گۈلىنىڭ رەڭگىدەك بولسا، دىمەك،
ھەرقاچان ھال رەڭ بولسا نورمال بولغان بولىدۇ. 4 پەسىلدە
ھاۋا رايى ئۆزگىرىپ تۇرسىمۇ، كالىنىڭ ئېغىزى دائىم نەم،
پارقىراق تۇرىدۇ، رەڭگى شاپتۇل چېچىكى رەڭگىدە بولىدۇ، بۇ
ساغلاملىقنىڭ ئالامىتى.

كالا كېسەل بولغاندا، ئېغىزنىڭ رەڭگى كۆك، قىزىل، ئاق
ۋە قارا بولىدۇ.

يۇقۇرقلارنى تەكشۈرۈش بىلەن بىللە، ئېغىز بوشلۇقىدىن
چىققان پۇراققىمۇ دىققەت قىلىش لازىم، ساغلام كالىنىڭ ئاغ-
زىدىن ئوت-چۆپ پۇرىغىدىن باشقا غەيرى پۇراق كەلمەيدۇ.
ئېغىزنىڭ قىزىق ۋە سېسىق بولۇشى قېرىندا ئىسسىق بارلىغىدىن
بولىدۇ. ئېغىزدىن چىرىگەن نەرسە پۇرىغىنىڭ چىقىشى تىل
جاراھىتى، چىش مىلكىنىڭ چىرىشى ۋە يىمىرىلىشىدىن بولىدۇ.
ئېغىزدىن ئېچىق پۇراقنىڭ چىقىشى قېرىندا ئوزۇق تۇرۇپ
قېلىش ۋە ھەزىم قىلىش ناچارلىغىدىن بولىدۇ.

8. يۇتقۇنچاق ۋە قىزىل ئۆڭگەچنى تەكشۈرۈش: بۇ ئادەتتە
قاراپ ۋە تۇتۇپ تەكشۈرۈلىدۇ. يۇتقۇنچاق كېسەللەنگەندە،
يۇتۇش قىيىنلىشىدۇ، يۆتەل، ئىششىق، ئاغرىش، قىزىش ۋە

نەپەس قىسىلىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بويۇن قىسمىدىكى قىزىل ئۆگگەچكە ئوزۇق ياكى يات نەرسىلەر تۇرۇپ قالغاندا، قىسمەن ئورۇن تومپىيىپ قالىدۇ، قولغا قاتتىق بىلىنىدۇ. قىزىل ئۆگگەچنىڭ توسىلىپ قالغان جايىنى ۋە تارلىشىش دەرىجىسىنى قىزىل ئۆگگەچنى تەكشۈرۈش زونىتى ئارقىلىق تەكشۈرۈشكە بولىدۇ.

9. كۆشەش ۋە كىكىرىشىنى تەكشۈرۈش: كۆشەش ۋە كىكىرىش كۆشگۈچى ھايۋانلارغا خاس قىزىقۇلۇش گىمىنىلىك فۇنكسىيە ھىساپلىنىدۇ. كۆشەش ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ ۋە قات قېرىننىڭ خىزمىتى بىلەن، ئورگانىزىمنىڭ ساغلاملىقى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ، ئۇ كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ۋە پۈتۈن بەدەن پائالىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. كۆشەش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ ئىشلەش ئەھۋالىنى بىلىشكە، شۇنداقلا كېسەللىكنىڭ ئاقىۋىتىگە ھۆكۈم قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ، شۇڭا كىلىنىكىلىق تەكشۈرۈشتە، ئۇنىڭغا سەل قارىماسلىق كېرەك. مال ئوزۇق يىگەندىن كېيىن، ئادەتتە 30~60 مىنۇت ئۆتكەندە كۆشەشكە باشلاپ، بىر سائەتچە كۆشەيدۇ، سۈتلىكسىغا 4~8 قېتىم كۆشەيدۇ. كۆشەشنىڭ كېچى-كېشى ۋە ئاز بولۇشى (سۈتلىكسىغا 1~3 قېتىملا بولۇشى)، قىسقا ھەم جانسىز بولۇشى (ھەر قېتىمدا 5~15 مىنۇت داۋاملىشىشى)، كۆشەۋېتىپ توختاپ قېلىش، ئوزۇقنى چاينىماي ياكى تولۇق چاينىمايلا يۇتۇش ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ خىزمىتىنىڭ ئاجىزلى-

خانلىغىنىڭ ئالامىتى ھىساپلىنىدۇ، بۇ ھال ئالدىنقى قېرىنداشنىڭ بوشىشى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. كۆشمەسىلىك ئالدىنقى قېرىنداش ھەركىتىنىڭ قاتتىق توسالغۇغا ئۇچرىغانلىغىدىن، قېرىنداشىدىكى ماددىلارنىڭ قۇرۇپ قالغانلىغىدىن، ئاشقازان مۇسكولىلىرىنىڭ پالەچلىك ھالىتىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ ھال چوڭ قېرىنداشنىڭ ئۆتكۈر كۆپۈشى، چوڭ قېرىنداش ئۇزۇق توپلىنىش ۋە توققۇز تورلۇق قەۋزىيىتى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. كۆشەشنىڭ ئاستا-ئاستا ئەسلىگە كېلىشى كېسەللىكنىڭ ياخشىلىنىشقا قاراپ يۈز تۇتقانلىغىنىڭ ئىپادىسىدۇر.

كىكىرىش قېرىنداشىكى ماددىلار ئېچىش جەريانىدا ھاسىل بولغان گازلارنىڭ قېرىنداشنىڭ قىسقىرىشى ۋە قوساق تېمىنىڭ قىسقىرىشى ئارقىسىدا ئېغىز-بۇرۇندىن چىقىش ھەرىكىتىدۇر، ساغلام كالا سائىتىگە 20~40 قېتىم كىكىرىدۇ. كېسەللىك يۈز بەرگەندە، كىكىرىك ئازلايدۇ ياكى يوقىلىدۇ، بۇ ھال قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر، ئالدىنقى قېرىنداش كېسەللىكى ۋە قىزىل ئۆڭگەچنىڭ توسىلىپ قېلىشى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ ۋە كۆپ ھاللاردا قوساق كۆپۈپ تۇرىدۇ؛ كىكىرىشنىڭ كۆپىيىشى تولاراق چوڭ قېرىنداشنىڭ گازلىق كۆپۈشىدىن بولىدۇ.

كالىنىڭ قۇسۇشى، كۆپىنچە، قات قېرىنداشنىڭ ئۆتكۈر ياكى سوزۇلما خاراكتېرلىق غىدىقلىنىشىدىن، چوڭ قېرىنداشىكى ماددىلارنىڭ قاتتىق ئېچىشى ۋە قېرىنداش قاپقىغىنىنىڭ تارىيىشى قاتارلىقلاردىن بولىدۇ.

10. بويۇن كۆك تومۇرىنى تەكشۈرۈش: بۇنىڭدا بويۇن كۆك تومۇرىنىڭ سوقۇش ئەھۋالى ۋە كۆپۈش ئالامىتىنىڭ بار- يوقلۇقى تەكشۈرۈلىدۇ. بويۇن كۆك تومۇرىنىڭ كۆپۈشى قان ئايلىنىش توسالغۇغا ئۇچرىغاندا، مەسلەن، يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ ئاجىزلىشىشى، يۈرەك قېپىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. نورمال ئەھۋالدا، بويۇن كۆك تومۇرىنىڭ سوقۇ- ۋاتقانلىغىنى كۆرگىلى بولىدۇ، ئۇنىڭ ئوتتۇرا قىسمىنى بارماق بىلەن باسقاندا، ئۇنىڭ سوقۇشى يوقىلىدۇ. يۈرەكنىڭ ئۈچ قاپقاللىق كىلاپانى تولۇق يېپىلمىغان ئەھۋالدا، بويۇن كۆك تومۇرىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىنى بارماق بىلەن باسقاندا، ئۇنىڭ يۈرەككە يىراق تەرىپىنىڭ سوقۇشى يوقىلىدۇ، يۈرەككە يېقىن تەرىپىنىڭ سوقۇشى بىلىنىپ تۇرىدۇ. ئاساسىي قىزىل تومۇر كىلاپانى تولۇق يېپىلمىغان ئەھۋالدا، بويۇن كۆك تومۇرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن باسقاندا، ئۇنىڭ يۈرەككە يېقىن تەرىپىمۇ، يۈرەككە يىراق تەرىپىمۇ سوقۇپ تۇرىدۇ.

2. سىستېمىلىق تەكشۈرۈش

كىلىنىكىلىق تەكشۈرۈشتە قاراپ تەكشۈرۈش، تۇتۇپ تەك- شۈرۈش، چېكىپ تەكشۈرۈش ۋە تىڭشاپ تەكشۈرۈش ئۇسۇل- لىرى كۆپ قوللىنىلىدۇ.

1. يۈرەكنى تەكشۈرۈش: كالنىڭ يۈرىكى تارراق بولىدۇ، كۆپ قىسمى كۆكرەك بوشلۇغىنىڭ سول يېرىم قىسمىدا، ئالدى قىرى 3-قوۋۇرغا ئارىلىغىدا، كېيىنكى قىرى 5-قوۋۇرغا ئار-

لىغىدا تۇرىدۇ. يۈرەك تېگى كۆكرەك قەپىزىنىڭ $\frac{1}{2}$ ئىگىزلىكىگە توغرا كېلىدىغان تەكشى سىزىقتا، يۈرەك ئۇچى 5-قۇۋۇرغا ئارىلىقى، تۆش سۆڭىكىدىن 5-6 س م يۇقۇرى جايغا جايلاشقان بولىدۇ. يۈرەك 2-قېرىن (تورلۇق قېرىن) غا يېقىن تۇرغاچقا، تورلۇق قېرىندىكى ئۇچلۇق نەرسىلەر ئاسانلا توغرا توساق پەردە (دىئافراگما) دىن ئۆتۈپ يۈرەك قېپىغا سانجىلىپ قېلىپ، يۈرەك مۇسكۇلىنى زىدە قىلىدۇ.

1) يۈرەك سوقۇشنى تەكشۈرۈش: يۈرەك قىسمى تۇتۇپ كۆرۈلسە، يۈرەكنىڭ سوقۇۋاتقانلىقى سۇس بولىنىدۇ. كېسەللىك يۈز بەرگەندە، يۈرەك سوقۇش كۈچىيىدۇ ياكى ئاجىزلايدۇ. يۈرەك سوقۇشنىڭ كۈچىيىشى: بۇ يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىشچانلىقىنىڭ كۈچلۈك بولۇشنىڭ ۋە تىترىتىش دائىرىسىنىڭ چوڭايغانلىقىنىڭ ئىپادىسى، بۇ ھال يۈرەك يوغىناش ۋە قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە كۆرۈلىدۇ. يۈرەك سوقۇشنىڭ ئاجىزلىشىشى: بۇ يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىشچانلىقىنىڭ ئاجىز بولۇشنىڭ ۋە تىترىتىش دائىرىسىنىڭ تارايغانلىقىنىڭ ئىپادىسى، بۇ ھال ئېغىرلاشقاندا ھەتتا يۈرەكنىڭ سوقۇشى قولغا بىلىنمەيدۇ، بۇ ئەھۋال كۆكرەك بوشلۇقىغا سۇيۇقلۇق يىغىلىشنىڭ، ئۆتكۈر زورۇقۇشنىڭ خەتەرلىك باسقۇچىدا ۋە ئۆلۈش ئالدىدا كۆرۈلىدۇ.

2) يۈرەكنى چېكىپ تەكشۈرۈش: بۇنىڭدا يۈرەكنىڭ تۇتۇق ئاۋاز دائىرىسىنى تەكشۈرۈشكە دىققەت قىلىش كېرەك.

كېسەللىك يۈز بەرگەندە، يۈرەكنىڭ تۇتۇق ئاۋاز دائىرىسى چوڭىيىدۇ، كۆپ ھاللاردا، يۇقۇرى، ئارقا تەرەپكە كېڭىيىدۇ، بۇ، ئاساسەن، يۈرەك يوغانىپ كېتىش، كېڭىيىپ كېتىش، يۈرەك قېپىغا سۇ يىغىلىش ۋە كۆكرەك بوشلۇغىغا سۇ يىغىلىش قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. يۈرەكنىڭ تۇتۇق ئاۋاز دائىرىسىنىڭ تارىيىپ كېتىشى، ئاساسەن، ئۆپكە يەللىك ئىششىقى، يۈرەك قېپىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغىدا كۆرۈلىدۇ. يۈرەك قېپىغا گاز يىغىلىپ قالغاندا، چېكىپ تەكشۈرۈلسە كۆپىنچە دۇمباق ئاۋازى چىقىدۇ. يۈرەك دائىرىسىنى چېكىپ تەكشۈرگەندە روشەن ئاغرىقىسىنىش ئىپادىسىنىڭ كۆرۈلۈشى، تىڭشاپ تەكشۈرگەندە شالاقىغان ياكى سۈركەلگەن ئاۋازلارنىڭ ئاڭلىنىشى يۈرەك قېپىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغىنىڭ مۇھىم بەلگىسى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ.

3) يۈرەكنى تىڭشاپ تەكشۈرۈش: يۈرەك دالانچىسىدىن باشلانغان دەۋرىيلىك يۈرەك سوقۇش ئاۋازى نورمال يۈرەك ئاۋازى دىيىلىدۇ. يۈرەك دالانچىسىنىڭ قىسقىرىشى ئارقىسىدا، ئۇ كېڭەيگەن چاغدا ئۇنىڭغا تولۇپ كەتكەن كۆك تومۇر قېنى (ئۆپكە كۆك تومۇر قېنى ۋە ئالدى-كەينىدىكى بوشلۇقلاردىكى كۆك تومۇر قېنى) نىڭ يۈرەك قېرىنچىسىگە كىرگۈزۈلۈشى بىلەن، قېرىنچە قانغا تولىدۇ. يۈرەك قېرىنچىسى قىسقارغاندا، ئۇنىڭدىكى قاننىڭ بېسىمى بىردىنلا ئۆرلەيدۇ، بۇنىڭ كۈچى بىلەن دالانچە-قېرىنچە كىلاپانلىرى يېپىلىپ قالىدۇ-دە، قېرىن-

چىدىكى قان دالانىغا قايتىپ كېتەلمەيدۇ. دېمەك، قاننىڭ دالانىچە-قېرىنچە كىلاپانلىرىغا ئۇرۇلۇشى ۋە يۈرەك قېرىنچىسىنىڭ قىسقىرىشى نەتىجىسىدە چىققان ئاۋاز يۈرەكنىڭ 1-ئاۋازى دېيىلىدۇ. بۇ ئاۋاز تۆۋەن بولىدۇ، ئۇنىڭ سوزۇلىدىغان ۋاقتىمۇ ئۇزۇنراق بولىدۇ، بۇ يۈرەكنىڭ قىسقىرىش ئاۋازى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. يۈرەك قېرىنچىسىنىڭ قىسقىرىشى ئارقىسىدا، ئوڭ قېرىنچىدىكى قان ئۆپكە قىزىل تومۇرى ئارقىلىق ئۆپكەگە بارىدۇ، سول قېرىنچىدىكى قان ئاساسىي قىزىل تومۇر ئارقىلىق قىزىل تومۇرلارغا ئۆتۈپ پۈتۈن بەدەنگە تارايىدۇ. قان يۈرەك قېرىنچىسىدىن چوڭ تومۇرلارغا ئۆتكەندە، قېرىنچىدىكى قان بېسىمى تۆۋەنلەپ، تومۇردىكى قان بېسىمى بىردىنلا ئۆرلەيدۇ، تومۇرغا كىرگەن قاننىڭ ئارقىغا تېپىشى نەتىجىسىدە، يېرىم ئايىسىمان كىلاپان ئېتىلىدۇ، مانا بۇنىڭدىن چىققان ئاۋاز يۈرەكنىڭ 2-ئاۋازى دېيىلىدۇ. بۇ ئاۋاز يۇقۇرى بولىدۇ، ئۇنىڭ سوزۇلىدىغان ۋاقتى قىسقا بولىدۇ، بۇ يۈرەكنىڭ كېرىلىش ئاۋازى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. يۈرەكنى تىگشاپ تەكشۈرگەندە، رېتىملىك ھالدا "بۈك - دۈك، بۈك - دۈك" قىلغان ئىككى ئاۋاز، يەنى يۈرەك ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ.

يۈرەك ئاۋازىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى: بۇنىڭدا ئاساسەن يۈرەك ئاۋازىنىڭ كۈچىيىشى ۋە ئاجىزلىشىشى، يۈرەك ئاۋازىنىڭ بۆلۈنۈشى ۋە تەكرارلىنىشى شۇنىڭدەك يۈرەكنىڭ يات ئاۋازلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

1. يۈرەك ئاۋازىنىڭ كۈچىيىشى ۋە ئاجىزلىشىشى: ئىككىلا يۈرەك ئاۋازىنىڭ كۈچىيىپ كېتىشى يۈرەك مۇسكۇلى قىسقىرىش-چانلىغىنىڭ كۈچىيىپ، قاننىڭ يۈرەك دالانچە-قېرىنچە كىلا-پانلىرىغا ئۇرۇلۇش كۈچىنىڭ ئاشقانلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ. يۈرەك كېرىلگەندە، قاننىڭ قىزىل تومۇر كىلاپانغا ئۇرۇلۇش كۈچى كۈچىيىدۇ، بۇ ھال يۈرەك يوغىناپ كېتىش ۋە قىزىتىلىق كېسەللىكلەرنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە كۆرۈلىدۇ. يالغۇز يۈرەك 1-ئاۋازىنىڭلا كۈچىيىپ كېتىشى يۈرەك مۇسكۇلى قىسقىرىشچانلىغىنىڭ كۈچلۈك بولغانلىغىدىن، قىسپ چىقىرىلغان قان مىقدارىنىڭ كەملىگىدىن بولىدۇ، شۇڭا يۈرەك قىسقارغاندا قاننىڭ دالانچە-قېرىنچە كىلاپانلىرىغا ئۇرۇلۇش كۈچى كۈچىيىدۇ، يۈرەك كېرىلگەندە قاننىڭ قىزىل تومۇر كىلاپانغا تېپىش كۈچى ئاجىزلايدۇ، شۇنىڭ بىلەن 1-ئاۋاز كۈچىيىدۇ، 2-ئاۋاز نىسبى ھالدا ئاجىزلايدۇ، بۇ ھال ئۆتكۈر يۈرەك كېڭىيىش كېسىلى، يۈرەك مۇسكۇلى ياللۇغى ۋە سوزۇلما كەمقانلىق قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. يۈرەك 2-ئاۋازىنىڭ كۈچىيىپ كېتىشى ئىككى قاپقارقىلىق كىلاپاننىڭ تولۇق يېپىلماسلىقى ۋە سوزۇلما بۆرەك ياللۇغى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

يۈرەك ئاۋازىنىڭ ئاجىزلىشىشى، تولاراق ئىككىلا يۈرەك ئاۋازىنىڭ بىرلا ۋاقىتتا ئاجىزلىشىشى يۈرەك ئاجىزلىغىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە، يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ سۈپەت ئۆزگىرىشىدە، ئېغىر كەمقانلىق كېسىلىدە، پۈتۈن بەدەننىڭ ئاجىزلاپ كېتىشىدە

ۋە سرغىتما سۇيۇقلۇقلۇق كۆكرەك پەردىسى ياللۇغى، ھەم يۈرەك قېپىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

II. يۈرەك ئاۋازىنىڭ بۆلۈنۈشى ۋە تەكرارلىنىشى: يۈرەكنى تىڭشاپ تەكشۈرگەندە، يۈرەكنىڭ 1-ئاۋازى ياكى 2-ئاۋازى ئىككىگە بۆلۈنۈپ ”بۈك، بۈك-دۈك“ ياكى ”بۈك-دۈك، دۈك-دۈك“ قىلىپ ئاڭلىنىدۇ، ”بۈك، بۈك“ ياكى ”دۈك، دۈك“ قىلغان ئىككى ئاۋازنىڭ ئارىلىق تاشلىشىنىڭ ئېنىق بولماسلىقى يۈرەك ئاۋازىنىڭ بۆلۈنۈشى دىيىلىدۇ، ئىككى ئاۋازنىڭ ئارىلىق تاشلىشىنىڭ ئېنىق بولۇشى يۈرەك ئاۋازىنىڭ تەكرارلىنىشى دىيىلىدۇ. يۈرەك ئاۋازىنىڭ بۆلۈنۈشى ۋە تەكرارلىنىشى دىئاگنوز قويۇشتا ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشاش ئەھمىيەتكە ئىگە. 1-ئاۋازنىڭ بۆلۈنۈشى ۋە تەكرارلىنىشى يۈرەكنىڭ ئوڭ ۋە سول دالانىچە-قېرىنچە كىلاپانلىرى تەڭ يېپىلمىغانلىقتىن بولىدۇ. 2-ئاۋازنىڭ بۆلۈنۈشى ۋە تەكرارلىنىشى ئاساسىي قىزىل تومۇردىكى ياكى ئۆپكە قىزىل تومۇردىكى قان بېسىمىنىڭ ئۆرلەپ، ئاساسىي قىزىل تومۇر كىلاپانى بىلەن ئۆپكە قىزىل تومۇر كىلاپانى تەڭ يېپىلمىغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ، بۇ ھال بۆرەك ياللۇغى ۋە ئۆپكە پۇۋەكچىلىرىنىڭ سوزۇلما خاراكتىرلىق يەللىك ئىششىغى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

III. يۈرەكنىڭ يات ئاۋازى: يۈرەكنى تىڭشاپ تەكشۈرگەندە، نورمال يۈرەك ئاۋازىغا ئارىلىشىپ ئاڭلىنىدىغان، يۈرەك ئاۋازىغا زادى ئوخشىمايدىغان يات ئاۋازلار يۈرەكنىڭ يات

ئاۋازى دىيىلىدۇ. ئۇ پەيدا بولۇش ئورنىغا قاراپ ئىچكى يات
ئاۋاز ۋە تاشقى يات ئاۋاز دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ.
ئىچكى يات ئاۋاز: يۈرەك كىلاپانلىرىدا پاتومورفولوگىيىلىك
ئۆزگىرىش ياكى فۇنكىتسىيە توسقۇنلۇغى پەيدا بولۇش، قان
تەركۈنىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە قاننىڭ ئېقىش سۈرئىتىنىڭ كۈچىيىشى
قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن، يۈرەك ياكى چوڭ تومۇرلاردا قاننىڭ
قاينام ھەرىكىتى پەيدا بولىدۇ، بۇ ھەرىكەت يۈرەك تېمى ياكى
چوڭ تومۇر تېمىنى تەۋرىتىپ يات ئاۋازلارنى پەيدا قىلىدۇ،
مانا بۇ ئىچكى يات ئاۋاز دىيىلىدۇ. ئىچكى يات ئاۋاز پەيدا
بولۇش سەۋىيىگە ئاساسەن ئورگان خاراكتىرلىق يات ئاۋاز ۋە
فۇنكىتسىيە خاراكتىرلىق يات ئاۋاز دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ.
يۈرەك كىلاپاننىڭ قېلىنلىشىشى، قورۇلۇشى ياكى يېپىشىپ
قېلىشى تۈپەيلىدىن، كىلاپان تولۇق يېپىلمايدۇ ياكى كىلاپان
تۆشۈكى تارىيىپ قالىدۇ، يۈرەك ھەرىكەتلىگەندە، قان تولۇق
يېپىلمىغان كىلاپان يۈچۈقلىرىدىن ئۆتكەندە پەيدا بولىدىغان
تەنۇر ئېقىم چىقارغان، ياكى قان تارايغان كىلاپان تۆشۈگەدىن
يۈرەك بوشلۇغى ياكى چوڭ تومۇرلارغا كىرگەندە پەيدا بولىدۇ.
قان قاينام ھەرىكىتى چىقارغان يات ئاۋاز ئورگان خاراكتىرلىق
يات ئاۋاز دىيىلىدۇ. بۇنداق ئاۋازنىڭ خاراكتىرى ئاسانلىقچە
ئۆزگەرمەيدۇ، ئۇ ئۇزاققىچە ساقلىنىدۇ، خۇددى ھەرە تارتقان-
دەك، ئىسقىرتقان دەك، يېقىمىسىز، قوپال ئاڭلىنىدۇ. كېسەل مالنى
ھەيدەپ ھەرىكەتلىگەندە ياكى ئۇنىڭغا يۈرەك كۈچەيتكۈچى

دورنى بەرگەندە، يۈرەكنىڭ يات ئاۋازى كۆرۈنەرلىك ھالدا كۈچىيىدۇ. يات ئاۋازنى پەيدا بولۇش ۋاقتىغا ئاساسەن قىسقىرىش ۋاقتىدىكى يات ئاۋاز ۋە كېرىلىش ۋاقتىدىكى يات ئاۋاز دەپ ئىككىگە ئايرىشۇ مۇمكىن.

قىسقىرىش ۋاقتىدىكى يات ئاۋاز يۈرەك قېرىنچىسى قىسقارغان ۋاقىتتا يەنى 1-ئاۋازغا ئۆلىنىپلا پەيدا بولىدۇ، بۇ، ئاساسەن، يۈرەكنىڭ ئوڭ-سول دالانچە-قېرىنچە كىلاپانلىرىنىڭ تولۇق يېپىلماسلىقىدا ياكى ئاساسىي قىزىل تومۇر كىلاپانى ۋە ئۆپكە قىزىل تومۇرى كىلاپانى تۆشۈكلىرىنىڭ تارىيىپ قېلىشىدا كۆرۈلىدۇ.

يۈرەك دالانچە-قېرىنچە كىلاپانلىرى تولۇق يېپىلماسلىقتىن چىقىدىغان قىسقىرىش ۋاقتىدىكى يات ئاۋاز 1-ئاۋازغا ئۆلىنىپلا، ياكى 1-ئاۋازنى بېسىپ كېتىپ پەيدا بولىدۇ. ئۇ بىرقەدەر يۇمشاق بولىدۇ، خۇددى "پۇ" دەپ قوپال پۇدىگەندەك ئاڭلىنىدۇ. تىڭشاپ تەكشۈرگەندە "دۈپ-پۇ-بۇك" قىلغان، ياكى "پۇ-بۇك" قىلغان ئاۋازغا ئوخشاشراق ئاڭلىنىدۇ.

ئاساسىي قىزىل تومۇر كىلاپانى ۋە ئۆپكە قىزىل تومۇرى كىلاپانى تۆشۈكلىرىنىڭ تارىيىشىدىن چىقىدىغان قىسقىرىش ۋاقتىدىكى يات ئاۋاز يۈرەكنىڭ 1-ئاۋازىدىن كېيىن، 2-ئاۋازى چىقىشتىن بۇرۇن پەيدا بولىدۇ. ئۇ قوپالراق ۋە يۇقۇرى بولىدۇ، ھەر تارتقاندا ياكى سۇ تار سۇڭگۈچتىن ئېتىلىپ چىققاندا چىققان ئاۋازدەك ئاڭلىنىدۇ، تىڭشاپ تەكشۈرگەندە "دۈپ-پۇ-بۇك"

دۇك“ قىلغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. ئاساسىي قىزىل تومۇر كىلاپانى تۆشۈڭى تارايغان كېسەل مال ئاسانلا ئايلىنىپ كېتىدۇ، ماغدۇ-رىدىن كېتىدۇ. ئۆپكە قىزىل تومۇرى كىلاپانى تۆشۈڭى تارايغاندا، ئۆپكەگە كېلىدىغان قان يېتەرلىك بولماي، ئۆپكەدىكى قان بېسىمى تۆۋەنلەپ، ئۆپكەدە قان تۇرۇپ قېلىش بىلەن نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىدۇ.

كېرىلىش ۋاقتىدىكى يات ئاۋاز يۈرەك قېرىنچىسى كېرىلگەندە 2-ئاۋازغا ئۇلىنىپلا، ياكى 2-ئاۋازدىن كېيىن ئاڭلىنىدۇ، بۇ تولاراق ئاساسىي قىزىل تومۇر كىلاپانى ۋە ئۆپكە قىزىل تومۇرى كىلاپانىنىڭ تولۇق يېپىلماسلىقىدا، ياكى ئۆك ۋە سول دالانىچە-قېرىنچە كىلاپانىلىرى تۆشۈگىنىڭ تارىيىشىدا كۆرۈلىدۇ. ئاساسىي قىزىل تومۇر كىلاپانى ۋە ئۆپكە قىزىل تومۇرى كىلاپانى تولۇق يېپىلماسلىقتىن چىقىدىغان كېرىلىش ۋاقتىدىكى يات ئاۋاز 2-ئاۋازغا ئۇلىنىپلا، ياكى 2-ئاۋازنى بېسىپ كېتىپ پەيدا بولىدۇ. ئۇ بىرقەدەر يۇمشاق بولىدۇ، ”پۇ“ دەپ قوپال پۈدگەندەك ئاڭلىنىدۇ، تىڭشاپ تەكشۈرگەندە ”دۈپ — بۈك — پۇ“ قىلغان، ياكى ”دۈپ — پۇ“ قىلغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ.

يۈرەكنىڭ دالانىچە-قېرىنچە كىلاپانىلىرى تۆشۈگىنىڭ تاردىمىشىدىن چىقىدىغان كېرىلىش ۋاقتىدىكى يات ئاۋاز 2-ئاۋازدىن كېيىن، 1-ئاۋاز چىقىشتىن بۇرۇن ناھايىتى ئېنىق ئاڭلىنىدۇ. ئۇ قوپالراق ھەم قاتتىق بولغان قىسىلما ئاۋاز بولۇپ، خۇددى ھەرە تارتقاندا ياكى ئوقيا ئاتقاندا چىققان ئاۋازدەك ئاڭلىنىدۇ.

كىلاپان پەردىسى ياكى كىلاپان تۆشۈگىدە پاتومورفولوگىيەلىك ئۆزگىرىش بولمىغان ئەھۋالدا پەيدا بولغان يات ئاۋاز يۈرەكنىڭ فۇنكسىيە خاراكتىرلىق ئىچكى يات ئاۋازى دىيىلىدۇ. بۇنداق ئاۋاز قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردە يۈرەك قېرىنچىسىنىڭ ئىمىزىكىسىمان مۇسكۇلىنىڭ بوشىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ، شۇنداقلا پىروپىلازموز كېسەلىگە ئوخشاش قان كېسەللىكلىرىدە قاننىڭ سۇيۇلۇپ كېتىشى، ئېقىش سۈرئىتىنىڭ تېزلىشى تۈپەيلىدىن كىلاپان ۋە كىلاپان تۆشۈگىنىڭ دىرىلىشى نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدۇ، شۇڭا ئۇ كەمتەنلىقتىن بولىدىغان يات ئاۋاز دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

فۇنكسىيە خاراكتىرلىق ئىچكى يات ئاۋازنىڭ ئورنى، كۈچلۈكلۈكى مۇقىم بولمايدۇ، داۋالغاندىن كېيىن، يۈرەك خىزمىتىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە ئەگىشىپ، ئۇ ئاجىزلىشىدۇ ياكى يوقىلىدۇ. بۇنداق ئاۋاز ئاساسەن ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتىرلىق زورۇقۇش، يۈرەك مادارسىزلىقى، يۈرەك مۇسكۇلى ياللۇغى ۋە قاتتىق قوساق ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەردە كۆرۈلىدۇ.

تاشقى يات ئاۋاز: بۇ يۈرەكنىڭ تاشقى پەردىسى بىلەن يۈرەك قېپىنىڭ ئىچكى پەردىسىنىڭ ئۆزئارا سۈركىلىشىدىن، شۇنداقلا يۈرەك قېپىنىڭ تاشقى پەردىسى بىلەن كۆكرەك پەردىسىنىڭ ئۆزئارا سۈركىلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يۈرەك قېپىنىڭ تاشقى پەردىسى بىلەن كۆكرەك پەردىسى ئوتتۇرىسىدە

دىكى سۈركىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان يات ئاۋاز، كۆكرەك پەردىسى ياللۇغلىنىش ياكى كۆكرەك پەردىسى بىلەن يۈرەك قېپىنىڭ تاشقى پەردىسى بىرلا ۋاقىتتا ياللۇغلىنىش، يۈرەك قېپى تاشقى پەردىسىنىڭ يۈزلىرىگە ۋە يۈرەككە تېگىپ تۇرىدۇ. ھال كۆكرەك پەردىسىنىڭ يۈزلىرىگە تاللىق ماددىلار ئورنىتىلىش سەۋىيىسىدىن، يۈرەك سوققاندا سۈركىلىش پەيدا بولۇش نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدۇ، بۇ ھال كۆكرەك پەردىسى ياللۇغ غىدا كۆرۈلىدۇ. يۈرەك قېپى ياللۇغلىغاندا ياكى يۈرەك قېپىنىڭ قان ئايلىنىشى توسالغۇغا ئۇچرىغاندا ۋە سرغىتىملىق كېسەللىكلەردە يۈرەك قېپىغا كۆپلەپ سرغىتما سۇيۇقلۇق يىغىۋالىدۇ. دە، بۇ سۇيۇقلۇق يۈرەك سوققاندا شالداقشپ يات ئاۋاز پەيدا قىلىدۇ، بۇنداق ئاۋاز شالداقشش ئاۋازى دىيىلىدۇ. ئۇ خۇددى يېرىم بوتۇلكا سۈنى چاپىغاندا، ياكى گىرىلىكغا سۈنى يىرىم ئېلىپ چاپىغاندا چىققان ئاۋازدەك ئاڭلىنىدۇ. بۇنداق ئاۋاز يۈرەكنىڭ سوقۇشى بىلەن بىردەك بولۇش، شۇنىڭ بىلەن تەڭ يۈرەكنىڭ ھەر ئىككى ئاۋازى يىراقتىن كېلىۋاتقاندا بوش ئاڭلىنىش، يۈرەكنىڭ تۇتۇق ئاۋاز رايونى كېڭىيىش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. بۇ ھال يۈرەك قېپى ياللۇغلىنىش ۋە يۈرەك قېپىغا سۇيۇقلۇق يىغىلىش قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. يۈرەك قېپى ياللۇغلىغاندا، يۈرەك قېپى ئىچكى پەردىسىنىڭ يۈزلىرىگىمۇ، يۈرەك تاشقى پەردىسىنىڭ يۈزلىرىگىمۇ تاللىق ماددىلار ئورنىتىۋالىدۇ. دە، بۇ ئىككى يۈز يىرىكىلىشپ

قالدۇ، يۈرەك قىسقارغاندا بۇ ئىككى يىرنىڭ يۈزىنىڭ ئۆزئارا سۈركىلىشىدىن پەيدا بولىدىغان يات ئاۋاز يۈرەك قېيىنىنىڭ سۈركىلىش ئاۋازى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ خۇددى چاچنى ئوۋۇلىدىغاندا، قىچشقان يەرنى تاتىلىغاندا ۋە كۆن ئەيلىگەندە چىققان ئاۋازدەك ئاڭلىنىدۇ ۋە ناھايىتى يېقىن يەردىن كېلىۋاتقاندا ئاڭلىنىدۇ، كۆپىنچە، يۈرەكنىڭ سوقۇشى بىلەن بىردەك بولىدۇ، يۈرەك مۇسكۇلى خىزمىتىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ روشەنلىشىپ بارىدۇ. يۈرەكنىڭ سوقۇشى بىلەن بىردەك بولمىغان، نەپەس ھەرىكىتىگە ئەگىشىپ پەيدا بولغان سۈركىلىش ئاۋازى ئاڭلانسا، بۇنى يۈرەك قېيىنىنىڭ سىرتىغا تالالىق ماددىلارنىڭ ئورنىتىۋالغانلىقىدىن بولغان دەپ قاراش كېرەك.

IV. يۈرەك ئاۋازىنىڭ تۇتۇلۇشى: ساغلام كالىنىڭ 1-ۋە 2-يۈرەك ئاۋازى ئېنىق ۋە ئايرىم-ئايرىم ئاڭلىنىدۇ، يۈرەك سوقۇش كۈچەيگەن ياكى يۈرەكنىڭ خىزمىتى يەتتىكى دەرىجىدە ناچارلاشقاندا، يۈرەكنىڭ ئاۋازى ئېنىق ئاڭلانمايدۇ، بۇ يۈرەك ئاۋازىنىڭ تۇتۇلۇشى دېيىلىدۇ. ئادەتتە 1-ياكى 2-يۈرەك ئاۋازى تۇتۇلۇپ قالىدۇ. بۇ ھال تولاراق قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنىڭ دەسلەۋىدە، ئوزۇقلىنىشتىن بولغان ئاجىزلىق، يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ ئوزۇقلۇق يېتىشمەي ئۆزگىرىپ قېلىشى ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىق، يۈرەك ئاجىزلىقى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

V. يۈرەك سوقۇشنىڭ رېتىمى: يۈرەكنىڭ رېتىملىك سوقۇپ تۇرۇشى يۈرەكنىڭ رېتىمى دېيىلىدۇ. ساغلام كالىنىڭ

يۈرگەننىڭ سوقۇشى رىتىملىك بولىدۇ، ھەر قېتىملىق سوقۇشى ۋە ئاۋازنىڭ كۈچلۈكلۈكى بىردەك بولىدۇ، يۈرەك سوقۇشىنىڭ ھەر قېتىملىق ئارىلىق تاشلاش ۋاقتى ئوخشاش بولىدۇ. يۈرەكنى تىڭشاپ تەكشۈرگەندە، يۈرەك ئاۋازىنىڭ بىر كۈچلۈك، بىر بوش بولۇشى، يۈرەك سوقۇشىنىڭ ئارىلىق تاشلىشىنىڭ بىردەك بولماسلىقى، تېز-ئاستىلىغىنىڭ تەكشى بولماسلىقى ۋە ئۇزۇلۇپ قېلىشى قاتارلىقلار يۈرەك سوقۇشىنىڭ رىتىمىزلىكى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ، ئاساسەن، ھەر خىل كېسەللىكلەر تۈپەيلىدىن يۈرەكنىڭ يەتكۈزۈش ۋە قىسقىرىش خىزمىتىنىڭ توسقۇن-لىققا ئۇچرىغانلىغىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

2. كۆكرەك قىسمىنى تەكشۈرۈش:

(1) تۇتۇپ تەكشۈرۈش: كالنىڭ كۆكرەك قىسمى سېزىم-چان بولۇپ كېتىش، كالنىڭ تىنىم تاپماي كېتىشى تولراق كۆكرەك پەردىسى يالغۇلانغاندا ۋە قوۋۇرغىلار سۇنغاندا كۆرۈلىدۇ. راخت كېسىلىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدا، بەزىدە قوۋۇرغىنىڭ كۆمۈرچەككە تۇتاشقان يېرىدە تەشۋىسسىمان ئىش-شىق ياكى شەكىل ئۆزگىرىشى بارلىقى بىلىنىدۇ.

(2) چېكىپ تەكشۈرۈش: چېكىپ تەكشۈرگەندە ئاڭلانغان ئاۋازنىڭ خۇسۇسىيىتىگە قاراپ، ئۆپكە پاسىلىنىڭ چوڭ-كىچىك-لىكىگە ۋە ئۆپكەدە كېسەللىك ئۆزگىرىشىنىڭ بار-يوقلۇغىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ. كالا ئۆپكەسىنى چېكىپ تەكشۈرۈشنىڭ نورمال دائىرىسى ئاتنىڭكىگە ئوخشىمايدۇ، يەنى ئۇ ئۆپكەنى


چېكىپ تەكشۈرۈش دائىرىسى ۋە مۇرە ئالدىنى چېكىپ تەكشۈرۈش دائىرىسى دىگەن ئىككى قىسىمغا بۆلۈندى.

ئۆپكىنى چېكىپ تەكشۈرۈش دائىرىسى: يۇقۇرقى چېگىرىسى تاغاقنىڭ كەينى بۇرجىگىدىن يانپاش بوغۇمىنىڭ ئىچكى بۇرجىگىگىچە تۈز چۈشۈرۈلگەن سىزىقچىچە؛ ئالدى چېگىرىسى تاغاقنىڭ كەينى بۇرجىگىدىن يەرگە تىك چۈشۈرۈلگەن سىزىقچىچە؛ كەينى چېگىرىسى يايىسمان بولىدۇ، يەنى ئۇ 12-قوۋۇرغىنىڭ ئۈچىدىن باشلىنىپ ئالدى ئاستىغا قاراپ چۈشۈپ، 11-قوۋۇرغىدا يانپاش بوغۇمى تەكشى سىزىغى بىلەن كېسىشىدۇ، 8-قوۋۇرغىدا مۇرە بوغۇمى تەكشى سىزىغى بىلەن كېسىشىدۇ، ئاخىرى 4-قوۋۇرغىنىڭ ئاستىغىچە بارىدۇ.

مۇرە ئالدىنى چېكىپ تەكشۈرۈش دائىرىسى: بۇ كالىنىڭ ئورۇق-سېمىزلىكىگە قاراپ تۈرلۈك بولىدۇ. سېمىز بۇقنىڭ مۇرە بوغۇمىنىڭ ئۈستىدىن تاغاقنىڭ ئالدى قىرغىچىچە، يەنى 2-3 بارماق كەڭلىكتە بولىدۇ. ئورۇق سىيىرنىڭ مۇرە ئالدىنى چېكىپ تەكشۈرۈش دائىرىسىنىڭ يۇقۇرىسى كەڭ، تۆۋىنى تار بولىدۇ، يەنى ئۇ خۇددى قۇش بېشىغا ئوخشايدۇ، يۇقۇرقى چېگىرىسى تاغاق قىرغىچىچە، تۆۋەن ئۇچى بويۇن ئېرىغى قىسمىغىچە بولىدۇ. مۇرە ئالدىنى چېكىپ تەكشۈرۈش دائىرىسى كالىلارنىڭ ئالا ئۆپكە ۋە تۈپىر كۈليوز كېسەللىكلىرىنى تەكشۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

ئۆپكىنى چېكىپ تەكشۈرۈش دائىرىسى كېسەللىك يۈز

بەرگەن ئەھۋاللاردا ئۆزگىرىپ، ياكى كېڭىيىپ كېتىدۇ، ياكى كىچىكلەپ كېتىدۇ، بۇ ھال ئۆپكە يەللىك ئىششىغى ۋە جارا-ھەتلىك يۈرەك قېپى ياللۇغى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. ئۆپكەنى چېكىپ تەكشۈرۈشنىڭ نورمال دائىرىسىدىن ساز (ئوچۇق) ئاۋاز چىقىدۇ، ئۆپكە ياللۇغى يۈز بەرگەندە بولسا، ئۇنىڭدىن دۈمباق ئاۋازى ۋە بوغۇق ئاۋاز چىقىدۇ.



9-رەسىم كالىنىڭ ئۆپكەسىنى چېكىپ تەكشۈرۈش دائىرىسى

3) تىڭشاپ تەكشۈرۈش: كۆكرەك قىسمىنى تىڭشاپ تەكشۈرگەندە، ئادەتتە ئۆپكە دائىرىسىنىڭ يۇقۇرى $\frac{1}{3}$ دىن باشلاپ، ئالدىدىن كەينىگە تەدرىجى تەكشۈرۈلىدۇ، ئاندىن ئوتتۇرا $\frac{1}{3}$ قىسمى، ئاخىرىدا تۆۋەن $\frac{1}{3}$ قىسمى تەكشۈرۈلىدۇ. ھەر بىر قىسمىنى تەكشۈرگەندە، كالا 2~3 قېتىم نەپەس ئال-غىچە تىڭشاپ كۆرۈش، ئاندىن ئورۇن يۆتكەپ تىڭشاپ، تەكشۈرۈش دائىرىسى تۈگىگىچە تىڭشاپ چىقىش كېرەك. بۇ جەرياندا غەيرى نورمال ئاۋاز بىلىنسە، ئۇنى ئەتراپىدىكى ۋە قارشى يېقىدىكى ئورۇننىڭ ئاۋازىغا سېلىشتۇرۇپ تىڭشاپ

بېقىش كېرەك.

ئۆيىنىڭ نورمال ئاۋازى پۈۋەكچىلەرنىڭ ئاۋازى ۋە كانايچىلەرنىڭ ئاۋازىدىن ئىبارەت ئىككى خىل بولىدۇ. پۈۋەكچىلەرنىڭ ئاۋازى — نەپەس ئالغاندا ھاۋانىڭ ئۆپكە پۈۋەكچىلىرىنىڭ تار تۆشۈكلىرىدىن كىرىشى بىلەن، پۈۋەكچىلەر تېمىنىڭ چىڭ قىلىشى، ھاۋا ئېقىمىنىڭ پۈۋەكچىلەر تېمىغا سوقۇلۇپ قاينام ھەرىكىتى پەيدا قىلىشى، بۇنىڭ پۈۋەكچىلەر تېمىنى تىترىتىشىدىن ئىبارەت 3 خىل ئامىلدىن ھاسىل بولىدىغان “قۇق” دېگەن ئاۋازغا ئوخشايدىغان ئاۋاز. نەپەس چىقارغاندا ئۆپكە پۈۋەكچىلىرىنىڭ تار تۆشۈكلىرىدىن ھاۋا سىقىلىپ چىقىش بىلەن، ئۇششاق كانايچىلەرنىڭ تېمى بوش تىترەپ قىسقا ھەم ئاجىز ئاۋاز چىقىدۇ. شۇڭا، پۈۋەكچە ئاۋازىنى تىڭشاپ كۆرگەندە، نەپەس ئالغان ۋاقىتتىكى ئاۋاز ئەڭ روشەن ئاڭلىنىدۇ، ئۇنىڭ داۋاملىشىش ۋاقتى ئۇزۇن بولىدۇ، ئۇ تەدرىجى كۈچىيىپ بارىدۇ؛ نەپەس چىقارغان ۋاقىتتىكى ئاۋاز بولسا قىسقا ھەم ئاجىز بولىدۇ، بەزىدە روشەن بولمايدۇ، ئاخىرىنى ئاڭلىغىلى بولمايدۇ، تەدرىجى ئاجىزلىشىپ بارىدۇ. كانايچىلەرنىڭ ئاۋازى ھاۋا كىكرتەك، كاناي ۋە كانايچىلەردىن ئۆتكەندە ھاسىل بولىدىغان بىر خىل نەپەس ئاۋازىدۇر، ئۇ خۇددى “خىخ” دېگەن ئاۋازغا ئوخشايدۇ، نەپەس چىقارغاندا روشەن، نەپەس ئالغاندا ئاجىز ھەتتا ئاڭلىغىلى بولمىغۇدەك دەرىجىدە بولىدۇ. نورمال ئەھۋالدا، 3-ۋە 4-قوۋۇرغىلارنىڭ ئارىلىغىدىن،

مۇرە بوغۇمى تۈز سىزىغىنىڭ ئاستىدىن بوش ۋە ئارىلاش كانايچە ئاۋازى (پۈۋەكچە ئاۋازى ئارىلاشقان كانايچە ئاۋازى) ئاڭلىنىدۇ، ئەگەر بۇنداق ئاۋاز باشقا جايدىن ئاڭلانسا، ئۇ كېسەللىك ئالامىتى ھىساپلىنىدۇ، يەنى ئۇ ئۆپكەدە، كۆكرەك پەردىسىدە ئېغىر كېسەللىك بارلىغىنىڭ مۇھىم بەلگىسىدۇر.

كالا كېسەل بولغاندا، بولۇپمۇ نەپەس مەركىزىنىڭ خىزمىتى توسالغۇغا ئۇچرىغاندا ۋە ئۆپكەدە پاتولوگىيىلىك ئۆزگىرىش يۈز بەرگەندە، فىزىئولوگىيىلىك ۋە پاتولوگىيىلىك جەريانلار- نىڭ بىر بىرىگە ئايلىنىشى سەۋىيىسىدىن، نورمال ئۆپكە ئاۋازىدا كېسەللىك ئۆزگىرىشى پەيدا بولىدۇ، شۇڭا كىلىنىكىدا پۈۋەكچە ئاۋازىنىڭ كۈچىيىشى، ئاجىزلىشىشى ياكى يوقىلىشى كۆپ ئۇچرايدۇ.

كۈچىيىشى: ئومۇمىي يۈزلۈك كۈچەيگەندە، ئۆپكەنىڭ ھەرقانداق يېرىدىن بىر خىل كۈچلۈك "فۇ" دىگەن ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. بۇنداق ئەھۋال ئۆپكەنىڭ ئۆزىدە كېسەللىك پەيدا بولغانلىغىدىن ئەمەس، نەپەس مەركىزىنىڭ قوزغىلىشىدىن بولىدۇ. بۇ ھال قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنىڭ دەسلەپتە كۆرۈلىدۇ. "فۇ" دىگەن ئاۋازنىڭ قوپاللاشقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا "خىخ" دىگەن ئاۋازنىڭ ئارىلاشقانلىقى ئۆپكە پۈۋەكچە ئاۋازى- نىڭ بوملىشىشى دەپ ئاتىلىدۇ، بۇ ھال كانايچە ياللۇغىنىڭ، كانايچە- ئۆپكە ياللۇغىنىڭ دەسلەپتە كۆرۈلىدۇ.

قىسمەن كۈچىيىش ئۆپكەنىڭ مەلۇم ئورنىدىكى پۈۋەكچە

ئاۋازىنىڭ كۈچەيگەنلىگىدىن بولىدۇ، بۇ ھال كانايچە - ئۆپكە ياللۇغى، چوڭ ياپراقچە خاراكتىرلىق ئۆپكە ياللۇغى قاتارلىق لاردا كۆرۈلىدۇ.

ئاجىزلىشىشى: پۈۋەكچىلەرنى سىرغىتىملار نەملەشتۈرگەندە پۈۋەكچىلەر تېمىنىڭ ئەۋرىشىملىكى ئاجىزلاشقاندا ۋە ئۇششاق كانايچىلەرنىڭ شىللىق پەردىلىرى ئىششىغاندا ھەم ئۇ تىقىلىپ قالغاندا، پۈۋەكچىلەرگە بارىدىغان ھاۋا ئازىيىپ كېتىدۇ، شۇڭا ئۆپكەنى تىگىشىغاندا پۈۋەكچە ئاۋازى ئاجىز ئاڭلىنىدۇ. بۇ ھال ئۆپكە ياللۇغى، سوزۇلما ئۆپكە يەللىك ئىششىغى، ئۇششاق كانايچە ياللۇغى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

يوقىلىشى: بۇ ھال پۈۋەكچىلەر بىلەن ئۇششاق كانايچىلەر تامامەن توسىلىپ قېلىپ، پۈۋەكچىلەرگە ھاۋا بارالمىغانلىقتىن بولىدۇ. بۇ كەڭ كۆلەملىك، چوڭ ياپراقچە خاراكتىرلىق ئۆپكە ياللۇغىنىڭ جىگەرسىمان ئۆزگىرىش مەزگىلىدە يۈز بېرىدۇ.

خىرىلداش ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك خاراكتىرلىق تىنىق بولۇپ، ئۇ كانايچە ياللۇغىنىڭ نۇقتىلىق ئالامىتى ھىساپلىنىدۇ ۋە كانايچە شىللىق پەردىسىنىڭ ياللۇغلانغانلىغىدىن، ئىششىغانلىغىدىن ياكى ئۇنىڭدا ئاجراتمىلارنىڭ بارلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئۇ خۇسۇسىيەتلىك ئاساسەن قۇرۇق خىرىلداش ۋە ھۆل خىرىلداش دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ. كانايچە شىللىق پەردىسى ياللۇغلىنىپ ئىششىغاندا، ئۇنىڭ يوللىرى تارايغاندا، تىنىق راۋان ئۆتۈشۈپ تۇرمىغاندا، ياكى ئاز مىقداردىكى

شلىمىش ئاجراتمىلار كانايچە تېمىغا چاپلىشىۋالغاندا، نەپەس ئالغاندا كىرگەن ھاۋانىڭ تۇرۇلۇشى بىلەن كانايچە تېمى چىڭقىلىپ تىترەيدۇ، مانا مۇشۇنداق ئەھۋاللاردا كۆپىنچە قۇرۇق خىرىلداش كېلىپ چىقىدۇ. ئۇ گۈدۈك ئاۋازىدەك، پارتلاش ئاۋازىدەك، ئىسقىرتقاندىك، ھەرە غۇڭۇلىدىغاندىك ياكى گىژىلىدىغاندىك ئاڭلىنىدۇ. نەپەس ئالغاندىمۇ، نەپەس چىقارغاندىمۇ ئۇنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ. بۇنداق ئاۋاز كانايچە ياللۇغى ۋە ئارىلىق ماددا خاراكىتىرلىق ئۆپكە ياللۇغى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. ھۆل خىرىلداش كانايچىلەردە كۆپلەپ سىرغىما سۇيۇقلۇق يىغىلىپ قالغاندا، نەپەس ئالغاندا كىرگەن ھاۋا ئۇنىڭدىن ئۆتكەندە سۇ كۆپۈكلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشى ۋە ئۇنىڭ ھاۋا تېمىسى بىلەن بىللە پارچىلىنىشى ھەم يۆتكىلىشىدىن ھاسىل بولىدۇ. ئۇ خۇددى كۆپۈكچىلەر پارچىلانغاندىك، پورۇقشىغاندىك ياكى غار-غار قىلغاندىك ئاڭلىنىدۇ. ئۇ نەپەس ئېلىشنىڭ ئاخىرىدا كۈچلۈكرەك ئاڭلىنىدۇ، قاتتىق يۆتەلگەندە ۋاقىتلىق يوقىلىدۇ. بۇنداق ئاۋاز كانايچە-ئۆپكە ياللۇغى، ئۆپكە سۇلۇق ئىششىغى ۋە ئۆپكەدىن قان چىقىش قاتارلىق كېسەللىكلەردە كۆرۈلىدۇ.

شىتىرلاش ئاۋازى خۇددى قۇلاق تۈۋىدە چاپنى ئۇۋۇلىغاندا چىققان ئاۋازدەك ئىنچىكە، تەكشى ئاڭلىنىدۇ. ئۇ نەپەس ئېلىشنىڭ ئاخىرىدا ئەڭ ئېنىق ئاڭلىنىدۇ، نەپەس چىقارغاندا ئاڭلانمايدۇ. بۇنداق ئاۋاز ئۇششاق كانايچىلەر ياكى ئۆپكە

پۈۋەكچىلىرى تېمىنى شىلىشىق سۇيۇقلۇق چاپلاشتۇرۇپ قويى-
غاندا، نەپەس ئالغاندا پۈۋەكچىلەرگە كىرگەن ھاۋانىڭ چاپلى-
شىپ قالغان ئۇششاق كانايچىلەر ياكى ئۆپكە پۈۋەكچىلىرى
تېمىنى بىردىنلا ئاجرىتىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ ھال كىچىك
ياپراقچە خاراكتىرلىق ئۆپكە ياللۇغىنىڭ، چوڭ ياپراقچە خاراكتىر-
لىق ئۆپكە ياللۇغىنىڭ قان چۈشۈش باسقۇچىدا، ئېرىش
باسقۇچىدا ۋە ئۆپكە سۇلۇق ئىشىشىدا كۆرۈلىدۇ.


كۆكرەك پەردىسىنىڭ سۈركىلىش ئاۋازى خۇددى قولىنى
قۇلاققا يېقىن تۇتۇپ بىر بىرىگە سۈركىگەندە چىققان ئاۋاز-
دەك ئاڭلىنىدۇ. نەپەس ئالغاندىمۇ، نەپەس چىقارغاندىمۇ ئۇنى
ئاڭلىغىلى بولىدۇ. كۆكرەك پەردىسى ياللۇغلىغاندا، تالالىق
سىرغىتىملارنىڭ تۇرۇپ قېلىشىدىن كۆكرەك پەردىسى قېلىنلاپ
يىرىكلىشىدۇ، شۇڭا نەپەسكە ئەگىشىپ، يىرىكلىككەن كۆكرەك
پەردىلىرىنىڭ ئۆزئارا سۈركىلىشىدىن سۈركىلىش ئاۋازى
كېلىپ چىقىدۇ. بۇ ھال تالالىق كۆكرەك پەردىسى ياللۇغى
ياكى كۆكرەك پەردىسى-ئۆپكە ياللۇغىدا كۆرۈلىدۇ.

3. قوساق قىسمىنى تەكشۈرۈش: بۇ قوساق دائىرىسى،
قوساقتىكى ماددىلار ۋە قېرىن-ئۈچەي خىزمىتى قاتارلىقلارنى
تەكشۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

قوساق دائىرىسىنى تەكشۈرۈش: ساغلام كالىنىڭ قوساق
دائىرىسى نەسىل ۋە بېقىش ئۇسۇلىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ
قاتتىق پەرقلىنىدۇ. بوغازلىقنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە قوساقنىڭ

سول يېقى كۆرۈنەرلىك يوغىمىدايدۇ. چوڭ قېرىنىغا ئوزۇق تېقىلغاندا، چوڭ قېرىن كۆپكەندە، قوساققا سۇ يىغىلغاندا قوساق دائىرىسى چوڭىيىپ كېتىدۇ. ئۇزاق ۋاقىت ئاچ قېلىش، ئىچ سۈرۈش، قېرىلىق ۋە ئاجىزلىق، سوزۇلما جۈدەش كېسەللىكى قاتارلىقلاردا قوساق دائىرىسى كىچىكلەپ كېتىدۇ.

چوڭ قېرىن (1-قېرىن) نى تەكشۈرۈش: كۆپىنچە قاراپ، تۇتۇپ، چېكىپ ۋە تىگىشاپ تەكشۈرۈلىدۇ. قاراپ تەكشۈر-گەندە، قوساقنىڭ سول تەرىپىنىڭ (چوڭ قېرىن تەرىپىنىڭ) يوغىناش ئەھۋالىغا، بولۇپمۇ سول تەرەپ ئاچ بېقىن قىسمىنىڭ زورىيىش ئەھۋالىغا دىققەت قىلىنىدۇ. تۇتۇپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق قېرىننىڭ لۆمۈلدەش قېتىم سانى، كۈچلۈك-ئاجىزلىقى ۋە قېرىن ماددىلىرىنىڭ ھالىتى ئېنىقلىنىدۇ. سول تەرەپ ئاچ بېقىنغا مۇشتۇمىمىزنى ياكى ئاللىقىمىزنى چىڭ تاقاپ تۇرساق، قوساق تېمىنىڭ قەرەللىك ھالدا كۆتىرىلىپ ۋە ئاستا-ئاستا چۈشۈپ تۇرغانلىقى بىلىنىدۇ، مانا بۇ چوڭ قېرىننىڭ لۆمۈل-دىشى (سازاڭسىمان ھەركىتى) ھىساپلىنىدۇ. ساغلام كالىدا بۇنداق ھەركەت ھەر ئىككى مىنۇتتا 2~5 قېتىم بولىدۇ. نورمال ئەھۋالدا، كالا ئوزۇققا تويغاندىن كېيىن ئاچ بېقىن تولۇپ تۇرىدۇ، ئۇ خېمىرسىمان قاتتىق بىلىنىدۇ، لۆمۈلدەش كۈچلۈك بولىدۇ. چوڭ قېرىن كۆپكەندە، ئۇ چىڭقىلىدۇ، ئۇنىڭ ئەۋرىشمى-لىكى ئاشىدۇ، ئۇنى چېكىپ كۆرگەندە دۇمباق ئاۋازى چىقىدۇ. چوڭ قېرىنغا ئوزۇق يىغىلىپ قالغاندا، قېرىن تولۇق ۋە قاتتىق




10-رەسىم كالىنىڭ ئوڭ تەرەپ كۆكرەك ۋە قوساق

بوشلۇغىدىكى ئەزالىرىنىڭ ئورنى

1. تۈز ئۈچەي 2. ئوڭ بۆرەك 3. سول بۆرەك 4. قوساق ئاۋورتىسى
5. جىگەر 6. ئۆت خالتىسى 7. دىئافراگما ئايلىنىمى 8. ئۆپكە
9. كاناي 10 قىزىل ئۆگگەچ 11. يۈرەك 12. دىئافراگمىنىڭ قوۋۇرغا
- بويلاپ چاپلاشقان سىزىغى 13. قات قېرىن 14. 12 بارماق ئۈچەي
15. قېرىن ئاستى بېزى 16. ئاچ ئۈچەي 17. بوغماق ئۈچەي 18. يانپاش
- ئۈچەي 19. سوقۇر ئۈچەي 20. جىنىسى يول 21. دوۋساق

بىلىنىدۇ، باسقاندا ئىز قالىدۇ. چوڭ قېرىن بوشاشقاندا، ئىچى
بوش، يۇمشاق بىلىنىدۇ، بەزىدە مىلىقلىغانىدەك بىلىنىدۇ.
چوڭ قېرىن شىللىق پەردىسى ياللۇغلانغاندا، تۇتۇپ-بېسىپ
كۆرۈلسە كالا سېزىدۇ ۋە ئاغرىقسىنىدۇ. تىڭشاپ تەكشۈرۈش
سول تەرەپ ئاچ بېقىندىن باشلىنىدۇ، ئاڭلانغان ئاۋازنىڭ كۈچ-



11-رەسىم كالىنىڭ سول تەرەپ كۆكرەك ۋە قوساق

بوشلۇغىدىكى ئەزالىرىنىڭ ئورنى

1. قىزىل ئۆڭگەچ 2. كاناي 3. ئۆپكە 4. دىئافراگمىنىڭ ئالدى
- ئايلىنىمى 5. تال (ئالدى قىرى ئۇزۇك سىزىق بىلەن كۆرسىتىلگەن)
6. چوڭ قېرىن 7. دوۋساق 8. سول بالىياتقۇ بۇرجىگى 9. تۈز ئۈچەي
10. جىنىسى يول 11. جىنىسى يول ئالدى دالىنى 12. ئاچ ئۈچەي
13. تورلۇق قېرىن 14. يۈرەك.

لۈكۈلۈگى، تەكرارلىغى ۋە داۋاملىشىشىغا قاراپ، چوڭ قېرىن خىزمىتىنىڭ ئەھۋالىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ. چوڭ قېرىننىڭ لۈمۈل-دېشى ناھايىتى ئېنىق بولىدۇ، ئۇ "غور-غور" قىلغان ئاۋازدەك ئاڭلىنىدۇ ۋە ئاچ بېقىننىڭ كۆتىرىلىشىگە ئەگىشىپ تەدرىجى كۈچىيىدۇ، كېيىن بارا-بارا يوقىلىدۇ، بۇ بىر قېتىملىق لۈمۈل-دەش ھىساپلىنىدۇ، يەنە كېلىپ ئۇ قانۇنىيەتلىك بولىدۇ. لۈمۈل-

دەشنىڭ كۈچىيىشى چوڭ قېرىنىڭ قىسقىرىغانلىقىنىڭ ئاشقان-
لىغىدىن دېرەك بېرىدۇ، ئاجىزلىشىپ ياكى يوقىلىپ كېتىشى
چوڭ قېرىن خىزمىتىنىڭ توسالغۇغا ئۇچرىغانلىقىدىن دېرەك
بېرىدۇ ۋە بۇ ھال ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشىشى ياكى
چوڭ قېرىنغا ئوزۇق يىغىلىش قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

تورلۇق قېرىن (2-قېرىن) نى تەكشۈرۈش: تۇتۇپ ياكى
چېكىپ تەكشۈرگەندە، تەكشۈرگۈچى كالىنىڭ سول تەرىپىدە
تىزىنى قوساققا توغرىلاپ زوڭزىيىپ ئولتۇرىدۇ ۋە جەينىگىنى
تىزىغا قويۇپ تۇرۇپ، مۇشتۇمنى خەنجەرسىمان كۆمۈرچەككە
تاقاپ تۇرىدۇ-دە، پۇتىنى كۆتىرىپ قېرىننى نىقتايدۇ، ياكى
ئىككى كىشى بىر تال تاياقنى خەنجەرسىمان كۆمۈرچەك ئاستى-
دىن ئېلىپ يۇقۇرىغا كۆتىرىپ، تورلۇق قېرىننى نىقتايدۇ ۋە
شۇنىڭ بىلەن تەڭ، ھەر ئىككى كىشى يەنە بىر قولى بىلەن
كالىنىڭ سەردىن تۆۋەنگە بېسىپ تۇرىدۇ. ئەگەر تورلۇق
قېرىن جاراھەتلىك ياللۇغلانغان بولسا، كالا ئاغرىقسىنىدۇ،
ئىنجىقلايدۇ، قارشىلىق كۆرسىتىدۇ ھەمدە يېتىۋېلىشقا ئۇرۇنىدۇ.
قوساق تېمىنىڭ ئاستىنقى $\frac{1}{3}$ قىسمىغا توغرا كېلىدىغان 8-
قوۋۇرغا ئارىلىغىدىن ياكى خەنجەرسىمان كۆمۈرچەك ئورنىدىن
تىگىشاپ كۆرگەندە بوش شىتىرىلغان ئاۋازنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ،
تورلۇق قېرىننىڭ بىر مىنۇت ئىچىدىكى لۆمۈلدەش قېتىم سانى
چوڭ قېرىننىڭكىگە ئوخشايدۇ.

توققۇز تورلۇق (3-قېرىن) نى تەكشۈرۈش: ئۇنىڭ ئورنى

ئوڭ تەرەپ مۇرە دوقسى تەكشىلىگىدىكى 7-ۋە 9-قوۋۇرغىلار ئارىلىقىدا بولىدۇ. توققۇز تورلۇقنىڭ تىقىلىشى، توققۇز تورلۇق شىلىق پەردىسىنىڭ ياللۇغلىنىشى ياكى چىرىپ كېتىشى يۈز بەرگەندە، تۇتۇپ تەكشۈرۈلسە كالا ئاغرىقسىنىدۇ؛ تىگشاپ تەكشۈرۈلسە ”غور-غور“ قىلغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ، لۆمۈلدىشى چوڭ قېرىنىڭكىدىن ئاجىز بولىدۇ. توققۇز تورلۇقنىڭ قىسقىرىش ئاۋازىنىڭ ئاجىزلىشىشى ياكى يوقىلىشى ئېغىر قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردە، ئوزۇق تىقىلىش ۋە ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ ئېغىر كېسەللىكلىرىدە كۆرۈلىدۇ.

قات قېرىن (4-قېرىن) نى تەكشۈرۈش: ئۇنىڭ ئورنى ئوڭ تەرەپ 8-ۋە 11-قوۋۇرغىلارنىڭ ئارىلىقى، ئوڭ تەرەپ قوۋۇرغا ئەگىمىسىنىڭ ئاستى، خەنجەرسىمان كۆمۈرچەك كەينىدىكى قوساق ئاستى تېمى قىسمىدا بولىدۇ. قات قېرىن ياللۇغلانغاندا، تۇتۇپ-بېسىپ كۆرۈلسە كالا ئاغرىقسىنىدۇ ۋە قارشىلىق كۆرسىتىدۇ. بولۇپمۇ موزايىلارنى تەكشۈرۈشتە بۇ ئۇسۇل تېخىمۇ ئەھمىيەتكە ئىگە، چۈنكى موزاي سۈت ئىمىپ تۇرغاچقا قات قېرىنى تەرەققى قىلغان بولىدۇ، موزايىلاردا قات قېرىن كېسەللىكى كۆپرەك ئۇچرايدۇ، كۆپ ھاللاردا قات قېرىن ياللۇغى ياكى ئۇچەي ياللۇغى تۈپەيلىدىن موزايىلارنىڭ ئىچى سۈرىدۇ. گېمونخوز، تىرىخوستىرونىگلىد ۋە ئاشقازان قوڭۇر قۇرۇتلىرى چۈشكەندىمۇ، موزايىلارنىڭ قات قېرىنىغا ۋە ئۇچەيلىرىگە ئېغىر زىيان يېتىدۇ.

تۇچەينى تەكشۈرۈش: كالىنىڭ ئۈچىيى قوساقنىڭ ئوڭ تەرەپ كەينى يېرىم قىسمىغا جايلاشقان بولىدۇ، بۇرمىسىمان بوغماق ئۈچەي دىسكىسى بولىدۇ، سوقۇر ئۈچىيى بوغماق ئۈچەينىڭ ئۈستىدە تۇرىدۇ؛ ئىنچىكە ئۈچىيى بوغماق ئۈچەينىڭ ئەتراپىغا ئورلىپ تۇرىدۇ. قوساقنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن ئۈچەينىڭ لۆمۈلىدىگەن ئاۋازىنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ، ئۈچەينىڭ نورمال ئاۋازى ئاجىز ۋە قىسقا بولىدۇ. كالا تىزىگىنىڭ شەكلى ئۈچەي خىزمىتىنىڭ نورمال ياكى نورمال ئەمەسلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. ئىچ سۈرۈش ئۈچەي ياللۇغىنىڭ ئالامىتى، كېسەل كالىنىڭ قان ئارىلاش ئىچ سۈرۈشى تولاراق كالا ۋاباسى، قاناش خاراكتىرلىق قان يۇقۇملىنىش قاتارلىق كېسەللىكلەردە كۆرۈلىدۇ. سوزۇلما ئىچ سۈرۈش كۆپىنچە پارازىتلاردىن بولغان قېرىن-ئۈچەي ياللۇغىدا كۆرۈلىدۇ. ئۈچەي كىرىشىپ قالغاندا، كالا قارادىگۈت مېيىغا ئوخشاش تىزەكلەيدۇ ۋە تىزەكلىرى كۆتىنىڭ چۆرىسىگە يېپىشىپ قالىدۇ.

جىگەرنى تەكشۈرۈش: كالىنىڭ جىگىرى كۆكرەكنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى 12-ۋە 13-قوۋۇرغىلار ئارىلىقى بىلەن دۈمبىنىڭ ئارىلىقىدا بولىدۇ، چېكىپ تەكشۈرگەندە تۇتۇق ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ، بۇ جىگەرنىڭ نورمال تۇتۇق ئاۋاز رايونى ھىساپلىنىدۇ. جىگەر يوغاناپ قالغاندا، تۇتۇق ئاۋاز رايونى چوڭىيىپ كېتىدۇ. جىگەر قاتتىق يوغاناپ كەتكەندە، تېشىدىن تۇتۇپ كۆرگەندە قولغا قاتتىق نەرسە بىلىنىدۇ ۋە ئۇ نەپەسكە ئەگىشىپ مېدىراپ

تۇرىدۇ. بەزىدە توغرا ئۈچەيدىن تەكشۈرگەندە يوغىناپ كەت-
كەن جىگەر قولغا بىلىنىدۇ. بۇ ھال جىگەر ياللۇغى، جىگەرنىڭ
يىرىڭلىق ئىششىغى ۋە جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىكلىرىدە
كۆرۈلىدۇ.

4. سېيىش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش: سېيىشنىڭ قېتىم سانى-
نىڭ كۆپىيىشى، سېيىش سىيىرنىڭ دۈمچىيىپ قېلىشى، سۈيدۈك
مقدارىنىڭ ئاز، سېيىش قېتىم سانىنىڭ كۆپ بولۇشى دوۋساق
ياللۇغى، سۈيدۈك يولى ياللۇغى، جىنىسى يول ياللۇغىنىڭ
ئالامىتىدۇر. قان ئارىلاش سېيىش بۆرەك جامى ياللۇغى،
دوۋساق ياللۇغى ۋە سۈيدۈك يولى ياللۇغىدىن بولىدۇ. بۆرەك
جامى ياللۇغىدا سۈيدۈك دۇغلۇق ۋە ماش رەڭ بولىدۇ. سۈيدۈك-
نىڭ ئاخىرى قان ئارىلاش كېلىش، سۈيدۈك ئۇيۇپ قېلىش،
سۈيدۈكتە قىزىل قان ئاقسىلى بولۇش تۇغۇتتىن كېيىنكى
قىزىل قان ئاقسىللىق ياكى باكتېرىيە خاراكتىرلىق سۈيدۈك
يولى كېسەللىكىدىن بولۇشى مۇمكىن.

5. توغرا ئۈچەينى تەكشۈرۈش: كالىنىڭ توغرا ئۈچەينى
تەكشۈرۈش بوغازلىق ۋە جىنىسى ئەزا كېسەللىكلىرىنى ئېنىق-
لاشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە، قات قېرىنىڭ تولىشىپ قېلىشى،
ئۈچەي ئورنىنىڭ ئۆزگىرىپ قېلىشى قاتارلىقلارنى ئېنىقلاشتىمۇ
مەلۇم ئەھمىيەتكە ئىگە. قوساق ئاغرىغاندا، توغرا ئۈچەينى
تەكشۈرۈش ئارقىلىق كېسەللىكنىڭ سەۋىيىسىنى بىر قەدەر
توغرا ئېنىقلىغىلى بولىدۇ.

تەكشۈرگەندە دوۋساق. تۇخۇمدان، بۆرەك، چىگەرە
بالياتقۇ ئەھۋالىنى ۋە ئىششىق بار-يوقلۇقى، تاغرىقچىلىقى
ئىنكاسى بار-يوقلۇقىنى بىلىشنى مۇھىم نۇقتا قىلىش ھەمدە
قات قېرىننىڭ ئۆزگىرىشى، ئۇنىڭدا كۆپۈش ئەھۋالىنىڭ بار-
يوقلۇقى، تولغىشى، چىگىشىپ قېلىش، قىسىلىپ قېلىش ۋە
ئۆچەي كىرىشىپ قېلىش ئەھۋاللىرىنىڭ بار-يوقلۇقى قاتارلىق-
لارغىمۇ دىققەت قىلىش كېرەك.

6. نېرۋا سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش: ساغلام كالىنىڭ چوڭ
مىڭە پوستلىغىنىڭ قوزغىلىشى ۋە تورمۇزلىنىشى بىر بىرىگە
قارىمۇ-قارشى بولغان تۈپ جەريان، شۇ ئارقىلىق تەڭپۇڭلۇق
ساقلىنىپ، كالا روھلۇق ۋە سەگەك تۇرىدۇ. مەركىزىي نېرۋا
فۇنكسىيىسى قالايمىقانلاشسا تەڭپۇڭلۇق يوقىلىدۇ، بۇ ھال
كىلىنىڭدا قوزغىلىش ۋە تورمۇزلىنىشتىن ئىبارەت ئىككى خىل
شەكىلدە ئىپادىلىنىدۇ. تورمۇزلىنىش چوڭ مىڭە پوستلىغىنىڭ
غىدىقلىنىشىغا بولغان سەزگۈرلۈگىنىڭ ئاجىزلىغانلىقى ياكى
يوقالغانلىقىدىن بولىدۇ، ئۇ، دەرىجىسىگە قاراپ، روھسىزلىنىش،
خارامۇشلۇق ۋە خۇددىنى يوقىتىش دەپ 3 خىلغا ئايرىلىدۇ.
قوزغىلىش چوڭ مىڭە پوستلىغىنىڭ غىدىقلىنىشىغا بولغان سەز-
گۈرلۈگىنىڭ كۈچەيگەنلىكىدىن بولىدۇ، مەسىلەن، بىئارام
بولۇپ تىپىرلاش، تىنماي مۇرەش، قالايمىقان ئېتىلىش ياكى
چاپچىش قاتارلىق ئەھۋاللار ئەنە شۇنىڭدىن بولىدۇ.
سەزگۈ فۇنكسىيىسىنى تەكشۈرۈش: ئالدى بىلەن تېرىنىڭ

سېزىمچانلىغىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئادەتتە ساغرا قىسمىدىن باشلاپ، ئومۇرتقىنىڭ ئىككى يېنىنى بويلىتىپ بويۇن ۋە باش قىسمىغىچە يىگنە سانچىپ كۆرۈلىدۇ، ئاياقلىرىغا ئايلىنىدۇ. رۇپ يىگنە سانچىپ كۆرۈلىدۇ. ساغلام كالىغا يىگنە سانچىغاندا، مۇسكۇللىرى قىسقىرىش، تۈكلىرى دىرىلدەش، ياكى بېشىنى قايرىپ قاراش، قۇلغىنى دىڭ تۇتۇش، ئادەمنى تېپىش قاتارلىق ئىنكاسلار كۆرۈلىدۇ. سېزىمچانلىقنىڭ زىيادە ئېشىپ كېتىشى يۇلۇن پەردىسى ياللۇغدا كۆرۈلىدۇ. سېزىمچانلىقنىڭ ئاجىزلىشىشى مېڭە ياللۇغى، تۇغۇت پالىچى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، كالىنىڭ كۆز قارچۇغى، قۇلغى ۋە كۆتۈننىڭ ئىنكاسلىرىغىمۇ دىققەت قىلىش لازىم.

ھەركەت فۇنكسىيەسىنى تەكشۈرۈش: قارىشىغا ھەركەتلىنىش ۋە قاملاشمىغان ھەركەت قىلىش، تارتىشىش ۋە پالەچلىك قاتارلىق ھادىسىلەرنىڭ بار-يوقلۇغىغا دىققەت قىلىش كېرەك. قارىشىغا ھەركەتلىنىش ئاڭنىڭ ئىدارە قىلىشىدىن بولمايدۇ، شۇنداقلا تاشقى ئامىلنىڭ تەسىرىدىنمۇ بولمايدۇ، شۇڭا كېسەل كالا قوتان چۆڭسەلمەيدۇ، ياكى نىشانىسىز ماڭىدۇ، كۆرگەنلەر يەرگە ئۆزىنى ئۇرىدۇ، بۇ ھال مېڭە ياللۇغى، مېڭە خالتىلىق قۇرۇت كېسىلى قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. ھەركەت قاملاشماسلىق دېگەندە، خۇددى مەس بولۇپ قالغاندەك دەلدەڭشىپ مېڭىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ، بۇ تولاراق يۇلۇننىڭ خەۋەر يەتكۈزۈش فۇنكسىيەسىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى ۋە چوڭ مېڭە كېسەللىك.

لىرىدە كۆرۈلىدۇ. تارتىشش دىگەندە، مۇسكۇلنىڭ ئىختىيارسىز قىسقىرىشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ، بۇ قاتمال خاراكتىرلىق تارتىشش ۋە تۇتما خاراكتىرلىق تارتىشش دەپ ئىككى خىل بولىدۇ، بۇ ھال قاتما، زەھەرلىنىش ۋە كالتىسى يېتىشمەسلىك كېسەللىكلىرىدە كۆرۈلىدۇ. پالەچلىك ھەركەت نېرۋىسىنىڭ زەخمىلەندىگەنلىكىدىن بولىدۇ. بەدەننىڭ ئىختىيارىي ھەركەتتىن پۈتۈنلەي قېلىشى پۈتۈن پالەچلىنىش دىيىلىدۇ. ھەركەتلىنىش دائىرىسىنىڭ چەكلىمىگە ئۇچرىشى ۋە مۇسكۇل كۈچىنىڭ ئاجىزلىشىشى يېرىم پالەچلىنىش دىيىلىدۇ. بىر ئاياقنىڭ پالەچ بولۇشى سىڭار پالەچلىنىش، بىر ياق گەۋدىنىڭ پالەچ بولۇشى بىر تەرەپ پالەچلىنىش، كەينى ئىككى ئاياقنىڭ ياكى ئالدى ئىككى ئاياقنىڭ پالەچ بولۇشى ئىككى ئاياق پالەچلىنىش دىيىلىدۇ. گەۋدەنىڭ بىر تەرىپىنىڭ پالەچ بولۇشى مىڭدىن، ئىككى ئاياقنىڭ پالەچ بولۇشى يۇلۇندىن، سىڭار ئاياقنىڭ پالەچ بولۇشى نېرۋا ئۇچلىرىنىڭ زەخمىلىنىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

2. يۇقۇملۇق كېسەللەكلەر

ئاقسىل

ئاقسىل ئاچا تۇياق ھايۋانلاردا بولىدىغان ئۆتكۈر، قىزىق-مىلىق، بەك يۇقۇمچان كېسەللىك بولۇپ، كىلىنىكىدا ئېغىز شىللىق پەردىسى، تۇياق ئاچىسى، تۇياق تاجىسى ۋە يىلىن تېرىسىدە قاپارتما پەيدا بولۇش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] ئاقسىل ۋىرۇسلىرى كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر، ئۇنىڭ ئاساسەن A، O، C دىن ئىبارەت 3 خىل تىپى بولىدۇ، باشقا تىپلىرىمۇ بولىدۇ، ھەرقايسى تىپلار ئۆزئارا ئىممۇنىت تۇتمايدۇ.

ۋىرۇسلارنىڭ تاشقى مۇھىتقا بولغان قارشىلىق كۈچى كۈچ-لۈكرەك بولىدۇ، تۇپراقتا 21 كۈن ياشىيالايدۇ. كېسەل كالىنىڭ قەقىچىدىكى ۋىرۇسلار يازدا 14 كۈن، كۈزدە 20 كۈن، قىشتا ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزاق ياشىيالايدۇ. ۋىرۇسلارنىڭ ئىسسىقلىققا بولغان قارشىلىق كۈچى ئاجىزراق بولىدۇ، $70^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ تا 30 مىنۇتتا، 85°C تا 1 مىنۇتتا ئۆلىدۇ. بۇ ۋىرۇسلارنىڭ ئادەتتىكى دېرىزى-فېكسىيە دورىلىرىغا بولغان قارشىلىق كۈچى كۈچلۈكرەك بولىدۇ،

لېكىن ئۇلار ئىشقارلىق دېزىنفېكسىيە دورىسىغا قارىتا سېزىم-
چان كېلىدۇ، بۇنداق دورىدا بىرنەچچە مىنۇتتىلا ئۆلىدۇ.
ۋىرۇسلار ئاساسەن كېسەل كالىنىڭ قاپارتمىلىرى، قاپارتمى-
سۇيۇقلۇقى، شالى-سۈتى، تىزەك-سۈيدۈڭى ۋە كۆز يېشىدا
ساقلىنىدۇ، ئاجراتمىلار ۋە چىقىرىندىلار بىلەن بىللە بەدەندىن
چىقىرىلىدۇ، ئاغرىپ ساقايغان كالىلاردىمۇ مەلۇم ۋاقىتقىچە
ۋىرۇسلار ساقلىنىپ قالىدۇ ۋە چىقىرىلىپ تۇرىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] ئاقسىل دۇنيادىكى ھەرقايسى
ئەللەرگە تارقالغان بولۇپ، كالىلارغا ئەڭ ئاسان يۇقىدۇ.
ئۇنىڭدىن قالسا قوي، ئۆشكە، تۆگە، بۇغا ۋە چوشقىلارغا
يۇقىدۇ.

بۇ كېسەللىك، ئاساسەن، كېسەل مال بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىد-
شىشتىن يۇقىدۇ. كېسەل كالا چىقىرىۋەتكەن ئاجراتمىلاردىن
بۇلغانغان ئوزۇق، سۇ ۋە جابدۇقلار ئارقىلىقمۇ يۇقىدۇ. قان
شورغۇچ ھاشارەتلەر ۋە باشقا جانىۋارلارمۇ بۇ كېسەللىكنى
تارقىتىدۇ.

ھەزىم قىلىش يولىنىڭ يۇقۇملىنىشى بۇ كېسەللىكنىڭ تار-
قىلىش يولىدۇر، بۇ كېسەللىكنىڭ ئېغىز شىلىق پەردىسىنىڭ
يۇقۇملىنىشى ئارقىلىق تارقىلىش نىسبىتى ئەڭ يۇقۇرى بولىدۇ،
شۇنداقلا ئۇ بۇرۇن شىلىق پەردىسى، كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى
پەردىسى، يىمىن توپچىسى ۋە تېرىنىڭ زەخمىلەنگەن ئورۇن-
لىرى ئارقىلىقمۇ يۇقىدۇ.

ئاقسىل يېڭى تارقالغان ئورۇندا ئۇنىڭ يۇقۇش نىسبىتى 100%، كونا يۇقۇم رايونىدا 50% تىن يۇقۇرى بولىدۇ، ئۇ شىددەت بىلەن تېز تارقىلىدۇ، كۆپ ھاللاردا كالا، قوي، چوشقىلار تەڭلا كېسەل بولىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] ۋىرۇسلار ئورگانىزىمنىڭ مەلۇم قىسمىغا كىرگەندىن كېيىن، شۇ يەرنىڭ ئۈستىكى تېرە ھۈجەيرىلىرىدە كۆپىيىدۇ-دە، شىرلىق سىرغىتىلارنى پەيدا قىلىپ، باشلانما قاپارتمىلارنى شەكىللەندۈرىدۇ، 2~3 كۈندىن كېيىن قانغا ئۆتۈپ، قاننىڭ ئايلىنىشى بىلەن يىلىن، تۇياق ئاچمىسى، تۇياق تاجمىسى، تېرە شىللىق پەردىلىرىدە ئۇلانما قاپارتمىلارنى پەيدا قىلىدۇ ھەمدە كۆپىنچە بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ. قاپارتما يېرىلغاندىن كېيىن قاندىكى ۋىرۇسلار يوقىلىدۇ-دە، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئەسلىگە كېلىپ، كېسەللىك ياخشىلىنىشقا يۈز تۇتىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يوشۇرۇن ۋاقتى ئادەتتە 2~7 كۈن بولىدۇ، بەزىدە 14 كۈنگە يېتىپ بارىدۇ.

دەسلۇندە ئېغىز شىللىق پەردىسىدە، تۇياق ئاچمىسىدا باشلانما قاپارتما پەيدا بولىدۇ، ئارقىدىنلا بەدەن تېمپېراتۇرىسى 41°C ~ 40°C قا چىقىدۇ، ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، كۆشەش ئازلايدۇ. كالىپۇك، بۇرۇن ئەينىكى، تىل ئۈستى، چىش مىلكى ۋە يىملىندا چوڭ-كىچىك قاپارتمىلار پەيدا بولىدۇ، قاپارتمىلار بىر بىرىگە قوشۇلۇپ يوغانىدۇ، ئۇ يېرىلغاندىن كېيىن چەت-چۆرىسى

تەپ- تەكشى قىزىل يارا ھاسىل بولىدۇ، ئېغىز بوشلۇغىدىن يىمىسىمان شال كۆپلەپ ئېقىپ تۇرىدۇ.

ئېغىز بوشلۇغىدا قاپارتما پەيدا بولۇش بىلەن بىرگە تۇياق ئاچمىسى ۋە تۇياق تاجمىسى تېرىسىدىمۇ قاپارتما پەيدا بولىدۇ، بۇ ئىششپ، قىزىپ ئاغرىتقانلىقتىن، كالا ئاقساق قالىدۇ، بۇ ھال ئېغىز بولغاندا، تۇياق قېپى چۈشۈپ كېتىپ، كالا يەرگە دەسسە- يەلمەس بولۇپ قالىدۇ ۋە ئۇزاق مەزگىل يېتىۋەرگەنلىكتىن تۆشەك جاراھىتى پەيدا بولىدۇ- دە، زەھەرلىك يىمىرىك قانغا ئۆتۈپ سېپىتىسىمىيە بولۇش بىلەن ئۆلۈپ قالىدۇ.

ئاقسىل ئادەتتە خەتەرسىز ئۆتىدۇ، ئۇنىڭدىن ئۆلۈش نىسبىتى 2% بولىدۇ، كېسەللىك ساقايغاندىن كېيىن 6~12 ئايلىق ئىممۇنىت ھاسىل بولىدۇ. كالا يامان سۈپەتلىك ئاقسىل بولۇپ قالسا، كۆپىنچە ئاجىزلاپ كېتىپ ئۆلۈپ قالىدۇ.

[دىئاگنوز قويۇش] كالىنىڭ ئېغىزىدا، تۇياقلىرىدا قاپارتما پەيدا بولۇش ۋە بۇ كېسەللىك قوي، چوشقىلاردىمۇ بىرلا ۋاقىتتا كۆرۈلۈش دىئاگنوز قويۇشتا ئاساس قىلىنىدۇ. شەرت- شارائىتى بار جايلار قەقەچ ياكى قاپارتما سۇيۇقلۇغىدىن ئېلىپ، ئۇنى پېنتىسىللىن قۇتىسىغا قاپلاپ يۇقۇمدىن مۇداپىئە كۆرۈش ئورگانلىرى ياكى ئىلمىي تەتقىقات ئورۇنلىرىغا ئەۋەتىپ، ۋىرۇس تىپىنى ئېنىقلىتىشى كېرەك.

كالا ۋابىسىدىن پەرقلەندۈرۈش: كالا ۋابىسى كالىلاردىلا كۆرۈلىدۇ، قوي، چوشقىلاردا كۆرۈلمەيدۇ؛ كېسەللىك ئۆزگە-

رىشى كۆرۈلىدىغان ئورۇن ئېغىز بوشلۇقى بىلەنلا چەكلىنىدۇ، كېسەللىك كۆرۈلگەن ئورۇندا قاپارتما پەيدا بولمايدۇ، كېپەك-سىمان ساختا پەردە ھاسىل بولىدۇ ۋە چەت-چۆرىسى تەكشى بولمىغان يارا پەيدا بولىدۇ؛ ئۇ كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى ياللۇغى، ئاشقازان-ئۈچەي ياللۇغى بىلەن بىللە كۆرۈلىدۇ، ئۇنىڭدىن ئۆلۈش نىسبىتى يۇقۇرى بولىدۇ.

يۇقۇملۇق قاپارتمىلىق ئېغىز ياللۇغىدىن پەرقلىنىدۇرۇش: يۇقۇملۇق قاپارتمىلىق ئېغىز ياللۇغى تولراق ئات، كالىلاردا بىرلا ۋاقىتتا كۆرۈلىدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش] ئاقسىلنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا، يەرلىك پارتىيە تەشكىلىنىڭ رەھبەرلىگىدە، ئاممىنى كەڭ ھەركەتلەندۈرۈش، بىرلەشمە مۇداپىئە كۆرۈش، ھەر تەرەپلىمە تەدبىر قوللىنىش كېرەك.

(1) ھەر يىلى ئەتىيازدا ئاقسىلنىڭ سۆسۈن رەڭ كىرىستال گلىتسېرىن ۋاكسىنىسىنى ئوكۇل قىلىپ تۇرۇش كېرەك. ئۇ چوڭ كالىغا 10 م ل دىن، كىچىك كالىغا 5 م ل دىن تېمىر ئاستىغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ئىممۇنىت ۋاقتى 6~12 ئاي بولىدۇ.

(2) ئاقسىل كۆرۈلگەندە، ئۆز ۋاقتىدا يۇقۇرغا مەلۇم قىلىش، يۇقۇم رايونىنى ئايرىپ، كېسەل كالىلارنى كارانتىن قىلىش ۋە ئايرىپ داۋالاش، شۇنداق قىلىپ كېسەللىكنى ئۆز ئورنىدا يوقىتىش ۋە ئۇنىڭ يامراپ كېتىشىدىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم.

(3) كارانتىن رايونىغا كىرىپ-چىقىش تېخىزىدا دېزىنفېك-سىيە كۆلچىگى ياساپ، كېلىپ-كېتىپ تۇرغۇچى ئادەم ۋە ماشىنا (ھارۋا) لارنى قاتتىق دېزىنفېكسىيە قىلىش كېرەك. رايونغا ئاقسىل ئاسان يۇقىدىغان مالىلارنى كىرگۈزۈشنى، ئۇ رايوندىن چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى سىرتقا چىقىرىشنى مەنئى قىلىش لازىم.

(4) يۇقۇمدىن خالى رايونلارنى ياخشى قوغداش، كارانتىن رايونى ئەتراپىدىكى ئاسان يۇقۇملىنىدىغان مالىلارغا ئاقسىلنىڭ ئوخشاش تىپلىق ۋاكسىننىسىنى تېز ئۆكۈل قىلىپ، ئىممۇنىت بەلپىغى ھاسىل قىلىش لازىم.

(5) يامان سۈپەتلىك ئاقسىل بولغان، داۋالاش قىممىتى يوق كالىلارنى ۋاقىتدا سويۇۋېتىش كېرەك. ئۇنداق كالىنىڭ گۆشىنى 30 مىنۇت قاينىتىۋەتكەندىن كېيىن، يۇقۇم رايونىنىڭ ئۆزىدە پايدىلانسا بولىدۇ. بۇنداق كېسەل بىلەن ئۆلۈپ قالغان كالىنىڭ ئۆلۈگىنى كۆيدۈرۈۋېتىش ياكى چوڭقۇر كۆمۈش لازىم.

(6) بۇلغانغان ئېغىل-قوتان، ئوقۇر، جابدۇق-سايما، تىزەك ۋە كالىنىڭ بەدىنىنى 2% لىك ئويغۇچى ناتىرىي ئېرىتمىسى بىلەن قاتتىق دېزىنفېكسىيە قىلىش كېرەك. ئەڭ ئاخىرقى بىر كېسەل كالا ساقىيىپ ياكى ئۆلۈپ 14 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭدا يېڭىدىن كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىسە، ئۇنى قاتتىق دېزىنفېكسىيە قىلغاندىن كېيىن كارانتىننى بىكار قىلىش كېرەك.

[داۋالاش]

(1) ئاسراشنى كۈچەيتىش: كېسەل كالىنى پاكىز ئېغىلغا ئايرىپ چىقىپ بېقىش، ئاستىغا يۇمشاق تۆشەك چۆپ سېلىپ بېرىپ، تۆشەك جاراھەتى بولۇشتىن ساقلاش، پاكىز ھەم ئىلمان سۇدا سۇغىرىش، ئاسان سىڭىدىغان يۇمشاق ئوزۇق بىلەن بېقىش لازىم.

(2) دورا بىلەن داۋالاش: ئېغىز بوشلۇغىنى %3 لىك بور كىسلاتاسى سۈيى بىلەن، ياكى %0.1 لىك مارگانسوپ ئېرىتمىسى بىلەن، ياكى پاكىز سۇ بىلەن يۇيۇپ، ئاندىن ئۇ يەرگە يود گلىتسېرىن سۈركەش كېرەك، ھىندى ئۆسمىسى ياكى بورنېئول - دانىكا دورىسى قاتارلىق جۇڭگىي ئۆسۈملۈك دورىلىرى بىلەن داۋالسىمۇ بولىدۇ.

رېتسېپ: ھىندى ئۆسمىسى دورىسى

ھىندى ئۆسمىسى 3 مىسقال، مامۇرانچىن 2 مىسقال، خۇاڭبو

2 مىسقال، يالپۇز 1 مىسقال، قوڭغۇراقگۈل 2 مىسقال، كات

ھىندى 2 مىسقال

بۇلار يۇمشاق سوقۇلۇپ، كەڭلىكى 1 سۇڭىچە، ئۇزۇنلۇغى 3 سۇڭىچە كېلىدىغان داكا خالىغا سېلىنىدۇ ۋە خالىنىڭ ئاغزى بوغۇلغاندىن كېيىن ئىلمان سۇغا چىلاپ ئېلىنىپ كېسەل كالد - نىڭ ئاغزىغا سېلىپ قويۇلىدۇ، سۇغارغاندا ئېلىۋېتىلىدۇ، كۈندە بىر قېتىم يەڭگۈشلىنىدۇ.

رېتسېپ: بورنېئول - دانىكا دورىسى

بورنېئول 5 سەر، دانىكا 5 سەر، تازىلانغان شور 5 مىسقال

بۇلار يۇمشاق سوقۇلۇپ تەييارلۇۋېلىنغاندىن كېيىن ئېغىز بوشلۇغىغا لايىقىدا پۈركىلىدۇ. تۇياق ۋە يىلىندا كېسەللىك ئۆزگىرىشى كۆرۈلىشى، ئۇ جاي 0.1% لىك مارگانىسوپ ئېرىتمىسى بىلەن، ياكى 3% لىك بور كىسلاتاسى ئېرىتمىسى بىلەن، 2% لىك زەمچە ئېرىتمىسى بىلەن يۇيۇلىدۇ ۋە ئۇ جايغا زىياۋىي ياكى يود گلىتسېرىن سۈركەپ قويۇلىدۇ. ياكى بولمىسا ئۇ جايغا كۆيدۈرۈلگەن گەج بىلەن قازان كۆيىسىنى سوقۇپ تەڭ مىقداردا ئارىلاشتۇرۇپ (ئازراق تۇز قوشۇپ) سەپسىمۇ، ياكى كامفورا مەلھىمى، سۇلغانىلامىد مەلھىمى سۈرتىمۇ بولىدۇ. قوشۇلما كېسەللىكنىڭ كېلىپ چىقىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، مۇسكۇلغا پېنىتسىللىن ياكى سۇلغانىلامىدلىق دورىلار ئوكۇل قىلىنىدۇ.

كالا ۋاباسى

كالا ۋاباسى ۋابا ۋىرۇسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئۆتكۈر، قان يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىق يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، شىملىق پەردىلەر ياللۇغلىنىش، قاناش، شەلۋەرەش ۋە نېكروز-لىنىشلار بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] كالا ۋاباسى ۋىرۇسى كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر. ئۇ قۇرغاق مۇھىتتا ئاسانلا ھالىدىن كېتىدۇ، 25°C - تا 3~2 يىلغىچە يۇقۇش ئىقتىدارىنى ساقلاپ تۇرالايدۇ.

ئادەتتىكى دېزىنڧېكسىيە دورىلىرى (0.1% لىك سىمپا خلورىد يەنى سولما، 2% لىك كاربولىكا قاتارلىقلار) ئۇنى بىرنەچچە مىنۇتتىلا ئۆلتۈرىدۇ. ۋىرۇسلار ئاساسەن كېسەل كالىنىڭ قېنى، ئىچكى ئەزالىرى، ئاجراتمىلىرى ۋە چىقىرىندىلىرىدا ساقلىنىدۇ. [كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] يەرلىك كالا، سۇ كالىسى ۋە قوتازلارغا ئاسان يۇقىدۇ.

كالا ۋاجاسى روشەن پەسىل خاراكتىرىغا ئىگە ئەمەس، ئومۇمەن قىشنىڭ ئاخىرى ۋە باش ئەتىيازدا تولاراق پەيدا بولىدۇ، چاپسان تارقىلىپ كەتكەندە، ئۆلۈش نىسبىتى يۇقۇردىراق بولىدۇ. كېسەل كالىلار ئاساسىي يۇقۇم مەنبەسىدۇر. بۇلغانغان يەم-خەشەك، سۇ، ئوقۇر، جابدۇق-سايمانلار ياكى جايىدا بىر تەرەپ قىلىنمىغان ئۆلۈكلەرمۇ يۇقۇم مەنبەسى بولۇپ قالىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] ۋىرۇسلار ھەزىم قىلىش يوللىرى ئارقىلىق قانغا ئۆتكەندىن كېيىن تېز كۆپىيىپ، زەھەرلىك ماددا ئىشلەپچىقىرىدۇ ۋە قاننى زەھەرلەيدۇ. قاننىڭ زەھەرلىنىشى ئارقىسىدا قان تومۇر تېمى زەخمىلەنگەنلىكتىن، شىلىق پەردىلەرگە قان چۈشىدۇ-دە، ئۇ ئىششىيدۇ ۋە قانايدۇ، ئۈستىكى تېرە توقۇلمىلىرى چىرىيدۇ، سۇيۇلىدۇ ۋە يارىلىنىدۇ. چىرىگەن ئۈستىكى تېرە چۈشۈپ كېتىپ يارا پەيدا بولىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن قان سرغىپ چىقىپ، بوش ساختا پەردىلەرنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئىششىق ئون ئىككى بارماق ئۇچىي

شېلىق پەردىلىرىدە كۆرۈلگەندە، ئۆت يولى تۈسلىپ قېلىپ
ئۆت خالىسى ئىشىپ قالىدۇ؛ نەپەس يولىدا كۆرۈلگەندە،
كانايچىگە سرغىتمىلار تولۇپ كېتىدۇ-دە، نەپەس ئېلىش
قىيىنلىشىدۇ، كۆپ ھاللاردا ئۆپكە يەللىك ئىشىقى پەيدا بولىدۇ.
[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يوشۇرۇن ۋاقتى 3~6 كۈن،
بەزىدە 10 كۈن ئەتراپىدا بولىدۇ.

كېسەل كالىنىڭ تېمپېراتۇرىسى 42°C ~ 40°C قا چىقىدۇ،
قىزىتما 4~6 كۈن داۋام قىلىدۇ. كالا روھسىزلىنىدۇ، قۇلاقلىرى-
نى سالىپايتىپ، كۆزىنى يۇمۇپ جىم تۇرىدىغان، ئاز كۆشەيدىغان
ياكى كۆشەيدىغان، ئۇسسايىدىغان بولۇپ قالىدۇ. كالىنىڭ
كۆزىنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى قاتتىق قىزىرىپ كېتىدۇ ۋە
ئۇنىڭدا قانلىق چېكىتلەر بولىدۇ، قاپىقى ئىشىشىدۇ، كۆزى
يېرىم يۇمۇلۇپ تۇرىدۇ، كۆزىدە شىلىمىش قۇيۇقلۇق ياكى
يىرىڭلىق ئاجراتمىلار بولىدۇ.

كالىنىڭ بۇرۇن ئەينىكى قۇرغاقلىشىدۇ، كېسەللىك ئېغىرلاش-
قانلىرىنىڭكى يېرىلىپ كەتكەندەك كۆرۈنىدۇ، قوڭۇر سېرىق
قەقەچ پەيدا بولىدۇ، كالىنىڭ بۇرۇندىن سۈزۈك يېپىشقاق
ئاجراتمىلار ئاقىدۇ، بۇ كېيىن يىرىڭغا ئايلىنىپ سۈر رەڭگە
كىرىپ قالىدۇ، بەزىدە ئۇنىڭغا قان ئارىلاشقان بولىدۇ.

كالىنىڭ ئاغزىدىن شال ئاقىدۇ، ئېغىز شېلىق پەردىسى
يامرىغاق قانايىدۇ، جاۋغىيى، تىل ئاستى، چىش مىلكى، قوۋۇ-
زىنىڭ ئىچكى يۈزى ۋە قاتتىق تاڭلىيى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ

شىللىق پەردىلىرىدە كۈل رەڭ ياكى سۈر سېرىق چېكىتىلەر پەيدا بولىدۇ، بۇلار تەدرىجى قوشۇلۇپ كۈل رەڭ ياكى سۈر سېرىق كېپەكتەك ساختا پەردە ھاسىل قىلىدۇ. بۇ پەردە ئاج-راپ چۈشكەندى كېيىن، چەت-چۆرىسى تەكشى بولمىغان داغ ۋە يارا پەيدا بولىدۇ.

دەسلۇىدە كالا تىزەكلىيەلمەس بولۇپ قالىدۇ، كېيىن كالا-نىڭ ئىچى سۈرىدۇ، تىزىگى شىلىمدەك ياكى سۈيۈك كېلىدۇ، تىزىگى كۈل رەڭ ياكى سېغىز رەڭ بولىدۇ، سېسىق پۇرايدۇ، تىزىگىگە قان ئارىلاشقان، چىرىگەن ئۈچەي شىللىق پەردىسى پارچىلىرى ۋە ساختا پەردە ئارىلاشقان بولىدۇ. ئىچ سۈرۈش بارغانچە كۈچىيىدۇ، كالا تىزەك تۇتالماس بولۇپ قالىدۇ، تىز ئورۇقلايدۇ، ئاخىردا سىپازما بولۇپ قالىدۇ، ھەتتا ئۆلىدۇ.

سىيىرنىڭ جىنىسى يولىدىن يېپەشتاق ياكى زەرداپسىمان ئاجراتىملار ئېقىپ تۇرىدۇ، جىنىسى يول شىللىق پەردىسىدە نېكىروز ئوچاقلىرى، كۈل رەڭ ياكى سۈر سېرىق قەقەچ ۋە قارامتۇل قىزىل يارا بولىدۇ. بوغاز سىيىر ئاسانلا بالا تاشلايدۇ. [دېئاگنوز قويۇش] كىلىنىكىدا تۇراقلىق قىزىتما بارلىغى، ئېغىز شىللىق پەردىسىدە كېپەكسىمان قەقەچ، داغ بارلىغى، قاتتىق ئىچ سۈرۈش، چاپسان ئورۇقلاش ئالامەتلىرى بارلىغى بىلىنىدۇ.

پاتوئاناتومىيىلىك ئۆزگىرىش جەھەتتە، ئېغىز شىللىق پەردىسى شەلۋەرەش، ھەزىم قىلىش يولىنىڭ شىللىق پەردىسى

قاناش خاراكتىرلىق ياللۇغلىنىش روشەن ئىپادىلىنىدۇ، ئاشقا-
زان-ئۈچەي شىللىق پەردىسى چېكىتىسمان ياكى ئاسمىسمان
قانايدۇ ۋە ئۇنىڭدا ساختا پەردە، يارا بولىدۇ. لىمفا ئۆگۈنلىرى
يوغىنايدۇ. جىگەر ساغۇچ توپا زەڭگە كىرىدۇ، ئۆت خالىتىسى
يوغىنايدۇ ۋە قان ئارىلاش يېشىل ئۆت سۇيۇقلۇغىغا ئىلىق تولىدۇ.
تالدىكى ئۆزگىرىش روشەن بولمايدۇ، ئۇ بەزىدە سەل يوغىنايدۇ.
بۆرەك ئىشىشىدۇ، بۆرەك جامىغا قان چۈشۈپ قالىدۇ. دوۋساق
شىللىق پەردىسىگە قان چۈشىدۇ ۋە ئۇ قانايدۇ. يۈرەك مۇسكولى
يۇمشاپ ئۆزگىرىدۇ. كىكرەكتە قانلىق چېكىت ۋە يارا بولىدۇ.
تېخىمۇ توغرا دىئاگنوز قويۇش ئۈچۈن، قاتتىق ئايرىش
شەرتى ئاستىدا، كېسەل كالىنىڭ قېنى موزايغا ئۆكۈل قىلىنىپ،
موزايدىكى ئۆزگىرىش ئەھۋالى كۆزىتىلىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش] ئېلىمىزدە كالا ۋاباسى يوقىتىلدى، شۇڭا
ئادەتتىكى چاغلاردا چەتتىن كىرگۈزۈلگەن چارۋا مال ۋە چارۋا
مەھسۇلاتلىرى بويىچە يۇقۇم تەكشۈرۈش ئىشنى كۈچەيتىپ،
كالا ۋاباسىنىڭ كىرىشىدىن ساقلىنىش لازىم. ناۋادا يۇقۇملى-
نىش ئەھۋالى كۆرۈلسە، دەرھال مەلۇم قىلىش، كارانتىن
قىلىش، ئايرىش، دېزىنڧېكسىيە قىلىش، ئۆلۈگىنى كۆيدۈرۈش
قاتارلىق تەدبىرلەرنى قاتتىق ئىجرا قىلىش لازىم. كېسەل
يوقىتىلغاندىن كېيىن، كالىلارغا كالا ۋاباسىنىڭ توشقاندىن
ئۆتكۈزۈپ ئاجىزلاشتۇرۇلغان ۋاكسىنىسىنى ئۇدا 3 يىلغىچە
ئۆكۈل قىلىپ تۇرۇش كېرەك.

تارقىلىشچان زۇكام

تارقىلىشچان زۇكام كالىلاردا بولىدىغان بىر خىل ئۆتكۈر، قىزىتمىلىق يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، كىلىنىكىدا نەپەس ئېلىش ۋە ھەزىم قىلىش يوللىرىنىڭ شىللىق پەردىلىرى كاتار-لىق ياللۇغلىنىش، ئاياق بوغۇملىرى ياللۇغلىنىش ۋە تېرە ئاستىدا يەللىك ئىششىق كۆرۈلۈش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ.

[كېسەللىك قوزغانتقۇچى] تارقىلىشچان زۇكام ۋىرۇسلىرى كېسەللىك قوزغانتقۇچىدۇر. ئۇ، كېسەل كالىنىڭ ئۆپكە، كاناي سىرغىتمىلىرىدا، قېنىدا، تاللىمغا تۈگۈنلىرىدە ۋە ئىلىكلىرىدە ساقلىنىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] يەرلىك كالا ۋە سېغىن سىپىر-لاردا كۆپرەك، سۇ كالىلىرىدا ئازراق پەيدا بولىدۇ. 3~5 ياشلىق كالىلارغا ئاسانراق يۇقىدۇ.

باش ئەتىيازدا ۋە كەچ كۈزدە، ھاۋا رايى توساتتىن ئۆز-گەرگەندە ئاسان پەيدا بولىدۇ، بولۇپمۇ يامغۇر كۆپ ياغىدىغان مەزگىللەردە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. كالىنى زىيادە ئىشلىتىش، ئوبدان باقماسلىق، ئېغىل پاكىز بولماسلىق ياكى نەم تۇرۇش قاتارلىقلار بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىغا قوشۇمچە سەۋەب بولىدۇ.

بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى 20% چە بولىدۇ.

مۇداپىئە-داۋالاش تەدبىرلىرى قاتتىق بولىغان ئەھۋالدا، بۇ كېسەللىك تېز تارقىلىدۇ، ئۇنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى 60% كە چىقىدۇ. ئۆلۈش نىسبىتى 5% ئۆپچۆرىسىدە بولىدۇ. [كېسەللىك ئالامەتلىرى] يوشۇرۇن ۋاقتى 2~4 كۈن بولىدۇ.

كالا تۇيۇقسىز زۇكام بولىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى تېزلا $41.2 \sim 42^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، توڭلاپ تىترەيدۇ، تېرە تېمپېراتۇرىسى نورمال بولمايدۇ، كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى قىزىرىدۇ، قاپىقى ئىششىپ قالىدۇ، كۆزى ياشاڭغۇراپ، يورۇقتىن قاچىدىغان بولۇپ قالىدۇ؛ روھسىزلىنىدۇ، تىنچسىزلىنىپ ئىنجىقلايدۇ؛ بۇرۇن ئەينىكى قۇرغاق ۋە قىزىق بولىدۇ، بۇرۇندىن شىرىقلىق ماڭقا ئاقىدۇ؛ بۇرنى، كىكرىتىگى، كانىيى شىلىمىش ياللۇغلانغاندا، نەپىسى قىسىلىدۇ، بوينىنى سوزۇپ، ئاغزىنى ئېچىپ، تىلىنى چىقىرىپ تۇرىدۇ، يۆتىلىدۇ؛ نەپەس ئالغاندا خىقرايدۇ؛ ئىش-تىبى تۇتۇلىدۇ، كۆشىشى توختايدۇ، بەزىدە چوڭ قېرىنىمۇ كۆپۈپ قالىدۇ. بەزىلىرىنىڭ جاۋىغىدا ۋە كۆكرەك ساڭگىلىمىسىدا تېرە ئاستى يەللىك ئىششىقى پەيدا بولىدۇ، لىمفا تۈگۈنىلىرى يوغىناپ قالىدۇ؛ ئاياق بوغۇملىرى ئىششىيدۇ ۋە ئاغرىيدۇ، بۇ ھال ئېغىرلاشقاندا ئورنىدىن تەستە تۇرىدىغان بولۇپ قالىدۇ. بوغاز سىيىرلار بالا تاشلىۋېتىشى مۇمكىن.

بۇ كېسەل ئانچە ئۇزۇنغا سوزۇلمايدۇ، ئادەتتە 2~4 كۈندە كالىنىڭ تېمپېراتۇرىسى چۈشۈپ، كېسەللىك ئەھۋالى ياخشىلىنىدۇ.

نىشقا باشلاپ، سالامەتلىگى ئەسلىگە كېلىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش]

(1) بېقىش-باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، كالىنىڭ كېسەللىككە قارشى كۈچىنى ئاشۇرۇش، ھاۋا رايى ئۆستۈمۈت ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان پەسىللەردە، كالىلارنى جۇتتىن ساقلاش خىزمىتىنى ئوبدان ئىشلەش كېرەك.

(2) كېسەللىك كۆرۈلگەندىن كېيىن كالىلارنى تولۇق تەك-شۇرۇش، كېسەل كالىلارنى ئايرىپ چىقىپ ۋاقىتدا داۋالاش كېرەك.

(3) بۇلغانغان جايلار، كالا قوتىنى ۋە جابدۇق-سايىمانلارنى 2% لىك ئويغۇچى نائىرىننىڭ ئىسسىق ئېرىتمىسى بىلەن دېزىنفېك-سىيە قىلىش، تىزەكلەرنى ئېچىتىپ بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

[داۋالاش] يېنىك دەرىجىدە زۇكام تەككەن كالىلارنى ئاس-راش خىزمىتىنى كۈچەيتىش، ھەر كۈنى سۇغىرىپ تۇرۇش ۋە ئاسان ھەزىم بولىدىغان يەم-خەشەك ياكى كۆك چۆپ بىلەن بېقىش، مۇۋاپىق ھەركەتلەندۈرۈپ تۇرۇش كېرەك، شۇنداق قىلىنسا كالا تېز ساقىيىدۇ. ئېغىز زۇكام تەككەن كالىلارنى كېسەللىك ئالامەتلىرىگە قاراپ تۆۋەندىكىچە داۋالاش كېرەك.

(1) مۇرەككەپ ئامىنوپىرىن ياكى ئانالىگىن ئوكۇلىدىن مۇسكۇلغا 20~40 م ل ئۇرۇلىدۇ، ياكى ئامىنوپىرىن پاراشوگە-دىن 15~20 گ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(2) كۆك تومۇرغا 10% لىك گلىكوزا ئېرىتمىسىدىن 500~1000

م ل، 10% لىك كوففېين ئېرىتمىسىدىن 20 م ل ئاسكوربىك
كىسلاتا ئوكۇلىدىن 20 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ، زۆرۈر قىلىنغاندا
ئانتىبىيوتىك ۋە سۇلفانىلامىدلىق دورىلار ئوكۇل قىلىنىپ
ئۆپكە ياللۇغى قاتارلىق ئۇلانما كېسەللىكلەرنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.
(3) جۇڭىي ئۆسۈملۈك دورىلىرى بىلەن داۋالاش:

رېتسېپ:

كەۋرەك 6 مىسقال، يالپۇز 8 مىسقال، شاتارى 8 مىسقال،

زىسۇ ئۇرۇغى 8 مىسقال، جىڭجىي گۈلى 8 مىسقال، قالقانگۈل

6 مىسقال، داڭگۈي 6 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 3 مىسقال، چاكاندا

4 مىسقال، قوڭغۇرافگۈل 6 مىسقال، چۈەنجۈڭ 6 مىسقال،

گەج 5 مىسقال

بۇلار يۇمشاق سوقۇلۇپ، قايناق سۇ بىلەن كۈندە بىر

قېتىم ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

پەربۇن 1 سەر، ئوتتۇج 1 سەر، دارچىن شېخى 1 سەر،

قالقانگۈل 8 مىسقال، مۇۋەبەلسىپىت 8 مىسقال، مۈتۈڭ 8

مىسقال، ئەينولا 6 مىسقال، چاكاندا 5 مىسقال، چۈچۈكبۇيا

5 مىسقال

بۇلار يۇمشاق سوقۇلۇپ، قايناق سۇ بىلەن كۈندە بىر قېتىم

ئىچكۈزۈلىدۇ.

كۆيدۈرگە

بۇ ھايۋانلارغىمۇ، ئادەملەرگىمۇ يۇقىدىغان ئۆتكۈر، قىزىق-مىلىق، قان يۇقۇملىنىش خاراكتىرلىق يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، كىلىنىكىدا تەبىئى تۆشۈكلەردىن قان چىقىش، ئۆلۈك تولۇق قاتماسلىق، قان ئوبدان ئۇيۇماسلىق بىلەن خاراكتىرلىنىدۇ. [كېسەللىك قوزغاتقۇچى] كۆيدۈرگە تاياقچە باكتېرىيىسى كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر. ئۇ گرام بويىغىدا مۇسبى بويىلىدۇ، ھايۋان تېنىدە يەككە ھالدا ياكى كالتا زەنجىرسىمان تىزىلىپ تۇرىدۇ، ئىككى بېشى تەكشى بامبۇك بوغۇمىدەك بولىدۇ، كاپسۇلا ھاسىل قىلىدۇ؛ تەن سىرتىدا سپورا پەيدا قىلىۋالىدۇ. سپورىسىنىڭ تاشقى مۇھىتقا قارىتا قارشىلىق كۈچى يۇقۇرى بولىدۇ، تۇپراقتا 10 يىلدىن نەچچە ئون يىلغىچە ياشىيالايدۇ، قايناتقاندا 60 مىنۇتتا ئاندىن ئۆلىدۇ، يۇقۇرى بېسىملىق 110°C تا 10~15 مىنۇتتا ئۆلىدۇ. بۇ باكتېرىيىنىڭ كۆپەيگەن تەنچىسىنىڭ قارشىلىق كۈچى تۆۋەنرەك بولىدۇ، ئۇ چىرىگەن مۇھىتتا تېزلا ئۆلىدۇ. كىلىنىكىدا كۆپىنچە 0.1% لىك سىمپا خىلورىد ئېرىتمىسى، 20% لىك ئاقارتقۇچى پاراشوگى ۋە 10%~5% لىك ئويغۇچى ناترىي ئېرىتمىسى دېزىنفېكسىيە دورىسى قىلىنىدۇ. [كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] كۆيدۈرگە باكتېرىيىسى ئاسان تارقىلىدۇ، كالا، قوي، ئاتلارغا ئاسانراق يۇقىدۇ، ئۇنىڭدىن

قالسا باشقا ھايۋانلارغا يۇقىدۇ. كېسەل ئال ئاساسىي پۇقۇم مەنبەسى ھىساپلىنىدۇ. كۆيدۈرگە باكتېرىيىسى ئاجراتمىلار چىقىرىدىلار ئارقىلىق بەدەندىن چىقىرىلىدۇ، تەبىئىي تۆشۈك لەردىن چىققان قان تەركىبىدە ئەڭ كۆپ بولىدۇ. كېسەلدىن ئۆلگەن مالنىڭ ئۆلۈكى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىنمىسا، باكتېرىيە ئاسانلا سىپورا ھاسىل قىلىۋېلىپ، ئۇزاق مەزگىلگىچە توپىدا ساقلىنىپ تۇرىدۇ-دە، كەلكۈن كەلگەندە خەتەرلىك يۇقۇم مەنبەسى بولۇپ قالىدۇ.

كۆيدۈرگە ئاساسەن ھەزىم قىلىش ۋە نەپەس ئېلىش يوللىرى، تېرە جاراھىتى ئارقىلىق يۇقىدۇ، قان شورىغۇچى قۇرۇتلارمۇ ئۇنى تارقىتىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] كۆيدۈرگە تاياقچە باكتېرىيە-سى ئورگانىزىمنىڭ مەلۇم قىسمىغا ئورنىشىۋالغاندىن كېيىن يېتىلىپ-كۆپىيىپ كاپسۇلا ھاسىل قىلىدۇ. بۇنداق كاپسۇلا ئاق قان ھۈجەيرىلىرىنىڭ باكتېرىيىنى يېمىش رولىنى توساپ، ئۇنىڭ زىيان يەتكۈزۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدۇ. باكتېرىيە ئۆزىدىن زەھەرلىك ماددا ئىشلەپچىقىرىپ، قىسمەن ئورۇندا قاناش، سۇلۇق ئىششىق ۋە نېكروز پەيدا قىلىپ، قانغا يىلمىسىمان ئىنفىلىترات ھاسىل قىلىدۇ، شۇڭا كىلىنىكىدا قىسمەن ئورۇندا چەكلىك ياللۇغلۇق ئىششىق (كۆيدۈرگە) كۆرۈلىدۇ. ئورگانىزمنىڭ قارشىلىق كۈچى تۆۋەنلىگەندە، كۆيدۈرگە تاياقچە باكتېرىيىسى لىمفا تومۇرلىرى ئارقىلىق قانغا ئۆتىدۇ.

دە، قاندا تازا كۆپىيىپ سېتىۋېلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن كېسەل مال بىرنەچچە سائەتكە قالمايلا ئۆلىدۇ. [كېسەللىك ئالامەتلىرى] يوشۇرۇن ۋاقتى 1~3 كۈن بولىدۇ، بەزىلىرىنىڭكى 14 كۈنگە يېتىدۇ. كىلىنىكىدا ئەڭ ئۆتكۈر، ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما دىگەن 3 تىپقا ئايرىلىدۇ.

ئەڭ ئۆتكۈر تىپ: كالا تۇيۇقسىز ئاغرىپ قالىدۇ، دەلدەڭشىپ ماڭىدۇ، نەپەس ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ، كۆرۈنىدىغان شىللىق پەردىلىرى كۆكرىدۇ، پۇتۇن بەدىنى تىترەيدۇ، بەزىلىرىنىڭ ئېغىز-بۇرىنىدىن قانداق كۆپۈك چىقىدۇ، پۇرۇڭى ۋە جىنىسى يولىدىن قان ئاقىدۇ، شۇنىڭ بىلەن كالا بىرنەچچە سائەت ئىچىدىلا ئۆلىدۇ.

ئۆتكۈر تىپ: كالانىڭ تېمپېراتۇرىسى 40°C ~ 42°C قا چىقىدۇ، تومۇر سوقۇشى ۋە نەپەس قېتىم سانى ئاشىدۇ، ئىشتىيى ناچار-لايدۇ ياكى تۇتۇلىدۇ، كۆشىشى توختايدۇ، چوڭ قېرىنى كۆپىدۇ؛ تىزىڭىدە قان بولىدۇ، بوغاز سىيىر بالا تاشلايدۇ، سېغىن سىيىردىن سۈت چىقمايدىغان بولۇپ قالىدۇ. كېسەلى ئېغىر كالىلار تىنچىسىزلىنىپ، ئۈرگۈپ مۆرەيدۇ، كېسەلنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە قاتتىق روھسىزلىنىدۇ، نەپەس ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ، كۆرۈنىدىغان شىللىق پەردىلىرى كۆكرىدۇ، قانلىق چېكىتىلەر پەيدا بولىدۇ، ئاخىرىدا تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ، سىپازما بولۇپ قالىدۇ، ھەتتا ئۆلۈپ قالىدۇ.

سوزۇلما تىپ: كالانىڭ تىلى ئىشىپ قالىدۇ، قارامتۇل

قىزغۇچ رەڭگە كىرىپ قالىدۇ، بويۇن، كۆكرەك، بەل، تۈن ئۈچەي ۋە تاشقى جىنسى يول قىسمىلىرىدا سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، قىسمەن ئورۇننىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ. بەزىدە بۇ جاي يېرىلىپ، ئۇنىڭدىن قىزغۇچ سېرىق سۇ ئېقىپ چىقىدۇ. كالىنىڭ تىزىكىدە قارا مايغا ئوخشاش قان بولىدۇ، پۇرۇكى ئەتراپىدا سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، بەزى كېسەل كالىلار ئورۇقلاپ، 2~3 ئايغىچە ئەسلىگە كېلەلمەيدۇ.

[دىئاگنوز قويۇش] ئېپىدېمىيىلىك ئانالىز، باكتېرىئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ۋە سېرولوگىيىلىك دىئاگنوزغا ئاساسەن ھۆكۈم قىلىندۇ.

(1) باكتېرىئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش:

كېسەللىك ئەۋرىشكىسى ئېلىش: قۇلاق ئۇچىدىن قان ئېلىپ (كېسەللىك قوزغاتقۇچى تارقىلىپ كەتمەسۇن ئۈچۈن، قان ئېلىپ بولۇپلا قۇلاقنى داغلاپ، قاننى توختىتىش كېرەك) 4 پارچە ئەينەككە تامچىتىلىدۇ، قان ئۆزلۈكىدىن قۇرۇغاندىن كېيىن، ئۇ مايلىق قەغەزگە ئورنىلىپ تەجرىبىخانىغا تەكشۈرۈپ بېرىشكە ئەۋەتىلىدۇ. ياكى سول تەرەپ 17- ۋە 18- قوۋۇرغىلار ئارىسىدىن بىر ئېغىز ئېچىلىپ تالدىن ئەۋرىشكە ئېلىنىدۇ ۋە ئۇ باكتېرىيىسىزەندۈرۈلگەن قۇتىغا قاچىلىنىپ تەجرىبىخانىغا تەكشۈرۈپ بېرىشكە ئەۋەتىلىدۇ.

بويىپ تەكشۈرۈش: ئەۋرىشكىنى ئىشقارلىق مېتىلېن كۆك بويىغى بىلەن بويىپ 2~3 مىنۇت قىزدۇرغاندىن كېيىن، يۇيۇپ،

قۇرۇتۇپ مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە، كالتا، زەنجىرسىمان، ئۇچى تەكشى، كاپسۇلىلىق تاياقچە باكتېرىيىلەر كۆرۈنسە، شۇنىڭغا ئاساسەن دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ.

(2) سېرولوگىيىلىك تەكشۈرۈش: كېسەل بولۇپ ئۆلگەن كالىنىڭ تېرىسى ياكى باشقا مەھسۇلاتلىرىدىن بىر گىرام ئەۋرىشكە ئېلىپ ھاۋانچىدا سوققاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا 10 م ل فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە ئارىلاشتۇرۇش ۋە ئۇنى تەجرىبە نەيچىسىگە قاچىلاش، ئاندىن ئۇنى مۇنچا قازىنىدا 10~15 مىنۇت قىزدۇرۇپ تاش پاختىدا سۈزۈش، ئاخىردا ئىنچىكە ئەي-نەك نەيچە بىلەن سۈمۈرۈپ ئېلىپ تىنما قان زەردىۋى سۇيۇق-لۇغى ئۈستىگە قويۇش كېرەك، 2~5 مىنۇتتىن كېيىن ئىككى سۇيۇقلۇقنىڭ ئۇچراشقان يۈزىدە ئاق ھالقى پەيدا بولسا، بۇنىڭغا كۆيدۈرگە دەپ ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ.

(3) پاتوئاناتومىيىلىك تەكشۈرۈش: كۆيدۈرگە تاياقچە باكتېرىيىسىنىڭ سىپورا ھاسىل قىلىۋېلىشى ۋە تۇپراقنى بۇلغى-شىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئادەتتە يېرىپ تەكشۈرۈش مەنىسى قىلىنىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا، قاتتىق دېزىنفېكسىيە قىلىش ۋە كېسەللىك قوزغاتقۇچىنىڭ تارقىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش شەرتى ئاستىدا، يېرىپ تەكشۈرۈشكە بولىدۇ. يېرىپ تەكشۈر-گەندە، كۆپىنچە، تېز چىرىش، كۆپۈش، ئۆلۈك تولۇق قاتماسلىق، تەبىئى تۆشۈكلەردىن قان چىقىش، قان ياخشى ئۇيۇماسلىق (كۆمۈر ھېيدەك بولۇپ قېلىش)، تېرە ئاستى ۋە

شېرىلىق پەردىلەر ئاستىدىن قانغاق ئىنقىلىپاتلار چىقىش،
تال كۆرۈنەرلىك يوغىناپ كېتىش، تال ئىلىكى پارامۇل قىزىچ
رەڭگە كىرىپ قىلىش، ئۇماچتەك يۇمشاپ كېتىشتەك ئۆزگىرىشلەر
كۆرۈلىدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش]

(1) كۆيدۈرگە كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان جايلاردىن كالا ۋە
ئوت-سامان قاتارلىقلارنى سېتىپ ئېچىپىلىشنى قاتتىق مەنئى
قىلىش كېرەك، نىمە سەۋەپتىن ئۆلگەنلىكى ئېنىق بولمىغان
ياكى تۇيۇقسىز ئۆلگەن كالىلارنى سويۇپ يېمىشكە بولمايدۇ،
مال دوختۇرى ئۇنىڭغا ئېنىق دىئاگنوز قويغاندىن كېيىن،
ئاندىن ئۇنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

(2) ھەر يىلى بىر قېتىم مۇداپىئە ئوكۇلى سېلىنىدۇ.
كۆيدۈرگىنىڭ زەھەرسىزلەندۈرۈلگەن سىپورلىق ۋاكسىنىسىدىن
چوڭ كالىلارغا 1 م ل دىن، بىر ياشتىن تۆۋەن موزايىلارغا 0.5
م ل دىن تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. ياكى بولمىسا كۆيدۈر-
گىنىڭ 2-نومۇرلۇق سىپورلىق ۋاكسىنىسىدىن چوڭ كالىلار ۋە
موزايىلارغا 1 م ل دىن ئوكۇل قىلىنىسىمۇ بولىدۇ. ئوكۇل
قىلىنىپ 14 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئىممۇنىت پەيدا بولىدۇ ۋە
ئۇ بىر يىل ساقلىنىدۇ.

(3) چارۋا مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتلىرى
ۋە قۇشخانلار كۆيدۈرگە بولغان چارۋا مال مەھسۇلاتلىرىنى
تەكشۈرۈش ئىشىغا ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك.

(4) كۆيدۈرگە پەيدا بولغاندا، دەرھال يۇقۇرسىغا مەلۇم قىلىش، خوشنا ئورۇنلارغا خەۋەر قىلىش، يۇقۇم رايونىنى ئايرىپ كارانتىن قىلىش، كېسەل كالىلارنى ئايرىپ داۋالاش كېرەك. كېسەل كالا تۇرغان قوتان، جاي ۋە كېسەل كالىغا ئىشلەتكەن سايمانلارنى 20% لىك ئاقارتقۇچى پاراشوك ئېرىتمىسى، ياكى 0.1% لىك سىمپا خلورىد ئېرىتمىسى، ياكى 5~10% لىك ئىسسىق ئويغۇچى ناترىي ئېرىتمىسى بىلەن تولۇق دېزىن-فېكسىيە قىلىش كېرەك. ئۆلۈك ۋە ئۇنىڭ چىقىرىندىلىرى بىلەن بولغانغان تۆشەك چۆپ، يەم-خەشەكلەرنى ماشىنا ياكى ھارۋىغا ھىم قاچىلاپ كۆزلەنگەن جايغا ئېيىرىپ كۆيدۈرۈش ياكى چوڭقۇر كۆمۈش (ئۆلۈك كۆمىدىغان ئورنىنىڭ تېگىگە ۋە ئۆلۈكنىڭ ئۈستىگە خام ھاك ۋە دېزىن-فېكسىيە دورىلىرىدىن چېچىپ، ئاندىن توپا بىلەن كۆمۈش) لازىم.

(5) كېسەل كالىغا يېقىنلاشقان كالىلارنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى ئۇدا ئىككى ھەپتىگىچە ئۆلچەپ كۆرۈپ، تېمپېراتۇرىسى يۇقۇرى بولغانلىرىنى دەرھال ئايرىپ چىقىپ داۋالاش كېرەك. (6) يۇقۇم رايونى ئەتراپىدىكى كالىلارغا جىددى تۇتۇش قىلىپ مۇداپىئە ئۆكۈلى ئۇرۇش كېرەك. (داۋالاش)

(1) كۆيدۈرگىنىڭ ئىممۇنلۇق قان زەردىۋى چوڭ كالىغا 100~300 مىل دىن كۆك تومۇرغا ياكى تېرە ئاستىغا ئۆكۈل قىلىندۇ.

(2) مۇسكۇلغا پىنتىسىللىنىدىن 1~2 مىليون بىرلىك، سىرېپتومىتىسىدىن 2 مىليون بىرلىك (كۈندە 4 قېتىمىدىن ئۆدە 3 كۈن) ئوكۇل قىلىندۇ.

(3) كۆك تومۇرغا 20% لىك ناتىرىي سۇلفادىئازىن ياكى ناتىرىي سۇلفاتىئازول ئېرىتمىسىدىن 80~100 م ل (ھەر 4 سائەتتە بىر قېتىمىدىن) ئوكۇل قىلىندۇ، 3 كۈن بىر داۋالاش باسقۇچى قىلىندۇ.

(4) تېررامىتسىنىدىن بىرىنچى كۈنى 2 گ، 2-ۋە 5- كۈنلىرى 1 گ دىن مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىندۇ.

(5) يېڭى ئارىسپىنئامىن («914») ھەرك گ تەن ئېغىرلىقىغا 0.015 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ ۋە 30~50 م ل فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىدە ئېرىتىلىپ كۆك تومۇرغا ئوكۇل قىلىندۇ، ئوكۇل قىلىشتىن ئىلگىرى يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلاردىن ئوكۇل قىلىندۇ.

يۇقۇرقى داۋالاش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىش بىلەن بىرگە، كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ، يۈرەك كۈچەيتكۈچى، زەھەر قايتۇرغۇچى، سۈيدۈك ھەيدىگۈچى ۋە ئاشقازان-ئۈچەيلىرىنى دېزىنفيكسىيىلىگۈچى دورىلار قوشۇپ ئىشلىتىلسە، سېرولوگىيىلىك داۋالاش ئۇسۇلى ۋە باشقا ھەر خىل داۋالاش ئۇسۇللىرىمۇ بىرلەشتۈرۈپ قوللىنىلسا، ئۈنۈمى تېخىمۇ ئوبدان بولىدۇ.

قانغاق سېپتسىمىيە

بۇ كېسەللىك پاستېرىللو دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ، قان يۇقۇم-لىنىش خاراكتېرلىق ئۆتكۈر يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، كالا ۋە باشقا ھايۋانلاردا كۆرۈلىدۇ، كىلىنىكىدا تۇيۇقسىزلا يۇقۇرى قىزىتما ۋە ئۆپكە ياللۇغى پەيدا بولۇش، بەزىدە ئۆتكۈر ئاشقازان-ئۆچەي ياللۇغى ۋە تېرە ئاستى توقۇلمىلىرىدا سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولۇش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] پاستېرىللا تاياقچە باكتېرىيىسى كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر. ئۇ ئۇششاق، تاياقسىمان كېلىدۇ، ئادەتتىكى بويقلاردا بويىلىدۇ، گرام بويىغدا مەنپى بويىلىدۇ. قان ياكى توقۇلمىدىن ئەۋرىشكە ئېلىپ مېتىلېن كۆك بويىغى بىلەن بويىغاندا، ئۇنىڭ ئىككى ئۇچى قېنىق بويىلىدۇ، شۇڭا ئۇ ئىككى ئۇچى بويىلىدىغان باكتېرىيە دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ سىپورا ھاسىل قىلمايدۇ، قۇيرۇقسىز بولىدۇ، ھەركەت قىلالايدۇ. زەھەرلەشچانلىغى كۈچلۈك بولغىنى شىلىمىسمان كاپسۇلا ھاسىل قىلىدۇ، سۈنئىي ئۆستۈرگۈچلەردە ئۇنىڭ كاپسۇلىسى يوقىلىدۇ.

پاستېرىللا باكتېرىيىسىنىڭ قارشىلىق كۈچى ئاجىزراق بولىدۇ، 70°C تا $10\sim 5$ مىنۇتتا ئۆلىدۇ، ھاۋادا 48 سائەتتە ئۆلىدۇ، قاندا زەھەرلىكلىگىنى $6\sim 10$ كۈنگىچە ساقلىيالايدۇ، قىغدا 30

كۈنگىچە ياشىلايدۇ. 5% لىك كاربولىكا ئېرىتمىسى، 0.2% لىك سىمپا خىلورىد ئېرىتمىسى ۋە 10% لىك ئاقارتىغۇچى پاراشوك ئېرىتمىسى قىسقا ۋاقىت ئىچىدىلا بۇنداق باكتېرىيىنى ئۆلتۈرەلەيدۇ.

[كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] يەرلىك كالا، سۇ كالىسى، قوتاز-لارغا ئاسانراق يۇقىدۇ، ھەممە پەسىلدە كۆرۈلىدۇ، كەچ كۈزدە، باش ئەتىيازدا، ھاۋا تېز ئۆزگىرىدىغان چاغلاردا كۆپرەك پەيدا بولىدۇ، تولاراق چاچما ھالەتتە تارقىلىدۇ.

پاستېرىللا باكتېرىيىسى كېسەل كالىنىڭ ئىچكى ئەزالىرى ۋە قەيندا ساقلىنىدۇ، ئاجراتمىلار، چىقىرىندىلار بىلەن بىللە بەدەن سىرتىغا چىقىرىلىدۇ، بۇلغانغان يەم-خەشەك، سۇ، ھاۋا قاتارلىقلار ئۇنى تارقىتىدۇ، ئۇ ھەزىم قىلىش، نەپەس ئېلىش يوللىرى ۋە زەخمىلەنگەن تېرە، شىلىق پەردىلەر ئارقىلىق كالا بەدىنىگە كىرىپ كېسەللىك پەيدا قىلىدۇ. ساغلام كالىلار-نىڭ يۇقۇرقى نەپەس يولى ۋە ھەزىم قىلىش يوللىرىدا زەھەر-لىكلىكى ئاجىزراق بولغان پاستېرىللا باكتېرىيىلىرى پارازىت ھالدا ياشايدۇ. بېقىش-باشقۇرۇش مۇۋاپىق بولماسلىق، سوغاق تېگىش، زورۇقۇش، ئېچىرقاپ كېتىش، زۇكام تېگىش قاتارلىقلار بۇ كېسەللىكنىڭ قوشۇمچە سەۋەپلىرىدۇر.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يوشۇرۇن ۋاقتى 2~4 كۈن بولىدۇ. كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرىگە ئاساسەن 3 تىپقا ئايرىلىدۇ. ئۆتكۈر قان يۇقۇلمىنىش تىپى: كالىنىڭ تېمپېراتۇرىسى

تۇيۇقسىزلا $40 \sim 42^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، روھى چۈشكۈنلىشىدۇ، ئىشتىي تۇتۇلىدۇ، كۆشى توختايدۇ، توڭلاپ تىترەيدۇ، نەپەس ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ، پۈتۈن بەدىنى ئاجىزلايدۇ، بۇرۇن ئەينىگى قۇرۇيدۇ، شىلىق پەردىلىرى كۆكرىدۇ، ئىچى سۈرىدۇ، تىزىگى شىلىمىش قۇيۇقلۇق، تالالىق ماددا ياكى قان ئارىلاش كېلىدۇ، بەزىدە سۈيدۈگى قان ئارىلاش كېلىدۇ. كالا 12~24 سائەت ئىچىدە ئۆلۈپ قالىدۇ.

سۇلۇق ئىششىق تىپى: كالىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ، ئىشتىي تۇتۇلىدۇ، باش، بويۇن، كىكرەك ۋە كۆكرەك ئالدى تېرە ئاستى توقۇلمىلىرىدا ياللۇغلۇق سۇلۇق ئىششىق تېز پەيدا بولىدۇ، تىلى ۋە ئۇنىڭ ئۆپچۆرىسىدىكى توقۇلمىلىرى ئىششىيدۇ، ئاغزىدىن شال ئاقىدۇ، نەپەس ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ، بەزىدە ئىششىق ئاياق ۋە چاترىغىچە تارقىلىدۇ، كۆزىنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى قىزىرىدۇ، ئىششىيدۇ، كۆزى ياشاغۇ-رايدۇ. كېسەللىك جەريانى قىسقا بولىدۇ، كالا تولاراق تۇنجۇ-قۇش ياكى ئىچى سۈرۈش بىلەن ئۆلۈپ قالىدۇ.

كۆكرەك ياللۇغى تىپى: ئۆتكۈر تالالىق كۆكرەك پەردە-ئۆپكە ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، كالىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ $40 \sim 41.5^{\circ}\text{C}$ تا تۇراقلىشىدۇ، كالا ئاغرىتىدىغان قۇرۇق يۆتەل ياكى ھۆل يۆتەل بولۇپ قالىدۇ، كالىنىڭ بۇرىندىن شىرلىق ياكى يىرىڭلىق ماڭقا ئېقىپ تۇرىدۇ، نەپەس ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ، تىنىغىدىن سېسىق پۇراق كېلىدۇ. كالىنىڭ كۆكرەك

قىسمىنى چېكىپ كۆرگەندە، تۇتۇق ئاۋاز چىقىدۇ ۋە كالا ئاغرىقىسىنىدۇ؛ تىگشاپ تەكشۈرگەندە، كاناچىدىن ئىنىق ئاۋازى ياكى خىرىلداش ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ، بەزىدە سۈركىلىش ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ. كېسەللىك سەل ئۇزۇنغا سوزۇلسا، كاللىنىڭ قان ئارىلاش ئىچى سۈرىدۇ.

[دىئاگنوز قويۇش]

(1) پاتوئاناتومىيىلىك تەكشۈرۈش: كاللىنىڭ كىكرتەك قىسمىدا سۆسۈن رەڭلىك سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، شىللىق پەردىسى، شىرىلىق پەردىسى ۋە ئىچكى ئەزالىرى چېكىتىسىمان قانايىدۇ. كاللىنىڭ تېلىدا روشەن ئۆزگىرىش بولمايدۇ، لىمفا تۈگۈنلىرى ئۆتكۈر ئىششىيدۇ. كۆكرەك يالۇغى تىپىدىكى ئۆزگىرىش كۆكرەك بوشلۇغى ۋە ئۆپكەدە ئەڭ روشەن كۆرۈلىدۇ، كۆكرەك بوشلۇغىدا تەركىۋىدە كۆپلەپ تالالىق ئاقسىل تۈگۈنچەكلىرى بولغان سىرغىتما سۇيۇقلۇق بولىدۇ، ئۆپكەنىڭ كەسمە يۈزىدە قىزىل جىگەرسىمان ئۆزگىرىش بولىدۇ، كۆكرەك پەردىسى يېپىشىپ قالىدۇ. ھەزىم قىلىش يولىغا يامرىغاق قان چۈشىدۇ، ئۇنىڭدا قانلىق چېكىتلەر بولىدۇ. تېرە ئاستى توقۇلمىسى ۋە مۇسكۇل تالا ئارىلىقلىرىدا يىلىمىسىمان ئىنقىلىراتلار كۆرۈلىدۇ.

(2) باكتېرىئولوگىيىلىك دىئاگنوز قويۇش: يۈرەك قېنى ياكى تال، لىمفا تۈگۈنلىرىدىن ئەۋرىشكە ئېلىنىدۇ، بۇ سۈرتمە تەبىئىي ھالدا قۇرۇتۇلۇپ، ئوت يالقۇنىدا قاتۇرۇلغانىدىن

كېيىن، مېتېلېن كۆك بويىغىدا 2 مىنۇت بويىلىدۇ، بۇنى ئاۋال سۇدا چايقاپ، ئاندىن قۇرۇتۇپ مىكروسكوپتا تەكشۈرگەندە، ئىككى ئۇچى قېنىق بويالغان تاياقچە باكتېرىيە كۆرۈلسە، شۇنىڭغا ئاساسەن دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ.

(3) پەرقلەندۈرۈپ دىئاگنوز قويۇش:

كۆيدۈرگىدىن پەرقلەندۈرۈش: قانغاق سېپتسېمىيە سۇلۇق ئىششىق كىكرتەك قىسمى بىلەنلا چەكلىنىش، شىرىلىق سۇيۇقلۇق بولۇش، ئۆلۈك تولۇق قېتىش، قان ئاسان ئويۇش، تال ئۆتكۈر خاراكتېرلىق ئىششىماسلىق جەھەتلەردىن كۆيدۈر-گىگە ئوخشىمايدۇ.

قاراساندىن پەرقلەندۈرۈش: قاراساندا مۇسكۇلنىڭ قېلىن جايلىرىدا ئىششىق پەيدا بولىدۇ، ئۇنىڭدىن شىتىرلىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ، ئۇنى كەسكەندە گازلىق كۆپۈك چىقىدۇ ۋە ناھايىتى سېسىق پۇراق كېلىدۇ، بۇ جەھەتلەردىن قانغاق سېپتسېمىيىگە ئوخشىمايدۇ.

ئالا ئۆپكەدىن پەرقلەندۈرۈش: قانغاق سېپتسېمىيە تۇيۇقسىز يۈز بېرىدۇ، كېسەللىك جەريانى قىسقا بولىدۇ، كېسەل كالا ئۆلگەندىن كېيىن شىللىق پەردە، شىرىلىق پەردە ۋە ئىچكى ئەزالار قانايىدۇ؛ ئالا ئۆپكەدە كېسەللىك ئۆزگىرىشى كۆكرەك بوشلۇغىدىكى ئەزالار دىلا كۆرۈلىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش]

(1) بېقىش - باشقۇرۇشنى كۆچەيتىش، قوتان تازىلىغى،

يەم - خەشەك تازىلىغى ۋە سۇ تازىلىغى خىزمىتى ياخشى ئىشلەش، زۇكام ۋە زورۇقۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

(2) كېسەللىك كۆرۈلگەن رايونلاردا ھەر يىلى مۇشۇ كېسەللىكنىڭ ئاليۇمىن ھىدروكسىدلىق - فورمالىنلىق ۋاكسىنىنى سىنى ئوكۇل قىلىپ مۇداپىئە كۆرۈش، تەن ئېغىرلىغى 100 ك گ دىن تۆۋەن كالىلارغا 5 م ل دىن، 100~200 ك گ كېلىدە - غانلىرىغا 10 م ل دىن، 250 ك گ دىن ئاشىدىغانلىرىغا 15 م ل دىن تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىپ تۇرۇش لازىم.

(3) كېسەل كالىنى ئايرىپ داۋالاش، كالىلارنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى ئومۇمى يۈزلۈك تەكشۈرۈپ، تېمپېراتۇرىسى ئۆرلىگەندە - لىرىنى دەرھال ئايرىپ داۋالاش كېرەك. بۇلغانغان كالا قوتاندە - لىرىنى 5% لىك ئويغۇچى ناتىرىي ئېرىتمىسى، 10% لىك ھاك سۈيى، 3% لىك ئىسسىق كرىئولىن ئېرىتمىسى، 20% لىك ئاقارتقۇچى پاراشوك ئېرىتمىسى بىلەن دېزىنفېكسىيە قىلىش، تۆشەك چۆپ، تىزەك قاتارلىقلارنى ئېچىتىپ بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. داۋالاش قىممىتى يوق كالىلارنى بەلگىلەنگەن جايغا ئېيىرىپ سويۇۋېتىش كېرەك. كېسەللىك ئۆزگىرىشى بار ئەزا ۋە توقۇلمىلارنى كۆيدۈرۈش ياكى چوڭقۇر كۆمۈش لازىم.

[داۋالاش] كېسەل كالىلارنى ئاسراش ئىشنى كۈچەيتىپ، ئۇلارنى ئىسسىق ۋە كۈن نۇرى ئوبدان چۈشىدىغان قوتاندا ئاسان ھەزىم بولىدىغان ۋە ئوزۇقلۇق ماددىسى كۆپ بولغان يەم - خەشەك بىلەن بېقىش لازىم.

(1) ئانتىبىيوتىك دورىلار بىلەن داۋالاش: مۇسكۇلغا يېنىتە-سىلىندىن 2~3 مىليون بىرلىك، سترېپتومىتسىندىن 1~2 مىليون بىرلىك (كۈنىگە 2~3 قېتىم) ئوكۇل قىلىندۇ، ياكى مۇسكۇلغا تېررامىتسىندىن كۈنىگە 1~2 گ دىن ئوكۇل قىلىنسۇمۇ بولىدۇ.

(2) سۇلفانىلامىدلىق دورىلار بىلەن داۋالاش: كۆك تومۇرغا 20% لىك سۇلفادىئازىن (ياكى سۇلفاتىئازول) ئېرىتمىسىدىن 80~100 م ل (كۈنىگە 2 قېتىم) ئوكۇل قىلىندۇ، ئۇزاق تەسىر كۆرسىتىدىغان سۇلفانىلامىددىن 20~30 گ ئىچكۈزۈلسۇمۇ بولىدۇ.

(3) يېڭى ئارسىپىنئامىن بىلەن داۋالاش: ئۆپكە ياللۇغىنى داۋالاشتا، بۇ دورا ھەر ك گ تەن ئېغىرلىغىغا 0.015 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ ۋە 30~50 م ل فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىدە ئېرىتىلىپ كۆك تومۇرغا ئوكۇل قىلىندۇ.

(4) كېسەللىك ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالاش: بۇنىڭدا يۈرەك كۈچەيتكۈچى، سۇيۇقلۇق تولۇقلىغۇچى ۋە قىزىتما قايتۇرغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

تۇبېركۇلىوز

تۇبېركۇلىوز كالىلاردا بولىدىغان سوزۇلما خاراكتىرلىق يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، تولاراق سېغىن سىيرلاردا

كۆرۈلىدۇ، ئادەمگىمۇ، چارۋا ماللارغىمۇ يوقىدۇ.
[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] تۇبېركۇليوز تايافە باكتېرىيىسى
كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر. ئۇ، ئومۇمەن، ئىككى ئۇچى دېنماق
ئىنچىكە - ئۇزۇن ياكى سەل ئېگىلگەن بولىدۇ، ھەركەتلەنمەيدۇ،
كاپسۇلا ۋە سىپورا ھاسىل قىلمايدۇ، كۆپىنچە تاق ياكى تۈز
قاتارلىشىپ تۇرىدۇ. ئۇ گرام بويىغىدا مۇسبى بويىلىدۇ،
باكتېرىيە تەنچىسىنىڭ سىرتىدا بىر قەۋەت مۇسسىمان قاپ
بولغانلىقتىن، ئادەتتە ئاسانلىقچە بويالمايدۇ، شۇڭا تولراق
كىسلاتاغا قارشى بوياش ئۇسۇلى بىلەن بويىلىدۇ، بۇنىڭدا
تۇبېركۇليوز باكتېرىيىلىرى قىزىل، باشقا باكتېرىيىلەر كۆك
بويىلىدۇ.

تۇبېركۇليوز باكتېرىيىسىنىڭ تاشقى مۇھىتقا بولغان قارشىلىق
كۈچى كۈچلۈكرەك بولىدۇ، قۇرغاق بەلغەمدە ۋە چاڭ - توزاڭدا
10 ئاي، چىرىگەن مۇھىتتا 6 ئاي، زەي مۇھىتتا 5~9 ئاي،
گەندە ۋە تۇپراقتا 6~7 ئايدىن ئارتۇق، كالا سۈتىدە 5~9
ئاي، سوغاق ساقلانغان سېرىق مايدا 10 ئاي ياشايدۇ. ئۇ تىك
چۈشكەن كۈن نۇرىغا سېزىمچان كېلىدۇ، شۇڭا بەلغەم تەركۈد -
دىكى باكتېرىيىلەر 30~120 مىنۇتتىلا ئۆلىدۇ. بەلغەمدىكى
باكتېرىيىلەر قاينىتىلسا 5 مىنۇتتا ئۆلىدۇ. سۈتتىكى باكتېرىيىلەر
 60°C دا 15~20 مىنۇتتا ئۆلىدۇ. ئادەتتە 5% لىك كاربولىكا
ئېرىتمىسى ۋە لىزول ئېرىتمىسىدە 24 سائەتتە، 5% لىك فورمال -
لىن ئېرىتمىسىدە 12 سائەتتە ئۆلىدۇ. تۇبېركۇليوز باكتېرىيىسى

يۇقۇش ئوبېكتىغا ئاساسەن ئادەملەرگە يۇقىدىغان تىپ، كالىلارغا يۇقىدىغان تىپ ۋە قۇشلارغا يۇقىدىغان تىپ دەپ 3 تىپقا ئايرىلىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] بۇ كېسەللىك سېغىن سىيرلارغا ئەڭ ئاسان يۇقىدۇ، ئوچۇق تۇبېركۇليوز بولغان كېسەل كالىلار ئاساسىي يۇقۇم مەنبەسى ھىساپلىنىدۇ. بۇ باكتېرىيىلەر ماڭقا، بەلغەم، شۆلگەي، تىمزەك، سۈيدۈك، سۈت ۋە يۆتەلگەندە ھەم چۈشكۈرگەندە چىققان چاچراندىلار ئارقىلىق تاشقى مۇھىتقا تارقىلىپ، يەم-خەشەك، سۇ، ھاۋا ۋە مۇھىتنى بۇلغايدۇ. چوڭ كالىلار كۆپىنچە نەپەس يوللىرى ئارقىلىق يۇقۇملىنىدۇ، موزايىلار تولاراق ھەزىم قىلىش يوللىرى ئارقىلىق يۇقۇملىنىدۇ. ئېغىلنىڭ قىستائىلىغى، نەم، دىمىق، قاراڭغۇ بولۇشى، قاتتىق ئىشلىتىش، يەم-خەشەكتە ۋىتامىن ۋە مىنېرال ماددىلارنىڭ كەمچىل بولۇشى قاتارلىقلار تۇبېركۇليوزنىڭ پەيدا بولۇشىغا قوشۇمچە سەۋەب بولىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] تۇبېركۇليوز باكتېرىيىلىرى بەدەنگە كىرگەندىن كېيىن، ئۆپكەدە كۆپىيىپ قىسمەن دائىرىلىك سرغىتمىلىق ياكى ئۆسمىلىك ياللۇغ پەيدا قىلىدۇ، نەتىجىدە تورسىمان ئىچكى تېرە ھۈجەيرىلىرى ياللۇغ بولغان جايغا يىغىلىپ ۋە ئۆزگىرىپ ئالاھىدە بولغان ئۈستىكى تېرىسىمان ھۈجەيرىلەرگە ۋە يوغان-يوغان ھۈجەيرىلەرگە ئايلىنىدۇ-دە، لىمفا شارچىسى ۋە تالا ماددىسى تورلىرىغا ئورنىلىپ قوناقىتەك

ھەتتا توخۇ تۇخۇمىدەك يوغانلىقتىكى كۆل دەك ياكى سۇس سېرىق بۆرتىمىلەرنى شەكىللەندۈرىدۇ. ياللۇغ بولغان جايدا قان تومۇرلىرى كەمچىل، ئوزۇقلىنىش ناچار بولىدىغان بولغاچقا مەركىزىي توقۇلمىلار چىرىپ پارچىلىنىدۇ، بەزىدە ئۇ يىرىگىلاپ بارا-بارا ئىرىمچىكسىمان ماددىغا ئايلىنىدۇ. بۇ خىل ماددا كالتىسى تۈزىنى ئىنتايىن ئاسان شۇمۇرۇۋالىدىغان بولغاچقا، كالتىسى شۇ جايدا تىنىپ توپلىنىدۇ-دە، كالتىسى ئوچىقى شەكىللىنىدۇ. تۇبېركۇليوز باكتېرىيىلىرى ئاشۇ كالتىسى ئۈچە-غىدا چەكلىنىپ قېلىپ ئەتراپىغا تارقىلالمايدۇ. ئورگانىزىمنىڭ قارشىلىق كۈچى ئاجىزلاشقاندا ياكى كالتىسى ئوچىقى شەكىللەنمىشتىن ئىلگىرى، تۇبېركۇليوز بۆرتىمىلىرى يۇمشاپ يېرىلىدۇ-دە، تۇبېركۇليوز باكتېرىيىلىرى يېڭىۋاشتىن قانغا ئۆتۈپ، باشقا توقۇلما ۋە ئەزالارغا تارقىلىپ، ئۇلانما خاراكتىرلىق كېسەللىك ئوچاقلارنى ھاسىل قىلىپ، كېسەللىكنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ. يۇم-شاپ يېرىلغان تۇبېركۇليوز بۆرتىمىلىرى كاناي ئارقىلىق سىرتقا تىنماي باكتېرىيە چىقىرىدۇ، بۇ ئوچۇق تۇبېركۇليوز ھىساپلىنىدۇ.

{كېسەللىك ئالامەتلىرى} يوشۇرۇن ۋاقتى ئۇزۇن بولىدۇ، ئادەتتە 16~45 كۈنگە يېتىپ بارىدۇ، كۆپىنچە سوزۇلما خاراكتىرلىق بولىدۇ.

ئۆپكە تۇبېركۇليوزىدا: كالا دەسلەپتە كالتا-كالتا قۇرۇق يۆتىلىدۇ، كېيىن ئاغرىقىسىنىپ كۆپ يۆتىلىدۇ، ئەتىگەنلىكى سۇ

ئىچكەن ۋە ھەركەت قىلغاندىن كېيىن. يۆتەل كۈچىيىدۇ ھەمدە يۆتەلگەندە شىلىمىش ياكى يىرىڭلىق ئاجراتمىلار چىقىدۇ. كۆك-رەڭ قىسمىنى تىڭشاپ تەكشۈرگەندە، كانايچە ئاۋازى ۋە قۇرۇق ياكى نەم خىرىلداش ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ؛ چېكىپ تەكشۈرگەندە بولسا، كالا ئاغرىقىسىنىدۇ ۋە تۇتۇق ئاۋاز رايونى بارلىقى بىلىنىدۇ. كېسەل كالا تەدرىجى ئورۇقلايدۇ، ئاسان چارچايدۇ، كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى ئاقىرىدۇ. دىئافراگما لىمفا بەزلىرىمۇ تۈبېركۇلىوز بولغاندا، قىزىل ئۆڭگەچ بېسىلىپ، كۆپ ھاللاردا سوزۇلما خاراكتىرلىق تومپىيىدۇ.

يىللىق تۈبېركۇلىوزىدا: يىللىق كەينى قىسمىدا چەكلىك ياكى يامرىق خاراكتىرلىق قىزىمايدىغان ۋە ئاغرىمايدىغان ئىش-شىق پەيدا بولىدۇ ۋە ئۇ تەدرىجى ھالدا ئىگىز-پەس قاتتىق بۆرتىمىلەرگە ئايلىنىدۇ، يىللىق ئۈستى لىمفا تۈگۈنلىرى ئىشىپ قاتتىقلىشىدۇ. كېسەل تەككەن سېغىن سىپىرىنىڭ سۈتى ئازىيىپ كېتىدۇ، سۈت دەسلەپتە روشەن ئۆزگىرىش ياسىمايدۇ، كېيىن بارا-بارا سۇيۇقلىشىپ، ساغۇچ يېشىل رەڭگە كىرىپ قالىدۇ ۋە پاختا ئارىلاشقاندا دۇغلىشىپ قالىدۇ. كېسەللى ئېغىرلىرىنىڭ يىللىق يىگىدەپ قالىدۇ، سۈتى تارتىلىپ كېتىدۇ.

ئۈچەي تۈبېركۇلىوزىدا: كالا جۈدەيدۇ، كاللىنىڭ ھەزىم قىلىشى توسالغۇغا ئۇچرايدۇ، دائىم قوسىغى ئاغرىيدۇ، توختىماي ئىچى سۈرىدۇ، قەۋزىيەت بىلەن ئىچى سۈرۈش ئالماشتىرىپ كۆرۈلىدۇ؛ تىزىڭى سۇيۇقراق، ناھايىتى سېسىق، قان ۋە يىرىڭ

ئارىلاش كېلىدۇ. تۈز ئۈچەيدىن تەكشۈرگەندە، كالىنىڭ ئۈچەي بېغىشى لىمفا تۈگۈنلىرىنىڭ ئىشىغانلىقى بىلىنىدۇ. جىنسى ئەزالار تۈبېركۇليوزىدا: بۇقنىڭ جىنسى ئەزاسىدا قىزىمايدىغان ۋە ئاغرىمايدىغان قاتتىق ئىششىق پەيدا بولىدۇ. يىرىق بەزىلىرى ئىشىيدۇ. سىيىرنىڭ جىنسى يولىدىن ساغۇچ ئاق شىلىمشىق ئاجراتمىلار چىقىدۇ، بۇنىڭ تەركىبىدە يىرىڭلىق سۇيۇقلۇق بولىدۇ، سىيىر كۆپ كۈيلەيدىغان بولۇپ قالىدۇ، ئەمما ئاسانلىقچە بوغاز بولمايدۇ، بوغاز بولغانلىرى دائىم بالا تاشلىۋېتىدۇ. تۈز ئۈچەيدىن تەكشۈرگەندە، بالياتقۇنىڭ ۋە سۆڭەكچى ئىچى لىمفا بەزىلىرىنىڭ يوغاناپ قالغانلىقى، سۈيدۈك يولىنىڭ قاتتىقلىشىپ قالغانلىقى بىلىنىدۇ، قوڭىنىڭ ئاغزىدا تۈبېركۇليوزلۇق بۆرتىمە ۋە يارا بارلىقى بىلىنىدۇ.

مىڭە تۈبېركۇليوزى: بۇ تولراق موزاي ۋە يېتىلگەن كالا-لاردا كۆرۈلىدۇ، بۇنىڭدا ئۆتكۈر مىڭە پەردىسى ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، قوزغىلىش، غالجىرلىشىش ياكى ھۈشە-دىن كېتىش، ئېسىنى يوقىتىش، ھەتتا پالەچلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. يۇلۇن تۈبېركۇليوزى پەيدا بولغاندا، كالا ئاسانلا بەلدىن پالەچ بولىدۇ.

(دىئاگنوز قويۇش)

(1) كۆزگە تۈبېركۇلىن تېمىتىش:

ئۇسۇلى: سول (ياكى ئوڭ) كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردە خالتىسىغا 2~3 تېمىم تۈبېركۇلىن تامغۇزۇلۇپ، رېئاكسىيە ئەھ-

ۋالى 3، 6، 9 ۋە 24 سائەت ئۆتكەندىن كېيىن بىر قېتىمدىن كۆزىتىلىدۇ.

ھۆكۈم قىلىش ئۆلچىمى: بىرىكتۈرگۈچى پەردە قىزارغان، سۇلۇق ئىششىغان، كۆز ياشاڭغۇرىغان، كۆزدىن يىرىڭلىق چاپاق چىققان بولسا، بۇ مۇسبى رېئاكسىيە ھىساپلىنىدۇ. بىرىكتۈرگۈچى پەردە روشەن ھالدا قىزارمىغان، سۇلۇق ئىششىمىغان، ئېقىش كۈل رەڭ، يېرىم سۈزۈك سۇيۇقلۇق چىققان بولسا، بۇ گۇمانلىق رېئاكسىيە ھىساپلىنىدۇ. بىرىكتۈرگۈچى پەردىگە بىزە قان چۈشكەن، كۆزدىن سۈزۈك، شىرىلىق سۇيۇقلۇق ئاز-تولا چىققان بولسا، بۇ مەنپى رېئاكسىيە ھىساپلىنىدۇ.

بىرىنچى قېتىم تېمىتىپ كۆرۈلگەندىن كېيىن مەنپى رېئاكسىيە كۆرۈلگەن ۋە گۇمانلىق چىققان كالىلارغا 25~30 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئىككىنچى قېتىم تېمىتىپ كۆرۈلىدۇ، بۇنىڭدىمۇ گۇمانلىق چىققان كالىلارغا ئارىسىدىن 30~35 كۈن ئۆتكۈزۈپ ئۈچىنچى قېتىم تېمىتىلىدۇ، تېمىتىش ئۇسۇلى ۋە ھۆكۈم قىلىش ئۆلچىمى 1-قېتىمقىسىغا ئوخشاش.

(2) تېرە ئىچىگە ئوكۇل قىلىش:

ئۇسۇلى: بويۇننىڭ ئوتتۇرا يۇقۇرى قىسمىنىڭ $\frac{1}{3}$ گە توغرا كېلىدىغان جايغا، يۇڭنى قىرقىۋېتىپ تېرىنىڭ قېلىنلىغىنى قىسما چىزا بىلەن ئۆلچىگەندىن كېيىن، تۇبېركۇلىن ئوكۇل قىلىنىدۇ، چوڭ كالىلارغا 2 م ل دىن، 3 ئايلىقتىن بىر ياشلىققىچە بولغان موزايىلارغا 0.15 م ل دىن، 3 ئايلىقتىن تۆۋەن موزايىلارغا 0.10

م ل دىن ئوكۇل قىلىندۇ، كۆرۈلگەن رېئاكسىيە 48 سائەت ۋە 72 سائەت ئۆتكەندىن كېيىن بىر قېتىمدىن تەكشۈرۈلۈپ تېرىنىڭ قىلىنلىغى ۋە ئىششىق دائىرىسى ئۆلچەپ كۆرۈلۈپ ھۆكۈم قىلىش ئۆلچىمى: قىسمەن ئورۇندا قىزىپ ئاغرىتىدىغان يامرىغاق سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلگەن ۋە ئىششىق كۆلىمى 45×35 م م دىن ئاشقان، ياكى يۇقۇرقىدەك رېئاكسىيە روشەن كۆرۈلمەي، قىسمەن ئورۇندىكى تېرە قېلىنلاپ 8 م م دىن ئاشقان بولسا، بۇ مۇسبى رېئاكسىيە ھىساپلىنىدۇ. ياللۇغلۇق سۇلۇق ئىششىق روشەن بولماي، تېرە قېلىنلاپ 5~8 م م ئارىلىغىدا بولغان، ياكى ئىششىق دائىرىسى 45×35 م م ئارىلىغىدا بولغان بولسا، بۇ گۇمانلىق رېئاكسىيە ھىساپلىنىدۇ. ياللۇغلۇق سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلمىگەن، ياكى چىڭ، قىزىغى يوق، چېگرىسى ئېنىق بولغان تېرە ئىششىغىلا كۆرۈلۈپ، تېرە قېلىنلاپ 5 م م غا يەتمىگەن بولسا، بۇ مەنپى رېئاكسىيە ھىساپلىنىدۇ.

بىرىنچى قېتىمقى تەكشۈرۈشتە گۇمانلىق چىققان ۋە مەنپى رېئاكسىيە كۆرۈلگەن كالىلارغا ئارىدىن 72 سائەت ئۆتكەندىن كېيىن بىرىنچى قېتىم ئوكۇل قىلىنغان جايغا ئوخشاش مىقداردا 2-قېتىم ئوكۇل قىلىندۇ (تېرە ئىچىگە) ھەم 24 سائەتتىن كېيىن ھۆكۈم قىلىندۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا 48 سائەتتىن كېيىن يەنە كۆزىتىلىدۇ.

(3) پاتوئاناتومىيىلىك تەكشۈرۈش: ئىچكى ئەزالاردا يىڭىنىڭ بېشىدەك ھەتتا تېرىقتەك چوڭلۇقتا تۈپىر كۈليوز بۇرتى.

مىلىرى بولىدۇ، بۇ يېرىپ كۆرۈلسە، ئوتتۇرىسى ئىرىمچىكىسىمان ئۆزگىرىپ قالغانلىقى، بەزىدە كالتىسىلاشقانلىقى بىلىنىدۇ. ئۆت-كۈر تۇبېركۇليوز بۆرتىمىلىرىنىڭ چۆرىسىدە قىزىل ئىنقىلىرات بولىدۇ. سوزۇلما تۇبېركۇليوز بۆرتىمىلىرىنىڭ ئەتراپىدا ئاق بىرىكتۈرگۈچى توقۇلما ياكى كالتىسى ئوچاقلرى بولىدۇ. سېغىن سىيرىنىڭ ئۆپكە، كۆكرەك پەردىسى، جىگەر، تال، بۆرەك، يىلىن ۋە بالىياتقۇ قاتارلىق ئەزالىرىدا تۇبېركۇليوز كېسەللىك ئوچاقلرى كۆپرەك بولىدۇ.

(4) زۆرۈر تېپىلغاندا، بەلغەم، ئاغرىغان ئەزا، سۈت، جىنىسى يول ئاجراتمىلىرى قاتارلىقلارنى تەجرىبىخاناغا يوللاپ باكتېرىئولوگىيىلىك تەكشۈرتۈش لازىم.

[ئالدىنى ئېلىش]

1. ساغلام كالا خوجۇلۇغى (پادىسى)دا قوللىنىلىدىغان مۇھاپىزەت تەدبىرلىرى:

(1) بېقىش-باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، قوتاننىڭ تازىلىغىنى ياخشى ئىشلەش، قوتاننى يورۇق چۈشۈپ تۇرىدىغان، شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان قىلىش، قوتاننىڭ نەمدىشىپ كېتىشىدىن ۋە قىستا-قىستاك بولۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

(2) تۇبېركۇليوز بولغان كىشىلەرگە كالا باقتۇرۇشقا بولمايدۇ.

(3) تولۇقلىنىدىغان كالىلارنى يۇقۇم تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈ-

زۇش، ئاۋال 30 كۈن ئايرىپ تۇرۇپ كۈزىتىش، ئىككىنچى قېتىم يۇقۇم تەكشۈرگەندە مەنپى رېئاكسىيە كۆرۈلسە، ئاندىن

ئۇلارنى پادىغا قوشۇش لازىم.

(4) ھەر يىلى ئەتىيازدا ۋە كۈزدە قەرەللىك ھالدا ئىككى

قېتىم يۇقۇم تەكشۈرۈش، تۈبېركۇليوز بولغانلىرى چىقىپ قالسا

ئۇلارنى ۋاقتىدا كېسەل كالىلارغا قوشۇش ياكى بىراققا

چىقىرىش كېرەك. بىرىنچى قېتىملىق يۇقۇم تەكشۈرۈشتىن

كېيىن 30~45 كۈن ئۆتكۈزۈپ ئىككىنچى قېتىم يۇقۇم تەكشۈرۈش،

كېيىن ھەر 75~90 كۈندە ئۈچىنچى، تۆتىنچى قېتىم يۇقۇم تەك-

شۈرۈش لازىم. كېيىنكى 3 قېتىملىق يۇقۇم تەكشۈرۈشتە مۇسبى

رېئاكسىيە كۆرۈلمىگەن كالا خوجۇلۇغى (پادىسى) ساق كالا

خوجۇلۇغى (پادىسى) دەپ قارىلىدۇ، ئۇنداق بولمىغانلىرى كېسەل

كالا خوجۇلۇغى (پادىسى) بويىچە بىر تەرەپ قىلىنىدۇ.

2. كېسەل كالا خوجۇلۇغى (پادىسى) نى بىر تەرەپ قىلىش

تەدبىرلىرى:

(1) تۈبېركۇليوز بولغان ئەمما كېسەللىك ئالامەتلىرى

بولمىغان كالىلارنى ئايرىپ چىقىپ بىر يەردە بېقىش كېرەك،

بۇنداق كالا سۈتىنى 80°C تا 30 مىنۇت قاينىتىپ دېزىن-

فېكسىيە قىلغاندىن كېيىن ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

(2) ساغلام موزايلارنى يېتىشتۈرۈش: موزاي تۇغۇلغاندىن

كېيىن، ئۇنى دەرھال ئانىسىدىن ئايرىپ بۆلەك بېقىش، 3~4

كۈنگىچە ئوغۇز سۈتى بىلەن بېقىش، كېيىن ساق كالىنىڭ

سۈتى بىلەن ياكى كېسەل كالىنىڭ دېزىنېكسىيە قىلىنغان سۈتى

بىلەن بېقىش لازىم. تۇغۇلۇپ 20~30 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن

بىرىنچى قېتىم تۈبېركۇلىيوزدىن يۇقۇم تەكشۈرۈلدى. سۈتتىن ئايرىغاندا ئىككىنچى قېتىم يۇقۇم تەكشۈرۈلدى، ئارىدىن 30~45 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئۈچىنچى قېتىم يۇقۇم تەكشۈرۈلدى. 3 قېتىملىق تەكشۈرۈشتە مەنپى رېئاكسىيە كۆرۈلگەنلىرى ساق كالا پادىسى (خوجۇلۇغى) غا قوشۇلدى، مۇسبى رېئاكسىيە كۆرۈلگەنلىرى بىراك قىلىندى. شەرت-شارائىتى بار خوجۇ-لۇقلار-موزايىلار تۇغۇلۇپ 3 ئايلىق بولغاندا، ساغلاملىرىغا تۆش ساڭگىلىمىسىنىڭ تېرە ئاستىغا كالىمتا-گېرىن ۋاكسىنىسى ئوكۇل قىلىشى، 2~4 يىل ئۆتكۈزۈپ يۇقۇم تەكشۈرگەندە مەنپى رېئاكسىيە كۆرۈلگەنلىرىگە يەنە بىر قېتىم ۋاكسىنا ئوكۇل قىلىشى كېرەك.

(3) كېسەل كالا پادىسىنى ھەر 3 ئايدا بىر قېتىم كىلىنىكىلىق تەكشۈرۈش، ھەر 6 ئايدا بىر قېتىم باكتېرىئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش، ئوچۇق تۈبېركۇلىيوز بولغان كالىلارنى دەرھال ئۆلتۈرۈش لازىم. كالا گۆشىنىڭ كېسەل تەككەن قىسمىنى ئېلىپ تاشلاپ، قالغان قىسمىنى پىشۇرۇپ يېسە بولىدۇ.

[داۋالاش]

(1) رېمىفون كۈندە 3~4 گ دىن (3~4 قېتىمغا بۆلۈپ ئوزۇققا قوشۇپ) يىمگۈزىلىدۇ. ئۇدا 3 ئاي يىمگۈزۈش بىر داۋا-لاش باسقۇچى بولىدۇ.

(2) رېمىفون 1~2 گ دىن ئىچكۈزۈلىدۇ، مۇسكۇلغا سترېپتو-مىتسىندىن 300~500 تۈمەن بىرلىك بويىچە كۈن ئارىلاپ بىر

قېتىم ئوكۇل قىلىندۇ.

(3) رېمفون 1~2 گ دىن يىگۈزىلىدۇ، ناتىرىي قاراشلىق سالىسات 4~6 گ دىن مۇسكۇلغا ئىككىگە بۆلۈپ ئوكۇل قىلىندۇ.

برۇتسېللوز

برۇتسېللوز جىنىسى ئەزا ۋە بوغۇملارغا زىيان يەتكۈزىدىغان بىر خىل سوزۇلما خاراكتىرلىق يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، كىلىنىكىدا بوغاز سىيىر بالا تاشلاش، بۇقىنىڭ ئۇرۇقدېنى يال-لۇغلىنىش بىلەن خاراكتىرلىنىدۇ. بۇ كېسەللىك كەڭرەك تارقالغان بولىدۇ، ئادەملەرگىمۇ، چارۋا ماللارغىمۇ يۇقىدۇ، زىيىنى ئېغىرراق بولىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] برۇتسېللا تاياقچە باكتېرىيىسى كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر. ئۇ، كېسەللىك قوزغاش ئوبېكتىغا قاراپ، كالا تىپى، قوي تىپى، چوشقا تىپى دىگەن 3 تىپقا ئايرىلىدۇ، بۇلار بەزىدە ئۆزئارا يۇقىدۇ. برۇتسېللا كالتا ۋە ئۇششاق تاياقچە باكتېرىيە بولۇپ، كاپسۇلا ۋە سىپورا ھاسىل قىلمايدۇ، ھەركەت قىلمايدۇ، گرام بويىغىدا مەنپى بويىلىدۇ، بويىلىشى ئاستا بولغانلىقتىن، تولاراق كوزلوۋىسكى ئۇسۇلىدا بويىلىدۇ، برۇتسېللا باكتېرىيىلىرى قىزىل بويىلىدۇ، باشقا باكتېرىيىلەر بولسا يېشىل بويىلىدۇ.

برۇتسېللا باكتېرىيىسىنىڭ قارشىلىق كۈچى ئاجىزراق بولىدۇ،

قاينىتىلسا شۇ زامات ئۆلىدۇ؛ كۈن نۇرىدا 10~20 مىنۇتتا ئۆلىدۇ؛ تىزەكتە 8~25 كۈن، سۈتتە 3~10 كۈنگىچە ياشايدۇ. ئۇنىڭ سوغاقتا چىداملىغى خېلى كۈچلۈك بولىدۇ، قىش كۈنى بىرنەچچە ئايغىچە ئۆلىمەيدۇ. كۆپىنچە %3~2 لىك كىرىملىك، %3 لىك ئاقارتقۇچى پاراشوگى، %10 لىك ھاك سۈيى، %2 لىك ئويغۇچى ناتىرىي ئېرىتمىلىرى بىلەن ئۆلتۈرۈلىدۇ، بۇ ئېرىتمىلەر بىرۋىتسىيىلە باكتېرىيىلىرىنى بىرنەچچە مىنۇتقا قالمايلا ئۆلتۈرىدۇ. [كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] سېغىن سىيىرلار ئەڭ ئاسان يۇقۇملىنىدۇ، ئۇنىڭدىن قالسا قوتاز، ئارغۇن ۋە يەرلىك كالىلار ئاسان يۇقۇملىنىدۇ، قوي ۋە چوشقىلارمۇ يۇقۇملىنىدۇ.

بىرۋىتسىيىلە باكتېرىيىسى ئاساسەن چۈشۈك تۆرەلىمىدە، بالا ھەمىيىدە، باش سۈيىدە، جىمىنى يول ئاجراتمىلىرىدا، بۇقىنىڭ ئورۇغىدا بولىدۇ. ئۇ بەدەندىن سىرتقا چىقىرىلغاندىن كېيىن، يەم-خەشەك، سۇ، تۆشەك چۆپ ۋە جابدۇق-سايىمانلارنى بۇلغايدۇ. ساق كالىلارغا ھەزىم قىلىش يولى ئارقىلىق يۇقىدۇ. كېسەل كالىغا يېقىنلاشقان ساق كالىلارغا باشقۇرۇش سايىمىنى، زەخمىلەنگەن تېرە شىلىق پەردىسى ۋە چېتىلىش ئارقىلىق يۇقىدۇ. ھاشارەتلەر (كانا، پاشا قاتارلىقلار) يۇقۇم ۋاسىتىچىلىرى ھىساپلىنىدۇ، غاجلىغۇچىلار بۇنداق باكتېرىيىلەرنى تارقىتىدۇ. بۇ كېسەللىك يەرلىك خاراكتىردا تارقىلىدۇ. يېڭى يۇقۇم رايونىدا بوغاز سىيىرلار بالا تاشلاش ئەھۋالى كۆپ كۆرۈلىدۇ. كونا يۇقۇم رايونىدا بوغۇم ياللۇغى، بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى

ياللۇغى، ھەمىيى چۈشمەسلىك، قانچە چېتىلدۇرسىمۇ بوغاز بولماسلىق ۋە بۇقنىڭ ئۇرۇقلىشىش ياللۇغلىشىش ئەھۋالى كۆپ كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يوشۇرۇن ۋاقتى 33~230 كۈن بولىدۇ.

كالا برۇتسېلوز بولغاندا روشەن كىلىنسكىلىق ئالامەت كۆرۈلمەيدۇ، بۇ كېسەللىك كۆپىنچە يوشۇرۇن ئۆتىدۇ. بوغاز ئىنەك ئاسانلا بالا تاشلايدۇ، تۆرەلمە ئۆلۈك چۈشىدۇ، ئاجىز تۇغۇلىدۇ. ئىنەك بالا تاشلاش ئالدىدا روھسىزلىنىدۇ، قوسىغى ئاغرىيدۇ، بىئارام بولۇپ يېتىپ-قوپىدۇ، جىنىسى يول لېۋى ئىششپ قالىدۇ، جىنىسى يول ئاغزى قىزىرىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن شىلىمىش سۇيۇقلۇق ئېقىپ قالىدۇ، يىلىن ئىششىيدۇ. بوغازلىق نىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە بالا تاشلىغاندىن كېيىن، كۆپ ھال-لاردا، بالا ھەمىيى چۈشمەيدۇ، بالياتقۇ ئىچكى پەردىسىمۇ ياللۇغلىنىدۇ، جىنىسى يولىدىن بۇلغىنىق، سېسىق ئاجراتىمىلار چىقىپ تۇرىدۇ. بەزىلىرىنىڭ سىلىقلاتقۇچى سۇيۇقلۇق خالىتىسى ياللۇغلىنىدۇ، بوغۇملىرى ئىششپ قالىدۇ ۋە ئاغرىيدۇ. بەزىلىرىنىڭ تۇخۇمدىنى ئىششپ قالىدۇ، ئۇلار كۆپ كۈيەلەيدىغان بولۇپ قالىدۇ، ئەمما قانچە ئۇرۇقلاندۇرۇلسىمۇ بوغاز بولمايدۇ. بۇقلار ئاسانلا ئۇرۇقدان ياللۇغى ۋە قوشۇمچە ئۇرۇقدان ياللۇغى بولۇپ قالىدۇ، ئۇرۇقلىنىش ئىششپ قالىدۇ، جىنىسى ھەۋسى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ، تەدرىجى ئۇرۇقلاپ كېتىدۇ، ھەتتا

ئۇرۇقلاندۇرۇشقا يارمايدىغان بولۇپ قالدۇ.

[دېئاگنوز قويۇش] بالا تاشلاش ۋە ھەمىيى چۈشمەسلىك ئەھۋاللىرىغا قاراپ باشلانغۇچ قەدەمدە دېئاگنوز قويۇش مۇمكىن. يۇقۇمسىز كېسەللىكتىن بولىدىغان بالا تاشلاشتىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن، ئۇيۇش رېئاكسىيىسى، سۈتنىڭ ھالقى-سىمان رېئاكسىيىسى ئىشلىنىدۇ ۋە باكتېرىئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش، پاتوئاناتومىيىلىك تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

(1) باكتېرىئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش: چۈشۈكنىڭ ئاشقازان ماددىسى، بوغۇم سۇيۇقلۇقى، ئەش ۋە باش سۈيى ياكى چىشى مالنىڭ جىمىسى يول ئاجراتمىلىرىدىن باكتېرىيىسىز يول بىلەن ئەۋرىشكە ئېلىپ سۈرتىمە ياساپ، ئۇنى قۇرۇتۇپ قاتۇر-غاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا 2% لىك سافرانىن ئېرىتمىسىدىن تېپىتىپ ۋە ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ كۆپۈكچە ھاسىل قىلىنىدۇ، ئاندىن ئۇنى سۇدا يۇيۇپ 1% لىك مالاخت بويىمى بىلەن 1~2 مىنۇت قايتا بويىغاندىن كېيىن، ئاۋال سۇدا يۇيۇلىدۇ، ئاندىن قۇرۇتۇلىدۇ، ئاخىردا ئۇ مىكروسكوپتا تەكشۈرۈلىدۇ. بويىغاندا برۇتسېللا تاياقچە باكتېرىيىلىرى قىزىل، باشقا باكتېرىيىلەر يېشىل بويىلىدۇ.

(2) ئۇيۇش رېئاكسىيىسى بۆيىچە تەكشۈرۈش: كالا، قوي برۇتسېللا تاياقچە باكتېرىيىسى بىلەن يۇقۇملىنىپ 7 كۈن ئۆت-كەندىن كېيىن، قاندا ئۇيۇش پەيدا بولىدۇ، ئۇنىڭ بالا تاشلاپ 7~15 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن، بۇ ھال كۆرۈنەرلىك كۈچىيىدۇ،

بۇ قان ئېلىپ ئۇيۇش رېئاكسىيىسى ئىشلەشنىڭ ئەڭ مۇۋاپىق پەيتىدۇر.

قان زەردىۋىنى ئەينەكتە ئۇيۇتۇش رېئاكسىيىسى: بىر پارچە پاكىز ئەينەك پارچىسىغا قېرىنداش بىلەن $4\text{cm}^2 \sim 3$ لىق كاتەكچە سىزىلىدۇ ۋە 1، 2، 3، 4 دىگەن رەقەملەر ھەم سېلىش-تۇرما دىگەن خەت يېزىلىدۇ. ھەر بىر كاتەكچىگە ئايرىم-ئايرىم ھالدا تەكشۈرۈلىدىغان قان زەردىۋى، ئانتىگېن، فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە (مىقدارى جەدۋەلدىكىدەك) تېمىتىلىدۇ، ئاندىن بىر تال سەرەڭگە بىلەن، تەكشۈرۈلىدىغان قان زەردىۋى ئەڭ ئاز كاتەكچىدىن باشلاپ بىر-بىرلەپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ۋە يەنە بىر تال سەرەڭگە بىلەن سېلىشتۇرما كاتەكچىدىكىسى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئەينەكنى ئوت يالقۇنىغا تۇتۇپ بىر ئاز

1-جەدۋەل قان زەردىۋىنى ئەينەكتە ئۇيۇتۇش رېئاكسىيىسى

نومۇرى	1	2	3	4	سېلىشتۇرما
تەركىۋى					
تەجرىبە نەيچىسىدە سۇيۇل- دۇرۇشقا توغرا كېلىدىغان ھەسسىلىك سان	1:25	1:50	1:100	1:200	
تەكشۈرۈلىدىغان قان زەردىۋى (مىل)	0.08	0.04	0.02	0.01	—
ئانتىگېن	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە	—	—	—	—	0.03

ئىسسىتىپ، 5~8 مىنۇت ئۆتكەندىن كېيىن رېئاكسىيە نەتىجە-
سىگە ھۆكۈم قىلىنىدۇ.

تەكشۈرۈلىدىغان قان زەردىۋى 0.02 م ل لىق كاتەكچىدە
كۆرۈنەرلىك ھالدا پاختىسىمان ئۇيۇسا مۇسبى دەپ ھۆكۈم
قىلىنىدۇ. 0.04 م ل لىق كاتەكچىدە كۆرۈنەرلىك ھالدا ئۇيۇسا
گۇمانلىق دەپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ. ھەممە كاتەكچىلەردە ئوخشاش
دەرىجىدە دۇغلىشىپ تۇرسا مەنپى دەپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ.
سېلىشتۇرمىسى ئوخشاش دەرىجىدە دۇغلىشىپ تۇرۇشى كېرەك.
قاننى ئەينەكتە تېز ئۇيۇتۇش رېئاكسىيىسى: بۇ ئۇسۇل
پادا بويىچە نەق مەيداندا يۇقۇم تەكشۈرۈشتە قوللىنىلىدۇ.
بۇنىڭدا باكتېرىيىسىز ئۇسۇل بىلەن قۇلاق ئۇچىدىن (كۆك
تومۇردىن) قان ئېلىپ، بىر تامچە قاننى پاكىز ئەينەك ئۈستىگە
تېمىتىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئانتېگىن تېمىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ،
بىرنەچچە مىنۇت ئۆتكەندىن كېيىن كۈزىتىلىدۇ. ئەگەر
پاختىسىمان ياكى دانىسىمان ئۇيۇغان بولسا مۇسبى رېئاكسىيە،
تەپ-تەكشى دۇغلىنىپ تۇرغان بولسا مەنپى رېئاكسىيە بەرگەن
بولىدۇ.

(3) سۈتنىڭ ھالقىسىمان رېئاكسىيىسى:

ئۇسۇلى: يىلىننى پاكىز يۇيۇپ سۈرتكەندىن كېيىن، پاكىز
قاچىغا ئازراق سۈت سېغىۋېلىنىپ تەكشى چايقىلىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن
1 م ل سۈت ئېلىنىپ باكتېرىيىسىزلەندۈرۈلگەن تەجرىبە نەيچە-
سىگە قويۇلىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا بەلگىلەنگەن مىقدار بويىچە

ئانتىگېن قوشۇلىدۇ ۋە ئۇ تولۇق ئارىلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن $37\sim 38^{\circ}\text{C}$ لۇق ساندۇقتا 1 مىنۇت تۇرغۇزۇلىدۇ، ياكى مۇنچا قازىنىدا 40 مىنۇت تۇرغۇزۇلىدۇ، ئاخىردا پەم بىلەن چېقىرىۋېلىنىپ، رېئاكسىيە نەتىجىسىگە ھۆكۈم قىلىنىدۇ.

ھۆكۈم قىلىش ئۆلچىمى: مۇسبى رېئاكسىيە بەرگىنى مۇنداق بولىدۇ: سۈت تۇۋرۇكى ئەسلى رەڭگىنى ساقلاپ قالىدۇ، ئۈستىكى قەۋەتتىكى سۈت قايمىغىدا قېنىق كۆك ھالقا بولىدۇ، سۈت تۇۋرۇكى بىلەن ھالقىنىڭ چېگرىسى ئېنىق بولىدۇ، ياكى قايماق قەۋىتىدىكى ھالقىسىمان ماددىلار سۇس كۆك رەڭدە يەنى سۈت تۇۋرۇگىنىڭ رەڭگىدىن سەل قېنىق رەڭدە بولىدۇ. گۇمانلىق رېئاكسىيە بەرگىنى مۇنداق بولىدۇ: قايماق قەۋىتىدىكى ھالقىسىمان ماددىلار روشەن بولمايدۇ ۋە سۈت تۇۋرۇگىدىن ئېنىق ئايرىلىپ تۇرمايدۇ، سۈت تۇۋرۇكى سۈر كۆك بولىدۇ. مەنپى رېئاكسىيە بەرگىنى مۇنداق بولىدۇ: سۈت تۇۋرۇگىنىڭ ئۈستىكى قەۋىتىدە ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇرۇنقى ئارىلاشما سۇيۇقلۇق بىلەن تامامەن ئوخشاش بولىدۇ.

(4) پاتوئاناتومىيىلىك تەكشۈرۈش: تۈكلۈك پەردە ئارىلىقلىرىدا تۇتۇق كۈل رەڭ ياكى سېرىق يىلمىسىمان ئىنقىلىراتلار بولىدۇ، تۆرەلمە پەردىسىگە تالالىق ۋە يىرىڭسىمان سىرغىمىملار كۆپلەپ يېپىشىۋالغان، بەزىدە ئۇ سۇلۇق ئىشىغان، قېلىنلاپ قالغان بولىدۇ، كېسەللىك ئېغىر بولغان بولسا، ئۇنىڭدا نېكروز ئۆچمىسى پەيدا بولغان بولىدۇ. چۈشۈكنىڭ

تېرە ئاستىدىن شىرىلىق، قانلىق ئىنقىلىرات چىقىدۇ. ئاشقا-
زان-ئۆچەي ۋە دوۋساق شىرىلىق پەردىلىرى ۋە شىللىق
پەردىلەر قانغان بولىدۇ. 4-قېرىندا سېرىق ياكى ئاق شىللىق
سۇيۇقلۇق ۋە پاختىسىمان ماددىلار بولغان بولىدۇ. لىمفا تۈگۈن-
لىرى، جىگەر، تال ئىششىغان بولىدۇ. تەكشۈرۈشكە تۆرەلىمە
ئىشلىتىلىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش]

1. ساغلام كالىلارنى ئاسراش:

(1) تولۇقلىنىدىغان كالىلار يۇقۇم تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ،
خوجۇلۇققا ئېلىپ كېلىنگەندىن كېيىن ئىككى ئايغىچە ئايرىم
بېقىپ، ئىككى قېتىم قاتتىق يۇقۇم تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈپ،
ھەقىقەتەن ساقلىغى ئېنىقلانغاندىن كېيىن ساق كالىلارغا
قوشۇۋېتىلىدۇ.

(2) قەرەللىك يۇقۇم تەكشۈرۈش: يىملىغا ئىككى قېتىم ئۇيۇش
رېئاكسىيىسى ئارقىلىق يۇقۇم تەكشۈرۈلىدۇ، كېسىلى بارلىرى
چىقىپ قالسا دەرھال ئايرىۋېتىلىدۇ ۋە كېسەل كالىلارغا قوشۇپ
ئايرىم بېقىلىدۇ. بۇلانغان ئېغىل، سايمان ۋە مەيدان قاتارلىقلار
قاتتىق دېزىنفېكسىيە قىلىنىدۇ. نەسىللىك بۇقىلار ھەر يىملى
ئۇرۇقلاندۇرۇشقا قاتناشتۇرۇلۇش ئالدىدا يۇقۇم تەكشۈرۈشتىن
ئۆتكۈزۈلىدۇ. ۋاكسىنا ئۇرۇلغانلىرىنى تەكشۈرمىسىمۇ بولىدۇ.

(3) قەرەللىك ھالدا مۇداپىئە ئوكۇلى سېلىش:

برۇتسېللا ناياقچە باكتېرىيىسىنىڭ 19-نومۇرلۇق ۋاكسىنىسى.

سنى ئوكۇل قىلىش: بۇ چوڭ سىپىرلارغا ئورۇقلاندۇرۇشتىن
2 ئاي بۇرۇن بويۇن تېرە ئاستىدىن 5 م ل ئوكۇل قىلىندى.
ئوكۇل سېلىنغاندىن كېيىن تېمپېراتۇرا ئۆزلەش ۋە قىسمەن
ئورۇن قىزىش، ئىششىق رېئاكسىيىلىرى كۆرۈلىدۇ، بۇ ھال
3~5 كۈندە يوقاپ كېتىدۇ. 6 ئايلىقتىن تۆۋەن موزايىلارغا،
كېسەل، قېرى، ئاجىز كالىلارغا ئوكۇل قىلىنمايدۇ.

برۇتسېللا تاياقچە باكتېرىيىسىنىڭ توڭلىتىپ قاتۇرۇلغان قوي
تېپىلىق 5-نومۇرلۇق ۋاكسىنىسىنى ئوكۇل قىلىش: بۇ ساغلام
كالا ۋە قوي، ئۆشكىلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. ئورۇقلاندۇرۇشتىن 1~2
ئاي ئىلگىرى ئوكۇل قىلىنىدۇ، بۇنىڭ ئىممۇنىت ۋاقتى بىر
يىل بولىدۇ. بۇ ۋاكسىنا باكتېرىيىسىزلىنىدۇرۇلگەن فېزىئولو-
گىيىلىك ئېرىتمە بىلەن سۇيۇلدۇرۇلغاندىن كېيىن، ھەر م ل دا
10 مىليارت باكتېرىيە بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كالىنىڭ بويۇن ئاستى
تېرە ئاستىغا ياكى كاسا مۇسكۇلىغا 1.5 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ،
ياكى ئۇنى باكتېرىيىسىزلىنىدۇرۇلگەن فېزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىدە
ئېھتىياجلىق مىقداردا سۇيۇلدۇرۇپ پۈركۈگۈچ بىلەن پۈركىسىمۇ
بولىدۇ.

ئۆيدە پۈركۈپ ئىممۇنلىغاندا ھەر بىر كالىغا 25 مىليارت
باكتېرىيە پۈركۈلىدۇ، پۈركۈش تاماملانغاندىن كېيىن كالىلار
ئۆز ئورنىدا 30 مىنۇت تۇرغۇزۇلىدۇ؛ دالدا ئىممۇنلىغاندا ھەر
بىر كالىغا 50 مىليارت باكتېرىيە پۈركۈلىدۇ، پۈركۈش تاماملان-
غاندىن كېيىن كالىلار ئۆز ئورنىدا 30 مىنۇت تۇرغۇزۇلىدۇ.

2. كېسەل كالىلارنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش:

(1) ئوتلاقنى ئايرىپ قاتتىق باشقۇرۇپ، يۇقۇمنىڭ تارقىلىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

(2) قەرەللىك دېزىنفېكسىيە قىلىدىغان قاتتىق تۈزۈم ئور-
نىتىپ، تىزەك ۋە تۆشەك چۆپلەرنى ئېچىتىپ بىر تەرەپ
قىلىش، ئاغرىپ ئۆلگەن كالا ۋە چۈشۈك، ئەش ۋە بۇلغانغان
تۆشەك چۆپ قاتارلىقلارنى كۆيدۈرۈۋېتىش ياكى چوڭقۇر
كۆمۈش كېرەك.

(3) سويۇلغان كېسەل كالىنىڭ كېسەللىك ئۆزگىرىشى بار
قىسىملىرىنى ۋە ئىچكى ئەزالىرىنى چوڭقۇر كۆمۈش، گۆشنى
يۇقۇرى تېمپېراتۇرىدا ياخشى پىشۇرۇپ، ئاندىن ئۇنىڭدىن
پايدىلىنىش، كېسەل كالىنىڭ تېرىسىنى %5~3 لىك لىزولغا 24
سائەت چىلاپ، ئاندىن ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش، كېسەل كالىنىڭ
سۈتىنى قاينىتىپ دېزىنفېكسىيە قىلغاندىن كېيىن ئىستېمال
قىلىش لازىم.

3. ساغلام موزايىلارنى يېتىشتۈرۈش:

(1) كېسەل سىيىرلارنى ئۇرۇقلاندۇرۇشقا ساغلام بۇقىنىڭ
ئۇرۇغىنى ئىشلىتىش (سۈنئىي ئۇرۇقلاندۇرۇش ئۇسۇلىنى قولل-
نىش) كېرەك.

(2) موزايىلارنى ئايرىم بېقىش، تۇغۇلۇپ 3~5 كۈنگىچە
ئوغۇز سۈتى بىلەن، كېيىن دېزىنفېكسىيە قىلىنغان سۈت ياكى
ساغلام سىيىرنىڭ سۈتى بىلەن بېقىش لازىم.

(3) موزايىلار 6 ئايلىق بولغاندا 2 قېتىم ئارىدىن 30~45 كۈن ئۆتكۈزۈپ) يۇقۇم تەكشۈرۈش (ئۇيۇتۇش رېئاكسىيىسى بويىچە برۇتسېللا بار-يوقلۇغىنى ئېنىقلاش) لازىم. ئىككىنچى قېتىم تەكشۈرۈشتە مەنپى رېئاكسىيە كۆرۈنگەنلىرىنى برۇتسېللا ۋاكسىنىسىنى ئوكۇل قىلغاندىن كېيىن ساغلام كالىلارغا قوشۇشقا بولىدۇ. مۇسبى رېئاكسىيە كۆرۈلگەنلىرىنى كېسەل كالىلارغا قوشۇپ بېقىش لازىم.

[داۋالاش] سىير بالا تاشلىغاندىن كېيىن بالىياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغلانغاندا ياكى ھەمىيى چۈشمىگەندە، ھەمىيىنى ئاجرىتىۋالغاندىن كېيىن، 0.1% لىك مارگانسوپ ئېرىتمىسى، ياكى 0.02% لىك فۇراتسىللىن ئېرىتمىسى، ياكى 0.2% لىك رىۋانول ئېرىتمىسى بىلەن بالىياتقۇ يۇيۇلىدۇ، باشتا كۈندە 1~2 قېتىم، 2~3 كۈن ئۆتكەندە كۈن ئارىلاپ بىر قېتىمدىن تاكى ئاجراتمىلارنىڭ ئېقىشى توختىغىچە يۇيۇلىدۇ. كېسەللىك ئېغىر بولسا، ئانتىبىيوتىك ۋە سۇلفانىلامىدلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ (ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى كۆيدۈرگىنى داۋالاشقا ئوخشاش). جۇڭگىي دورىلىرىدىن يىمۇساۋ دورىسى ئىشلىتىلىشىمۇ بولىدۇ.

رېتسېپ:

يىمۇساۋ 1 سەر، قالقانگۈل 6 مىسقال، چۈەنجۈك 5 مىسقال، داڭگۈي 5 مىسقال، ئاق چوغلۇق 5 مىسقال بۇلار يۇمشاق سوقۇلۇپ، قايناق سۇ بىلەن ئېرىتىلىپ، دورا

ئىللىغاندىن كېيىن ئىچكۈزۈلىدۇ.

قاراسان

قاراسان ئېمكار دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ كالىلاردا بولىدىغان ئۆتكۈر سېتىسېمىيلىك يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، كىلىنىكىدا كالا مۇسكۇلىنىڭ قېلىنراق جايلىرى گازلىق، ياللۇغلۇق ئىششىق بىلەن خاراكتىرلىنىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] قاراسان تاياقچە باكتېرىيىسى كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر. ئۇ ئوكسىگېندىن قاچىدىغان باكتېرىيە، گرام بويىغدا مۇسبى بويىلىدۇ، ئىككى ئۇچى دىقماق كېلىدۇ، كۆپىنچە يەككە ياكى ئىككىدىن تىزىلىپ تۇرىدۇ، قۇيرۇغى بولىدۇ، ھەركەت قىلالايدۇ، كاپسۇلىسى بولمايدۇ، ئورگانىزىمنىڭ ئىچى ۋە تېشىدا سىپورا ھاسىل قىلىدۇ. ئۇنىڭ سىپورىسى باكتېرىيە تېنىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ياكى بىر تەرەپىدە بولىدۇ، ئۇنىڭ قارشىلىق كۈچى ناھايىتى كۈچلۈك بولىدۇ، توپىدا 5~6 يىل ياشىيالايدۇ، 100°C دا 20 مىنۇتتىن ئارتۇق ۋاقىتتا ئاندىن كۈچىدىن قالىدۇ، 0.2% لىك سىمپا خىلورىد ئېرىتمىسىدە 10 مىنۇتتا، 3% لىك فورمالىندا 15 مىنۇتتا ئاندىن سىپورىسىنى ئۆلتۈرگىلى بولىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] كېسەل ئۇلاق ئاساسىي يۇقۇم مەنبەسىدۇر. بۇ باكتېرىيىلەر ئاساسەن كېسەل كالىنىڭ چىرىگەن

توقۇلمىسىدا ۋە سۇلۇق ئىششىق بولغان جايلارنى چىققان سۈيۈق-
لۇقتا ساقلىنىدۇ. بەزىلىرى ئۆلۈك ۋە بۇلغانغان نۇپراق، يەنىمۇ
خەشەك ۋە سۇدا ساقلىنىدۇ. بۇ كېسەللىك ئاساسەن ھەزىم
قىلىش يولى ئارقىلىق يۇقىدۇ، بەزىدە تېرە جاراھىتى ۋە قان
شوربىغۇچى پارازىتلار ئارقىلىقمۇ يۇقىدۇ. يەرلىك كالىلار
ئاسانراق يۇقۇملىنىدۇ، سۇ كالىسى، سېغىن سىيىر تەستەرەك
يۇقۇملىنىدۇ. 3 ئايلىقتىن 4 ياشلىققىچە بولغان كالىلار (بولۇپمۇ
4 ياشتىن تۆۋەن يەرلىك كالىلار) كۆپرەك يۇقۇملىنىدۇ. بۇ
كېسەللىك تولراق يەرلىك خاراكتىردا تارقىلىدۇ. ياز پەسلىدە
ئويما-زەي ئوتلاقلىرىدا ئاسان پەيدا بولىدۇ. تومۇز ئىسسىق
ۋە قۇرغاقچىلىق پەسىللىرىدە تېخىمۇ كۆپ ئۇچرايدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] كېسەللىك باكتېرىيىلىرى
ھەزىم قىلىش يوللىرى ئارقىلىق يۇقىدۇ، ئۈچەي شىللىق پەر-
دىسى ھەر خىل كېسەللىك ئامىللىرى تۈپەيلىدىن زەخمىلەن-
گەندە، كېسەللىك باكتېرىيىلىرى قانغا ئۆتۈپ ۋە قان ئارقىلىق
مۇسكۇل ياكى بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلارغا بېرىپ، مۇسكۇلدا
كۆپىيىدۇ، ئاندىن توقۇلمىنىڭ ئىچكىرى قىسمىلىرىغا ئۆتۈپ
كۆپىيىپ زەھەر چىقىرىدۇ-دە، چەكلىك دائىرىدە شىرىقلىق
ئىنفىلىترات ۋە قاناش پەيدا بولىدۇ، باكتېرىيە فېرېمېنتىنىڭ
رولى ئارقىسىدا مۇسكۇل قەنتى پارچىلىنىپ، مۇسكۇل ئۆزگىرىپ
چىرىيدۇ ۋە ئورگانىك كىسلاتا ۋە گاز ھاسىل بولىدۇ-دە،
گازلىق-ياللۇغلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ ۋە توقۇلما چىرىپ

كېتىدۇ. باكتېرىيە چىقارغان زەھەر ۋە توقۇلمىلارنىڭ پارچىلىنىشىدىن ھاسىل بولغان ماددىلار قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىن پۈتۈن بەدەندە كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] قاراساننىڭ يوشۇرۇن ۋاقتى ئادەتتە 3~5 كۈن بولىدۇ، قىسقا بولغاندا 1~2 كۈن، ئۇزاق بولغاندا 7~9 كۈن بولىدۇ. بۇ كېسەللىك كۆپىنچە تۇيۇقسىز پەيدا بولىدۇ، تەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ 41°C ~ 40°C قا چىقىدۇ، روھسىزلىنىش، ئىشتەي تۇتۇلۇش، كۆشەش توختاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كېيىنچە ساغرا، يانپاش، بەل، يەلكە ۋە بويۇن-كۆكرەكنىڭ ئەتىلىك جايلىرى ئىشىشىدۇ، ئىشىغان يەر قىزىپ قالىدۇ، ئاغرىيدۇ. ئىشىغان يەرنىڭ ئوتتۇرىسى بارا-بارا مۇزلايدۇ، ئاغرىمايدىغان بولۇپ قالىدۇ، گاز كۆپلەپ پەيدا بولۇپ، تېرە ئاستى ۋە مۇسكۇل ئارىلىغىنى بويلاپ تېز تارقىلىدۇ. ئىششىق پەيدا بولغان جايىنىڭ تېرىسى قۇرغاقلىشىپ، چىڭقىلىپ، قارىداپ كېتىدۇ، باسما قولغا قاتتىق بىلىنىدۇ ۋە غىچىرلايدۇ. ئىششىق بىلەن تەڭلا مال ئاقساق قالىدۇ. ئىششىغان جاناي ئېغىز ئالغاندا ياكى ئۇنى كەسكەندە كۆپۈك ئارىلاش توق قىزىل، ئالاھىدە سېسىق سۇ چىقىدۇ ۋە مۇسكۇل قارىداپ قالىدۇ. ئىششىغان جايغا يېقىن لىمفا تۈگۈنلىرى يوغاناپ قالىدۇ. نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىدۇ، بىرىكتۈرگۈچى پەردىلەر كۆكرىدۇ، تومۇر سوقۇش تېزلىپ، مىنۇتغا 100 قېتىمغىچە يېتىدۇ. ۋاقتىدا داۋالىمىسا، كالا 1~2 كۈندىلا ئۆلىدۇ، بەزىلىرى 4~10 كۈنگە

سوزۇلۇشى مۇمكىن.

[دېئاگنوز قويۇش] بۇ كېسەللىككە ئۇنىڭ كىلىنىكىلىق ئالاھىدەلىرى ۋە ئېپىدېمىيىلىك ماتېرىياللىرىغا قاراپ دېئاگنوز قويىلغانلىقىنى بىلىش ئارقىلىق بولىدۇ. بۇ كېسەللىكنىڭ بەزى ئالاھىدەلىرى كۆيدۈرگەن يامان سۈپەتلىك سۇلۇق ئىششۇق ۋە كالا پاستېرېلوزىنىڭ ئالاھىدەلىرىگە ئوخشاپ كېتىدۇ، شۇڭا بۇلارنى پەرقلەندۈرۈشكە دىققەت قىلىش كېرەك.

[ئالدىنى ئېلىش]

(1) قاراسان كۆرۈلگەن رايوندا ھەر يىلى ئەتىيازدا ۋە كۈزدە قاراساننىڭ فورمالىنلىق ۋاكسىنىسىدىن ئىككى قېتىم تېرە ئاستىغا 5 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ. موزايىلار 6 ئايلىق بولغاندا يەنە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئىممۇنىت ۋاقتى 6 ئاي بولىدۇ.

(2) قاراسان يېڭى كۆرۈلگەن يۇقۇم رايونىدا بارلىق كالىلارنى دەرھال ئومۇمىي يۈزلۈك تەكشۈرۈپ چىقىپ، ساغلام كالىلارغا مۇداپىئە ئوكۇلى سېلىش، كېسەل كالىلارنى ۋاقىتلىق ئايرىپ چىقىپ داۋالاش، يۇقۇم رايونىنى كارانتىن قىلىش لازىم.

(3) كېسەل كالا ئۆلۈكى ۋە بۇلغانغان تىزەك، سۈيدۈك ۋە تۆشەك چۆپلەرنى كۆيدۈرۈش ياكى چوڭقۇر كۆمۈش لازىم. كېسەل كالا تۇرغان ئېغىل، بۇلغانغان جابدۇق-سايىمان ۋە ئوقۇرلارنى 5~10% لىك ئۇيغۇچى ناترىي ئېرىتمىسى، ياكى 5% لىك ئاقارتقۇچى پاراشوگى ئېرىتمىسى، ياكى 0.2% لىك سىمپ

[illegible]

پاکستان کے لیے

၁-၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင်

[illegible]

خلورىد ئېرىتمىسى بىلەن قاتتىق دېزىنفېكسىيە قىلىش لازىم.

[داۋالاش]

(1) قان زەردىۋى بىلەن داۋالاش: قاراسانغا قارشى قان زەردىۋىدىن كۆك تومۇرغا 150~200 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا 12 سائەتتىن كېيىن يەنە ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(2) پېنتسىللىندىن مۇسكۇلغا 2~3 مىليون بىرلىك، ياكى كۆك تومۇرغا تېررامىتسىندىن ۋە تېتراسىكلندىن 2~3 گ، ياكى كۆك تومۇرغا 20% لىك ناترىي سۇلفادىئازىن (ياكى ناترىي سۇلفاتىئازول)دىن 100~150 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ. قاراسانغا قارشى قان زەردىۋى بىلەن بىللە ئوكۇل قىلىنسا، ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

(3) جۈزى داۋالاش: ئىششىقنى يېرىپ، چىرىگەن توقۇلما، مىلارنى چىقىرىپ تاشلاپ، 2~1% لىك مارگانىسوپ ئېرىتمىسى ياكى 3% لىك قوش ئوكسىگېنلىق سۇ بىلەن پاكىز يۇيۇش لازىم. يېڭى ئىششىقنى يېرىشقا بولمايدۇ، 2~1% لىك مارگانىسوپ ئېرىتمىسى ياكى 3% لىك قوش ئوكسىگېنلىق سۇ بىۋاسىتلا تېرە ئاستى ياكى مۇسكۇلغا ئىششىقنى چۆرىدەپ ئوكۇل قىلىنىدۇ، ياكى 0.25~0.5% لىك پروكايمىن ئېرىتمىسىدىن 10~20 م ل قوشۇپ 1~2 مىليون بىرلىك پېنتسىللىننى ئېرىتىپ، مۇسكۇلغا ئىششىقنى چۆرىدەپ ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(4) كېسەللىككە قاراپ داۋالاش: يۈرەك كۈچەيتكۈچى، سۇيۇقلۇق تولۇقلىغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. كۆك تومۇرغا 5%

لىك ناتىرىي ھىدروكاربوناتتىن 300~500 ملى ئوكۇل قىلىنسا،
ئۇنۇمى ياخشىراق بولىدۇ.

قاتما

قاتما جاراھەتتىن يۇقىدىغان ئۆتكۈر، زەھەرلىنىش خاراك-
تىرلىق يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، كىلىنىكىدا ھەركەت مەر-
كزىنىڭ رېڭلىقلىق قوزغىلىشىنىڭ كۈچىيىشى، پۈتۈن بەدەن
ياكى ئايرىم ئورۇندىكى سۆڭەك مۇسكۇللىرىنىڭ قېتىش خاراك-
تىرلىق تارتىشىپ قېلىشى بىلەن خاراكتىرلىنىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] قاتمىنىڭ تاياقچە باكتېرىيىلىرى
كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر. ئۇ ئىككى بېشى دىققەت، ئىنچىكە،
چوڭ تاياقچە باكتېرىيە بولۇپ، ئوكسىگېندىن قانچىسىدۇ، سىپو-
رلىق بولىدۇ. ئۇنىڭ سىپورىسى بارابان كالتىگىگە ئوخشايدۇ،
تەنچىنىڭ بىر ئۇچىدا بولىدۇ، قۇيرۇقى بولىدۇ، ھەركەتلىنە-
لەيدۇ، گرام بويىغىدا مۇسبى بويىلىدۇ. باكتېرىيە چىقارغان
تاشقى زەھەرنىڭ كۈچى ناھايىتى كۈچلۈك بولىدۇ، بۇ، مۇس-
كۇلنى تارتىشتۇرىدىغان زەھەر ۋە قاننى ئېرىتىدىغان زەھەرنى
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ زەھەرنىڭ ئىسسىقلىقتا چىداملىقلىقى
ئاجىز بولىدۇ، 65°C تا 5 مىنۇتتىلا تۈگىشىدۇ. كۆپىيىش تېپىلىق
قاتما باكتېرىيىسىنىڭ قارشىلىق كۈچى ئۇنىڭدىنمۇ ئاجىز بولىدۇ،
 100°C تا 5 مىنۇتتا ئۆلىدۇ. ئادەتتىكى دېزىنفېكسىيە دورىلى-

رىدىن 5% لىك كاربولىكا، 3% لىك فورمالىن، 2%~1 لىك ئۇيغۇچى ناترىي كۆپىيىش تىپىلىق قاتما باكتېرىيىلىرىنى قىسقا ۋاقىتتا ئۆلتۈرەلەيدۇ. سىپورا تىپىلىق قاتما باكتېرىيىلىرىنىڭ قارشىلىق كۈچى كۈچلۈك بولىدۇ، قاراڭغۇ يەرلەردە 10 يىلدىن ئارتۇق ياشايدۇ، قايناتقاندا 30~90 مىنۇتتا ئاندىن ئۆلىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] قاتما باكتېرىيىلىرى توپىدا ۋە ئادەم-چارۋا گەندىلىرىدە ياشايدۇ. تىرىم-چارۋا بولۇپمۇ مىخ-چارۋىنى ۋە سانچىلغان چارۋىنى تارقىلىق يۇقىدۇ. ھەر خىل ھايۋانلارغا يۇقىدۇ، تولاراق چاچما ھالەتتە تارقىلىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] باكتېرىيە چارۋىنى تارقىلىق يۇققاندىن كېيىن، چارۋىنى ئاغزى لاي، تىزەك ياكى چىرىگەن توقۇلما، يىرىنىڭ قاتارلىقلار تەرىپىدىن ئېتىلىپ قېلىپ، ئانا-روپلۇق شارائىت پەيدا بولىدۇ-دە، باكتېرىيە تېز كۆپىيىپ، تاشقى زەھەر چىقىرىدۇ. زەھەر نېرۋا تاللىلىرىنى بويلاپ مەز-كىزى نېرۋىغا ئۆتۈپ، يۇلۇننىڭ ۋە سوزۇنچاق مىڭىنىڭ نېرۋا ھۈجەيرىلىرىنى غىدىقلايدۇ-دە، ئۇلار كۈچلۈك قوزغىلىش ھالىتىگە كىرىدۇ، ئۇلار يەنە غىدىقلانغان ھامان، مۇناسىپ مۇسكۇللاردا تارتىشىش خاراكتېرلىق قىسقىراش پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يوشۇرۇن ۋاقتى 7~14 كۈن بولىدۇ. دەسلەپتە ھەركەت قاتمىلىشىش، باش مۇسكۇلى قېتىۋېلىپ تارتىشىپ قېلىش، چايناش ۋە يۇتۇش ئاستىلاش، ئېغىزىدىن شال ئېقىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، تەن تېمپېراتۇرا-

رىسى ۋە تومۇرنىڭ سوقۇشىدا چوڭ ئۆزگىرىش بولمايدۇ. ئوت-
تۇرا مەزگىلدە، كاللىنىڭ ئەس-ھۇشى نورمال بولىدۇ، ئىشەنچى
تۇتۇلمايدۇ، بىراق كۆشەش توختاش، كىكىرىك كەلمەسلىك
سەۋىيىدىن چوڭ قېرىن ئاسانلا كۆپۈۋالىدۇ؛ ئالقارىغى پولاتىيىپ
چىقىدۇ، بۇرۇن تۆشۈكلىرى كېرىلىدۇ، قوسىغى ئىچىگە تارتىلىپ
كېتىدۇ، نەپەس ئېلىشى ئىتتىكلەيدۇ؛ كالا بېشى ۋە بوينىنى
سوزۇپ تۇرىدۇ، كاللىنىڭ بەل ئۇمۇرتقىسى ئۈستىگە ئېگىلىپ
قالىدۇ، دۈمبە-بېلى قېتىۋالىدۇ، قۇيرۇغى كۆتىرىلىپ قالىدۇ،
ئىختىيارىي ھەركىتى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ. كالا ئاۋاز ۋە كۈچ-
لۈك نۇرنىڭ تەسىرىدىن ئۆرگۈپ بىئارام بولىدۇ، مۇسكۇللىرىنىڭ
تارتىشىشى كۈچىيىدۇ. ئاخىرقى مەزگىلدە، تومۇر سوقۇش
ئىتتىكلەيدۇ، نەپەس ئاستىلايدۇ، شىلىق پەردە كۆكىرىپ
قالىدۇ، تەن تېمپېراتۇرىسى $42 \sim 43^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، پۈتۈن
بەدەندىن تەر چىقىدۇ، كالا قاتتىق زەئىپلىك ياكى تۇنجۇ-
قۇشتىن ئۆلىدۇ. كالىدىكى كېسەللىك ئالامەتلىرى باشقا چارۋى-
لاردىكىدىن يېنىكرەك بولىدۇ، شۇڭا ۋاقىتدا داۋالىسىلا، كالا
كۆپ ھاللاردا ئوڭشىلىپ كېتىدۇ.

[دېئاگنوز قويۇش] كىلىنىكىلىق ئالامەتلەرگە قاراپ ئاسانلا
دېئاگنوز قويغىلى بولىدۇ، كېسەللىك ئالامەتلىرى ئانچە تىپىك
بولمىغانلىرىنى ئۆتكۈر رېماتىزىمدىن پەرقلەندۈرۈشكە دىققەت
قىلىش لازىم. ئۆتكۈر مۇسكۇل رېماتىزىمىدا تەن تېمپېراتۇرىسى
ئۆرلەيدۇ، قوزغىلىش بوش بولىدۇ، ئالقاراق پولاتىيىپ

چىقمايدۇ، كېسەللىك تەككەن جاينىڭ مۇسكۇلىنى تۇتقاندا مال ئاغرىقسىنىدۇ، سالىسل كىسلاتاسلىق دورىلار بىلەن داۋالسا خېلى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش]

(1) قاتما دائىم كۆرۈلىدىغان ئورۇن ۋە جايلاردا كالىلارغا قاتما ئاناتوكسىنىنى ئوكۇل قىلىپ تۇرۇش كېرەك، چوڭ كالىغا 5 م ل دىن، موزايغا 2~5 م ل دىن تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئوكۇل قىلىپ 30 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئىممۇنىت ھاسىل بولىدۇ، ئىممۇنىت مۇددىتى بىر يىل بولىدۇ.

(2) تاشقى جاراھەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تاشقى جاراھەت كۆرۈلگەندە ۋاقىتدا داۋالاش لازىم. پىچىش، مۇڭگۈز كېسىش، چۈلۈك ئۆتكۈزۈش، موزايىنىڭ كىندىگىنى كېسىش، تۇغۇش ۋاقىتدا تۇغۇت يولى زەخمىلىنىش ۋە ئېغىرراق جاراھەتلىنىش كۆرۈلگەن (بولۇپمۇ ئىچكى قەۋەت جاراھەتلىگەن ياكى تۇياق تېگىگە مىخ كىرىپ كەتكەن) چاغدا، دېزىنفىكسىيە قىلىش ئىشنى ياخشى ئىشلەش كېرەك، قاتما ئاناتوكسىنىدىن چوڭ كالىغا 10 مىڭ بىرلىك، موزايغا 2~3 مىڭ بىرلىك بويىچە مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنسۇمۇ بولىدۇ.

[داۋالاش]

(1) كېسەل كالىنى ئاسراش: كېسەل كالىنى پاكىز، قۇرۇق، قاراڭغۇ قوتاندا تېچ تۇرغۇزۇپ بېقىش، تاشقىرىدىن كېلىدىغان تەسىرلەردىن ساقلاش كېرەك. ئوزۇقلىنىشتا قىيىنلىدىغانلىرىغا

ئاشقازان كانىلى ئارقىلىق ئوزۇقلۇق چىقىرىش مولى ئاسان سىڭىدىغان يەم-خەشەكلەرنى بېرىش كېرەك.

(2) كېسەللىك قوزغاتقۇچىلارنى يوقىتىش: جاراھەت ئاغىزىنى كېڭەيتىپ، ئىچىدىكى يىرىك ۋە ئۆلگەن توقۇلمىلارنى تازىلاپ چىقىرىش ۋە جاراھەت ئىچىنى 3% لىك قوش ئوكسىد گېنلىق سۇ ياكى 2%~1 لىك مارگانىسوپ ئېرىتمىسى بىلەن يۇيۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا قويۇق يود تىنىكتۇرسى قويۇش، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پېنتىسىللىندىن مۇسكۇلغا 2~3 مىليون بىرلىك ئوكۇل قىلىش لازىم.

(3) زەھەرنى ئىيتىرالاڭ: دەسلەپتە قاتما ئانتىتوكسىنىدىن تېرە ئاستىغا ئاۋال 1~2 تۈمەن بىرلىك ئوكۇل قىلىپ، زىيادە سەزگۈرلۈكنى پەسەيتىش سىنىغى ئىشلەپ كۆرۈلىدۇ، ئەگەر ئوكۇل قىلىپ 15 مىنۇت ئۆتكىچە ھىچقانداق ناچار رېئاكسىيە كۆرۈلمىسە، ئاندىن كۆك تومۇرغا يەنە 20~30 تۈمەن بىرلىك ئوكۇل قىلىنىدۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا تەكرار ئوكۇل قىلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە 4% لىك ئۇروتروپىندىن كۆك تومۇرغا 50 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ. قان زەردىۋىدىن 5~10 تۈمەن بىرلىك ئېلىپ يۇلۇن بوشلۇغىغا بىۋاسىتە ئوكۇل قىلىنسا، داۋالاش ئۈنۈمى ئاشىدۇ.

(4) تېنچلاندۇرۇپ مۇسكۇل تارتىشىشنى بوشىتىش: خەلور پرومازىندىن ھەر ك گ تەن ئېغىرلىغىغا 1~2 م ل دىن ھىساپلاپ ئېلىپ مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ياكى 25% لىك ماگنىي

سۇلفات ئېرىتمىسى 100 م ل دىن كۆك تومۇرغا كۈندە 1~2 قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. نەپەس مەركىزى پالەچلىنىپ ئۆلۈپ قالمىسۇن ئۈچۈن، ئوكۇلنى ئاستا سېلىش لازىم. دۈمبە-بەل مۇسكۇللىرى قېتىۋالغان بولسا، 1% لىك پروكاين بىلەن 25% لىك ماگني سۇلفاتنىڭ تەڭ مىقدارلىق ئېرىتمىسى مۇسكۇلغا 8~10 نۇقتىغا بۆلۈپ (ھەر نۇقتىغا 10 م ل ئۆپچۆرىسىدە) ئوكۇل قىلىنىدۇ. يىڭنە سانچىپ داۋالاشنى بىرلەشتۈرسىمۇ بولىدۇ، مەسىلەن، بەيخۇي، شېنمىن پەللىلىرىگە قىزىق يىڭنە، گەنجى، رېنجۇڭ، شەنگېن ۋە شۆيىڭ پەللىلىرىگە قانلىق يىڭنە سانچىلىدۇ.

(5) كېسەللىك ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالاش: ئوت-چۆپ يىمەلمەس بولۇپ قالغان كالىلارغا كۈنىگە ئىككى قېتىم سۇيۇق-لۇق ۋە گلىكوزا ئوكۇل قىلىنىدۇ. كىسلاتادىن زەھەرلىنىش كۆرۈلگەنلىرىگە 5% لىك ناترىي ھىدروكاربوناتتىن كۆك تومۇرغا 300~500 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(6) جۇڭگىي دورىلىرى بىلەن داۋالاش: دەسلەپكى مەزگىل-لىدە جۇيىڭسەن، ئوتتۇرا مەزگىلىدە فاڭفېڭسەن، ئاخىرقى مەزگىلىدە تيانماسەن دورىلىرى ئىشلىتىلىدۇ.

① جۇيىڭسەن دورىسى:

رېتسېپ:

كەۋرەك 1 سەر، جىڭجىي باشقى 1 سەر، داغۇر داڭگۇيى 8 مىسقال، دەننەنشىڭ 5 مىسقال، يالپۇز 1 سەر، تومۇزغا

قېپى 1 سەر، شېگما 8 مىسقال، گېگېن يىلتىزى 6 مىسقال،

تيەنما 5 مىسقال، پىلە قۇرۇتى 8 مىسقال

بۇ دورىلار سۇ قوشۇپ قاينىتىلىپ، ئاشقازان كانىلى بىلەن ئىچكۈزۈلىدۇ.

② فاگفېگسەن دورىسى:

رېتسېپ:

كەۋرەك 8 مىسقال، چياڭخو 8 مىسقال، تيەنما 6 مىسقال،

دەنەنشىك 6 مىسقال، قورۇلغان پىلە قۇرۇتى 6 مىسقال،

تومۇزغا قېپى 1 سەر، چايان 4 مىسقال، چۈەنجۇڭ 5

مىسقال، ئاسارۇن 3 مىسقال، داغۇر داڭگۈيى 7 مىسقال،

زاراڭزا چېچىگى 3 مىسقال، زەنجۈبىلدە ئىشلەنگەن بەنشيا

6 مىسقال

بۇ دورىلار سۇ قوشۇپ قاينىتىلىپ، سوۋۇغاندا 2 سەر سېرىق

ھاراق قوشۇلۇپ ئاشقازان كانىلى بىلەن ئىچكۈزۈلىدۇ.

③ تيەنماسەن دورىسى:

رېتسېپ:

قان تېپەر 1 سەر، كەترا 1 سەر، داڭگۈيى 1 سەر، چۇقا

8 مىسقال، ئۇچىقات 1 سەر، ليەنچاۋ 1 سەر، تيەنما 1

سەر، پىلە قۇرۇتى 7 مىسقال، قارا ئىلان 4 مىسقال،

دەنەنشىك 4 مىسقال، تومۇزغا قېپى 4 مىسقال، چايان

3 مىسقال، سەكسەن پۇت 3 دانە

بۇلار سۇ قوشۇپ قاينىتىلىپ، ئاشقازان كانىلى بىلەن ئىچكۈ-

زۈلىدۇ.

ئالا ئۆپكە

ئالا ئۆپكە يۇقۇملۇق كۆكرەك پەردە-ئۆپكە ياللۇغى دەپمۇ ئاتىلىدىغان، يېقىنلىشىشتىن يۇقىدىغان يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، تالالىق ئۆپكە ياللۇغى ۋە كۆكرەك پەردە ياللۇغى بولۇش بىلەن خاراكتىرلىنىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] قىلىسمان مىكوپلازما كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر. ئۇ شەكلى ھەر خىل بولغان ئۇشاق مىكرو ئورگانىزىم، مىكروسكوپتا شارىسمان، تاياقسىمان، بۇرغىسىمان، قىلىسمان ۋە يۇلتۇزسىمان قاتارلىق شەكىللەردە كۆرۈنىدۇ؛ گرام بويىغىدا مەنپى بويىلىدۇ، ئادەتتىكى بويىقتا ئاسانلىقچە بويالمايدۇ؛ گىمزا بويىغىدا بويىسا نەتىجىسى ياخشى چىقىدۇ. مىكوپلازىملار تاشقى مۇھىتتا، بولۇپمۇ تىك چۈشكەن كۈن نۇرىدا بىرنەچچە سائەتتىلا زەھەرلىكلىگىنى يوقىتىدۇ. %1لىك لىزول، %0.1لىك سىمپاڭ خلورىدا، %2لىك كاربولىكا، %5لىك ئاقارتى-قۇچى پاراشوگى، %2~1لىك ئويغۇچى ناترىي ئېرىتمىلىرى مىكوپلازىمنى تېزلا ئۆلتۈرىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ تارقىلىشى] يەرلىك كالا، سېغىن سىيىر ۋە قوتازلار ئاسان يۇقۇملىنىدۇ، ئۇنىڭدىن قالسا سۇ كالىسى ئاسان يۇقۇملىنىدۇ. كېسەل كالا يۇقۇم مەنبەسى ھىساپلىنىدۇ. كېسەللىك قوزغاتقۇچىلار كېسەل كالانىڭ ئۆپكە توقۇلمىسى، كاناي

ئاجراتمىلىرى ۋە كۆكرەك بوشلۇغى سرغىتمىلىرىدا ساقلىنىدۇ،
 ھەزىم قىلىش يولى ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىلىدۇ. سۈت، سۈيىد
 دۈك ۋە جىنىسى يول ئاجراتمىلىرى بىلەنمۇ سىرتقا چىقىرىلىدۇ.
 بۇلغانغان ھاۋا، چاڭ-توزاڭ بىلەن بىللە نەپەس يولىغا كىرىپ
 بەدەنگە يۇقىدۇ. ساغلام كالا كېسەل كالغا بىۋاستە ئۇچراشقاندا
 تېخىمۇ ئاسان يۇقىدۇ. ياشاش شارائىتى ئۇشتۇمۇت ئۆزگەرتىلىش،
 ھاۋا كىلىماتىنىڭ بىردىنبىلا ئۆزگىرىشى، قىستا-قىستائىچىلىق،
 يىراق جايلارغا توشۇش ۋە قاتتىق چارچىتىش قاتارلىقلار ئالا
 ئۆپكىنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى قوشۇمچە سەۋەپلەردۇر. بۇ كېسەل-
 لىك ئادەتتە تولاراق قىشنىڭ ئاخىرى ۋە باش باھاردا چاچما
 ھالەتتە ياكى يەرلىك خاراكتىردا تارقىلىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] مىكوپلازمىلار نەپەس يولىغا
 كىرگەندىن كېيىن ئۇششاق كانايچىلارنىڭ شىلىق پەردىسىدە
 باشلانما كېسەللىك ئۈچىغىنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن
 مىكوپلازمىلار مۇنداق ئىككى خىل يول بىلەن تارقىلىدۇ: بىرى،
 كانايچىلار ئارقىلىق ئۆپكىنىڭ ئۇششاق قاناتلىرىغىچە يامراپ،
 شىرىلىق ۋە قىسمەن نېكرىزىلۇق ياللۇغلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
 ھەمدە باشقا كانايچىلارنى بويلاپ سىرتقا قاراپ كېڭىيىۋېرىپ،
 يېڭى كېسەللىك ئۇچاقلىرىنى ھاسىل قىلىدۇ-دە، ئۆپكىدە
 تۈرلۈك مەزگىللىك جىگەرسىمان ئۆزگىرىش رايونى پەيدا
 بولىدۇ؛ يەنە بىرى، مىكوپلازمىلار كانايچىلارنىڭ ئەتراپىغا يامراپ،
 ئۆپكە پۈۋەكچىلىرى تاشقى پەردىسىدە كۆپىيىدۇ ۋە لىمفا سىس-

تېمىسىنى بويلاپ سىرتقا كېڭىيىدۇ-دە، ئۇششاق ياپراقچىلار ئارا بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلاردا يالغۇلۇق سۇلۇق ئۇششاق پەيدا بولىدۇ ۋە لىمغا تومۇرلىرى روشەن كېڭىيىدۇ، ئارىلىق ماددا ئۆسۈپ قالىدۇ. ئۆسۈپ قالغان ئارىلىق ماددىلار بىلەن ئۆپكە-نىڭ ھەرقايسى مەزگىللىك جىگەرسىمان ئۆزگىرىشى ئۆزئارا بىرلىشىپ، ھەر خىل رەڭلىك مەر-مەر تاشسىمان سىزىقلارنى شەكىللەندۈرىدۇ.

كېسەللىك قوزغاتقۇچىنىڭ زەھەرلىكلىكى كۈچلۈك بولغاندا، ئۆپكە تالالىق ئاقسىللىرى مۇسكۇللىشىپ، ئۆپكەدە ئەتىسىمان ئۆزگىرىش پەيدا بولىدۇ، كۆكرەك پەردىسى يېپىشىپ قالىدۇ ۋە ئۆپكەدە تىقىلىش يۈز بېرىدۇ. بۇنىڭغا يىرىڭلاتقۇچى باكتېرىيە-لەر ۋە چىرىتكۈچى باكتېرىيەلەر يولۇقسا، ئۆپكە توقۇلمىلىرى چىرىپ كېتىدۇ ياكى يىرىڭلىق سېپتىسىمىيە كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يوشۇرۇن ۋاقتى ئادەتتە 14~28 كۈن بولىدۇ، ئەڭ قىسقا بولغاندا 7 كۈن، ئەڭ ئۇزاق بولغاندا 120 كۈن ئەتراپىدا بولىدۇ. دەسلەپتە كېسەللىك ئالامەتلىرى روشەن بولمايدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى سەل ئۆرلەش، روھ-سىزلىنىش، ئىشتەيى ناچارلاش، سۈت مىقدارى تۆۋەنلەش ئالامەتلىرىلا كۆرۈلىدۇ. ھەركەت قىلغاندا ياكى توڭلىغاندا كالتا ۋە قۇرۇق بوش يۆتەل كېلىدۇ، كېسەللىك ئالامەتلىرى تەدرىجى روشەنلىشىدۇ. بۇ كېسەللىك جەريانىغا قاراپ ئۆتكۈر تىپ ۋە سوزۇلما تىپ دەپ ئىككى تىپقا ئايرىلىدۇ.

تۆتكۈر تىپىدا: بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ $42^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، تۇراقلىق قىزىتما بولىدۇ، بۇرۇن نۆشۈكلىرى كېڭىيىدۇ، بەزىدە شىرىقلىق ماڭقا ئاقىدۇ. نەپەس قىلىنىدۇ. "كۆك-كۆك" قىلغان ئاۋاز چىقىدۇ، قوساق فورمىلىق نەپەس ئېلىنىدۇ. يۆتەل كۈچەيگەندە، تولاراق ئاجىز يۆتەل كېلىدۇ. كېسەل كالا يېتىشىنى خالىمايدۇ، ئالدى ئاياقلىرىنى كېرىپ ئۆرە تۇرىدۇ. كۆكرەك قىسمىنى چېكىپ تەكشۈرگەندە، كالا ئاغرىق-سىنىدۇ، ئۆپكەنىڭ ياللۇغلانغان قىسمىدىن تۇتۇق ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. كۆكرەك بوشلۇغىغا سۇ يىغىلغاندا تەكشى تۇتۇق ئاۋاز چىقىدۇ. تىڭشاپ تەكشۈرگەندە، ئۆپكە پۈۋەكچىلىرىنىڭ ئاۋازى ئاجىز ئاڭلىنىدۇ ياكى ئاڭلانمايدۇ، خىرىلىدىغان ئاۋاز ۋە كاناي-چىلار ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ، بەزىدە كۆكرەك پەردىسىنىڭ سۈركەلىشى ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ. كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە، يۈرەك ئاۋازى ئاجىزلايدۇ، قوساقنىڭ ئالدى ۋە ئاستى سۇلۇق ئېشىشىدۇ، ھەزىم قىلىش خىزمىتى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ، كالا تېز جۈدەيدۇ، ئاخىردا تۇنجۇقۇپ ئۆلىدۇ.

كۆرۈلدى. كۆكرەك قىسمىنى تىگشاپ ۋە چېكىپ تەكشۈرگەندە،
روشن ئۆزگىرىش بارلىقى بىلىنىدۇ. تاشقى شارائىت ناچار-
لاشقاندا، ئۆتكۈر تىپلىق كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى كۆرۈلىدۇ.
[دېئاگنوز قويۇش] توغرا دېئاگنوز قويۇش ئۈچۈن پاتو-
ئاناتومىيىلىك ۋە سېرولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش
لازم. سېرولوگىيىلىك تەكشۈرۈشتە كومپلېمېنت باغلاش
رېئاكسىيىسى ئىشلىنىدۇ، بۇ ئۇسۇل پادا بويىچە يۇقۇم تەكشۈ-
رۈشكە باپ كېلىدۇ.

(1) يېرىپ تەكشۈرۈش: كۆكرەك بوشلۇغىغا سۇيۇقلۇق
يىغىلغان بولىدۇ، ئۇنىڭدا قىزغۇچ سېرىق تالالىق ماددىلار ئۇيۇپ
قالغان بولىدۇ، قوساق پەردىسى بىلەن ئۆپكە شىرىلىق پەردىسىگە
تالالىق ماددىلار يېپىشقان بولىدۇ. ئۆپكەنىڭ ئۆزىدە تۈرلۈك
مەزگىللىك جەڭگەرسىمان ئۆزگىرىشلەر بولغان بولىدۇ، كەسمە
يۈزىدە مەر-مەر تاشقا ئوخشاش سىزىقلار ۋە بىرىكتۈرگۈچى
توقۇلمىلار بىلەن ئورالغان نېكروز ئوچاقلرى بولغان بولىدۇ.
ئۆپكە ئارىلىق ماددىسى سۇلۇق ئىششىغان، كېڭەيگەن ۋە ئاقىرىپ
قالغان، لىمفا تومۇرلىرى قاتتىق كېڭەيگەن بولىدۇ. كۆكرەك
پەردىسى يىمىرىلىشىپ، قېلىنلاپ، ئۆپكەگە چاپلىشىپ قالغان
بولىدۇ.

(2) پەرقلەندۈرۈپ دېئاگنوز قويۇش:

پاستېرېللوزدىن پەرقلەندۈرۈش: كالا پاستېرېللوزدىدا كېسەل-
لىك جەريانى ئۆتكۈر ھەم قىسقىراق بولىدۇ، كۆپىنچە كىكرەك

سۇلۇق ئىششىدۇ، بەدەننى يېرىپ تەكشۈرگەندە سېتىشچىلىك ئۆزگىرىش بارلىقى ئېنىق بىلىنىدۇ، قان ۋە ئەزالاردىن ئەۋرىشكە ئېلىپ تەكشۈرگەندە پاستېرىللا تاپاقچە باكتېرىيىلىرى بارلىقى بىلىنىدۇ.

كالا تۇبېركۇلىوزىدىن پەرقلەندۈرۈش: سوزۇلما تېپىنىڭ ئالامەتلىرى تۇبېركۇلىوزغا ئوخشاپ كېتىدۇ، تۇبېركۇلىنى كۆزگە تېمىتىش ياكى تېرە ئاستىغا ئۆكۈل قىلىش ئارقىلىق پەرقلەندۈرۈشكە بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش]

(1) بۇ كېسەللىك مەملىكىتىمىزدە ئاساسىي جەھەتتىن يوقىتىلدى. ئۇ ناۋادا كۆرۈلۈپ قالسا، دەرھال يۇقۇرىغا مەلۇم قىلىش، ۋاقتىدا دىئاگنوز قويۇش، كارانتىن قىلىش، ئايرىش، دېزىنڧېكسىيە قىلىش ۋە ئۆلۈگىنى بىر تەرەپ قىلىش تەدبىرلىرىنى قاتتىق ئىجرا قىلىش لازىم.

(2) تولۇقلىنىدىغان كالىلارنى قاتتىق يۇقۇم تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈش، ئالا ئۆپكەننىڭ توشقاندىن ئۆتكۈزۈپ ئاجىزلاشتۇرۇلغان ۋاكسىنىنى ئۆكۈل قىلىش، 21 كۈنگىچە ئايرىم كۆزدە تىپ، ھەقىقەتەن كېسەللىك يوقلۇقى ئىسپاتلانغاندىن كېيىن ساق كالىلارغا قوشۇش لازىم.

(3) كېسەللىك كۆرۈلگەن رايونلاردا ھەر يىلى ئالا ئۆپكەننىڭ توشقاندىن ئۆتكۈزۈپ ئاجىزلاشتۇرۇلغان ۋاكسىنىسى (ياكى ئالا ئۆپكەننىڭ ئاجىزلاشتۇرۇپ توڭلىتىلغان ۋاكسىنىسى) قەرەل.

لىك ھالدا ئوكۇل قىلىپ تۇرۇلۇشى، مىقدارى ۋە ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى بىئولوگىيىلىك دورا زاۋۇدىنىڭ چۈشەندۈرمىسى بويىچە بولۇشى كېرەك.

[داۋالاش] بالدۇر تۇتۇش قىلىپ داۋالسا، كېسەل كالىنىڭ كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرى يوقىلىدۇ، ئەمما بۇنداق كالىلار باكتېر-رىيىلەرنى ئۇزاققىچە ئېلىپ يۈرىدۇ، شۇڭا يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، بۇنداق كالىلارنى ئايرىم بېقىش لازىم.

(1) 3~4 گ يېڭى ئارسېنىئامىن 5% لىك 100~500 م ل گىلىكوزىلىق - فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىدە ئېرىتىلىپ، كۆك تومۇرغا بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. 4~7 كۈندىن كېيىن يەنە شۇ مىقداردا قايتا ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(2) تېررامىتسىن ياكى تېتراسىكلىن، ياكى سترېپتومىتسىن مۇسكۇلغا 2~4 گ دىن ئۇدا 7 كۈن ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(3) يۈرەك كۈچەيتكۈچى، سۈيدۈك ھەيدىگۈچى، يۆتەل توختىتىپ بەلگەم چۈشۈرگۈچى ۋە ھەزىم قىلىشنى ياخشىلىغۇچى دورىلار كېسەللىك ئالامەتلىرىگە قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

3. پارازىت قۇرۇت كېسەللىكلىرى

جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىكى

جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىكى دىستوماتوز دەپمۇ ئاتىلىدۇ، بۇنى جىگەر ۋە ئۆت يولىدا پارازىتلايدىغان ياپىلاق ۋە چوڭ شورىغۇچ قۇرۇتلار پەيدا قىلىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] جىگەر شورىغۇچ قۇرۇتنىڭ ئۇزۇن-لۇغى 20~30 م م، كەڭلىكى 8~13 م م كېلىدۇ. ئۇ يوپۇرماققا ئوخشاش، ئالدى كەڭ، كەينى تار، ياپىلاق بولىدۇ، ئۇنىڭ ئالدى قىسمىدا كۈنۈسسېمان تومپىغى بولىدۇ، بۇنىڭ ئۈچىدا كىچىك تۆشۈكى بولىدۇ، بۇ ئېغىز شورىغۇچىسى ھىساپلىنىدۇ، ئاساسىي قىسمى تۇيۇقسىز كېڭىيىپ دۇلغا ئوخشاپ تۇرىدۇ، ئىككى ياق دۈلىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا كىچىك تۆشۈكى بولىدۇ، بۇ قوساق شورىغۇچىسى ھىساپلىنىدۇ. قۇرۇتنىڭ رەڭگى قىزغۇچ كۈل رەڭ بولىدۇ، ئىچكى ئەزالىرىنىڭ رەڭگى بىر خىل بولىدۇ. خالىقتىن، ھەر خىل گۈللۈك سىزىقلار كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. قۇرۇت تۇخۇمىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 0.13~0.15 م م، كەڭلىكى 0.07~0.09 م م بولىدۇ، سوقىچاق كېلىدۇ، رەڭگى سېرىق، ئاچ سېرىق


ياكى قېنىق سېرىق بولىدۇ، ئىككى قەۋەت نېپىز ۋە پارىراق تۇخۇم پەردىسى بولىدۇ، بىر ئۇچىدا ئانچە ئېنىق بولمىغان تۇخۇم قاپقىغى بولىدۇ. تۇخۇمنىڭ ئىچىدە يۇمۇلاق تۆرەلمە ھۈجەيرىسى بولىدۇ، ئۇنى نۇرغۇنلىغان تۇخۇم سېرىغى دانىچە-لىرى ئوراپ تۇرىدۇ.

چوڭ شورىغۇچ قۇرۇتلار يايىلاق شورىغۇچ قۇرۇتلاردىن ئۇزۇن بولىدۇ، سۆگەت يوپۇرمىغىغا ئوخشايدۇ، ئۇزۇنلۇغى 33~76 م م، كەڭلىكى 5~12 م م كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئالدى تەرىپى تەبىئى ھالدا تومپىيىپ تۇرىدۇ، دۇلغا ئوخشاش تۈزۈ-لۈشى بولمايدۇ، كەينى تەرىپى دىقماق بولىدۇ. تۇخۇمنىڭ ئۇزۇنلۇغى 0.15~0.19 م م، كەڭلىكى 0.07~0.09 م م كېلىدۇ.

[يېتىلىش تارىخى] يايىلاق شورىغۇچ قۇرۇت بىلەن چوڭ شورىغۇچ قۇرۇتنىڭ يېتىلىش جەريانى ئوخشىشىپ كېتىدۇ، ئىككىلىسىلا قۇلۇلدىن ئىبارەت ئارىلىق خوجايىنىنىڭ تېنىدە ئۆسۈپ يېتىلىدۇ. قۇلۇلە قېپى ئوڭغا 4 بۇرمىلىق بولىدۇ، ئاخىرى كۆرۈنەرلىك كەڭ بولىدۇ، ئىگىزلىكى 10~12 م م غا يېتىدۇ. بۇ سۇدا ۋە قۇرۇقلۇقتا ياشايدىغان قۇلۇلە بولۇپ، تولا-راق زەيلىك، شاللىق، ئېرىق-ئۆستەڭ ۋە سۇ كۆپۈكلىرىدە ياشايدۇ، ھەر يىلى 5-ئايدىن باشلاپ تۈركۈملەپ تۇخۇم سېلىپ كۆپىيىدۇ.

يايىلاق ۋە چوڭ شورىغۇچى قۇرۇتلار كالىنىڭ جىگەر ۋە

ئۆت يولىدا پارازىتلايدۇ. ياپىلاق شورغۇچ قۇرۇتلار قوي، چوشقا، ئات ۋە باشقا ھايۋانلارنىڭ تېنىدىمۇ پارازىتلايدۇ. ئۇلار پارازىتلاش جەريانىدا تۇخۇملايدۇ، تۇخۇملار ئۆت سۈيۈقلۈكى ئارقىلىق ئۈچەيگە ئۆتۈپ، تىزەك بىلەن بىللە بەدەندىن سىرتقا چىقىرىلىدۇ ۋە $15\sim 30^{\circ}\text{C}$ لۇق سۇدا 10~26 كۈنگىچە تۈگۈلۈك لىچىنكىلارغا ئايلىنىدۇ. لىچىنكىلار سۇدا ئىختىيارىي ئۈزۈپ يۈرىدۇ، قۇلۇلگە يولۇققان ھامان، ئۇنىڭ بەدىنىگە كىرىپ



12-رەسىم جىگەر شورغۇچ قۇرۇق ۋە ئۇنىڭ تۇخۇمى

1. ياپىلاق شورغۇچ قۇرۇق 2. چوڭ شورغۇچ قۇرۇق

3. قۇرۇق تۇخۇمى (چوڭايتىلغان)

داۋاملىق يېتىلىپ ۋە كۆپىيىپ، 35~40 كۈنىدە نۇرغۇنلىغان قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلارغا ئايلىنىدۇ. قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلار ئارلىق خوجايىندىن ئايرىلىپ يېڭىۋاشتىن سۇغا چۈشۈپ، سۇ ئوتلىرى ياكى باشقا جىسىملارغا يېپىشىپ يۈرىدۇ، ياكى سۇ يۈزىدە لەيلەپ يۈرىدۇ ھەمدە قۇيرۇغىنى تاشلاپ، ئاسان قاتنىدىغان يېپىشقاق ماددىلارنى چىقىرىپ ئۆزىنى نېپىز پەردىلەر بىلەن ئورۇنلاپ، تاشقى ناچار شارائىتنىڭ تەسىرىدىن ئۆزىنى قوغدايدۇ، بۇ ۋاقىتتا ئۇ قاپلىق لىچىنكىغا ئايلانغان بولىدۇ. قاپلىق لىچىنكى

لارنى كالىلار سۇ ۋە ئوت-چۆپكە قوشۇپ يۇتۇۋالىدۇ-دە، يۇقۇملىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن قاپلىق لىچىنكىلار كالىنىڭ ھەزىم قىلىش يولىدا قېيىدىن ئاجراپ چىقىپ ئۈچەي تېمىغا تېشىپ كىرىدۇ، ياكى قان ئارقىلىق قاپلىق كۆك تومۇر ئارقىلىق جىگەرگە بېرىپ، ئۆت يولىدا پارازىتلايدۇ؛ ياكى ئۈچەي تېمىدىن قوساق بوشلۇقىغا كىرىپ، جىگەر ئارقىلىق ئۆت يولىغا كىرىدۇ. قاپلىق لىچىنكىلار 90~120 كۈن ئەتراپىدا يېتىلىپ چوڭ قۇرۇتلارغا ئايلىنىدۇ ۋە چارۋا مال تېنىدە 3~5 يىل ياشايدۇ.



13-رەسىم جىگەر شورىغۇچ قۇرۇتنىڭ يېتىلىش تارىخى

جىگەر شورىغۇچ قۇرۇتلارنىڭ يېتىلىشى ئۈچۈن يامغۇرلۇق يىللار، ئويمان-زەي يەرلەر باپ كېلىدۇ. بۇ قۇرۇتلار 5-ئاي-دىن كېيىن قۇلۇلەر تېنىدە پارازىتلايدۇ، 7-ئايدىن كېيىن قاپلىق لىچىنكىلارغا ئايلىنىپ، چارۋا ماللارغا يۇقىدۇ. چارۋا ماللار ئادەتتە كۈز، قىش، ئەتىياز پەسىللىرىدە كېسەللىنىدۇ. شورلۇق يەرلەردە كالىلارنىڭ يۇقۇملىنىش نىسبىتى تۆۋەنرەك بولىدۇ. موزايىلار ئېغىرراق كېسەللىنىدۇ، چوڭ كالىلار يەڭگىل كېسەللىنىدىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇلار كۆپ ھاللاردا جىگەر

شورغۇچ قۇرۇت كېسەللىگىنىڭ يۇقۇم مەنبەسى بولۇپ قالىدۇ.
[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرىگە قاراپ
ئۆتكۈر تىپ ۋە سوزۇلما تىپ دەپ ئىككى تىپقا ئايرىلىدۇ.
ئادەتتە تولراق سوزۇلما تىپتا كۆرۈلىدۇ.

ئۆتكۈر تىپى: بۇ، يېتىلمىگەن قۇرۇتلاردىن پەيدا بولىدۇ.
قاتتىق يۇقۇملانغان ئەھۋالدا، ئاز ساندىكى موزايىلار 11~12-
ئايىلاردا كېسەللىنىدۇ. كېسەللەنگەندىن كېيىن تەن تېمپېراتۇرىسى
دەۋرىيلىك ھالدا ئۆرلەيدۇ (بەزىدە 41°C ~ 42°C قا چىقىدۇ).
روھسىزلىنىدۇ ياكى قاتتىق بىئارام بولىدۇ، ئىشتىيى
ناچارلايدۇ ياكى پۈتۈنلەي تۈتۈلىدۇ، كۆرۈنىدىغان شىلىق
پەردىلىرى باشتا قىزىرىدۇ، كېيىن ئاقىرىدۇ، سارغىيىدۇ، جىگەر
قىسمىنى بېسىپ كۆرگەندە، كالا ئاغرىقىسىنىدۇ. قان تەكشۈرۈلسە،
قىزىل قان ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئازايغانلىقى، گېمىگلوبىن
پىرسەنتىنىڭ تۆۋەنلىگەنلىكى، كىسلاتاپەرەس ئاق قان ھۈجەيى-
رىلىرىنىڭ كۆپىيىپ قالغانلىقى بايقىلىدۇ. كۆپ ساندىكىلىرى
سوزۇلما تىپقا ئايلىنىدۇ، ئاز ساندىكىلىرى 7~14 كۈندىن كېيىن
ئۆلۈپ قالىدۇ.

سوزۇلما تىپى: بۇ، يېتىلگەن قۇرۇتلارنىڭ پارازىتلىشىدىن
پەيدا بولىدۇ، تولراق 1~4-ئايىلاردا كۆرۈلىدۇ. كېسەللەنگەن
كالا روھسىزلىنىدۇ، ئورۇقلايدۇ، كەمقان بولۇپ قالىدۇ، تۈكلىرى
يىرىك، پارقراقسىز، ئاسان تۆكۈلىدىغان بولۇپ قالىدۇ، ئىشتى-
يى ناچارلايدۇ ياكى غەيرى نەرسىلەرگە ئامراق بولۇپ قالىدۇ.

ئالدىنقى قېرىندىلىرى بوشىشىپ قالىدۇ ياكى ئىچى سۇرىدۇ، بەزىدە تىزىكى قان ئارىلاش كېلىدۇ. كالىنىڭ كۆرۈنىدىغان شىللىق پەردىلىرى ئاقىرىدۇ، بەزىدە سارغىيىپ قالىدۇ. ئىش كالىلىرىنىڭ ئىشلەش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ، ئېغىر كېسەللەندۈرگەنلىرى كاردىن چىقىدۇ. سېغىن سىيىرلارنىڭ سۈتى %30~20 ئازلايدۇ، ئېغىر بولغاندا %50 تىن ئوشۇق ئازلايدۇ. بوداق كالىلارنى سەمىرىتىش تەسكە توختايدۇ، ئۇلارنىڭ ئەت ئېلىشى ئاستا بولىدۇ. ئانىلىق سىيىرلارنىڭ كۈيلىشى نورمالسىزلىشىدۇ، ئۇلار ھەتتا كۈيلىمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ، بوغاز بولغاندىن كېيىن ئاسانلا بالا تاشلايدۇ، ياكى ئۆلۈك تۇغىدۇ، ساق تۇققان تەقدىردىمۇ، موزىيى ناھايىتى ئاجىز تۇغۇلىدۇ. موزايىلار كېسەللەندۈرگەندىن كېيىن ئۆسۈشى ئاستا بولىدۇ، ئوبدان يېتىلەلمەيدۇ. كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە بەزى كالىلارنىڭ ئىكەك ئاستىدا سوغاق، ئاغرىمايدىغان سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، بەزىدە ئىششىق باش، بويۇن ھەتتا ساڭگىلىما گۆشكەچە كېڭىيىدۇ، بۇ ھال ئادەتتە ئەتىگەنلىكى روشەن بىلىنىدۇ، ھەركەتلەنگەندىن كېيىن يەڭگىلەيدۇ ياكى يوقىلىدۇ، ئېغىر كېسەللەنگەنلىرى 30~60 كۈندىن كېيىن ئۆلۈپ قالىدۇ.

[دىئاگنوز قويۇش] كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرىگە ۋە كېسەللىكنىڭ تارقىلىش ئەھۋالىغا ئاساسلانغاندىن باشقا، ئۆلۈكنى يېرىپ كۆرۈش ۋە تىزەكنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق دىئاگنوز قويۇلىدۇ.

(1) ئۆلۈكنى يېرىپ تەكشۈرۈش: ئۆتكۈر كېسەل تېگىپ ئۆلگەن كالىنىڭ قوساق بوشلۇقىغا سۇيۇقلۇق يىغىلغان، ئۇنىڭغا قان ئارىلاشقان، جىگىرى يوغانغان، جىگەرنىڭ ئۈستىدە 2~5 م م كېلىدىغان قارامتۇل قىزىل سىزىقلار ھەمدە ئۇيۇغان قان ۋە تولۇق يېتىلمىگەن قۇرۇت لىچىنكىلىرى بولغان بولىدۇ. سوزۇلما تىپلىق كېسەل بىلەن ئۆلگەن كالىنىڭ قېنى سۇيۇلۇپ قالغان، جىگىرى قاتتىقلىشىپ، ئۈستى مۇدۈر-چوقۇر بولۇپ قالغان، ھەر خىل چوڭلۇقتىكى كۆكۈش ئاق تانۇقلار پەيدا بولغان، ئۆت يولى تومپىيىپ ھەم قاتتىقلىشىپ قالغان، ئۆت خالىسى ئىشىپ قالغان بولىدۇ، ئۆت يولىنى كەسكەندە غىچىر-لىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ، سىمقا ئىچىدىن قۇرۇت چىقىدۇ.

(2) تىزەكنى تەكشۈرۈش: بۇنىڭدا سۇ بىلەن يۇيۇپ تىندۈرۈش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ: 5~10 گىرام تىزەكنى ئىستاكىغا سېلىپ، ئۇنىڭغا 10~20 ھەسسە سۇ قۇيۇپ تەكشى ئارىلاشتۇر-غاندىن كېيىن، مېتال ئەگەك بىلەن ياكى داكا (3~4 قەۋەت قاتلانغان) بىلەن ئىككىنچى بىر ئىستاكىغا سۈزۈپ ئېلىپ، 5~10 مىنۇت جىم تۇرغۇزۇلىدۇ، ئاندىن ئۈستىدىكى سۇ تۆكۈ-ۋېتىلىپ، تىنمىسىغا يەنە سۇ قوشۇپ جىم تۇرغۇزۇپ تىندۈرۈلىدۇ، بۇنداق تىندۈرۈش ئۈستىدىكى سۇ سۈزۈكلىشىگەچە 3~4 قېتىم داۋاملاشتۇرۇلىدۇ. ئاخىردا ئۈستىدىكى سۈزۈك سۇ تۆكۈۋېتىلىپ، تىنمىلار ئەينەك ئۈستىگە شورغۇچ ئارقىلىق تامغۇزۇلۇپ، ئۈستىگە ياپقۇچ ئەينەك يېپىپ مىكروسكوپتا تەكشۈرۈلىدۇ،

جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت تۇخۇملىرى كۆرۈنسلا، شۇنىڭغا قاراپ دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ. بۇنى قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇت تۇخۇملىرىدىن پەرقلەندۈرۈشكە دىققەت قىلىش كېرەك، چۈنكى ھەر ئىككىسىنىڭ شەكلى، تۈزۈلۈشى ۋە چوڭلۇغى ئوخشىشىپ كېتىدۇ، لېكىن رەڭگى ئوخشىمايدۇ، يەنى جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت تۇخۇمىنىڭ رەڭگى سېرىق، ئاچ سېرىق ياكى قېنىق سېرىق بولىدۇ، قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇت تۇخۇمىنىڭ رەڭگى بولسا سۈر ئاق بولىدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش]

1. قۇرۇت چۈشۈرۈش: بۇ كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قەرەللىك ھالدا قۇرۇت چۈشۈرۈش (ئەتىيازدا 3~4-ئايىلاردا بىر قېتىم، كۈزدە 11~12-ئايىلاردا يەنە بىر قېتىم) خىزمىتىنى ئىشلەش، كېسەللىك كۆرۈلگەن چاغدا جىددى تۈتۈش قىلىپ قۇرۇت چۈشۈرۈش كېرەك.

(1) كاربون تېتراخلور (4 خلورلۇق كاربون): بۇ تولاراق سۇيۇق پارافىن بىلەن تەڭ مىقداردا ئارىلاشتۇرۇلۇپ، ھەر كىگ تەن ئېغىرلىغىغا 6~8 م ل دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ (ئەڭ يۇقىرى مىقدارى 30 م ل دىن ئېشىپ كەتمىسۇن)، كاسا مۇسكۇلىغا نۇقتىلارغا بۆلۈپ ئۆكۈل قىلىنىدۇ. كاربون تېتراخلور كالىنى ئاسانراق زەھەرلەپ قويىدۇ، پادا بويىچە قۇرۇت چۈشۈرۈشتە ئۆلۈش نىسبىتى $\frac{2}{10000}\%$ كە يېتىدۇ. كالا زەھەرلەنگەندىن كېيىن، روھسىزلىنىش ياكى بىئارام بولۇش،

ئىشتەي تۇتۇلۇش، چوڭ قېرىن بوشاش ۋە كۆيۈش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كالىنىڭ سالامەتلىكى ئادەتتە ناھايىتى تېزلا ئىسسىقلىق كېلىدۇ، سالامەتلىكى ئۇزاققىچە ئەسلىگە كېلەلمىگەنلىرىنى كالتسىيلىق دورىلارنى بېرىپ قۇتۇلدۇرغىلى بولىدۇ، يەنى كۆڭ تومۇرغا %10 لىك كالتسىي خلورىددىن 100~150 م ل، ياكى %10 لىك كالتسىي گلىكوناتتىن 150~200 م ل ئوكۇل قىلىنسا بولىدۇ.

2) ھېكساخلور ئېتان (6 خلورلۇق ئېتان): بۇ دورا كالىنىڭ ھەرىكەت تەن ئېغىرلىقىغا 0.3 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ بىر يوللا ئىچكىۈزۈلىدۇ. تېنى ئاجىز كالىلارغا ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ (ئارىسىدىن 20~30 سائەت ئۆتكۈزۈپ) ئىچكىۈزۈلىدۇ. ئەتىگەندە ئاچ قوساق ئىچكىۈزۈلسە ئۈنۈمى ياخشىراق بولىدۇ، دورا ئىچكىۈزۈلۈپ 2 سائەتتىن كېيىن ئوزۇق بېرىلىدۇ. دورا ئىچكىۈزگەندىن كېيىن ئىچى سۈرۈش، ئىشتەي تۇتۇلۇش، سۈت مىقدارى ئازىيشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلۈشى مۈمكىن، لېكىن 2~3 كۈندىن كېيىن بۇ ئالامەتلەر ئۆزلۈگىدىن يوقاپ كېتىدۇ. رېئاكسىيە ئېغىرراق كۆرۈلۈپ، ئوزۇق يىمەسلىك، ئىچى سۈرۈش، چوڭ قېرىن كۆپۈش، ھەتتا ئورنىدىن تۇرماسلىقتەك ئەھۋاللار كۆرۈلگەن ئايرىم كالىلارغا كۆپلەپ سۇ ئىچكىۈزۈش، ئېچىشنى باسقۇچى دورا ۋە ماگنىي سۇلفات بېرىش، كالتسىي خلورىد ياكى كالتسىي گلىكوناتتىن كۆڭ تومۇرغا ئوكۇل قىلىش لازىم. دورىنىڭ ئەكس تەسىرىنى ئازايتىش ئۈچۈن دورا بېرىل-

گەندىن كېيىن 2~3 كۈنگىچە بوغۇز، ئاقسىللىق ئوزۇق ۋە باشقا ئاسان ئېچىدىغان يەم-خەشەكلەرنى ئاز بېرىش لازىم. ھېكساخلور ئېتان بىلەن كاربون تېتراخلور يېتىلگەن قۇرۇت-لارنى چۈشۈرۈشتە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ، سوزۇلما خاراكتىرلىق جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىگىنى داۋالاشقىلا. مۇۋاپىق كېلىدۇ. كاربون تېتراخلور بىلەن سۇيۇق پارافىن ئارىلاشمىسىنى مۇسكۇلغا ئۆكۈل قىلىش بىلەن بىللە ھېكساخلور ئېتانمۇ ئىچكىۈزۈلسە، ئۆتكۈر خاراكتىرلىق جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىگىنى داۋالاشقا بولىدۇ.

(3) بىتىئونول: بۇ دورا يەرلىك كالىنىڭ ھەركىگە تەن ئېغىرلىغىغا 0.05 گ دىن، سېغىن سىيرىنىڭ ھەركىگە تەن ئېغىرلىغىغا 0.06~0.08 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ بىر يوللا ياكى ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ (ئارىدىن 20~30 سائەت ئۆتكۈزۈپ) ئىچكىۈزۈلىدۇ، ياكى بولمىسا ئۇنى يالىتىپ يىگۈزسىمۇ بولىدۇ، دورا بېرىلگەندىن كېيىن ئىچى سۈرۈش، ئىشتەي تۇتۇلۇش ۋە سۈت مىقدارى ئازىيشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ، لېكىن بۇنداق ئەھۋاللار ئادەتتە 2~3 كۈندىن كېيىن يوقاپ كېتىدۇ.

(4) نىتروخلور فېنول: ھەركىگە تەن ئېغىرلىغىغا 3~5 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ، ئادەتتە چوڭ كالىلارغا 1.5 گ دىن، ئوتتۇرا ھال كالىلارغا 1.0 گ دىن، موزايىلارغا 0.5 گ دىن ئىچكىۈزۈلىدۇ، ئەكس تەسىر كۆرۈلمەيدۇ.

5) تىئورىيە فېنول: بۇ دورىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى بىئوتىئورلارغا ئوخشاش.

6) خىتول: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقىغا 0.13~0.15 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

2. قۇلۇلە يوقىتىش: قۇلۇللەرنى يوقىتىش جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىگىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ مۇھىم تەدبىرى. قۇلۇلە يوقىتىشتا دورا بىلەن يوقىتىش، بىئولوگىيىلىك يول بىلەن يوقىتىش ۋە تۇپراقنى ئۆزگەرتىپ يوقىتىش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ.

1) دورا بىلەن يوقىتىش:

ئاممىياك سۈيى: شاللىقلاردىكى قۇلۇللەرنى يوقىتىشقا باپ كېلىدۇ. ھەر مو يەرنىڭ بىر سۇڭ قېلىنلىقتىكى سۇ قەۋىتى ئۈچۈن 20% لىك ئاممىياك سۈيىدىن 20 ك گ ئىشلىتىلىدۇ.

كۆكتاش (مىس سۇلفات): ئوتلاق، كۆلچەك، سازلقلاردىكى قۇلۇللەرنى يوقىتىشقا مۇۋاپىق كېلىدۇ. ھەر كۇۋادىرات مېتىر يەردىكى 1 س م چوڭقۇرلۇقتىكى سۇ قەۋىتى ئۈچۈن 2 گ دىن ھىساپلىنىپ، 1:5000 ھەسسىلىك ئېرىتمىسى پۇركىلىدۇ.

ھاك: ئېرىقلار ۋە سازلقلاردىكى قۇلۇللەرنى يوقىتىشقا لايىق كېلىدۇ. ھەر مو يەرگە 50 ك گ ئىشلىتىلىدۇ.

ناترىي پېنتاخلور فېنول: كۆلچەكلەر ۋە دەريا ياقلىرىدىكى قۇلۇللەرنى يوقىتىشقا ئىشلىتىلىدۇ. كۆلچەك سۈيىنىڭ ھەر كۇۋادىرات مېتىرى ئۈچۈن 10~20 گ دىن، دەريا ياقىسىنىڭ

ھەر مېتىرى ئۈچۈن 10 گ دىن ئىشلىتىلىدۇ.

شۇڭاڭ — 67: تەركىبىدە 50% نىكلوسامىد بار بولغىنى كۆل-
چەكلەردىكى قۇلۇلەرنى يوقىتىشقا باپ كېلىدۇ، ھەر كۆپ
مېتىرغا 2 گ ئىشلىتىلىدۇ. ناتىرىي پېنتاخلور فېنول ئارىلاش-
تۇرۇلسا (شۇڭاڭ — 67 بىر ئۇلۇش، ناتىرىي پېنتاخلور فېنول 5
ئۇلۇش) ئۇنۇمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ، ھەر كۆپ مېتىرغا 6
گ ئىشلىتىلىدۇ.

تىرىقنى مورى (蜗螺净): كۆلچەك ۋە ئېرىقلاردىكى قۇلۇ-
لەرنى يوقىتىشقا لايىق كېلىدۇ. 15~40 ھەسسە سۇ ئارىلاش-
تۇرۇپ سۇيۇلدۇرۇلغاندىن كېيىن ئېقىن سۇغا (ئېرىق سۈيى،
ئېتىزغا كىرىۋاتقان سۇ) قۇيۇلىدۇ، ھەر كۆپ مېتىر سۇغا ساپ
دورىدىن 2 م ل ئىشلىتىلىدۇ؛ ئۆلۈك سۇ (كۆلچەك ۋە ئامبار
سۈيى) غا قويغاندا سۇيۇلدۇرۇپ %0.1 لىك ئېرىتمە قىلىنىپ،
سۇ يۈزىگە پۈركۈلىدۇ، ھەر كۆپ مېتىر سۇغا 0.025 م ل ساپ
دورا ئىشلىتىلىدۇ.

ناتىرىي پېنتاخلور فېنول بىلەن شۇڭاڭ — 67 بېلىقلارنى
زەھەرلەپ قويىدىغان بولغاچقا، ئىشلەتكەندە دىققەت قىلىش
كېرەك.

2) قۇلۇلىنى تۇپراقنى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق يوقىتىش:
تاغلىقنى ئۆزلەشتۈرۈش، سۈنى تىزگىنلەش ئىشى ۋە ئېتىز-
ئېرىق ئاساسىي قۇرۇلۇشىغا بىرلەشتۈرۈپ، كېرەكسىز كۆلچەك ۋە
ئويمانلارنى تىندۈرۈش، كۆلچەك، زەيكەش، ئېرىق-ئۆستەڭ-

لەرنى راۋانلاشتۇرۇش ئارقىلىق قۇلۇلىك بىك كۆپىيىشىگە ئىمكانىيەت بەرمەسلىك كېرەك.

(3) قۇلۇلىنى بىئولوگىيىلىك يول بىلەن يوقىتىش: غاز-ئۆدەك بېقىپ، سۇدىكى قۇلۇلىلەرنى ئۇلارغا يىگۈزۈش كېرەك. 3. يۇقۇملاندىنىشتىن ساقلىنىش:

(1) قىغ-تمزەكلەرنى ۋاقتى-ۋاقتىدا چىقىرىپ بىر يەرگە توپلاپ، ئېچىتىلدىن كېيىن ئوغۇت قىلىش كېرەك.

(2) كالىلارنى سالىق، ئۇيمان، شاللىقتىكى سۇ ۋە پاسكىنا ئېرىق-ئۆستەك سۈيى بىلەن سۇغارماسلىق لازىم.

(3) چوڭ-كىچىك كالىلارنى ئايرىم-ئايرىم بېقىش، موزاي-لارنى قۇرغاق ئوتلاق ۋە سۈنىي ئوتلاققا بېقىش، ئۇيمان ئوتلاق-لارغا ئېپىيىرىپ باققان كالىلارنى ئادەتتە 45~60 كۈندە ئۇرۇن يۆتكەپ بېقىش لازىم.

(4) زەيكەش ئوتلاقلىرىنىڭ ئوت-چۆپلىرىنى ئۇرغاندا ئېگە-زىنى ئىگىزەك قالدۇرۇش، قاپلىق لىچىكىلارنىڭ ئوت-چۆپكە ئارىلىشىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش لازىم. بۇلغانغان ئوتلاق ۋە شاللىقلارنىڭ ئوت-چۆپلىرىنى ئۇرۇپ ئېلىپ تولۇق قۇرۇتۇپ، 6 ئاي تۇرغۇزغاندىن كېيىن مالغا بېرىشكە بولىدۇ.

(5) سۈيۈۋېتىلگەن كېسەل كالىنىڭ جىگىرىنى چوڭقۇر كۆمۈش، كۆيدۈرۈش ياكى پىشۇرغاندىن كېيىن چوشقا ۋە ئۆي قۇشلىرىغا بېرىش لازىم، ئىنقا تاشلاپ بېرىشكە بولمايدۇ، چۈنكى قۇرۇت تۇخۇملىرى ئىتنىڭ ھەزىم قىلىش يولىدا ساقلىدۇ.


نىدۇ ۋە سىرتقا چىقىرىۋېتىلگەندىن كېيىن داۋاملىق ئۆسۈپ يېتىلىدۇ. كېسەل كالىنىڭ ئۈچەيلەردىن چىقىدىغان نەرسىلەرنى ئېچىتىپ بىر تەرەپ قىلىش كېرەك، ئۇنى ئېرىق-ئۆستەك ۋە كۆلچەك-سازلىقلارغا ئېقىتىۋېتىشكە بولىدۇ.

قېرىن شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىگى

قېرىن شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىگى قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇتلارنىڭ چوڭ قېرىندا پارازىتلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئۆلكىمىزدە بۇنداق كېسەللىك كەڭ تارقالغان بولۇپ، كالىلار-دىمۇ، قويلىرىمۇ بولىدۇ، موزايىلارغا ئېغىرراق زىيان يەتكۈزىدۇ. [كېسەللىك قوزغاتقۇچى] قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇتلار ئۇپا رەڭلىك، ئامۇتسىمان بولىدۇ، دۈمبىسى بىر ئاز تومپاق، قوسىغى سەل ئويىمان كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇغى 5~12 م، كەڭلىگى 2~4 م بولىدۇ، ئالدى تەرىپىدە قان شۇراش ئېغىزى يەنى ئالدى شورىغۇچىسى، كەينى تەرىپىدە قوساق شورىغۇچىسى يەنى كەينى شورىغۇچىسى بولىدۇ. كەينى شورىغۇچىسى ئالدى شورىغۇچىسىدىن چوڭ بولىدۇ، ئۇ چىڭ يېپىشىۋېلىش رولىنى ئوينايدۇ.

قۇرۇت تۇخۇمنىڭ ئۇزۇنلۇغى 0.15~0.16 م، كەڭلىگى 0.07~0.08 م كېلىدۇ، رەڭگى سۇر ئاق، شەكلى سوقىچاق بولىدۇ، تۇخۇمنىڭ ئىككى قەۋەت نېپىز ھەم سىلىق پەردىسى

بولدۇ، پەردە ئىچىدە يۇمۇلاق تۆرەلمە ھۈجەيرىسى بولىدۇ، ئۇ تۇخۇم سېرىغى دانىچىلىرى بىلەن ئۆرسىلىپ تۇرىدۇ. تۇخۇم سېرىغى دانىچىلىرى تۇخۇمنىڭ بىر ئۇچىغا يىغىلىپ تۇرىدۇ.



14-رەسىم قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇت ۋە ئۇنىڭ تۇخۇمى

A. قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇت B. قۇرۇت تۇخۇمى


[يېتىلىش تارىخى] قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇتلار ئارىلىق

خوجايىن — سۇدا ياشىغۇچى قۇلۇننىڭ ياردىمىدە يېتىلىدۇ. قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇتلار كالا، قويلارنىڭ چوڭ قېرىندىكى تىرىپلار ئارىسىدا ياشايدۇ ۋە تۇخۇملايدۇ. تۇخۇملار تىزەك بىلەن بىللە سىرتقا چىقىرىلىدۇ. دە، سۇغا چۈشكەنلىرى مۇۋاپىق تېمپېراتۇرىدا 11~22 كۈندە تۈكلۈك لىچىنىڭغا ئايلىنىدۇ. تۈكلۈك لىچىنىكلار قۇلۇلە تېنىگە كىرىپ، ھۈجەيرىلىك لىچىنىكا، قاتقان لىچىنىكا ۋە ئەركەك لىچىنىكا قاتارلىق جەريانلارنى بېسىپ ئۆتۈپ، ئاخىردا قۇيرۇقلۇق لىچىنىكىغا ئايلىنىدۇ. تۈكلۈك لىچىنىكىنىڭ بىرىدىن 180 دانە قۇيرۇقلۇق لىچىنىكا

يېتىلىپ چىقىدۇ. تۈكلۈك لىچىنكا قۇيرۇقلۇق لىچىنكىغا ئايلانغىچە 50~60 كۈنچە ۋاقىت كېتىدۇ.

قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلار قۇلۇلە تېنىدىن ئاچراپ چىققاندىن كېيىن ئوت-چۆپ ۋە سۇ ئارقىلىق ھايۋانلارغا يۇقىدۇ ۋە ھايۋانلارنىڭ ئون ئىككى بارماق ئۈچىسى بىلەن ئاچ ئۈچىيىنىڭ تېمىغا ئۆتۈپ، ئۇنىڭدىن 4-قېرىنغا، ئاخىردا چوڭ قېرىنغا ئۆتۈپ پارازىتلايدۇ. ئۇ ھايۋانغا يۇقۇپ رەسمىي يېتىلگىچە 90~120 كۈن ۋاقىت كېتىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] چوڭ كالىلاردا كۆرۈنەرلىك



15-رەسىم قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇتنىڭ يېتىلىش تارىخى

ئالامەتلەر بولمايدۇ، ياش كالىلاردا بولۇپمۇ بىر نەچچە ئايلىق موزايلاردا كېسەللىك ئالامەتلىرى روشەن كۆرۈلىدۇ. مۇئەددەتتە، ئۆتكۈر تىپ ۋە سوزۇلما تىپ دەپ ئىككى تىپقا ئايرىلىدۇ.

ئۆتكۈر تىپى: بۇ، لىچىنىكلارنىڭ ئۈچەي تىپىدا پارازىت-لىشىدىن پەيدا بولىدۇ، ئۈچەي تىپلىق قوش شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىكى دەپمۇ ئاتىلىدۇ، تولاراق موزايلاردا كۆرۈلىدۇ. كېسەل موزايلاردا تەن تېمپېراتۇرىسى 40.5°C ~ 40°C قا چىقىش، روھسىزلىنىش، ئىشتەي ناچارلاش، ئىچى سۈرۈش، چوڭ قېرىن كۆپۈش، بوشىش، بارا-بارا جۈدەش ۋە كەمقان بولۇش، ساڭگىلىما گۆش سۇلۇق ئىششىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئېغىر كېسەللەنگەنلىرىنىڭ توختىماي ئىچى سۈرىدۇ، تىزىكى قان ئارىلاش كېلىدۇ، بۇنداقلىرى ياكى 5~7 كۈندە ئۆلىدۇ، ياكى كېسەللىك 30 نەچچە كۈنگە سوزۇلۇپ سوزۇلما تىپقا ئايلىنىدۇ.

سوزۇلما تىپى: بۇ، يېتىلگەن قۇرۇتلارنىڭ چوڭ قېرىندا پارازىتلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ، كۆپىنچىسىدە كېسەللىك ئالامەتلىرى روشەن بولمايدۇ، تەن تېمپېراتۇرىسى نورمال بولىدۇ، پەقەت ئىشتەي ناچارلاش، ئۇزاققىچە ئورۇق تۇرۇش، دائىم دېگۈدەك ئالدىنقى قېرىن بوشاش، ئىچ سۈرۈش، كەمقانلىق، كۆكرەك ۋە ئىكەك ئاستى سۇلۇق ئىششىش ئالامەتلىرىلا كۆرۈلىدۇ.

[دئاگنوز قويۇش] ئېپىدېمىيلىك، كىلىنىكىلىق تەكشۈرۈش، قۇرۇت تۇخۇمىنى تەكشۈرۈش ۋە ئۆلۈكنى يېرىپ تەكشۈرۈشكە ئاساسەن دئاگنوز قويۇلىدۇ. قۇرۇت تۇخۇمىنى تەكشۈرۈشتە سۇ بىلەن يۇيۇپ چۆكمە قىلىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ، بۇنىڭدا جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت تۇخۇمىدىن يەرقلەندۈرۈشكە دىققەت قىلىش كېرەك. يېرىپ تەكشۈرگەندە مۇنداق ئالامەتلەر بارلىقى بايقىلىدۇ: ئۆتكۈر تىپىدا قوساق بوشلۇغىغا سۇيۇقلۇق يىغىلىپ قالغان بولىدۇ، سۇيۇقلۇقنىڭ رەڭگى قىزغۇچ بولىدۇ، ئىچىدە ئۇششاق قوش شورىغۇچ قۇرۇتلار بولىدۇ، 4-قېرىن ئېغىزىنىڭ شىللىق پەردىسى سۇلۇق ئىششىغان بولىدۇ، ئۇنىڭدا قان چۈشكەن نۇقتىلار بولىدۇ ۋە لىچىنكىلار توپلىشىپ قالغان بولىدۇ؛ ئون ئىككى بارماق ئۈچەي سۇلۇق ئىششىغان، قانغان، شىللىق پەردە ئاستى ۋە ئۈچەي شىلمىش سۇيۇقلۇقى غدا ئۇششاق لىچىنكىلار بولغان بولىدۇ. سوزۇلما تىپىدا پەۋقۇلئاددە كېسەللىك ئۆزگىرىشى بولمىغان بولىدۇ، چوڭ قېرىن تىرىپلىرى ئاستىدا نۇرغۇن قۇرۇتلار بولغان بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) قۇرۇت چۈشۈرۈش: ھەر يىلى ئەتىياز ۋە كۈزدە ئىككى قېتىم قۇرۇت چۈشۈرۈلىدۇ. قۇرۇت چۈشۈرۈشكە بىتسۇنول ئىشلىتىلىدۇ، ھەر ك گ تەن ئېغىزلىغىغا 0.05~0.08 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ، ياكى ئۇنىڭدىن يالانما، چوڭ كۈمۈلچ ياساپ يىگۈزۈلىدۇ. بۇ دورا سوزۇلما ۋە

ئۆتكۈر تېپىشكى قوش شورىغۇچلۇق قۇرۇت كېسەللىگىنى داۋالاشتا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ھېكساخلور ئېتانى ھەرىكەت تەن ئېغىرلىغىغا 0.3 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ بىر يوللا ياكى ئىككىگە بۆلۈپ (ئارىدىن 20~30 سائەت ئۆتكۈزۈپ) ئىچكۈرۈپ سىمۇ بولىدۇ.

(2) قۇلۇلە يوقىتىش (جىگەر شورىغۇچ قۇرۇت كېسەللىكىگە ئوخشاش).


(3) يۇقۇملانغان ئالدىنى ئېلىش: بېقىش - باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، سۇ تازىلىغىنى ياخشىلاش، ئېغىل - قوتاننى پاكىز تۇتۇش كېرەك. قىغ - تىزەك ۋە تۆشەك چۆپلەرنى ۋاقتى - ۋاقتىدا چىقىرىپ دۆۋىلەپ، ئۇنى ئېچىتىش ئارقىلىق قۇرۇت تۇخۇملىرىنى يوقىتىپ تۇرۇش لازىم. چوڭ - كىچىك كالىلارنى ئايرىم - ئايرىم بېقىش، موزايىلارنى ئىگىز ۋە قۇرغاق ئوتلاقلاردا بېقىش، ئويما ئوتلاقلاردا باقماسلىق كېرەك. بۇلغانغان ئوت - چۆپ ۋە پاخاللارنى يەم - خەشەك قىلىشقا بولمايدۇ.

ئاشقازان ئاستى بېزى كەڭ تەخسىلىك شورىغۇچ قۇرۇتى كېسەللىگى

بۇ كېسەللىكنى ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ يولىرىدا پارازىت - لايىدىغان كەڭ تەخسىلىك شورىغۇچ قۇرۇتلار پەيدا قىلىدۇ، بۇ كېسەللىك ئۆلكىمىزدە كەڭ تارقالغان بولۇپ، كالىلار -

دىمۇ، قويلاردىمۇ بولىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] كەڭ تەخسىلىك شورىغۇچ قۇرۇت-
نىڭ رەڭگى سۆسۈن، شەكلى يوپۇرماقسىمان بولىدۇ، تېنى
يۇمۇلاقراق، قېلىنراق بولىدۇ، ئۇزۇنلۇقى 8~16 م م، كەڭلىكى
5~9 م م كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئالدى تەرىپىدە ئالدى شورىغۇچىسى،
ئوتتۇرا قىسمىدا قوساق شورىغۇچىسى بولىدۇ، ئالدى شورىغۇ-
چىسى قوساق شورىغۇچىسىدىن چوڭ بولىدۇ.



16-رەسىم كەڭ تەخسىلىك شورىغۇچ قۇرۇت ۋە ئۇنىڭ تۇخۇمى

1. قۇرۇت 2. قۇرۇت تۇخۇمى

قۇرۇت تۇخۇمىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 0.04~0.05 م م، كەڭلىكى
0.02~0.03 م م، شەكلى سوقىچاق، ئىككى يېقى ماس كەلىد-
گەن، رەڭگى قېنىق قوڭۇر رەڭ بولىدۇ، ئىككى قەۋەت قېلىن پەر-
دىسى بولىدۇ، پەردە ئىچىدە يېتىلگەن قۇيرۇقلۇق لىچىنكا بولىدۇ.
[يېتىلىش تارىخى] كەڭ تەخسىلىك شورىغۇچ قۇرۇت ئىككى
ئارىلىق خوجايىن ئارقىلىق يېتىلىدۇ. بىرىنچى خوجايىن پارقە-
راق قۇرۇقلۇق قۇلۇلىسى بولۇپ، ئۇ نەمرەك ئوتلاقلىرىدا

ياشايدۇ؛ ئىككىنچى خوجاينى قىزىل ئۇمۇرتقىلىق چېكەتكە دەپ ئاتىلىدىغان ھاشارە تۇر.

كەڭ تەخسىلىك شورىغۇچ قۇرۇت كالا ۋە قويلارنىڭ ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ يوللىرىدا پارازىتلانغان ۋە تۇخۇملايدۇ. ئۇنىڭ تۇخۇمى ئاشقازان ئاستى بېزى سۇيۇقلۇغىغا قوشۇلۇپ ھەزىم قىلىش يولىغا ئۆتىدۇ ۋە تىزەك بىلەن بىللە سىرتقا چىقىرىلىدۇ. ئۇ پارىقراق قۇلۇلەرگە يەم بولغاندىن كېيىن، قۇلۇلە تېنىدە تۈكلۈك لىچىنكىغا ئايلىنىدۇ. تۈكلۈك لىچىنكىلار ئانا ھۈجەيرىلىك لىچىنكا، ئەركەك ھۈجەيرىلىك لىچىنكا قاتارلىق مۇرەككەپ كۆپىيىش جەريانلىرىنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ، 150~180 كۈن ئۆپچۆرىسىدە كالتا قۇيرۇقلۇق نۇرغۇنلىغان لىچىنكىلارغا ئايلىنىدۇ. قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلار ئەركەك ھۈجەيرىلىك لىچىنكىلارنىڭ تېنىدە تۇرىدۇ. ئەركەك ھۈجەيرىلىك لىچىنكىلار بولسا قۇلۇلەنىڭ نەپەس تۈشۈگى ئارقىلىق ئۆزلۈلگىدىن سىرتقا چىقىدۇ.

ئەركەك ھۈجەيرىلىك لىچىنكىلار قىزىل ئۇمۇرتقىلىق چېكەتكە يەم بولغاندىن كېيىن، 7~30 كۈندە قاپلىق لىچىنكىغا ئايلىنىدۇ. كالا مۇشۇنداق چېكەتكە يەم بولغان بىلەن بىللە يۇتقاندىن كېيىن، چېكەتكە كالىنىڭ ھەزىم قىلىش يولىدا ھەزىم بولۇپ كېتىدۇ، قاپلىق لىچىنكىلار بولسا ئاجراپ چىقىدۇ ۋە ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ رولى ئارقىسىدا قېپىدىن چىقىپ، بەزى يولى بىلەن ئاشقازانغا ئۆتىدۇ. دە، 90 كۈندە رەسمىي

قۇرۇتقا ئايلىنىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كالا يۇقۇملانغاندىن كېيىن، ئاساسەن، ئىشتەي ناچارلاش، روھسىزلىنىش، ھەزىم قىلىش ناچارلاش، دائىم ئىچى سۈرۈش، تىزىگى شىلىق ماددا ئارىلاش كېلىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن كالا تەدرىجى ئورۇقلايدۇ، كەمقان بولىدۇ، كاللىنىڭ كۆرۈنىدىغان شىللىق پەردىلىرى ئاقىرىدۇ، ئىشلەش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ، ئېغىر كېسەللەنگەن كاللىنىڭ ئىگەك ئاستى ۋە ساڭگىلىما گۆشىدە سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلىدۇ، كەينى گەۋدىسى جانسىز ھەركەت-لىنىدىغان بولۇپ قالىدۇ، ئاخىردا ئاجىزلىقتىن ئۆلىدۇ.

[دىئاگنوز قويۇش] ھەر تەرەپلىمە تەكشۈرۈش يولى بىلەن دىئاگنوز قويۇلىدۇ. تىزەكنى سۇ بىلەن يۇيۇپ چۆكمە قىلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئىنتايىن ئەستايىدىل، ئىنچىكىلىك بىلەن تەكشۈرگەندىلا، قۇرۇت تۇخۇمنى بايقىۋالغىلى بولىدۇ، قۇرۇت تۇخۇمى بەك ئۇششاق بولغاچقا، بىخەستەلىك قىلىنسا ئاسان-لىقچە تاپقىلى بولمايدۇ. ئۆلۈكنى يېرىپ تەكشۈرگەندە، ئاشقازان ئاستى بېزى يىگىلەپ قالغان، بەزى يولى سۆسۈن رەڭگە كىرىپ قالغان ۋە تومپىيىپ قالغان، بەزى يولى تېمى قېلىنلىشىپ قالغان، ئۇنىڭ ئەۋرىشمىلىگى ناچارلاشقان بولىدۇ، ئۇنى يېرىپ كۆرگەندە ئىچىدىن كەڭ تەخسىلىك شورىغۇچ قۇرۇتلار كۆپلەپ چىقىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

1. قۇرۇت چۈشۈرۈش: ئۈنۈملۈك بولغان قۇرۇت چۈشۈرۈش ۋە داۋالاش چارىسى ھازىرغىچە تېپىلمىدى. يېقىندا شىنجاڭ مال دوختۇرلۇق ئىلمىي تەتقىقات ئورنى مۇرەككەپ قۇرۇت چۈشۈرۈش دورىسىنى قويلارغا ئىشلىتىپ ئوبدان نەتىجىگە ئېرىشتى، بۇ دورىنى كالىلارغىمۇ مىقدارنى ئاشۇرۇپ ئىشلىتىپ كۆرسە بولىدۇ.

رېتسېپ:

دېتېرىكس 10 گ، تېترازول 1 گ، خەيتولىن 4 گ،
بىتىئونول 12 گ، ئادەتتىكى سۇ 200 م ل
بۇلار ئارىلاشتۇرۇلۇپ بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

تېترازول 1 گ، نىتروخلور فېنول 1 گ، بىتىئونول 12~15
گ، ئادەتتىكى سۇ 200 م ل
بۇلار ئارىلاشتۇرۇلۇپ بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ.
2. قۇلۇلە يوقىتىش:

(1) توخۇ، ئۆردەك بېقىلىپ، قۇلۇللەر يوقىتىلىدۇ.

(2) ناتىرىي پېنتاخلور فېنول ئېرىتمىسى ھەر كۇۋادىرات
مېتىر ئوتلاققا 5~10 گ چېچىلىدۇ.

(3) شۇفاڭ — 67 ئېرىتمىسى (تەركىبىدە نىكلوسامىد بولغان)
ھەر كۇۋادىرات مېتىر ئوتلاققا 2 گ چېچىلىدۇ.

(4) 0.1% لىك تىرىفىن مورفى سۈيى ھەر مو يەرگە 186
م ل دىن (ئەسلى سۇيۇقلۇغى ھېساۋىدا) چېچىلىدۇ.

3. يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش: بېقىش - باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، قىغ - تىزەكلەرنى پات - پات چىقىرىپ ئېچىتىش، ئويماق ئوتلاقلىرىدا مال باقماسلىق لازىم.

ئۈچەي لېنتىسىمان قۇرۇت كېسەللىگى

بۇ كېسەللىك ئىنچىكە ئۈچەيدە پارازىتلايدىغان مۈنەزى لېنتىسىمان قۇرۇتى، تۇخۇم سېرىقى بېزى يوق لېنتىسىمان قۇرۇت ۋە ئەگرى بالياتقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇتتىن پەيدا بولىدۇ. بۇ كېسەللىك ئۆلكىمىزدە كەڭرەك تارقالغان بولۇپ، كالا، قويلارغا ئېغىرراق زىيان يەتكۈزىدۇ، موزاي ۋە قوزىلاردا ئېغىر كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] مۈنەزى لېنتىسىمان قۇرۇتى، تۇخۇم سېرىقى بېزى يوق لېنتىسىمان قۇرۇت ۋە ئەگرى بالياتقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇت ئاق رەڭلىك، تاسمىسىمان بولىدۇ، ئۇلارنىڭ ئۇزۇنلۇقى 1~5 م كېلىدۇ، بىرنەچچە يۈزدىن بىرنەچچە مىڭغىچە بوغۇملىرى بولىدۇ. ئالدى ئۈچىدا شەكلى يۇمۇلاق، دىئامېتىرى 0.7~1.0 م كېلىدىغان باش بوغۇمى، 4 دانە شورغۇچىسى (شوراش تەخسىسى) بولىدۇ. باش بوغۇمىدىن كېيىن ئىنچىكە، ئۇزۇن بويۇن بوغۇمى بولىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىنكىلىرى بەدەن بوغۇملىرى ھىساپلىنىدۇ.

بۇ 3 خىل لېنتىسىمان قۇرۇتلارنىڭ پەرقى ئاساسەن بەدەن


بوغۇملىرىدا كۆرۈلىدۇ. مونىزى لېنتىسىمان قۇرۇتۇشنىڭ بىدەن
 بوغۇملىرى كەڭ بولىدۇ، ئەڭ كەڭلىرىنىڭ 16 م م كېلىدۇ ۋە
 ھەر بىر بوغۇمدا ئىككى جۈپتىن كۆپىيىش ئەزاسى بولىدۇ
 تۇخۇم سېرىغى بېزى يوق لېنتىسىمان قۇرۇتۇشنىڭ بىدەن
 بوغۇملىرى تار (كەڭلىكى ئاران 3 م م كېلىدۇ) ۋە ناھايىتى
 قىسقا بولغاچقا، بوغۇمنىڭ تۇتاشقان يېرىنى پەرق ئەتكىلى
 بولمايدۇ، ھەر بىر بوغۇمدا بىر جۈپتىن كۆپىيىش ئەزاسى
 بولىدۇ ۋە ئۇلار قۇرۇتۇشنىڭ ئىككى يېقىدا تەرتىپسىز ھالدا
 تىزىلىپ تۇرىدۇ. ئەگرى بالىياتقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇتۇشنىڭ
 بىدەن بوغۇملىرىنىڭ كەڭلىكى 12 م م كېلىدۇ، بوغۇملار
 قىسقا بولىدۇ، ھەر بىر بوغۇمدا بىر جۈپتىن كۆپىيىش ئەزاسى
 بولىدۇ ۋە ئۇلار قۇرۇتۇشنىڭ ئىككى يېقىدا تەرتىپسىز ھالدا
 تىزىلىپ تۇرىدۇ.

مونىزى لېنتىسىمان قۇرۇتۇشنىڭ تۇخۇمى 4 قىرلىق، 3 قىرلىق
 ياكى سەل يۇمۇلاق بولىدۇ، ئۇنىڭ دىئامېتىرى 0.05~0.08
 م م كېلىدۇ، رەڭگى سۇر ئاق بولىدۇ، ئىچىدە ئالاھىدە تۈزۈل-
 گەن ئامۇتسىمان ئەزاسى ۋە 6 ئىلمەكلىك لىچىنكىلىرى بولىدۇ.
 تۇخۇم سېرىغى بېزى يوق لېنتىسىمان قۇرۇتۇشنىڭ تۇخۇملىرى
 چېچىلىپ كەتمەيدۇ، كۆپ ساندىكىلىرى تۇخۇملۇق بوغۇمنىڭ
 بالىياتقۇ ئايلاشمىسىنى چۆرىدەپ تۇرىدۇ، ھەر بىر بوغۇمدا
 بىردىن بالىياتقۇ ئايلاشمىسى بولىدۇ، تۇخۇمنىڭ ئامۇتسىمان
 ئەزاسى بولمايدۇ. ئەگرى بالىياتقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇت



17-رەسىم لېنتىسىمان قۇرۇت ۋە ئۇنىڭ تۇخۇمى

1. لېنتىسىمان قۇرۇتنىڭ باش بوغۇمى 2، 3. مونىزى لېنتىسىمان قۇرۇت-
نىڭ بەدەن بوغۇمى 4. مونىزى لېنتىسىمان قۇرۇتنىڭ تۇخۇمى 5.
ئەگرى يالپاققۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇتنىڭ بەدەن بوغۇمى 6. ئەگرى
بالىياتقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇتنىڭ بالىياتقۇ ئايلىنىمى 7. تۇخۇم
سېرىغى بېزى يوق لېنتىسىمان قۇرۇتنىڭ بەدەن بوغۇمى



18-رەسىم لېنتىسىمان قۇرۇتنىڭ ئارلىق خوجاينى — تۇپراق كانىسى

تۇخۇملىرى يۇمۇلاقراق بولىدۇ، ئۇنىڭ ئامۇتسىمان ئەزاسى بولمايدۇ، ھەر 3~8 قۇرۇت تۇخۇمى بىر باليانتقۇ ئايلاڭمىسىنى چۆرىدەپ تۇرىدۇ، ھەر بىر بوغۇمدا نەچچە يۈز باليانتقۇ ئايلاڭمىسى بولىدۇ.

[يېتىلىش تارىخى] مونىزى لېنتىسىمان قۇرۇتى، تۇخۇم سېرىقى بېزى يوق لېنتىسىمان قۇرۇت ۋە ئەگرى باليانتقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇتلار ئارىلىق خوجايىنلار ئارقىلىق يېتىلىدۇ. بۇلارنىڭ ئارىلىق خوجايىنى تۇپراق كانىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى 1.2 م م كېلىدۇ، تۈرى بىردەك بولمىغاچقا، رەڭگى قېنىق قىزىل، قوڭۇر، قارامتۇل ۋە باشقا رەڭدە بولىدۇ. تۇپراق كانىلىرى ئاستا يۈرىدۇ، كۈن نۇرىدىن قاچىدۇ، ئۆسۈم-لۈكلەرنىڭ چىرىگەن شاخ-يوپۇرماقلىرىنى ئوزۇق قىلىدۇ، تولاراق چاتقاللىق ۋە تەبىئى ئوتلاقلىرىدا ياشايدۇ.

مونىزى لېنتىسىمان قۇرۇتى قاتارلىق لېنتىسىمان قۇرۇتلار كالىنىڭ ئىنچىكە ئۆچمىدە پارازىتلايدۇ، قوي ۋە باشقا كۆشگۈچى ھايۋانلارنىڭ تېنىدىمۇ پارازىتلايدۇ. پارازىتلاش جەريانىدا تۇخۇملۇق بوغۇملار ئۈزلۈكسىز ئاجرىلىپ چىقىپ، تىزەك بىلەن بىللە سىرتقا چىقىرىلىدۇ. بۇ بوغۇملار ۋە تۇخۇم-لار تۇپراق كانىلىرىغا يەم بولغاندىن كېيىن، 100~120 كۈندە يېتىلىپ قاپلىق-قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلارغا ئايلىنىدۇ. كالا تۇپراق كانىسىنى ئوت-چۆپ بىلەن بىللە يىگەنلىكتىن يۇقۇملىنىدۇ. تۇپراق كانىلىرى ھايۋان تېنىدە ھەزىم بولۇپ كېتىدۇ،

قاپلىق - قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلار بولسا ئاجرىلىپ چىقىپ مالىنىڭ ئىنچىكە ئۈچىيىگە يېپىشىۋېلىپ، 40~50 كۈندە تولۇق يېتىلىدۇ. يېتىلگەن قۇرۇتلار مال تېنىدە 60~180 كۈن ياشايدۇ.

ئۆلكىمىزدە قاپلىق - قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلارنى توشۇغۇچى تۇپراق كانلىرى قىشتىن ساق ئۆتۈپ، ئىككىنچى يىلى 5 - ئايلاردا موزايلارغا يۇقىدۇ. بۇ 3 خىل لېنتىسىمان قۇرۇتلار ئىچىدە، مونسىزى لېنتىسىمان قۇرۇتى ئەڭ كەڭ تارقالغان بولۇپ، 2 ياشتىن تۆۋەن موزايلارغا ۋە قوزىلارغا يۇقۇش نىسبىتى ئەڭ يۇقۇرى بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەللىك ئالامىتى كالىنىڭ يېشى، ئورۇق - سېمىزلىقى ۋە لېنتىسىمان قۇرۇت بىلەن يۇقۇم - لىنىش دەرىجىسىگە قاراپ تۈرلۈكچە بولىدۇ. چوڭ كالىلار ۋە يېنىك يۇقۇملانغان موزايلاردا ئېنىق كىلىنكىلىق ئالامەتلىر كۆرۈلمەيدۇ. ئېغىر يۇقۇملانغان موزايلاردا ئىشتەي تۇتۇلۇش، روھسىزلىنىش، بارغانچە جۈدەش، تۈكلىرى يىرىك ۋە پارقە - راقسىز بولۇپ قېلىش، كەمقان بولۇش، كۆرۈنىدىغان شىلىق پەردىلىرى ئاقىرىپ قېلىش، دائىم ئىچى سۈرۈش، بەزىدە ئىچى سۈرۈش بىلەن قەۋزىيەت ئالمىشىپ كۆرۈلۈش، تىزىگىدە كۆپىنچە قۇرۇت بوغۇملىرى ئارىلاش بولۇش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. موزاينىڭ يېتىلىشى ۋە ئەت ئېلىشى ئاستا بولىدۇ. بەزىدە لىرىدە نېرۋىلىق ئالامەتلىر كۆرۈلۈپ، مۇسكۇل تارتىشىش ۋە قوتان چۆگىمەش، گەجگىسى تارتىشىش، ئىنكاس قايتۇرۇش

ئاستا بولۇش، يېتىش تۇرقى غەيرى نورمال بولۇش، قۇرۇق چايناش، جاۋغىمىدىن كۆپۈك قايناش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئۈچەيدىكى لېنتىسىمان قۇرۇتلار كۆپىيىپ كەتكەندە، ئۈچەي توسىلىش، ئۈچەي كىرىش يۈز بېرىپ، قوساق ئاغرىش ۋە كۆپۈش ھەمدە دۈمچىيىش، بېلىنى سوزۇپ تۇرۇش، كۆپ يېتىۋېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. ئېغىر كېسەللەنگەنلىرى ئۆلىدۇ. [دېئاگنوز قويۇش] كېسەل مال ئۆلمەستىن ئىلگىرى تىزەك-تىكى قۇرۇت بوغۇملىرىنى ۋە تۇخۇملىرىنى تەكشۈرۈش ھەمدە قۇرۇت چۈشۈرۈش ئۇسۇللىرى بىلەن دېئاگنوز قويۇلىدۇ.

1. قۇرۇت بوغۇملىرىنى تەكشۈرۈش: كېسەل مالنىڭ تىزەك-تىكىنى پار-پۇر تەخسىگە قويۇپ، سۇ قوشۇپ ئەزگەندىن كېيىن قايتا-قايتا چايقاش، ئاندىن قالدۇغىنى قارا تەخسىگە سېلىپ تەكشۈرۈش لازىم. مونىزى لېنتىسىمان قۇرۇتسىنىڭ بوغۇملىرى ساغۇچ بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10~12 م م، قېلىنلىقى 2~3 م م كېلىدۇ؛ ئەگرى بالياتقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇت بوغۇملىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 5~7 م م، قېلىنلىقى 2 م م ئەتراپىدا كېلىدۇ؛ تۇخۇم سېرىغى بېزى يوق لېنتىسىمان قۇرۇت بوغۇملىرى 1~2 م م لىق بوغۇمدەك كۆرۈنىدۇ. تەكشۈرۈپ تېپىلغان بوغۇملارنى ئىككى پارچە ئەينەك ئارىسىغا ئېلىپ ئېزىپ، مىكروسكوپتا تەكشۈرۈش ئارقىلىق، يۇقۇرىدا دىيىلگەن 3 خىل قۇرۇتنى پەرقلەندۈرگىلى بولىدۇ.

2. قۇرۇت تۇخۇملىرىنى تەكشۈرۈش: بۇنىڭدا تۈز ئېرىتمە-

سىدە لەيلىتىپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. كۆپىنچە،
تويۇنغان تۇز ئېرىتمىسى (380 گ تۇز 1000 م ل ئىسسىق
سۇدا ئېرىتىلىدۇ)، ناترىي بىسۇلفىتنىڭ تويۇنغان ئېرىتمىسى
(1750 گ ناترىي بىسۇلفىت 1000 م ل سۇدا ئېرىتىلىدۇ)،
ماگنىي سۇلفاتنىڭ تويۇنغان ئېرىتمىسى (920 گ ماگنىي سۇلفات
1000 م ل سۇدا ئېرىتىلىدۇ) ۋە ناترىي نىتراتنىڭ تويۇنغان
ئېرىتمىسى (1000 گ ناترىي نىترات 1000 م ل سۇدا ئېرىتىل-
لىدۇ) ئىشلىتىلىدۇ. يېقىندا چەتئەللەردە ئاممونىي نىترات ۋە
قوغۇشۇن نىترات ئېرىتمىلىرى (600~650 گىرامى 1000 م ل
سۇدا ئېرىتىلىدۇ) دىن پايدىلىنىپ لەيلىتىپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى
قوللىنىلىۋاتىدۇ، بۇنىڭ ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدىكەن.
مەشغۇلات ئۇسۇلى: 3~5 گ تىزەك كولبا ياكى ئىستاكىغا
سېلىنىپ، ئۈستىگە ئازراق تۇز سۈيى قويۇلۇپ تەكشى ئارىلاش-
تۇرۇلىدۇ، ئاندىن 20 ھەسسە تۇز سۈيى قويۇپ سۇيۇلدۇرۇلغان-
دىن كېيىن مېتال ئەگلەك ياكى 3~4 قات داكىدىن ئۆتكۈزۈلۈپ
باشقا ئىستاكىغا سۇزۇلدۇرۇلىدۇ. تىزەكنىڭ سۇزۇلدۇرۇلگەن سۈيى
تەجرىبە نەيچىسىگە توشاي دىگىچە قويۇلىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا
يەنە تىزەك سۈيىدىن نەيچىنىڭ ئاغزى بېلىق كۆزى بولغىچە
تامغۇزۇلىدۇ. نەيچە 20~30 مىنۇت تىك ھالدا جىم تۇرغۇزۇل-
غاندىن كېيىن، پاكىز ياپقۇچ ئەينەك سۇيۇقلۇققا تەككۈزۈپ
ئېلىنىپ، سۈرتىمە ئەينەك ئۈستىگە قويۇلىدۇ ۋە مىكروسكوپتا
تەكشۈرۈلىدۇ. تەكشۈرۈشتە مۇنەزىر لېنتىسىمان قۇرۇتتى، ئەگرى

باليانتقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇت ۋە تۇخۇم سېلىرىغى بېزى يوق
لېنتىسىمان قۇرۇتنىڭ كۆرۈنۈشىگە قاراپ دىئاگنوز قويۇلىدۇ.
3. قۇرۇت چۈشۈرۈپ دىئاگنوز قويۇش: گۇمانلىق كېسەل
كالغا قۇرۇت چۈشۈرۈش دورىسى ئىچكىزۈلىدۇ، 7~10 سائەت
كېچە قۇرۇت چۈشۈشلا دىئاگنوز قويۇش مۇمكىن.
(ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش)

1. قۇرۇت چۈشۈرۈش: ھەر يىلى ئەتىياز ۋە كۈزدە قۇرۇت
چۈشۈرۈلىدۇ. ئەتىيازدا كالىلارنى ئوتلاققا ئېچىقلىتىش ئىلگىرى،
كۈزدە كالىلارنى ئوتلاقتىن قايتۇرۇپ كەلگەندىن كېيىن دورا
بېرىلىدۇ. كېسەللەنگەن كالىلارغا قارىتا تېز تۇتۇش قىلىپ
داۋالاش خاراكتېرلىق قۇرۇت چۈشۈرۈش ئىشى ئىشلىنىدۇ.
كېسەللىك ئېغىر كۆرۈلگەن ئورۇنلاردا قۇرۇتنىڭ يېتىلىش
مەزگىلىدىن بۇرۇنلا قۇرۇت چۈشۈرۈلىدۇ، كالىلارنى ئوتلاققا
ئېچىقىش ئالدىدا قۇرۇت چۈشۈرگەندىن تاشقىرى، ئوتلاقتىن
قايتۇرۇپ كەلگەندىن كېيىن ھەر 30~40 كۈندە بىر قېتىم
قۇرۇت چۈشۈرۈلىدۇ. قۇرۇتنىڭ يېتىلىش مەزگىلىدىن ئىلگىرىكى
قۇرۇت چۈشۈرۈش قېتىم سانى موزايلارنىڭ يۇقۇملىنىش
دەرىجىسىگە قاراپ بەلگىلىنىدۇ، ئومۇمەن، 1~2 قېتىم ياكى
3~4 قېتىم بولسا بولىدۇ.

(1) نىكلوسامىد: كالىنىڭ ھەرك گ تەن ئېغىرلىغىغا
60~65 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ، كىمراخماللىق بوتقىغا
قوشۇپ ئىچكىزۈلىدۇ، ياكى يالانما، كۇمۇلاچ ياساپ يىمگۈزۈ-

لىدۇ، ياكى يەم - خەشەككە ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ.

(2) بىتىئونول: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىغىغا 50~70 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن بېرىلىدۇ.

(3) كۆكتاش: مونىزى لېنتىسىمان قۇرۇتلىرىنى چۈشۈرۈشتە 1% لىك ئېرىتمە، ئەگرى بالىياتىقۇلۇق لېنتىسىمان قۇرۇت ۋە تۇخۇم سېرىغى بېزى يوق لېنتىسىمان قۇرۇتلىرىنى چۈشۈرۈشتە 2% لىك ئېرىتمە تەييارلىنىپ، كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىغىغا 2~3 م ل دىن ھىساپلاپ بېرىلىدۇ. كۆكتاش ئېرىتمىسى ئۇدۇللۇق تەييارلىنىدۇ، پار سۈيى، يامغۇر سۈيى، قار سۈيى ياكى تىندۇرۇلغان قايناق سۇ بىلەن سۇيۇلدۇرۇلىدۇ، مېتال سايمانلارغا تەككۈزۈلمەيدۇ. دورا سۇيۇقلۇغى تەييارلانغاندىن كېيىن تىندۇرۇپ سۈزۈلدۈرۈلىدۇ، دۇغلىشىپ قالسا سۇيۇق تۈز كىسلاتاسى تامغۇزۇپ سۈزۈلدۈرۈلىدۇ. دورا بېرىشتىن ئىلگىرى كالىغا ئوزۇق بېرىلمەيدۇ، چالا - بۇلا سۇغىرىلىدۇ. ئايرىم موزاي - لاردا دورا بېرىلگەندىن كېيىن ئاغزىدىن كۆپۈك چىقىش، ھىچنەمە يىمەسلىك، چوڭ قېرىنى كۆپۈش قاتارلىق رېئاكسىيەلەر كۆرۈلىدۇ، بۇنداقتا سۈزۈك سۇدا كۆپرەك سۇغىرىش، ماگنېسى ئوكسىدى (15~25 گ)، كالا سۈتى (250~500 م ل)، تۇخۇم ئېقى (3~5 دانە) قاتارلىقلارنى بېرىش بىلەن قۇتقۇزۇلىدۇ.

نېكروسامىد ۋە بىتىئونول بىلەن قۇرۇت چۈشۈرۈلسە، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ، بىخەتەر بولىدۇ، زەھەرلىنىش ئەھۋاللىرى ئاز كۆرۈلىدۇ.

2. چوڭ كالىلار بىلەن موزايىلارنى بالدۇرراق ئايرىپ بېقىش لازىم. موزايىلارنى پاكىز ئوتلاقلاردا، مەسىلەن، مەنئى ئوتلاق، ئاقىيەر، ئېگىزلىق، ياكى ئىككى يىلغىچە كالا، قويلارنىڭ ئايىمى تەگمەگەن ئوتلاقلاردا بېقىش، زەي ئوتلاقلاردا باقماسلىق شەبىنەم ۋاقتىدا ئوتلاتماسلىق لازىم، چۈنكى تۇپراق كانلىرى شەبىنەم ۋاقتىدا تازا ئەۋج ئېلىپ، ئوت-چۆپكە ئاسانلا يېپىشە-ۋالىدۇ، كالا، قويلار بۇنداق ئوتلارنى يىسە يۇقۇملىنىدۇ.

3. قىغ ۋە تۆشەك چۆپلەرنى ۋاقتى-ۋاقتىدا چىقىرىپ ۋە دۆۋىلەپ ئېچىتىپ، ئۇنىڭدىكى قۇرۇت تۇخۇملىرىنى يوقىتىش كېرەك. يەم-خەشەك، سۇ ۋە قوتان تازىلىغىنى ئوبدان ئىشلەپ، ئۇلارنىڭ بۇلغىنىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

4. كالىنىڭ لېنتىسىمان قۇرۇت كېسەللىگىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا، قوي ۋە باشقا كۆشىگۈچى ماللار جەھەتتىمۇ مۇناسىپ تەدبىر كۆرۈپ، كېسەللىكنىڭ ئۇلارنىڭ ۋاستىسى بىلەن تارقىلىپ، قايتا يۇقىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

قاچىلىق قۇرۇت كېسەللىگى

بۇ كېسەللىك ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇت لېچىنكىلىرى (قاچىلىق-قۇيرۇقلۇق لېچىنكىلار) نىڭ كالىنىڭ مۇسكۇل توقۇلمىسىدا پارازىتلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇتلار ئادەمنىڭ ئىنچىكە ئۈچىمىدە پارازىتلىسا، ئادەمدىمۇ


لېنتىسىمان قۇرۇت كېسەللىگىنى پەيدا قىلىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇتلىقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 3~10 م كېلىدۇ، ئۇ مىڭدىن ئارتۇق بوغۇمدىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. بوغۇم بېشى چاسا بولىدۇ، ئۇنىڭ دىئامېتىرى 1.5~2 م م كېلىدۇ، 4 دانە شورىغۇچىسى بولىدۇ، تومپىغى ۋە ئىلمىگى بولمايدۇ. بويۇن بوغۇمى ئۇزۇن ۋە ئىنچىكە بولىدۇ. يېتىلگەن قۇرۇت بوغۇمىدا بىر جۈپتىن ئەركەك-چىشى كۆپىيىش ئەزاسى بولىدۇ، تۇخۇملۇق بوغۇملار بالىياتقۇغا تولۇپ تۇرىدۇ، بالىياتقۇ 15~35 كىچە شاخلاىغان بولىدۇ.

كالىدىكى قاپلىق-قۇيرۇقلۇق لىچىنىكلار سۈزۈك سۇيۇقلۇق بىلەن تولغان قاپچۇقلاردىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى 5~9 م م، كەڭلىكى 3~6 م م كېلىدۇ، قاپچۇقنىڭ ئىچكى پەردىسىدە بىر دانە ئاق قوناقچىلىك ئاپپاق باش بوغۇمى بولۇپ، ئۇنىڭ تۈزۈلۈشى يېتىلگەن قۇرۇتلىقنىڭ باش بوغۇمىغا ئوخشايدۇ.

[يېتىلىش تارىخى] ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇتلىقنىڭ ئاخىرقى خوجايىنى — ئادەم، ئارىلىق خوجايىنى — كالا.

ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇتلار ئادەمنىڭ ئىنچىكە ئۈچمىدە 15 يىلدىن ئارتۇق ياشايدۇ. پارازىتلاش جەريانىدا تۇخۇملۇق بوغۇملار تىنماي ئاجرىلىپ چىقىپ، بەدەن سىرتىغا چىقىرىلىدۇ. ھەر بىر بوغۇمىدا 10~12 تۈمەن تۇخۇم بولىدۇ، ھەر كۈنى بەدەن سىرتىغا 10 چە بوغۇم چىقىرىلىدۇ، ئەينى ۋاقىتتا جەمئى



19-رەسىم ئىلمەكسىز

لېنتىسمان قۇرۇت

1. باش بوغۇمى

2. يېتىلگەن بوغۇمى

3. تۇخۇمى

4. قاپلىق - قۇيرۇقلۇق لېچىنكا

20-رەسىم قاپلىق قۇرۇتىنىڭ

يېتىلىش تارىخى

1 مىليوندىن ئوشۇق تۇخۇم چىقىرىلىدۇ، بوغۇملار سىرتقى مۇھىتقا چۈشكەندىن كېيىن چېچىلغان تۇخۇملار ئوتلاق، يەم-خەشەك ۋە سۇنى بۇلغايدۇ. دە، شۇنىڭ بىلەن كالا يۇقۇملىنىدۇ. كالىغا يۇققان تۇخۇملار ھەزم قىلىش سۇيۇقلۇغىنىڭ ئېرىتىشى ئارقىسىدا قېپىدىن ئاجراپ 6 ئىلمەكلىك لېچىنكىلارغا ئايلىنىدۇ. دە، ئۈچەي شىللىق پەردىسى ئارقىلىق قانغا ئۆتىدۇ ۋە قان ئارقىلىق بەدەننىڭ ھەممە يېرىدىكى مۇسكۇللارغا تارقىلىپ،

90~180 كۈندە قاپلىق-قۇيرۇقلۇق لىچىنكا بولۇپ يېتىلىدۇ. ئايرىم موزايىلار ھەتتا ئانىسىنىڭ قوسىغىدا تۇرغان ۋاقتىدىلا ئانىسىنىڭ قېنى ئارقىلىق يۇقۇملىنىدۇ.

ئادەم مانا شۇنداق لىچىنكىلار بولغان كالا گۆشىنى ئوبدان پىشۇرماي يىگەنلىكتىن يۇقۇملىنىدۇ. ئادەم يۇقۇملانغاندىن كېيىن، لىچىنكىنىڭ باش بوغۇمى ئۆت سۇيۇقلۇغىنىڭ تەسىرىدە ئۆرۈلۈپ ئۈچەي تېمىغا ئورنىشىۋېلىپ، كۈنىگە 5~6 س م ئۆسىدۇ-دە، 75~90 كۈندە يېتىلگەن قۇرۇتقا ئايلىنىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كالا يۇقۇملانغاندىن كېيىن، ئادەتتە، كىلىنىكلىق ئالامەتلەر كۆرۈلمەيدۇ، ئاز ساندىكى ئېغىر يۇقۇملانغان كالىلارنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ $41^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، چوڭ قېرىننىڭ لۆمۈلدەش قېتىم سانى ئازىيىدۇ، قاتتىق ئىچى سۈرىدۇ، تېنى ئاجىزلايدۇ، شىللىق پەردىسى ئاقىرىدۇ، بۇرۇن ئەينىكى قۇرغاقلىشىدۇ، يېتىۋالدىغان بولۇپ قالىدۇ؛ مۇسكۇللىرىنى تۇتۇپ ياكى چېكىپ كۆرگەندە ئاغرىقىسىنىدۇ، يۈرىكىنىڭ سوقۇشى تېزلىشىدۇ، نەپەس ئېلىشى ئىتتىكلەيدۇ، 6~7 كۈندىن كېيىن بۇ ئالامەتلەر ئازىيىپ، 8~12 كۈندىن كېيىن تامامەن يوقىلىدۇ.

[دىئاگنوز قويۇش] كېسەل كالىغا تىرىك ۋاقتىدا دىئاگنوز قويۇش تەسرىك بولىدۇ. كالا ئۆلگەندىن كېيىن يېرىپ تەك-شۈرۈپ، مۇسكۇلدىن چىققان قاپلىق-قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلارغا قاراپ دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ. ھەرقايسى مۇسكۇللار ئىچىدە،

يانتاش مۇسكۇللىرىنىڭ زەخمىلىنىشى ئەڭ يۇقۇرى بولىدۇ، ئۇنىڭدىن قالسا بويۇن، يەلكە ۋە دۈمبە مۇسكۇللىرىنىڭ زەخمىلىنىشى يۇقۇرى بولىدۇ، باشقا مۇسكۇللارنىڭ زەخمىلىنىشى تۆۋەنرەك بولىدۇ.

(ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش) كالىلاردا بولىدىغان قاپلىق قۇرۇت كېسەللىگىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاشتا، يەرلىك پارتىكوملارنىڭ رەھبەرلىگىدە، ساقلىق ساقلاش — يۇقۇمدىن مۇداپىە كۆرۈش پونكىتلىرى ۋە يىمەكلىك تارماقلىرى بىلەن زىچ ماسلىشىپ، ئاممىۋى خاراكتىرلىق قۇرۇت چۈشۈرۈش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇش لازىم.

1. قۇرۇت چۈشۈرۈش:

(1) ئومۇمىي يۈزلۈك تەكشۈرۈش: كالىلاردا بولىدىغان قاپلىق قۇرۇت كېسەللىگى كۆرۈلگەن جاي ۋە ئورۇنلاردا ئۆيمۇ-ئۆي تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىپ، مۇشۇنداق كېسەل بار كالا گۆشىنى يەگەنلەر بار-يوقلۇغى، دائىم كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، باش قېيىش، جۈدەش، قوساق ئاغرىش ۋە ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش ئالامەتلىرى بار-يوقلۇغى، چوڭ تەرەت بىلەن بىللە قۇرۇت بوغۇملىرى چۈشكەن ئەھۋال بار-يوقلۇغى قاتارلىقلار ئىگەللىنىدۇ. بۇ ئالامەتلەردىن بىرى كۆرۈلگەن كىشىلەر گۇمانلىق بىمار دەپ قارىلىدۇ.

(2) دىئاگنوز قويۇش: گۇمانلىق بىمار نۇقتىلىق كۈزىتىلىپ، ئىككى ئاي ئىچىدە تەرىتىدىن ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇت


چۈشكەن كىشىلەر ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇت كېسەللىكى بولغانلار ھىساپلىنىدۇ. بۇنى ئىلمەكلىك لېنتىسىمان قۇرۇت كېسەللىكىدىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن، كېسەل كىشىنىڭ تەرىپىدىن چىققان قۇرۇت بوغۇملىرىنى ئەينەك ئۈستىگە ئېلىپ مىكروسكوپتا تەكشۈرۈپ، بوغۇملاردىكى بالياتقۇنىڭ شاخلىنىش ئەھۋالى كۈزىتىلىدۇ، 15~35 كىچىك شاخلانغانلىرى ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇت، 7~12 گىچىك شاخلانغانلىرى ئىلمەكلىك لېنتىسىمان قۇرۇت ھىساپلىنىدۇ.

(3) قۇرۇت چۈشۈرۈش: دوختۇرنىڭ يېتەكچىلىگىدە، بىتىئونول، نىكلوسامىد، لاگىياساۋ يىلتىزى پاراشوگى

قاتارلىقلار بىلەن قۇرۇت چۈشۈرۈلىدۇ.

2. ئومۇمى تازىلىق:

ئاممىۋى ھاجەتخانىلارنى قۇرۇپ، گەندىنى ئوبدان باشقۇرۇش، سۇ، ئوتلاق ۋە يەم-خەشەكلەرنىڭ بۇلغىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. گەندىنى يىغىپ ئېچىتقاندىن كېيىن ئوغۇت قىلىسا بولىدۇ.



21 - رەسىم ئىلمەكسىز ۋە

ئىلمەكلىك لېنتىسىمان

قۇرۇتلارنىڭ تۇخۇملۇق

بوغۇملىرىنىڭ پەرقى

1. ئىلمەكلىك لېنتىسىمان قۇرۇت

2. ئىلمەكسىز لېنتىسىمان قۇرۇت

3. يىمەكلىك گۆشىنى تەكشۈرۈش: كۆش كۆمىمىناتلىرى ۋە قۇشخانلاردا يىمەكلىك گۆشىنى تەكشۈرۈش تۈزۈملىرىنى ئورنىتىش ۋە كۈچەيتىش لازىم. تەكشۈرگەندە يانپاش بويۇن، يەلكە ۋە دۈمبە گۆشلىرىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش گۆشنىڭ ھەر 40 كۇۋادىرات س م كەسمە يۈزىدىكى قاپلىق-قۇيرۇقلۇق لىچىنكا سانى 4 تىن ئېشىپ كەتسە، بۇنداق گۆش كېرەكسىز قىلىنىپ، يۇقۇرى ھارارەتتە بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىن يەم-خەشەك قىلىنىدۇ؛ 3 كە يەتمىسە، دېزىنڧىكسىيە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىن ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ. (1) پىشۇرۇش: كېسەل كاللىنىڭ گۆشىنى قېلىنلىغىنى 8 س م دىن، ئېغىرلىغىنى 2 ك گ دىن قىلىپ توغراپ، 2 سائەت پىشۇرغاندىن كېيىن پايدىلانسا بولىدۇ.

(2) تۈزلەش: كېسەل كاللىنىڭ گۆشىنى 2.5 ك گ دىن قىلىپ توغراپ، قويۇق شاكاراپقا چىلاپ (تۈز گۆشنىڭ ئېغىرلىغىنىڭ 15 پىرسەنتىنى ئىگەللەيدۇ)، 21 كۈن تۇرغۇزغاندىن كېيىن ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ.

(3) توڭلىتىش: قېلىن لوق گۆش 10°C -دا (ھاۋانىڭ ھارارىتى 12°C -) 10 سوتكا، ياكى 12°C -دا (ھاۋانىڭ ھارارىتى 13°C -) 4 سوتكا توڭلىتىلىدۇ.

توڭ گۆشتىن پايدىلىنىشتىن بۇرۇن، قاپلىق-قۇيرۇقلۇق لىچىنكىلارنىڭ پائالىيەت ئىقتىدارى سىناپ كۆرۈلىدۇ، يەنى توڭ گۆشتىكى لىچىنكىلار ئاجرىتىپ ئېلىنىپ، كاللىنىڭ ئۆت

سۇيۇقلۇقى بىلەن فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىنىڭ 80% لىك ئارىلاش-
مىسىغا سېلىنىپ، $38\sim 40^{\circ}\text{C}$ قىچە قىزدۇرۇلۇپ 15 مىنۇت
تۇرغۇزۇلىدۇ. توڭلاپ ئۆلمىگەن لىچىنىكلار ھەركەتلىنىپ باش
بوغۇملىرىنى چىقىرىدۇ، ئۆلمىگەن لىچىنىكلار ھەركەت قىلالمايدۇ
ۋە باش بوغۇملىرىنى چىقىرالمايدۇ. دىمەك، مەنپى رېئاكسىيە
كۆرۈلگەن گۆش (لىچىنىكلار ئۆلمىگەن گۆش) تىن پايدىلىنىشقا
بولىدۇ.

ئاشقازان-ئۈچەي يىپىچە قۇرۇت كېسەللىكى

بۇ كېسەللىك ئاشقازان-ئۈچەيدە پارازىتلايدىغان كۆپ
خىل يىپىچە قۇرۇتلاردىن پەيدا بولىدۇ. بۇلار، ئاساسەن،
4-قېرىندى پارازىتلايدىغان گېمونىخوز (تولغىماچ قۇرۇت)
قۇرۇتى، ئىنچىكە ئۈچەيدە پارازىتلايدىغان ئىلمەكلىك قۇرۇت
ۋە چوڭ ئۈچەيدە پارازىتلايدىغان بوغۇملۇق قۇرۇتلاردىن
ئىبارەت. ئاشقازان-ئۈچەي يىپىچە قۇرۇت كېسەللىكى كەڭ
تارقالغان بولۇپ، كالىلارغىمۇ، قويلارغىمۇ يۇقىدۇ.

(كېسەللىك قوزغاتقۇچى)

گېمونىخوز قۇرۇتى: ئۇزۇنچاق يىپىچە قۇرۇت بولۇپ،
ئەركىگىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10~20 م م كېلىدۇ، رەڭگى قىزغۇچ
بولىدۇ، قۇيرۇق قىسمىدا ئېنىق يېرىم يۇمۇلاق ئاچمىغى
بولىدۇ؛ چىشىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 18~30 م م كېلىدۇ، تولغاپ

ئەشكەن يىپتەك ئاق-قىزىل سىزىقلىرى بولىدۇ، قىزىل سىزىق قان شىۋاش ئۆچمىسى، ئاق سىزىق بالىياتقۇسى ھىساپلىنىدۇ. ئىلمەكلىك قۇرۇت: تومراق بولىدۇ، رەڭگى سۇس سۇس-ئۆزۈر بولىدۇ، بېشى دۈمبىسىگە ئېگىلگەن بولىدۇ، ئەركىگىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10~17 م م كېلىدۇ، قۇيرۇق قىسمى ئاچماق بولىدۇ؛ چىشىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10~25 م م كېلىدۇ. بوغۇملۇق قۇرۇت: رەڭگى ئاق بولىدۇ، بېشى دۈمبىسىگە ئېگىلگەن بولىدۇ، ئەركىگىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 12~16 م م كېلىدۇ، قۇيرۇق قىسمى ئېنىق ئاچىلانمىغان بولىدۇ؛ چىشىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 15~20 م م كېلىدۇ، كەينى قىسمىدا جىنىسى ئەزاسى بولۇپ، قارا نەرسە بىلەن يېپىلىپ تۇرىدۇ. بۇ 3 خىل يىپچە قۇرۇتنىڭ تۇخۇملىرى ئاساسەن ئوخشاش



A



B

22-رەسىم ئاشقازان-ئۆچەي يىپچە قۇرۇتى

ۋە ئۇنىڭ تۇخۇمى

A ئاشقازان-ئۆچەي يىپچە قۇرۇتى 1. بوغۇملۇق قۇرۇت

2. گېمونخوز قۇرۇتى 3. ئىلمەكلىك قۇرۇت

B ئاشقازان-ئۆچەي يىپچە قۇرۇت تۇخۇمى


بولدۇ، ئۇزۇنلۇقى 0.08~0.10 م م، كەڭلىكى 0.04~0.05 م م كېلىدۇ، شەكلى سوقىچاق، رەڭگى سۈر ئاق، سەل سۈزۈك بولىدۇ، ئىككى قەۋەت نېپىز ۋە سىلىق تۇخۇم قېپى بولىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدە 10 دانە تۇخۇم ھۈجەيرىسى بولىدۇ.

ئاشقازان-ئۈچەيدە كېسەل پەيدا قىلغۇچى يۇقۇرقى 3 خىل يىپىچە قۇرۇتتىن باشقا، كوئوپېرىيا يىپىچە قۇرۇتى، ئۈستىر-توگمىيە يىپىچە قۇرۇتى، سترونكىلىد يىپىچە قۇرۇتى، كەڭ ئېغىزلىق يىپىچە قۇرۇت، ئىنچىكە بويۇنلۇق يىپىچە قۇرۇت ۋە قامچا قۇرۇتلارمۇ بار.

[يېتىلىش تارىخى] بۇ خىل قۇرۇتلارنىڭ يېتىلىش ئالاھىدىلىكى بىردەك بولمىسىمۇ، ئەمما ئاساسىي جەريانى ئوخشاش. گېمونخوز قۇرۇتى 4-قېرىندا، ئىلمەكلىك قۇرۇت ئىنچىكە ئۈچەيدە، بوغۇملۇق قۇرۇت چوڭ ئۈچەيدە پارازىتلايدۇ. ئۇلار ئاشقازان-ئۈچەيدە جۈپلىشىدۇ، تۇخۇملار تىزەك ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىلىدۇ. ئىسسىق ($20\sim 30^{\circ}\text{C}$)، نەم شارائىتىدا، 2~3 كۈندە تۇخۇمدىن لىچىنىكلار تۇرىلىدۇ، لىچىنىكلار 4~5 كۈندە 2 قېتىم قاسراق تاشلاپ، زىيان يەتكۈزىدىغان لىچىنىكلارغا ئايلىنىدۇ.

زىيان يەتكۈزەلەيدىغان لىچىنىكلار ناھايىتى چىداملىق كېلىدۇ، نەم شارائىتىدا 3~4 ئاي ياشايدۇ، قۇرغاق شارائىتىدا بولسا ئۇيغۇ ھالىتىگە كىرىۋالىدۇ، بىر يىلغىچە ئۆلمەيدۇ. زىيان يەتكۈزىدىغان لىچىنىكلار ئىنتايىن جانلىق كېلىدۇ،

يامغۇرلۇق، تۇمانلىق كۈنلەردە،
 شەبنەم چۈشكەن ياكى زەي
 يەرلەردە، سۇ تامچىلىرىنىڭ يار-
 دىمىدە ئوت - چۆپلەرنىڭ يوپۇر-
 ماقلىرىغا تېزلا يامىشىپ چىقىۋا-
 لىدۇ، كالىغا ئوت - چۆپ بىلەن
 بىللە يۇقىدۇ، بۇلغانغان يەم -
 خەشەك ۋە سۇ ئارقىلىقمۇ يۇقىدۇ.
 ئىلمەكلىك قۇرۇت كالىغا ئېغىز
 ئارقىلىق يۇققاندىن باشقا،
 تېرىدىن تېشىپ ئۆتۈپمۇ يۇقىدۇ.
 كالىغا يۇققاندىن كېيىن،
 گېمونخوز لىچىنكىلىرى 4 -
 قېرىندىدا، ئېغىزدىن يۇققان
 ئىلمەكلىك قۇرۇت لىچىنكىلىرى
 ئىنچىكە ئۆچەيدە بىۋاسىتە
 پارازىتلايدۇ ۋە ئۇلار 14~21
 كۈندە يېتىلگەن قۇرۇتقا ئايلىنى-
 دۇ. تېرە ئارقىلىق يۇققان ئىل-
 مەكلىك قۇرۇتلار قانغا ئۆتۈپ،
 قان بىلەن بىللە ئايلىنىپ
 ئۆپكەگە بارىدۇ، ئاندىن



23-رەسىم ئاشقازان - ئۆچەي

يېپىچە قۇرۇتىنىڭ يېتىلىش

تارىخى

1. تۇخۇمى ۋە قاسراق

تاشلىغان لىچىنكىسى

2. ئىككىنچى دەۋرلىك

لىچىنكىسى

3. زىيان يەتكۈزىدىغان

لىچىنكا

4. كالىغا يۇقۇش يولى

بەلغەم ئارقىلىق ھەزىم قىلىش يولىغا ئۆتۈپ، ئىنچىكە ئۆچەيدە پارازىتلايدۇ ۋە 14~21 كۈندە يېتىلگەن قۇرۇتقا ئايلىنىدۇ. بوغۇملۇق قۇرۇت لىچىنكىسى كالىغا يۇققاندىن كېيىن چوڭ ئۆچەي تېمىغا تېشىپ كىرىپ، ئۇ يەردە تۈگۈنلەرنى شەكىللەندۈرىدۇ ۋە تۈگۈننىڭ ئىچىدە بىرنەچچە كۈندىن بىرنەچچە ئايغىچە تۇرۇپ، ئاخىردا ئۆزلۈگىدىن تۈگۈننى تېشىپ چىقىپ ئۆچەيگە چۈشۈپ، 14~21 كۈندە يېتىلگەن قۇرۇتقا ئايلىنىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەللىك ئالامەتلىرى چوڭ كالىلاردا روشەن كۆرۈلمەيدۇ، موزايىلاردا روشەنرەك كۆرۈلىدۇ، ئۆتكۈر تىپ ۋە سوزۇلما تىپ دەپ ئىككى تىپقا ئايرىلىدۇ. ئۆتكۈر تىپ: تولراق ياز ۋە كۈزنىڭ يامغۇرلۇق مەزگىلىلىرىدە، ياكى ئويمان ئوتلاقلىرىدا ئۇزاق مۇددەت بېقىلغان كالىلاردا كۆرۈلىدۇ. كېسەل تەككەن موزاينىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ 40°C تىن ئېشىپ كېتىدۇ ۋە 4~10 كۈنگىچە چۈشمەيدۇ؛ بۇرۇن ئەينىكى قۇرۇيدۇ، ئىشتىيى تۇتۇلىدۇ، ئىچى سۈرىدۇ. ئىلمەكلىك قۇرۇت ۋە بوغۇملۇق قۇرۇتتىن يۇقۇملانغانلىرى قان ئارىلاش تىزەكلەيدۇ؛ تېز ئورۇقلايدۇ، كەمقان بولۇپ قالىدۇ، شىللىق پەردىلىرى ئاقىرىدۇ، ئىگەك ئاستى ۋە كۆكرەك ساڭگىلىمىسى سۇلۇق ئىشىيدۇ، ئېغىر كېسەللەنگەنلىرىنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى بولمايدۇ. كۆپ ساندىكى موزايىلارنىڭ تىزىگىدىن قۇرۇت تۇخۇملىرى چىققاندىن كېيىن بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئەسلىگە

قايتىپ، ئىشتىي تۈزىلىپ، ئومۇمى بەدەن ئەھۋالى ياخشىلىنىدۇ. سوزۇلما تىپ: تولاراق ئىككىنچى يىلنىڭ ئەتىياز پەسلىدە كۆرۈلىدۇ. ئاشقازان - ئۈچەي يىمپىچە قۇرۇتىدىن يۇقۇملانغان كالىنىڭ تېمپېراتۇرسى نورمال بولىدۇ، ئەمما ئۇزاققىچە ئورۇق تۇرىدۇ. كەمەن بولۇپ قالىدۇ ۋە ئىچى سۇرىدۇ. ئىلمەكلىك قۇرۇتتىن يۇقۇملانغان كالىنىڭ تېمىگى قان ئارىلاش كېلىدۇ؛ بوغۇملۇق قۇرۇتتىن يۇقۇملانغان كالىنىڭ تىمىگىدە يىمىرىك بولىدۇ. بەزى كالىلاردا قوسىغى ئاغرىش، بېلىنى سوزۇش، دۈمبىسىنى پەسكە ئېگىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئېغىر كېسەللەنگەنلىرى ئاجىزلىشىۋېرىپ ئۆلۈپ قالىدۇ.

[دېئاگنوز قويۇش] ئومۇمى ماتىرىياللارغا ئاساسەن دېئاگنوز قويۇلىدۇ. قۇرۇت تۇخۇملىرىنى تەكشۈرۈشتە جۇغلاپ لەيلىتىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ (لېنتىسمان قۇرۇت كېسەللىگىگە قارالسۇن). ئۆلۈكنى يېرىپ تەكشۈرگەندە، كالىنىڭ بەك ئورۇقلىغانلىقى ۋە قوساق بوشلۇقىغا سۇيۇقلۇق يىغىلىپ كەتكەنلىكى بىلىنىدۇ. 4 - قېرىندىكى ماددىلار قېنىق بېغىر رەڭ كۆرۈنىدۇ، ئىچىدىن كۆپلىگەن گېمونخوز قۇرۇتى چىقىدۇ. ئىنچىكە ئۈچەينىڭ ئوتتۇرا قىسمىنىڭ شىللىق پەردىسى سۇلۇق ئىششىغان، ئىچىدە تېرىق چوڭلۇغىدىكى قانلىق چېكىتلەر ھەم نۇرغۇن گېمونخوز قۇرۇتلىرى بولغان بولىدۇ. چوڭ ئۈچەي ھەتتا ئۈچەي بېغىشى ۋە جىگەر، بالياتقۇلاردا 2~10 م كېلىدىغان بوغۇملار بولغان بولىدۇ، يېڭى بوغۇملار ئىچىدە لېچىنكىلار بولغان، بەزىلىرىدە

يىمىرىك، ئىرىمچىكىسىمان ماددىلار، ياكى كالتسىيلاشقان ماددىلار بولغان بولىدۇ، چوڭ ئۆچەيدە نۇرغۇنلىغان بوغۇملۇق قۇرۇت بولغان بولىدۇ. ئاشقازان-ئۆچەي يىپىچە قۇرۇتى كىچىكرەك بولغاچقا، ئۆلۈكنى يېرىپ تەكشۈرگەندە ئەستايىدىل، ئىنچىكىلەپ تەكشۈرگەندىلا، ئاندىن ئۇنى بايقىۋالغىلى بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

1. قۇرۇت چۈشۈرۈش: ھەر يىلى ئەتىياز ۋە كۈزدە ئالدىنى ئېلىش خاراكتىرلىق قۇرۇت چۈشۈرۈلىدۇ. كېسەللىك كۆرۈلگەندىن كېيىن جىددى رەۋىشتە داۋالاش خاراكتىرلىق قۇرۇت چۈشۈرۈلىدۇ.

(1) دىپتېرىكسى: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 0.05 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ، سۇدا ئېرىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. دورا ئىچكۈزۈلگەندىن كېيىن، ئايرىم كېسەل كالىلاردا زەھەر-لىنىش تۈپەيلىدىن شال ئېقىش، قوساق ئاغرىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، ئېغىر كېسەللەنگەن كالىلارنى ئاتروپىن، پىرالوكسىمى مېتېئود قاتارلىقلار بىلەن قۇتقۇزۇشقا توغرا كېلىدۇ (زەھەرلىنىش كېسەللىكلىرىگە قارالسۇن).

(2) تېترامىزول: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 10 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ، سۇدا ئېرىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ، ياكى يەم-ئوزۇققا قوشۇپ بەرسىمۇ، بىۋاستە يىگۈزسىمۇ بولىدۇ، ياكى پار سۈيىدە ئېرىتىپ تېرە ئاستىغا ئۆكۈل قىلىسىمۇ بولىدۇ.

(3) لېۋامزول: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 7.5-8 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ، تېترامزولنى ھەر كەندەك بېرىلىدۇ.

(4) تىئابىندازىن: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 0.1 گ ھىساپلاپ ئېلىنىپ، دۇغلاشما سۇيۇقلۇق ياساپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(5) فېنوتىئازىن: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 0.2 گ ھىساپلاپ ئېلىنىپ، كىراخمال بوتقىسىغا قوشۇپ ئىچ-كۈزۈلىدۇ، ياكى كۈمۈلچ، يالانما ياساپ يىگۈزسىمۇ بولىدۇ. دورا بېرىشتىن بۇرۇن كالىنى 6~12 سائەتكىچە ئاچ قويۇش لازىم.

2. بېقىش-باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، يەم-خەشەك، سۇ، ئوقۇر تازىلىغىنى ئوبدان ساقلاش، قىغ-تۆشەك چۆپلەرنى ۋاقتى-ۋاقتىدا چىقىرىپ ۋە دۆۋىلەپ ئېچىتىپ، قۇرۇت تۇخۇم-لىرىنى ئۆلتۈرۈش لازىم.

3. سازلقلاردا مال باقماسلىق، ھەر 5~6 كۈندە ئوتلاق يەڭگۈشلەپ تۇرۇش، يايلاق، ئېتىز-ئېرىق بويلىرى ۋە ئېگىز-لىقلاردىن تولۇق پايدىلىنىش كېرەك.


ئۆپكە قىل قۇرۇت كېسەللىگى

بۇ قىلىسمان قۇرۇتلارنىڭ ئۆپكەدە پارازىتلىشىدىن كېلىپ

چىقىدىغان كېسەللىك بولۇپ، ئۆلكىمىزنىڭ غەربىي شىمالىغا تارقالغان، موزايىلاردا كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] بۇ بىر خىل قىلىسىمان يىمپە قۇرۇت بولۇپ، رەڭگى ئاق بولىدۇ، ئەركىگىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 17~43 مم كېلىدۇ، قۇيرۇغىنىڭ ئۇچىدا ئاچىماق جۈپلىشىش كۈنلۈكى ۋە ئىككى دانە توم ۋە قىسقا ساغۇچ قوڭۇر رەڭلىك جۈپلىشىش سانسىغۇچىسى بولىدۇ؛ چىشىسىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 25~58 مم كېلىدۇ، تېنىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تومپىيىپ چىقىپ تۇرىدىغان، كالىپۇكىسىمان كۆپىيىش تۆشۈكى بولىدۇ.

لېچىنىكىسىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 0.32~0.40 مم، كەڭلىكى 0.016~0.019 مم كېلىدۇ، قېپى ناھايىتى نەپىز بولىدۇ ۋە ئۇنى ئاسانلىقچە پەرق ئەتكىلى بولمايدۇ، ئىچىدە داغسىمان تۈرۈلگەن ئۇچىيى بولىدۇ، قۇيرۇق ئۇچى قىسقا ۋە ئۇچلۇق كېلىدۇ.



24-رەسىم ئۆپكە قىل قۇرۇتى

ۋە ئۇنىڭ لېچىنىكىسى

A ئۆپكە قىل قۇرۇتى

B لېچىنىكىسى

1. ئۆزگىرىشتىن بۇرۇن

2. ئۆزگەرگەندىن كېيىن

3. قاسراق تاشلىغاندىن كېيىن

[يېتىلىش تارىخى] ئۆپكە قىل قۇرۇتلىرى كالىنىڭ كاناي ۋە كانايچىلىرىدا بارازىتلايدۇ، جۈپلەشكەندىن كېيىن تۇخۇملايدۇ. تۇخۇملىرى كالا يۆتەلگەندە خەپرۈككە قوشۇلۇپ ئېغىزغا چۈشۈپ، ئۇنىڭدىن ھەزىم قىلىش يولىغا بارىدۇ. ئۈچەيىدە لىچىنىڭغا ئايلىنىپ تىزەك بىلەن سىرتقا چىقىرىلىدۇ.

لىچىنىڭلار ھاۋا ۋە تۇپراق نەم بولغان، تېمپېراتۇرا $28^{\circ}\text{C} \sim 21^{\circ}\text{C}$ بولغان شارائىتتا 3~6 كۈندىلا زىيان يەتكۈزگۈچى لىچىنىڭا بولۇپ يېتىلىدۇ. بۇنداق لىچىنىڭلار يەم-خەشەك، ئوت-چۆپ ۋە سۇغا قوشۇلۇپ كالىغا يۇقىدۇ، ئاندىن ئىنچىكە ئۈچەينىڭ شىلىق پەردىسىنى تېشىپ قانغا ئۆتۈپ، قان ئارقىلىق ئۆپكەگە ۋە ئۇنىڭدىن ئۆپكە پۈۋەكچىلىرى، كاناي ۋە كانايچىلارغا ئۆتۈپ، 20~30 كۈندە يېتىلگەن قۇرۇتقا ئايلىنىدۇ. ئۆپكە قىل قۇرۇتىنىڭ ياشاش مۇددىتى 2~12 ئاي بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەل كالا يۆتىلىدۇ، ئاۋال قۇرۇق يۆتىلىدۇ، كېيىن ھۆل يۆتىلىدۇ، يۆتەل بارغانسېرى كۈچىيىدۇ. بەزىدە دېمى سىقىلىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ $40^{\circ}\text{C} \sim 39.5^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، روھسىزلىنىدۇ، ئىشتىيى تۈتۈلىدۇ، بۇرىندىن شىلىمىش سۇيۇقلۇق ئاقىدۇ؛ تەدرىجى ئورۇقلايدۇ، گەمقان بولىدۇ. موزاينىڭ يېتىلىشى ئاستا بولىدۇ. تىڭشاپ تەكشۈرۈلسە، يۈرەك ھەرىكىتى كۈچەيگەن بولىدۇ، ئۆپكەدىن قۇرۇق ياكى ھۆل خىرىلىدىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. كېسەللىكنىڭ كېيىنكى باسقۇچىدا نەپەس قىيىنلىشىدۇ، ئېغىزدىن


كۆپۈك قاينايدۇ، كالا ئۆرە تۇرالمايدۇ، ئاخىرىدا تۇنجۇقۇپ ئۆلىدۇ.

[دېئاگنوز قويۇش] ئومۇمى تەكشۈرۈش ماتېرىياللىرىغا ئاساسەن دېئاگنوز قويۇلىدۇ. كېسەل كالا تىرىك ۋاقتىدا تىزەك-تىكى لىچىنىكلارنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ، كالا ئۆلگەندىن كېيىن ئۆلۈكنى يېرىپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ.

1. تىزەكتىكى لىچىنىكلارنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى: ئالاھىدە ياسالغان قۇرۇلما—چوڭ تەجرىبە نەيچىسى جازىسى ئۈستىگە دېئامېتىرى 10~15 س م كېلىدىغان ۋارونىكلار قويۇلىدۇ، ۋارونىكلارنىڭ ئىچىگە مېتال ئەگلەك (ياكى 3~4 قەۋەت داكا) سېلىنىدۇ، ئۇنىڭ تۆۋەنكى ئۇچىغا 15~20 س م رېزىنكە نەيچە ئۇلىنىدۇ، رېزىنكە نەيچىنىڭ تۆۋەنكى ئۇچىغا تۈۋى بار كىچىك ئەينەك نەيچە ئۇلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىغا قىسقىچ قىسىپ قويۇلىدۇ. تەكشۈرۈشتە، 10~20 گ يېڭى تىزەكنى ۋارونىكا ئىچىدىكى ئەگلەككە سېلىپ، ئۈستىگە 40°C ~38 لۇق ئىسسىق سۇ تىزەك چۆككەندەك قويۇلىدۇ. لىچىنىكلار تىزەكتىن ئاجراپ چىقىپ سۇغا چۈشىدۇ. بۇ 1 سائەت جىم تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن، لىچىنىكلار رېزىنكە نەيچە ئاستىدىكى كىچىك ئەينەك نەيچە تۈۋىگە چۆكىدۇ. بۇ چاغدا رېزىنكە نەيچىنى قىسۇپ تۇرۇپ، كىچىك ئەينەك نەيچىنى چىقىرىپ ئېلىپ، ئۇنىڭدىكى سۈزۈك سۇنى قىسايىتىپ تۆكۈۋېتىپ، ئاستىدىكى تىنىملارنى

ئەينەك ئۈستىگە شورغۇچ بىلەن شورىتىپ ئېلىپ، ئۈستىگە بىر تامچە يۇد سۇيۇقلۇقى تامغۇزۇلىدۇ (1 گ يۈد، 2 گ كالىي يودات، 1000 م ل سۇ) ۋە ئۇ ئەينەك ياپقۇچ بىلەن يېمىلىنىدۇ. دىن كېيىن مىكروسكوپتا تەكشۈرۈلىدۇ.

2. ئۆلۈكنى يېرىپ تەكشۈرۈش: ئۆپكە لىمفا تۈگۈنلىرى زورايدىغان، ئۆپكەدىكى كېسەل تەككەن ئورۇن تومپايدىغان، ساغۇچ ئاقارغان بولىدۇ، باسقاندا قاتتىق بولىنىدۇ، شىتىرىلغان ئاۋاز چىقىدۇ. كانايچىلار كېڭەيگەن، شىلىق پەردىلەردە قانلىق چېكىتلەر بولغان، ئىچىگە شىلىمىش سۇيۇقلۇق ۋە ئۆپكە قىل قۇرۇتلىرى تولۇپ كەتكەن بولىدۇ.



25-رەسىم تېرمان قۇرۇلمىسى

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

1. قۇرۇت چۈشۈرۈش: ئەتىياز ۋە كۈزدە ئالدىنى ئېلىش خاراكتىرلىق قۇرۇت چۈشۈرۈلىدۇ، كېسەللىك كۆرۈلگەندە جىددى رەۋىشتە داۋالاش خاراكتىرلىق قۇرۇت چۈشۈرۈلىدۇ.

(1) سىئانودىسھىدرازىد: كالىنىڭ ھەرك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 15~20 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ %10 لىك سۇيۇق-لۇق تەييارلىنىپ، تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. سېغىن كالغا ئوكۇل قىلىنغاندىن كېيىن سۈت مىقدارى سەل ئازىيىدۇ، ئەمما 3~4 كۈندىن كېيىن ئەسلىگە كېلىدۇ.

(2) ھىترازان: كالىنىڭ ھەرك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 20~40 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ %25~20 لىك سۇيۇقلۇق تەييارلىنىپ، تېرە ئاستىغا ئۇدا 3~5 كۈن ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(3) تېترامىزول: كالىنىڭ ھەرك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 5~7.5 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ %10 لىك سۇيۇقلۇق تەييارلىنىپ، تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ياكى يەم-خەشەككە ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ، ياكى سۇدا ئېرىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(4) لېۋامىزول: كالىنىڭ ھەرك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 7.5 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ، تېترامىزولنى بەرگەندەك بېرىلىدۇ.

2. بېقىش تازىلىغىنى ياخشىلاش، يەم-خەشەك ۋە سۇنىڭ بۇلغىنىشىدىن ساقلىنىش، تىزەكلەرنى ئېچىتىپ بىر تەرەپ قىلىش، چوڭ كالىلار بىلەن موزايلارنى ئايرىم-ئايرىم بېقىش، ھەر 5~6 كۈندە ئوتلاقى ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش، سازلىقلاردا كالا باقماسلىق لازىم.


قوتۇر

قوتۇر قىچىشقاق دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ، تېرە تەشكۈچى ۋە تېرە شورىغۇچى قۇرۇتلارنىڭ تېرىدە پارازىتلىشىدىن پەيدا بولىدۇ. ئۇ كەڭ تارقالغان، زىيىنى چوڭراق بولغان كېسەللىكتۇر. [كېسەللىك قوزغاتقۇچى] تېرە تەشكۈچى ۋە تېرە شورىغۇچى قۇرۇتلار كېسەللىك قوزغاتقۇچىلاردۇر.

تېرە تەشكۈچى قۇرۇتنىڭ شەكلى يۇمۇلاق بولۇپ، تاشپاقىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. باش تەرىپىدە قىسقا ۋە توم تاقىسىمان ئاغزى بولىدۇ. قوساق قىسمىدا 4 جۈپ بوغۇملۇق پۇتلىرى بولۇپ، ئالدى 2 جۈپ پۇتى بەدىنىدىن چىقىپ تۇرىدۇ، كەينى 2 جۈپ پۇتى روشەن كۆرۈنمەيدۇ. تۇخۇمى سوقىچاق، تۇخۇم قېپى ئاق ۋە نېپىز بولىدۇ.

تېرە شورىغۇچى قۇرۇت ئۇزۇن، يۇمۇلاق كېلىدۇ، ئاغزى يۇمۇلاق، ئۆشكىسىمان بولىدۇ، پۇتلىرى ئىنچىكە ۋە ئۇزۇن بولىدۇ، 4 جۈپ پۇتنىڭ ھەممىسىلا تېنىدىن چىقىپ تۇرىدۇ. ئەركىگىنىڭ كەينى قوساق تەرىپىدە ئىككى دانە يۇمۇلاق جۈپلىشىش شورىغۇچىسى بولىدۇ. تۇخۇمى سوقىچاق كېلىدۇ.

[يېتىلىش تارىخى] قوتۇر قۇرۇتلىرىنىڭ پۈتۈن ھاياتى كالا تېنىدە ئۆتىدۇ ۋە ئۇلار كالا تېنىدە كۆپىيىپ ئەۋلات قالدۇرىدۇ.



26-رەسىم تېرە تەشكۈچى ۋە تېرە شورىغۇچى قۇرۇتلار

1. شورىغۇچى چىشى قۇرۇت 2. شورىغۇچى ئەركەك قۇرۇت
3. تەشكۈچى ئەركەك قۇرۇت 4. تەشكۈچى چىشى قۇرۇت

قوتۇر قۇرۇتلىرى تۇخۇم. لىچىنكا، ياش قۇرۇت ۋە يېتىل-
گەن قۇرۇقتىن ئىبارەت 4 باسقۇچنى بېسىپ ئۆتىدۇ.
تەشكۈچى قۇرۇتلار تېرىنىڭ چىن قەۋىتىدە ياشايدۇ،
ئۈستىكى تېرە توقۇلمىسى سۇيۇقلۇغى، لىمفا سۇيۇقلۇغى ۋە
باشقا توقۇلما سۇيۇقلۇغىنى ئوزۇق قىلىپ جان باقىدۇ. شورىغۇچى
قۇرۇتلار بولسا ئۇزۇن تۈكلۈك جايلاردىكى تېرە ئۈستىدە
ياشايدۇ، ئېغىز سانچىغۇچىسى بىلەن قان، لىمفا سۇيۇقلۇغى
ۋە توقۇلما سۇيۇقلۇغىنى شوراپ جان باقىدۇ.

قوتۇر قۇرۇتلىرى تېرىدە تۇخۇملايدۇ. تۇخۇملار مۇۋاپىق
ھارارەت ۋە نەملىك شارائىتىدا 3~7 كۈندە لىچىنكىغا ئايلى-
نىدۇ. لىچىنكىلار 3~4 كۈندە يەنە قاسراق تاشلاپ ياش

قۇرۇتقا، ياش قۇرۇتلار 3~4 كۈندىن كېيىن يەنە قاسراق تاشلاپ يېتىلگەن قۇرۇتقا ئايلىنىدۇ. قوتۇر قۇرۇتلىرىنىڭ تۇخۇمدىن يېتىلگەن قۇرۇتقا ئايلىنىشى ئۈچۈن 14~21 كۈنلا كېتىدۇ. قوتۇر قۇرۇتلىرى كالىغا يۇققاندىن كېيىن چاپسالا كۆپلەپ كۆپىيىپ، كېسەللىك پەيدا قىلىدۇ.

قوتۇر قۇرۇتلىرى قاراڭغۇ، نەم، ئىللىق شارائىتتا يېتىلىدۇ، شارائىت ماس كەلمىگەندە، كۆپىنچە، كالىنىڭ قۇلىغى، قۇيرۇق ئاستى، تۇياق يىرىقلىرى ۋە باقاي، قوساق ئاستى قاتارلىق ئورۇنلارغا يوشۇرۇنۇۋالىدۇ، شارائىت يار بەرگەن ھامان تېز كۆپىيىدۇ.

قوتۇر تولاراق قوتۇر بولغان كالىلارنىڭ ساق كالىلارغا يېقىنلىشىشىدىن يۇقىدۇ. قوتۇر قۇرۇتلىرى كالا تېنىدىن چۈشۈپ كەتكەندىمۇ بىرنەچچە ئايغىچە ئۆلمەيدۇ. بۇلغانغان ئىگەر - توقۇم، تازىلىق چۈتكىلىرى، بېقىش - باشقۇرۇش جابدۇقلىرى، ئېغىل، تۆشەك چۆپ قاتارلىقلارمۇ يۇقۇم پەيدا قىلىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كالىلار قوتۇر قۇرۇتلىرى بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن 14~21 كۈندە كېسەللىنىدۇ، كېسەللەندىگەن جاي قىچىشىدۇ، كالا قىچىشقان يېرىنى يالايدۇ، ياكى شۇ يېرىنى تام، تۈۋرۈك، دەل - دەرەخ ۋە باشقا نەرسىلەرگە تىنماي سۈركەيدۇ، نەتىجىدە شۇ يەر ياللۇغلىنىدۇ، ھەتتا جاراھەتكە ئايلىنىدۇ.

تېرە تەشكۈچى قۇرۇتلاردىن بولىدىغان قوتۇر كالىدا ئاز

ئۇچرايدۇ، قوتۇر تولاراق باش، بويۇن بىلەنلا چەكلىنىدۇ، قوتۇر ئېغىر بولغاندا باشقا قىسىملارغا تارقىلىشى مۇمكىن. شورىغۇچى قۇرۇتلاردىن بولىدىغان قىچىشقاق كالىدا كۆپ بولىدۇ، ئاۋال بويۇن، ساڭگىلىما گۆش، يەلكە قىسىملاردىن باشلىنىدۇ، ئاندىن پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدۇ. كېسەل تەككەن جايدا دەسلەپتە ئۇششاق بۆرتىمەلەر پەيدا بولىدۇ، كېيىن ئۇ بارا-بارا سۇلۇق قاپارتمىلارغا ھەتتا يىرىڭلىق قاپارتمىغا ئايلىنىدۇ. كالا قىچىشقىنى بېسىشقا ئۇرۇنىدۇ-دە، سۇلۇق قاپارتىمىلار، يىرىڭلىق قاپارتمىلار يېرىلىپ، ساغۇچ لىمغا سۇيۇقلۇقى ئاقىدۇ. مۇشۇ سېرىق سۇۋە تېرە قاسرىغى، يۇڭ، پاسكىنا نەرسىلەر قوشۇلۇپ قاتقاندىن كېيىن قاتتىق جىگەر رەڭ قەقەچ پەيدا بولىدۇ. قوتۇر بولغان جاينىڭ يۇڭى چۈشۈپ، تېرە يالىڭاچلىنىپ قالىدۇ. تېرىنىڭ مۇڭگۈزلۈك قەۋىتى بارغانچە قېلىنلايدۇ، تېرە ئاستى توقۇلمىلىرى ئۆسۈپ بارىدۇ، تېرە قېلىنلىشىپ كېتىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئەۋرىشىملىكى يوقىلىدۇ-دە، قورۇقلار ياكى يېرىقلار شەكىللىنىدۇ. كېسەل تەككەن جاي بارغانچە يوغانىپ ماڭىدۇ، قەقەچ بولغان ۋە تۈكى چۈشكەن جاينىڭ ئۆپچۆرىسى-دىمۇ يېڭى كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى كۆرۈلىدۇ.

كېسەل كالىلاردا كۆپىنچە ئومۇمىي ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، ئىشتەي تۇتۇلۇش، روھسىزلىنىش، كۈندىن-كۈنگە جۈدەش، كەمقان بولۇش، ھەتتا ئاجىزلاپ ئۆلۈش ھادىسىلىرى كۆرۈلىدۇ. [دىئاگنوز قويۇش] كېسەللىكنىڭ تارقىلىش ئەھۋالىغا ۋە

كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرىگە قاراپ ئاسانلا دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ. قوتۇرنى ھۆل تەمرە تىكىدىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن تەجرىبىخانىدا دىئاگنوز قويۇلسۇمۇ بولىدۇ.

1 كېسەللىك ئەۋرىشكىسى ئېلىش: ئۆتكۈر قوشۇق ياكى ئوپىراتسىيە پىچىغى بىلەن قوتۇر بولغان يەر بىلەن ساق يەرنىڭ تۇتاشقان جايىدىن قان چىققىچە قىرىپ ئەۋرىشكە ئېلىنىدۇ ۋە قىرىۋېلىنغان ئەۋرىشكە ئەينەك نەيچىگە، قەغەز ياكى سۇلياۋ خالتىغا سېلىنىپ، تەكشۈرۈشكە ھازىرلاپ قويۇلىدۇ.

2 تەكشۈرۈش ئۇسۇلى:

بىۋاسىتە تەكشۈرۈش: ئەۋرىشكىنى ئەينەك قاچىغا سېلىپ $35 \sim 40^{\circ}\text{C}$ قىزدۇرۇپ، ئاندىن ئۇنى قارا قەغەز، قارا رەخت ياكى قارا سىرلانغان شىرە ئۈستىگە قويۇپ لوپا ئەينەك بىلەن كۈزەتسە، سۈر ئاق قۇرۇتلارنىڭ ئۆمىلەپ يۈرگەنلىگى كۆرۈنىدۇ. تېرە قاسرىغىنى ئېرىتىپ تەكشۈرۈش: كېسەللىك ئەۋرىشكىسىنى تەجرىبە نەيچىسىگە سېلىپ، ئۇنىڭغا 10% لىك ئۇيغۇچى كالىي ياكى ئۇيغۇچى ناترىي قويۇپ، نەيچە تىك پېتى 1~2 سائەت جىم تۇرغۇزۇلسا، قاسراق يۇمشاپ ئېرىيدۇ. بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئۈستىدىكى سۈزۈك سۇنى تۆكۈۋېتىپ، تىنىمىسىنى ئەينەك ئۈستىگە تامغۇزۇپ ۋە ئۇنى ياپقۇچ بىلەن يېپىپ، تۆۋەن ھەسسىلىك مىكروسكوپتا تەكشۈرسە بولىدۇ. تەكشۈرۈش ۋاقتىنى قىسقارتىش ئۈچۈن، ئۇيغۇچى ناترىي قويۇلغان نەيچىنى (ئىچىدە قاسراق بار) ئىسپىرت لامپىغا تۇتۇپ بىرنەچچە مىنۇت

قىزدۇرۇپ، قاسراق تولۇق ئېرىگەندىن كېيىن تىندۇرغۇچقا تىندۇرۇپ تەكشۈرسىمۇ بولىدۇ.

كىرىسىگە چىلاپ تەكشۈرۈش: كېسەللىك ئەۋرىشكىسىنى چوڭراق ئەينەك ئۈستىگە قويۇپ، ئۈستىگە بىرنەچچە تېمىم كىرىس تامغۇزغاندىن كېيىن ياپقۇچ يېپىپ، قول بىلەن ئۇۋۇ-لاپ ئېزىپ، تۆۋەن ھەسسىلىك مىكروسكوپتا تەكشۈرسە بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

1. كالا قوتىنىنىڭ ئىچى يورۇق، ھاۋا ئالمىشىش شارائىتى ياخشى، قۇرغاق ۋە تازا بولۇشى، تۆشەك چۆپ پات-پات ئالماشتۇرۇپ تۇرۇلۇشى كېرەك. كالىنىڭ بەدىنىنى دائىم چۈتە-كىلاپ تۇرۇش، قىش ۋە ئەتىياز كۈنلىرى كالىلارنى قوتاندىن پات-پات چىقىرىپ ھەركەتلەندۈرۈپ ۋە كۈن كۆرسىتىپ تۇرۇش كېرەك.

2. بېقىش-باشقۇرۇش جابدۇقلىرى ۋە ئىگەر-توقۇم، چۈتكە قاتارلىقلارنى مۇقىملاشتۇرۇش لازىم. يېڭى كەلتۈرۈلگەن كالىلارنى يۇقۇم تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈش، گۇمانلىقلىرىنى ئايرىپ كۈزىتىش، ئېنىق دىئاگنوز قويۇلغاندىن كېيىن ۋاقتىدا داۋالاش، پۈتۈنلەي ساقايغاندىن كېيىن ئاندىن ساق كالىلارغا قوشۇپ بېقىش كېرەك.

3. كېسەل كالىلارنى ئايرىپ بېقىش، قوتان ۋە جابدۇق-سايىمانلارنى 20%~10 لىك ھاك سۈيى، 5% لىك ئۇيغۇچى ناترىي، 20% لىك ئوتۇن-ياغاچ كۈلى بىلەن دېزىنفېكسىيە

قىلىش لازىم. دورا سۇيۇقلۇغىنى ئەڭ ياخشىسى قىزدۇرۇپ
ياكى قاينىتىپ ئىشلىتىش كېرەك. دىپتېرىكسىنىڭ %3-1 لىك
ئېرىتمىسى، "666" نىڭ %0.25 لىك دۇغلۇق سۇيۇقلۇغى ئىشلىتىش
لىتىلىشمۇ بولىدۇ.

4. داۋالاش:

(1) د د ت ئىمۇلسىيىسى:

رېتسېپ:

د د ت 1 ئۇلۇش، كىرسىن 9 ئۇلۇش، لىزول 1 ئۇلۇش، سۇ 19
ئۇلۇش

د د ت كىرسىندە ئېرىتىلىدۇ، لىزولغا سۇ قوشۇلىدۇ. ئۇنىڭدىن
كېيىن د د ت بىلەن كىرسىن ئارىلاشمىسىنى قازاندا ۋاسە
تىلىك قىزدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە لىزول سۈيىمىنى ئاستا-ئاستا
قۇيۇپ (بىر تەرەپتىن قۇيۇپ، بىر تەرەپتىن ئارىلاشتۇرۇپ) ۋە
ئۇنى ئوبدان چايقاپ ئىمۇلسىيە ھالىتىگە كەلتۈرۈپ، كېسەل
تەككەن جايغا سۈرتۈلىدۇ.

(2) "666" دۇغلۇق ئېرىتمىسى:

رېتسېپ:

%6 لىك "666" 1 ئۇلۇش، لىزول 1 ئۇلۇش،

سۇ 100 ئۇلۇش

"666" نى ئىلمان سۇغا ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە لىزولنى
قوشۇپ ئوبدان چايقاپ، كېسەل تەككەن جايغا سۈرتۈلىدۇ.
(3) دىپتېرىكسى سۇيۇقلۇغى:

رېتسېپ:

دېپتېرىكس 5 ئۇلۇش، كىرىئولىن 5 ئۇلۇش،

سۇ 100 ئۇلۇش

كىرىئولىن (ياكى لىزول) نى ئىلمان سۇدا ئېرىتىپ، ئۇنىڭ
ئۈستىگە دېپتېرىكسنى قوشۇپ ئوبدان ئېرىتىپ، كېسەل تەككەن
جاي يۇيۇلىدۇ.

(4) دېپتېرىكس مەلھىمى:

رېتسېپ:

دېپتېرىكس 100.0، كىرىئولىن 100.0، مەلھەم

100.0، ۋازىلىن 700.0

ۋازىلىن بىلەن مەلھەمنى قىزدۇرۇپ ئېرىتىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە
دېپتېرىكس ۋە كىرىئولىن (ياكى لىزول) نى قوشۇپ
تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، سوۋۇپ 40°C قا كەلگەندە،
كېسەل تەككەن جايغا سۈرتۈلىدۇ.

(5) دېپتېرىكس - سەلەركە ئېرىتمىسى:

رېتسېپ:

دېپتېرىكس 1 ئۇلۇش، كېرەكسىز سەلەرگە

100 ئۇلۇش

دېپتېرىكس سەلەركىدە ئېرىتىلىپ، كېسەل تەككەن ئورۇنغا
سۈرتۈلىدۇ.

(6) گۇڭگۇرت مەلھىمى:

رېتسېپ:

گۇڭگۇرت 15 ئۇلۇش، كىرسىن 5 ئۇلۇش، ۋازىلىن
20 ئۇلۇش

ۋازىلىنى قىزىتىپ ئېرىتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئۈستىگە
كىرسىن بىلەن گۇڭگۇرتنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم قىلىپ،
كېسەل تەككەن جايغا سۈرتۈلىدۇ.

(7) فىشىر سۈتلۈك ئوتى دورىسى:

رېتسېپ:

فىشىر سۈتلۈك ئوتى 1 جىڭ، كۆيدۈرۈلگەن

گۇڭگۇرت 3 سەر، ئاقمۇچ 1.5 سەر

بۇلارنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، پاراشوك ياسىلىدۇ. بىر
جىڭ پۇرچاق يېغىنى قاينىتىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە يۇقۇرقى دورى-
دىن 1 سەر قوشۇپ يەنە 15 مىنۇت قاينىتىپ، سوۋۇغاندا
كېسەل تەككەن جايغا سۈرتۈلىدۇ.

ھاۋا ئىللىقچاق چاغلاردا سۇلۇق ئېرىتمە ياكى دۇغلۇق
ئېرىتمە دورىلارنى ئىشلەتكەن مۇۋاپىق. ھاۋا سوغاق چاغلاردا
دورنىڭ ئىمۇلسىيلىك، مايلىق ۋە مەلھەم دورىلارنى ئىشلەت-
كەن مۇۋاپىق. سوغاق پەسىللەردە زۇكامدىن ساقلىنىش ئۈچۈن،
داۋالاشنى ئەڭ ياخشىسى ئىسسىق قوتانلاردا، چۈش ۋاقتى
ئېلىپ بارغان ياخشى. دورا سۈرتۈشتىن بۇرۇن كېسەل تەككەن
جايىنىڭ چۆرىسىدىكى يۇڭلارنى قىرغۇچىتىش، كېسەل تەككەن
ئورۇندىكى قەقەچ ۋە پاسكىنا نەرسىلەرنى ئېلىۋېتىش كېرەك.
ھاۋا ئىسسىق كۈنلىرى، كېسەل تەككەن ئورۇنغا دورا سۈرتۈش-

تىن ئىلگىرى، كېسەل تەككەن ئورۇننى ۋە ئۇنىڭ ئۆپچۆرىسىنى لىزول سۈيى ياكى سوپۇن سۈيى، ئوتۇن-ياغاچ كۈلى سۈيى بىلەن يۇيۇپ، ئاندىن دورا سۈرتۈش لازىم. كېسەل تەككەن جايىنىڭ دائىرىسى چوڭراق بولسا، بىرقانچە بۆلەككە بۆلۈپ دورا سۈرتۈش، ھەر قېتىم دورا سۈرتۈش دائىرىسى بەدەننىڭ $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{4}$ قىسمىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. زەھەرلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ھاۋا ئىسسىق كۈنلىرى ئەتىگەن ۋە كەچتە دورا سۈرتكەن مۇۋاپىق. دورا سۈرتكەندىن كېيىن كاللىنى يام-غۇردا ۋە ئاپتاپتا قالدۇرماسلىق كېرەك. كالا قايتا يۇقۇملانمىسۇن ئۈچۈن، داۋالاپ بولغاندىن كېيىن ئېغىل ۋە جابدۇق-سايما-لارنى دېزىنفېكسىيە قىلىش ۋە قۇرۇتلارنى ئۆلتۈرۈش كېرەك.


سايغاق

بۇ ئوقرا چىۋىنى لىچىنكىلىرىنىڭ كاللىنىڭ تېرە ئاستى توقۇل-مىسىدا پارازىتلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان كېسەللىك بولۇپ، ئۆلكىمىزنىڭ ئوتتۇرا ۋە غەربىي قىسمىدىكى ئوتلاقلاردا كەڭ تارالغان، ئۇنىڭ يەتكۈزىدىغان زىيىنىمۇ خېلى زور. [كېسەللىك قوزغاتقۇچى] كالا ئوقرا چىۋىنى بىلەن سىزىق-لىق ئوقرا چىۋىنى كېسەللىك قوزغاتقۇچىدۇر.

كالا ئوقرا چىۋىنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 13~14 مم كېلىدۇ، رەڭگى قارا، تۈكلىرى قويۇق بولىدۇ. شەكلى ھەسەل ھەرىسىگە

ئوخشاپ كېتىدۇ. لىچىنكىلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 21~28 مم كېلىدۇ، تېنى چوڭ، قوساق تەرىپى ياپىلاق، دۈمبە قىسمى دۆڭ بولىدۇ. ھەرقايسى يېتىلىش مەزگىلىدە، ئۇلارنىڭ رەڭگىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ (ئاق، سۈر سېرىق، بېغىر رەڭ ۋە قارامتۇل بېغىر رەڭ بولىدۇ). تېنى 11 بوغۇملۇق بولىدۇ، ھەر بىر بوغۇمنىڭ ئاستى تەرىپىدە كىچىك تىكىنى بولىدۇ، كەينى تەرىپىدە يېرىم ئايسە-مان قارا رەڭلىك ھاۋا تۆشۈكى بولىدۇ. تۇخۇمنىڭ ئۇزۇنلۇغى 1.1 مم كېلىدۇ، شەكلى ئۇزۇن سوقىچاق، رەڭگى ئاقۇشراق بولىدۇ.

سىزىقلىق ئوقرا چىۋىنىڭ يېتىلگەنلىرى، لىچىنكىلىرى ۋە تۇخۇملىرى كالا ئوقرا چىۋىلىرىنىڭكىگە ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشايدۇ، ئوخشامايدىغان يېرى شۇكى، يېتىلگەن سەل كىچىك بولىدۇ، ئۇزۇنلۇغى 12~13 مملا كېلىدۇ، كۆكرەك، دۈمبە ۋە يان تەرىپىدە قارا سىزىقلىرى بولىدۇ، لىچىنكىسى سۈر سېرىق بولىدۇ، ئاخىرقى بىر بوغۇمىدا تىكىنى بولمايدۇ، تۇخۇمى كىچىكرەك ۋە ساغۇچ ئاق بولىدۇ.



27-رەسىم كالا ئوقرا چىۋىنى

1. تۇخۇمى 2. چىۋىن 3. 3-مەزگىللىك لىچىنكىسى

[يېتىلىش تارىخى] ئوقرا چمۇنى يىلدا بىر قېتىم كۆپىيىدۇ. پۈتكۈل كۆپىيىش جەريانى تۇخۇم، لىچىنكا، قوچاق ۋە يېتىلگەن قۇرۇتتىن ئىبارەت 4 باسقۇچقا بۆلۈنىدۇ.

ئوقرا چمۇنىلىرى يازدا (6~8-ئايلاردا) پەيدا بولىدۇ، ئەركىكى جۈپلەشكەندىن كېيىنلا ئۆلىدۇ. چىشى چمۇنىلار ھاۋا ئوچۇق، شامالسىز كۈنلەردە كالا بەدىنىگە قونۇپ، كاللىنىڭ ئاياق، چات، قوساق قىسىملىرىنىڭ يۇڭ ئارىسىغا تۇخۇملايدۇ. بىر چمۇنى 300~500 دانە تۇخۇم تۇغىدۇ ۋە تۇخۇملاپ بولۇپلا ئۆلىدۇ. يېتىلگەن چمۇنىلارنىڭ ئۆمرى ناھايىتى قىسقا بولىدۇ، ئۇلار ئوزۇق يېمەيدۇ، لىچىنكا ۋاقتىدا پارازىتلاپ توپ-لىغان ئوزۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ ھەركەت قىلىدۇ ۋە كۆپىيىش ئېھتىياجىنى تەمىن ئېتىدۇ.

تۇخۇملار دانە-دانە ياكى تىزىلغان ھالەتتە كاللىنىڭ تۈك-لىرىگە چاپلىشىپ تۇرىدۇ، 3~7 كۈندە 0.5 مم چوڭلۇقتىكى لىچىنكىغا ئايلىنىپ، سانچىغۇچلىرىغا تايىنىپ تۈكنىڭ تۈۋىگە ئورۇنلىشىۋېلىپ، ئاندىن تېرىگە تېشىپ كىرىدۇ. ئاندىن تاشقى نېرۋىلارنى بويلاپ نېرۋىنىڭ سىرتقى پەردە توقۇلمىلىرىغا يۆت-كىلىپ، ئۇ يەردىن يەنە ئۆمۈرتىقىنىڭ تاشقى مايلىق توقۇلمىلىرىغا ئۆتۈپ پارازىتلايدۇ. سىزىقلىق ئوقرا چمۇنى لىچىنكىلىرى بولسا يۇمشاق بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلارنى بويلاپ كىكىرتەك ۋە قىزىل ئۆڭگەچ تەرەپكە مېڭىپ، 60~75 كۈندە كىكىرتەك ۋە قىزىل ئۆڭگەچكە يېتىپ بارىدۇ، قاسراق تاشلىغاندىن كېيىن

دۈمبىگە قاراپ مېڭىپ، 2-يىلى باھاردا دۈمبىگە يېتىپ بارىدۇ. دۈمبە تېرە ئاستىدىكى لىچىنكىلار ئەتىيازدا تېرىدە ھۆرۈك ئىششىقلارنى پەيدا قىلىدۇ ۋە بۇ ئىششىقلارنىڭ ئۈچىدا بارا بارا كىچىك تۆشۈك ئېچىلىدۇ، لىچىنكىلار قۇيرۇغىدىكى نەپەسلىنىش تۆشۈكىنى ھىلىقى ئىششىق تۆشۈكىگە توغرىلاپ نەپەسلىنىدۇ ۋە كېرەكسىز ئاجراتمىلارنى سىرتقا چىقىرىدۇ. دىمەك، لىچىنكىلار كالا تېنىدە 9~11 ئاي پارازىتلايدۇ، ئىششىق ئىچىدە قاسراق تاشلايدۇ، يېتىلىدۇ، 60~75 كۈندە تېرىدىن چىقىپ يەرگە چۈشكەندىن كېيىن قوچاققا ئايلىنىدۇ. قوچاقلار 30~45 كۈندە يېتىلگەن قۇرۇتقا ئايلىنىپ، يەنە ئەۋلات قالدۇرۇشقا باشلايدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] چىشى چىۋىنلار كالسىنى ئايلىنىپ ئۇچۇپ يۈرۈپ تۇخۇملىغاندا، كالا بىئارام بولۇپ پىشقىرىدۇ، تېپىچەكلەيدۇ، قۇيرۇغىنى خادا قىلىپ يۈگۈرەيدۇ، نەتىجىدە نورمال ئوزۇقلىنىشقا تەسر يېتىدۇ، ھەتتا جاراھەتلىنىدۇ ۋە بالا تاشلايدۇ.

لىچىنكىلار تېرە ئاستىدا يۆتكىلىپ يۈرگەندە، ئۆتكۈر سىر-غىتىملىق ياللۇغ پەيدا قىلىدۇ؛ قىزىل ئۆڭگەچتە توختاپ قالسا، قىزىل ئۆڭگەچ ياللۇغىنى پەيدا قىلىدۇ، كالا بىر نەرسە يۇتقاندا بەك ئېھتىيات قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ. لىچىنكىلار كالسىنىڭ دۈمبە قىسمىغا يېتىپ بارغاندا، چەكلىك دائىرىدە قانلىق ئىش-شىق ۋە بىرىكتۈرگۈچى توقۇلما ئىنقىلىراتىنى پەيدا قىلىدۇ.

دە، تېرە سەل تومپىيىپ قالىدۇ، ئىگىز-پەس بولۇپ قالىدۇ، ئاخىردا بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلارنىڭ لىچىنكىلارنى ئورنۇپلىشى تۈپەيلىدىن ياڭاقىتەك چوڭلۇقتىكى تومپاق ئىششىقلار كېلىپ چىقىدۇ. ئارىدىن كۆپ ئۆتمەيلا، لىچىنكىلار تېرىدە 4~7 مم كېلىدىغان تۆشۈكلەرنى پەيدا قىلىدۇ، ئۇنىڭدىن سرغىتمىلىق ياكى يىرىڭلىق ئاجراتىملار ئېقىپ چىقىپ، ئۆپچۆرىدىكى تۈك-لەرگە شىلىمىدەك چاپلىشىپ قالىدۇ. لىچىنكىلار ئاجرىلىپ چىققاندىن كېيىن، ئۇ جايدىكى گۆشلەر ئۆسۈپ، توقۇلمىلار قېلىنلىشىدۇ ۋە تارتۇق بولۇپ ساقىيىدۇ. ئايرىم ئىششىقلارغا باكتېرىيە كىرىۋالغانلىقتىن، ئۇ جاي يىرىڭلاپ ئىشىشىپ قالىدۇ. ئادەتتە، ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەت كۆرۈلمەيدۇ، ئايرىم ئەھۋاللاردا ئۆزگىرىشلىك رېئاكسىيە خاراكتېرىدىكى ھۆل تەمرەتكە يۈز بېرىپ، كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى، جىنسى ئەزا لېۋى ۋە يىلىنلار سۇلۇق ئىشىشىدۇ، قاتتىق قىچىشىش، يۆتىلىش ۋە نەپەس قىسىلىش، يۈرەك سوقۇش ئىتتىكلەش، قېرىن كۆپۈش، ھەتتا بالا تاشلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

ئوقرا، ئاساسەن، سىيىرنىڭ تۇغۇمچانلىغىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ، سۈت بېرىش مىقدارىنى 25%~15 تۆۋەنلىتىدۇ، سۈتنىڭ سۈپىتىنى ناچارلاشتۇرىدۇ؛ بوداق كالىنىڭ ئەت ئېلىشىنى ئاستىلىتىدۇ، گۆشنىڭ سۈپىتىنى ناچارلاشتۇرىدۇ؛ مۇزايىلارنىڭ يېتىلىشىگە توسالغۇ بولىدۇ.

[دېئاگنوز قويۇش] كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە كىلە-

نىكىلىق ئالامەتلەرگە ۋە تېپىلغان قۇرۇتقا قاراپ دىئاگنوز قويۇ-
لىدۇ. لېكىن تۇغۇش جەريانىدا تۇرغان كالىغا بالدۇر دىئاگنوز
قويۇش ھەممىدىن ئەھمىيەتلىك. چەتئەللەر ئىممۇنىت ئۇسۇلى
ئارقىلىق بالدۇر دىئاگنوز قويۇپ ئوبدان ئۈنۈم ھاسىل قىلدى.
بۇ ئۇسۇل تېرىنىڭ ئۆزگىرىش رېئاكسىيىسى، ئاگاردىكى
ياققا كېڭىيىش رېئاكسىيىسى ۋە قىزىل قان دانىچىلىرىنىڭ ۋاس-
تىلىك ئۇيۇش رېئاكسىيىسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

1. دەسلەپكى مەزگىللىك خىمىيىلىك ئالدىنى ئېلىش: بۇ ھەر
يىلى 11~12-ئايلىرىدا بىر قېتىم ئېلىپ بېرىلىپ، كالا تېنىدە
يۆتكىلىپ يۈرگەن لىچىنكىلار ئۆلتۈرۈلىدۇ.

(1) دىپتېرىكس: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن
0.05 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. ياكى ئۇنى ئورگانىك
ئېرىتكۈچلەر، ئىسپىرت ۋە مىنېراللىق مايدا ئېرىتىپ %12~11 لىك
ئېرىتمە تەييارلاپ، كالىنىڭ دۈمبىسىگە چاچسىمۇ بولىدۇ (تەن ئېغىر-
لىقى 150 ك گ دىن تۆۋەن كالىلارغا 15 م ل دىن، تەن ئېغىرلىقى
150 ك گ دىن ئېغىر كالىلارغا 22 م ل دىن چېچىلسا بولىدۇ).
(2) فېنتىيول: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن
5 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ، ياكى ئەسلى مېيى-
دىن مۇسكۇلغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

(3) رۈننېل: كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 0.1 گ
دىن ھىساپلاپ ئېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(4) روگور: روگورنىڭ 50% لىك ئىسپىرتلىق ئېرىتمىسى چوڭ كالىغا 5 م ل دىن، كىچىك كالىغا 2~3 م ل دىن ھىساپلاپ ئېلىپ تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىنىدۇ.

2. ئاخىرقى مەزگىلدە يەككىلىك بويىچە بىر تەرەپ قىلىش: خىمىيىلىك دورىلار بىلەن ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈم بەرمىگەندە، 2-يىلى 3~4-ئايلاردا ئوقرا ئىششىقلىرىغا 2% لىك دىپتېرىكس ئېرىتمىسى، ياكى "666" نىڭ 5% لىك دۇغلۇق ئېرىتمىسى، ياكى 0.35% لىك روگور ئىمۇلسىيىسى سۈركىلىدۇ؛ ياكى بولمىسا ئوقرا ئىششىقلىرى ئىچىدىكى لىچىنكىلارنى سىقىپ چىقىرىپ ئوتتا كۆيدۈرۈۋەتسىمۇ، ياكى قۇرۇت ئۆلتۈرۈش دورىلىرى بىلەن زەھەرلەپ ئۆلتۈرۈۋەتسىمۇ بولىدۇ.

تېلېرىئوز

تېلېرىئوز تېلېرىئا قۇرۇتلىرىنىڭ كالىنىڭ تورسىمان ئىچكى سىستېمىسى ۋە قىزىل قان شارچىلىرىدا پارازىتلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ — خولونبور ئايىمىغىنىڭ قىسمەن جايلىرىدا تارقالغان، ئۆلۈش نىسبىتى يۇقۇرىراق بولغان كېسەللىكتۇر.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] تېلېرىئا قۇرۇتلىرى كۆپ شەكىللىك قۇرۇت بولۇپ، ھەر بىر قىزىل قان شارچىسىدا 10 چە قۇرۇت پارازىتلايدۇ، ئۇلارنىڭ شەكلى ھالقىسىمان، سوقچاق، تاياقسىمان، پەشسىمان ۋە باشقا شەكىللەردە بولىدۇ، ھالقىسى-

مانلىرى كۆپرەك بولىدۇ.

لىمفا تۈگۈنلىرىنىڭ ئىچى ياكى سىرتىدا پارازىتلانغان تېلېرىئا قۇرۇتلىرىنىڭ شەكلى ئانارسىمان بولىدۇ، رەڭگى كۆك بولىدۇ، قارامتۇل قىزىل يادروسى بولىدۇ.

[يېتىلىش تارىخى] تېلېرىئا قۇرۇتلىرىنىڭ يېتىلىش جەريانى جىنسلىق كۆپىيىش ۋە جىنسىسز كۆپىيىش دىگەن ئىككى باسقۇچقا بۆلۈنىدۇ.

جىنسىسز كۆپىيىش باسقۇچى: بۇ جەريان كالا تېنىدە داۋاملىشىدۇ. كانىلار كاللىنىڭ قېنىنى شورىغاندا، ئۇنىڭدىكى



28-رەسىم تېلېرىئا قۇرۇتى

1. ئانارسىمان تەنچە 2. ئانارسىمان تەنچىنىڭ پارچىلىنىشى

3. قىزىل قان ھۈجەيرىسىدىكى قۇرۇتلار

تېلېرىئا قۇرۇتلىرىنىڭ سپورىچا قلىرى كالا بەدىنىگە كىرگەندىن كېيىن، تورسىمان ئىچكى سىستېما (لىمفا تۈگۈنى، تال، جىگەر، بۆرەك قاتارلىقلار) نىڭ ھۈجەيرىلىرىگە ئۆتىدۇ، ئۇلارنىڭ ھەممى شۇ جايدا يوغىنايدۇ، يادروسى كۆپ قېتىم بۆلۈنىدۇ. دە، كۆپ يادرولۇق جىنسىسز كۆپەيگۈچى تەنچىلەر (ئانارسى-

جان تەنچىلەر) شەكىللىنىدۇ. جىنسىسز كۆپەيگۈچى تەنچىلەر پارچىلىنىپ ۋە بۆلۈنۈپ نۇرغۇنلىغان يەككە يادرولۇق قۇرۇتلارغا ئايلىنىدۇ، بۇلار تۇرسىمان ئىچكى سىستېما ھۈجەيرىلىرىگە يېتىۋاشتىن كىرىپ، كۆپ قېتىملاپ، تەكرار ھالدا جىنسىسز كۆپىيىدۇ. ئاخىرىدا، بۇلار ئىككىنچى بىر خىل كۆپ يادرولۇق جىنسىلىق كۆپىيىش تەنچىلىرىگە ئايلىنىدۇ ۋە پارچىلانغاندىن كېيىن قانغا ئۆتۈپ، قىزىل قان شارچىلىرىنىڭ ئىچىدە گامېتا تەنچىسىگە ئايلىنىدۇ. گامېتا تەنچىلىرى ئۆز ئىچىدىن ئەركەك ۋە چىشى گامېتىلارغا ئايرىلىدۇ. دە، قايتا كۆپىيىش ۋە يېتىلىش باسقۇچىغا كىرمەي، كالا بەدىنىدە يېتىلىشنى تاماملايدۇ.

جىنسىلىق كۆپىيىش باسقۇچى: بۇ جەريان كانىننىڭ تېنىدە (ئىككى سانچىغۇچلۇق قارغۇ كانا ياكى پارقىرىما كۆز كانا تېنىدە) داۋاملىشىدۇ. كانىلار قان شورىغاندا، ئىچىدە گامېتا تەنچىلىرى بار قىزىل قان شارچىلىرى كانىننىڭ قوسىغىغا كىرىدۇ ۋە گامېتا تەنچىلىرى قىزىل قان شارچىلىرىدىن چىقىپ، كىچىك (ئەركەك) ۋە چوڭ (چىشى) گامېتىلارغا ئايلىنىدۇ. دە، بۇ ئىككىسى بىرىكىپ زىگوتىغا ھەمدە ھەركەتچان زىگوتىغا ئايلىنىدۇ، ھەركەتچان زىگوتىلار يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا بۆلۈنۈپ ۋە يېتىلىپ سپورىچاقلارغا ئۆزگىرىدۇ. مۇشۇ مەزگىلدە كانىلار كالا قېنىنى شورىغاندا، سپورىچاقلار كالا تېنىگە ئۆتۈپ ئەۋلات قالدۇرۇشقا باشلايدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كالا يۇقۇملىنىپ 9~12 كۈن

ئۆتكەندىن كېيىن كېسەللەندۈ، بۇ كېسەللىك ئۇلار ئۆتكۈر خاراكتېردا ئۆتدۇ، كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرى دەسلەپكى مەزگىللىك، ئوتتۇرا مەزگىللىك ۋە ئاخىرقى مەزگىللىك دەپ 3 باسقۇچقا ئايرىلىدۇ، كېسەللىكنىڭ ئومۇمى جەريانى 20~7 كۈن داۋام قىلىدۇ.

دەسلەپكى مەزگىلىدە: تېلېرىئا قۇرۇتلىرى كالىنىڭ لىمفا تۈگۈنلىرىگە توپلىنىپ كۆپىيىدۇ، نەتىجىدە كالىنىڭ بەدەن ئۈستى لىمفا تۈگۈنلىرى ئىششىدۇ، ئىششىق مۇرە ئالدى ۋە چات چەمبىرىگى لىمفا تۈگۈنلىرىدە روشەن كۆرۈلىدۇ، بۇ جايلارنى باسقاندا، كالا ئاغرىقىسىنىدۇ. كالىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ $39.5 \sim 41.8^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، قىزىتما ئۇزاققىچە قايتمايدۇ.

ئوتتۇرا مەزگىلىدە: قۇرۇتلىار تورسىمان سىستېمىغا كىرىش بىلەن بىرگە قانغا زىيان يەتكۈزۈپ، قان شارچىلىرىنى كۆپ-لەپ بۇزىدۇ ۋە زەھەر چىقىرىدۇ، نەتىجىدە كالىنىڭ قان تومۇر تېمىنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىغى ئېشىپ، قان ئىشلەش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ، ئومۇمى بەدەنلىك ماددا ئالماشتۇرۇش جەريانى توس-قۇنلۇققا ئۇچرايدۇ؛ بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆزلۈكسىز ئۆرلەپ $40 \sim 42^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ ۋە قىزىتما 5~10 كۈنگىچە قايتمايدۇ، روھى ئىنتايىن سۇسلىشىدۇ، ئىشتىي كۆرۈنەرلىك ناچارلايدۇ، بۇرۇن ئەينىگى قۇرۇيدۇ، بۇرۇندىن سۈزۈك سۇيۇقلۇق ئاقىدۇ. كالىنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىلىرى قىزىرىدۇ ۋە سارغىيىدۇ، ئۇنىڭدا

قانلىق چېكىتلەر پەيدا بولىدۇ، كۆزىدىن ياش ئاقىدۇ، كۆرۈش قۇۋۋىتى ناچارلايدۇ، مۈڭگۈز پەردە دۇغلىشىدۇ؛ بەدەن ئۈستى لىمفا تۈگۈنلىرى ئىششۇپرىدۇ؛ ئالدىنقى قېرىزلىرى بوشىشىدۇ، ئىچى سۇرىدۇ، تىزىگىدە شىلىمشىق نەرسەلەر ۋە قان يىمپىچىلىرى بولىدۇ؛ يۈرەك سوقۇشى تېزلىشىدۇ، رىتمىسىز بولىدۇ، نەپەس ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ؛ كالا تېز ئورۇقلايدۇ، مۇسكۇلى تىترەيدىغان، ماڭغاندا دەلدەڭشىيدىغان، كۆپ ياتىدىغان، چىشىنى غۇچۇرلىتىدىغان، ئىنجىقلايدىغان، يەر غاچىدا لايىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

ئاخىرقى مەزگىلىدە: بەدەن تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلەيدۇ، كېسەللىك ئالامەتلىرى يېنىكلەيدۇ، بىرىكتۈرگۈچى پەردىلەر ئاقىرىدۇ، كەمقانلىق كۈچىيىدۇ، ئورۇقلاش ۋە ئاجىزلىشىش بارغانچە ئېغىرلىشىدۇ، كۆپ ساندىكىلىرى ئۆلۈپ قالىدۇ.

[دېئاگنوز قويۇش]

1. قۇرۇت تەكشۈرۈش: بۇ مەزكۇر كېسەلگە دېئاگنوز قويۇشتىكى ئەڭ ئىشەنچلىك ئاساس بولۇپ، بۇنىڭدا نەشتە بىلەن ئېلىنغان قان ياكى لىمفا تۈگۈنى سۇيۇقلۇغى ئەينەك ئۈستىگە قۇيۇلۇپ، قۇرۇتۇلغاندىن كېيىن ياغاچ ئىسپىرتىدا 2~3 مىنۇت تۇرغۇزۇلىدۇ ۋە گىمزا بويىغىدا 20 مىنۇت بويىلىدۇ، ئاندىن يۇيۇپ، قۇرۇتۇپ مىكروسكوپتا تەكشۈرۈلىدۇ. قان سۈرتىمىسىدە تېلېرىئا قۇرۇتلىرى بارلىغى، لىمفا سۇيۇقلۇغى سۈرتىمىسىدە ئانارسىمان تەنچىلەر بارلىغى بىلىنىدۇ.

2. ئۆلۈكنى يېرىپ تەكشۈرۈش: ئۆلۈك ناھايىتى ئورۇق بولىدۇ، شىللىق پەردە ۋە تېرىدە قانلىق داغلار بولغان بولىدۇ. تەن ئۈستى لىمفا تۈگۈنلىرى كۆرۈنەرلىك ئىششىغان، تېرى ئاستىدا سېرىق يىلمىدەك ئىنقىلىرات بولغان بولىدۇ. تال 3-2 ھەسسە يوغانغان، قېپىدا قانلىق چېكىتلەر پەيدا بولغان، تال ماددىسى يۇمشاپ لايدەك بولۇپ قالغان بولىدۇ. جىگەر يوغان پەردىسى سىرتقى پەردىسى قانغان، جىگەر قاپقىغى لىمفا تۈگۈنلىرى ئىششىپ قالغان بولىدۇ. 4- قېرىن ۋە ئۈچەي شىللىق پەردىسى قانغان، ئاققوناق ھەتتا پۇرچاقتەك يارىلار پەيدا بولغان بولىدۇ. ئۈچەي لىمفا تۈگۈنى ئىلىكسىمان زورايغان بولىدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش]

1. كانىنى يوقىتىش:

(1) ئۇلاق-قارا تېنىدىكى كانىلارنى يوقىتىش: سوغاق مەز-گىللەردە ئۇلاقنىڭ دۈمبىسىگە فېنتىئول ياكى "666" پاراشوگى چېچىلىدۇ. ئىسسىق مەزگىللەردە، 1~2% لىك دىپتېرىكس ئېرىتمىسى، ياكى "666" نىڭ 0.05% لىك دۇغلۇق سۇيۇقلۇقى، ياكى 0.06% لىك دىيازىنۇن ئېرىتمىسى ئۇلاقلارنى ئۆلتۈش مەزگىلىدە ھەر 7~14 كۈندە بىر قېتىم پۈركۈلىدۇ. 1~0.5% لىك دىپتېرىكس ئېرىتمىسى ۋە "666" نىڭ 0.05% لىك دۇغلۇق ئېرىتمىسى بىلەن ئۇلاقنى يۇسۇمۇ بولىدۇ. ئۇلاقنى يۇيۇشتا دورا كۆلچىگى بولۇشى لازىم. يېقىندا خولونبور ئايىمىغا چارۋىچى-

لىق- مالدوختۇرلۇق تەتقىقات ئورنى چارۋىلارنى يۇيىدىغان «خولونبۇر - 10» تىپلىق ماشىنىلاشقان يۇيۇش كۆلچىكىنى لايىھىلەپ چىقىپتۇ، ئۇنىڭ ئۈنۈمى ياخشى بولپتۇ، سائىتىگە كالا ۋە ئاتتىن 200~300 تۇياق، چوشقىدىن 800~1000 تۇياق، قويىدىن 1500~2000 تۇياق يۇيۇشقا بولىدىكەن.

(2) ئوتلاقلاردا كانا يوقىتىش: ئوتلاقلاردىن نۆۋەت بىلەن پايدىلانغاندا، كانىنىڭ كېسەل يۇقتۇرۇش نىسبىتىنى تۆۋەنلەت- كىلى بولىدۇ، چارۋىلارنى يېڭى ئوتلاققا كۆچۈرۈشتىن ئىلگىرى، ئۇلارنىڭ بەدىنىدىكى كانىلارنى يوقىتىش لازىم. ئوتلاققا 3% لىك "666" پاراشوگى، 1.5% لىك دىيازىنۇن پاراشوگى، ئاقىر قەرھا بىلەن دىت ئارىلاشمىسى چېچىلىدۇ. ئوتلاقلاردىكى كېرەكسىز ئوت- چۆپ ۋە ئىقتىسادىي قىممىتى يوق چاتقاللارنى يوقىتىش كېرەك. بىنەم يەرلەرگە ئوت قويۇش، زەپكەش چېچىش، غاجىلغۇچىلارنى يوقىتىش چارىلىرىنى قوللىنىش ئار- قىلىق ئوتلاق سۈپىتىنى ياخشىلاش، سۈنئىي ئوتلاق كۆلىمىنى كېڭەيتىش لازىم.

(3) ئېغىل- قوتاندىكى كانىلارنى يوقىتىش: ئېغىلنىڭ تۆشۈك- يوقۇقلىرىغا "666"، دىپتېرىكس ۋە فېنتىيول پاراشوك- لىرىنى چېچىپ، ئاندىن ئۇنى سىمونت، ھاك، سېغىز توپا لېيى بىلەن ئېتىپ تاشلاش كېرەك. ئوقۇر، يەر يۈزى، تام- تۇرۇس ۋە ئاچا- تۈۋرۈكلەرگە قەرەللىك ھالدا كانا يوقىتىش دورىلىرىنى چېچىپ، ئاندىن ئۇنى پاكىز سۇ بىلەن يۇيۇش كېرەك. ئېغىل-

قوتاننى ئافارتقاندا، ھاككا "666" پاراشوتىدىن قوشۇۋېتىش كېرەك.

2. مۇداپىئە ئوكۇلى سېلىش: بۇ كېسەل دائىم كۆرۈلىدىغان رايونلاردا ۋە كېسەل تارقىلىدىغان پەسىللەردە تېلېرىئا قۇرۇت-نىڭ توڭلىتىپ قاتۇرۇلغان ۋاكسىننى كالىنىڭ كاسا مۇسكۇلىغا تىرەن ئوكۇل قىلىش كېرەك.

3. داۋالاش:

(1) ئاسراشنى كۈچەيتىش: كېسەل كالىلارنى ھاۋاسى سالقىن، شاماللىق، قۇرغاق قوتاندا ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقۇرى ۋە ئاسان ھەزىم بولىدىغان يەم-خەشەك بىلەن بېقىش، ئازراق تۇز سېلىنغان ئىلماق سۇدا سۇغىرىپ تۇرۇش لازىم.

(2) كېسەللىك قوزغاتقۇچىنى يوقىتىش يولى بىلەن

داۋالاش:

بېرىنچىل: كالىنىڭ ھەرىكەت تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 3.5~4 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ 7%~3 لىك ئېرىتمە تەييارلىنىپ، مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىندۇ.

ئاكرىفلاۋىن: كالىنىڭ ھەرىكەت تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 3~4 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ 1% لىك ئېرىتمە تەييارلىنىپ، كۆك تومۇرغا ئوكۇل قىلىندۇ.

ناگانىن: كالىنىڭ ھەرىكەت تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 15~20 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ 10% لىك ئېرىتمە تەييارلىنىپ، مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىندۇ.

3- جەدۋەل تېلېرىئوزنى داۋالاش لايىھىسى

دورلار	بېرىنچىل	ئاكرىفلاۋىن	(SM ₂)	ئاگانىن
لايىھە				
1- لايىھە	1، -2، -4، 6-كۈنلىرى	1، -3، -5، 5-كۈنلىرى	4، -5، -6، 6-كۈنلىرى	(—)
2- لايىھە	1، -2، -4، 6-كۈنلىرى	(—)	3، -4، -5، 5-كۈنلىرى	1، -2، -4، 4-كۈنلىرى

تېلېرىئوزغا قارشى دورىلار ئالماشتۇرۇپ قوللىنىلسا تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەن SM₂ كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 4 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ 2% لىك ئېرىتمە تەييارلىنىپ، كۆك تومۇرغا ئوكۇل قىلىندۇ؛ ياكى 10% لىك ئېرىتمە تەييارلىنىپ مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىندۇ.

(3) ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالاش: سۇيۇقلۇق تولۇقلاپ يۈرەك كۈچەيتىلىدۇ، سىلىق سۈرگە دورىسى بېرىلىپ ئۈچەي ھەركىتى رەتكە سېلىنىدۇ، كۆك تومۇرغا ياكى مۇسكۇلغا ۋىتامىن B₁ دىن 50~100 م گ، ۋىتامىن B₁₂ دىن 400~800 م گ ئوكۇل قىلىندۇ، كوبالت خلوئىد كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 1~2 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ ئۇدا 10~12 كۈن ئىچكۈزۈلىدۇ.

تامچە قۇرۇت كېسەللىكى

بۇ كېسەل تۆرەلمە تامچە قۇرۇتتىن كالىنىڭ كۆپىيىش سىستېمىسىدا پارازىتلىشىدىن پەيدا بولىدۇ، كىلىنىكىدا سىيرلار بالا تاشلاش ۋە بوغاز بولماسلىق بىلەن خاراكتىرلىنىدۇ.

[كېسەللىك قوزغات-

قۇچى] تامچە قۇرۇتتىن

شەكلى سوقىچاق، يۇمۇلاق،

ئۇرچۇقسىمان ۋە تاياقسىمان

بولىدۇ؛ ئۇزۇنلۇقى 12~17

مىكرومېتىر، كەڭلىكى 3~10

مىكرومېتىر كېلىدۇ؛ ئالدى

تەرىپىدە بۇرۇت تۈۋى

بولىدۇ، بۇ يەردىن چىققان


4 تال بۇرۇتتىن 3

ئالدىغا، بىرى ھەركەتچان

پەردىنى بويلاپ كەينىگە

چىقىپ تۇرىدۇ. تامچە

قۇرۇتلار مانا مۇشۇ بۇرۇت-



29-رەسىم تامچە قۇرۇت

1. ھەركەتچان پەردىسى

2. پۈۋەكچە ئاغزى

3. ھۈجەيرە يادروسى

4. پۈۋەكچە 5. ئۇزۇنلۇق ئوقى

6. ئىنكەلوزىن 7. قىرى

8. كەينى بۇرۇتى

لىرى ۋە ھەركەتچان پەردىسىنىڭ ياردىمىدە ھەركەتلىنىدۇ. قۇرۇت

تېنىنىڭ ئالدى تەرىپىدە يادروسى بولىدۇ ۋە يادروسىنى بويلىغان

ئۇزۇن ئوقى قۇرۇت تېنىنى ئوڭ - سول ئىككى قىسمىغا ئايرىپ تۇرىدۇ، ئۇزۇن ئوقى قۇرۇت تېنىنىڭ كەينى قىرىدىن تومپىيىپ چىقىپ تۇرىدۇ.

[يېتىلىش تارىخى] تامچە قۇرۇتلار سىپىرنىڭ جىنىسى يولى، بالياتقۇسى ۋە بۇقنىڭ پۆپۈچەك بوشلۇغى، چىۋىسىنىڭ شىللىق پەردىسى ھەم ئۇرۇق يولىدا شىلىمىشقى سۇيۇقلۇق ۋە قىزىل قان دانچىلىرىنى ئۇزۇق قىلىپ ياشايدۇ. ئوتتۇرىسىدىن ئىككىگە بۆلۈنۈش يولى بىلەن كۆپىيىدۇ.

تامچە قۇرۇتلار كالىلارنىڭ چېتىلىشىدىن يۇقىدۇ، بۇقلار - نىڭ ئۇرۇقلىرى، بۇلغانغان ئۇرۇقلاندۇرۇش سايىمانلىرى، تۆشەك چۆپ ۋە بېقىش - باشقۇرۇش سايىمانلىرى ئارقىلىقمۇ يۇقىدۇ. ئۆي چىۋىسىمۇ بۇ كېسەلنى يوقىتىۋېرىدىغان ۋاستە بولۇپ قالىدۇ. [كېسەللىك ئالامەتلىرى] تامچە قۇرۇتلار سىپىر تېنىگە كىرگەندىن كېيىن جىنىسى يول ۋە بالياتقۇ شىللىق پەردىسىدە كۆپىيىپ، جىنىسى يول ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ - دە، سىپىر بىئارام بولىدۇ، قۇيرۇغىنى شىپاڭلىتىپ تۇرىدۇ، كەينىگە قارايدۇ، سىپىرنىڭ جىنىسى يول لېۋى ئىشىشىدۇ. جىنىسى يول شىللىق پەردىلىرى قىزىرىپ قالىدۇ، ئۇنىڭدا ئەسۋە ۋە تېرىقتەك تۈگۈنلەر پەيدا بولىدۇ. بۇ ھال بارغانسېرى بالياتقۇنىڭ ئىچكىرىسىگە قاراپ كېڭىيىپ، بالياتقۇ بويىنى ياللۇغى ۋە بالد - ياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ - دە، جىنىسى يولىدىن شىلىمىشقى سۇيۇقلۇق ۋە يىرنىڭ ئاقىدىغان بولۇپ

قالدۇ. ئۆتكۈر ياللۇغ 20~40 كۈندە سوزۇلما ياللۇغغا ئايلىنىدۇ. كۆپلەش نورماللىقى بۇزۇلىدۇ، ھەتتا سىپىرلار ئۈچمەس يۈزۈپ قالدۇ.

بوغاز سىپىرنىڭ بالىياتقۇسى تامچە قۇرۇتنىڭ كۆپىيىشىگە بەك مۇۋاپىق كېلىدۇ. قۇرۇت تۆرەلىمنىڭ كۆكرەك، قوساق بوشلۇغى ۋە باشقا ئەزالىرىغا ئۆتۈپمۇ ئاۋۇيدىغان بولغاچقا، تۆرەلىمە ئۆلۈش، بالا تاشلاش يۈز بېرىدۇ. بالا تاشلاش، كۆپىنچە، سىپىر بوغاز بولۇپ 1~3 ئاي ئۆتكەندە كۆرۈلىدۇ. بالا تاشلاشتىن بۇرۇن، سىپىرنىڭ جىنىسى يول لېۋى ئىششىپ قالدۇ، ئۇنىڭدىن شىلمىسىمان يىرنىڭ ئاقىدۇ.

بۇقلاردا كېسەللىك ئالامىتى روشەن بولمايدۇ، ئاز ساندىكى بۇقلارنىڭ پۆپۈچىگى ياللۇغلىنىدۇ، سۇلۇق ئىششىيدۇ، ئاغرىيدۇ، چمۇسىدىن شىلمىسىمان يىرنىڭ ئاقىدۇ، ئۇنىڭ شىللىق پەردىسىدە تېرىقتەك تۈگۈنلەر پەيدا بولىدۇ.

[دىئاگنوز قويۇش] بۇ كېسەلنى مېخانىكىلىق بالا تاشلاش، برۇتسېللو ۋە ئادەتتىكى جىنىسى يول ياللۇغى، بالىياتقۇ ياللۇغى قاتارلىقلاردىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن، جىنىسى يول ئاجراتمەلىرىنى، تۆرەلىمنىڭ باش سۈيى، كۆكرەك ۋە قوساق بوشلۇغى سۇيۇقلۇغىنى، پۆپۈچەك ئاجراتمەلىرىنى ئېلىپ، ئۇنىڭدىكى تامچە قۇرۇتلارنى تەكشۈرۈپ كۆرۈش لازىم.

1. تىرىك پېتى تەكشۈرۈش: كېسەللىك ئەۋرىشكىسىنى ئويمان ئەينەك ئۈستىگە تېمىتىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە 1~2 تامچە

فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە تېمىتىپ ۋە ئەينەك ياپقۇچ يېپىپ مىكروسكوپتا تەكشۈرۈلىدۇ. تېمپېراتۇرا $18\sim 20^{\circ}\text{C}$ بولغان شارائىتتا، 400 ھەسسە چوڭايتىدىغان مىكروسكوپتا قاراڭغۇدا تەكشۈرۈلسە، قىمىرلاۋاتقان قۇرۇتلار كۆرۈنىدۇ.

2. بويىپ تەكشۈرۈش: كېسەللىك ئەۋرىشكىسىنى ئەينەك ئۈستىگە سۈرتۈپ، قۇرۇغاندىن كېيىن ئوت يالقۇنغا تۇتۇپ قاتۇرۇپ، كاربولىكلىق فوكسىن ياكى كرىستال رىئولىت بويىغى بىلەن 2~3 مىنۇت بويىلىدۇ، ئاندىن ئۇ يۇيۇلۇپ ۋە قۇرۇتۇلۇپ مىكروسكوپتا تەكشۈرۈلىدۇ. ئۇنى گىمزا بويىغىدا بويىسىمۇ بولىدۇ، بوياش ئۇسۇلى تېلېرىئوز كېسەللىككە دىئاگنوز قويۇشتە كىگە ئوخشاش.

[ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش]

1. تامچە قۇرۇت كېسەللىكى كۆرۈلۈپ باقمىغان كالا خوجۇ-لۇغىدا تۆۋەندىكىدەك تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ:

(1) سۈنئىي ئۇرۇقلاندۇرۇش تېخنىكىسىنى قوللىنىپ ئۇرۇق-لاندۇرغاندا، دېزىنفىكسىيە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش لازىم.
(2) ئۇرۇقلاندۇرۇشقا سېلىنىدىغان بۇقلارنى دائىم تەكشۈرۈپ تۇرۇش، ئۇلارنىڭ ساقلىغىغا كاپالەتلىك قىلىش لازىم.

(3) تولۇقلىنىدىغان كالىلارنى كېسەلدىن خالىي خوجۇلۇقلار-دىن ئېلىپ كېلىش ۋە يۇقۇم تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈش كېرەك.

(4) جىنسى يول ياللۇغى، بالىياتقۇ ياللۇغى ۋە بالا تاشلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە، ۋاقتىدا تەكشۈرۈپ دىئاگنوز قويۇش، ئايرىپ داۋالاش لازىم.

(5) تەبىئىي چېتىلدۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللانغاندا دېزىنفېكسىيە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش لازىم. بۇقىلار بىلەن سىيرلارنى ئايرىپ بېقىش كېرەك.

2. تامچە قۇرۇت كېسەللىكى كۆرۈلگەن كالا خوجۇلۇغىدا تۆۋەندىكىدەك تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ:

(1) كېسەل بۇقىنى ئۇرۇقلاندۇرۇشقا سېلىشقا بولمايدۇ.
(2) سۈنئىي ئۇرۇقلاندۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىش، تەبىئىي چېتىلدۈرۈشنى مەنئى قىلىش لازىم. سۈنئىي ئۇرۇقلاندۇرغاندا دېزىنفېكسىيە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش، قىزىقتۇرغۇچى سىير ئۈچۈن تېنى ساق سىيرنى تاللاش لازىم.

(3) موزايلارنى سۈتتىن ئايرىغاندىن كېيىن چوڭ كالىلاردىن ئايرىپ (ئەركەك - چىشىنىمۇ ئايرىپ) بېقىش لازىم.

(4) بۇقىلار ۋە سىيرلارنى ساغلام، گۇمانلىق ۋە كېسەل دىگەن 3 پادىغا ئايرىش، تۇغۇلغان موزايلارنى پادىدىن ئايرىپ بېقىش، ساغلام ۋە گۇمانلىق سىيرلارنى ساغلام بۇقىنىڭ ئۇرۇغى بىلەن ئۇرۇقلاندۇرۇش لازىم.

3. داۋالاش:

(1) 5~8% لىك ئىختىيول، يود ئېرىتمىسى (يود 1 گ، كالىي يودات 2 گ، پار سۈيى 500 م ل)، 0.1% لىك رىۋانول،

0.03% — 0.01% لىك فۇراتسىللىن ئېرىتمىسى، 0.5% لىك كۈمۈش نىترات ئېرىتمىسى، 5% لىك ناترىي خلورىد ئېرىتمىسى بىلەن جىنسى يولىنى كۈن ئارىلاپ چايقاپ يۇيۇش (5~6 كۈن بىر داۋالاش مۇددىتى قىلىنىدۇ، ئارىدىن 5 كۈن ئۆتكەندە ئىككىنچى داۋالاش مۇددىتى باشلىنىدۇ) لازىم. جايىلىق ئورۇننى بىر تەرەپ قىلىشقا بىرلەشتۈرۈپ، مالىنىڭ ئۆز قېنىنى ئۆزىگە ئۆكۈل قىلىشنىڭ ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ (1-كۈنى 80 م ل، 12-كۈنى 100 م ل، 21-كۈنى 120 م ل ئۆكۈل قىلىنىدۇ).

(2) بۇقىلارغا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار يۇقۇرقىلارغا ئوخشاش. ئاۋال پۆپۈچەك بوشلۇغىنى چايقاپ يۇيۇپ، ئاندىن چىۋىسىنىڭ ئۈچىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، پۆپۈچەكنى ئۇۋۇلاپ، دورىنى كېسەل-لەنگەن جايغا تولۇق تەككۈزۈش لازىم. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كۆك تومۇرغا ناگانىن ئېرىتمىسى كالىنىڭ ھەرك گ تەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 0.05 گ دىن ئېلىنىپ ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

4. ئىچكى كېسەللىكلەر

يۈرەك مۇسكۇلى ياللۇغى

يۈرەك مۇسكۇلىدا چەكلىك ۋە يامرىغاق ياللۇغ ئۆزگىرىش-
نىڭ كۆرۈلۈشى يۈرەك مۇسكۇلى ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ
كېسەللىك جەريانىغا قاراپ ئۆتكۈر تىپ، يېرىم ئۆتكۈر تىپ ۋە
سوزۇلما تىپ دەپ 3 تىپقا بۆلۈنىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئۆتكۈر يۈرەك مۇسكۇلى ياللۇغى
تولاراق بەزى يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرگە ئۇلىنىپ پەيدا بولىدۇ؛
بەزىلىرى پارازىت قۇرۇت كېسەللىكلىرىگە، سىپتىسېمىيىگە،
زەھەرلىك يىرىڭلىق سىپتىسېمىيىگە، ئارسىنىدىن، سىمپتىن،
فوسفۇردىن زەھەرلىنىش كېسەللىكلىرىگە ئۇلىنىپ پەيدا بولىدۇ.
[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەلنىڭ دەسلەپتە يۈرەك
سوقۇش ئىتتىكىلەپ، سوقۇش قېتىمى ئاشىدۇ، ھەركەتلەنگەندىن
كېيىن تېخىمۇ ئىتتىكىلەپ كېتىدۇ، ۋاقتى 2~3 مىنۇتقا سوزۇلىدۇ.
كېسەل ئەھۋالى تېخىمۇ ئېغىرلاشقاندا، يۈرەكنىڭ قىسقىرىش
ھەركىتى ئاجىزلايدۇ، تومۇر سوقۇش تېز ھەم ئاجىز بولىدۇ،
رىتىمى بۇزۇلىدۇ، بەزىدە يۈرەكنىڭ 1-ئاۋازى كۈچىيىدۇ،

تۇتۇق ياكى بۆلۈنۈپ ئاڭلىنىدۇ، 2-ئاۋازى ئاجىزلىشىدۇ.
كېسەلنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىش-
چانلىغى ئاجىزلاپ، يۈرەك ئۆزىدىكى قاننى تولۇق سىقىپ
چىقىرالماس بولۇپ قالىدۇ، يۈرەك قېرىنچىسى قان تولۇش
تۈپەيلىدىن كېڭىيىپ كېتىدۇ. چېكىپ تەكشۈرگەندە، يۈرەكنىڭ
تۇتۇق ئاۋاز دائىرىسىنىڭ كېڭەيگەنلىگى بىلىنىدۇ، تىڭشاپ
تەكشۈرگەندە، قىسقىرىش مەزگىللىك يات ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ.

پۈتۈن بەدەنلىك قان ئايلىنىش توسقۇنلۇغى تۈپەيلىدىن،
بەدەن ئۈستى كۆك تومۇرلىرى كۆپۈپ قالىدۇ، شىللىق پەردە-
لەر كۆكرىپ قالىدۇ، نەپەس قىيىنلىشىدۇ، ئاياقلار ۋە قۇلاق
سوۋۇپ كېتىدۇ. تېرە ئاستى سۇلۇق ئىششىيدۇ ياكى بەدەن
بوشلۇغىغا سۇ يىغىلىپ قالىدۇ.

كېسەللىك جەريانىدا، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئومۇمەن
نورمال بولىدۇ، يۇقۇملۇق كېسەل يۇققاندا تېمپېراتۇرا كۆرۈ-
نەرلىك ئۆزلەيدۇ، روھسىزلىنىش، ئىشتەي ناچارلاش ياكى
تامامەن تۇتۇلۇش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] كېسەل چارۋىنى تىنچلاند-
دۇرۇش، غىدىقلىنىش ۋە ھەركەتلىنىشتىن ساقلاش، ئوزۇقلۇق
ماددىلىرى مول، ئاسان ھەزىم بولىدىغان يەم-خەشەك بىلەن
بېقىش لازىم.

(1) كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە، يۈرەك ھەركىتى
كۈچەيگەن بولغاچقا، يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلارنى بېرىشكە

بولمايدۇ، يۈرەك دائىرىسىگە سوغاق نەرسىنى يېقىش، شارائىت يار بەرسە ئوكسىگېن بېرىش كېرەك.

(2) كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە، قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش ئۈچۈن مۇسكۇلغا ھەر 3 سائەتتە بىر قېتىم كامغوزا مېيىدىن 10 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ، ئۇنىڭ بىلەن ئاز مىقدار-دىكى كوففېينىنى ئالماشتۇرۇپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

(3) يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ خىزمىتىنى ۋە نېرۋىنىڭ خەۋەر يەتكۈزۈش سىستېمىسىنىڭ پائالىيىتىنى ساقلاش ئۈچۈن، كۆك تومۇرغا 50% لىك گلىكوزا ئېرىتمىسىدىن 200~300 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(4) ھەزىم قىلىش توسقۇنلۇققا ئۇچرىغاندا، سىلىق سۈرگە ۋە ھەزىم قىلىشنى ياخشىلىغۇچى دورىلار ئىچكۈزۈلىدۇ.

يۈرەك قېپى ياللىغۇسى

يۈرەكنى قاپلاپ تۇرغۇچى پەردىنىڭ ياللىغۇسى يۈرەك قېپى ياللىغۇسى دەپ ئاتىلىدۇ. غەيرى ماددىلارنىڭ يۈرەك قېپىغا سانچىلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان يۈرەك قېپى ياللىغۇسى يۈرەك قېپىنىڭ جاراھەتلىك ياللىغۇسى دەپ ئاتىلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] كالا ئېچىرقاپ كەتكەندە ئوت-چۆپنى چاينىمايلا يۇتۇۋېتىدۇ-دە، ئوزۇققا ئارىلىشىپ قالغان تۆمۈر مىخ، سىم قاتارلىق ئۇچلۇق نەرسىلەر تورلۇق قېرىن

بىلەن دىئافراگمىدىن ئۆتۈپ يۈرەك قېپىغا سانچىلىدۇ، مانا بۇ—يۈرەك قېپىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغلىنىشىنىڭ ئاساسىي سەۋىيىسى. يۈرەك مۇسكۇلى ياللۇغى، كۆكرەك پەردىسى ياللۇغى ۋە خوشنا ئەزالاردىكى ياللۇغنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىدىنمۇ يۈرەك قېپى ياللۇغلىنىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى ئىشتەي تۇتۇلۇش، روھسىزلىنىش، كۆشەش ئازلاش ياكى توختاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

يۈرەك دائىرىسى ئاغرىغانلىقتىن، كالا ئۆرە تۇرغاندا جەينىگىنى كېرىپ، دۈمچىيىپ، ئارقا ئاياقلىرىنى پەسرەك جايغا قويۇپ تۇرىدۇ؛ بەك ئاۋايلاپ ماڭىدۇ، تېز بۇرۇلمايدۇ، تۆۋەنگە ماڭغاندا قوساق بوشلۇغىدىكى ئەزالار يۈرەك قېپىنى قىسقالىقىتىن، قاتتىق ئاغرىقىسىنىپ ئىنجىقلايدۇ، ياكى ماڭماي تۇرۇۋالىدۇ.

كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى تومۇر تېز ھەم ئاجىز سوقىدۇ، رېتىمىز سوقىدۇ. يۈرەك قېپىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغلىنىش دەسلەپكى مەزگىلىدە بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ ($41\sim 42^{\circ}\text{C}$)، قىزىتما تىپى مۇقىم بولمايدۇ؛ كېيىنكى مەزگىلىدە بەدەن تېمپېراتۇرىسىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ. جاراھەتسىز يۈرەك قېپى ياللۇغلىنىش شۇنداق بولىدۇ. يۈرەك دائىرىسىنى تۇتۇپ تەكشۈرگەندە كالا ئاغرىقىسىنىدۇ، چېكىپ تەكشۈرگەندە تۇتۇق ئاۋاز دائىرىسىنىڭ كېڭەيگەنلىكى بىلىنىدۇ، تىڭشاپ

كۆرگەندە (تالالىق تىنىما بولغان ئەھۋالدا) يۈرەك قېيىنىنىڭ سۈركىلىش ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ. يۈرەك قېيىنىنىڭ ئىچىدە سىر-سىرتىدا سىلار كۆپلەپ يىغىلىپ قالغان بولسا، يۈرەك قىسىلىپ تۇلۇق كېڭىيەلمەيدۇ-دە، پۈتۈن بەدەندىكى كۆك تومۇردا قان تۇرۇپ قالىدۇ، نەپەس بوغۇلىدۇ.

كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە بويۇن كۆك تومۇرى كۆپۈپ كېتىدۇ ۋە ئۇنىڭدا سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ. [ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش] ئادەتتىكى چاغلاردا يەم-خەشەكنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۇچلۇق نەرسىلەرنىڭ ئۇنىڭغا ئارىلىشىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. يېنىك دەرد-جىددىكى جاراھەتسىز يۈرەك قېيى ياللۇغىنى ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالسا بولىدۇ. جاراھەتلىك يۈرەك قېيى ياللۇغىغا باشتا ئانتىبىيوتىك ياكى سۇلفامىدلىق دورىلارنى ئىشلىتىش، زۆرۈر تېپىلغاندا تاشقى ئوپىراتسىيە ئۇسۇلىنى قوللىنىش كېرەك. ساقىيىشتىن ئۈمىت بولمىغانلىرىنى دەرھال سۈيۈۋېتىش كېرەك.

كىكرەتەك ياللۇغى

كىكرەتەك شىللىق پەردىسىنىڭ ياللۇغلىنىشى كىكرەتەك ياللۇغى دىيىلىدۇ. ئۇ قاتتىق يۆتىلىش ۋە كىكرەتەك دائىرىسى سېزىمچان بولۇپ كېتىش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. تولاراق ئەتىياز ۋە كۈز كۈنلىرى پەيدا بولىدۇ، كۆپىنچە ئۆتكۈر

خاراكتىردا ئۆتىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئاساسەن سوغاق تېگىش ۋە خىمىيىۋى، فىزىكىلىق، مېخانىكىلىق غىدىقلىنىشلار سەۋىيىسىدىن پەيدا بولىدۇ. خوشنا ئەزالاردىكى ياللۇغ (بۇرۇن ياللۇغى، يۇتقۇنچاق ياللۇغى، كاناي ياللۇغى) نىڭ يامرىشىدىنمۇ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ئاساسىي ئالامىتى يۆتەل، باشتا سرغىتىملار ئاز بولغاچقا، ئاغرىقىسىنىشلىق قىسقا ۋە قۇرغاق يۆتەل تۇتىدۇ، سرغىتىملار كۆپەيگەندە ئۇزۇلمەي كېلىدىغان ھول يۆتەل تۇتىدۇ. سوغاق تەككەن ۋە قاتتىق ھەركەتلەنگەندە يۆتەل كۈچىيىدۇ، بەزىدە تۇتما خاراكتىرلىق يۆتەل تۇتىدۇ. كىكرتەكنى تۇتۇپ كۆرگەندە، ئۇنىڭ سېزىمچانلىغىنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكى بىلىنىدۇ، ئۇدا يۆتەل تۇتىدۇ. يۆتەلگەندە بۇرۇندىن سۇلۇق، شىلىمشىق ياكى يىرىك ئارىلاش ماڭقا ئاقىدۇ، كىكرتەكنى تىڭشاپ كۆرگەندە، سرغىتىملار سۇيۇق بولسا، خور-خور قىلغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ؛ سرغىتىملار قويۇق بولسا، قۇرغاق خىرىلدىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ؛ كىكرتەك ئىشىپ بەك تارىيىپ قالغان بولسا، ئىسقىرتقان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ ھەمدە بويۇننى سوزۇپ تۇرۇش، نەپەس ئالالماي قېلىش ھەتتا تۇنجۇقۇپ قېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ.

كىكرتەك ياللۇغى سوزۇلما خاراكتىرغا ئايلانغاندا، ئۇنىڭ ئالامەتلىرى ئۆتكۈر خاراكتىردىكىگە ئوخشاش بولىدۇ، لېكىن يۆتىلىش قاتتىق بولمايدۇ، ھەركەتلەنگەندىلا يۆتەل كۈچىيىدۇ

ۋە نەپەس توسقۇنلۇغى ئۇزاققا داۋام قىلىدۇ.
[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] سوغاققا چىداشلىق بېرىش
مەشقىنى كۈچەيتىش، سوغاق تېگىپ زۇكام بولۇشتىن ساقلىنىش
قوتانىنىڭ ھاۋاسىنى يېڭىلاپ تۇرۇشقا ۋە قوتان تازىلىغىغا
ئەھمىيەت بېرىش، كىكرتەك شىللىق پەردىسىنىڭ مېخانىكىلىق
زەخمىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

(1) ئۆتكۈر تىپىدا يۇتقۇنچاق قىسمىغا سوغاق نەرسە يېقە-
لىدۇ، ياكى ياللۇغ قايتۇرۇش دورىسى چىپىلىدۇ.
(2) ياللۇغ ئېغىرلاشقان ۋە ئومۇمى بەدەنلىك ئۆزگىرىش
كۆرۈلگەندە، سۇلغامىدلىق ۋە ئانتىبىيوتىك دورىلار بىلەن
داۋالىنىدۇ.

(3) سوزۇلما تىپىدا كىكرتەك قىسمىغا ئىسسىق ھول لاتا
قويۇلىدۇ، شۇنداقلا 20% لىك كىرىئولىن ئېرىتمىسى ياكى 2% لىك
ئىسكىپىدار ئېرىتمىسى پارلاندۇرۇپ پۇركۇلىدۇ.

(4) ئاجراتمىلار قويۇق بولغان، ئاسانلىقچە ئاجرىلىپ
چىقمىغاندا، 8~15 گ ئاممونىي خلورىد، ياكى 30~50 گ
ناترىي ھىدروكاربونات ئىچكۈزۈلىدۇ.

(5) قۇرۇق يۆتەل كۆپ بولسا، ئاجراتمىلار كۆپ بولمىسا،
مۇرەككەپ چۈچۈكبۇيا ياسالسىمى ياكى كەرمان تىنىك تۇرىسى
ئىشلىتىلىدۇ.

(6) نەپەس قاتتىق قىسىلىپ، تۇنجۇقۇش خەۋپى تۇغۇلغان-
دا، شۇ زامات كانايىنى يېرىپ نەپەسلەندۈرۈش لازىم.

(7) جۇڭىي دورىلىرىدىن ئىسسىقنى قايتۇرۇپ، زەھەر ياندۇرىدىغان، يۆتەلنى توختىتىپ، ئىششىقنى يوقىتىدىغان دورىلار ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

جۈمۈ، سوغۇگۈل، قالىقانگۈل، رەۋەن، چۈچۈكبۇيا،
جىڭجىي گۈلى، شاتارى، ئاچچىق تاۋۇز، چۈەنجۈڭ،
تازىلانغان شور -

بۇلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ قوشۇپ، يۇمشاق سوققاندىن كېيىن، ھەر قېتىمدا 3~4 سەردىن ئىچكۈزۈلىدۇ (ئىچكۈزۈش ئالدىدا قايناق سۇ بىلەن چايقاپ، سوۋۇغاندىن كېيىن 4 سەل ھەسەل قوشۇۋېتىلىدۇ).

كانايچە ياللۇغى

كانايچە ياللۇغى كانايچە شىللىق پەردىسى يۈزىنىڭ ياللۇغى بولۇپ، يۆتىلىش ۋە نەپەس قىسىلىش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. كۆپىنچە ئەتىياز ۋە كۈزدە ھاۋا كۆپ ئۆزگىرىدىغان چاغلاردا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] سوغاق تېگىش ۋە زۇكام بولۇش بۇ كېسەللىكنىڭ ئاساسىي سەۋىيىسىدۇر. خىمىيىلىك ۋە فىزىكىلىق غىدىقلاشلار، مەسىلەن، چاڭ - توزاڭ ۋە غىدىقلىغۇچى گازنىڭ كانايغا كىرىشى، ياكى دورا ئىچكۈزگەندە كانايغا كېتىپ قېلىشى

سەۋىيىدىن ئاسانلا كانايچە ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ. ئۆپكە
كېسەللىكلىرى ۋە يۇقۇرقى نەپەس يولى ياللۇغىنىڭ يامرىشىد
دىنمۇ كانايچە ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ئۆتكۈر تىپىدا ئاساسەن يۆتلىش
ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. دەسلەپتە ئاغرىقسىزلىق قۇرۇق ۋە
قىسقا يۆتەل تۇتىدۇ، كېيىن ئۇ ياللۇغلۇق سرغىتىلارنىڭ
چىقىشىغا ئەگىشىپ ھۆل يۆتەلگە ئۆزگىرىدۇ، ئاغرىقسىزلىق
يەڭگىلەيدۇ، بەزىدە بەلغەم چىقىدۇ. بۇرۇندىن باشتا سۇيۇق،
كېيىن شىلىمشىق ياكى يىرىڭلىق ماڭقا ئاقىدۇ. كۆكرەكنى
تىڭشاپ كۆرگەندە، قۇرۇق خىرىلداش ياكى ھۆل خىرىلداش
ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ. ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلىر يەڭگىل،
تېمپېراتۇرا نورمال ياكى سەل يۇقۇرى بولىدۇ، نەپەس
ئىتتىكىلىشىدۇ. كېسەللىك ئەۋج ئېلىپ كانايچىلار ياللۇغلانغاندا
ئومۇمىي بەدەنلىك كېسەللىك ئالامىتى خېلى ئېغىرلايدۇ، تېم-
پېراتۇرا $37.5^{\circ}\text{C} \sim 38.5^{\circ}\text{C}$ ئۆرلەيدۇ، ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، كۆزنىڭ
بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى كۆكرىدۇ، تومۇر سوقۇش ئىتتىكىلەيدۇ،
نەپەس قىيىنلىشىدۇ، كاللىنىڭ ئاغزى ئېچىلىپ، تىلى ساڭگىلايد-
دۇ. كۆكرەكنى تىڭشاپ كۆرگەندە، ئۆپكە پۈۋەكچىلىرى ئاۋاز-
نىڭ كۈچىيىپ قالغانلىقى بىلىنىدۇ، سۇ كۆپۈكچىلىرى ئاۋازى
ئاڭلىنىدۇ. كۆكرەكنى چېكىپ تەكشۈرگەندە خېلى نورمال
يۇقۇرى ئاۋاز چىقىدۇ، ئۆپكە پاسىلى كېڭەيگەنلىكى بىلىنىدۇ.
سوزۇلما تىپىدا كۆپىنچە قۇرۇق يۆتەل تۇتىدۇ، بۇ ھال

ئەتىگەندە ياكى كېچىدە ھاۋا تېمپېراتۇرىسى نۆۋەتلىگەن چاغدا روشەن كۆرۈلىدۇ، ھاۋا توساتتىن ئۆزگەرگەندە تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ، بۇرۇندىن ماڭقا ئاقىدۇ، نەپەس قىسىلىدۇ، كۆكرەك دائىرىسىدىن قۇرغاق خىرىلىدىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] ئېغىل - قوتانىنى ئىسسىق، پاكىز، قۇرغاق تۇتۇش، شامالدىتىپ تۇرۇش، غىدىقلىغۇچى گازنىڭ كىرىشىدىن ساقلىنىش، كۆكرەگەن ۋە چاڭ - توزاڭ ئارىلاشقان يەم - خەشەكنى كالىغا قەتئى بەرمەسلىك كېرەك.

(1) ياللۇغنى قايتۇرۇش: 1 مىليون بىرلىك پېنتىسىلدىن ياكى سترېپتومىتسىن 15~20 م ل پار سۈيىدە ئېرىتىلىپ كانايغا ئاستا ئوكۇل قىلىپ كىرگۈزۈلىدۇ، كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 5 كۈن داۋالاش بىر قارار داۋالاش بولىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلىگەن، ئومۇمى بەدەنلىك ئالامەتلەر ئېغىرراق بولغان بولسا، سۇلفامىدلىق ياكى ئانتىبىيوتىك دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

(2) بەلغەمنى ھەيدەپ، يۆتەلنى توختىتىش: يۆتەل كۆپ، سرغىتمىلار قويۇق بولۇپ، بەلغەم ئاسانلىقچە چىقمىغاندا، بەلغەم بوشاققۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ؛ نەپەس قىسىلغاندا، مۇسكۇلغا ئامىنوفىلىن 1~2 گ دىن كۈندە 1 قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(3) يۈرەك ئاجىزلاشقاندا، 20% لىك كوففېين 10~20 م ل دىن مۇسكۇلغا ھەر كۈنى بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(4) ئۆتكۈر كانايچە ياللۇغنى جۇڭىي دورىلىرىدىن يۆتەلنى توختاتقۇچى، سوغاقنى ھەيدىگۈچى، بەلغەمنى يوشاتقۇچى دورىلار بىلەن داۋالسىمۇ بولىدۇ.

رېتسېپ:

قوڭغۇراقگۈل 8 مىسقال، جىڭجېي گۈلى 6 مىسقال،
يۇلتۇزگۈل 8 مىسقال، بەيىۇ يىلتىزى 8 مىسقال،
بەيچىيەن 8 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 5 مىسقال، سېرىق
جۈيزە پوستى 6 مىسقال، كەۋرەك 8 مىسقال
بۇلارنى سوقۇپ قايناق سۇغا چىلاپ، سوۋۇغاندا ئىچكۈزۈلىدۇ.

كانەيچە - ئۆپكە ياللۇغى

بۇ تولاراق ئۆپكەنىڭ بىر ياپراقچىسىدا ياكى بىر مۇنچە ياپراقچىلىرىدا كۆرۈلىدىغان ياللۇغ بولغاچقا، ئۆپكە ياپراقچىسى ياللۇغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ كۆپىنچە كانەيچە ياكى ئىنچىكە كانايچىلار شىلىق پەردىسى بىلەن ئۆپكە ياپراقچىلىرى بىرلا ۋاقىتتا كېسەللەنگەنلىكتىن كېلىپ چىقىدىغان بولغاچقا، كانەيچە - ئۆپكە ياللۇغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۆلكىمىزدە بۇ كېسەللەك باش ئەتىياز ۋە كەچ كۈزدە تېنى ئاجىز ۋە قېرى كالىلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللەك سەۋىيىسى] سوغاق، نەملىك، زۇكام تەسىرىدىن، باش ئەتىياز ۋە كەچ كۈزدە ھاۋا كۆپ ئۆزگىرىدىغان چاغدا

ئاسان پەيدا بولىدۇ. غىدىقلىغۇچى گازنى سۈمۈرۈۋېلىش، بېقىش-باشقۇرۇش مۇۋاپىق بولماسلىق تۈپەيلىدىن، ئۆپكە ياللۇغىنى پەيدا قىلىدىغان شارچە باكتېرىيىلەر ۋە باشقا كېسەللىك قوزغاتقۇچىلار بەدەنگە كىرىۋېلىپ، بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەبچى بولىدۇ. بىر قىسىم يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر، ياكى پارازىت قۇرۇت كېسەللىكلىرى، مەسلەن، ئاقسىل، ئاكتىنومىكوز، ئۆپكە قىل قۇرۇت كېسەللىكىگە ئۇلىنىپمۇ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] دەسلەۋىدە ئۆتكۈر كانايچە ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كېسەلنىڭ ئەۋج ئېلىشىغا ئەگەشپ، روھسىزلىنىش، ئىشتەيى ناچارلاش ياكى پۈتۈنلەي تۇتۇلۇش، ئارىلاشما نەپەس قىسىلىش، نەپەس ئىتتىكلەش (مىنۇتغا 40~100 قېتىمغا يېتىدۇ)، شىلىق پەردىلەرگە قان چۈشۈپ كۆكرىش، تومۇر سوقۇش ئىتتىكلەش (مىنۇتغا 60~100 قېتىمغا بارىدۇ)، سېغىن سىيىرنىڭ سۈت مىقدارى ئازلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ 41°C ~ 40°C دىن ئېشىپ، دولقۇنسىمان قىزىتما كۆرۈلىدۇ، يۆتەل تۇتىدۇ، بۇرۇن ۋە كانايچە ئاجراتمىلىرى كۆپىيىدۇ.

دەسلەپتە قۇرغاق، ئاغرىق سىنىشلىق يۆتەل تۇتىدۇ، كېيىن ئۇ ھۆل يۆتەلگە ئايلىنىدۇ. يۆتەلگەندە ئاجراتمىلار چىقىدۇ، شىلىمىش قانغا كۆپرەك بولىدۇ.

كۆكرەكنى تىڭشاپ كۆرگەندە قۇرغاق خىرىلىدىغان ياكى
ھۆل خىرىلىدىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. ئۆپكە پۈۋەكچىلىرى ياكى
كانايچىلار سرغىتىملار بىلەن تولۇپ كەتكەندە، پۈۋەكچىلەر
ئاۋازى يوقىلىدۇ، بەزىدە كانايچىلاردىن نەپەس ئاۋازى ئاڭلى-
نىدۇ. باشقا ساق جايلاردىكى پۈۋەكچىلەر ئاۋازىنىڭ كۈچەي-
گەنلىكى بىلىنىدۇ.

كۆكرەكنى چېكىپ تەكشۈرگەندە، كۆپىنچە، ئاغرىق ۋە
يۆتەل قوزغىلىدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش داۋالاش]

(1) ياللۇغنى قايتۇرۇش: سۇلفاتىئازول باشتا 30~40 گ
دىن، كېيىن 15~20 گ دىن ھەر 8~12 سائەتتە بىر قېتىم
ئىچكۈزۈلىدۇ؛ ياكى 10% لىك ناترىي سۇلفاتىئازول 80~150
م ل دىن ھەر 8~12 سائەتتە بىر قېتىم كۆك تومۇرغا ئوكۇل
قىلىنىدۇ؛ ياكى پېنتسىلىن 60~120 تۈمەن بىرلىكتىن ھەر
8~12 سائەتتە بىر قېتىم مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنىسىمۇ بولىدۇ.
كېسەللىك ئېغىر بولسا، پېنتسىلىندىن 1 مىليون بىرلىكنى 5%
لىك گلىكوزىلىق تۇز ئېرىتمىسىدە (500 م ل) ئېرىتىپ، كۆك
تومۇرغا ئاستا ئوكۇل قىلسا ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. ياكى
بولمىسا، سترېپتومىتسىن بىلەن پېنتسىلىننى قوشۇپ ئىشلەت-
سىمۇ بولىدۇ، ئۈنۈم بەرمىسە، تېتراسىكلىن كۆك تومۇرغا
ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(2) ياللۇغلىق سرغىتىملارنىڭ چىقىشىنى توساش ۋە

شۈمۈرۈلۈشنى ئىلگىرىلىتىش ئۈچۈن كۆك تومۇرغا 10% لىك كالتسىي خلورىد ئېرىتمىسى 100 م ل دىن كۈندە 1 قېتىم ئوكۇل قىلىندۇ.

(3) جۇڭىي دورىلىرى بىلەن داۋالاشتا تۆۋەندىكى رېتسېپلەر تاللاپ قوللىنىلدى.

رېتسېپ:

چېكىلەنگەن چاكاندا 5 مىسقال، ئۇرۇك مېغىزى 1.5 سەر،

گەج 3 مىسقال، ئۇچقات 2 سەر، ليەنچياۋ 1.5 سەر،

قالقانگۈل 1 سەر، چۈچۈكبۇيا 5 مىسقال

بۇلارنى سوقۇپ قايناق سۇغا چىلاپ، سوۋۇغاندا ئىچ-كۈزۈلدى.

رېتسېپ:

تەڭگە يوپۇرماق 1 سەر، مۇۋەببەلسىپت 8 مىسقال، مۇر-

چۇبا 5 مىسقال، كەۋرەك 4 مىسقال، زىسۇ يوپۇرمىغى

5 مىسقال، چاكاندا 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 3 مىسقال

بۇلارنى سوقۇپ قايناق سۇغا چىلاپ، سوۋۇغاندا 2 سەر ھەسەل قوشۇپ ئىچكۈزۈلدى.

ئېغىز ياللۇغى

ئېغىز شىللىق پەردىسىنىڭ ياللۇغى ئېغىز ياللۇغى دىيىلىدۇ، بۇ تىل جاراھىتى، ئېغىز جاراھىتى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. كىلىنىكىدا كاتارلىق، قاپارتىمىلىق ۋە يارا، خاراكتىرلىق ئېغىز ياللۇغى

كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] كاتارلىق ئېغىز ياللۇغى ئاساسەن مېخانىكىلىق زەخمىلىنىش، خىمىيىۋى دورىلار تەرىپىدىن غىدىقلىنىش ۋە فىزىكىلىق غىدىقلىنىش تۈپەيلىدىن پەيدا بولىدۇ. قاپارتمىلىق ئېغىز ياللۇغى تولاراق كۆكرەتمە باكتېرىيە (كېرىبوكلار) نىڭ تەسىرىدىن كېلىپ چىقىدۇ، يەنىدە جاراھەتلىك يۇقۇملىنىش تۈپەيلىدىن كاتارلىق ئېغىز ياللۇغى بىلەن بىللە كۆرۈلىدۇ. يارا خاراكتىرلىق ئېغىز ياللۇغى كۆپىنچە باشقا ئېغىز ياللۇغلىرى بىلەن بىللە كۆرۈلىدۇ. ئېغىز بوشلۇغىنىڭ تازا بولماسلىقى، كېسەللىك قوزغاتقۇچى مىكرو ئورگانىزىملارنىڭ يۇقىشمۇ بۇ كېسەللىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەزىم قىلىش توسقۇنلۇغى، كىكرتەك ياللۇغى ۋە بىر قىسىم يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر (مەسىلەن، كالا ۋاباسى، ئاقسىل) دىن كېيىنمۇ ئېغىز ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى]

كاتارلىق ئېغىز ياللۇغىدا: ئېغىز شىلىق پەردىسىنىڭ سېزىمچانلىقى ئېشىپ كېتىدۇ. كالا ئوت يىگەندە ناھايىتى ئاۋايلاپ چاينايدۇ، ياللۇغ ئېغىر بولسا ئوزۇق يىمەيدۇ. ئېغىز بوشلۇغىنى تەكشۈرگەندە چەكلىك ۋە يامىرىغاق قىزىرىش، ئىشش، قىزىپ ئاغرىش ئالامەتلىرى بارلىقى بىلىنىدۇ، تىل يۈزى سۈر ئاق، سۈر سېرىق ياكى ماش رەڭگەز باغلاپ كەتكەن بولىدۇ، ئېغىزدىن سېسىق پۇراق كېلىدۇ. ياللۇغ تەسىرىدىن

ئېغىز بوشلۇقى نەملىشىپ قالدۇ ۋە كۆپلەپ شال ئېقىپ تۇرىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى، تومۇر سوقۇش، نەپەس ئېلىش ئادەتتە نورمال بولىدۇ.

قاپارتمىلىق ئېغىز ياللۇغىدا: كاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈل-
گەندىن باشقا، بەدەن تېمپېراتۇرىسى سەل ئۆرلەيدۇ، كالىپۇك،
جاۋغاي، تىل، چىش مىلكى قاتارلىق ئورۇنلاردا ئىچىدە سۈزۈك
ياكى سېرىق سۇيۇقلۇق بولغان ھەر خىل چوڭلۇقتىكى قاپارتمىلار
كۆرۈلىدۇ. 3~4 كۈندىن كېيىن قاپارتمىلار يېرىلىپ، ئېنىق
قىزىرىپ قالىدۇ.

يارا خاراكتېرلىق ئېغىز ياللۇغىدا: شىللىق پەردە ئاغرىيدۇ،
كالا ئوزۇق چايناشتا قىيىنلىدۇ، ئوزۇق يىمەي تۇرۇۋالىدۇ،
ھەزىم قىلىش توسقۇنلۇقى كۆرۈلىدۇ، ئېغىز بوشلۇغىنى
تەكشۈرگەندە ھەر خىل چوڭلۇقتىكى شەلۋەرگەن جاراھەتلەر
بارلىقى بىلىنىدۇ. تىلنىڭ ئارقا تەرىپىدە يارا بولىدۇ.

(ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش)

(1) ئېغىز بوشلۇغىنى يۇيۇش: كېسىلى يېنىكرەكلىرىنىڭ
ئېغىز بوشلۇغىنى پاكىز سۇ بىلەن ياكى %3~2 لىك تۇز سۈيى
ياكى %2 لىك بور كىسلاتاسى سۇيۇقلۇقى بىلەن يۇيۇش كېرەك.
سېسىق پۇراق بولسا، %0.1 لىك مارگانىسوپ سۈيى بىلەن
يۇيۇش لازىم. شال كۆپىيىپ كەتسە، ئاۋال ئادەتتىكى سۇدا
يۇيۇپ، كەينىدىن %2~1 لىك زەمچە ياكى تاننىن سۇيۇقلۇقى
بىلەن يۇيۇش لازىم. ئېغىز شىللىق پەردىسى بىلەن تىل

ئۈستى شەلۋەرىگەن ياكى يارىلانغان بولسا، دېرىنغىكىسىدە ئېرىتە-
مىلىرى بىلەن يۇغاندىن كېيىن، يارىغا يود گىلتىپىرىن، ياكى
10% لىك سۇلفانىلامىد-گىلتىپىرىن ئىمۇلسىيىسى ياكى گىلتىپىرىن
ۋىئولېت قاتارلىقلارنى سۈرتۈش كېرەك.

(2) ھەزىم قىلىش ناچارلاشقاندا ھەزىم قىلىشنى ياخشى-
لىغۇچى دورىلار ئىچكۈزۈلىدۇ. كېسەللىك ئېغىر بولسا ۋە
يۇقۇملانغان ئەھۋالى كۆرۈلسە، ئەھۋالغا قاراپ ئانتىبىيوتىك
دورىلار بىلەن ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاش كېرەك.

(3) جۇڭگىيى دورىلىرى بىلەن داۋالاش: جۇڭگىيى مال
دوختۇرلىغىنىڭ قارشىچە، ئېغىز ياللۇغى يۈرەك جىڭلوسغا يىغىل-
غان ئىسسىقنىڭ تىلغا تېپىپ چىقىشى ئارقىسىدا كېلىپ چىقىدۇ،
بۇنى داۋالاشتا يۈرەكتىكى ئوت ئىسسىقنى قايتۇرۇش، ئىششىقنى
ياندۇرۇش، ئاغرىقنى توختىتىش ئاساس قىلىنىدۇ. بۇنىڭ
ئۈچۈن ياللۇق قايتۇرۇش دورىسى ئىچكۈزۈلىدۇ، سىرتتىن
ھىندى ئۆسۈمىسى دورىسى چېپىلىدۇ (ئاقسىل كېسىلىنى داۋالاشقا
قاراڭ)، جاراھەتكە مامۇرانچىن-بورنېئول دورىسىنى سەپسىمۇ
بولىدۇ.

رېتسېپ:

رەۋەن 8 مىسقال، جىزمۇ 8 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 5 مىسقال،
تازىلانغان شور 2 سەر، مامۇرانچىن 8 مىسقال، قالقانگۈل 7 مىسقال،
شاتارى 7 مىسقال، لىيەنچياۋ 7 مىسقال، ئاچچىق تاۋۇز يىلتىزى
تالقىنى 7 مىسقال، يالىپۇز 4 مىسقال، خۇاڭجۈ قوۋزىغى 6 مىسقال

بۇلار سوقۇپ تالقان قىلىنىپ ۋە قايناق سۇغا چىلىنىپ،
سوۋۇغاندا ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

مامۇرانچىن 2 مىسقال، بورنىئۇل 2 فۇڭ، دانىكا 2 فۇڭ
بۇلار سوقۇپ تالقان قىلىنىپ ئېغىزغا پۇركۈلىدۇ.
(4) يىگىنە سانچىپ داۋالاش: تىل ئاستى (جىرگەن)،
دامەي، شەنگېن پەللىلىرىگە يىگىنە سانچىلىدۇ.

قىزىل ئۆڭگەچ توسىلىپ قېلىش

قىزىل ئۆڭگەچ توسىلىپ قېلىش ئوت-چۆپ تۇرۇپ قېلىش
دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ئۇ قىزىل ئۆڭگەچكە يەم-خەشەك ۋە غەيرى
نەرسىلەر تىقىلىپ قىلىپ تۆۋەنگە ماڭمايدىغان كېسەللىك بولۇپ،
كىلىنىكىدا يۇتۇش قىيىنلىقى، شال ئېقىش، ياندۇرۇش، چوڭ
قېرىن كۆپۈش قاتارلىقلار بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ.

(كېسەللىك سەۋىيىسى) بۇ، ئاساسەن، ئوزۇقنى ئىتتىك
يىمىش، بەك ئىتتىك يۇتۇش، قىزىل ئۆڭگەچكە ئوت-چۆپ،
تۈگىنەك يىلتىز (تۇرۇپ، ياڭيۇ، قىزىلچا قاتارلىقلارنىڭ
يىلتىزى) ياكى غەيرى نەرسىلەر تۇرۇپ قېلىش سەۋىيىسىدىن
كېلىپ چىقىدۇ.

قىزىل ئۆڭگەچ پالەچ بولۇش، تارتىشىپ قېلىش، تارىيىپ
كېتىش ئارقىسىدىمۇ قىزىل ئۆڭگەچ ئاسانلا توسىلىپ قالىدۇ.

(كېسەللىك ئالامەتلىرى) كالا تولاراق ئۇشتۇمۇتلا ئوزۇق يېمەي تۇرۇۋالىدۇ، ئاغزىنى ئېچىپ تۇرىدۇ، كېلىنى قاقىدۇ، بويىنى سوزىدۇ. قىزىل ئۆڭگەچنىڭ يۇقۇرقى قىسمى توسىلىپ قالغاندا، باشتا شال ئاقىدۇ ۋە قوساق كۆپىدۇ. يۆتىلىش، چاپناش، قۇسۇش ۋە قۇرۇق يۇتۇش ئالامەتلىرى كۆپ بولىدۇ. تۇتۇپ كۆرۈلسە، قولغا غەيرى ماددا بارلىقى بىلىنىدۇ، كالا ئاغرىقسىنىدۇ. كۆكرەك قىسمىدىكى قىزىل ئۆڭگەچكە نەرسە تۇرۇپ قالغاندا، قوساق كۆپۈش تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ، بەزىدە كالا ئاز-تولا ئوت يەيدۇ، سۇ ئىچىدۇ، ئەمما ئىچكەن سۈيى بۇرىندىن يېنىپ چىقىدۇ. توسىلىپ قالغان جاينىڭ يۇقۇرقى قىسمىغا شال يىغىلىپ قالغاندا، ئۇنى باسقاندا مىلىقلايدۇ، ئۇنىڭغا ئاشقازان كانىلى سالغاندا، كانال بويلاپ شىلمىسىمان كۆپۈك ئېقىپ چىقىدۇ، كالا قاتتىق ئاغرىقسىنىدۇ. ئەگەر ۋاقتىدا داۋالىمىسا، كالا كۆپ ھاللاردا قوساق كۆپۈش بىلەن بىللە تۇنجۇقۇپ قېلىپ ئۆلىدۇ.

(ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش)

- (1) ئۆتكۈر قوساق كۆپۈشنى توختىتىش ئۈچۈن چوڭ قېرىنغا يىڭىنە سانچىپ (كاۋاك يىڭىنە) گاز قويۇۋېتىلىدۇ، قىزىل ئۆڭگەچكە تۇرۇپ قالغان نەرسە چۈشۈپ كەتكەندىن كېيىن يىڭىنە تارتىۋېلىنىدۇ.
- (2) بويۇن قىسمىدىكى قىزىل ئۆڭگەچ توسىلىپ قالغاندا، ئاۋال قىزىل ئۆڭگەچكە 100~200 م ل ئۆسۈملۈك مېيى

كىرگۈزۈلۈپ، قىزىل ئۆڭگەچكە تۇرۇپ قالغان نەرسە ئىككى قول بىلەن ئاستا ئىتتىرىلىپ يۇتقۇنچاققا كەلتۈرۈلىدۇ، ئاندىن قول سېلىپ تارتىۋېلىنىدۇ. بۇنىڭغا بىرلەشتۈرۈپ، %3 لىك تۈز كىسلاتاسىلىق پىلوكارپىندىن تېرە ئاستىغا 3 م ل ئوكۇل قىلىپ ئىچكى ئاجراتمىلارنى كۆپەيتىپ، قىزىل ئۆڭگەچنىڭ قىسقارغان پەيتىدىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ قالغان نەرسىنى قېرىنغا ماڭدۇرۇۋەتە سىمۇ بولىدۇ.

(3) تۇرۇپ قالغان نەرسىنى سىرتماقلاپ ئېلىش: 3 مېتىرچە كېلىدىغان 8-نومۇرلۇق سىمىنى 2~3 قات قىلىپ تولغاپ بۇرۇم-سىمان قىلىسىز، باش تەرىپىنى تۇرۇپ قالغان نەرسىدىن يوغان-راق قىلىپ يۇمۇلاق سىرتماق قىلىسىز، ئاندىن كالىنىڭ بۇرىندىن تۇتۇۋېلىپ، كالىنىڭ ئاغزىغا ئېغىز ئاچقۇچ سېلىپ قويۇپ، مىلىقى سىم سىرتماقنى قىزىل ئۆڭگەچكە كىرگۈزۈپ، تۇرۇپ قالغان نەرسىنى پەم بىلەن سىرتماقلاپ (بۇ چاغدا ياردەمچى خادىم سىرتتىن ماسلىشىپ تۇرۇپ قالغان نەرسىنى تۇتۇپ تۇرىدۇ) ئاستا-ئاستا تارتىپ چىقىرىۋالىسىز. ئۇچلۇق ياكى قىرلىق نەرسىلەر تۇرۇپ قالغاندا، قىزىل ئۆڭگەچنى يېرىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ.

چوڭ قېرىنغا ئوزۇق تىقىلىش

بۇ چوڭ قېرىن ئوزۇق بىلەن تولۇپ كېتىپ، يوغىناپ

كېتىپ، قېرىن ھەركىتى بۇزۇلغان بىر خىل كېسەللىك بولۇپ،
تولاراق ئېغىلدا بېقىلىدىغان كالىلاردا كۆرۈلىدۇ. (كېسەللىك سەۋىيىسى)
ياكى ئاسان كۆپىدىغان يەم-خەشەكلەرنى ھەددىدىن زىيادە
يىگۈزۈش، ئېچىرقاپ كەتكەندە بەك تويغۇزۇۋېتىش، قاتتىق ۋە
يىرىك ئوت-چۆپ بىلەن بېقىۋېتىپ، ئۇشتۇمۇتلا يەم-بوغۇز
بېرىش، كۆپ يىگۈزۈش ۋە يىگەن ئوزۇق ھەزىم بولماسلىق
سەۋىيىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشىشى، قېرىن فۇنكسىيىسىنىڭ
ئاجىزلاپ كېتىشى ئارقىسىدىمۇ چوڭ قېرىنغا ئوزۇق تەقىلىپ
قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ئىشتەي، كۆشەش ناچارلايدۇ.
قوساق دائىرىسى يوغاناپ، سول ئاچ بېقىن كۆپۈپ كېتىدۇ. چوڭ
قېرىن قولغا تومپاق بىلىنىدۇ، مۇشتۇم بىلەن باسسا قالدىغان
ئىز تەستە ئەسلىگە قايتىدۇ. چېكىپ كۆرۈلسە چوڭ قېرىندىن
تۇتۇق ئاۋاز چىقىدۇ، شىرنىلىق ۋە ئاسان كۆپىدىغان ئوزۇقلارنى
يىگەنلىكتىن پەيدا بولغان ئوزۇق تەقىلىشتا، چوڭ قېرىننى
باسسا قولغا يۇمشاق بىلىنىدۇ، چېكىپ كۆرۈلسە يېرىم تۇتۇق
ئاۋاز چىقىدۇ. تىڭشاپ كۆرۈلسە چوڭ قېرىندىن بوش لۇمۇل-
دىگەن ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ، ھەتتا تامامەن ئاڭلانمايدۇ، بەزى كېسەل
كالىلاردا قوساق ئاغرىقى كۆرۈلىدۇ.

ئېغىر كېسەللەنگەنلىرىدە ئىشتەي تۇتۇلۇش، بۇرۇن ئەينىگى

قۇرۇش، نەپەس قىسىلىش، شىلىق پەردىلەر كۆكرىش،
تومۇر سوقۇش ئىتتىكلەش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، باشقا قوشۇلما
كېسەللىك كۆرۈلمەيدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئادەتتە نورمال
بولىدۇ.

كېسەلنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە كالا ئاجىزلاپ، ئاياقلىرىنىڭ
ماغدۇرى قالمايدۇ، تىترەيدۇ، دەلدەڭشىپ ماڭىدۇ، بەزىدە
بېھۇش ھالەتتە ياتىدۇ، سېغىن ئىنەكنىڭ سۈتى ئازلاپ كېتىدۇ،
ھەتتا توختايدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] ئوزۇقلارنى تەڭشەپ بېرىش،
يەۋاتقان ئوزۇقنى بىردىنلا يەڭگۈشلىمەسلىك، لايىغىدا
ئىشلىتىش. ھەركەتلەندۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىش بىلەن، بۇ
كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش ياكى ئۇنى ئازايتىش مۇمكىن.

(1) ئوزۇق بىلەن داۋالاش: 2~3 كۈن ئاچ قالدۇرۇلىدۇ،
قاندۇرۇپ سۇغىرىلىدۇ، كېيىن ئاسان ھەزىم بولىدىغان يۇمشاق
ئوزۇق بىلەن بېقىلىدۇ.

(2) ئۇۋۇلاپ داۋالاش: سۇغىرىلغاندىن كېيىن چوڭ قېرىن
ساھەسى كۈندە بىرنەچچە قېتىم، ھەر قېتىمدا 10~15 مىنۇت
ئۇۋۇلاپ تۇرۇلسا، چوڭ قېرىننىڭ ھەركەت فۇنكسىيىسىنىڭ
ئەسلىگە كېلىشىگە ياردەمى بولىدۇ.

(3) يىڭنە سانچىپ داۋالاش: تولاراق پىيۇي، سەنگۈەن،
چېڭجياڭ، سۇچى، لىۋمەي، بەيخۇي پەللىلىرىگە يىڭنە
سانچىلىدۇ.

(4) چوڭ قېرىن ھەركىتىنى قوزغاش ۋە قېرىنىدا تۇرۇپ قالغان ماددىلارنى چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن چوڭ قېرىن ھەركىتىنى قوزغىغۇچى دورىلار ۋە سۈرگە دورىلىرى بېرىلىدۇ. كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۈرگە دورىلىرىدىن (ناترىي) ماگنىي سۇلفات ھەر قېتىمدا 500~800 گ، ئابدېمىلىك يېغى 300~500 م ل، سۇيۇق پارافىن 500~2000 م ل، ئۆسۈملۈك يېغى 1~2 چىڭ بېرىلىدۇ.

چوڭ قېرىننى قوزغاتقۇچى دورىلاردىن سۈرمە-كالىي تارتىرات (قۇستۇرۇش تېشى) ھەر قېتىمدا 8~10 گ ئىچكۈزۈلۈپ، كېسەل مال ئاجىزلاپ كەتكەن ياكى ئۆچەي-قېرىن ياللۇغى ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن بولسا بۇ دورىنى بېرىشكە بولمايدۇ. ياكى پىلوكارپىن ھەر قېتىمدا تېرە ئاستىغا 0.06~0.08 گ ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئۆپكەسى ۋە يۈرىكى ساق بولمىغان ۋە بوغاز بولۇپ قالغان مالغا بۇ دورىلارنى بېرىش مەنىسى قىلىنىدۇ.

چوڭ قېرىن ھەركىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن 10% لىك ناترىي خلورىد ئېرىتمىسىدىن كۆك تومۇرغا 300~500 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.

قوساق كۆپكەندە، چوڭ قېرىنغا يىڭنە سانچىپ يەل چىقىرىدۇ ۋېتىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىلىلە ئېچىشنى باسقۇچى دورىلار ئىچكۈزۈلىدۇ.

يۈرەك ئاجىزلىغان ۋە زەھەرلىنىش كۆرۈلگەندە 5% لىك

گلىكوزىلىق تۇز ئېرىتمىسىدىن ياكى فېزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىسىدىن كۆك تومۇرغا 1000~3000 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ (بۇنىڭغا 0.5% لىك كامفورا سۈيىدىن 20 م ل، ياكى 20% لىك كوفېيىندىن 20 م ل قوشۇلىدۇ).

كېسەللىك جەريانىدا بولۇپمۇ كېسەلنىڭ ئەسلىگە كېلىش مەزگىلىدە قوزغاتقۇچى ۋە ھەزىم قىلىشنى ياخشىلىغۇچى دورىلارنى قوشۇپ ئىشلەتسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

(5) جۇڭگىي دورىلىرى بىلەن داۋالاش: ئىشتەينى ئېچىپ، ھەزىم قىلىشنى ياخشىلاش، ئوزۇقنى سىڭدۈرۈپ، يەل ماڭغۇ-زۇشنى ئاساس قىلىپ، تۆۋەندىكى رېتسېپ بويىچە دورا بېرىلىدۇ.

رېتسېپ:

خۇپۇ 7 مىسقال، جىرشى 2 سەر، دولانە 2 سەر، ھەزىم ئېچىتقۇسى 1 سەر، ئارپا ئۇندۇرمىسى 2 سەر، يۇمۇلاق قاقىلە 4 مىسقال، سېرىق جۈيزە پوستى 8 مىسقال، سېپارى 6 مىسقال، سەرخس 5 مىسقال، ئۇياۋ 5 مىسقال، بەيجۇ 5 مىسقال، رەۋەن 1 سەر، تازىلانغان شور 4 مىسقال

بۇلار سوقۇپ تالىقان قىلىنىدۇ ۋە قايناق سۇغا چىلاپ سوۋۇغاندا ئىچكۈزۈلىدۇ.

(6) يۇقۇرقى داۋالاش ئۇسۇللىرى ئۈنۈم بەرمىسە، چوڭ قېرىننى يېرىپ، ئىچىدە تۇرۇپ قالغان نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىش كېرەك.

چوڭ قېرىن كۆپۈش

چوڭ قېرىننىڭ كۆپۈشى گازلىق كۆپۈش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدا چوڭ قېرىنغا تېزلا كۆپلەپ گاز يىغىلىپ، قېرىن يوغاناپ كېتىدۇ. بۇ ھال تولاراق يازدا ئوتلىتىپ بېقىلغان كالا ۋە قويىلاردا كۆرۈلىدۇ، ئۆشكىلەردە ئاز بولىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] بۇ، ئاساسەن، كالا ئوڭاي ئېچىدىغان يەم-خەشەكلەر (كۆك چۆپ، بىدە، تۈگىنەك يىلتىزلىق چۆپ، پۇرچاق ئاتىلىسىدىكى ئۆسۈملۈكلەر) نى كۆپ يىگەنلىكتىن، قېرىندا ناھايىتى تېزلا كۆپلەپ گاز پەيدا بولۇش نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدۇ. يامغۇردىن كېيىن شەبنەم تەككەن كۆك چۆپلەر (بولۇپمۇ پۇرچاق ئاتىلىسىدىكى ئۆسۈملۈكلەر) نى يەپ ياكى كۆكرىپ سۈپىتى ئۆزگەركەن يەم-خەشەكلەرنى يەۋېلىپ، ئارقىدىنلا سۇ ئىچىش ئارقىسىدىمۇ پەيدا بولىدۇ. ئۇزاق مەزگىل قوتاندا بېقىلغان كالىلارنى بىردىنلا ئوتلاققا ئېلىپ چىقىپ بېقىشتىنمۇ پەيدا بولۇپ قالىدۇ.

ئوزۇقلاندۇرۇپلا ئىشلىتىش، قىزىل ئۆڭگەچىنىڭ توسىلىپ قېلىشى ۋە ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشىشىغا ئۇلىنىپمۇ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] باشلانما خاراكتېرلىق چوڭ قېرىن كۆپۈش، كۆپىنچە، ئوزۇقلىنىپ كۆپ ئۆتمەيلا پەيدا بولىدۇ.

قوساق دائىرىسى يوغاناپ قالدۇ، ئاچ بېقىن تومپىيىپ قالدۇ، بولۇپمۇ سول ياقنىڭ كۆپۈشى كۆرۈنەرلىك بولدى. ئىشتەي ۋە كۆشەش توختايدۇ، كالا قوسىغى ئاغرىپ بىئارام بولدى، قوسىغىنى تېپىدۇ ياكى پات-پات قوسىغىغا قارايدۇ.

چوڭ قېرىن تۇتۇپ كۆرۈلسە، ئۇنىڭ چىڭقىلىپ قالغانلىغى، ئەۋرىشىملىكى ئاشقانلىغى بىلىنىدۇ، تۇتقان جايدا ئىز قالمايدۇ. چېكىپ كۆرۈلسە، ئۇنىڭدىن دۇمباق ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ، تىڭشاپ كۆرۈلسە، ئۇنىڭ لۆمۈلدەش ئاۋازى ئاجىز ئاڭلىنىدۇ ياكى ئاڭلانمايدۇ. چوڭ قېرىن بەك كۆپۈپ كەتكەنلىكتىن، دىئافراگما ئالدىغا سىلجىغانلىقتىن ئۆپكە، يۈرەك بېسىلىدۇ-دە، نەپەس ئېلىش ۋە قان ئايلىنىش توسقۇنلۇغى كېلىپ چىقىدۇ، نەپەس قىسىلىدۇ، شىللىق پەردىلەر كۆكرىدۇ، تومۇر سوقۇش تېزلىيدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئادەتتە نورمال بولىدۇ. كېسەل ئېغىرلاش-قاندا كالا ئاغزىنى ئېچىپ تۇرىدۇ، ئاغزىدىن شال ئاقىدۇ، تىلىنى سوزۇپ ھۆكمرەيدۇ، قويماي يېتىۋالىدۇ، كۆپىنچە تۇنجۇقۇپ ياكى يۈرەك پالەچلىنىپ ئۆلىدۇ.

ئۆلانما خاراكتىرلىق چوڭ قېرىن كۆپۈشتە، كېسەللىك ئالامەتلىرى باشلانما خاراكتىرلىق چوڭ قېرىن كۆپۈش ئالامەتلىرىگە ئاساسەن ئوخشاش بولىدۇ، كېسەللىك ئالامەتلىرى ئارىلاپ-ئارىلاپ كۆرۈلىدۇ، ئاستا تەرەققى قىلىدۇ.

(ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش) ئەتىيازدا كۆك چۆپ بىلەن بەك كۆپ باقماسلىق، بولۇپمۇ يېڭىدىن ئوتلاققا ئېلىپ چىقىلغان

كاملارنى ئوتلىستىش ۋاقتىنى تەدرىجىي ئۆزگەرتىش، شەرىپلىق ياكى ئاسان كۆپىدىغان يەم-خەشەكلەرنى يېگۈرۈپلا بولماق ماسلىق كېرەك.

(1) كېسەللىك ئېغىر بولسا، چوڭ قېرىنغا شۇ زاماتلا يىگنە سانچىپ، قېرىن ئىچىدىكى گاز چىقىرىۋېتىلىدۇ. گاز چىقىرىلغاندىن كېيىن يىگنە قېيى ئارقىلىق قېرىنغا ئېچىشقا قارشى دورا قۇيۇلىدۇ. كۆپ ئىشلىتىلىدىغان دورىلاردىن سۈت كىسلاتاسى 30~20 م ل، لىزول 20~30 م ل، ئىسكىپىدار 30~50 م ل ئىشلىتىدۇ.

(2) 30~50 م ل ئىسكىپىدارنى، ياكى 30~50 م ل خۇش-پۇراق ئاممونىيا ئىسپىرتىنى 300~500 م ل ئابدېمىلىك مېيغا قوشۇپ بىر قېتىم ئىچكۈزۈلسە، قېرىندىكى ئېچىتقۇلار تازىلىنىدۇ.

(3) چوڭ قېرىن ھەركىتىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن 8~10 گ سۈرمە-كالىي تارتىرات، ياكى 10~20 م ل كۈچۈلا تىنىكتۇرسى ئىچكۈزۈلىدۇ، بۇنىڭغا بىرلەشتۈرۈپ كۆك تومۇرغا 10% لىك ناترىي خلورىد ئېرىتمىسىدىن 500~1000 م ل ئوكۇل قىلىنسا ئۈنۈمى تېخىمۇ ئوبدان بولىدۇ.

(4) يۈرەك فۇنكسىيىسىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن كوفېين ياكى كامفورا مۇسكۇلغا بىر يوللا 20 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(5) جۇڭىيى دورىلىرىدىن يەل ماڭغۇزىدىغان، ئوزۇقنى سىڭدۈرىدىغان، ئۈچەينى راۋانلاشتۇرىدىغان دورىلار بىرقەدەر

ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

رېتسېپ:

تۈرۈپ ئۇرۇغى 3 سەر، جۇچياۋ 1 سەر، تازىلانغان شور

4 سەر، رەۋەن 2 سەر، سۇدى ھىندى 8 مىسقال، خۇپۇ

8 مىسقال، كۆك جۈيزە پوستى 1 سەر، مۇتۇك 6 مىسقال،

كۆك سېغىز 2 سەر

بۇلار سوقۇپ تالقان قىلىنىپ بېرىلىدۇ.

(6) يىگنە سانچىپ داۋالاش: سۇچى، شۇنچى، شەنگېن،

شۈيىن، پىيۈ قاتارلىق پەللىلەرگە يىگنە سانچىلىدۇ.

ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشىشىپ قېلىشى

بۇ، تال-قېرىن ئاجىزلىغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ ئالدىنقى

قېرىنلارنىڭ قوزغىلىشى ۋە قىسقىرىشچانلىغىنىڭ تۆۋەنلىشى

بىلەن خاراكتېرلىنىدىغانلىقتىن، ئالدىنقى قېرىنلار فۇنكسىيىسىدە

سىنىڭ يېتەرسىزلىكى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئوزۇق سۈپىتى ناچار بولۇش، ئاسان

ھەزىم بولمايدىغان يىرىك ياكى قاتتىق ئوزۇق بىلەن ئوزاق

مەزگىل بېقىش، يەم-خەشەك بىرلا خىل بولۇپ قېلىش ئارقىدە

سىدا ئالدىنقى قېرىنلار فۇنكسىيىسىنىڭ ئاجىزلاپ كېتىشى

بۇ كېسەللىكنىڭ ئاساسىي سەۋىيىسىدۇر.

ئوزۇقلاندۇرۇشتا نورما ۋە قەرەل بولماسلىغى، ئوزۇق

تۈرنى تۇيۇقسىز ئۆزگەرتىۋېتىش تۈپەيلىدىن ئالدىنقى قېرىندەلارنىڭ پائالىيىتى بۇزۇلىدۇ.

ھەددىدىن زىيادە ئىشلىتىش، ھەركەتلىنىدۇرۇش كىيىم بولۇش، چوڭ قېرىن ھەركىتىنىڭ سۇسلىشىپ كېتىشىمۇ بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەپ بولىدۇ.

بۇ كېسەللىك كۆپىنچە چوڭ قېرىنغا ئۇزۇق تىقىلىش، قوساق كۆپۈش، چىش كېسەللىكلىرى ۋە زەھەرلىنىش قاتارلىقلارغا ئۇلىنىپ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كالا روھسىزلىنىدۇ، چىشىنى غۇچۇرلىتىدۇ. كالىنىڭ بۇرۇن ئەينىكى قۇرۇيدۇ، ئىشتىي تۇتۇلىدۇ، كۆشى ئازلايدۇ، سۈت مىقدارى كېمىيىدۇ ياكى سۈتى توختايدۇ. چوڭ قېرىن تۇتۇپ كۆرۈلسە، يۇمشاق، جانسىز بىلىنىدۇ، بېسىپ كۆرۈلسە ئىز قالمايدۇ؛ تىڭشاپ كۆرۈلسە لۆمۈلدەگەن ئاۋاز بوش ئاڭلىنىدۇ، كېيىنچە يوقىلىدۇ، تىزەك قۇرغاق بولىدۇ. قېرىنغا ئاسانلا گاز تولىدۇ. چوڭ قېرىندىكى ئېچىغان ئۇزۇقلار ئۈچەيگە ئۆتكەندىن كېيىن ئۈچەي ياللۇغى پەيدا بولۇپ، ئىچى سۈرۈش، قەۋزىيەت بىلەن ئىچى سۈرۈش ئالمىشىپ كۆرۈلىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى، تومۇر سوقۇش، نەپەس ئېلىش قاتارلىقلاردا باشتا روشەن ئۆزگىرىش كۆرۈلمەيدۇ، كېيىنكى مەزگىلدە كالا يېتىۋالمايدىغان بولۇپ قالىدۇ، كالىنىڭ تومۇرى تېز ۋە ئاستا سوقىدۇ. ئارقىدىنلا چوڭ قېرىن كۆپىيىدۇ، نەپەس قىسىلىدۇ. كېسەللىك جەريانى

سوزۇلغانسىرى، كالىنىڭ تۈكلىرى رەتسىزلىشىدۇ. كۆزى ئولتۇرۇشىدۇ، كالا بارا-بارا جۈدەيدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) چوڭ قېرىن ھەركىتىنى كۈچەيتىش، ئىشتەينى ئېچىش، كۆشەشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تۆۋەندىكى رېتسپىلار بويىچە دورا بېرىلىدۇ.

رېتسپى:

جىنتيانا تىنىكتۇرسى 30~50، سۇيۇق تۇز كىسلاتاسى

10~30، كۈچۈلا تىنىكتۇرسى 10~25، ئىسپىرت 50~60

بۇلار ئارىلاشتۇرۇلۇپ بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسپى:

كۈچۈلا تىنىكتۇرسى 15~25، ئاقچەشكى تىنىكتۇرسى 30،

جىنتيانا تىنىكتۇرسى 30

بۇلار ئارىلاشتۇرۇلۇپ بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ.

جىنتيانا پاراشوگى 40 گ، سۈنئى تۇز 100 گ، كۈچۈلا

تىنىكتۇرسى 25 م ل، ئىلمان سۇ 1000 م ل. بۇلارنى ئارىلاش-

تۇرۇپ بىر يوللا ئىچكۈزۈسۈمۇ؛ ياكى 2 جىڭ ئاچچىقسۇغا 2

سەر تۇز قوشۇپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇ بىلەن ئىچكۈزۈسۈمۇ

بولىدۇ. ئالدىنقى قېرىنلار ئوڭشالماس دەرىجىدە بوشاپ كەت-

كەندە، تېرە ئاستىغا 3% لىك تۇز كىسلاتاسىلىق پىلوكارپىندىن

2~4 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(2) ئۇچەي-قېرىندىكى نەرسىلەرنى تازىلاش، ئۇنىڭ

ئېچىشنى بېسىش ئۈچۈن سىلىق سۈرگە دورىلىرى ۋە ئېچىشنى باسقۇچى دورىلار ئىچكۈزۈلىدۇ.

(3) يۈرەك ئاجىزلاپ قالغاندا، يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلار

ياكى 10% لىك ناترىي خلورىد ئېرىتمىسىدىن 300~500 مىللىلىق ئېلىپ، 10% لىك كوففېيندىن 10~20 مىللىلىق ئېلىپ، ئىككىسىنى ئارىلاشتۇرۇپ، كۈندە بىر قېتىمدىن كۆك تومۇرغا ئۈكۈل قىلىنسا، ئۈنۈمى ياخشىراق بولىدۇ.

(4) ئاشقازان - تال خىزمىتىنى ياخشىلىغۇچى دورىلار ۋە

تۇرۇپ قالغان ئوزۇقلارنى سىڭدۈرگۈچى دورىلار ئىچكۈزۈلىدۇ.
رېتسېپ:

قان تېپەر 1 سەر، كەترا 1 سەر، بەيجۇ 8 مىسقال،

چۈپچىنى 1 سەر، ياۋا كەشمىر 6 مىسقال، كۆك جۈيزە

پوستى 4 مىسقال، قۇستە 5 مىسقال، خۇيۇ 5 مىسقال،

چۈچۈكبۇيا 4 مىسقال، ساڭجۇ 5 مىسقال، جۇچياۋ 1 سەر،

ھەزىم ئېچىتقۇسى 1 سەر، سىپارى 6 مىسقال

بۇلار سوقۇپ تالىقان قىلىنىدۇ ۋە قايناق سۇغا چىلاپ

سوۋۇغاندا ئىچكۈزۈلىدۇ.

توققۇز تورلۇقنىڭ توسىلىپ قېلىشى

بۇ توققۇز تورلۇقنىڭ تىقىلىشى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ تولراق

قىش ئاخىرى، باش ئەتىيازدا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىۋى] قۇم - توپا ئارىلىشىپ قالغان ئۇزۇق بىلەن ئۇزاق مۇددەت بېقىش، قاندۇرۇپ سۇغارماسلىق بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى ئاساسىي سەۋەپ ھېسابلىنىدۇ. ھەددىدىن زىيادە ئىشلىتىش، ئۇسسۇز قېلىش، ئېچىرقاش، ماغ-دۇرسىزلىنىش، قېرىندا سۇيۇقلۇق كەم بولۇش، قېرىندىكى ئۇزۇقنىڭ نورمال سىگمە سىلىگىمۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى مۇھىم ئامىللار ھېسابلىنىدۇ.

بۇ كېسەللىك ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشىشى، چوڭ قېرىنغا ئۇزۇق تىقىلىش، تۇغۇت پالچى ۋە باشقا قىزىتمىلىق كېسەل-لەرگە ئۇلىنىپمۇ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] باشتا ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشى-شىدا كۆرۈلىدىغان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، روھسىزلىنىش، ئىشتەي-تۇتۇلۇش، كۆشەش ناچارلاش، كۈندىن-كۈنگە تۈكلىرى پوي-پىلىشىش، جۈدەش، بۇرۇن ئەينىكى يېرىلىش، قوساق تارتىلىش، تىزەك ئازلاش، قۇرغاقلىشىش ياكى كەلمەسلىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بەزىدە كالا قوسىغىغا قاراپ تۇرىدۇ، كالنىڭ قوسىغى بوش ئاغرىيدۇ، تۇتۇپ ۋە چېكىپ كۆرۈلسە، كالا ئاغرىقسىنىدۇ. تىڭشاپ كۆرۈلسە، قوساقنىڭ لۈمۈلدەش ئاۋازى بوش ئاڭلىنىدۇ ياكى ئاڭلانمايدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى، نەپەس ئېلىش، تومۇر سوقۇش جەھەتلەردە ئۆزگىرىش بولمايدۇ. توققۇز تورلۇققا يىڭنە سانچىپ كۆرۈلسە، ئىچىدىكى نەرسىلەر قاتتىق بىلىنىدۇ. ئەگەر توققۇز تورلۇقتا نېكروزلىنىش كۆرۈلسە ياكى سېپتىسىمىيە

يۈز بەرسە، ئومۇمى بەدەنلىك كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.
[ئالدىنى ئېلىش داۋالاش]

(1) توققۇز تورلۇقنىڭ فونكتسىيىسىنى قوزغاش ئۈچۈن 5~10 گ قۇستۇرۇش تېشىغا مۇۋاپىق مىقداردا سۇ قوشۇپ ئىچكۈزۈلدى. ياكى 0.1% لىك كاربامىل خولىن تېرە ئاستىغا 3~4 م ل دىن كۈندە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. ياكى كۆك تومۇرغا 10% لىك ناترىي خلورىد ئېرىتمىسىدىن 500 م ل ياكى 5% لىك گلىكوزىلىق تۇز سۈيىدىن 1000~2000 م ل ئوكۇل قىلىنىپ بولىدۇ.

(2) قېرىندىكى نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن ماگنىي (ناترىي) سۇلفاتىنى 500~800 گ، سۇيۇق پارافىندىن 1000~2000 م ل، ئۆسۈملۈك مېيىدىن 1~2 جىڭ تەييارلاپ، بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ. كېسەلى ئېغىرلىرىغا 25% لىك ماگنىي سۇلفات ئېرىتمىسىدىن توققۇز تورلۇققا 250~300 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.
(3) جۇڭگىي دورىلىرى بىلەن داۋالاش: ئىسسىقنى ھەيدەش ۋە تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكى دورا ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

رەۋەن 2 سەر، تازىلانغان شور 4 سەر، كۆك سېغىز 3 سەر، سۈتلۈك ئوت 1 سەر، داڭگۈي 1.5 سەر، ياۋا كەشمىر 1.5 سەر، گەج 3 سەر، سېرىق جۈيزە پوستى 5 مىسقال، ساڭجۇ 5 مىسقال، ھەشقىپچەك ئۇرۇغى 1.5 سەر، چۈچۈكبۇيا 5 مىسقال، جىرچياۋ 1.5 سەر، خۇبۇ 5 مىسقال

بۇلار تالقان قىلىنغاندىن كېيىن يېرىم جىڭ چوشقا مېيى فوشۇلىدۇ، ئاندىن سۇ قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ بىر يولسلا ئىچكىۋ-ۈزلىدۇ. بۇ دورا ئۇدا بىرنەچچە بولاق ئىچكىۈزۈلىدۇ.

تورلۇق قېرىنىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغى

ئوزۇققا ئارىلىشىپ قالغان ئۇچلۇق مېتال نەرسىلەرنىڭ تور-لۇق قېرىنغا سانچىلىشى بىلەن، تورلۇق قېرىن تېمىدا پەيدا بولغان ياللۇغ تورلۇق قېرىنىنىڭ جاراھەتلىك ياللۇغى دىيىلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئوزۇققا ئارىلىشىپ قالغان قاتتىق نەرسىلەر، بولۇپمۇ ئۇچلۇق مېتال نەرسىلەر (تۆمۈر مىخ، سىم قاتارلىقلار) نىڭ تورلۇق قېرىن تېمىغا سانچىلىشى بۇ كېسەللىك-نىڭ پەيدا بولۇشىدىكى ئاساسىي سەۋەپتۇر.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] باشتا تولاراق ئالدىنقى قېرىنلار-نىڭ بوشىشىدا كۆرۈلىدىغان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. كالا روھسىز-لىنىدۇ، كالىنىڭ ئىشتىيى ناچارلايدۇ، ياكى تامامەن تۇتۇلىدۇ، كۆشىشى ئاستىلايدۇ، ياكى توختايدۇ، بۇرۇن ئەينىگى قۇرۇيدۇ، كالا چىشىنى غۇچۇرلىتىدۇ، ئىنچىقلايدۇ.

چوڭ قېرىنىنىڭ لۆمۈلىدىگەن ئاۋازى ئاجىزلايدۇ، قېتىم سانى ئازلايدۇ ھەمدە چوڭ قېرىنىنىڭ سوزۇلما گازلىق كۆپۈشى كۆرۈ-لىدۇ.

كېسەل كالىنىڭ ھەركەت ۋە تۇرقى غەيرىلىشىپ قالىدۇ، كالا ئۆرە تۇرغاندا جەينىڭنى كېرىپ تۇرىدۇ، كۆپىنچە ئالدى پۇتىنى ئىگىز، ئارقا پۇتىنى پەس يەرگە قويغاندەك تۇرىدۇ. ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ. ياتقاندا ئاستا ياتىدۇ، ئاۋال ئارقا گەۋدە-سىنى يەرگە قويۇۋېلىپ ياتىدۇ، قوپقاندا ئاۋال ئالدى پۇتىنى كۆتۈرىۋالىدۇ، ياتقاندا ۋە قوپقاندا ئىنجىقلايدۇ. ماڭغاندا ئېغىر قەدەم تاشلايدۇ، قاتتىق يولدا ماڭغۇسى كەلمەيدۇ، ئىتتىك بۇرۇلغۇسى كەلمەيدۇ. يۇقۇرىغا ماڭغاندا قەدەمنى يېنىك ئالىدۇ، پەسكە ماڭغاندا قەدەم تاشلىغۇسى كەلمەيدۇ ياكى سىڭايان ماڭىدۇ. بەزى كېسەل كالىلار تىزەكلىگەن ۋە سىيگەندىمۇ بىئ-رام بولىدۇ.

تورلۇق قېرىن تۇتۇپ كۆرۈلسە، كالا بىئارام بولىدۇ، كەينى پۇتى بىلەن قوسىغىنى تېپىدۇ، ئىنجىقلايدۇ ياكى تەك-شۇرۇشكە قارشىلىق كۆرسىتىدۇ.

باشتا بەدەن تېمپېراتۇرىسى $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ ئۆرلەپ قالىدۇ، تومۇر سوقۇش ئىتتىكىلەيدۇ، كېيىن بەدەن تېمپېراتۇرىسى تەدرىجى ئەسلىگە كېلىدۇ، تومۇر سوقۇشى بارا-بارا ئىتتىكىلە-ۋېرىدۇ. غەيرى نەرسىلەر يۈرەك قېپىغا تېگىپ قالسا، تورلۇق قېرىن ۋە يۈرەك قېپى ياللۇغى پەيدا بولىدۇ-دە. كېسەل ئەھۋالى يامانلىشىپ، ئومۇمى بەدەنلىك ئالامەتلەر روشەنلە-شىدۇ.

ئۆتكۈر ياللۇغلانغاندا، ئاق قان ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئومۇمى

سانى ئاشىدۇ، ھۈجەيرە يادروسى تىپى سولغا سىلجىيدۇ. سوزۇل-
 مىغا ئايلانغاندا، قاندىكى ئۆزگىرىش روشەن بولمايدۇ.
 [ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش] قوتاننىڭ ئىچى - تېشىغا ھەر
 خىل مېتال نەرسىلەرنى تاشلىماسلىق، ئوت - چۆپنى ئوبدان
 تاسقاپ، غەيرى نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىش كېرەك.
 تۈپتىن ساقايتىش ئۈچۈن، ۋاقتىدا ئوپىراتسىيە قىلىپ،
 غەيرى نەرسىلەرنى ئېلىۋېتىش كېرەك. ياللۇغ ئەدەپ كەتمە-
 سۇن ئۈچۈن، ئانتىبىيوتىك ياكى سۇلفانىلامىدلىق دورىلارنى
 بېرىش، شۇنىڭ بىلەن بىللە كېسەللىك ئالامەتلىرىگە قاراپ
 مۇناسىپ داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىش لازىم.

ئۈچەي تىقىلىشى

ئۈچەي ھەركىتى ۋە ئۈچەينىڭ ئاجراتمىلارنى چىقىرىش
 پائالىيىتىنىڭ ناچارلىشىشى، ئۈچەينىڭ چىقىرىندىلارنى كەينىگە
 ماڭغۇزۇش فۇنكسىيىسىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى بىلەن، ئۈچەي-
 دىكى نەرسىلەرنىڭ قۇرغاقلىشىپ قېتىۋېلىشى ۋە ماڭماي تۇرۇپ
 قېلىشى ئۈچەي تىقىلىشى دىيىلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئوزۇقلۇق تەركىۋى كەمچىل بولغان،
 ئاسان ھەزىم بولمايدىغان يىرىك - قاتتىق يەم - خەشەكنى ئۇزاق
 مەزگىل بېرىش ياكى تومۇزدا ئۇزاق مۇساپىگە توشۇش، ئۇزاق-
 قىچە ئۇسسۇز قويۇش سەۋىيىسى بىلەن، ئۈچەي - قېرىن سۇيۇقلۇغى

كۆپلەپ خوراپ، تىزەكنىڭ قېتىپ قېلىپ ئۈچەيدە توختاپ قېلىشى بۇ كېسەللىكنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى ئاساسىي ئامىللار ھېساپلىنىدۇ.

قېزىلىق، ئاجىزلىق، ئورۇقلۇق، ياكى ئۇزاق ۋاقىت ئاغرىپ ئاجىزلاش، ئۈچەي ھەركىتى توسقۇنلۇققا ئۇچراش سەۋىيىسىدىنمۇ ئۈچەي تىقىلىشى كېلىپ چىقىدۇ.

ئۆتكۈر قىزىتمىلىق كېسەللىك، چىش كېسەللىكى، ھەركەت ئاز بولۇش قاتارلىقلاردىنمۇ تىزەك قېتىۋېلىپ تۆۋەنگە ماڭمايدۇ. [كېسەللىك ئالامەتلىرى] باشتا ئىشتەي ناچارلايدۇ، كۆشەش ئازلايدۇ، ئارقىدىنلا ئىشتەي تامامەن تۇتۇلىدۇ، كۆشەش تۈخ-تايدۇ، ئېغىز بوشلۇقى قۇرغاقلىشىدۇ، ئۈچەي ئاۋازى ئاجىزلايدۇ ياكى يوقىلىدۇ، قوساق تەدرىجى كۆپۈپ يوغىنايدۇ. كالا روھ-سىزلىنىدۇ، پات-پات ئىنجىقلايدۇ؛ ئاز تىزەكلەيدۇ، كېيىن تىزەكلەيدۇ، ياكى ئاز مىقداردا لىغىلداق، شىلىمىش قى تىزەكلەيدۇ.

بەدەن تېمپېراتۇرىسى، تومۇر سوقۇش، نەپەس ئېلىش جەھەتلەردە غەيرى ئۆزگىرىش كۆرۈلمەيدۇ. چوڭ قېرىن كۆپۈپ كەتكەندە، تومۇر سوقۇش ئىستىكلەيدۇ، نەپەس يۈزە ئېلىنىدۇ، تېرە تېمپېراتۇرىسى نورمالسىز بولىدۇ.

قوساق ئاغرىش باشتا يېنىك بولىدۇ، كېيىن ئېغىرلىشىدۇ، كالا ئۆرە تۇرغاندا بىئارام بولىدۇ، كەينى پۇتى بىلەن قوس-غىنى تېپىدۇ، قوسىغىغا قارايدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) قولغا ئۇرۇنغىدەك تىقىلمىلارنى ئۇۋۇلاپ يۇمشىتىۋېتىش مۇمكىن.

(2) ئۈچەيدىكى تىقىلمىلارنى چىقىرىش ئۈچۈن، ئاۋال تۈزلۈك ياكى مايلىق سۈرگىلەر ئىشلىتىلىدۇ؛ ناتىرىي سۇلفاتتىن 500~800 م ل، ياكى سۇيۇق پارافىنىدىن 1000~1500 م ل ئىچكۈزۈلىدۇ. ياكى 10% لىك ناتىرىي سۇلفات ئېرىتمىسى ياكى ئىلمان سوپۇن سۈيى چوڭقۇر ھەمەل قىلىنىدۇ. ياكى 300 گ ناتىرىي سۇلفات بىلەن 500 م ل سۇيۇق پارافىننى 1500 م ل ئىسسىق سۇ قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، توققۇز تورلۇققا ئوكۇل قىلىنىمۇ بولىدۇ، بۇنىڭغا 1 گ فۇراتسىلىن قوشۇپ ئوكۇل قىلىنسا، ئۈچەي ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

جۇڭگىي دورىلىرى بىلەن داۋالاش: تىقىلمىنى يۇمشىتىش، ئۈچەينى راۋانلاشتۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكى دورىلار بېرىلىدۇ. رېتسېپ (چىلان قايناتمىسى):

گەنسۇ سۈتلۈك ئوتى 1 سەر، سۈتلۈك ئوت 2 سەر،

يۈەنخۇا 1 سەر، رەۋەن 2 سەر، تازىلانغان شور 3 سەر،

مۈتۈك 1 سەر، جۈشى 2 سەر، قالقانگۈل 3 سەر، كەندىر

ئۇرۇغى 3 سەر، چىلان 3 سەر

بۇلار تالقان قىلىنىپ، ئىككىگە بۆلۈپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ (تىقىلمىنى ماڭدۇرۇش دورىسى):

رەۋەن 3 سەر، كەندىر ئۇرۇغى 5 سەر، جۈشى 2 سەر، خۇپۇ

1 سەر، ئاچچىقسۇدا ئىشلەنگەن سۇدى ھىندى 2 سەر، قۇستە

1 سەر، مۇتۇڭ 9 سەر، ليەنچياۋ 9 مىسىقال، شاتارى

1 سەر، داڭگۈي 1 سەر

بۇلار قاينىتىلىپ سوۋۇغاندا ئىچكۈزۈلىدۇ.

(4) داۋالاش ئۈنۈم بەرمىسە، ئوپىراتسىيە قىلىنىدۇ.

ئۈچەي - قېرىن ياللۇغى

بۇ ئۈچەي - قېرىن شىللىق پەردىسى ۋە ئۇنىڭ تۆۋەن قەۋەت توقۇلمىلىرىنىڭ ياللۇغىدۇر. كالىلاردا ئۈچەي ياللۇغى كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] كۆكرىپ قالغان ياكى زەھەرلىك ماددىلار ئارىلاشقان يەم - خەشەكلەر بىلەن بېقىش، پاسكىنا سۇدا سۇغىرىش، ئۈچەي - قېرىن شىللىق پەردىسىنىڭ سەزگۈ ئەزا - لىرى كۈچلۈك غەدىقلىنىش تۈپەيلىدىن ئۈچەي - قېرىن تېمىدا كۈچلۈك ياللۇغلىق ئۆزگىرىش پەيدا بولىدۇ، بۇ - مۇشۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى ئاساسىي سەۋەپ.

ئۈچەي - قېرىن ياللۇغى تولراق ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشىشى، تورلۇق قېرىننىڭ جاراھەتلىك ياللۇغى ياكى بەزى يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر (كالا ۋاباسى، ئاقسىل قاتارلىقلار) گە ئۇلىنىپ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ئۈشتۈمتۈتلا قاتتىق ۋە ئۈزۈلمەي ئىچى سۇرىدۇ، تىزىگى سۇدەك كېلىدۇ، تەركىۋىدە شىلىمىش

سۇيۇقلۇق، ساختا پەردىلەر، قان ياكى يىرىڭلىق ماددىلار بولىدۇ ۋە ئۇ سېسىق پۇرايدۇ. بەزى كالىلار تىزەك تۇتالماستىن بولۇپ قالىدۇ، قوڭى ۋە قۇيرۇق تۈۋى بۇلىنىپ كېتىدۇ. ئۈچەي-قېرىن ھەركىتى كۈچىيىدۇ، ئىچى سۈرگەندىن كېيىن ئۈچەي-قېرىن ھەركىتى ئاۋازى ئاجىزلايدۇ ياكى يوقىلىدۇ.

كالا روھسىزلىنىدۇ، كالىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆر-لەپ 41°C ~ 40°C تىن ئاشىدۇ، ئىشتىيى تامامەن تۇتۇلىدۇ ۋە كۆشى توختايدۇ، كالا تېز جۈدەيدۇ، كۆپ ئۇسسايدۇ، كالىنىڭ شىللىق پەردىلىرى قىزىرىدۇ ياكى سارغىيىدۇ، تىلى گەز باغلايدۇ، ياتقۇسى كېلىپ تۇرىدۇ. كالا ئاجىزلاپ كەتكەنلىك-تىن دەلدەڭشىپ ماڭىدۇ، دائىم ئىنجىقلايدۇ، چىشىنى غۇچۇر-لىتىدۇ، كالىنىڭ تېرە تېمپېراتۇرىسى نورمالسىزلىشىدۇ، ئاياق-لىرىنىڭ ئۇچى مۇزلايدۇ، سىپىرنىڭ سۈتى ئازىيىدۇ ياكى توختايدۇ.

يۈرەك سوقۇش، نەپەس ئېلىش ئىتتىكلەيدۇ ھەم ئاجىز بولىدۇ، مۇسكۇللار دىرىلىدەيدۇ، چەكلىك دائىرىدىن ياكى پۈتۈن بەدەندىن تەر چىقىدۇ. ئارىلاپ قوساق ئاغرىپ تۇرىدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش]

بېقىش-باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، كالىلارغا چېرىگەن، كۆكەرگەن، سۈپىتى ئۆزگەرگەن ۋە زەھەرلىك ماددىلار ئارىلاشقان يەم-خەشەكنى بەرمەسلىك، سۇ تازىلىغىغا دىققەت قىلىش لازىم. ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ فۇنكىتسىيىسى بۇزۇلسا ۋاقتىدا

داۋالاش، ئۇنىڭ ئەۋج ئېلىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

(1) ئۈچەي-قېرىندىكى زەھەرلىك ماددىلارنى ئازىلاش، ئېچىشنى توساش، ئۈچەي-قېرىن شىللىق پەردىسىنى قوغداش ياللۇغنىڭ غىدىقلىنىشىنى پەسەيتىش ئۈچۈن، غىدىقلىمايدىغان سىلىق سۈرگە دورىلىرى بېرىلىدۇ. ئادەتتە تۈزلۈك سۈرگىلەر ياكى سۇيۇق پارافىن كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ. ئېچىشنى باسدىغان دورىلاردىن كىرروت مېيى، ئىختىيول، لىزول قاتارلىقلار يانداش-تۇرۇپ ئىشلىتىلسە، ئۈنۈمى تېخىمۇ ئوبدان بولىدۇ.

(2) يىغىلىپ قالغان تىزەكنى ئاساسەن چىقىرىپ بولغاندىن كېيىن، ئىچى سۈرۈش يەنىلا توختىمىسا، ۋىسمۇت ھىپونىترىت-تىن 15~20 گىرام، تانئالىپىندىن 20 گ، ناترىي بىكاربوناتتىن 40 گ، كىراخمالدىن 1000 م ل ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ. ياكى 1000~2000 م ل سۇغا 100~200 گ ياغاچ كۆمۈرنى قوشۇپ دۇغلۇق ئېرىتمە ياساپ، بىر يوللا ئىچكۈزۈلسمۇ بولىدۇ.

(3) ياللۇغنىڭ ئەۋج ئېلىشىنى توساش، باكتېرىيىنى ئۆلتۈرۈپ ياللۇغ قايتۇرۇش ئۈچۈن، مامۇرانچىن جەۋھىرىدىن 2~4 گ ئېلىپ كۈنىگە 3 قېتىمدىن ئىچكۈزۈلىدۇ، ياكى فۇراتسىلىندىن 1~2 گ ئېلىپ كۈنىگە بىر-ئىككى قېتىمدىن ئىچكۈزۈلىدۇ، ياكى سۇلفاگۇامىدىندىن 30~50 گ ئېلىپ كۈنىگە 3 قېتىمدىن ئىچكۈزۈلىدۇ، 0.1% لىك مارگانىسوپىتىن 2000~3000 م ل ئىچكۈزۈلسمۇ بولىدۇ.

(4) كۆپلەپ سۇسىزلىنىپ، ئۆزلۈگىدىن زەھەرلىنىش ۋە يۈرەك ئاجىزلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ۋاقتىدا سۇيۇق-لۇق تولۇقلاش، زەھەر قايتۇرۇش ۋە يۈرەكنى كۈچلەندۈرۈش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن تولاراق %5 لىك گلىكوزىلىق تۇز ئېرىتمىسى، مۇرەككەپ ناترىي خلورىد ئېرىتمىسى (500~1000 م.ل) ئىشلىتىلىدۇ، بۇنىڭغا كوفېيىن (%20 لىگىدىن 10~20 م.ل)، ۋىتامىن O ئوكۇلى (10~20 م.ل) نى قوشۇپ كۆك تومۇرغا كۈنىگە 2~3 قېتىمدىن تامغۇزۇپ ئوكۇل قىلىنسا، ئۈنۈمى ياخشىراق بولىدۇ.

(5) زەھەر قايتۇرۇش فۇنكسىيىسىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن، سۇيۇقلۇق تولۇقلىغاندا %5 لىك ناترىي بىكاربوناتتىن 300~500 م.ل، ياكى %40 لىك ئۇرۇتروپىندىن 50 م.ل قوشۇلىدۇ.

(6) قوساق ئاغرىپ بىئارام بولغاندا مۇسكۇلغا %30 لىك ئانالىگىندىن 30 م.ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(7) ياللۇغ ئاساسەن قايتقاندا، ئۈچەي-قېرىن پائالىيىتىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ئاشقازان دورىلىرىدىن بېرىلىدۇ.

(8) جۇڭىي دورىلىرىدىن: ئىسسىقنى ياندۇرۇپ، زەھەر قايتۇرغۇچى، ھۆللۈكنى سرغىتىپ، سۇيۇقلۇق ماڭغۇزغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

رېتسېپ:

قالقانگۈل 1 سەر، خۇاڭبو قوۋزىغى 1 سەر، مامۇرانچىن

1 سەر. ئاقۇاشئوت 1 سەر، جۇچياۋ 5 مىسقال، قاقىلە 5 مىسقال، ياۋا كەشمىر 5 مىسقال، جۈلك گىرىمى 5 مىسقال، قال، خۇپۇ 5 مىسقال، ساڭجۇ 5 مىسقال بۇلار سۇدا قاينىتىلىپ، سوۋۇغاندا ئىچكۈزۈلىدۇ. قوشۇش ۋە كېمەيتىش: قىزىتما بولسا، تىزىگىگە شىلىمىش قوشۇقلۇق، قان-يىرىك ئارىلاشقان بولسا، قاقىلە، ساڭجۇنى كېمەيتىپ، خام ئەگرى سۇناي، ئاچچىق تاۋۇز تالقىنى، رەۋەن ۋە تازىلانغان شورنى كۆپەيتىش لازىم.

ماھىيەتلىك ئۆتكۈر جىگەر ياللىغى

بۇ جىگەر توقۇلمىسىدا كۆرۈلىدىغان ياللىغۇلۇق كېسەللىك ئۆزگىرىشى بولۇپ، قان چۈشۈش، سىرغىش ۋە جىگەر ھۈجەيە-رىسىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن خاراكتىرلىنىدۇ. [كېسەللىك سەۋىيىسى] چىرىگەن يەم-خەشەك، زەھەرلىك ئۆسۈملۈك ۋە خىمىيىۋى زەھەرلىك ماددىلار (فوسفور، ئارسىن، كاربون تېتراخلور، ئاش تۇزى، سۈرمە قاتارلىقلار) بۇ كېسەللىكنى پەيدا قىلىدىغان ئاساسىي ئامىللاردۇر. چوڭ ياپراقچە خاراكتىرلىق ئۆپكە ياللىغى، سېپتىسېمىيە، گېموسپورمىدوز، ئۆچەي-قېرىن ياللىغى ۋە بالىياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللىغى قاتارلىقلارغا ئۇلىنىپمۇ ماھىيەتلىك ئۆتكۈر جىگەر ياللىغى كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] باشتا چارچاش، ئاستا ماڭىدىغان بولۇپ قېلىش، كېيىن تومۇر سوقۇش ئىتتىكلەش، بەدەن تېم-پېراتۇرىسى ئۆرلەش، ئىشتەي ناچارلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بىرنەچچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن كۆزنىڭ ئېقى، بۇرۇن شىلا-لىق پەردىسى ۋە ئېغىز شىللىق پەردىسى، تېرىنىڭ رەڭسىز قىسىملىرى سارغىيىپ قېلىش، تەن ئاجىزلاپ كېتىش، روھسىز-لىنىش، بەدەن تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلەش، يۈرەك فونىكتسىيىسى ئاجىزلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئوزۇق يېيىشتە قىيىنلىش، كۆشەش توختاش، ئۈچەي ھەركىتى ئاستىلاش، ئىچى قېتىش كۆرۈلىدۇ. تىزەك سۇس سېرىق كېلىدۇ ۋە سېسىق پۇرايدۇ، تىزەك تەركۈندىكى ئۆت پىگمېنتى ئازلاپ كېتىدۇ. جىگەرنىڭ تۇتۇق ئاۋاز رايونى كېڭىيىدۇ، سىزىمچانلىغى ئاشىدۇ. سۈيىدۈك مىقدارى ئازىيىدۇ، ئۇنىڭ رەڭگى قارىيىدۇ، سېلىشتۇرما ئېغىر-لىغى يۇقۇرىلايدۇ، سۈيىدۈك تەركۈندە ئۇرۇلىن ۋە بىلىرۇبىن بولىدۇ، بەزىدە ئاقسىل ۋە بۆرەك ئۈستى تېرىسى بولىدۇ. قان زەردىۋىدە بىۋاسىتە ۋە ۋاستىلىك بىلىرۇبىن بولىدۇ.

كېسەللىك ئادەتتە 20~30 كۈن داۋام قىلىدۇ. ئۆز ۋاقتىدىلا داۋالسا، يامان ئاقىۋەت كېلىپ چىقمايدۇ. كېسەللىك ئېغىر بولسا، ئۇ كۆپ ھاللاردا ئۆتكۈر جىگەر يىگىلەش كېسىلىگە، ياكى سوزۇلما جىگەر ياللۇغىغا ئايلىنىدۇ.

[داۋالاش]

(1) سۈنئىي تۈز ھەر قېتىمدا 60 گ دىن كۈنىگە 3 قېتىم

ئىچكۈزۈلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىللە كۆك تومۇرغا %20 لىك گلىكوزا ئېرىتمىسىدىن 300~500 م ل ئوكۇل قىلىندۇ. ياكى %40 لىك ئۇرۇتروپىندىن 50 م ل ئوكۇل قىلىندۇ. (2) ئاسان ھەزىم بولىدىغان تاتلىق يەم-خەشەك (قىزىلچا، سەۋزە قاتارلىقلار) كۆپ بېرىلىدۇ، سۇ ۋە تۇز ئاز بېرىلىدۇ.

بۆرەك جامى - بۆرەك ياللۇغى

بۆرەك جامى ۋە بۆرەك، سۈيدۈك نەيچىسى بىرلا ۋاقىتتا ياللۇغلىنىش بۆرەك جامى - بۆرەك ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ تولراق سېغىن سىيرلاردا سوزۇلما ۋە يىرىڭلىق خاراكتىردا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك قوزغاتقۇچى] باكتېرىيە ۋە ۋىرۇسلار كېسەللىك قوزغاتقۇچىلاردۇر. بۇ، كۆپىنچە، تۇغۇتتىن بۇرۇن ۋە كېيىن جىنسى يول ياللۇغى، دوۋساق ياللۇغى، ئەش چۈشمەسلىك كېسەللىكلىرى بىلەن بىللە پەيدا بولىدۇ.

بۆرەكتىكى تاش مېخانىكىلىق تەسىرگە ئۇچراش، قاتتىق غىدىقلىغۇچى دورىلارنى ئىچكۈزۈش قاتارلىقلار تۈپەيلىدىنمۇ بۇ كېسەللىك كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] بۇ كېسەللىك ئۆتۈش جەريانىغا قاراپ ئۆتكۈر تىپ ۋە سوزۇلما تىپ دەپ ئىككى تىپقا ئايرىلىدۇ. ئۆتكۈر تىپىدا بەدەن تېمپېراتۇرىسى 41°C ~ 40°C

قا چىقىپ، ئارىلاپ - ئارىلاپ ياكى دولقۇنسىمان قىزىتما كۆرۈل-
دۇ. روھسىزلىنىش، ئىشتەي تۇتۇلۇش، سىگەندە ئاغرىش،
پات - پات تامچىلاپ سىيىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. تۈز ئۈچەي-
دىن تەكشۈرۈلسە بۆرەك ۋە بۆرەك جامى زورايغانلىقى بىلىند-
دۇ، قول تەگسە ئاغرىقسىنىش ئىپادىسى كۆرۈلىدۇ. سۈيدۈك
دۇغلۇق بولىدۇ، سۈيدۈك تىنمىسىدا ئاق قان ھۈجەيرىلىرى،
بۆرەك جامى ئۈستىكى پوستلىقى، بەزىدە ئازراق قىزىل قان
ھۈجەيرىلىرىمۇ بولىدۇ. بۆرەك ماھىيەتلىك زىيانغا ئۇچرىغاندا،
سۈيدۈكتە ھەر خىل سۈيدۈك تۈۋرۈكلىرى ۋە بۆرەك ئۈستىكى
پوستلىقى كۆرۈلىدۇ.

سوزۇلما تىپىدا بەدەن تېمپېراتۇرىسىدا ئادەتتە ئۆزگىرىش
بولمايدۇ، ئومۇمى بەدەنلىك ئالامەتلەرمۇ روشەن كۆرۈلمەيدۇ،
كېسەل كالا ئوڭاي چارچايدۇ، ئۇنىڭ سۈيدۈگىدىن ئاق قان
ھۈجەيرىلىرى كۆرۈلىدۇ، بەزىدە كېسەل كالىدا سۇلۇق ئىششىق
يۈز بېرىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] كۆپىيىش ئەزاسى كېسەللە-
گىنى داۋالاشتا كۈچلۈك غىدىقلىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىشكە
بولمايدۇ. تۇغۇت كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا يۇقۇملىنىشتىن
ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش لازىم.

(1) كېسەللىكنىڭ دەسلەپتە ئانتىبىيوتىك دورىلاردىن
پېنىتسىللىن، سترېپتومىتىن قاتارلىقلار مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىنسا
ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. كۆك تومۇرغا 25%~10 لىك گلىكوزا

ئېرىتمىسىدىن 500 م ل، فېزىئولوگىيىلىك تۈز ئېرىتمىسىدىن 1000 م ل، ياكى گلىكوزىلىق تۈز ئېرىتمىسى ئۆتكۈزۈلۈپ قىلىندۇ. (2) سۈيىدۈك يولىنى دېزىنفېكسىيە قىلىش دورىلىرىدىن ئۇرۇتروپىن (5~10 گ)، سالور (10~15 گ) ئىچكۈزۈلدى، ياكى كۆك تومۇرغا %40 لىك ئۇرۇتروپىن 50~100 م ل ئۆتكۈزۈلۈپ قىلىندۇ. سۈيىدۈك ھەيدىگۈچى دورىلاردىن دىيورتن (3~8 گ) ئىچكۈزۈلدى، ياكى ئۇنىڭغا دىگىتالىس قوشۇپ ئىچكۈزۈلدى.

(3) يۈرەك ئاجىزلىقى كۆرۈلسە، يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلارمۇ قوشۇپ ئىشلىتىلدى.

(4) سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلگەندە، سۈيىدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار بېرىلدى ۋە سۇ ئاز بېرىلدى، ئۇنىڭدىن باشقا، كۆك تومۇرغا %10 لىك كالتسىيە خلورىد ئېرىتمىسىدىن 100~150 م ل ئۆتكۈزۈلۈپ قىلىندۇ.

دوۋساق ياللۇغى

بۇ دوۋساق شىللىق پەردىسىنىڭ ياللۇغى بولۇپ، ياللۇغنىڭ خاراكتېرىغا قاراپ كاتارلىق ياللۇغ ۋە يىرىڭلىق ياللۇغ دەپ ئىككى خىلغا، ياللۇغنىڭ جەريانغا قاراپ ئۆتكۈر تىپ ۋە سوزۇلما تىپ دىگەن ئىككى تىپقا ئايرىلدى.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] دوۋساق ياللۇغى تولاراق بۆرەك

ياللۇغى، سۈيدۈك نەيچىسى ياللۇغى ۋە سۈيدۈك يولى ياللۇ-
غىنىڭ كېڭىيىشى شۇنىڭدەك بەزى دورىلار (مەسىلەن، ئالا
قوڭغۇز قاتارلىقلار) نىڭ غىدىقلىشى سەۋىيىسىدىن پەيدا بولىدۇ.
سۈيدۈك يولى زىتىنىڭ ۋە دوۋساققا تۇرۇپ قالغان تاشنىڭ
دوۋساقنى زەخمىلەندۈرۈشى سەۋىيىسىدىنمۇ دوۋساق ياللۇغى
كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللەك ئالامەتلىرى] ئۆتكۈر تىپىدا كۆپىنچە سۈيدۈك
قىستاپ تۇرۇش، ئەمما ئاز-ئاز سىيىپ تۇرۇش، سۈيدۈك
ئاغرىتىپ كېلىش ئىپادىلىرى كۆرۈلىدۇ. پۈرمە مۇسكۇلى
تارتىش خاراكتېرلىق قىسقارغان ياكى دوۋساق بويىنى شىلىق
پەردىسى ئىشىغاندا، سۈيدۈك كەلمەس بولۇپ قالىدۇ. ئۇزۇن-
غىچە سۈيدۈك كەلمەسلىكتىن، سۈيدۈك دوۋساققا ئېچىپ ئاممە-
ياك پەيدا بولىدۇ-دە، دوۋساق غىدىقلىنىدۇ، بەزىدە دوۋساق
يېرىلىدۇ.

ئېغىر كېسەللەنگەن كالا روھسىزلىنىدۇ، كالىنىڭ بەدەن
تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ. ئىشتىيى ناچارلايدۇ ياكى تامامەن
تۇتۇلىدۇ. سۈيدۈك دوغلىشىدۇ. كاتارلىق ياللۇغتا سۈيدۈكتە
جىق شىلمىشق ماددىلار ۋە ئازراق ئاقسىل بولىدۇ. يىرىڭلىق
ياللۇغتا سۈيدۈكتە يىرىڭ بولىدۇ. كىرپوزلۇق ياللۇغتا سۈي-
دۈكتە ئاق پەردىلەر بولىدۇ. سۈيدۈك چۆكمىسىنى مىكروسكوپتا
تەكشۈرگەندە، نۇرغۇن ئاق قان ھۈجەيرىلىرى، دوۋساق
ئۈستى پوستلاقلىرى، باكتېرىيىلەر ۋە ئاز مىقداردا قىزىل قان

ھۈجەيرىلىرى، توقۇلما پارچىلىرى كۆرۈنىدۇ.
سوزۇلما دوۋساق ياللۇغىدا كېسەللىك خېلى ئۇزاققا سوزۇ-
لىدۇ، كېسەللىك ئالامەتلىرى ئۆتكۈر تېپىنىشكىگە ئوخشاپ كېتىدۇ.
[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]
(1) بۆرەك ۋە سۈيدۈك يولى كېسەللىكلىرىنى ۋاقتىدا
داۋالاش لازىم.

(2) ئۇرۇتروپىنىدىن 5~10 گ، سالىوردىن 10~15 گ
ئىچكۈزۈلىدۇ. ئېغىز، يىرىڭلىق دوۋساق ياللۇغى ئانتىبىيوتىك ۋە
سۇلفانىلامىدلىق دورىلار بىلەن داۋالىنىدۇ.

(3) سىيىرلارنىڭ سوزۇلما دوۋساق ياللۇغىدا، دوۋساقنى
سۈيدۈك ماڭدۇرۇش نەيچىسى بىلەن يۇيۇش ياخشى ئۇنۇم
بېرىدۇ. يۇيۇش ئالدىدا سۇنئىي يول بىلەن سىيگۈزۈش، ئاندىن
ئىلمان فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە بىلەن تەكرار يۇيۇپ، ئارقى-
دىنلا 300~500 م ل دېزىنفىكسىيە سۇيۇقلۇغىنى كىرگۈزۈپ،
2~3 مىنۇت تۇرغۇزغاندىن كېيىن چىقىرىۋېتىش لازىم. دېزىن-
فىكسىيە سۇيۇقلۇقلىرىدىن 1~2% لىك بور كىسلاتاسى، 0.1%
لىك مارگانىسوپ، 0.5% لىك زەمچە، 0.1% لىك رىئانوللار
كۆپ ئىشلىتىلىدۇ.

(4) دوۋساققا سۈيدۈك تولۇپ كەتكەندە، سىيىرلارنى
قەرەللىك ھالدا سىيگۈزۈپ تۇرۇش، بۇقلارنى سۈيدۈك
يولىدىن ئېغىز ئېچىپ (ئوپىراتسىيە يولى بىلەن) سىيگۈزۈش
كېرەك.

سۆڭەك يۇمشاش كېسەللىگى

سۆڭەك يۇمشاش كېسەللىگى تولاراق كالتىسى بىلەن فوسفورنىڭ ئالمىشىش توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، سۆڭەك توقۇلمىسىدا كالتىسى كېمىيىپ بېرىش، سۆڭەك يۇمشاش، ئىششىق ۋە ئىلىك تاللىشىش سەۋىيىسىدىن كېلىپ چىقىدۇ، كۆپىنچە بوغازلىقنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە ياكى سۈتلۈك سىيىرلاردا كۆرۈلىدۇ، يەرلىك كالىلاردىمۇ بولىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئوزۇق تەركىبىدە كالتىسى، فوسفور مىقدارى كەم بولۇش، ياكى كالتىسى بىلەن فوسفورنىڭ نىسبىتى مۇۋاپىق بولماسلىق (كالتىسى بىلەن فوسفورنىڭ نورمال نىسبىتى 2:1 ياكى 1.5:1 بولىدۇ) سۆڭەك يۇمشاش كېسەللىگىنىڭ ئاساسىي سەۋىيىسى ھىساپلىنىدۇ.

ئوزۇق تەركىبىدە ئۆسۈملۈك كىسلاتاسى تۈزى، ئاقسىل ۋە ماي بەك كۆپ بولۇپ كەتسىمۇ بەدەندىكى كالتىسى ئازلاپ كېتىدۇ-دە، بۇ كېسەللىك كېلىپ چىقىدۇ.

قوشۇمچە قالقانسىمان بەزىنىڭ خىزمىتى قالايمىقانلىشىش، ۋىتامىن D يېتىشمەسلىك، سوزۇلما ئۈچەي-قېرىن ياللۇغى، سۈت مىقدارى كۆپىيىش، ھەركەت ئاز بولۇش، ئاپتاپ تېگىپ تۇرماسلىق قاتارلىقلارمۇ بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] دەسلەپتە كىلىنىكىلىق ئالامەتلەر روشەن بولمايدۇ، ھەزىم قىلىش نورمالسىزلىشىشى ۋە بالقاق بولۇپ قېلىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كېسەللىكنىڭ ئۆزىنى ئىشقا ئەگىشىپ، تەدرىجى ئورۇقلاش ئالامىتى ۋە ھەركەت توسقۇنلۇغى كۆرۈلىدۇ. كېسەللىك ئالامەتلىرى كېسەللىك جەريانىغا قاراپ مۇنداق 3 باسقۇچقا ئايرىلىدۇ.

بىرىنچى باسقۇچتا، روھسىزلىنىش، شال ئازلاش، ئىشتەيى ناچارلاش، غەيرى نەرسىلەرگە ئامراق بولۇپ قېلىش، تېتىش سېزىمى نورمالسىزلىشىش، ئوت-چۆپ ۋە سۇغا ئۆزىنى ئانچە ئۇرمايدىغان بولۇپ قېلىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بۇ ھال تەدرىجى تەرەققى قىلسا، سوزۇلما ھەزىم قىلىش توسقۇنلۇغى كېلىپ چىقىدۇ، ئورۇقلاش، تۈكلەر يارقىراقسىزلىشىش، دىڭگىيىۋېلىش، سۈت مىقدارى ئازىيىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئىككىنچى باسقۇچتا، كۈندىن-كۈنگە جىۋە كىلىشىش ۋە پۈتۈن بەدەن ئاجىزلاش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. كالا ئۆرە تۇرغاندا دۈمچىيىپ، ئاياقلىرىنى سەل ئېگىپ تۇرىدۇ؛ بەدەن ئېغىرلىغىنى ئاياقلىرىغا ئالماشتۇرۇپ چۈشۈرۈپ تۇرىدۇ، قاتتىق قەدەم تاشلايدۇ، بىر تەرەپ ياكى ئىككى تەرەپ ئايىغى ئاقىسايدۇ. سۆڭەك ۋە بوغۇملار ناھايىتى سەزگۈرلىشىپ كېتىدۇ، تۇياق قىسمىدا سۆڭەك پەردە يالىۇغى ۋە بوغۇم يالىۇغى كۆرۈلىدۇ. كالا كۆپ ياتىدۇ، ئۆرە تۇرۇشىنى خالىمايدۇ، سۈت مىقدارى ئازىيىدۇ ياكى سۈت چىقمايدۇ. بوغاز سىيىرلار ئاسانلا بالاتاش.

لايدۇ ياكى بالىسى قوسىغدا چىرىپ كېتىدۇ.

ئۈچىنچى باسقۇچتا، سۆڭەك بوشاپ بېرىش ۋە يۇمشاپ بېرىش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. كۆرۈنىدىغان باش سۆڭىكى ئۆزگىرىپ كېتىدۇ، ئومۇرتقا تۈۋرۈكى ئېگىلىپ قالىدۇ. سۈتلۈك سىيىرنىڭ كەينىدىن سانغاندا 1-، 2- قۇيرۇق ئومۇرتقىسى كىچىكلەپ ۋە يۇمشاپ بارىدۇ، ھەتتا يوقاپ كېتىدۇ. ئاياق بوغۇملىرى ئىشىپ يوغىنايدۇ، ئۇدۇل چىشى، مۇڭگۈزى مىدىراپ قالىدۇ. ماڭلاي سۆڭىكى يىڭىنە بىلەن تېشىپ كۆرۈلسە، بەك ئاسان تېشىلىدۇ.

كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە، چوڭ قېرىن كۆپۈش، چوڭ قېرىنغا ئوزۇق تەقىلىش، ئۈچەي-قېرىن ياللۇغى، سۆڭەك سۇنۇش، بوغۇم تولغىشىپ زەخمىلىنىش، تۆشەك جاراھىتى قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش] بېقىش-باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، ئوزۇق تەركىۋىدىكى كالىتسىي بىلەن فوسفور نىسبىتى مۇۋاپىق بولۇش، تەركىۋىدە مىنېرال ماددىلار ۋە ۋىتامىن D ۋە ۋىتامىن C كۆپ بولغان يەم-خەشەكلەرنى بېرىش لازىم. مۇۋاپىق ئىشلىتىش ۋە ئۈچەي-قېرىن كېسەللىكلىرىنى ۋاقتىدا داۋالاش كېرەك. قوتاندا بېقىلىدىغان سېغىن سىيىرلارنى مۇۋاپىق ھەركەتلەندۈرۈپ تۇرۇش ۋە ئاپتاپقا سېلىپ تۇرۇش لازىم. يېشى چوڭ ۋە سۈتلۈك سىيىرلارغا يىل بويى سۆڭەك پاراشوگى بېرىپ تۇرۇش كېرەك.

(1) بەدەندىكى كالتسىي، فوسفور تەركىبىنى تولۇقلاپ تۇرۇش ئۈچۈن، يەم - خەشەككە سۆڭەك پاراشوتىدىن 30~60 گ، كالتسىي فوسفاتتىن 15~30 گ، تۈزدىن 15~80 گ قوشۇپ بېرىلىدۇ. 10% لىك كالتسىي خىلورىد ئېرىتمىسىدىن 100~150 م ل، ياكى 5% لىك كالتسىي گلىكونات ئېرىتمىسىدىن 200~300 م ل ئېلىپ كۆك تومۇرغا كۈندە بىر قېتىم ئۆكۈل قىلىنىدۇ. كۆك تومۇرغا ناتىرىي دىھىدرو فوسفاتتىن 300~500 م ل، ياكى 3% لىك كالتسىي ھىپوفوسفاتتىن 1000 م ل ئۆكۈل قىلىنىشىمۇ خېلى ئوبدان ئۈنۈم بېرىدۇ.

(2) كالتسىي تۈزلىرىنىڭ شۈمۈرۈلۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن كالتسىي فىرولىدىن 10~15 م ل ئېلىپ مۇسكۇلغا 3~5 كۈندە بىر قېتىم ئۆكۈل قىلىنىدۇ، كوللوئىدلىق كالتسىي فىرول ۋە ۋىتامىن AD مېيىدىن 10~20 م ل ئېلىپ مۇسكۇلغا كۈندە بىر قېتىم ئۆكۈل قىلىنىشىمۇ بولىدۇ.

(3) ئاغرىقنى پەسەيتىش ئۈچۈن، سالتىروپىن ئېرىتمىسىدىن 100 م ل ئېلىپ كۆك تومۇرغا كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 3~4 كۈن ئۆكۈل قىلىنىدۇ. ياكى ئانتى كالىرىن ئېرىتمىسىدىن 100~150 م ل ئېلىپ كۆك تومۇرغا ئۆكۈل قىلىنىشىمۇ بولىدۇ. ياكى كېسەللەنگەن ئاياقتىكى پەللىلەرنى پروكاىمىن بىلەن توساپ قويىشىمۇ بولىدۇ.

(4) ئۆچەي - قېرىن خىزمىتىنى تەڭشەش ئۈچۈن تۇرلۇك ئاشقازان دورىلىرى ئىشلىتىلىدۇ. باشقا قوشۇلما كېسەللىكلەر

ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋاللىنىدۇ.

(5) جۇڭىي دورىلىرى بىلەن داۋالاش:

(1) جۇڭىي مال دوختۇرلۇغىدا كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەرقلەندۈرۈپ داۋالاش ئۇسۇلى بويىچە، تال-قېرىنى ياخشە-لاش مەقسىدىدە، يىمجىز مېغىزى دورىسى ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

يىمجىز مېغىزى 1 سەر، جۈز بۇۋا 7 مىسقال، شازاندېرا

8 مىسقال، سېپارى 6 مىسقال، داڭگۈي 8 مىسقال، ئاق

چوغلۇق 6 مىسقال، دارچىن 8 مىسقال، بەيجۇ 8 مىسقال،

سېرىق جۈيزە پوستى 2 مىسقال، پۇراقلىق يىلتىز 6

مىسقال، چۈچۈكبۇيا 5 مىسقال، چىلان 2 سەر

بۇلار سۇدا قاينىتىلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(2) ئايقلار ئاغرىسا، بۆرەك ۋە مۇسبەللىككە مەدەت بېرىش،

قاننى جانلاندۇرۇپ تومۇرلارنى راۋانلاشتۇرۇش مەقسىدىدە،

تۈڭگۈەنسەن دورىسى ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

داڭگۈي 1 سەر، ئازادە دەرىخى ئۇرۇغى 8 مىسقال، ئارپا

بېدىيان 8 مىسقال، باجىتيەن 6 مىسقال، ئەمەن 6 مىسقال،

خۇلۇبا 8 مىسقال، مۇتۇك 7 مىسقال، بەيجۇ 8 مىسقال،

جىن كېۋىزى 7 مىسقال، ھەشقىپچەك ئۇرۇغى 6 مىسقال،

زاراخزا چېچىگى 5 مىسقال

بۇلار تالقان قىلىنىپ، ئاۋال 4 سەر سېرىق ھاراق ئىچكۈ-

زۈلۈپ، ئاندىن قايناق سۇ بىلەن ئىچكۈزۈلىدۇ.

3) جۇڭگىي دورىلىرىدىن ساڭجۇ ئىچكۈزۈلسىمۇ ئوبدان ئۈنۈم بېرىدۇ. ساڭجۇنى ياخشى سوقۇپ ئۇزۇققا قوشۇپ، كۈنگە 1 سەردىن 2 قېتىم ئىچكۈزۈلىدۇ.

ئاتىستونىمىيە

بۇ كېسەللىك تولاراق سېمىز بېقىلغان سۈتلۈك سىيىرلاردا كۆرۈلىدۇ. كۆپىنچە سىيىر تۇغۇپ 20 كۈنچە ئۆتكەندىن كېيىن پەيدا بولىدۇ، تۇغۇشقا 5~15 كۈن قالغان سىيىرلاردىمۇ كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] كېسەللىك سەۋىيىسى ھازىرغىچە ئېنىق ئەمەس. ئۇ كۆپىنچە ياخشى بېقىلغان سۈتلۈك سىيىرلاردا كۆرۈلىدۇ. كۆپ ھەركەتلەندۈرۈلمەيدىغان، ئاقسىل ۋە ماي تەركىبى يۇقۇرى ئۇزۇق بىلەن بېقىلغان كالىلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. تەركىبىدە كاربون-سۇ بىرىكمىلىرى كەمچىل بولغان ۋە يىرىك يەم-خەشەك بىلەن بېقىلىۋاتقان ئەھۋالدا، يەم-بوغۇز ئارتۇقچە بېرىلسە تېخىمۇ ئاسان كۆرۈلىدۇ. ئالدىنقى قېرىنلارنىڭ بوشىشى، جىگەر كېسىلى، ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ ئاجرىتىلىشىنىڭ بۇزۇلۇشى ياكى كۆپ سېغىش قاتارلىقلارمۇ بۇ كېسەلنى پەيدا قىلىدىغان ئامىلدۇر.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] باشتا كالىنىڭ ئىشتىيىى ناچارلايدۇ، كۆشىشى ئاستىلايدۇ، ئالدىنقى قېرىنلىرىنىڭ ھەركىتى بوشىشىدۇ،

كۆپ ھاللاردا ئاغزىدىن شال ئاقىدۇ ۋە كالا قۇرۇق چايناپ تۇرىدۇ، كالىنىڭ كۆز ئالمىسى مەدىرلايدۇ، بويۇن، بەل مۇس-كۈلى تىترەيدۇ، كالا مۆرەيدۇ ياكى ئالدىغا ئېتىلىدۇ. كەينىدىنلا روھسىزلىق، ئاجىزلىق، دەلدەڭشىش، مەزمۇت تۇرالماسلىق، بەزىدە ئۇنى-بۇنى يالاش، سۈت مىقدارى ئازلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە كالىنىڭ ئاياقلىرى پالەچ بولىدۇ، كالا ئۆرە تۇرالمىدا، ياتقاندا بېشىنى يېنىغا ئېلىپ ياتىدۇ، كالىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى نورمال ۋاقىتتىكىدىن تۆۋەن بولىدۇ، نەپەسلىنىشى ئاستىلايدۇ، تومۇر سوقۇشى ئازلايدۇ.

كالىنىڭ تىنىغى، سۈيدۈگى ۋە سۈتىدىن ئاتسېتون پۇرىغى كېلىدۇ، يەنى خۇددى خىلوروفورم ياكى سامساق پۇرىغىدەك خۇش پۇراق كېلىدۇ، بۇ ھال بۇ كېسەللىكنىڭ ئاساسىي بەلگىسىدۇر. [ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش] بۇ كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا، مۇھىمى، كالىنىڭ كۈندىلىك ئوزۇغىنىڭ تۈرىنى مۇۋاپىق تەڭشەپ تۇرۇش كېرەك. يەم-بوغۇزنى كۆپ بېرىشكە بولمايدۇ، ئاقسىل تەركىبى مول ئوزۇق بىلەن باققاندا يېڭى ئوت، قۇرۇق چۆپ ۋە تۈگىگەن يىلتىزلىق خەشەكلەرنى لايىغىدا قوشۇپ بېرىش كېرەك. يەم-بوغۇز بەرگەندە مىقدارىنى تەدرىجى كۆپەيتىش كېرەك. ئېغىلدا بېقىلىدىغان كالىلارنى ھەر كۈنى كەم دېگەندە 1~2 سائەت ھەركەتلەندۈرۈپ تۇرۇش، ئاپتاپ كۆرسىتىپ تۇرۇش لازىم.

(1) چىگەرەۋە قاندىكى قەنت ماددىسىنى كۆپەيتىش ئۈچۈن، كۈندە %40~20 لىك گلىكوزىدىن كۆك تومۇرغا ھەر كۈنى 500~1000 م ل تامچىتىپ ئوكۇل قىلىندۇ، ئۇنىڭغا ئىسسىقلىق بولسا 200~300 خەلقارا بىرلىك ئارىلاشتۇرۇپ ئوكۇل قىلىسمۇ بولىدۇ. ياكى مۇسكۇلغا ئىلگىرىلەتمە بۆرەك ئۈستى بېزى پوستىلىغى ھورمۇندىن 200~600 بىرلىك ئوكۇل قىلىندۇ. ياكى بولسا 250~500 گ شېكەر ياكى گلىكوزا پاراشوگى 1~2 ل سۇدا سۈيۈلدۈرۈلۈپ ئۇدا 2~3 كۈن ئىچكۈزۈلىدۇ.

(2) كىسلاتا بىلەن ئىشقار تەڭپۇڭلۇغىنى ياخشىلاش ئۈچۈن، ناترىي بىكاربوناتتىن 50~100 گ ئىچكۈزۈلىدۇ، ياكى كۆك تومۇرغا %5 لىك ناترىي بىكارنات ئېرىتمىسىدىن 200~300 م ل ئوكۇل قىلىندۇ (كۈندە بىر قېتىم).

(3) يۈرەك ھەرىكىتىنى ياخشىلاش ئۈچۈن، مۇسكۇلغا كوففېين ئوكۇل قىلىندۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كالتسىي گلىكونات، گلىكوزىلىق ماگنىي سۇلفات بىلەن داۋالاشمۇ خېلى ياخشى ئۈنۈم بەرمەكتە، چوڭ قېرىن ھەرىكىتىنى قوزغىغۇچى دورىلار، سىلىق سۈرگە دورىلىرى قاتارلىقلارمۇ قوشۇمچە دورا سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ.

ئاپتاپ ئۆتۈش ۋە ئىسسىق ئۆتۈش

بۇلار بىر خىل ئۆتكۈر كېسەللىك بولۇپ، مەركىزىي

نېرۋا سىستېمىسى پائالىيىتىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. تولاراق تومۇز پەسلىدە پەيدا بولىدۇ. [كېسەللىك سەۋىيىسى] كۈن نۇرىنىڭ باشقا ئۇزاق ۋاقىت بىۋاسىتە چۈشۈشى بىلەن، چوڭ مىڭە مەركىزىي نېرۋىسىدا كەسكىن كېسەللىك ئۆزگىرىشى پەيدا بولۇپ، ئېغىر فۇنكسىيە توسالغۇسى كۆرۈلۈش ئاپتاپ ئۆتۈش دەپ ئاتىلىدۇ. تومۇز ئىسسىق ۋە نەم شارائىتىدا، بەدەندىكى ئىسسىقلىق تارقىلىپ كېتەلمەي، پۈتۈن بەدەن بەك ئىسسىپ كېتىدۇ. دە، مەركىزىي نېرۋا فۇنكسىيىسى قالايمىقانلىشىدۇ، بۇ ئىسسىق ئۆتۈش دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇزاق مۇددەت قاتتىق ئىشلىتىش، تىنچىق ۋە قىس-تا-قىستاڭ ئېغىلدا قويۇش، توق قوساق ئىشلىتىش، يۈرەك ئاجىزلىقى ۋە سېمىزلىك قاتارلىقلار مەزكۇر كېسەللىكنى پەيدا قىلىدىغان ئامىللاردۇر.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كالا تۇيۇقسىز كېسەللىنىدۇ، كېسەللىك ئېغىرلاشقاندا، كالىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى 41°C دىن ئېشىپ كېتىدۇ، بىرىكتۈرگۈچى پەردىلىرى قىزىرىدۇ ياكى كۆكرىدۇ، پۈتۈن تېنى تەرلەيدۇ، ئاغزىدىن شال ئاقىدۇ، كالا ئاغزىنى ئېچىپ نەپەس ئالىدۇ، تىلىنى چىقىرىپ تۇرىدۇ، نەپەس ئېلىشتا بەك قىيىنلىدۇ. دەلدەڭشىپ، ئاستا ماڭىدۇ، ئەس-ھۇشى جايىدا بولمايدۇ، قوپماي ياتىدۇ. كۆپ ھاللاردا ئۆپكەننىڭ سۇلۇق ئىشىشى بىللە كۆرۈلۈپ، ئۆپكە-يۈرەك قان ئايلىنىشى توسالغۇغا ئۇچرايدۇ.

ئېغىر كېسەللەنگەن ئەھۋالدا، نېرۋا ۋە يۈرەك، قان تومۇر سىستېمىسى پائالىيىتى قاتتىق قالايمىقانلىشىپ، بىئارام بولۇش، ئۇدۇل كەلگەن يەرگە ئۆزىنى ئۇرۇش. مۇسكۇل دېرىلدەش ۋە تارتىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كالا يېقىلىپ چۈشكەن ھامان ئۆلۈپ قالىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] تومۇز پەسلىدە قوتاننىڭ ئىچى قۇرغاق، ھاۋالىق بولۇشى، كالا مۇۋاپىق ئىشلىتىلىشى، كالىنىڭ ئوزۇغغا تۇز قوشۇپ بېرىلىشى، كالىنى ئىشلىتىش ياكى ئوتلىتىش ئالدىدا قانغۇدەك سۇغىرىش لازىم. سېغىن سىيىرلارنىڭ قوتىنىغا سالقىنداتقۇ ئورنىتىلغان بولۇشى لازىم.

(1) ئۆپكە - يۈرەك فۇنكىتسىيىسى توسقۇنلۇغىنى يەڭگىلەشتۈرۈش، ئۆپكە - يۈرەكنىڭ سېلىغىنى ئازايتىش ئۈچۈن كۆك تومۇردىن 1~2 ل قان قويۇۋېتىلىدۇ. قان قويۇۋېتىلگەندىن كېيىن، كۆك تومۇرغا فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە، ياكى مۇرەككەپ ناترىي خلورىد ئېرىتمىسى، ياكى 5% لىك گلىكوزىلىق تۇز ئېرىتمىسىدىن 1000~2000 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ. يۈرەك فۇنكىتسىيىسى نورماللىغىنى قوغداشقا دىققەت قىلىپ، كامفورا ياكى كوففېين قاتارلىق يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلاردىن تېرە ئاستىغا ھەر سائەتتە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىش كېرەك.

(2) كېسەل كالا بىئارام بولۇپ كەتكەندە تىنچلاندۇرغۇچى دورىلاردىن ئىچكۈزۈلسە بولىدۇ. ئېمەي، شۋېين، شېدى، دىتۇ، ۋېيجيەن پەللىلىرىگە يېڭىنە سانچىسىمۇ ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.

مىڭە ياللۇغى ۋە مىڭە پەردىسى ياللۇغى

مىڭە ياللۇغى بىلەن مىڭە پەردىسى ياللۇغى كۆپىنچە بىرلا ۋاقىتتا پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] باشلانما خاراكتېرىدىكىسى ئاز ئۇچرايدۇ. سىرتتىن كىرگەن مىكرو ئورگانىزىملار ياكى بەدەننىڭ ئۆزىدە پارازىتلايدىغان مىكرو ئورگانىزىملار بۇ كېسەللىكنى پەيدا قىلغۇچى ئاساسىي ئامىللاردۇر. بۇ كېسەللىك يەنە يۇقۇملۇق زۇكام، تۇبېركۇلىوز، چوڭ قاناتلىق ئۆپكە ياللۇغى، يارا خاراكتېرلىق يۈرەك ئىچكى پەردىسى ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئۇلىنىپمۇ پەيدا بولىدۇ.

چوقا سۆڭەك جاراھىتى، مۇڭگۈزنىڭ تۇۋىدىن سۇنۇشى، ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغى قاتارلىقلارنىڭ يامراپ كېتىشى ئارقىسىدەمۇ ئاسانلا بۇ كېسەللىك كېلىپ چىقىدۇ.

مىڭە سىلىكىنىپ كېتىش، بەدەن زىيادە ئىسسىپ كېتىش، ئۇزاق مەزگىل ماشىنا ياكى پاراخوتلاردا توشۇلۇش، كۆكسىپ قالغان ياكى چىرىگەن ئۇزۇق بىلەن بېقىش، زورۇقۇش قاتارلىقلارمۇ بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەپ بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] باشتا كاللىنىڭ ئەس-ھۇشى جايىدا بولمايدۇ، كالا روھسىزلىنىدۇ، قادىلىپ قارايدۇ، ھاڭۋېقىپ قالىدۇ، غەلىتە تۇرۇقتا تۇرىدۇ، كاللىنىڭ سېزىمچانلىغى ئاشىدۇ،

ئاۋاز ۋە يېقىنلىشىشقا قارىتا ئىنكاس قايتۇرۇشى كۈچلۈك بولىدۇ، ماڭغاندا دەلدەكشىيدۇ. ئارقىدىنلا قوزغىلىشى دەۋرىگە ئۆتكەندە، كالا چەكچىيىپ قارايدۇ، قاتتىق مۆرەيدۇ، بېشىنى چايقايدۇ، چاينايدۇ، ئۇدۇل كەلگەن نەرسىگە ئۇسىدۇ، بېشىنى چايقايدۇ، غالجىرلىشىدۇ، بۇ دەۋر ئۇزاققا داۋاملاشمايلا، كالا مۈگىدەش ھالىتىگە ئۆتىدۇ، كۆزنى يېرىم يۇمۇپ ۋە بېشىنى ساڭگىلىتىپ، غەلىتە تۇرۇقتا ھاڭۋېقىپ تۇرىدۇ، بېشىنى كۆتىرىپ، پۇتلىرىنى تىپىرلىتىپ ياتىدۇ.

بەزىدە قىسمەن كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلىدۇ، كۆز مۇسكۇلى تارتىشىدۇ، كۆز ئالمىسى مىدىرلايدۇ، ئالغاي بولۇپ قالىدۇ، كۆز قارچۇغى بىر كېڭىيىپ، بىر تارىيىپ تۇرىدۇ، نۇرغا ئىنكاس قايتۇرۇشى ئاجىز بولىدۇ ياكى ئىنكاس قايتۇرماس بولۇپ قالىدۇ. ئارقىدىنلا چىشلىرى كىرىشىپ قالىدۇ، بويۇن - گەجگىسى تارتىشىپ قالىدۇ، ياكى قىسمەن ئورۇن، بىر ياق ھەتتا پۈتۈن بەدەن پالەچلىنىدۇ.

ئادەتتىكى ئالامەتلەر: بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ، باش قىسمىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئاشىدۇ، ئىشتەيى ناچارلايدۇ ياكى پۈتۈنلەي تۇتۇلىدۇ، ئوزۇقلىنىش نورمالسىزلىشىدۇ. قوزغىلىش مەزگىلىدە نەپەس ئىتتىكىلەيدۇ. تومۇر سوقۇش تۇراقسىز بولىدۇ، ئادەتتە باشتا ئاستا سوقۇپ، كېيىن تېزلىنىدۇ. ئۆچەي - قېرىن ھەركىتى ئاۋازى باشتا كۈچىيىپ، كېيىن ئاجىزلايدۇ ياكى يوقايدۇ، كۆتۈرۈش پۇرىمە مۇسكۇلى دەسلەپتە تارتىشىپ قىسقىرىدۇ،

كېيىن بوشايدۇ. تىزەك تۇتالماس ياكى تىزەكلىيەلمەس بولۇپ قالىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) قاتتىق قۇترىغانلىرىغا خىلور پرومازىن ھەركىگ تەن ئېغىرلىقىغا 2~0 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىنىپ مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىندۇ، ياكى باشقا تىنچلاندۇرغۇچى دورىلار ئىشلىتىدۇ.

(2) كېسەللىكنىڭ دەسلەپتىنلا قوزغىلىش بەك ئېغىر بولسا، كۆك تومۇرىدىن قان قويۇۋېتىلىدۇ. قويۇۋېتىلىدىغان قان مىقدارى مالىنىڭ سېمىزلىكى ۋە كېسەل ئەھۋالىغا قاراپ بېكىتىلىدۇ. روھى چۈشكۈن بولسا، بەدەن تېمپېراتۇرىسى يۇقۇرى بولمىسا، قان قويۇۋېتىلمەيدۇ.

(3) ھۇشسىزلانغانلىرىنىڭ بېشىغا سوغاق سۇ پۇركىلىدۇ، كۆك تومۇرغا 10% لىك ناترىي خلورىد، ياكى 20% لىك گلىكوزا ئېرىتمىسى ئوكۇل قىلىندۇ، پىنىتسىللىن ياكى سۇلفانلامىدلىق دورىلار بىلەن داۋالسىمۇ بولىدۇ.

زەھەرلىنىش

ئومۇمەن زەھەرلىك ماددىلار ھەزىم قىلىش يولى، نەپەس يولى ياكى تېرە ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىپ كېلىپ چىققان كېسەللىك زەھەرلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ. زەھەرلىنىش تولراق مالىنى ئوزۇقلاندۇرغان ياكى ئوتلىتىپ بولغانىدىن كېيىن تۇيۇق-

سز پەيدا بولىدۇ، ئۇنىڭ ئالامەتلىرى ئۆتكۈر بولىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئادەتتە نورمال بولىدۇ، كۆپىنچە ئىبراۋا خاراكتېرلىق ئالامەتلەر بىلەن ئومۇمىي بەدەن فۇنكسىيەسى توشقۇنلۇغى ئالامەتلىرى بىللە كۆرۈلىدۇ.

زەھەرلەنگەن مالغا دىئاگنوز قويۇشتا، كېسەل تارىخى ۋە كىلىنىكىلىق ئالامەتلەرگە ئاساسەن، پاتولوگىيىلىك يېرىپ تەكشۈرۈش، زەھەرلىك ماددا تەركىبىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق توپلانغان ماتېرىياللار ئومۇملاشتۇرۇپ تەھلىل قىلىنىدۇ.

زەھەرلەنگەن مالنى تېز داۋاش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن، زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلار ياكى زەھەرنى شۈمۈرۈۋالغۇچى دورىلارنى دەروو ئىشلىتىپ، زەھەرنىڭ بەدەنگە تارقىلىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم. زەھەرنىڭ شۈمۈرۈلۈش مىقدارىنى ئازايتىش ئۈچۈن زەھەر قايتۇرغۇچى ئارىلاشما دورا ئىشلىتىلسۇمۇ بولىدۇ، مەسىلەن، 500 گ ئاكتىپال كۆمۈر، 250 گ ماگنىي ئوكسىد ۋە 250 گ تانىنن كىسلاتاسىنى ئارىلاشتۇرۇپ، چوڭ كالىغا ھەر قېتىمدا 100~150 گ ئىچكۈ-زۈاسە بولىدۇ. بەزىلىرىگە ئالاھىدە زەھەر قايتۇرغۇچى دورا ئىشلىتىلىدۇ، مەسىلەن، ھىدروسىئاناتىن زەھەرلەنلىرىگە ناترىي سۇلفىت ياكى مېتېلېن كۆك ئوكۇل قىلىنىدۇ. زەھەرلىك ماددىنىڭ كۈچىنى ئاجىزلىتىپ، بەدەندىن چىقىپ كېتىشىنى ئىلگىرلىتىش، كالا تېنىنى كۈچلەندۈرۈش، جىگەرنىڭ زەھەر قايتۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئومۇمىي بەدەنلىك

داۋالاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ، مەسىلەن، كۆك تومۇرغا فېزىئو-
لوگىيىلىك ئېرىتمە، رىنگىر سۇيۇقلۇغى ياكى سىڭىشچان
گلىكوزا ئېرىتمىسى كۆپلەپ ئوكۇل قىلىنىدۇ. تېز قۇتقۇزۇشتا
كېسەللىك ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالانىدۇ، مەسىلەن، يۈرەك
ئاجىزلىغان بولسا يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلار؛ قوزغىلىش -
بىئاراملىق ۋە مۇسكۇل تارتىشىش كۆرۈلسە تىنچلاندۇرغۇچى
دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

زەھەرلىنىش خاراكتېرىدىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى
ئېلىش تەدبىرلىرى: يەم - خەشەكنى تەكشۈرۈپ تۇرۇش ۋە
چارۋا ماللارنى ئىلمىي ئۇسۇلدا بېقىش تۈزۈملىرىنى ئورنىتىش
ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈش، ھەر قېتىم ئوزۇق تۇرىنى ئالماشتۇر-
ۇشتا تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈش، كۆكرىپ سۈپىتى ئۆزگەرگەن
ئوزۇقلارنى بىر تەرەپ قىلغاندىن كېيىن (مەسىلەن، چىلاش،
قاينىتىش ۋە ئىشقارلاشتۇرۇش ئارقىلىق) مالغا بېرىپ كۆرۈش،
ھىچقانداق غەيرى رېئاكسىيە كۆرۈلمىسە، ئاندىن نورمال
مىقداردا بېرىش لازىم. كالىلارغا بېرىلىدىغان يەم - خەشەكنىڭ
ئوزۇقلۇق تەركىبىگە ئەھمىيەت بېرىش، بولۇپمۇ مېنىرال
ماددىلىق ئوزۇقلارنىڭ يېتەرلىك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش
كېرەك. زەھەرلىك ئۆسۈملۈكلەردىن زەھەرلىنىشنىڭ ئالدىنى
ئېلىش ئۈچۈن، كالىلارنى ئوتلاققا ئېلىپ چىقىشتىن ئاۋال
ئوتلاقنى تەكشۈرۈپ كۆرۈپ، زەھەرلىك ئوتلارنىڭ ئۆسۈش
ۋە تارقىلىش ئەھۋالىنى ئىگەللەپ بېقىش كېرەك، زەھەرلىك

ئوت-چۆپ بار جايلاردا كالا بېقىشقا بولمايدۇ. باش ئەتىيازدا كالىلارنى ئوتلاققا ئېلىپ چىقىشتىن ئىلگىرى ئازراق ئوزۇق بېرىپ چالا قوساق قېلىۋېلىش لازىم، ئۇنداق قىلىنمىسا كالىلار ھە دىگەندە يېشىل كۆكنى كۆپ يەۋالىدۇ. دىخانچىلىق دورىلىرى چېچىلغان كۆكتاتلىق ياكى ئېتىزلىقتا كالا باقماسلىق لازىم. قۇرۇت چۈشۈرۈش دورىلىرىنى بېرىشتە مىقدارى ۋە بېرىش ئۇسۇلىنى توغرا ئىگەللەش كېرەك.

سۇكاتتىن زەھەرلىنىش

سۇكاتنىڭ زەھەرلىك تەركىبى بولغان بىئوئىشقارلىق سۇكات توكسىنى سۇكاتنىڭ يىلتىزىدا كۆپ بولىدۇ، ئۇ سۇكات قۇرۇتۇلغاندىن كېيىنمۇ يوقالمايدۇ، ئۇنىڭ زەھەرلەشچانلىقى ناھايىتى كۈچلۈك بولىدۇ، سۇكات يىلتىزىنىڭ تەمى تاتلىق بولىدۇ، كالىلار ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ، شۇڭا كالىلاردا سۇكاتتىن زەھەرلىنىش كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] سۇكات توكسىنى مایىسىمان ماددا بولۇپ، ئۇ كالا بەدىنىگە كىرگەندىن كېيىن تېز شۇمۇرۇلىدۇ ۋە مىڭە بىلەن يۇلۇنغا تەسىر قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن رېڧلېكىسلىق قوزغىلىش كۈچىيىدۇ-دە، كالىنىڭ پۈتۈن بەدىنى كۈچلۈك تارتىشىپ قالىدۇ ۋە نەپەس مەركىزى پالەچلىنىدۇ، نەتىجىدە كالا كۆپىنچە تۇنجۇقۇپ ئۆلىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ئادەتتە بىئارام بولۇش، ئاغزىدىن شال ئېقىش، ئىشتەي تامامەن تۇتۇلۇش، كۆشەش توختاش، ئىچى سۇرۇش، ئارقىدىنلا توتما ۋە قاتما خاراكتىرلىق تارتىش، تۇيۇقسىز يىقىلىپ چۈشۈش، باش-بويىنى كەينىگە تارتىشىپ قېلىش، چىشى كىرىشىپ قېلىش، يۈرەك سوقۇش كۈچىيىش، تومۇر سوقۇش ئىتتىكلەش، نەپەس تېزلەش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كېسەللىكنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە بەدەن تېمپېراتۇرىسى $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ تۆۋەنلەيدۇ، كالا كۆپىنچە نەپەس مەركىزىنىڭ پالەچلىنىشى تۈپەيلىدىن ئۆلىدۇ.

[يېرىپ تەكشۈرۈش] ئۆپكە، يۈرەك مۇسكۇلى ۋە يۈرەك ئىچىكى پەردىسى، بۆرەك توقۇلمىسى ۋە دوۋساق شىللىق پەردىسى قاتارلىق جايلاردا قانلىق چېكىتلەر بولىدۇ. ئۈچەي-قېرىن شىللىق پەردىسىگە ئېغىر دەرىجىدە قان چۈشكەن ۋە ئۇ قاتتىق قانغان، مىڭە پەردىسىگە قان چۈشكەن بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] ئوتلاق ۋە ئوتلاق ئۆيچۆرد-سىدىكى يەرلەرنى تەپسىلى تەكشۈرۈپ، سۇكاتنىڭ ئۆسۈش ۋە تارقىلىش ئەھۋالىنى ئىگەللەش، ياكى ئوتلاقلاردىكى سۇكاتلارنى پىلانلىق تۈردە يوقىتىش، سۇكات بار جايلاردا كالا بېقىشتىن ساقلىنىش لازىم. بۇنىڭدىن باشقا، سۇكات ئارىلىشىپ قالغان ئوت-چۆپ بىلەن كالا بېقىشتىنمۇ ساقلىنىش كېرەك.

(1) زەھەرلىنىش كۆرۈلگەندە، يود ئېرىتمىسى (يود 1 گ.

كالىي يودات 2 گ، سۇ 1500 م ل ئىچكۈزۈلىدۇ، ئارىدىن 2~3 سائەت ئۆتكۈزۈپ يەنە بىر قېتىم ئىچكۈزۈلىدۇ. ياكى بولمىسا يېڭى سۈت ياكى دۇفۇ سۈيى ئىچكۈزۈلىدۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا چوڭ قېرىنى يېرىپ ئىچىدىكى نەرسىلەر چىقىرىۋېتىلىدۇ.

(2) ئۈچەينى تازىلاپ، زەھەرلىك ماددىلارنى چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن ناترىي سۇلفاتتىن 300~500 گ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(3) تارتىش ۋە بىئاراملىقنى پەسەيتىش ئۈچۈن مۇسكۇلغا خلوروپىرومازىنىدىن 300~500 م گ ئۆكۈل قىلىنىدۇ، ياكى ناترىي برومىددىن 10~15 گ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(4) يۈرەك ئاجىزلىغان بولسا، مۇسكۇلغا 10% لىك كوففېين ئېرىتمىسىدىن 20 م ل، ياكى ناترىي كامفورا سۇلفاتتىن 20 م ل ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

ھىدرو سىئانيد كىسلاتاسىدىن زەھەرلىنىش

كالىلار تەركىبىدە سىئانىدلىق ماددىلار بولغان ئاققوناق مايىسى، زىغىر يوپۇرمىقى ۋە زىغىر كۈنجىرىسى قاتارلىقلارنى يىگەندىن كېيىن، كۆپىنچە، زەھەرلىنىپ قالىدۇ. بۇنداق سىئانىدلىق ماددىلار زەھەرسىز بولسىمۇ، ئەمما بەدەندىكى فېرېمېنتلارنىڭ پارچىلىنىشى ۋە تۈز كىسلاتاسىنىڭ رولى ئارقىسىدا زەھەرلىكلىكى كۈچلۈك بولغان ھىدرو سىئانيدقا ئايلىنىپ

كالىنى زەھەرلەيدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] ھىدرو سىئاندى كالا تېنىگە كىرگەندىن كېيىن، سىئاندى ئىئونلىرى ئوكسىدلىغۇچى فېرمىنتلار- نىڭ رولىنى چەكلەيدۇ-دە، توقۇلمىلارنىڭ ئوكسىدلىنىش جەريانى بۇزۇلىدۇ، ماددا ئالماشتۇرۇشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر قاتار كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى كېلىپ چىقىدۇ.

ھىدرو سىئاندى يەنە نەپەس مەركىزى بىلەن قان ئايلىنىش مەركىزىنى پالەچلەندۈرۈپ قويىدىغان بولغاچقا، بۇ ئىككى مەركەزنىڭ فۇنكسىيىسى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ-دە، چارۋا مال تۇنجۇقۇپ ئۆلۈپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كالا كۆپىنچە ئوزۇقلانغاندىن كېيىن كېسەللىنىدۇ، دەسلەپتە روھسىزلىنىش، شال ئېقىش، دەلدەڭشىش، نەپەس قىسىلىش، يۈرەك ئىتتىك سوقۇش، شىللىق پەردە كۆكرىش، مۇسكۇل دىرىلدەش، قوساق كۆپۈش ئالامەتلىرى، بەزىدە سانجىق ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئاخىردا كالىنىڭ پۈتۈن ئەزالىرى ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ، كالا ياتقان ئورنىدىن تۇرمايدۇ، كالىنىڭ كۆز قارچۇغى يوغىناپ قالىدۇ، سېزىمى يوقىلىدۇ، تومۇرى ئاستا سوقىدىغان بولۇپ قالىدۇ، كالا نەپەس توختاپ ئۆلۈپ قالىدۇ.

[يېرىپ تەكشۈرۈش] قان قىزىل پېتى تۇرغان ھەم ياخشى ئۇيۇمىغان، ئېغىز-بۇرنىدىن كۆپۈكلەر ئېقىپ قالغان، كاناي

ۋە كانايچىدا قانلىق چېكىتلەر بولغان بولىدۇ، بەزىلىرىدە ئۆپكە سۇلۇق ئىششىغان، ئۈچەي شىللىق پەردىسى قانلىق ئەزالارنىڭ ئۆزىدىمۇ ئۇششاق قانلىق چېكىتلەر بولغان بولىدۇ. [ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش] تەركىبىدە سىئانلىق ماددىلار بولغان زىغىر كۈنجۈرىسىگە ئوخشاش ئۆسۈملۈك ئوزۇقلىرىنى مۇۋاپىق تەڭشەپ بېرىش كېرەك. كالىلارغا ئاققوناق مايىسى ۋە چىرىگەن بەسەي قاتارلىقلارنى كۆپ بېرىشكە بولمايدۇ. زىغىر كۈنجۈرىسىنى كالىغا بەرگەندە قۇرۇق پېتى بېرىش ۋە يىگۈزۈپ بولغاندىن كېيىنلا كۆپ سۇغارماسلىق لازىم.

(1) 0.5~1% لىك ناترىي نىترىت ئېرىتمىسى ھەرك گ تەن ئېغىرلىقىغا 1 م ل دىن ھىساپلىنىپ كۆك تومۇرغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

(2) 5~10% لىك ناترىي ھىپوسۇلفىت ئېرىتمىسى ھەرك گ تەن ئېغىرلىقىغا 1 م ل دىن ھىساپلىنىپ كۆك تومۇرغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

(3) 0.5~1% لىك مېتىلېن كۆك ئېرىتمىسى ھەرك گ تەن ئېغىرلىقىغا 1~2 م ل دىن ھىساپلىنىپ كۆك تومۇرغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

(4) يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلار، گلىكوزىلىق ياسالما، ۋىتامىنلىق دورىلار يۈرەك ۋە جىگەرنىڭ فۇنكسىيەسىنى ئاسراشتا ئوبدان رول ئوينايدۇ.

ئابدىمىلىك ئۇرۇغى ۋە ئابدىمىلىك كۈنجۈرىسىدىن زەھەرلىنىش

ئابدىمىلىكنىڭ غول-يوپۇرمىغى ۋە ئۇرۇغىدا ئابدىمىلىك ماددىسى ۋە ئابدىمىلىك ئىشقارنى دىگەن زەھەرلىك تەركىپلەر بولىدۇ، ئابدىمىلىك ماددىسىنىڭ زەھەرلىكلىكى ھەممىدىن كۈچلۈك بولىدۇ. كالا ئابدىمىلىك ئۇرۇغىنى، ياكى يۇقۇرى ھارارەتتە بىر تەرەپ قىلىنغان ئابدىمىلىك كۈنجۈرىسىنى ۋە ئابدىمىلىكنىڭ غول-يوپۇرماقلىرىنى يىسە زەھەرلىنىپ قالىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] كالا ئابدىمىلىك ئۇرۇغى ياكى ئابدىمىلىك كۈنجۈرىسىنى يىگەندىن كېيىن، ئابدىمىلىك ماددىسىنىڭ بىر قىسمى قېرىنىدا پارچىلىنىپ كېتىدۇ، يەنە بىر قىسمى بەدەنگە شۇمۇرۇلۇپ قانغا ئۆتىدۇ. دە، تالالىق ئاقسىل ۋە قىزىل قان ھۈجەيرىسى ئۇيۇش ئەھۋالى يۈز بېرىدۇ ۋە ئۈچەي شىللىق پەردىسى قان تومۇرلىرىدا قان ئۆيىمىسى شەكىللىنىپ، قان ئايلىنىش توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. دە، قانغاق ئۈچەي ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا زىيان يەتكۈزگەندە نەپەسلىنىش ۋە قان تومۇر نېرۋا مەركەز-لىرى پالەچلىنىدۇ. دە، كالا ئۆلۈپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ئابدىمىلىك ئۇرۇغى ئارىلاشقان يەم-خەشەكنى يىگەن كالا ئادەتتە 4~12 سائەت ئىچىدە

زەھەرلىنىپ، ئۆچەي-قېرىن ياللۇغى ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، ئىچى سۇرىدۇ، تىزىگى سېسىق ۋە قان ئارىلاش كېلىدۇ. ئىشتىي تۇتۇلىدۇ ۋە كۆشى توختايدۇ، سۈتى توختايدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسىدا كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بولمايدۇ. تومۇر ئىتتىك سوقىدۇ، مۇسكۇل دىرىلدەيدۇ، پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلىنىپ كېتىدۇ، ئۇزاققىچە قوپماي ياتىدۇ، تاشقى تەسىرگە ھېچقانداق ئىنكاس قايتۇرمايدۇ. بوغاز ئىنەكلەر كۆپىنچە بالا تاشلايدۇ. قان تەكشۈرۈلسە، قىزىل قان ئاقسىلى 70% دىن ئاشقان بولىدۇ، قىزىل قان ھۈجەيرىلىرىنىڭ چوڭلۇغى بىر خىل بولمايدۇ، قاننىڭ چۆكۈشى ئىتتىك بولىدۇ.

[يېرىپ تەكشۈرۈش] كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى ئاقىرىپ قالغان، قان ياخشى ئۇيۇمىغان، كانايچىگە كۆپۈك تولۇپ كەتكەن، ئۆپكىگە قان چۈشكەن، يۈرەك قېپىغا سۇيۇقلۇق يىغىلىپ قالغان، يۈرەكنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى پەردىسىدە قانلىق چېكىتلەر پەيدا بولغان، يۈرەك مۇسكۇلى خۇددى پىشۇرۇلغان گۆشتەك بولۇپ قالغان، جىگەرگە قان چۈشكەن ياكى جىگەر دۇغلىشىپ ئىششىغان، بۆرەكتە ئۇششاق قانلىق چېكىتلەر پەيدا بولغان بولىدۇ، پوستلاق بىلەن ئىلىك ماددىسىنىڭ چېگرىسى ئېنىق كۆرۈنىدۇ، ئۆچەي يامرىغاق قانغان، مىڭگە قان چۈشكەن ياكى ئۇ قانغان بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] ئابدىمىلىكىنى كالىغا بېرىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئابدىمىلىك ئۇرۇغى ۋە كۈنجۈرىسىنى كالىغا

بېرىشكە توغرا كەلگەندە، ئۇنى زەھەرسىزلەندۈرۈش لازىم. يەنى ئۇنى 10% لىك ناتىرىي خلورىد ئېرىتمىسىگە 6~10 سائەت چىلاپ، كۆپۈكلەرنى چىقىرىۋېتىپ، پاكىز سۇدا چايقاپ يۇغاندىن كېيىن، ياكى 120°C سۇدا 2 سائەت قاينىتىپ زەھىرىنى يوقاتقاندىن كېيىن كالىغا بەرسە بولىدۇ. بېرىش مىقدارى كالىنىڭ كۈندىلىك ئوزۇغىنىڭ 10~20 پىرسەنتىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم.

(1) ئۈچەي-قېرىنى تازىلاش ئۈچۈن ناتىرىي سۇلفات ياكى ماگنىي سۇلفاتتىن 300~500 گ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(2) زەھەرلىك ماددىنىڭ شۇمۇرۇلۇشىنى ئازايتىش ئۈچۈن ناتىرىي بىكاربوناتتىن 30~50 گ ياكى ھايۋانات كۆمۈرى ۋە ياغاچ كۆمۈرىدىن 100 گ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(3) يۈرەك ئاجىزلىشىپ قالغاندا، مۇسكۇلغا 20% لىك كوففېين ناتىرىي بېنزوناتتىن 20 م ل، ياكى ناتىرىي كامفورا سۇلفاتتىن 20~30 م ل ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

(4) ئېغىر كېسەللەنگەنلىرىدىن ئاۋال 1000~2000 م ل قان قويۇۋېتىلىپ، ئاندىن كۆك تومۇرغا فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىدىن ياكى رىنىگىر سۇيۇقلۇغىدىن 1000~2000 م ل ئۆكۈل قىلىنىدۇ. كۆك تومۇرغا 25%~10 لىك گلىكوزا ئېرىتمىسىدىن 500~1000 م ل ئۆكۈل قىلىنسىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

ئورگانىك فوسفور تەركىپلىك دىخانچىلىق دورلىرىدىن زەھەرلىنىش

ھازىر ئورگانىك فوسفور تەركىپلىك دىخانچىلىق دورىلىرىدىن "1605"، "1059"، "4049"، دىپتېرىكس، ددۇ ۋە روگور قاتارلىقلار كۆپ ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. زىرائەتلەردىكى زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش مەقسىدىدە چېچىلىدىغان بۇ دورىلار زەھەرلىكلىگىنى بىرنەچچە كۈندىن بىرنەچچە ھەپتىگىچە يوقاتمايدۇ، شۇڭا چارۋا مال بۇ خىل دورىلار چېچىلىغان ئۆسۈملۈكنى يەسە زەھەرلىنىپ قالىدۇ.

[كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى] ئورگانىك فوسفوردىن زەھەرلىنىش جەريانى ئاساسەن مۇنداق بولىدۇ: ئۇ، ئاتسېتىلخولىن ئېستېرازىنىڭ ئاكتىپلىغىنى چەكلەپ، ئۇنىڭ ئاتسېتىلخولىننى پارچىلاش ئىقتىدارىنى يوقىتىدۇ. دە، ئاتسېتىلخولىن بەدەندە يىغىلىپ قالىدۇ، نەتىجىدە نەپەس يولى ۋە شۆلىگەي بېزى ئاجراتمىلىرى كۆپىيىپ، كانايچە ۋە مۇسكۇللار تارتىشىپ قالىدۇ، ئارقىدىنلا پالەچلىك، بېھۇشلۇق ۋە نەپەس بوغۇلۇش كېلىپ چىقىپ، ئۇلاق ئۆلۈپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەللەنگەن كالا ماغدۇرسىزلىنىدۇ، بوش نەپەسلىنىدۇ، كاللىنىڭ كۆز قارچۇغى كىچىكلەيدۇ، ئاغزىدىن شال ئاقىدۇ، كالا بەك بىئارام بولىدۇ، كاللىنىڭ قىسمىدىن

جايلىرىنىڭ مۇسكۇلى دىرىلدەيدۇ، ئۈچەي ئاۋازى جاراڭلىق ئاڭلىنىدۇ، كالا پات-پات تىزەكلەيدۇ. ئېغىر زەھەرلەنگەنلىرى خارامۇشلىنىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلەيدۇ، چىشلىرى كىرىشىدۇ، بويىنى قېتىۋالىدۇ، پۈتۈن مۇسكۇللىرى تارتىشىپ قالىدۇ، دەلدەڭشىپ ماڭىدۇ، ھۇشسىزلىنىدۇ، ئاخىردا نەپەس ئەزاسىنىڭ مۇسكۇلى پالەچلىنىشتىن تۇنجۇقۇپ ئۆلىدۇ.

[يېرىپ تەكشۈرۈش] كۆز قارچۇغى كىچىكلىگەن، كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسىدە چاچما قانلىق چېكىتلەر بولغان بولىدۇ. كاناي ۋە كانايچىلارغا ئاق كۆپۈكسىمان سۇيۇقلۇق تولۇپ كەتكەن، ئۆپكەگە قان يىغىلغان ۋە ئۇ سۇلۇق ئىششىغان، كۆكرەك پەردىسىدە چاچما قانلىق چېكىتلەر بولغان، قېرىن شىلىق پەردىسىگە قان چۈشكەن، ئۇنىڭدا چاچما قانلىق چېكىتلەر بولغان بولىدۇ. جىگەرگە، بۆرەككە قان يىغىلغان بولىدۇ. ئاز ساندىكىلىرىنىڭ يۈرەك تاشقى پەردىسىدە قانلىق چېكىتلەر بولغان، يۇمشاق مىڭە پەردىسىگە قان چۈشكەن ۋە ئۇ سۇلۇق ئىششىغان بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) پىرالوكسىمى مېتىئودىن كالىنىڭ ھەرك گ تەن ئېغىرلىغىغا 20~30 م گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە بىلەن 2.5% لىك سۇيۇقلۇق تەييارلاپ، كۆك تومۇرغا ئاستا ئۆكۈل قىلىنىدۇ. 2~3 سائەت ئۆتكەندە يەنە بىر قېتىم ئۆكۈل قىلىنىدۇ، كېسەللىك ئالامەتلىرى يەڭگىللەشكەندىن كېيىن

- دورا مىقدارىنى ئەھۋالغا قاراپ ئازايتسا بولىدۇ.
- (2) تېرە ئاستىغا 1% لىك ئاتىروپىن سۇلغاتىشنى ئامال ئۆكۈل قىلىنىشىمۇ بولىدۇ.
- (3) كالا بەك بىئارام بولۇپ كەتكەندە، خلوروپىروماتىن باكى بروم ياسالىملىرى ئىشلىتىلىدۇ.
- (4) جىگەرنى ئاسراپ، زەھەرنىڭ سىرتقا چىقىرىلىشىنى نېزىلىتىش ئۈچۈن، كۆك تومۇرغا 10~25% لىك گلىكوزا ئېرىتمىسىدىن 500~1000 م ل ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

5. تاشقى كېسەللەكلەر


جاراھەت

ئورگانىزىمنىڭ توقۇلما ياكى ئەزالىرىغا تاشقى كۈچنىڭ تەسىرىدە زەرەر يېتىش بىلەن بىللە تېرە ياكى شىلىق پەردە ئوچۇق زەخمىلىنىش جاراھەت دەپ ئاتىلىدۇ. جاراھەتنىڭ ھەر- قايسى قىسىملىرى ئايرىم-ئايرىم ھالدا جاراھەت ئەتراپى، جاراھەت قىرى، جاراھەت يۈزى، جاراھەت ئىچى ۋە جاراھەت تېگى دىگەن ناملار بىلەن ئاتىلىدۇ.

جاراھەت پەيدا بولغان ۋاقىتقا ۋە يۇقۇملانغان-يۇقۇلمانمى- خانىلىقىغا قاراپ يېڭى جاراھەت ۋە يىرىڭلىق يۇقۇملانغان جارا- ھەت دىگەن ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ.

جاراھەت يەنە پەيدا بولۇش سەۋىيىسىگە قاراپ سانچىلغان جاراھەت، كېسىلگەن جاراھەت، سوقۇلغان جاراھەت، يېرىلغان جاراھەت، تېپىلگەن جاراھەت ۋە چىشلەنگەن جاراھەت دىگەن- لەرگە بۆلۈنىدۇ. مەيلى قايسى خىلدىكى جاراھەت بولسۇن، ئۇ يا يېڭى بولىدۇ، يا يىرىڭلىق يۇقۇملانغان بولىدۇ. كېسىلگەن يېڭى جاراھەت يىرىڭلىمىغان بولسا، ئۇ يېڭى جاراھەت ھىساپ-

لىنىدۇ؛ پەيدا بولغىنىغا ئۇزاق بولغان ۋە يۇقۇلمىسىنىڭ پىرىگىلىمىسى بولسا، ئۇ يۇقۇملانغان جاراھەت ھىساپلىنىدۇ.



30- رەسىم جاراھەتنىڭ ھەرقايسى قىسىملىرىنىڭ نامى

1. جاراھەت قىرى 2. جاراھەت يۈزى 3. جاراھەت تېگى
4. جاراھەت ئىچى 5. جاراھەت ئەتراپى

[كېسەللىك ئالامەتلىرى]

(1) ئاغزى ئېچىلىپ قېلىش، قاناش، ئاغرىش ۋە فۇنكىتسىيە توسقۇنلۇغى قاتارلىقلار يېڭى جاراھەتنىڭ ئاساسىي ئالامەتلىرىدۇر.

ئاغزى ئېچىلىپ قېلىش: جاراھەت قىرى ئايرىلىپ تۇرىدۇ، بۇنىڭ چوڭ- كىچىكلىكى زەخمىلەنگەن توقۇلمىسىنىڭ ئورنى، خاراكتىرى ۋە زەخمىلىنىش سەۋىيىسىگە باغلىق بولىدۇ.

قاناش: بۇ يېڭى جاراھەتنىڭ ئاساسىي ئالامىتى ھىساپلىنىدۇ. قاناش دەرىجىسى جاراھەتلەنگەن جايغا، جاراھەت ئاغزىنىڭ چوڭلۇغى ۋە چوڭقۇرلۇغىغا، قان تومۇرىنىڭ زەخمىلىنىش ئەھۋالىغا ھەم قاننىڭ ئۇيۇشىغا بېقىپ ھەر خىل بولىدۇ. زەخمىلەنگەن جايدا قان تومۇر كۆپ بولسا، جاراھەت ئاغزى چوڭ

ۋە چوڭقۇر بولسا، چوڭراق قىزىل تومۇر ياكى كۆك تومۇر زەخ-
مىلەنگەن بولسا، قاننىڭ ئۇيۇشى ياخشى بولمىسا، قان كۆپ چىقىدۇ.
ئاغرىش: ئاغرىش توقۇلما ۋە ئەزالار زەخمىلىنىش بىلەن
بىرگە جايلىق سەزگۈ نېرۋىلىرىنىڭ زەخمىلىنىشى، غىدىقلىنىشى
ياكى بېسىلىشىدىن پەيدا بولىدۇ. ئاغرىش دەرىجىسى جاراھەت-
لەنگەن جايدىكى نېرۋىلارنىڭ جايلىشىشى، سېزىمچانلىقى ۋە
جاراھەتنىڭ خاراكتىرىغا قاراپ ھەر خىل بولىدۇ. جاراھەتلەنگەن
جايدا سەزگۈ نېرۋىلىرى كۆپ بولسا، ئۇنىڭ ئاغرىقتا بولغان
سېزىمچانلىقى يۇقۇرى بولىدۇ (مەسىلەن، تۇياق تاجىسى،
سۆڭەك پەردىسى، تاشقى جىنىسى ئەزا، پۇرۇك، كۆكرەك-
قوساق پەردىلىرىنىڭ تېمى قاتارلىقلار). نېرۋا بىۋاسىتە زەخمىلەن-
گەن بولسا، ئاغرىق ئالامىتى روشەن بولىدۇ.

فۇنكىتسىيە توسقۇنلۇغى: زەخمىلەنگەن توقۇلمىلارنىڭ
فۇنكىتسىيىسى بىر خىل بولمىغاچقا، فۇنكىتسىيە توسقۇنلىغىمۇ ھەر
خىل بولىدۇ. نېرۋىلار زەخمىلەنگەندە سېزىم يوقىلىدۇ ياكى
ھەركەت پالەچلىكى كېلىپ چىقىدۇ، مۇسكۇل ياكى پەيلەر زەخ-
مىلەنگەندە ھەركەت توسقۇنلۇغى پەيدا بولىدۇ.

ئېغىر ۋە چوڭ جاراھەتلەردە جايلىق ئالامەتلەر كۆرۈلگەندىن
باشقا ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلەرمۇ كۆرۈلىدۇ. قان كۆپ
چىقىپ كەتسە ئۆتكۈر كەمقانلىق، سۇسىزلىنىش، قاتتىق ئاغرىش
ھەتتا شۈكۈك كېلىپ چىقىدۇ.

(2) يىرىڭلىق يۇقۇملانغان جاراھەتتە، يېڭى جاراھەتتە

كۆرۈلىدىغان ئالامەتلەردىن باشقا، يىرىڭلىق ياللۇغنىڭ تەرەق-
قىياتىغا ئاساسەن، يىرىڭلاش مەزگىلى ۋە ئەت ئۆرۈش مەزگىلى
بولدۇ (ئادەتتە قان چىقمايدۇ).

يىرىڭلاش مەزگىلى (يىرىڭلىق جاراھەت): جاراھەت قىرى
ۋە يۈزى ئىششىدۇ، قىزىرىدۇ، جاراھەت دائىرىسىنىڭ تېمپېرا-
تۇرىسى ئۆرلەيدۇ، جاراھەت ئاغزىدىن يىرىڭ ئاقىدۇ. بەزىدە
ياللۇغنىڭ زىيانلىق ۋە زەھەرلىك ماددىلىرى بەدەنگە شۇمۇرۇل-
گەنلىكتىن بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەشتەك ئالامەتلەر
كۆرۈلىدۇ.

ئەت ئۆرۈش مەزگىلى (ئەت ئۆرۈيدىغان جاراھەت):
يىرىڭلىق ياللۇغنىڭ قايتىشىغا ئەگىشىپ، جاراھەت ئىچىدە يېڭى
ئەت توقۇلمىلىرى ئۈنۈشكە باشلايدۇ، ئەت توقۇلمىسىنىڭ
رەڭگى ئۇپا رەڭ، شەكلى تەكشى، دانىچىلاردەك خېلى قاتتىق
بولىدۇ ۋە ئۆپچۆرىسىدە قويۇق، سۇر ئاق، ئازراق يىرىڭ
بولىدۇ.

ساغلام ئەت توقۇلمىلىرى مۇستەھكەم توساق بولۇپ، ئۇ
جاراھەتنىڭ داۋاملىق يۇقۇملىنىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. يامان
سۈپەتلىك ئەت توقۇلمىلىرى ناھايىتى چۈرۈك، رەڭگى ئاق،
يۈزى سىلىق، ئۈستى يالتىراق بولىدۇ ۋە ئۇ يىرىڭ بىلەن
قاپلىنىپ تۇرىدۇ، جاراھەتنىڭ ئۈستىكى تېرىسى ئاستا يېتىلىدۇ،
شۇڭا جاراھەت تەستە ساقىيىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] جاراھەتنىڭ ئۆزىنى داۋالاش

بىلەن ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاشنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. جاراھەتنىڭ ئۆزىنى ئوبدان بىر تەرەپ قىلىش بىلەن بىرگە ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاشقىمۇ دىققەت قىلىش، ئورگانىزىمنىڭ ياشاشچانلىقى بىلەن قوغدىنىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، جاراھەتنىڭ يۇقۇملانۇشى ۋە زەھەرلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. نۇقتىلىق ھالدا يېڭى جاراھەتنىڭ يۇقۇملانۇشىدىن ساقلىنىش، يىرىڭلىق يۇقۇملانغان جاراھەتنىڭ شەلۋەرىنى تىزىش، زەھەرلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، جاراھەتنىڭ پۈتۈشكە تەسەر قىلىدىغان ئامىللارنى تۈگىتىش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا، بېقىش-باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، بەدەننىڭ كېسەللىككە قارشى ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش، ئەت-توقۇملارنىڭ ئۇنۇشكە مەدەت بېرىپ، تەكرار ئۇنۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ ۋە قوغداپ، قوشۇلما كېسەللىك-لەردىن ساقلىنىش كېرەك.

(1) يېڭى جاراھەتنى داۋالاش ئۇسۇلى:

(1) جاراھەتنى تېز بىر تەرەپ قىلىش: جاراھەتتىن قان چىقىش ئەھۋالىغا قاراپ قان توختىتىلىپ، قاننىڭ كۆپ چىقىپ كېتىشىنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. ئوپىراتسىيە ۋاقتىدىكى قان توختىتىش ئۇسۇلى قوللىنىلغاندىن باشقا، جاراھەت قېنىنى توختىتىش دورىلىرى ۋە ئومۇمىي بەدەنلىك قان توختىتىش دورىلىرى بىلەن قان توختىتىلىدۇ.

(2) جاراھەت ئەتراپىنى تازىلاش: جاراھەت ئىچىگە مەينەت

نەرسىلەر كىرىپ كەتمەسۇن ئۈچۈن، جاراھەت ئىچىگە باكتېرىيە-
سىزلىنىدۇرۇلگەن داكا قاپلاپ قويۇپ، جاراھەت ئەتراپىدىكى
يۇڭلارنى قايچىلاپ، جاراھەت ئەتراپى سۈپۈنلەپ پاكىز يۇيۇلىدۇ.
5% لىك يودىنىمكتۇرىسى سۈركەپ دېزىنفېكسىيە قىلىنغاندىن
كېيىن، داكا ئېلىپ تاشلىنىدۇ.

(3) جاراھەت ئىچىنى تازىلاش: جاراھەت ئىچىنى سايماق ۋە
دورا سۈيى بىلەن ئادالەت يۇيۇش ئۇنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈن
ياخشى شارائىت يارىتىپ بەرگەنلىك بولىدۇ. شۇڭا ئاۋال جارا-
ھەت ئىچىدىكى يات ماددىلار، قان لەختىلىرى ۋە ئۆلگەن توقۇل-
مىلارنى جۈپتەك (موچىن) بىلەن چىقىرىۋېتىش، جاراھەت
قىرىنى تۈزەپ تەكشىلەش كېرەك. ئاندىن فېزىئولوگىيىلىك
ئېرىتمە ياكى 0.1% لىك رېۋانول، 0.05~0.01 لىك برومو-
گېرام، 10% لىك ماگنىي سۇلفات ئېرىتمىلىرى بىلەن پاكىز
يۇيۇش كېرەك (دورا سۈيىنى قاتتىق بېسىم بىلەن قۇيۇشقا
بولمايدۇ).

(4) جاراھەت ئىچىگە دورا سېپىش: جاراھەتنى يۇيۇپ تازى-
لىغاندىن كېيىن، ئىچىگە پېنىتسىللىن پاراشوگى، ياكى سۇلفا-
نىلامىد پاراشوگى، ياكى يودفورم-سۇلفانىلامىد پاراشوگى (1:9)
سېپىلىدۇ.

(5) جاراھەتنى تىكىش ۋە تېگىش: يۈزى بىرقەدەر تەكشى
بولغان، بىرىنچى باسقۇچتىلا پۈتۈپ قېلىش ئېھتىمالى بولغان
جاراھەتنى تىكىپ، ئاندىن تېگىپ قويسا بولىدۇ (ئاياق جاراھەت-
تە).

لىرى ئوراپ، گەۋدە جاراهىتى تۈگۈنلەپ تېگىلىدۇ.

6) توقۇلمىنىڭ زەخمىلىنىشى ئېغىر بولغان ياكى تېگىپ قويۇشقا بولمايدىغان جاراهەت ئىچىنى ئاۋال تازىلاپ دېزىنفېكسىيە قىلىپ، ئاندىن چىرىشكە قارشى ھول تېگىمىق سېلىپ قويۇش، ياكى جاراهەت ئىچىگە خۇڭشاڭسەن دورىسى، چىرىشنى چەكلەپ، ئەت ئۇندۇرۇش دورىسى، ياكى سەدەپ دورىسى قاتارلىقلارنى سېپىش لازىم.

رېتسېپ: خۇڭشاڭسەن دورىسى

قىزىل گىل 4 مىسقال، پالما يىلىمى 3 مىسقال، كۆيدۈرۈلۈ-
گەن گەج 4 مىسقال، بورنېئول 3 مىسقال، قەدىمى
ھايۋانات سۆڭىكى 5 مىسقال، مەستىكى رۇمى 5 مىسقال،
مۇرمەككى 5 مىسقال، كات ھىندى 4 مىسقال، پىل تېرىسى
3 مىسقال

بۇلار سوقۇپ تالقان قىلىنىپ، قۇتىغا سېلىپ قويۇلىدۇ.
رېتسېپ: چىرىشنى چەكلەپ، ئەت ئۇندۇرۇش دورىسى
سىماپ پاراشوگى 5 مىسقال، مەستىكى رۇمى 5 مىسقال،
مۇرمەككى 5 مىسقال، كات ھىندى 3 مىسقال، قەدىمى
ھايۋانات سۆڭىكى 3 مىسقال، نۆشۈدۈر 2 مىسقال
بۇلار سوقۇپ تالقان قىلىنىپ، قۇتىغا سېلىپ قويۇلىدۇ.
رېتسېپ: سەدەپ دورىسى

خۇڭفېن 5 مىسقال، سىماپ پاراشوگى 5 مىسقال، گەنشېن
1 جىڭ، سەدەپ 6 مىسقال، بورنېئول 5 مىسقال
بۇلار سوقۇپ تالقان قىلىنىپ، قۇتىغا سېلىپ قويۇلىدۇ.

(2) يىرىڭلىق يۇقۇملانغان جاراھەتنى داۋالاش ئۇسۇلى:

(1) يىرىڭلىق جاراھەتنى داۋالاش ئۇسۇلى:

جاراھەت ئەتراپىنى تازىلاش: يېڭى جاراھەتنى تازىلاش

ئۇسۇلىغا ئوخشاش.

جاراھەت ئىچىنى تازىلاش: فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە ياكى

0.1% لىك مارگانسوپ ئېرىتمىسى بىلەن جاراھەتنى يۇيۇپ،

ئىچىدىكى يات ماددىلارنى چىقىرىپ، يىرىڭنى پاكىز تازىلاپ،

ئۆلگەن توقۇلمىلارنى قويماي ئېلىۋېتىش لازىم. يىرىڭنى پاكىز

تازىلاش مۇمكىن بولمىسا، جاراھەت تۆشۈگىنىڭ ئۇدۇلىدىن

(قارشى تەرىپىدىن) تۆشۈك ئېچىپ ياكى جاراھەتنىڭ ئاغزىنى

چوڭايتىپ يىرىڭنى قويماي چىقىرىۋېتىش لازىم.

جاراھەت ئىچىنى يۇيۇش: دورا سۇيۇقلۇقى بىلەن جاراھەت

ئىچىنى قايتا-قايتا چايقاپ يۇيۇپ، يىرىڭنى قويماي چىقىرىۋې-

تىش لازىم. كۆپ ئىشلىتىلىدىغان دورا سۇيۇقلۇقلىرىدىن

0.1~0.2% لىك مارگانسوپ ئېرىتمىسى، 10% لىك ماگنىي

سۇلفات ئېرىتمىسى، 10% لىك قويۇق تۇز سۈيى، 0.1% لىك

رىئانول ئېرىتمىسى، 3% لىك ھىدروگېن پېرئوكسىدات ئېرىت-

مىسى، 20% لىك ماگنىي سۇلفات-فۇراتسىلىن ئېرىتمىسى

(0.1% لىك 100 م ل فۇراتسىلىن ئېرىتمىسىگە 20 گ ماگنىي

سۇلفات قوشۇلىدۇ) قاتارلىقلار بار.

ئېقىتىش: جاراھەتنى يۇيۇپ تازىلىغاندىن كېيىن، دورا

سۈيىگە چىلانغان داكا پىلىگىنىڭ بىر ئۈچىنى جاراھەتنىڭ

ئىچكىرىسىگە تەقىپ، يەنە بىر ئۇچىنى جاراھەت ئاغزىدا قالدۇ-
رۇپ ساڭگىلىتىپ قويۇش لازىم. كېيىن يىرىڭلاش ئەھۋالىغا
قاراپ، كۈندە ياكى كۈن ئارىلاپ بىر قېتىم يۇيۇش ۋە يىرىڭنى
ئېقىتىش لازىم. ياللۇغ يەڭگىللەپ، يىرىڭ كۆرۈنەرلىك ھالدا
ئازايغاندا، يۇيۇش ۋاقتى ئۇزارتىلسا ياكى يىرىڭنى ئېقىتىش
توختىتىلسا بولىدۇ. يىرىڭنى ئېقىتقىلى بولمايدىغان جاراھەتنى
پاكىز يۇيۇپ، ئۈستىگە خۇڭشاڭسەن دورىسى، چىرىشنى چەك-
لەپ، ئەت ئۈندۈرۈش دورىسى ۋە سەدەپ دورىسى قاتارلىقلارنى
سېپىپ ئوچۇق قويۇپ داۋالاش كېرەك. مارگانىسوپنى ئېزىپ
سېپىپ داۋالسىمۇ بولىدۇ.

ئۆتكۈر ياللۇغ يېنىپ، يىرىڭلاش پەسەيگەندە، ئەت ئۈندۈ-
رۈش ئۈچۈن، پىكىس لىكۇيدا-يودفورم مەلھىمى (پىكىس
لىكۇيدا 5 گ، يودفورم 3 گ، ئابدىمىلىك يېغى 100 م ل)،
يودفورملۇق ئابدىمىلىك يېغى (يودفورم 1 گ، ئابدىمىلىك يېغى
100 م ل ۋە ئازراق يود تىنكتۇرسى قوشۇلىدۇ) ياكى ۋىتامىنلىق
ياسالماقلارنى جاراھەت ئىچىگە قۇيۇش ياكى داكنى مۇشۇ
دورىلارغا چىلاپ يىرىڭنى ئېقىتىش لازىم.

يىرىڭلىق جاراھەت بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىن ئادەتتە
تاڭماي ئوچۇق داۋالىنىدۇ، يىرىڭنى توختاپ يېڭى ئەت ئۈن-
گەندە، ئەت ئۆرۈيىدىغان جاراھەتنى داۋالاش بويىچە
داۋالىنىدۇ.

(2) ئەت ئۆرۈيىدىغان جاراھەتنى داۋالاش ئۇسۇلى: بۇ

يىرىڭلىق جاراھەتنى داۋالاشنىڭ داۋامى، بۇنىڭدا، ئاساسەن، ئەت توقۇلمىلىرىنىڭ ئۆسۈشى تېزلىتىلىدۇ ۋە ئۇ قوغدىلىدۇ، جاراھەت قىرىدىكى ئۈستىكى تېرىنىڭ يېڭىدىن ئۆسۈشى ئىلگىرى تىلىدۇ، ھارام ئەتنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. غىدىقلاش تەسىرى ئاجىز ۋە ۋىتامىنلىق ياسالمىلار ئىشلىتىلىدۇ. مەلھەم، مايلىق ئېرىتمە، ئىمۇلسىيە ياكى سۈرتىمە ياساپ جاراھەتكە سۈرتىلىدۇ. جاراھەتنى غىدىقلاش تەسىرى كۈچلۈك دورا بىلەن يۇيۇشقا بولمايدۇ، ئادەتتە 2~3 كۈندە بىر قېتىم دورا يەڭگۈشلىنىدۇ. دائىم ئىشلىتىلىدىغان دورىلاردىن 10% لىك سۇلفانىل-مىدىلىق بېلىق مېيى (سۇلفادىئازىن 10 گ، بېلىق مېيى 86 م ل، سالىسىل كىسلاتاسى 4 گ، پىكس لىكۇيدا-يودفورم مەلھىمى، 5% لىك تۇز دۇغى-بېلىق مېيى مەلھىمى، 10%~5 لىك دىپتېرىكس مەلھىمى قاتارلىقلار بار. كېيىنكى ۋاقىتلاردا سولفا-نىلامىد مەلھىمى، پېنىتسىللىن مەلھىمى چاپلىنىدۇ. كالىنىڭ ئۆز قېنى بىلەن تېڭىق سېلىپ ياكى ئۆز قېنىنى جاراھەتكە قۇيۇپ داۋالسىمۇ بولىدۇ.

جاراھەت قىرىدا ئۈستىكى تېرىنىڭ ئۆسۈپ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن سىنىڭ ئوكسىدلىق سالىسىل كىسلاتاسى مەلھىمى، سالىسىل كىسلاتاسىلىق سۇلفانىلامىد مەلھىمى ئىشلىتىلىدۇ. جاراھەت ئىچى ئەت ئۆرۈپ جاراھەت قىرىغىچە يەتكەندە، چېرىشكە قارشى قورۇغۇچى دورىلاردىن 1:9 ھەسسىلىك يود-فورمىلىق كۆمۈر پاراشوگى، يودفورم، ئاكتىپ كۆمۈر ياكى

تائىننى كىسلاتاسى قاتارلىقلار جاراھەتكە سېپىلسە، جاراھەت قەھەچلىنىپ تېز ساقىيىدۇ.

ھارام ئەت ئۆسۈپ قالسا، كۆكتاش بىلەن كۆيدۈرۈش، ياكى مارگانسوپ پاراشوگىنى سېپىپ يوقىتىش، زۆرۈر تېپىلغاندا ئۆتكۈر قوشۇق بىلەن قىرىپ ياكى كېسىپ چىقىرىۋېتىش كېرەك. (3) ئومۇمى بەدەنلىك داۋالاش ۋە ئاسراش: توقۇلمىنىڭ زەخىملىنىشى ئېغىر بولغان ياكى قاتتىق بولغانغان يېڭى جاراھەتكە، ياكى بەك يېرىڭلاپ كەتكەن ۋە ئومۇمى بەدەنلىك رېئاكسىيە بەرگەن جاراھەتكە قارشى ئۆز ۋاقتىدىلا مۇسكۇلغا پېنىتسىللىن ۋە سترېپتومىتىن ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى سۇلفانىل-مىدلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. جاراھەت چۆرىسىگە پېنىتسىللىنلىق پروكاين چۆرىدەپ ئوكۇل قىلىنىشىمۇ بولىدۇ.

قان كۆپ چىقىپ كەتسە ۋە جاراھەتنىڭ پۈتۈشى ئاستا بولسا، سۇيۇقلۇق تولۇقلىنىدۇ. ئورگانىزىمنى زەھەرلىنىشتىن ساقلاش ئۈچۈن كۆك تومۇرغا 5% لىك ناترىي بىكاربونات سۇيۇقلۇغىدىن 200~300 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ، كۈنىگە بىر قېتىمدىن ئۇدا 3~5 كۈن ئوكۇل قىلىنىدۇ. ياللۇغنى قايتۇرۇپ، زەھەرنى ياندۇرغۇچى دورىلار ئىچكۈزۈلىشىمۇ بولىدۇ.

رېتسېپ:

قالقانگۈل 1 سەر 6 مىسقال، خۇاڭبو 1 سەر 6 مىسقال،

ئۇچقات 1 سەر 3 مىسقال، ئوسما يىلتىزى 1 سەر 3

مىسقال

بۇلار يۇمشاق سوقۇپ تەييارلىنىپ، كۈندە 1~2 قېتىمىدىن
ئۇدا 5~6 كۈن ئىچكۈزۈلىدۇ.
جاراھەتلەنگەن مالنى ياخشى ئاسراش جاراھەتنىڭ يۈتۈ-
شىنى تېزلىتىشنىڭ مۇھىم شەرتى، جاراھەتلەنگەن جايىنى غىدىق-
لىنىش، تەكرار جاراھەتلىنىش ۋە يۇقۇملاندىنىشتىن ساقلاش،
ئومۇمىي بەدەن ھالىتىگە ئەھمىيەت بېرىش، بېقىش-باشقۇرۇشنى
كۈچەيتىش، ئورگانىزىمنىڭ كېسەلگە قارشى ئىقتىدارىنى ئاشۇ-
رۇش كېرەك.

يىرىڭلىق ئىششىق

يىرىڭلىق ياللۇغتىن پەيدا بولغان يىرىڭنىڭ توقۇلما ئىچىگە
يىغىلىپ، مۇكەممەل يىرىڭ كاۋىكىنى ھاسىل قىلىشى يىرىڭلىق
ئىششىق دەپ ئاتىلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى]

يىرىڭلاتقۇچى باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؛ ئاساسەن
ئۇزۇمسىمان شارچە باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ئاندىن قالسا
زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە، چوڭ ئۇچەي تاياقچە باكتېرى-
يىسى ۋە چىرىتكۈچى باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنداق
ئىششىق باكتېرىيىلەرنىڭ ئادەتتە تېرە جاراھىتى ئاغزىدىن
كىرىشى بىلەن، ياكى باشقا يىرىڭلىق ياللۇغلارغا ئۇلىنىپ پەيدا
بولىدۇ.

توقۇلمىنىڭ چىرىپ ئېرىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ؛ تولاراق كۈچلۈك غەدىقلىغۇچى دورىلار (كالتسىي خلورىد، خلورال ھىدرات، "914"، ئىسكىپىدار ۋە سىڭىشچان ناتىرىي خلورىد ئېرىتمىسى) نىڭ توقۇلما ئىچىگە خاتا قۇيۇلۇشىدىن ياكى تۆكۈلۈپ كېتىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يىرىڭلىق ئىششىق باشتا ئۆتكۈر ياللۇغ بىلەن باشلىنىدۇ، كېيىن ياللۇغ ئوچىغىدا قاننىڭ ئايلىنىشى ۋە توقۇلمىلارنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. دە، ئاق قان ھۈجەيرىلىرى ۋە توقۇلمىلار چىرىپ ۋە ئېرىپ سۇيۇقلۇققا — يىرىڭغا ئايلىنىدۇ، يىرىڭنى ئەت توقۇلمىسىدىن شەكىللەنگەن يىرىڭ قېپى ئورنىتىلىدۇ ۋە ئۇنى ئەتراپىدىكى توقۇلمىلاردىن ئايرىپ تۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن يىرىڭ ئۆپچۆرىسىگە تارقىلىپ كېتەلمەيدۇ. يىرىڭلىق ئىششىق پىشقاندىن كېيىن، يىرىڭ ئۆز ۋاقتىدا سىقىپ چىقىرىۋېتىلىمىسە، يارا ئۆز-لۈگىدىن ئېغىز ئېلىپ كېتىدۇ ياكى توقۇلمىنىڭ ئىچكىرىسىگە قاراپ كېڭىيىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى]

يۈزە يىرىڭلىق ئىششىق: بۇ تېرە ئاستى يۇمشاق توقۇلمىسىدا كۆپ پەيدا بولىدۇ، دەسلەپتە ئۆتكۈر ياللۇغ كۆرۈلۈپ، كېسەللەنگەن جاي قىزىپ ئاغرىيدۇ، يامرىغاق، چېگرىسى بىلىنمەيدىغان ئىششىق پەيدا بولىدۇ، بىرنەچچە كۈندىن كېيىن ئۇ تەدرىجى ھالدا چەكلىك دائىرىگە مەركەزلىشىپ، قولغا قاتتىق بىلىنىدىغان بولىدۇ، ئىششىقنىڭ ئوتتۇرىسى بارا-بارا يۇمشاپ،

مىلقلايدىغان بولۇپ قالدۇ (يىگنە سانچىلىرىنىڭ چىقىدۇ).
تېرە ئاستا-ئاستا نېپىزلەيدۇ، تۈكلەر چۈشۈپ كېتىدۇ، ئانىدىن
يارا ئۆزلۈگىدىن ئېغىز ئېلىپ، يىرىنىڭ ئېقىپ چىقىدۇ ئېغىز
ئالغان تۆشۈك كىچىك بولۇپ قالسا، ئىچىدىكى يىرىنىڭ تولۇق
چىقالمايدۇ. دە، كۆپ ھاللاردا ئۇ ئاقما يارا (سۆش) غا ئاي-
لىنىپ كېتىدۇ، شۇڭا يارا تۆشۈگىنى ۋاقتىدا يوغانلىتىپ، يىرىنى
تولۇق چىقىرىۋېتىش كېرەك.

تېرەن يىرىنلىق ئىششىق: بۇ تولاراق سېرىغەت ئاستى ياكى
توقۇلمىلارنىڭ ئىچكىرى قەۋىتىدە كۆرۈلىدۇ. ئىششىق قېلىن
توقۇلمىلار بىلەن يېپىلىپ تۇرغانلىقتىن، ئۇنى ئۆتكۈر ياللۇغ
مەزگىلىدە كۆرگىلى بولمايدۇ. ئىنچىكىلەپ تەكشۈرۈلسە،
ئىششىق پەيدا بولغان جاينىڭ تېرىسى ۋە تېرە ئاستى توقۇلمى-
سىنىڭ بوش ئىششىغانلىقى بىلىنىدۇ ھەمدە بېسىپ كۆرۈلسە
ئاغرىيدۇ ۋە ئىز قالىدۇ، لېكىن ئۇ مىلقىلمايدۇ. بۇنىڭغا يىگنە
سانچىپ كۆرۈش ئارقىلىق دىئاگنوز قويغىلى بولىدۇ.

سوزۇلما خاراكتېرلىق يىرىنلىق ئىششىق خېلى ئۇزۇنغا داۋام
قىلىدۇ، ياللۇغلۇق ئۆزگىرىشى ئېنىق بىلىنمەيدۇ، ئىششىق ۋە
روشەن مىلقلاش كۆرۈلىدۇ.

توقۇلمىنىڭ ئىچكىرى قىسمىدا چوڭراق يىرىنلىق ئىششىق
كۆرۈلسە، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەش، ئىشتەي تۇتۇلۇش،
روھى ھالەت ناچارلاش، نەپەس ئېلىش ۋە تومۇر سوقۇش
ئىتتىكىلەش، ئاق قان دانچىلىرى كۆپىيىپ كېتىشتەك ئومۇمىي

بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] بېقىش - باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، مال تېنىنىڭ تازىلىغىغا ئەھمىيەت بېرىش، ئوكۇل سېلىشتا قاتتىق دېزىنڧېكسىيە قىلىش، غىدىقلاش تەسىرى بار دورىلارنى قان تومۇرىنىڭ سىرتىغا كەتكۈزۈپ قويماسلىق لازىم.

ئىششىق يېڭى پەيدا بولغاندا ئىششىق قايتۇرۇش چارىلىرىنى قوللىنىپ، ئۇنىڭ يىرىڭلىق ئىششىققا ئايلىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئىششىقنىڭ كېيىنكى مەزگىلىدە ياللۇغنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئۇنى تېز پىشلىدۇرۇش، ئاندىن يېرىپ يىرىڭنى چىقىرىۋېتىپ، يىرىڭنىڭ باشقا ساق توقۇلمىلارغا تارقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. شۇنداقلا لايىق دەرىجىدە ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئورگانىزىمنىڭ كېسەللىككە قارشى ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش كېرەك.

(1) ئەمدىلا ئىششىغان جايغا يۇڭنى قىرغىچ دېزىنڧېكسىيە قىلغاندىن كېيىن ئىششىق ۋە زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلارنى سۈرتۈش، ياكى ئىششىغان ئورۇنغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش لازىم، ياكى بولمىسا ئىششىق ئەتراپىنى چۆرىدەپ %0.25 لىك پروكاينىلىق پىنىتسىللىن ئوكۇل قىلىنىشىمۇ بولىدۇ.

رېتسېپ: مۇرەككەپ قوغۇشۇن ئاتسېتات (ئاندىرىس دورىسى)

قوغۇشۇن ئاتسېتات 100 گ، زەمچە 50 گ، كامفورا 20

گ، يالپۇز 10 گ، كاۋلىن 820 گ

بۇلار ئاچچىقسۇ ياكى تۇز سۈيى قوشۇپ بوتقا قىلىنىپ،
ئىششىقتا چېپىلىدۇ.

رېتسېپ: زەرىنىخ دورىسى

زەرىنىخ 2 مىسقال، خۇاڭجۈ 2 سەر، بورنىئۇل 1 مىسقال
بۇلار تالقان قىلىنغاندىن كېيىن ئاچچىقسۇ ياكى ئىسپىرت
قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇلۇپ ئىششىقتا چېپىلىدۇ.

(2) بىرىنچى رېتسېپ بويىچە 3~5 كۈن داۋالغاندىن كېيىن
ياللۇغ يانمىسا، ئىختىيول ياكى كامفورا مەلھىمىدىن چاپلاپ
قويۇلسا، ياكى بولمىسا ئىسپىرتلىق ئىختىيول بىلەن ئىسسىق
ئۆتكۈزۈپ بېرىلسە، يارا تېز پىشىپ ئېغىز ئالىدۇ.

(3) ئاخىرقى مەزگىلدە ئىششىق مىلقلاپ پىشىدۇ، بۇ چاغدا
ئۇنىڭ ئۆزلۈكىدىن ئېغىز ئېلىشنى كۈتمەي، ئوپىراتسىيە قىلىپ
يىرىڭنى چىقىرىۋېتىش لازىم.

يىرىڭنى شىپىرىس بىلەن چىقىرىش: بۇ ئۇسۇل بوغۇم، قان
تومۇر، نېرۋا ياكى مۇھىم ئەزالارنىڭ يېنىدىكى يىرىڭلىق
ئىششىقلارنىڭ يىرىڭنى چىقىرىشقا باپ كېلىدۇ. بۇنىڭدا شىپىر-
رىس ئارقىلىق يىرىڭ شوربۇلىنغاندىن كېيىن، فىزىئولوگى-
يىلىك ئېرىتمە بىلەن يارا ئىچىنى يۇيۇش، ئاندىن ئۇنى يەنە
ئىشپىرىس بىلەن شوربۇلىپ، يارا ئىچىگە ھەر مىلدا 5000 بىرلىك
پېنىتسىلىن بار سۇيۇقلۇقنى كىرگۈزۈش لازىم.

يىرىڭلىق ئىششىقنى يېرىش: ئىششىغان جايىنىڭ يۇڭىنى
قاچچىلاپ، ئىششىقنى يۇيۇپ، دېزىنفېكسىيە قىلىپ بولغاندىن

كېيىن، يېرىڭنى چىقىرىش ئاسان بولغان يۇمشاق جايىدىن يېرىش كېرەك. ئىششىق چوڭراق بولۇپ، بىرەر تۆشۈكتىن يېرىڭنى تولۇق چىقىرىشقا بولمىسا، يەنە بىر قوشۇمچە تۆشۈك ئېچىش كېرەك. يېرىڭ تولۇق چىقىرىلغاندىن كېيىن، يات ماددا ياكى چىرىگەن توقۇلمىلارنى تولۇق چىقىرىپ، يېرىڭلىق جارا-ھەتنى داۋالاش ئۇسۇلى بويىچە بىر تەرەپ قىلىش لازىم.

(4) ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلگەندە، ئانتىبىيوتىك ۋە سۇلفانىلامىدلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ ياكى ناترىي بىكاربونات بىلەن داۋالانىدۇ. جۇڭىي دورىلىرىدىن ياللۇغ-زەھەر قايتۇرىدىغان دورىلار ئىچكىزۈلۈشمۇ بولىدۇ.

رېتسېپ: زەھەر قايتۇرغۇچى ليەنچاۋ دورىسى
ليەنچاۋ، ئۇچقات، ئاچچىق تاۋۇز يىلتىزى تالقىنى،
دىدىڭ، مامكاپ، خۇاڭياۋزى، بەيياۋزىلار 1 سەردىن،
يالپۇز ۋە جىڭجىيې گۈلى 5 مىسقالدىن، جۇخۇا گۈلى 3
مىسقال، كەترا 1 سەر، قالقانگۈل 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا
3 مىسقال

بۇلار سوقۇپ تالقان قىلىنىپ، قايناق سۇغا چىلاپ ئارىلاش-تۇرۇلۇپ، سوۋۇغاندا ئىچكىزۈلىدۇ. موزايلارغا يېرىم ھەسسە ئازايتىپ بېرىلىدۇ.

ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغى

يۇمشاق بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلار (مەسىلەن، تېرە ئاستى،

سېرىغەت ئاستى، مۇسكۇل ئارىسى قاتارلىقلارنىڭ ئۆتكۈر، يام-
رىغاق، يىرىڭلىق ياللۇغى ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغى دەپ
ئاتىلىدۇ. بۇ تولاراق بويۇن، يەلكە، پاچاق ۋە قوساق ئاستىدا
كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] بۇ، ئاساسەن، يىرىڭلاتقۇچى باكتېرى-
يىلەر ياكى چىرىتكۈچى باكتېرىيىلەرنىڭ يۇقۇشىدىن پەيدا
بولىدۇ. ئادەتتە تېرە جاراھىتى ئاغزىدىن باكتېرىيىنىڭ كىرىشى،
ياكى ئوكۇل قىلغاندا دېزىنڧېكسىيە قاتتىق بولمىغانلىقتىن
باكتېرىيىلەرنىڭ بىرىكتۈرگۈچى توقۇلما ئىچىگە كىرىشى نەتى-
جىسىدە كېلىپ چىقىدۇ. يىرىڭلىق ئىششىق ۋە يىرىڭلىق جارا-
ھەتكە ئۇلىنىپمۇ كېلىپ چىقىدۇ. قان ياكى لىمفاننىڭ يۇقۇملى-
نىشىدىن، ياكى خوشنا جايىدىكى كېسەللىك ئوچىغىنىڭ كېڭىيى-
شىدىن پەيدا بولۇشىمۇ مۇمكىن.

تېرە ئاستىغا كۈچلۈك غىدىقلىغۇچى ياكى چىرىتكۈچى دورىلار
(ئىسكىپىدار، خلورال ھىدرات، سىڭىشچان ناترىي خلورىد
ئېرىتمىسى قاتارلىقلار) نى ئوكۇل قىلىشتىنمۇ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەللەنگەن ئورۇن قاتتىق
ئاغرىيدۇ، ئۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ. ئىششىق دائىرىسى
كەڭ بولسا، ئەتراپىدا سۇلۇق ئىششىق بىللە پەيدا بولىدۇ،
فۇنكتسىيە توسقۇنلۇغى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇ-
رىسى ئۆرلەش، روھى ناچارلاش، ئىشتەي تۇتۇلۇش، نەپەس
ئېلىش ۋە تومۇر سوقۇش ئىتتىكلەش، ئاق قان دانىچىلىرىنىڭ

سانى كۆپىيىش قاتارلىق ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.
بۇنداق ياللۇغ كلىنىكىدا چەكلىك ياللۇغ ۋە يامرىغاق
ياللۇغ دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ.

چەكلىك ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغىدا: كۆپىنچە كىچىكرەك
دا ئىرىدە بىرنەچچە يىرىڭلىق ئوچاقلار شەكىللىنىدۇ. دەسلەپتە
قىزىق، ئاغرىشلىق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، بۇ باشتا قاتتىقراق
بولىدۇ، تېرە چىڭقىلىدۇ، كېيىن ئىششىق يىرىڭلىق ئىنقىلىرات-
لارنىڭ شەكىللىنىشىگە ئەگىشىپ يىرىڭلاپ ۋە يۇمشاپ مىلىق-
لايدۇ، ئاخىرىدا ئېغىز ئالىدۇ.

يامرىغاق ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغىدا: باشتا چەكلىك ھۆكۈ-
نەك توقۇلما ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، كېيىن ئۇ تېز
تەرەققىي قىلىپ، كەڭ كۆلەملىك، قىزىپ ئاغرىدىغان ئىششىققا
ئايلىنىدۇ، ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، بەدەن تېم-
پېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ. ئاياقلارنىڭ تۆۋەن قىسمىدا ھۆكۈنەك
توقۇلما ياللۇغى كۆرۈلگەندە، ئاياقنىڭ ھەممە يېرى قىزىپ،
ئاغرىپ، قاتتىق ئىششىيدۇ، كېسەل مال ھەتتا پۇتنى يىغالمىي
قالىدۇ، ئېغىر دەرىجىدە ئاقساق قالىدۇ. كېيىنچە بىرنەچچە
ئورۇندا يىرىڭلىق ئىششىق پەيدا بولىدۇ ۋە ئۇ ئۆزلۈكىدىن
ئېغىز ئالىدۇ.

چىرىتكۈچى ۋىرۇسلار بىلەن يۇقۇملانغاندا، چىرىش خاراكت-
تىرلىق ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغى پەيدا بولۇپ، كېسەللىك
تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ، توقۇلمىلار چىرىيدۇ، يىرىڭ چىرىپ پارچە-

لىنىپ، سېسىق پۇراق چاچىدۇ، تېرىنىڭ ئۇ يەر-بۇ يېرى تېشىلىپ يىرىك ئاقىدۇ، ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىنمىسا، كۆپ ھاللاردا يىرىكلىق سېتىسېمىيە كېلىپ چىقىدۇ. ھۆكۈمەت توقۇلما ياللۇغى سوزۇلمىغا ئايلانغاندا، ئىششىق ئاستا-ئاستا يېنىپ، تېرە ئاستى بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلار ئۆسىدۇ، تۈكلەر يىرىكلىشىدۇ، تېرە قېتىۋالىدۇ ۋە ئەۋرىشمىلىگىنى يوقىتىدۇ، ئاخىردا تېرە قېلىنلاپ كېتىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] ئالدىنى ئېلىش ئۇسۇلى يىرىك-لىق ئىششىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇسۇلىغا ئوخشاش.

(1) ئىششىغان ئورۇننى بىر تەرەپ قىلىش: يۇڭنى قىرغىچ، دېزىنفېكسىيە قىلىپ، يوقۇم مەنبەسى بولۇپ قالغان جاراھەت تولۇق بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. دەسلەپتە سىڭىشچان ماگنىي سۇلفات ياكى 0.1% لىك رىئانول ئېرىتمىسى سوغاق پېتى يېقىلىدۇ. ئاچچىقسۇدا ئىشلەنگەن مۇرەككەپ قوغۇشۇن ئاتسېتات ياكى زەرىنخ سىرتقا چېپىلىدۇ ھەمدە 0.25% لىك پروكاينىلىق پېنىتسىللىن كېسەللىك ئۆچمىگىنىنىڭ ئەتراپىغا ياكى ئاياقلاردىكى پەللىلەرگە چۆرىدەپ ئۆكۈل قىلىنىدۇ. ئۆتكۈر ياللۇق بىر ئاز قايتقاندىن كېيىن، سىرغىتمىلارنىڭ شۇمۇرۇلۇشى ياكى تارقىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن، ئىسسىق نەرسە يېقىش ياكى ئاچچىقسۇدا ئىشلەنگەن مۇرەككەپ قوغۇشۇن ئاتسېتات (ياكى زەرىنخ) نى سىرتتىن چېپىش لازىم. ياللۇغ ئۈچ ئېلىپ، توقۇلمىنىڭ ئىچكى بېسىمى ئېشىپ كەتسە، راسا مىلىقلاپ

تۇرغان جايدىن يېرىپ، ئىچىدىكى ياللۇغلۇق سرغىتىلار ۋە يىرىڭنى چىقىرىپ، توقۇلمىنىڭ ئىچكى بېسىمىنى پەسەيتىش لازىم. ۋاقتىدا يېرىلمىسا، يىرىڭ ئەتراپىغا تاراپ، توقۇلمىلار ئاسانلا ئېغىر دەرىجىدە چىرىپ كېتىدۇ. يارغاندىن كېيىن، ئىچىدىكى يىرىڭنى پاكىز چىقىرىۋېتىپ، ئۆلگەن توقۇلمىلارنى تازىلاپ، ئىچىنى ئوبدان يۇيۇپ، يۇقۇملانغان يىرىڭلىق جارا-ھەتنى بىر تەرەپ قىلغاندەك بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

(2) ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاش: جايلىق داۋالغاندىن باشقا، دەسلەۋىدىلا پېنتىسىللىن، سترېتومىتسىن ياكى سۇلفا-نىلامىدلىق دورىلار بىلەن ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاش، ياكى بولمىسا كۆك تومۇرغا 5% لىك ناترىي بىكاربونات ئېرىتمىسىنى ئوكۇل قىلىش، زۆرۈر تېپىلغاندا سۇيۇقلۇق تولۇقلاش، يۈرەكنى كۈچەيتىش ئارقىلىق يۈرەك فۇنكسىيەسىنى ياخشىلاش ۋە زەھەرنى قايتۇرۇش كېرەك.

(3) جۇڭگىي دورىسى بىلەن داۋالاش: زەھەر قايتۇرغۇچى لىيەنچاۋ دورىسى ئىچكۈزۈلىدۇ (يىرىڭلىق ئىششىققا قارالسۇن)، ياكى سىرتتىن زەرىنىخ دورىسى چېپىلىدۇ.

رېتسېپ: زەرىنىخ دورىسى

زەرىنىخ، رەۋەن، بەيجىز ۋە ئاچچىق تاۋۇز يىلتىزى

تالىقىنى 1 سەردىن، كاۋاۋىچىن ۋە چايانئوت 5 مىسقالدىن

بۇلار تالقان قىلىنغاندىن كېيىن ئاچچىقسۇ قوشۇپ تەييار-لىنىپ، ئىششىققا سۈرتۈلىدۇ.

رېماتىزىم

رېماتىزىم شامال، سوغاق، ھۆللۈك تېگىش نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدىغان، مۇسكۇل، پەي، بوغۇم قاتارلىق ئورۇنلاردا بولىدىغان ئاغرىشلىق كېسەللىك بولۇپ، تۇيۇقسىز پەيدا بولۇش، ئاسانلا قوزغىلىش، ئاغرىق كۆچۈپ تۇرۇش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. بۇ كېسەللىك ئۆلكىمىزدە باش ئەتىياز، كەچ كۈز ۋە قىشتا كۆپرەك يۈز بېرىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىۋى] كېسەللىك سەۋىۋى تېخى ئانچە ئېنىق ئەمەس. بەدەن ئاجىزلاش، قوتان زەي تارتىش، ئوغرى شامال تېگىشتىن ئاسان پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى]

بويۇن رېماتىزىمىدا: تولاراق بويۇننىڭ ئىككى يان مۇسكۇلى ئاغرىيدۇ، مال باش-بويىنى سوزۇپ تۇرىدۇ، بويىنى يېنىغا قايرىيالمايدۇ، ئىگىشىپ چۆپ يىيەلمەيدۇ. بويۇننىڭ بىر ياق مۇسكۇلى كېسەللەنگەندە، مال بويىنى بىر تەرەپىگىلا بۇرىيالايدۇ، بويۇن قىغىر تۇرىدۇ. ئاغرىق تەرەپنىڭ مۇسكۇلى قولغا قاتتىق بىلىنىدۇ.

دۈمبە-بەل رېماتىزىمىدا: مال دۈمچىيىپ تۇرىدۇ، دۈمبىنىڭ ئۇزۇن مۇسكۇلى بىلەن سۆڭەكچە مۇسكۇلى چىڭقىلىپ قاتىدۇ، بەلنىڭ ئىنسانى قايىتۇرۇشى گالىشىدۇ، مالنىڭ ھەركىتى

ئاستىلايدۇ، دۈمبە-بېلى تۈگۈلۈپ قالىدۇ، مال ئارقا ئايقلارنى
(تۇياق ئىلگىچى بىلەن يەر دەسسەپ) سۆرەپ ماڭىدۇ، تېز بۇرۇ-
لالمايدۇ؛ كۆپ ياتىدۇ، ياتقان ئورنىدىن تەستە تۇرىدۇ، بەزىدە
ئىنجىقلايدۇ.

ئاياق مۇسكۇللىرى رېماتىزىمىدا: تولاراق يەلكە ۋە كاسا
مۇسكۇللىرى كېسەللىنىدۇ، مالىنىڭ ئايقلارغا ئېغىرلىق چۈشۈ-
رۇشى ۋە قەدەم تاشلىشى غەيرىلىشىدۇ. مال دەلدەگۈشپ قاتمال
قەدەم تاشلايدۇ، كېسەل ئايىغىنى تەستە كۆتىرىدۇ، ئالدى
قەدىمىنى قىسقا ئالىدۇ، ئايىغىنى كۆتىرىۋېلىپ ئاقساق ماڭىدۇ،
بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىن ئاقساقى يېنىكلەيدۇ ياكى يوقىلىدۇ.
ئاقساقى يۆتكىلىپ تۇرىدۇ ۋە ھاۋانىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ
بىر كۈچىيىپ، بىر يېنىكلەشىدۇ، بەزىدە ئالدى ئايىغى ئاقسىسا،
بەزىدە كەينى ئايىغى ئاقسايدۇ، بەزىدە سول ئايىغى ئاقسىسا،
بەزىدە ئوڭ ئايىغى ئاقسايدۇ.

كېسەللەنگەن جاينىڭ مۇسكۇللىرى ئاغرىيدۇ (تۇتسا ئىنكاس
قايتۇرىدۇ)، چىڭقىلىدۇ ۋە قېتىۋالىدۇ.

ئاياق بوغۇمى رېماتىزىمى: بۇ تولاراق مۇسكۇل رېماتىزىمى
بىلەن تەڭ پەيدا بولىدۇ، ئادەتتە سىمىتىرىك ھالدا كۆرۈلىدۇ،
كۆپىنچە مۇرە بوغۇمى، يانپاش بوغۇمى ۋە ئوشۇق بوغۇملىرىدا
كۆرۈلىدۇ.

بوغۇم خالىتىسىدا شىرىقلىق ياكى شىرىقلىق-تالالىق سىرغىت-
مىلار پەيدا بولىدۇ، بوغۇم روشەن ھالدا يوغىنىلىدۇ، بوغۇم

ھەركىتى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ. كېسەل مال ماڭغاندا قىيىنلىق، ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە ئاقىپ ماڭىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى 40°C دىن ئېشىپ كېتىدۇ، تومۇر سوقۇش، نەپەس ئېلىش ئىتتىكلەيدۇ. كېسەل تەكرار قوزغىلىپ تۇرىدۇ، ئاغرىق كۆپىنچە باشقا بوغۇملارغا كۆچىدۇ.

رېماتىزم سوزۇلمىغا ئايلىنغاندا، ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلەر ئېنىق بىلىنمەيدۇ، مۇسكۇلنىڭ ئەۋرىشمىلىگى تۆۋەنلەيدۇ، مۇسكۇل تەدرىجىي ھالدا قاتتىقلىشىدۇ ياكى يىگىلەيدۇ. كېسەللىك ئېغىرلاشقاندا، بوغۇمدا تالالار چاپلىشىپ قالىدۇ ۋە شەكىل ئۆزگىرىشى كۆرۈلىدۇ، ئاسانلىقچە ساقايمايدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش] ئاساسەن ياللۇغنى قايتۇرۇپ، ئاغرىقنى بېسىش، يەنى ھەيدەپ، ھۆللۈكنى يوقىتىش، جىگىملەرنى راۋانلاشتۇرۇش پىرىنسىپى بويىچە داۋالىنىدۇ. داۋالاش بىلەن بىللە ئاسراش كۈچەيتىلىپ، كېسەل مال مۇۋاپىق دەم ئالدۇرۇلىدۇ ۋە ئىسسىق تۇتۇلىدۇ، سوغاق ۋە نەملىكتىن قوغداپ، كۆپرەك ھەركەتلەندۈرۈلىدۇ ۋە ئاپتاپ سىندۇرۇلىدۇ.

(1) سالىسىل كىسلاتا ياسالمايلىرى بىلەن داۋالاش: 10%

لىك ناترىي سالىسات ئوكۇلى، سالتىروپىن ئوكۇلى، سالىسىل كالتسىي برومىت ئوكۇلى ۋە ئوسمىن ئوكۇلى قاتارلىقلار كۆك تومۇرغا ھەر قېتىمدا 100~150 م ل دىن كۈندە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ، 5~7 كۈن بىر قارار داۋالاش ۋاقتى بولىدۇ. 10% لىك ناترىي سالىسات ئېرىتمىسى بىلەن مالنىڭ ئۆز قېنىنى

تەڭ مىقداردا ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، كۆك تومۇرغا ئوكۇل قىلىشمۇ بولىدۇ، ياكى 5% لىك كالتسىي گلىكوناتتىن 250 م ل ئېلىپ كۆك تومۇرغا ئايرىم-ئايرىم ئوكۇل قىلىشمۇ بولىدۇ. 0.5%~0.25 لىك پروكاين ئېرتىمىسىنى كۆك تومۇرغا توسما ئوكۇل قىلىشمۇ ئوبدان ئۈنۈم بېرىدۇ.

موزايىلار رېماتىزىمىدا كۆك تومۇردىن ئوكۇل سېلىش تەس بولغاندا، مۇسكۇلغا 30% لىك ئانالىگىن ياكى مۇرەككەپ ئامىنوپىرىن ئېرتىمىسى 10~20 م ل دىن كۈندە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. بۇنى چوڭ كالىلارغا قوللىنىشقىمۇ بولىدۇ. (2) پوستلاق ھورمۇنلىرى بىلەن داۋالاش: بۇنىڭدا تۆۋەندىكى دورىلار تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ.

(1) 2.5% لىك كورتسون ئاتسېتاتنىڭ دۇغلۇق ئېرتىمىسى مۇسكۇلغا ئۇدا 3~5 كۈن ئوكۇل قىلىنىدۇ (ھەر قېتىمىدا 10~40 م ل دىن كۈندە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ). (2) 5% لىك گلىكوزا ئېرتىمىسىگە 0.5% لىك ھىدروكورت-سون ئېرتىمىسىدىن ھەر قېتىمىدا 160~40 م ل قوشۇپ تولۇق ئارىلاشتۇرۇپ، كۆك تومۇرغا كۈندە بىر قېتىمىدىن ئۇدا 3~5 كۈن ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(3) 5% لىك گلىكوزىلىق تۇز سۈيىگە ياكى گلىكوزا ئېرتىمىسىگە 0.5% لىك ھىدروكورتسون ئېرتىمىسىدىن ھەر قېتىمىدا 160~20 م ل قوشۇپ، كۈندە بىر قېتىمىدىن كۆك تومۇرغا ئۇدا 3 كۈن ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(3) جۇڭىي دورىلىرى بىلەن داۋالاش:

(1) دۈمبە-بەل رېماتىزىمىدا دۇخۇ-دېنىق دورىسى ئىچكۈ-زۈلىدۇ.

رېتسېپ:

دۇخۇ، دېنىق 1 سەردىن، چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتيانا 8
مىسقال، كەۋرەك 5 مىسقال، ئاسارون 3 مىسقال، داڭگۈي
5 مىسقال، ئاق چوغلۇق 5 مىسقال، پۇراقلىق يىلتىز
مىسقال، خام ئەگرى سۇناي 6 مىسقال، دۇجۇڭ 6 مىسقال،
لىپەكگۈل 7 مىسقال، قان تېپەر 8 مىسقال، چۆپچىنى 7
مىسقال، دارچىن 5 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 5 مىسقال

بۇلارنى سوقۇپ تالقانلاپ، قايناق سۇغا چىلاپ تەڭشەپ،
سوۋۇغاندا ئىچكۈزۈلىدۇ. موزايغا 3 كە بۆلۈپ ئىچكۈزۈلىدۇ.
(2) ئاياق رېماتىزىمىدا جىڭلولارنى راۋانلاشتۇرۇش دورىسى
ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

كەتسرا 1 سەر، داڭگۈي 7 مىسقال، ئاق چوغلۇق 7
مىسقال، كۈلى بېيىسى 6 مىسقال، لىپەكگۈل 6 مىسقال،
باجىتەن يىلتىزى 8 مىسقال، بالدېرغان 8 مىسقال، جىن
كۈنسى 8 مىسقال، مۇنۇڭ 8 مىسقال، ياۋا كەشمىر 8
مىسقال، يالپۇز 8 مىسقال، ئۈجمە شېخى 1 سەر، لىڭشەن
1 سەر

بۇ دورىلارنى ئىشلەتكەندە، ئالدى ئاياق ئاغرىسا دارچىن
شېخى، دۇجۇڭ، ئارقا ئاياق ئاغرىسا چۈەندۈەن، لىپەكگۈل:

بەل ئاغرىسا چۈەندۈەن، كۈلى بېيىسى كۆپرەك قوشۇلىدۇ.
بۇلارنى يۇمشاق سوققاندىن كېيىن قايناق سۇغا چىلاپ،
سوۋۇغاندا ئىچكۈزۈلىدۇ، موزايغا 4 كە بۆلۈپ بېرىلىدۇ.

(4) يىگنە سانچىپ داۋالاش:

يەلكە رېماتىزىمىدا: يەنجى، جىيەنچىەن، جۇڭۋەن، شياۋەن،
جۇڭبو قاتارلىق پەللىلەرگە يىگنە سانچىلىدۇ.

دۈمبە-بەل رېماتىزىمىدا: بەيخۇي، شېنيۇ پەللىلىرىگە
يىگنە سانچىلىدۇ.

سان-ساغرا رېماتىزىمىدا: داكۋا، شياۋكۋا، شياۋجۈەن،
خۇتۇڭبو قاتارلىق پەللىلەرگە يىگنە سانچىلىدۇ.

كۈندە ياكى كۈن ئارىلاپ بىر قېتىم (4~6 كۈن بىر قارار
داۋالاش ۋاقتى بولىدۇ)، ئۇدا 2~6 قارار داۋالىنىدۇ. ھەر
قارارلىق داۋالاش ئارىلىغىدا 2~3 كۈن دەم ئالدۇرۇلىدۇ.

(5) جايلىق ئورۇنغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ داۋالاش:

ئاچچىقسۇ ۋە ھاراق بىلەن ئىسسىق ئۆتكۈزۈش ئۇسۇلى: بۇ
ئۇسۇل بەل-دۈمبە رېماتىزىمىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ. كېسەل مال
4 تۈۋرۈكلۈك داردا بېكىتىلىدۇ. سەردىن بەيخۇي پەللىسىگىچە
بولغان ئىككى ياق جەينەك ئۈستى تۈز سىزىقنىڭ ئۈستىگە
ئاچچىقسۇ پۈركۈلۈپ، يۇڭى نەمدىلىنىدۇ، ئۈستىگە ئاچچىقسۇغا
چىلانغان سامان قەغەز يېپىلىدۇ، قەغەز ئۈستىگە ئاق ھاراق
ياكى 70% لىك ئىسپىرت پۈركۈلىدۇ، ئاندىن ئوت يېقىپ كۆي-
دۈرۈلىدۇ. ئاچچىقسۇ قۇرۇپ كەتسە يەنە ئاچچىقسۇ پۈركۈلىدۇ.

ئوت ئاجىزلاپ قالسا، پاختىنى ئىسپىرتقا چىلاپ، قەغەز ئۈس-
تىگە جۈپتەك بىلەن ئىسپىرت سۈرتۈلىدۇ، ئوت كۈچەيتىپ
تۇرۇلىدۇ، بۇنى تاكى مال تەرلىگىچە داۋاملاشتۇرۇپ، ئاندىن
مالغا تاغار يېپىپ، ئۈستىدىن ئاغامچا بىلەن باغلاپ، مال
ئىسسىق قوتانغا كىرگۈزۈپ قويۇلىدۇ. بۇ ئۇسۇل قىش ۋە باش
ئەتىيازدا، كەچ كۈزدە قوللىنىشقا باپ كېلىدۇ. لېكىن تېنى
ئاجىز، قېرى، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ كەتكەن ۋە بوغاز
ماللارغا بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىشقا بولمايدۇ.

جايلىق ئورۇنغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش: ھاراق تىرىپى ياكى
كېپەكنى قورۇپ، ئۇنى ئاچچىقسۇ ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن خالتا
ياكى تاغارغا قاچىلاپ، كېسەللەنگەن جايغا قويۇپ، ئۈستىگە
سۇلياۋ يېپىپ ۋە ئاغامچا بىلەن تېگىپ قويۇش، ھەر كۈنى 2~
قېتىم شۇنداق قىلىش لازىم. بۇ ئۇسۇل بەل-دۈمبە ۋە ساغرا
مۇسكۇلى رېماتىزمنى داۋالاشتا ئوبدان ئۈنۈم بېرىدۇ.

بوغۇم سىلىقلاتقۇچى پەردە ياللۇغى

بۇ بوغۇم سىلىقلاتقۇچى پەردە قەۋىتىنىڭ سرغىتىمىلىق
ياللۇغى بولۇپ، سىلىقلاتقۇچى پەردىگە قان چۈشۈش ۋە ئۇ
ئىششىش، روشەن ھالدا سرغىتىمىلار پەيدا بولۇش، بوغۇم
بوشلۇغى شىرىقلىق ياكى شىرىقلىق-تالالىق سرغىتىمىلارغا
تولۇپ كېتىش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. بۇ خىل ياللۇغ تولاراق

ئوشۇق بوغۇمى، تىز بوغۇمى ۋە بېغىش بوغۇمىدا كۆرۈلىدۇ.
[كېسەللىك سەۋىيىسى] تولراق ھەر خىل مېخانىكىلىق زەخ-
مىلىنىشتىن پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن، مالىنى ئىگىز-پەس ئۆت-
لاقتا بېقىشتىن، پۇتلىشىپ ياكى تېپىلىپ يىقىلىش، قاتتىق
تېپىش قاتارلىقلاردىن پەيدا بولىدۇ؛ بوغۇملارنىڭ تولغۇشى،
سوقۇلۇشى ۋە چىقىپ كېتىشىدىنمۇ پەيدا بولىدۇ.
پاراتىپ، تارقىلىشچان زۇكام، برۇتسېللو، سۆڭەك يۇمشاش
ۋە رېماتىزىم كېسەللىكلىرى جەرياندىمۇ ئاسانلا پەيدا بولىدۇ.
[كېسەللىك ئالامەتلىرى]

بوغۇم سىلىقلاتقۇچى پەردىنىڭ ئۆتكۈر ياللۇغىدا: بوغۇم
خانىسى چىڭقىلىپ كۆپىدۇ، سىرتىغا چىقىپ قالىدۇ، ھەر خىل
چوڭلۇقتا ئىشىشىدۇ. تۇتۇپ كۆرۈلسە، ئىسسىق بىلىنىدۇ، مىدد-
رايدۇ، مال ئاغرىقسىنىدۇ. بوغۇم مىدىرلىتىلسا ئاغرىغانلىق
ئىپادىسى روشەن كۆرۈلىدۇ. بوغۇم بوشلۇغى تېشىپ كۆرۈلسە،
ئىچىدىن سەل دۇغلۇق ياكى ساغۇچ سۇيۇقلۇق چىقىدۇ، ئۇ
تېز قاتنىدۇ. مال ئۆرە تۇرغاندا ئاغرىق ئايىغىنى ئېگىپ، بەدەن
ئېغىرلىغىنى پۇتغا بوش چۈشۈرۈپ تۇرىدۇ، ئىككىلا ئايىغى تەڭ
كېسەللەنگەن بولسا، مال بەدەن ئېغىرلىغىنى ئاياقلىرىغا ئالماش-
تۇرۇپ چۈشۈرۈپ تۇرىدۇ. ماڭغاندا ئايىغىنى بوش ياكى ئوتتۇرا
ھال تىرەپ ماڭىدۇ ياكى يۆتكەپ ئاقساق ماڭىدۇ. ئادەتتە
ئومۇمىي بەدەنلىك ئۆزگىرىش كۆرۈلمەيدۇ.
بوغۇم سىلىقلاتقۇچى پەردىنىڭ سوزۇلما ياللۇغى: بۇ،

كۆپىنچە، ئۆتكۈر خاراكتېردىكىسىنىڭ راۋاجىدۇر، بەزىلىرى پەيدا بولغاندىن تارتىپلا سوزۇلما خاراكتېردا ئۆتىدۇ. بوغۇم بوشلۇغىغا سرغىتىملار كۆپلەپ يىغىلىدۇ، بوغۇم خالتىسى ئىچىگە قىلىپ كۆپىدۇ، يوغىناپ قالىدۇ. تۇتۇپ كۆرۈلسە، روشەن ھالدا مىدىرايدۇ، ئەمما بوغۇم ئاغرىمايدۇ ۋە قىزمايدۇ. تېشىپ كۆرۈلسە، ئىچىدىن نورمال ۋاقىتتىكىدىن شالاڭ، رەڭسىز ياكى سەل ساغۇچ سۇيۇقلۇق چىقىدۇ، ئۇ ئاسانلىقچە ئۇيۇمايدۇ، شۇڭا ئۇ بوغۇمغا سۇ يىغىلىش ياكى بوغۇمنىڭ سۇلۇق ئىششىغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدا ئاساسەن ھەركەت توسقۇنلۇغى ئېنىق كۆرۈل-مەيدۇ، بوغۇم ھەركىتى مەلۇم چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ، مال ئاسان چارچايدۇ. بوغۇم بوشلۇغىدىكى سرغىتىملار كۆپىيىپ قالغاندا، مال بوش ئاقساق قېلىشى مۇمكىن.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) ئۆتكۈر ياللۇغنىڭ بېشىدا، سرغىتىملارنىڭ چىقىشىنى توساش ئۈچۈن، بوغۇم سىرتىغا سوغاق سېغىز توپا لېيى چاپلىنىدۇ (توپىغا ئازراق تۇز قوشۇپ ئاچچىقسۇ بىلەن لاي قىلىنىدۇ)، بۇرۇلۇپ سۇيۇقلۇغى (زەمچە 5 گ، قوغۇشۇن ئاتسېتات 10 گ، سۇ 200 م ل)، ياكى 10~20 لىك ماگنىسي سۇلفات سۇيۇقلۇغى سىرتتىن سوغاق پېتى چېپىلىدۇ ۋە قىسما تېڭىق سېلىنىدۇ. شاتارى بىلەن رەۋەن پاراشوگىدىن ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ، ئۇنىڭغا تۇخۇم ئېقى ياكى ئاچچىقسۇ قوشۇپ بوتقا قىلىپ، سىرتتىن چېپىلىسىمۇ بولىدۇ.

(2) ئۆتكۈر ياللۇغ قايتقاندىن كېيىن، ياللۇغلۇق سرغىتمە-لارنىڭ شۈمۈرۈلۈشىنى تېزلىتىش ئۈچۈن، كۈندە بىر قېتىم ئىسسىق ئۆتكۈزۈلىدۇ، مۇم بىلەن داۋالىنىدۇ، تۇيۇنغان تۇز سۈيى، تۇيۇنغان ماگنىي سۇلفات ئېرىتمىسى، كامفورلۇق ئىسپىرت، ئىختىيوللۇق ئىسپىرت، ئاچچىقسۇ-ئىختىيول بىرىكمىسى قاتارلىقلار بىلەن نەمدەلگەن تېگىق سېلىنىدۇ.

(3) كېسەللەنگەن جايغا ئاچچىقسۇ ۋە تۇز سۈيى بىلەن تەييارلانغان مۇرەككەپ قوغۇشۇن ئاتسېتات سۈركىلىدۇ، ياكى ئاچچىقسۇ، ئىسپىرت بىلەن تەييارلانغان شاتارى پاراشوگى (مۇۋاپىق مىقداردا كىراخمال قوشۇلىدۇ)، ياكى "431" دىگەن جۇڭگىي دورىسى كۈندە ياكى كۈن ئارىلاپ بىر قېتىم سۈرتۈلسىمۇ بولىدۇ ("431" دىگەن دورىنىڭ ياسىلىشى مۇنداق: رەۋەن 4 ھەسسە، زەرىنخ 3 ھەسسە، بورنېئول 1 ھەسسە. بۇلار سوقۇپ تالقان قىلىنغاندىن كېيىن، تۇخۇم ئېقى قوشۇپ مەلھەم قىلىنىدۇ).

(4) سوزۇلما ياللۇققا يود-كامفورا - ئېفىر بىرىكمىسىنى، ياكى "431" بىرىكمىسىنى تەكرار سۈركەپ، ئارقىدىن ئىسسىق ئۆتكۈزۈلىدۇ.

(5) سرغىتمىلار كۆپرەك بولسا ۋە ئاسانلىقچە شۈمۈرۈلمىسە، باكتېرىيىسىز ئىشلەش ئۇسۇلى بىلەن بۇغۇم بوشلۇغىدىن سۇيۇق-لۇق ئېلىپ، ئاندىن دەرھال %2~1 لىك پروكاينىدىن 10~20 م ل ئوكۇل قىلىپ كىرگۈزۈلىدۇ (بۇ دورىغا 20~40 تۈمەن

بىرلىك پېنتىسىلىن قوشۇلىدۇ، ئاندىن ئىسسىق ھۆل تېپىق سېلىنىدۇ.

(6) سرغىتما سۇيۇقلۇق چىقىرىۋېلىنىپ، 2~5 م ل ھىدروكورتسون (40 تۈمەن بىرلىك پېنتىسىلىن قوشۇپ) كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 3~4 كۈن ئۆكۈل قىلىپ كىرگۈزۈلىدۇ.

شىللىق خالتا يالىمۇغى

بۇ شىللىق خالتىنىڭ سرغىتمىلىق يالىمۇغى بولۇپ، كلىنىكىدا خالتا قاناش، ئىششىش، سرغىش ھەمدە خالتىغا سرغىتىملار تولۇپ كېتىش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. تولاراق بېغىش ئالدى تېرە ئاستىدىكى ۋە جەينەك تېرە ئاستىدىكى شىللىق خالتىدا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] بۇ، ئاساسەن، تېپىشىش، يىقىلىش ۋە سوقۇلۇش قاتارلىق مېخانىكىلىق زەخمىلىنىشلەردىن پەيدا بولىدۇ. قوتانىنىڭ ئاستى تۈز بولماسلىق، تۆشەك چۆپ قېلىن سېلىنماسلىق، يېتىپ-قوپقاندا بېغىشنى يەرگە كۆپ ئۇرۇۋېلىش-تىنىۋ پەيدا بولىدۇ.

شىللىق خالتىنىڭ ئەتراپىدىكى توقۇلما يالىمۇغىنىڭ يامرىشى، ياكى بەزىبىر يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر (برۇتسېللو، تۇپىركۇليوز ۋە پارانتىپ قاتارلىقلارنىڭ قان ئارقىلىق تارقىلىش تۈپەيلىدىنمۇ يىمىرگىلىق شىللىق خالتا يالىمۇغى كېلىپ چىقىدۇ.


[كېسەللەك ئالامەتلىرى]

شىلىق خالتىنىڭ يىرىڭسىز ياللۇغى؛ ياللۇغنىڭ دەسلەپكى ئۆتكۈر مەزگىلىدە خالتا تېمى ۋە ئۇنىڭ چۆرىسىدىكى يۇمشاق توقۇلمىغا قان چۈشىدۇ، كېيىن ئۇ قاناپ ياللۇغلىنىدۇ، سۇلۇق ئىشىنىدۇ، خالتا تېمىدىن سرغىپ چىققان سرغىتمىلار خالتا ئىچىگە يىغىلىپ، خالتىنى كۆپتۈرىدۇ، زورايتىدۇ. تۇتۇپ كۆرۈلسە، مىلىقلايدۇ، ئاغرىيدۇ ۋە قولغا قىزىق بىلىنىدۇ. بوغۇم قىسمى كېسەللەنگەندە، بوغۇم ياخشى ھەركەتلەنمەيدۇ، مال ماڭغاندا ئاقسايدۇ. تېرە ئاستى شىلىق خالتا ياللۇغىدا چەكلىك دائىرىدە يۇمۇلاق ياكى سوقىچاق ئىششىق كۆرۈلىدۇ، ئۇ روشەن مىلىقلاپ تۇرىدۇ. پەي ئاستى شىلىق خالتا ياللۇغىدا ئىششىق يەڭگىل بولىدۇ، چېگرىسى ئېنىق بولمايدۇ، ئادەتتە ئانچە مىلىقلىمايدۇ، لېكىن مالىنىڭ ئاقسىشى روشەن بولىدۇ.

سوزۇلمىغا ئايلانغان ياكى بوش ۋە تەكرار غىدىقلىنىشتىن بولغان سوزۇلما ياللۇغتا چەكلىك، مىلىقلاپ تۇرىدىغان ئىششىق كۆرۈلىدۇ، ئۇ ئاغرىمايدۇ، قولغا قىزىق بىلىنمەيدۇ، فۇنكىتسىيە توسقۇنلۇغى ئېنىق بولمايدۇ. شىلىق خالتا ئىچىگە سۇيۇق سرغىتمىلار تولغاندا، ئۇنىڭ ھەجمى كۆرۈنەرلىك زورىيىپ قالىدۇ، ئىزىنىسى ئېنىق بولىدۇ، خالتا تېمى نېپىز، سىلىق بولىدۇ، مىلىقلاپ تۇرىدۇ، جايلىق ئورۇننىڭ تېرە ئاستىدا يۆتكىلىپ تۇرىدۇ. خالتا سۇيۇقلۇق-تالالىق سرغىتمىلار بىلەن تولغاندا، ئىششىقنىڭ چوڭلۇغى بىر خىل بولمايدۇ، چوڭلۇغى

تۇخۇمدەك، مۇشتەك ھەتتا ۋالبولدەك بولىدۇ، خالتا تېمى بىلىق، چىڭ بولىدۇ، ئىششىق تومپايغان جاي بىلىقلايدۇ، بەزى جاي قاتتىق، ئەۋرىشىمچان بولىدۇ، بەزىدە ئۇنى تۇتقاندا شىتىرىلغان ئاۋاز چىقىدۇ. خالتىنىڭ تېمى ۋە بىرىك-تۈرگۈچى توقۇلمىلار ئۆسۈپ قالغاندا، خالتا تېمى روشەن ھالدا قېلىنلاپ قالىدۇ، خالتا بوشلۇقى كىچىكلەيدۇ، قولغا قاتتىق بىلىنىدۇ، مىلىقلىمايدۇ، تېرە قېلىنلايدۇ، يۆتكىلىش كۆرۈلمەيدۇ.

شىللىق خالتىنىڭ يىرىڭلىق ياللۇغى: ياللۇغلانغان جايىنىڭ تېمىپىراتۇرىسى تېز ئۆرلەيدۇ ۋە ئۇ يەر ئىششىيدۇ، ئاغرىيدۇ،



31-رەسىم كالتىنىڭ بېغىش ئالدى شىللىق خالتا ياللۇغى

تېرە ۋە ئىششىق چۆرىسىدىكى يۇمشاق توقۇلمىدا يامرىداق سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلىدۇ، بەدەن تېمىپىراتۇرىسى بەزىدە ئۆرلەيدۇ، فۇنكىتسىيە توسقۇنلۇغى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. يىغىلغان يىرىڭنىڭ تەسىرىدىن خالتا يېرىلىپ يىرىڭ ئېقىپ چىقىدۇ،

بەزىدە خالتا چۆرىسىدىكى توقۇلمىلارمۇ يىرىڭلىق ياللۇغلىنىپ، ئاقما يارىغا ئايلىنىدۇ، بۇنىڭدىن توختىماي يىرىڭ ئېقىپ، يارا ئۇزاققىچە ساقايمايدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) كىلىنىكىلىق كۈزىتىشكە ئاساسەن، سېغىز توپا، مۇم بىلەن داۋالسا خېلى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا، باكتېرىيىسىز يول بىلەن تېشىپ خالتا ئىچىدىكى سرغىتىلارنى چىقىرىۋېلىپ، ئاندىن ئۇ جايغا %2~4 لىك پروكاين سۇيۇقلۇق-غىدىن 10~30 م ل (20~40 تۈمەن بىرلىك پېنىتسىللىن قوشۇپ)، ياكى لۇگولوف سۇيۇقلۇغىدىن 10 م ل ئوكۇل قىلىپ كىرگۈزۈلىدۇ. ھەر 3~4 كۈندە بىر قېتىم شۇنداق قىلىنىدۇ ۋە شۇنداق قىلغاندىن كېيىن قىسما تېڭىق سېلىنىدۇ.

(2) سرغىتىملارنى چىقىرىۋېتىش قىيىنغا چۈشسە، كېسەللەن-گەن ئورۇننى ئوبدان دېزىنېكسىيە قىلىپ، خالتىنى يېرىپ سرغىتىملارنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن، خالتىنىڭ ئىچكى قەۋىتى كېسىپ ئېلىۋېتىلىدۇ، ياكى خالتىنى يارغاندىن كېيىن ئىچىگە %10 لىك يود تىنىكتۇرسى (ياكى %10 لىك كۈمۈش نىترات سۇيۇقلۇغى) غا چىلانغان داكنى تىقىپ، خالتىنىڭ ئىچكى تېمى كۆيدۈرۈلىدۇ.

(3) سوزۇلما خاراكتىرلىق، تېمى قېلىنلىغان ۋە قاتقان تېرە ئاستى شىللىق خالتا ياللۇغىدا، خالتا كېسىپ ئېلىۋېتىلىدۇ. ئۇسۇلى مۇنداق: كېسەللەنگەن جاينى يۇڭىنى قىرقىپ دېزىنېك-

سىيە قىلغاندىن كېيىن، جايلىق ئورۇن ھۆشسىز لاندۇرۇلىدۇ، ئاندىن تېرىنى تىلىپ ئۆپچۆرىسىدىكى توقۇلمىدىن ئاجرىتىلىپ، شىلىق خالتا پۈتۈن كېسىپ چىقىرىۋېتىلىدۇ، قان تولۇق توختىتىلغاندىن كېيىن ياللۇغ قايتۇرغۇچى دورا سېپىلىدۇ. كېسىلگەن جاي تۈگۈنلەپ تىكىلىدۇ، سۇيۇقلۇق ئۇدۇللۇق ئېقىپ تۇرسۇن ئۈچۈن، كېسىكنىڭ تىۋەن تەرىپىدىن كىچىك بىر تۆشۈك قالدۇرۇلىدۇ، ئاخىردا سىرتىدىن باكتېرىيىسىز تېغىق سېلىنىدۇ.

(4) يىرىڭلىق شىلىق خالتا ياللۇغدا، خالتىنى بالدۇر تۇتۇش قىلىپ كېسىپ، ئىچىدىكى يىرىڭنى قالدۇرماي چىقىرىپ، خالتىنىڭ ئىچكى توقۇلما قەۋىتىنى ئۆتكۈر قوشۇق بىلەن قىرىپ تازىلاپ، ئىچىنى چىرىشكە قارشى دېزىنفېكسىيە سۇيۇقلۇقى بىلەن يۇيۇش، ئۇنىڭدىن كېيىن يىرىڭلىق جاراھەت بويىچە بىر تەرەپ قىلىش لازىم.

بوغۇم قايرىلىپ كېتىش

تاشقى مېخانىكىلىق كۈچنىڭ تەسىرىدىن بوغۇملارنىڭ ھەددىدىن زىيادە سوزۇلۇشى، ئېگىلىشى ياكى تولغىشى بىلەن، بوغۇم ئەتراپىدىكى تارتمۇش ۋە بوغۇم خالىتىسى تالاسى سوزۇلۇپ، ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئۇزۇلۇش ياكى زەخمىلىنىش نىڭ كېلىپ چىقىشى بوغۇم قايرىلىپ كېتىش دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ

ھال ئېغىر بولغاندا، بوغۇمنىڭ كۆمۈرچىگى بىلەن بېشى زەخمە-
لىنىدۇ. ئادەتتە باقاي بوغۇمنىڭ قايرىلىشى كۆپرەك ئۇچرايدۇ.
[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئىشلەۋېتىپ تېيىلىپ كېتىش، ئاتلاپ
كېتىش، پاتقاقچىلىقتا قاتتىق ئىشلەش، ياكى سەكرەش، ئىتتىك
يۈگۈرۈش، تېز قايرىلىش قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن بوغۇم قايرىد-
لىپ كېتىدۇ.

ئاياق تۇرقىنىڭ توغرا بولماسلىقى، تاقىلاش، تۇياقنى توغرا
شلىماسلىق، ۋىتامىن يېتىشمەسلىك، ئوزۇقلىنىش ناچارلىقى
قاتارلىقلارمۇ بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەپ بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] بوغۇم تولغىشىپ كەتكەندىن كېيىن
شۇ زامانلا ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئاقساش كۆرۈلىدۇ. مال ئۆرە
تۇرغاندا ئاغرىق ئايىغىنى ئېگىپ تۇرىدۇ، تەن ئېغىرلىغىنى
ئۇنىڭغا بوش چۈشۈرۈپ ياكى يەرگە بوش دەسسەپ تۇرىدۇ.
ماڭغاندا ئوتتۇرا ھال ياكى ئېغىر دەرىجىدە ئاقسايىدۇ. تۇتۇپ
كۆرۈلسە، كېسەللەنگەن جاي روشەن ھالدا قىزىق بىلىنىدۇ،
ئاغرىيدۇ، ئۇ جاي ئىششىپ قالىدۇ. بوغۇمنى ھەركەتلەندۈر-
گەندە، ئاغرىغانلىق تېخىمۇ ئېنىق ئىپادىلىنىدۇ، زەخمىلەنگەن
ئارمىمۇش چىڭقالغاندا ئاغرىش تېخىمۇ قاتتىق بولىدۇ. تارمۇش
ئۈزۈلگەن بولسا، بوغۇمنىڭ ھەركەت دائىرىسى كېڭىيىپ كېتىدۇ،
تولغىسا غىچىرىلغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

بېقىش-باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئوتلاتقاندا ياكى ماغدۇر-

غاندا، مالنڭ تېپىلىپ ياكى يىقىلىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

(1) كېسەلنىڭ دەسلەپتە سوغاق نەرسە يېقىش بىلەن بىللە باستۇرما تېخنىق سېلىپ، قان چۈشۈش ۋە سىرغىما سىرغىشى توساش كېرەك. ياكى بولمىسا ئوخشاش مىقداردىكى شاتارى بىلەن رەۋەن پاراشوگىنى تۇخۇم ئېقى قوشۇپ مەلھەم قىلىپ سىرتتىن چېپىش لازىم. زۆرۈر تېپىلغاندا، قاننىڭ ئويۇشىنى تېزلىتىدىغان دورىلار، مەسىلەن، 10% لىك كالتسىي خلورىد ئېرىتمىسى، قان ئويۇتقۇ، ۋىتامىن K_3 قاتارلىقلارنى ئوكۇل قىلىش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا، بوغۇم سىلىقلاتقۇچى پەردە ياللۇغىنى داۋالغانغا ئوخشاش داۋالسا بولىدۇ.

(2) ئۆتكۈر ياللۇغ يېنىكلەشكەندە، ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ داۋالىنىدۇ، بوش غىدىقلىغۇچىلارنى، مەسىلەن، يود تىنكتۇرىسى، ئىسپىرتلىق كامفور دورىسى (5% لىك يود تىنكتۇرىسى 20 م ل، 10% لىك كامفورلۇق ئىسپىرت 80 م ل)، ئىختىيول مەلھىمى، كامفور قاتارلىقلارنى سىرتتىن سۈركەپ، سىرغىتىلارنىڭ شۈمۈ-رۈلۈشى ۋە يوقىلىشىنى تېزلەتسىمۇ بولىدۇ.

(3) جايلىق ئورۇننى داۋالاش بىلەن بىر ۋاقىتتا، يېڭىچە يىڭنە سانجىپ داۋالاش ئۇسۇلى بىلەن داۋالسا تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئالدى ئاياق بوغۇمى تولغىشىپ كەتكەندە جۇڭبو، جۇڭۋەن ۋە شياۋەن پەللىلىرىگە؛ ئارقا ئاياق بوغۇمى تولغىشىپ كەتكەندە بەيخۇي، داکۋا، شياۋكۋا، داجۈەن ۋە خۇتۇڭبو پەللى-

لىرىگە يىڭنە سانچىلىدۇ. كومۇلان، ئەنتۇڭدىك، ئانتوكالورىن،
ياكى پروكاين بوغۇمغا چۆرىدەپ ئوكۇل قىلىنسۇمۇ بولىدۇ.
(4) ئاغرىق توختىتىش دورىسى ئىچكۈزۈلىدۇ، ياكى تولغە-
شىنى ساقايتىش دورىسى سىرتتىن چېپىلىدۇ.

رېتسېپ: ئاغرىق توختىتىش دورىسى

داڭگۈي 5 مىسقال، زاراڭزا چېچىگى 4 مىسقال، مەستىگى
رۇمى 5 مىسقال، مۇرمەككى 5 مىسقال، كەتمەن قوڭغۇز 5
مىسقال، تەبىئى مىس 5 مىسقال، گۈسۈيۈ 4 مىسقال،
سازاڭ 5 مىسقال، پۇراقلىق يىلتىز 5 مىسقال، پالما يىلە-
مى 5 مىسقال، ئىشلەنگەن چاپانئوت 5 مىسقال، چۈچۈك-
بۇيا 5 مىسقال

بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئاۋال يېرىم جىڭ سېرىق ھاراقنى
ئىچكۈزۈپ، ئاندىن دورا قايناق سۇغا چىلاپ ئىچكۈزۈلىدۇ.
موزايغا 4 كە بۆلۈپ بېرىلىدۇ.

ئالدى ئاياق بوغۇم تولغاشقاندا دارچىن شېخى، چۈەندۈەن
5 مىسقالدىن قوشۇلىدۇ؛ ئارقا ئاياق بوغۇمى تولغاشقاندا دۇجۇڭ،
لىپەكگۈل 5 مىسقالدىن قوشۇلىدۇ.

رېتسېپ: بوغۇم تولغىشىنى ساقايتىش دورىسى

شاپتۇل مېغىزى، ئۇرۇڭ مېغىزى، زاراڭزا چېچىگى، شاتارنى
ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوققاندىن كېيىن، ئاق
ھاراق ياكى ئاچچىقسۇ قوشۇپ مەلھەم قىلىپ، 1~2 كۈنىدە بىر
قېتىمدىن بوغۇم تېشىغا چېپىلىدۇ.

لپەك چىقىپ كېتىش

تاشقى كۈچ تەسىرىدىن لپەك (توپۇق) ئورنىدىن قوزغىلىپ كېتىش لپەك چىقىپ كېتىش دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ كۆپىنچە بوغۇم تارتمۇشى، بوغۇم خالىتىسى سوزۇلۇپ ياكى ئۇزۇلۇپ كېتىش بىلەن بىللە كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] سىرتتىن بىرەر نەرسە بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا ئىنتايىن قاتتىق تېگىش (قاتتىق ئۇرۇ-لۇش، سوقۇلۇش، تېپىشىش، تۇيۇقسىز تېز بۇرۇلۇش ۋە بۇق-نىڭ ئارتىلىشى) قاتارلىقلار سەۋىيىسىدىن بوغۇم ھەددىدىن زىيادە ئېگىلىپ، سوزۇلۇپ ۋە ئىچى-سىرتىغا تولغۇشۇپ كېتىش بىلەن لپەك چىقىپ كېتىدۇ.

بوغۇم، تارتمۇش ئوبدان يېتىلمەسلىك ۋە سوزۇلما بوغۇم ياللۇغى (تۇبېركۇليوز، شەكىل ئۆزگىرىشلىك بوغۇم ياللۇغى)، تاشقى كۈچنىڭ يېنىك تەسىر كۆرسىتىشى ئارقىسىدىمۇ لپەك چىقىپ كېتىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] لپەك يۇقۇرىسىغا چىقىپ كەتكەندە، تىز ۋە ئوشۇق بوغۇمى قاتتىق سوزۇلۇپ تۇرىدۇ، كېسەل-لەنگەن ئاياق كەينىگە بولۇۋېلىپ يىغىلمايدۇ. مال ماڭغاندا ئېسىلغان ئاقساق بولۇپ، بىر پۇتىنى سورەپ، 3 پۇتلۇق بولۇپ سەكرەپ ماڭىدۇ. تۇتۇپ كۆرۈلسە، تىزنىڭ ئىچكى تۈز تارتمۇ-

شىنىڭ بەك چىڭقىلىپ تۇرغانلىقى بىلىنىدۇ.

لىپەك سىرتىغا چىقىپ كەتكەندە، تىز ۋە ئوشۇق بوغۇمى ئېگىلىگەن ھالەتتە ئالدىغا سوزۇلۇپ چىقىپ تۇرىدۇ، مال كېسەل تەككەن ئايىغىنى يەرگە قويغاندا، قازان بوغۇمىدىن باشقا بوغۇم-لىرى قاتتىق ئېگىلىپ تۇرغاچقا، تېرەلگەن ئاقساق كۆرۈلىدۇ، تۇتۇپ تەكشۈرۈلسە، لىپەك ئورنىدىن تېشىغا چىقىپ كېتىپ، نورمال ئورنىنىڭ ئويمايلىشىپ قالغانلىقى بىلىنىدۇ، شۇنداقلا تىزنىڭ تۈز تارمۇشى يۇقۇرى سىرتىغا سىڭايان بولغان بولىدۇ. لىپەك ئىچ تەرەپكە چىقىپ كەتكەندە، كۆرۈلىدىغان كېسەللىك ئالامەتلىرى لىپەك سىرتىغا چىقىپ كەتكەندە كۆرۈلىدىغان ئالا-مەتلەرگە ئوخشايدۇ، تۇتقاندا لىپەكنىڭ ئىچ تەرەپكە قوزغالغان-لىقى، تىزنىڭ تۈز تارمۇشىنىڭ يۇقۇرى تەرەپكە سىڭايان بولغانلىقى مەلۇم بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) ئورنىغا چۈشۈرۈش: بوغۇم چىقىپ كەتكەندە، ئۇنى ۋاقىتدا ئۆز ئورنىغا چۈشۈرۈش كېرەك، بولمىسا، ئەتراپىدىكى توقۇلمىلار ياللۇغلىنىپ قالىدۇ-دە، ئورنىغا چۈشۈرۈش تەس بولۇپ قالىدۇ. ئورنىغا چۈشۈرۈشتىن ئىلگىرى، مۇسكۇللارنى بوشاشتۇرۇپ، چىققان بوغۇمنى ئورنىغا چۈشۈرۈشكە ئاسان بول-سۇن ئۈچۈن ھۇشسىزلاندۇرۇش ئۇسۇللىرى (پۈتۈن بەدەنلىك ھۇشسىزلاندۇرۇش، بوغۇم بوشلۇغىنى ھۇشسىزلاندۇرۇش ياكى ئۆتكۈزۈشلۈك ھۇشسىزلاندۇرۇش) قوللىنىلىدۇ.

لپەك يۇقۇرسىغا چىقىپ كەتكەندە، ئۇ تۇرغان كالىنىڭ ئاغرىق ئايىغىدىن ئېلىنغان ئاغامچىنى كالىنىڭ بويىسىدىن ئارىلاپ دۇرۇپ ئېلىپ، ئالدى يۇقۇرسىغا تارتىش كېرەك، بۇ چاغدا تېخنىك خادىم قولى بىلەن چىقىپ كەتكەن لپەكنى كۈچەپ بېسىپ، كالىنى تېز زوڭ ئولتۇرۇشقا مەجبۇر قىلدۇ، مۇشۇنداق تارتىش، بېسىش ۋە زوڭ ئولتۇرغۇزۇش ھەركەتلىرىنى زىچ ماسلاشتۇرۇپ ئىشلەش ئارقىلىق چىققان لپەك ئورنىغا چۈشۈرۈلدى. ياكى بولمىسا كالىنى يېنىچە ياتقۇزۇپ بېكىتىپ (ئاغرىق ئايىغىنى ئۈستىگە كەلتۈرۈپ)، ئاندىن ئاغرىق ئايىغىنى ئالدىغا كەلتۈرۈپ (ئاننى پىچىش ۋاقتىدىكى كەينى ئاياقنى ئالدىغا كەلتۈرگەندەك) كۈچەپ تارتىش لازىم، بۇ چاغدا تېخنىك خادىم چىقىپ كەتكەن لپەكنى قولى بىلەن باسسا، ئۇ ئورنىغا چۈشىدۇ. بوغۇم شەكلى ئۆزگەرگەندە ۋە غەيرى نورمال ئالامەتلەر يوقالغاندا، مال ئۆزلۈگىدىن ھەركەتلەنسە ياكى زورنىغا ھەركەتلەندۈرۈلسىمۇ چىقىپ كەتكەن لپەك ئۆزىلا ئورنىغا چۈشىدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش تەس بولغاندا، ئوپىراتسىيە ئۇسۇلى بىلەن لپەكنىڭ ئىچكى تۈز تارمۇشى قىيىۋېتىلىدۇ. قىيىشتا لپەكنىڭ تەخمىنەن 2 س م ئىچكى يۇقۇرسىدىكى ئوتتۇرا تۈز تارمۇشى بىلەن ئىچكى تۈز تارمۇشنىڭ ئارىلىغىدىن قىيىلىدۇ. پىچاقنى بۇ جاينىڭ ئەڭ تۆۋەن تەرىپىدىن ئۇزۇنسىغا 1 س م تىك كىرگۈزۈپ، ئاندىن لپەكنىڭ ئىچكى تۈز تارمۇشى كېسىلىدۇ، كېسىش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغاندا "غەرت" قىلغان ئاۋاز

ئاڭلىنىدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن چىقىپ كەتكەن لىپەك جايىغا چۈشىدۇ. كەسكەن جايىغا بىر يىپ تىكىلگەندىن كېيىن يود تىنىكتۇرىسى سۈركەپ قويۇلىدۇ.

(2) بېكىتىش: چىقىپ كەتكەن لىپەكنى ئورنىغا چۈشۈرگەندىن كېيىن، يەنە چىقىپ كەتمەسۇن ئۈچۈن، ئۇ يەر دەرھال تېڭىپ قويۇلىدۇ. بوغۇمنىڭ تۆۋەن تەرىپىگە تارشىلىق تېڭىق ياكى گەجلىك تېڭىق سېلىنىدۇ. 3 ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن تېڭىقنى ئېلىۋېتىپ، بوغۇم فۇنكسىيىسىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە پايدىسى بولسۇن ئۈچۈن، كېسەل كالا مۇۋاپىق دەرىجىدە يېتىلەپ ھەركەتلەندۈرۈلىدۇ، بوغۇمنىڭ يۇقۇرى تەرىپىدىكى توقۇلمىلارغا 10% لىك تۇز سۈيىدىن 10~20 م ل ئايلىنىدۇرۇپ ئوكۇل قىلىنسا، ياكى ئۇ يەر نۇقتىلاپ داغلانسا، بۇمۇ ئورنىغا چۈشكەن لىپەكنى مۇقىملاشتۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ.

لىپەك تېشىغا ياكى ئىچ تەرەپكە چىقىپ كەتكەن بولسا، ئۇنى ئورنىغا چۈشۈرۈشتە لىپەك يۇقۇرىغا چىقىپ كەتكەندە ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلىدىن پايدىلانسا بولىدۇ.

كۆزنىڭ مۈڭگۈز پەردىسى ياللۇغى

كۆز ئالمىسىنىڭ مۈڭگۈز پەردە قەۋىتىدە پەيدا بولىدىغان ياللۇغ كۆزنىڭ مۈڭگۈز پەردىسى ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ. [كېسەللىك سەۋىيىسى] مۈڭگۈز پەردە ياللۇغى تولاراق قامچا

تېگىش، سوقۇلۇش، بېسىلىش ۋە سۈركىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزىدە بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى ۋە باشقا يۇقۇملۇق كېسەللەردىن، ياكى خىمىيىۋى دورىلارنىڭ تەسىرىدىنمۇ پەيدا بولىدۇ. قانخۇمار تاپاقچە باكتېرىيىلەرنىڭ يۇقۇشىدىنمۇ يۇقۇملۇق مۇڭگۈز پەردە ياللۇغى كۆرۈلىدۇ. بۇ كېسەل 3~6 ئايلىق موزايىلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى]

مۇڭگۈز پەردىنىڭ تاشقى جاراھىتى: كۆزگە ياندىن قارىغاندا، مۇڭگۈز پەردىنىڭ يۈزىدە جاراھەت ئىزى بارلىقى بىلىنىدۇ، جاراھەت چۆرىسى ئاقۇش ياكى كۆكۈش تۇمانسىمان دۇغلۇق بولىدۇ. مۇڭگۈز پەردە توقۇلمىسى ياللۇغلانغان بولسا، مۇڭگۈز پەردە يىرىڭلايدۇ، كۆز ياشاغۇرايدۇ، يورۇقتىن قاچىدۇ، بىرىكتۈرگۈچى پەردە ئىششىيدۇ، يىرىڭلىق ئاجراتمىلار كۆپىيىپ كېتىدۇ، مۇڭگۈز پەردىنىڭ ئەتراپى قىزىرىدۇ، كۆزنى تۇتقاندا مال قاتتىق ئاغرىقىسىنىدۇ. بۇ ھال تېخىمۇ ئېغىرلاشسا، مۇڭگۈز پەردىدە بەزىدە يارا پەيدا بولىدۇ ياكى مۇڭگۈز پەردە تېشىلىدۇ. دە، كۆپ ھاللاردا كۆز ئالمىسىنىڭ يىرىڭلىق ياللۇغى پەيدا بولىدۇ.

مۇڭگۈز پەردىنىڭ دۇغلىشىشى: مۇڭگۈز پەردىنىڭ يۈزى باشتا يىرىكىلىشىدۇ ۋە پارقراقلىقى، سۈزۈكلۈكىنى يوقىتىپ، ئاقۇش دۇغلىشىدۇ، مۇڭگۈز پەردىنىڭ چۆرىسىدىن قان تومۇرلار شاخلاپ چىقىپ، مۇڭگۈز پەردىنىڭ يۈزىگە كىرىدۇ. يال-

لۇغ ئەۋج ئېلىپ مۇڭگۈز پەردىنىڭ چوڭقۇر قەۋىتىگە يەتكەندە، ئۇنىڭ يۈزى پارقراپ تۇرسىمۇ، ئەمما چوڭقۇر قەۋىتى تۇتۇقلۇق شىپ، تاسمىدەك ياكى تۇماندەك ئاقۇش، ئاپپاق ۋە ساغۇچ قىزىل دۇغلىشىدۇ. ياللۇغ يوقىلىپ سوزۇلمىغا ئايلانغاندا، يورۇق-تىن قېچىش، ياشاڭغۇراش ئەھۋاللىرى بولمايدۇ. مۇڭگۈز پەردىنىڭ يۈزىدە ئاق ياكى رەڭدار داغلار پەيدا بولىدۇ، شەكلى چېكىنسىمان، يېپسىمان، ھەتتا بەزىسى ئىسقا ئوخشاش كۆرۈنىدۇ. دوغلىشىش دەرىجىسى بىلەن دوغلاشقان ئورۇن ھەر خىل بولغاچقا، كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىمۇ بىردەك بولمايدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) ياللۇغنى قايتۇرۇش: كۆزنى 3% لىك بور كىسلاتاسى سۈيى ياكى فىزىئولوگىيەلىك ئېرىتمە بىلەن يۇيۇپ، يات نەرسىلەر ۋە ئاجراتمىلار چىقىرىلىدۇ، مايلىق پىنتىللىن، كورتسون ئاتىپتات مەلھىمى ياكى باشقا ئانتىبىيوتىك دورا مەلھەملىرى كۆزگە كۈندە 2~4 قېتىم تامغۇزۇلىدۇ. كۆز يىرىڭلىسا، 0.1% لىك رىئانول سۈيىگە چىلانغان داكا بىلەن تېڭىپ قويۇلىدۇ، بۇنىڭغا ماسلاشتۇرۇپ ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاش (ئانتىبىيوتىك، سۇلفانىلامىدلىق دورىلار بىلەن) ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. ياللۇغ ئېغىرلاشسا، 5% لىك پروكاين كۆزگە تامغۇزۇلىدۇ. رەڭدار پەردە يېپىشىپ قالمىسۇن ئۈچۈن، 1%~0.5 لىك ئاتروپىن سۇلفات ئېرىتمىسى كۈندە 2 قېتىم كۆزگە تامغۇزۇلىدۇ.

(2) دۇغلىشىشنى توختىتىش: مۇڭگۇز پەردىسىدىكى دوغىنى يوقىتىش ئۈچۈن، 10% لىك دىپتېرىكس مەلھىمى ياكى 0.5% لىك كورتسون ئاتسېتات سۇيۇقلۇقى كۆزگە تامغۇزۇلىدۇ. ياكى ئۆزىنىڭ قېنىنى ئېلىپ (كۆك تومۇردىن ئېلىنىدۇ) قاپاق تېرىپ- سىنىڭ ئاستىغا ھەر قېتىمدا 2~4 م ل دىن 1~2 كۈندە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش دورىسى ياكى سەدەپ دورىسى ئىشلىتىلسىمۇ بولىدۇ.

رېتسېپ: كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش دورىسى
دانىكا 1 سەر، كىلىمېل تېشى 5 مىسقال، بورنېئول 1
مىسقال، نۆشۈدۈر 2 فۇڭ
بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ تاسىقاپ، قۇتىغا سېلىپ قويۇپ،
كۆزگە سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ.

رېتسېپ: سەدەپ دورىسى
سەدەپ 8 مىسقال، ساۋجۇمىڭ 1 سەر، تاجىگۈل ئۇرۇغى
1 سەر، ئالقات 7 مىسقال، بىرتانىيە قارا كەندىرى 8
مىسقال، كەۋرەك 5 مىسقال، مامۇرانچىن 5 مىسقال،
جىنتىيانا 1 سەر، ئاق جۇخۇاگۈل 1 سەر
بۇلارنى قوشۇپ قاينىتىپ، چوڭ كالىغا 1 قېتىم ئىچكۈزۈ-
لىدۇ.

(3) كۆزگە يىڭىنە سانچىپ داۋالاش:
جىڭمىڭ، ماڭيۇ، تەيياڭ قاتارلىق پەلەسلەرگە يىڭىنە
سانچىلىدۇ.

جىڭيۇي قاتارلىق پەللىلەرگە % 15 لىك گلىكوزا ئېرىتمە-
 سىدىن 10 م ل ئوكۇل قىلىندۇ. قۇرۇق يىڭنە سانچىش بىلەن
 ئوكۇل سېلىش نۆۋەتلەشتۈرۈلۈپ، كۈندە بىر قېتىم شۇنداق
 قىلىندۇ، ئۈچ قېتىمى بىر قارار داۋالاش بولىدۇ.
 (4) چاناق ئۈستى تۆشۈگىگە ئوكۇل قىلىش: 8-نومۇرلۇق
 شىپىرس يىڭىنىنى تېرىدىن 45° بولۇڭ ھاسىل قىلغان ھالدا
 تۆۋەنگە 2~3 س م سانچىپ (چاناق ئۈستى تۆشۈگى قولىغا
 ئويما بىلىندۇ)، % 0.25~0.5 لىك پروكاينىدىن 5~10 م ل
 (40 تۈمەن بىرلىك پىنىتسىللىن قوشۇپ) كۈن ئارىلاپ بىر
 قېتىم ئوكۇل قىلىندۇ.

6. تۇغۇت كېسەللىكلىرى

قىيىن تۇغۇت

تۇغۇت جەريانىدا تۆرەلمىنىڭ ئوڭۇشلۇق تۇغۇلماسلىقى قىيىن تۇغۇت دىيىلىدۇ.

[قىيىن تۇغۇتنىڭ سەۋىۋى] تۇغۇت يولىنىڭ تۇغما تار بولۇشى، داس سۆڭىگىنىڭ ياخشى يېتىلمەسلىكى، بالىياتقۇ بويىنى بىلەن جىنىسى يولىنىڭ تولۇق ئېچىلماسلىقى، ياكى سىيىرنىڭ تۇغۇتتىن ئىلگىرى ئوبدان ئوزۇقلانماسلىقى، كۆپرەك ھەركەت قىلماسلىقى قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن تولغاق ئاجىز كېلىپ ياكى سىيىر كۈچىيەلمەي، قىيىن تۇغۇت كېلىپ چىقىدۇ. تۆرەلمىنىڭ بەك يوغاناپ كېتىشى، شەكلىنىڭ غەيرىلىكى ۋە تۆرەلمە تۇرقى، ئورنى ۋە يۆنىلىشى (كېلىشى) نىڭ توغرا بولماسلىقى قاتارلىقلاردىنمۇ قىيىن تۇغۇت كېلىپ چىقىدۇ.

[قىيىن تۇغۇتنى تەكشۈرۈش] قىيىن تۇغۇت كۆرۈلگەندە، كېسەل تارىخىنى تەپسىلى ئىگەللەش، تۇغۇت يولى، تۆرەلمە ۋە سىيىرنىڭ ئومۇمى ئەھۋالىنى ئىنچىكە تەكشۈرۈش، قىيىن تۇغۇتنىڭ سەۋىۋى ۋە خاراكتېرىنى ئەتراپلىق تەھلىل قىلىش.

ئاندىن كېيىن تۇغۇتقا ياردەم بېرىش ئۇسۇلىنى بېكىتىش كېرەك.

(1) كېسەل تارىخىنى تەكشۈرۈش: بۇنىڭدا تۇنجى تۇغۇت ياكى كېيىنكى تۇغۇت ئىكەنلىكى ئېنىقلاندى. تۇنجى تۇغۇتلۇق سىيرلاردا بولىدىغان قىيىن تۇغۇت تولاراق تۇغۇت يولىنىڭ تارىخىدىن كېلىپ چىقىدۇ. كېيىنكى تۇغۇتلۇق سىيرلاردا كۆرۈلىدىغان قىيىن تۇغۇت كۆپىنچە تۆرەلمە يۆنىلىشى، تۇرقى ۋە تۆرەلمە ئورنىنىڭ توغرا بولماسلىقى، تۆرەلمە شەكلىنىڭ غەلىتە بولۇشى ياكى قوشكېزەك بولۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

بوغازلىق قەرەلىنىڭ توشقان-توشمىغانلىقى، سىيىرنىڭ تۇغۇت ۋاقتىدىكى ئەھۋالى ئېنىقلاندى، تولغاننىڭ ئاجىز-كۈچلۈكلۈكى ۋە قېتىم سانى، باش سۈيى چىققان چاغدىكى ئەھۋالى قاتارلىقلار ئىگەللىنىدۇ.

قىيىن تۇغۇت يۈز بەرگەندىن كېيىن تۇغۇتقا قانداق ئۇسۇل بىلەن ياردەم قىلىنغانلىقى، قانداق دورا ئىشلىتىلگەنلىكى، ئۇنۇمنىڭ قانداق بولغانلىقى ئېنىقلاندى.

(2) ھازىرقى ھالىتىنى تەكشۈرۈش:

(1) پۈتۈن بەدىنىنى تەكشۈرۈش: بەدەن تېمپېراتۇرىسى، تومۇر سوقۇش، نەپەس ئېلىش، روھىي ھالەت ۋە شىلىق پەردىلەرنىڭ رەڭگى قاتارلىقلار تەكشۈرۈلىدۇ.

(2) تۇغۇت يولىنى تەكشۈرۈش: ئاۋال سىيىرنىڭ تاشقى

جىنىسى ئەزا قىسمى ۋە تەكشۈرگۈچىنىڭ قولى - بىلىشى يۈيۈپ دېزىنفېكسىيە قىلىنىدۇ، ئاندىن قولى تۇغۇت يولىغا كىرگۈزۈپ، داس بوشلۇغىنىڭ كەڭ - تارلىشى، بالياتقۇ بويىنىنىڭ تولۇق ئېچىلغان - ئېچىلمىغانلىقى، تۇغۇت يولىنىڭ قۇرغاق ياكى قۇرغاق ئەمەسلىكى شۇنىڭدەك تۇغۇت يولىدا جاراھەت، سۇلۇق ئىششىق ۋە ئۆسمە بار - يوقلۇقى تەكشۈرۈلىدۇ.

3) تۆرەلمىنى تەكشۈرۈش: قولى تۆرەلمە بىلەن ئەشنىڭ ئارىلىشىغا كىرگۈزۈپ، تۆرەلمىنىڭ تۇغۇت يولىغا چۈشۈش دەرىجىسى، ئوڭ ياكى تەتۈر كەلگەنلىكى، ئۆلۈك ياكى تىرىك - لمىكى، تۆرەلمە تۇرقى، تۆرەلمە يۆنۈلۈشى، تۆرەلمە ئورنى قاتارلىقلار تەكشۈرۈلىدۇ.

ئوڭ ياكى تەتۈر كېلىش: تۇغۇت يولىغا تۆرەلمىنىڭ بېشى ۋە ئالدى ئىككى پۇتى ئۇدۇل تۇرغان بولسا ئوڭ كەلگەنلىك، كەينى ئىككى ئايىقى ئۇدۇل تۇرغان بولسا تەتۈر كەلگەنلىك بولىدۇ. ئادەتتە ئوڭ كېلىش كۆپ ئۇچرايدۇ، تەتۈر كېلىش ئاز ئۇچرايدۇ، بۇ ئومۇمەن نورماللىققا ياتىدۇ.

تۆرەلمىنىڭ ئۆلۈك ياكى تىرىكلىكىنى بىلىش: تۆرەلمە ئوڭ كەلگەندە، قولىنى كىرگۈزۈپ تۆرەلمىنىڭ كۆز ئالمىسى بوش بېسىپ كۆرۈلىدۇ (بۇ چاغدا تۆرەلمە ئىنكاس قايتۇرىدۇ)، تىلى تارتىپ كۆرۈلىدۇ (بۇ چاغدا تۆرەلمە تىلىنى تارتىۋالىدۇ) ۋە قولى تۆرەلمىنىڭ ئاغزىغا تىققاندا، تۆرەلمە قولى ئىمدۇ. تۆرەلمە تەتۈر كەلگەندە، قولى تۆرەلمىنىڭ پۇرۇگىگە كىرگۈ -

زۇپ كۆرسە، مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىش ھەركىتى بىلىنىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسىدە فىزىئولوگىيىلىك ئىنكاس قايتۇرۇلمىسا، تۆرەلىمنىڭ ئۆلۈك ئىكەنلىگى، بىرەرسىدە ئىنكاس قايتۇرۇلسا، تۆرەلىمنىڭ تىرىك ئىكەنلىگى ئىسپاتلانغان بولىدۇ.

تۆرەلىمە ئورنى: بۇنىڭدا تۆرەلىمە تېنىنىڭ ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ تېنىگە ئۇزۇنسىغا تۇرغان. تۇرمىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ. تۆرەلىمە تېنى ئانىسىنىڭ تېنىگە ئۇزۇنسىغا تۇرغان (باش ئورنى بىلەن قۇيرۇق ئورنىمۇ نورمال تۇرغان) بولسا، تۆرەلىمە ئورنى نورمال بولغان بولىدۇ. تۆرەلىمە ئورنى توغرىسىغا تۇرغان بولسا ياكى ئانىسىنىڭ تېنىگە قىيىق تۇرغان بولسا، بۇلار قىيىن تۇغۇتلۇق تۆرەلىمە ئورنى ھىساپلىنىدۇ.

تۆرەلىمە يۆنۈلۈشى: بۇنىڭدا تۆرەلىمە دۈمبىسىنىڭ ئانىسىنىڭ دۈمبىسىگە قوسىغىغا قانداقسىگە كەلگەنلىگى كۆزدە تۇتۇلىدۇ. تۆرەلىمە دۈمبىسى ئانىسىنىڭ دۈمبىسىگە تەرىپىدە كەلگەن بولسا، تۆرەلىمە يۆنۈلۈشى نورمال بولغان بولىدۇ. تۆرەلىمە دۈمبىسى ئانىسىنىڭ قوساق تەرىپىدە كەلگەن بولسا، بۇ، تۆرەلىمە ئوڭدىنچە كەلگەنلىك بولىدۇ. تۆرەلىمە دۈمبىسى ئانىسىنىڭ بىر ياق قوسىغىغا ئۇدۇللىنىپ كەلگەن بولسا، بۇ، تۆرەلىمە يېنىچە كەلگەنلىك بولىدۇ. بۇ ئىككى تۈرلۈك ئەھۋال قىيىن تۇغۇتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.


تۆرەلىمە تۇرقى: تۆرەلىمنىڭ بېشى بىلەن ئالدى ئىككى ئايىغى ياكى كەينى ئىككى ئايىغى تۇغۇت يولىغا ئۇدۇللىنىپ

تۇرغان بولسا، بۇلار نورمال تۇرۇق ھېساپلىنىدۇ. تۆرەلمىنىڭ بويىنى ياكى 4 ئايىغى ئېگىلگەن ھالەتتە تۇغۇت يولىغا كىرگەن بولسا، بۇ غەيرى نورمال تۇرۇق ھېساپلىنىدۇ.


[تۇغۇتقا ياردەم بېرىش تەييارلىغى]

(1) تۇغۇتقا ياردەم بېرىش سايمانلىرى:

تۇغۇت كالتىگى: بۇ، تۆرەلمىنى ئىتتىرىپ كىرگۈزۈۋېتىش ۋە تۆرەلمە تۇرقىنى ئوڭشاشتا ئىشلىتىلىدۇ.




33-رەسىم قوساقچە كېلىش



32-رەسىم دۈمبىچە كېلىش




35-رەسىم تۇغۇت كالتىگى



34-رەسىم ساغوربىچە كېلىش

تۇغۇت شوپىنىسى: بۇ، پاختا ياكى يېپەكتىن ئېشىپ ياسالغان، دىئامېتىرى 0.5~0.7 س م، ئۇزۇنلۇقى 2~3 م كېلىدۇ. خان يىپ بولۇپ، تۆرەلىمنىڭ نورمالسىز تۇرۇپ قالغان قىسمىنى ئوڭشاش ۋە تۆرەلىمنى تارتىپ چىقىرىشتا ئىشلىتىلىدۇ. سىرتماق سالغۇچ: بۇ، تۇغۇت شوپىنىسىنى ياكى تۇغۇت ھەرىسىنى تۇغۇت يولىغا كىرگۈزۈپ، تۆرەلىمنى مەلۇم قىسمىدىن ئىلىۋېلىپ تارتىپ چىقىرىشقا ئىشلىتىلىدۇ.



36-رەسىم تۇغۇت شوپىنىسى 37-رەسىم سىرتماق سالغۇچ

تۇغۇت ئىلمەكلىرى: دائىم ئىشلىتىلىدىغانلىرىدىن ئۇزۇن دەستىلىك ئىلمەك، كۆزلۈك ئىلمەك، قوش ئىلمەك ۋە پۈرۈك ئىلمىكى قاتارلىقلار بار. بۇلار تۆرەلىمنى كۆز ئالمىسى، تۆۋەنكى جاغ سۆڭىكى، قۇلىقى ۋە بۇرىندىن ئىلىپ ئېلىشقا ئىشلىتىلىدۇ، تولاراق ئۆلۈك تۆرەلىمگە ئىشلىتىلىدۇ.




تۇغۇت پىچاقلرى: ئويمانلىق پىچاق، ئىلمەكسىمان پىچاق ۋە يوشۇرۇن بىسلىق پىچاقلار تۆرەلىمنى بالىياتقۇدا تۇرغۇزۇپ پارچىلاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

تۇغۇت ئىسكىنىسى: تۆرەلىمنىڭ سۆڭەك، بوغۇم ۋە تارد-

مۇشلىرىنى كېسىش ياكى پارچىلاشقا ئىشلىتىلىدۇ.




38-رەسىم تۇغۇت ئىلمەكلىرى
1. كۆزلۈك ئىلمەك 2. قوش ئىلمەك



39-رەسىم تۇغۇت پىچاقلرى
1. ئويمانلىق پىچاق 2. ئىلمەكسىمان پىچاق
3. يوشۇرۇن بىسلىق پىچاق

سويۇش بەلچىسى: تۆرەلمە تېرىسىنى سويۇشقا ئىشلىتىلىدۇ.
تۇغۇت ھەرىسى: بۇ ھەرە تىغى ۋە غىلىپىدىن تۈزۈلگەن
بولىدۇ. ھەرە تىغى بىر ياكى بىرنەچچە تال قىرلىق پولات
سىمىدىن تولغاچ ياسالغان بولىدۇ. ئۇ تۆرەلمىنى ھەرىدەپ
پارچىلاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(2) تۇغۇتقا ياردەم بېرىش تەييارلىغى: تۇغۇتقا ياردەم بېرىش ئۈچۈن كەڭ، يورۇق، شامالدىن خالى يەرنى تاللاش ۋە ئۇ يەرگە چۆپ سېلىپ قويۇش كېرەك. تۇغۇتقا ياردەم بېرىلىدىغان سىيىرنى ئىمكانىيەت بولسا ئۆرە تۇرغۇزۇپ بېكىتىش، ئۆرە تۇرالمايدىغانلىرىنى يېنىچە ياتقۇزۇپ (تۆرەلمە-سىنىڭ غەيرى نورمال قىسمىنى ئۈستىگە كەلتۈرۈپ ياتقۇزۇپ) بېكىتىش كېرەك. جىنسى ئەزاسىنىڭ سىرتقى قىسمى ۋە ساغرىسىغىچە بولغان ئارىلىق شۇنىڭدەك تۇغۇتقا ياردەم بەرگۈچىنىڭ قولى بىلىگىگىچە پاكىز يۇيۇپ دېزىنفېكسىيە قىلىنىشى لازىم. تۇغۇت يولى قۇرغاق بولسا، ئىچىگە سۈيۈن سۈيى ياكى پارافىن مېيى قۇيۇپ سىلىقلىتىش لازىم.



40-رەسىم تۇغۇت ھەرىسى

1. زەنجىر پىچاق 2. زەنجىر ھەرە

3. سىم ھەرە ۋە ئۇنىڭ غىلىپى

(3) تۇغۇتقا ياردەم بېرىش پىرىنسىپى: ئۆرەلمە ئۆنىك غەيرى نورمال تۇرقىنى ئىمكان قەدەر ئۆز ئورنىدا تۇرغۇزۇپ تۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق ياكى تۇغۇتقا ياردەم بېرىش سايمانلىرى بىلەن قۇتۇلدۇرۇلىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا، پارچىلاپ ئېلىش ياكى قوساقنى يېرىپ ئېلىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. تۆرەلمىنى ئوڭۇشلۇق تارتىپ چىقىرىۋېلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن، ئۇنى قول ياكى تۇغۇت كالتىكى بىلەن مۇۋاپىق قىسمىدىن ئىتتىرىپ تۇرۇپ، سىير ئىنجىقلىمىغان چاغدا كەينىگە ياندۇرۇش كېرەك.


تۆرەلمىنىڭ غەيرى نورمال ئورنىنى توغرىلاش قىيىن تۇغۇتقا ياردەم بېرىشنىڭ مۇھىم ھالقىسى ھىساپلىنىدۇ. تۆرەلمىنى كەينىگە ئىتتىرگەندە، تېزدىن غەيرى نورمال ئورۇننى توغرىلاپ، تۆرەلمىنى ئۆز ئورنىغا كەلتۈرۈش ۋە ئۇنى ئانىسىنىڭ ئىنجىقلىشىغا ئەگىشىپ ئاستا تارتىپ چىقىرىۋېلىش كېرەك. [قىيىن تۇغۇتقا ياردەم بېرىش]

(1) تۆرەلمە بېشىنىڭ بىر يېقىغا قايرىلىپ قېلىشى: دىئاگنوز قويۇش: تۆرەلمىنىڭ ئالدى ئىككى ئايىغى بىرى قىسقا، بىرى ئۇزۇن ھالەتتە تۇغۇت يولىغا چۈشكەن بولىدۇ، بېشى كۆرۈنمەيدۇ، قول بىلەن سىلىسا باش-بويىنىنىڭ بىر ياققا قايرىلىپ قالغانلىقى بىلىنىدۇ. قايرىلىپ قالغان بېشى كۆپىنچە قىسقا كەلگەن ئايىغى تەرەپتە بولىدۇ. تۇغۇتقا ياردەم بېرىش: قول بىلەن تۆرەلمىنى بويىنىدىن

ئىتتىرىپ بالياتقۇغا كىرگۈزۈۋېتىش بىلەن تەڭلا تۆرەلمە بېشى كالىپۇگىدىن ياكى كۆز چانغىدىن تۇتۇپ تۇرۇلۇپ تارتىپ رۇسلىنىدۇ. ياكى بىرەيلەن تۆرەلمىنى تۇمشۇغىغا سىرتىماق سېلىۋېلىپ تۇرۇپ كەينىگە ئىتتىرگەن چاغدا، ياردەمچى خادىم شويىنى تارتىپ رۇسلىسىمۇ بولىدۇ. تۆرەلمە ئۆلۈك بولسا، تۇغۇت ئىلمىگى بىلەن كۆز چانغىدىن ئىلىۋېلىپ، تۆرەلمىنى كەينىگە ئىتتىرىش بىلەن تەڭ بېشى تارتىپ رۇسلىنىدۇ. بۇ چارىلەر ئۈنۈم بەرمەسە پارچىلاپ ئېلىنىدۇ.

(2) تۆرەلمە بېشىنىڭ ئىچىگە

پۈكۈلۈپ قېلىشى:





دىئاگنوز قويۇش: جىنىسى ئېغىزنىڭ سەل ئىچكىرىسىدىن تۆرەلمىنىڭ ئىككى تۇيغىنىڭ ئۇچى كۆرۈنىدۇ، بېشى كۆرۈنۈپ مەيدۇ، داس سۆڭەكنىڭ ئالدى قىرىدىن تۆرەلمىنىڭ پىشانىسى ياكى بويىنى قولغا بىلىنىدۇ.

41-رەسىم بىر يېقىغا قايرىلىپ

قالغان باشنى ئوڭشاش

تۇغۇتقا ياردەم بېرىش: تۆرەلمىنىڭ ئىككى ئالدى ئايىغىنى شويىنا بىلەن باغلىۋېلىپ، قولىنى بالياتقۇغا تىقىپ، تۆرەلمىنىڭ ئىككى ياكى بۇرۇندىن تۇتۇپ، بېشىنى يۇقۇرى كۆتىرىپ داس بوشلۇغىغا كىرگۈزۈش لازىم. بېشى بەك پۈكۈلۈپ قالغاندا، تۆرەلمىنىڭ تۇمشۇغىدىن سىرتماقلاپ، بىر قول بىلەن شويىنى

تارتىپ تۇرۇپ، يەنە بىر قول بىلەن پىشانە ياكى كۆز چانغىمە-
دىن تۇتۇپ تۇرۇپ، تۆرەلمە بېشىنى ئىتتىرىش ئىشلىرىنى
بىلەن تەڭلا شوپىنىنى تارتىپ، تۆرەلمە بېشىنى ئورنىغا چۈشۈرۈش
لازم.



43-رەسىم تۆرەلمە بېشىنىڭ

تولغىشىپ قېلىشى

42-رەسىم تۆرەلمە بېشىنىڭ


ئىچىگە پۈكۈلۈپ قېلىشى

(3) بېغىش بوغۇمىنىڭ ئېگىلىپ قېلىشى:

دېئاگنوز قويۇش: قولى تۇغۇت يولىغا تىقىپ كۆرگەندە
بىر ياكى ئىككى ئالدى ئاياق بېغىش بوغۇمىنىڭ ئېگىلىپ
قالغانلىقى بىلىنىدۇ. بىر ئاياق بېغىش بوغۇمى ئېگىلىپ قالغاندا،
تۇغۇت يولىدىن بىر ئايىقى چىقىپ تۇرىدۇ. ئىككىسىلا ئاياق
بېغىش بوغۇمى ئېگىلىپ قالغاندا، جىنسى ئېغىز سىرتىدىن
ئالدى ئىككى ئاياق كۆرۈنمەيدۇ.

تۇغۇتقا ياردەم بېرىش: ساق ئالدى ئاياقتىن سىرتماقلىۋېلىپ،
تۆرەلمەنى تۇغۇت كالتىكى ئارقىلىق تۇش قىسمى بىلەن ئېگىلىپ

قالغان ئايىغى ئارىلىغىدىن ئىتتىرىپ كىرگۈزۈۋېتىش، شۇنىڭ بىلەن تەڭلا ئېگىلىپ قالغان ئايىغىنىڭ تاپان سۆڭىكىدىن ياكى بېغىش بوغۇمىدىن سىرتماقلاپ، بىر تەرەپتىن تۆرەلىمىنى ئىتتىرىپ، بىر تەرەپتىن ئېگىلىپ قالغان ئايىغىنى يۇقۇرى كۆتىرىپ ھەمدە شۇ پەيتتە تاپىنىدىن تۇتۇۋېلىپ، يۇقۇرىغا كۆتىرىش بىلەن بىللە پۇتنى تۇغۇت يولىغا كىرگۈزۈش لازىم، شۇنداقتا تۆرەلىمىنى تارتىپ چىقىدۇ.




رېۋالغىلى بولىدۇ. ياكى بولمىسا ئېگىلىپ قالغان ئايىغىدىن سىرتماقلاپ، بىر قول بىلەن تاپان سۆڭىكىنىڭ يۇقۇرقى ئۈچىدىن تۇتۇپ، يۇقۇرىغا ھەم ئىچىگە ئىتتىرىش بىلەن بىللە، يەنە بىر

قول بىلەن شويىنىنى تارتسا، ئېگىلىپ قالغان ئاياق تۈزلىنىدۇ. 44-رەسىم ئېگىلىپ قالغان بېغىش بوغۇمىنى قول بىلەن تۈزەش (1)

تۈزەش تەس بولسا، ئېگىلىپ قالغان بېغىش بوغۇمىنى بالىياتقۇغا ئىتتىرىپ كىرگۈزۈپ، ئۇنى ئېگىلىپ قالغان مۇرە بوغۇمى ھالىتىگە كەلتۈرگەندىن كېيىن ساق ئاياق ۋە باشتىن تارتسا، تۆرەلىمىنى ئومۇمەن تارتىپ چىقىرىۋالغىلى بولىدۇ. تۆرەلىمە ئۆلۈك بولسا، ئۇنى پارچىلاپ چىقىرىشقا توغرا كېلىدۇ. (4) مۇرە بوغۇمىنىڭ ئېگىلىپ قېلىشى:

دىئاگنوز قويۇش: تۆرەلىمنىڭ بىر ياكى ئىككىلا ئالدى

ئايىغى يانغا ياكى قوساق تەرەپكە (ئانسىنىڭ) ئېگىلىپ قالغان بولسا، قولغا تۆرەلمىنىڭ باش ۋە مۈرە بوغۇمى بىلىنىدۇ. تۇغۇتقا ياردەم بېرىش: بىر ئالدى ئايىغى ئېگىلىپ قالغان




بولسا، تۆرەلمە ساق ئالدى ئايىغىدىن ۋە بېشىدىن تارتىپ (تۇغۇت يولى سىلىق، تۆرەلمە كىچىك بولغان ئەھۋالدا) چىقىرىلىدۇ. تۆرەلمىنى تارتىپ چىقىرىش مۈمكىن بولمىسا، ئۇنى بالىياتقۇغا ئىتتىرىپ كىرگۈزۈپ، بېغىشنى تارتىپ تۇرۇپ كۆتىرىپ ئېگىلىپ

45-رەسىم ئېگىلىپ قالغان بېغىش بوغۇمىنى تۈزەش (2)

قالغان ھالەتكە كەلتۈرۈۋالغاندىن كېيىن رۇسلىنىدۇ. (5) ئوشۇق بوغۇمىنىڭ ئېگىلىپ قېلىشى:

دەئاگنوز قويۇش: بىر ئايىغىنىڭ ئوشۇق بوغۇمى ئېگىلىپ قالغان بولسا، تاپىنى يۇقۇرىغا قاراپ قالغان بىر ئارقا ئايىغى تۇغۇت يولىدىن چىقىپ تۇرىدۇ، ئېگىلىگەن ئوشۇق بوغۇمى بىلەن سۆڭى قولغا بىلىنىدۇ. ئىككىلا ئايىغى ئوشۇق بوغۇمىدىن ئېگىلىگەن بولسا، ئىككى ئوشۇقنىڭ بوغۇملىرى قولغا بىلىنىدۇ. تۇغۇتقا ياردەم بېرىش: تۇغۇت كالتىگى بىلەن تۆرەلمىنىڭ ئولتۇرغۇچ سۆڭەك ياسىدىن ئىتتىرىپ تۇرۇپ، يەنە بىر قول

بىلەن ئارقا شىراقتىن تۇتۇپ تۇرۇپ، ئىتتىرىش بىلەن تەڭ



تۆۋەنگە سېرىلدۇرۇپ،

چاچلىقى بىلەن تۇيغىدىن

تۇتۇۋېلىپ يۇقۇرىغا كۆتۈرۈپ،

رېپ، تۆرەلمە تۇغۇت يولىغا

كىرگۈزۈلىدۇ. ياكى بولمىسا

ئارقا ئاياقنىڭ چاچلىغىدىن

باغلىۋېلىپ، بىر قول بىلەن

تارتىپ، يەنە بىر قول بىلەن

ئوڭشىسىمۇ بولىدۇ.

46-رەسىم ئېگىلىگەن مۇرە

بوغۇمىنى تۈزەش

تۈزەش قىيىن بولسا، ئوشۇق بوغۇمىدىن ئىتتىرىپ، پاقالچاق

سۆڭىكىنى ئالدىغا سوزۇپ، يانپاش بوغۇمىسىمان ئېگىلىگەن ھالەتكە

كەلتۈرۈش، نورمال ئايىغىدىن تارتىش، ئېگىلىگەن ئاياقنىڭ پاقال-

چىگىگە سىرتماق سېلىپ تارتىش لازىم، تۆرەلمە چوڭ بولمىسىلا،

ئۇنى تارتىپ چىقىرىۋېلىشقا بولىدۇ. ئەگەر تۆرەلمە ئۆلۈك بولسا

ياكى ئۇنى تۈزەش تەس بولسا، ئوشۇق بوغۇمى كېسىلىدۇ ياكى

تۆرەلمە پارچىلاپ چىقىرىلىدۇ.

(6) تۆرەلمە دۇرۇس كەلمەسلىك:


دىئاگنوز قويۇش: تۆرەلمە يېنىچە كەلگەندە، ئالدى ئاياق-

نىڭ ئىككى تاپىنى ئوڭ ياكى سولغا، تۆرەلمە دۈمبىسى ئانا


قوسغىنىنىڭ بىر تەرىپىگە توغرىلىنىپ قالىدۇ. ئوڭ-تۆۋەن

كەلگەن تۆرەلمىنىڭ ئىككى ئالدى ئاياق تاپىنى يۇقۇرىغا قاراپ


قالدۇ. تۆرەلمە تەتۈر كەلگەندە تاپىنى تۈۋەتكە قاراپ تۇرىدۇ.




48-رەسىم ئوڭ پېنىچە كېلىش



47-رەسىم ئېگىلىپ قالغان
ئوشۇق بوغۇمىنى تۈزەش



50-رەسىم تەتۈر، تۆۋەن تەرىپى
بىلەن كەلگەن تۆرەلمىنى تۈزەش



49-رەسىم تەتۈر، تۆۋەن تەرىپى
بىلەن كېلىش

تۇغۇتقا ياردەم بېرىش: ئاۋال تۇغۇت يولىنى سىلىقلاشتۇرۇپ، ئاندىن ئالدى ياكى كەينى ئىككى ئايىغىدىن باغلىۋېلىندۇ. بۇ چاغدا تۇغۇت خادىمى تۆرەلمىنىڭ ئىككىدىن تۇتۇپ

تۇرىدۇ، ياردەمچى خادىم تۆرەلىمنىڭ ئىككى ئالدى ئايىغىنى بىر ياققا قايرىپ ئوڭ تۇرۇققا كەلتۈرىدۇ-دە، تۆرەلىمە تارتىپ چىقىرىلىدۇ.

تۆرەلىمنى پارچىلاپ ئېلىش

تۆرەلىمنى تۈزەش، تارتىپ چىقىرىش قىيىن بولغاندا، سايمان بىلەن تۆرەلىمنىڭ باش ۋە ئاياقلىرىنى كېسىپ پارچە-لاپ، بىر-بىرلەپ چىقىرىۋېلىش تۆرەلىمنى پارچىلاپ ئېلىش دەپ ئاتىلىدۇ.

1. تۆرەلىمە بېشىنى كىچىكلىتىش

بۇ ئۇسۇل باش بەك يوغان بولۇش، تۇغۇت يولى تار بولۇش ۋە باش قىسمىغا سۇ يىغىلىپ قېلىش قاتارلىقلاردا قوللىنىلىدۇ. مەشغۇلات: تۇغۇت ئىلمىگى بىلەن ئىگەكتىن ئىلىۋېلىپ تۇرۇپ، تۇغۇت ئىسكىنىسىنى تۆرەلىمە ئېغىزىدىن كىرگۈزۈپ، ئىگەك سۆڭىكىگە تاقاپ، ئىسكىنىنى بولقا بىلەن ئۇرۇپ ئىگەك سۆڭىكىنىڭ تۆۋەن قىسمى ئاجرىتىلىدۇ. ئاندىن ئىسكىنىنى يۇقۇرى-تۆۋەن ۋە ئوڭ-سول ئېزىق چىشلارنىڭ ئارىلىغىدىن ئېلىپ، ئىگەك سۆڭىكىنى تۇتاشتۇرغۇچى ئۈستىخان ئاجرىتىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۇقۇرى-تۆۋەن ئىگەك سۆڭىكى قاتلىنىدۇ-دە، باش كىچىكلەيدۇ. باش قىسمىغا سۇ يىغىلىپ قالغاندا، ئويمانلىق پىچاق ياكى يوشۇرۇن بىسلىق پىچاق بىلەن باش سۆڭىكى

تېشىلىپ، ئىچىدىكى سۇ چىقىرىلىدۇ، تۇغۇت ئىسكىنىسى بىلەن
باش سۆڭىكىنى چېقىۋەتسىمۇ بولىدۇ.

2. تۆرەلمە بېشىنى كېسىپ ئېلىۋېتىش

بۇ ئۇسۇل تۆرەلمە بېشى ئېگىلىپ قالغان ئالدى ئاياقنى
تۈزەشكە دەخلى قىلغان، بىر يانغا قايرىلىپ كەتكەن، تۆۋەنگە
پۈكۈلۈپ قالغان ۋە تۆرەلمە يوغىناپ كەتكەن ئەھۋاللاردا
قوللىنىلىدۇ.

مەشغۇلات: كۆز چانغى ياكى ئىگەكتىن تۇغۇت ئىلمىكى
بىلەن ئىلىۋېلىپ، باش تۇغۇت يولىدىن تارتىپ چىقىرىلىدۇ.
ئاندىن گەدەندىن تارتىپ قۇلاق ئالدى، كۆز ئاستى ھەم
جاۋاغىچە باشنىڭ ئىككى يېقىمىدىن كېسىلىدۇ ھەمدە تېرە
ئارقىغا تارتىپ سويۇلىدۇ، ئاندىن بويۇن تارمۇشىنى كېسىپ،
گەدەن سۆڭىكى تۆشۈكىدىن ئىلمەك بىلەن ئىلىۋېلىپ، بىر
تەرەپتىن تارتىپ تۇرۇپ، بىر تەرەپتىن بوغۇملار ۋە كۆمۈر-
چەكلەرنى كېسىپ، باش چىقىرىۋېلىنىدۇ. ئەگەر باشنى چىقىرىش
مۈمكىن بولمىسا، تۇغۇت يولىدىلا يوشۇرۇن بىسلىق پىچاق
بىلەن تېرە ۋە مۈسكۈلنى كېسىپ، ئاندىن سىرتماق سالغۇچ
ئارقىلىق سىم ھەرە تىغىنى تۆرەلمە بويىنىغا ئوراپ، ھەرىنى
سىرتتىكى ھەرە غىلىپى ئارقىلىق تېشىدىن تارتىپ، باش
ھەرىدەپ ئېلىنىدۇ.

3. ئالدى ئاياقلارنى پارچىلاپ ئېلىش

بۇ ئۇسۇل ئالدى ئاياق بوغۇملىرى ئېگىلىپ قېلىش، مۇرە

يوغىناپ كېتىش ياكى تۆرەلمە گەۋدىسىنى پارچىلاشقا شارائىت يارىتىش قاتارلىقلاردا قوللىنىلىدۇ.

مەشغۇلات: كېسىلىدىغان ئاياقنىڭ چاچلىق قىسمىدىن باغلىۋېلىپ، ئويمانلىق پىچاق ياكى يوشۇرۇن بىسلىق پىچاق بىلەن تاغاق چۆرىسىدىن باشلاپ تېرە ۋە مۇسكۇل كېسىلىپ، تاغاق كۆكرەكتىن ئاجرىتىلىدۇ. ئاندىن بىرەيلەن قول بىلەن تۆرەلمىنىڭ تۆشىدىن ئىتتىرىپ تۇرىدۇ، يەنە بىرەيلەن تۆرەلمىنىڭ ئالدى ئايىغىنى تولغاش بىلەن بىللە شوپىنىنى تارتىپ، ئۇنى تارتىپ چىقىرىدۇ. چىقىرىش تەس بولسا، تاغاق چۆرىسىنىڭ تېرىسىنى كەسكەندىن كېيىن، سىم ھەرە بىلەن ھەرىدەپ ئېلىنىدۇ (بۇ ئۇسۇل باشقا بوغۇملارغىمۇ باپ كېلىدۇ).

4. كۆكرەكنى كىچىكلىتىش

بۇ ئۇسۇل تۆرەلمە يوغىناپ كېتىش، تۇغۇت يولى تار بولۇش، كۆكرەك قەپىزى بەك چوڭ بولۇش قاتارلىقلاردا قوللىنىلىدۇ.

مەشغۇلات: ئاۋال بىر ئالدى ئاياق كېسىپ چىقىرىلىدۇ، ئاندىن سويۇش بەلچىسى بىلەن كۆكرەكتىن قوۋۇرغا ياسىغىچە تېرىنى سويۇپ بىر تۆشۈك ئېچىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇزۇن دەستىلىك ئىلمە كىسىمان پىچاقنى تۆشۈكتىن كىرگۈزۈپ، ئاخىرقى قوۋۇرغىدىن ئېلىپ تۇرۇپ كۈچەپ تارتىلسا، قوۋۇرغا ئۈزۈلىدۇ-دە، كۆكرەك تېمى ئولتۇرۇشۇپ، كۆكرەك قەپىزى كىچىكلەيدۇ.

5. تۆرەلىمنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى كېسىپ ئېلىش
بۇ ئۇسۇل تۆرەلىمنىڭ ھەممە يېرى سۇلۇق ئىشلىغان،
گازلىق ئىشلىغان، ياكى تۆرەلىمە يوغاناپ كەتكەن ئەھۋاللاردا
قوللىنىلىدۇ.

مەشغۇلات: بويۇننى كۆك تومۇر ئېزىقچىسىنى بويلىتىپ
تېلىپ، قىزىل ئۆڭگەچ بىلەن كاناي تارتىپ چىقىرىلىدۇ، ئاندىن
قولنى كۆكرەك تۆشۈڭىدىن تەقىپ، كۆكرەك ۋە قوساق بوشلۇق-
غىدىكى ئەزالار تارتىپ چىقىرىلىدۇ. ياكى بولمىسا ئاۋال بىر
ئالدى پۇتىنى تاغاق بىلەن بىللە كېسىۋېتىپ، ئاندىن 4 تال
قوۋۇرغىنى كېسىپ ئېلىپ، قولنى شۇ يەردىن تەقىپ، كۆكرەك
ۋە قوساق بوشلۇغىدىكى ئەزالار تارتىپ چىقىرىلىسىمۇ تۆرەلىمە
كىچىكلەيدۇ.

يۇقۇمسىز بالا تاشلاش

تۆرەلىمە ئانا تېنىدە نورمال يېتىلىۋاتقاندا زىيان-زەخمەتكە
ئۇچراپ، بوغازلىقنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى، بەزىدە تۆرەلىمنىڭ
ئۈزلۈڭىدىن ئانا تېنىگە شۈمۈرۈلۈشى، بەزىدە تۆرەلىمنىڭ
ئۆلۈك تۇغۇلۇشى ياكى چالا تۇغۇلۇشى بالا تاشلاش ھىساپلىنىدۇ.
[كېسەللىك سەۋىيىسى] كۆپىنچە كۆكرەپ قالغان، چىرىگەن
يەم-خەشەكلەرنى ئۇزاققىچە بېرىش، كۈندىلىك يېمەكلىك
تەركىبىدە ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ تەڭپۇڭ بولماسلىقى، ئاقسىل،

مىنېرال ماددىلار (كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر، مانگان، كوبالت، يود قاتارلىقلار) ۋە ۋىتامىن A، ۋىتامىن E كەمچىل بولغان ئوزۇقلار بىلەن بېقىش؛ ئىش جەريانىدا قېقىلىش، يىقىلىش، سوقۇلۇش، بوغاز ئىنەكنىڭ ئۈركۈپ كېتىشى، ئۇسۇش ياكى كۈيلىگەن بۇقنىڭ بوغاز ئىنەككە ئارتىلىشى قاتارلىقلار ئارقىسىدا بالا تاشلاش يۈز بېرىدۇ. ئېغىر كېسەللىك، يۇقۇرى قىزىتما ياكى بوغازلىق مەزگىلدە ئىشلىتىش مەنى قىلىنغان دورىلارنى ئىشلىتىشىنىمۇ بالا تاشلاش كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەللەنگەن سىيىردا روھسىز-لىنىش، ئىشتەي تۇتۇلۇش، سۈت مىقدارى ئازلاش، جىنسى يولىدىن قان چىقىش، ياكى قىزىل شىللىق ئاجراتمىلار ئېقىش، دۈمچىيىپ تۇرۇش، سىيگەندەك تۇرۇقتا تۇرۇش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، مانا بۇلار بالا تاشلاشتىن بەلگە بېرىدىغان ئالامەتلەردۇر. ئىنەك بالا تاشلاش ئالدىدا تىنماي ئىنجىقلايدۇ، قاتتىق ئىنجىقلاۋەرگەنلىكتىن باش سۈيى پەردىسى يېرىلىپ، تۆرەلمە تۇغۇلىدۇ، بۇ چاغدىكى ئالامەتلەر نورمال تۇغۇت ۋاقتىدىكى ئەھۋالغا ئوخشاپ كېتىدۇ، بەزىدە باش سۈيى چىقىپ قاندىن كېيىن تۆرەلمە چىقماي، بالياتقۇدا تۇرۇپ قالىدۇ ۋە ۋاقتىنىڭ ئۆتۈشى بىلەن چىرىپ پارچىلىنىدۇ-دە، زەھەرلىك ماددىلار ئانا تېنىگە شۈمۈرۈلۈپ، ئومۇمىي بەدەنلىك كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بەزىدە تۆرەلمە ئورنى توغرا بولمىغانلىقتىن قىيىن تۇغۇت يۈز بېرىدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش] بالا تاشلىغان سىيىر، چۈشۈك ۋە بۇلغانغان ئورۇن، سايما قاتارلىقلارنى تېز بېقىشقا سىيە قىلىش، بالا تاشلاش جەريانىدىن خەۋەردار بولۇش ياكى ئۇنى كۈزىتىش، چۈشۈكنىڭ ئەزالىرىدا كۆرۈلگەن ئۆزگىرىشلەرنى تەكشۈرۈپ، ئۇنىڭ سەۋىيىسىنى ئېنىقلاش، ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش جەھەتتە ئۈنۈملۈك تەدبىر كۆرۈش كېرەك.

(1) بالا تاشلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن ھامان، پروگېس-تېرون ئوكۇلىدىن مۇسكۇلغا 10~15 م ل ئۇرۇلىدۇ، 10% لىك ئاتروپىن سۇلفات ئوكۇلىدىن تېرە ئاستىغا 3~5 م ل ئۇرسىمۇ بولىدۇ.

(2) بالا ۋە بالا ھەمىرىيى چۈشۈپ، قوشۇلما كېسەللىك كۆرۈلمىسە، سىيىرنى كۈتۈشنى كۈچەيتىش؛ بالا ھەمىرىيى چۈشمىسە ياكى بالا ئۆلۈك بولسا، بالىنى ئوپىراتسىيە يولى بىلەن چىقىرىپ، بالىياتقۇنى كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 2~3 كۈنگىچە 0.1% لىك مارگانىسوپ ياكى 0.1% لىك رىۋانول ئېرىتمىلىرى بىلەن يۇيۇپ تۇرۇش كېرەك. ئومۇمىي بەدەنلىك كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، 5% لىك گلىكوزىلىق ناترىي خلورىد ئېرىتمىسىدىن كۆك تومۇرغا 1000~1500 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ ھەمدە ئانتىبىيوتىك دورىلار ياكى سۇلفانىلامىدلىق دورىلار بىلەن داۋالىنىلىدۇ.

جىنىسى يولنىڭ چىقىپ قېلىشى


جىنىسى يولنىڭ قىسمىەن ياكى تامامەن تەتۇر ئۆرۈلۈپ جىنىسى ئېغىزنىڭ تېشىغا چىقىپ قېلىشى جىنىسى يولنىڭ چىقىپ قېلىشى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ھال بوغازلىقنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە قېرى سىيىرلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىۋى] بوغازلىق مەزگىلىدە ئوزۇقلىنىش ناچار، ھەركەت يېتەرسىز بولۇش، باش سۈيى كۆپ بولۇش، تۆرەلىمە يوغىناپ كېتىش، قوشكېزەك بولۇش، بوغاز سىيىرلار يانتۇ يەردە تۇرۇش، ئۇزاققىچە قوپماي يېتىش قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن جىنىسى يولنى تۇتۇپ تۇرغۇچى توقۇل-مىلار بوشىشىپ كېتىپ ۋە كۈچىنى يوقىتىپ قويۇپ، جىنىسى يول سىرتقا چىقىپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] جىنىسى يولنىڭ قىسمىەن سىرتقا چىقىپ قېلىشى تولاراق بوغاز سىيىر ياتقان چاغدا كۆرۈلىدۇ، يەنى كىچىك بالىنىڭ بېشىدەك قىزىل، يۇمۇلاق بىر نەرسە جىنىسى ئېغىز تېشىغا چىقىپ قالىدۇ، سىيىر ئورنىدىن تۇرغاندىن كېيىن، ئۇ ئۆزلۈگىدىن كىرىپ كېتىدۇ.

جىنىسى يول تامامەن چىقىپ قالغاندا، ئۇ تەتۇر ئۆرۈلۈپ قالغاندىن باشقا، يەنە ئىشىپ چىقىپ قالغان بالىياتقۇ بويىنىمۇ كۆرگىلى ۋە سىلاپ بىلگىلى بولىدۇ، سىيىر ئورنىدىن تۇرغاندىمۇ

ئۇ ئىچىگە كىرىپ كەتمەيدۇ، بۇ ھال ئۇزاققا سوزۇلسا، ئۇ قارامتۇل قىزىل، ياكى سۆسەن رەڭگە كىرىپ قالىدۇ. ئادەتتە ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلمەيدۇ، كېسەللەنگەن سىيىر سەل بىئارام بولسلا، پات-پات ئىنجىقلايدۇ. تېشىغا چىقىپ قالغان شىلىق پەردە زەخمىلەنسە، ئاسانلا يۇقۇملانپ يىرىڭلايدۇ.



51-رەسىم قىسىپ توختاتقۇچ ۋە ئۇنى ئورنىتىش

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] بوغازلىقنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە بېقىش-باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، قۇرۇق ئوت-چۆپنى ئاز بېرىپ، ئوزۇقلۇق قىممىتى مول يەم-خەشەك بىلەن بېقىش، كۆپرەك ھەركەت-لەندۈرۈش، سىيىر ياتىدىغان ئورۇننىڭ يانتۇلۇق دەرد-جىسمىنى مۇۋاپىق قىلىش كېرەك.

جىنسى يول يېنىك دەرىجىدە چىقىپ قالغان سىيىرلارنى بېقىش-باشقۇرۇش ئىشىنى كۈچەيتىش، مۇۋاپىق دەرىجىدە كۆپرەك ھەركەتلەندۈرۈش، جىنسى يول سىرتىنى پاكىز تۇتۇش، زەخمىلەندۈرۈپ قويماسلىق لازىم. شۇنداق قىلىنسلا، سىيىر تۇققاندىن كېيىن جىنسى يولىنىڭ چىقىپ قالغان قىسمى ئاستا-

ئاستا يېنىپ كىرىپ كېتىدۇ. ئەسلىگە قايتىمىغانلىرىنى ئورنىغا سېلىش ۋە بېكىتىش ئۇسۇلى بويىچە بىر تەرەپ قىلىش لازىم. ئورنىغا سېلىش: ئاۋال 2% لىك زەمچە ياكى 0.1% لىك مارگانسوپ سۈيى بىلەن يۇيۇپ ھەمدە ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ، ئىششۇق قايتۇرۇلىدۇ. ئورنىغا سالغۇچى تېشىغا چىقىپ قالغان جىنىسى يولىنى مۇشتۇمى بىلەن ئىتتىرىپ، سىيىر ئىنجىقلىمىغان چاغدا ئورنىغا سېلىۋېلىشى كېرەك. ئورنىغا سېلىش تەس بولسا، قاتتىق پەردىنىڭ بىرىتقى بوشلۇغىدىن ھۇشسىزلاندۇرۇلسا بولىدۇ.

توختىتىش ئۇسۇلى: قايتا چىقىپ كەتمەسۇن ئۈچۈن، قىسىپ توختاتقۇچ بېكىتىپ قويۇلىدۇ، ياكى چىڭقىلىشنى بوشاشتۇرىدىغان تىكىش ئۇسۇلى بويىچە جىنىسى يول لېۋىدىن 2~3 يىپ تىكىپ قويۇلسىمۇ بولىدۇ.

قىسىپ توختاتقۇچ ئورنىتىلغاندىن كېيىن، سىيىر سىيگەندە دىققەت قىلىش لازىم، 4~5 كۈندىن كېيىن سىيىردا ئىنجىقلاش كۆرۈلمىسلا، ئۇنى ئېلىۋەتسە بولىدۇ.

ھەمىيى چۈشمەسلىك

سىيىر تۇغۇپ 12 سائەتكىچە ھەمىيى چۈشمەسە، بۇ ھەمىيى چۈشمەسلىك دەپ ئاتىلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] بوغازلىقنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە

ھەركەت يېتەرلىك بولماسلىق، ئوزۇق تەركىبىدە ۋىتامىن، كالىسىي تۈزلىرى ۋە باشقا مىنېرال ماددىلار يېتەرلىك بولماسلىق، باش سۈيى بەك كۆپ بولۇش، تۆرەلمە يوغاناپ كېتىش ياكى قوشكېزەك بولۇش ئارقىسىدا، بالىياتقۇنىڭ قىسقىرىشچانلىقى ئاجىزلاپ، ئەش بالىياتقۇدىن قىسمەن ياكى پۈتۈنلەي ئاجرىماي قېلىپ، ھەمىيى چۈشمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ. بالىياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياكى بالا ھەمىيى ياللۇغلانغاندا، ئەش بىلەن بالىياتقۇ چاپلىشىپ قېلىپمۇ ھەمىيى چۈشمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ئەش جىنىسى ئېغىز تېشىغا بىرئاز چىقىپ قالىدۇ، بەزىدە ئوشۇق بوغۇمىغىچە ساڭگىلاپ قالىدۇ، كېسەل سىيىر تىنماي ئىنجىقلايدۇ، دەسلەپتە ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلمەيدۇ، كېيىنكى مەزگىلدە ئەش چىرىگەنلىكتىن، جىنىسى يولىدىن بۇلغانغان سېسىق سۇيۇقلۇق ئاقىدۇ، ئىچىدە چىرىگەن ئەش پارچىلىرى بولىدۇ. كېسەل سىيىر روھسىزلىنىدۇ، سۈتى ئازلايدۇ، ئىشتىيى ناچارلايدۇ، تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ. ۋاقتىدا داۋالىمىسا، بالىياتقۇ ئىچكى پەردىسىمۇ ياللۇغلىنىدۇ، كېسەللىك ئېغىرلاشسا، سىيىر سېپتىسېمىيە بولۇپ ئۆلۈپ قالىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] بېقىش - باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، بوغازلىقنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە ھەركەتنى مۇۋاپىق ھالدا كۆپەيتىش، مىنېرال ماددىلىق ۋە ۋىتامىنلىق ئوزۇقلارنى

تولۇقلاپ بېرىش لازىم. تۈبېركۇليوز، برۇتسېللىوز، بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغى قاتارلىقلارنىڭ پەيدا بولۇشىدىن ساقلىنىش كېرەك. سىيىرغا تۇققاندىن كېيىنلا 0.5~1 جىڭچە ئاق ھاراق ئىچكۈزۈلسە، ئەشنىڭ چۈشۈشى تېزلىشىدۇ.

(1) بالياتقۇنىڭ قىسقىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەشنىڭ چۈشۈشىنى تېزلىتىش ئۈچۈن، مۇسكۇلغا ھىپوفىزىندىن 10~15 م ل، ياكى سىتى بېسترولىدىن 10~20 م گ ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(2) ئەشنىڭ بالياتقۇدىن ۋاقتىدا ئاجرىلىپ چىقىشىنى تېزلىتىش ئۈچۈن، بالياتقۇغا 10% لىك ناترىي خلورىد ئېرىتمىسىدىن 1000~2000 م ل كىرگۈزۈلىدۇ.

(3) سىيىر تۇغۇپ 3 سائەتكىچە ھەمىيى چۈشمىسە، كۆك تومۇرغا 10% لىك كالتسىي خلورىددىن 150~250 م ل، ياكى 10% لىك كالتسىي گلىكوزىدىن 500 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ. 5~6 سائەتكىچىمۇ چۈشمىسە، يۇقۇرقى دورىلاردىن يەنە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىش بىلەن بىللە مۇسكۇلغا ھىپوفىزىندىن 5 م ل (ھەر م ل تەركىبىدە 10 بىرلىك بولىدۇ) ئوكۇل قىلىنسا، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.


(4) ئوپېراتسىيە قىلىپ ئېلىش: ھەمىيى چۈشمىگەن سىيىر ئۆرە تۇرغۇزۇپ بېكىتىلىپ، قۇيرۇغى يېنىغا قايرىپ باغلىنىدۇ، جىنىسى يولىنىڭ چۆرىسى پاكىز يۇيۇلۇپ تولۇق دېزىنېكسىيە قىلىنىدۇ، ئوپېراتسىيە قىلغۇچى تىرىناقلىرىنى ئېلىپ، قولىنى بىلىگىگىچە ئادەتتىكى تاشقى كېسەللىكتە قىلىنىدىغان دېزىنېكى-

سىيە ئۇسۇلى بويىچە دېزىنفېكسىيە قىلىدۇ ھەمدە قولغا ۋازىلىن سۈركەيدۇ. سول قول بىلەن ساڭگىلاپ قالغان ئەشنى يېنىنىڭ تارتىپ تۇرۇپ، ئوڭ قولىنى بالياتقۇ بىلەن ئەشنىڭ ئارىلىقىغا كىرگۈزۈپ، كۆرسەتكۈچ ۋە ئوتتۇرا بارماقلار بىلەن بالياتقۇنى قىسىپ تۇرۇپ، باش بارماق بىلەن ئەش ئاجرىتىلىدۇ ۋە يېقىندىن يىراققا، يۇقۇرىدىن تۆۋەنگە بىر-بىرلەپ ئاجرىتىلىدۇ، بالياتقۇ بۇرجىگىچە ئاجرىتىلغان ئەمما قول ئۇنىڭ ئۇچىغا يەتمىگەندە، ئەش ئاستا تارتىلىپ بالياتقۇ بۇرجىگى يېقىنلاش-تۇرۇلىدۇ ۋە ئاجرىتىلىدۇ (ئەشنى تارتىپ ئۇزۇپ قويماسلىق لازىم). ئەشنى ئاجرىتىپ بولغاندىن كېيىن 0.2% لىك مارگان-سوپ ياكى 0.1% لىك رېۋانول ئېرىتمىلىرى بىلەن بالياتقۇنى يۇيۇش، بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئانتىبىيوتىك ياكى سۇلفانىلامىدلىق دورىلار بىلەن داۋالاش لازىم.

بالياتقۇنىڭ چىقىپ قېلىشى

سىيىر تۇغۇپ بولغاندىن كېيىن بالياتقۇنىڭ جىنىسى يول ئىچىگە ياكى تېشىغا قىسمەن ياكى تامامەن چىقىپ قېلىشى بالياتقۇنىڭ چىقىپ قېلىشى دەپ ئاتىلىدۇ. [كېسەللىك سەۋىيىسى] تۇغۇشتىن بۇرۇن ھەركەت يېتەرلىك بولماسلىق، سىيىر ئورۇق ۋە ئاجىز بولۇش، ياخشى بېقىلماس-

لىق، قېرىلىق قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن بالياتقۇ مۇسكۇلى بىلەن بالياتقۇ تارىمۇشى ھەددىدىن زىيادە بوشىشىپ كېتىپ، سىير تۇققان ۋاقتىدا بالىنىڭ چىقىشىغا ئەگىشىپ بالياتقۇمۇ تەتۈر ئۆرۈلۈپ قالىدۇ، سىير تۇققاندىن



كېيىن، ھەمىيى چۈشمىگەندە، ئۇنى كۈچەپ تارتىش ياكى ئۇنىڭغا ئېغىر نەرسە ئېسىپ قويۇش، قىيىن تۇغۇتقا ياردەم بېرىش ئۇسۇلى مۇۋاپىق بولماسلىق، ھەمىيىنى كۈچەپ تارتىپ چىقىرىش قاتارلىقلار ئارقىسىدا بالياتقۇ چىقىپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] بالياتقۇ 52-رەسىم بالياتقۇنىڭ چىقىپ قېلىشى ئىچىگە ئۆرۈلۈپ قالغاندا، سىرتتىن

ئاسانلىقچە بايقىغىلى بولمايدۇ. سىير تۇغۇپ بولغاندىن كېيىن ئىنجىقلايدۇ، بىئارام بولىدۇ، قۇيرۇق كۆتىرىلىپ قالىدۇ، سانجىق بولغاندەك ئالامەت كۆرۈلىدۇ، جىنىسى يولدىن تەكشۈرگەندە بالياتقۇ بويىنىنىڭ ئىچىگە پۇرۇلۇپ تۇرغانلىقى بىلىنىدۇ.

بالياتقۇ پۈتۈنلەي چىقىپ قالغاندا، سوقچاق، خالتىسىمان نەرسە جىنىسى ئېغىزدىن چىقىپ قالىدۇ، ئۇنىڭ ئۇچى ئوشۇق بوغۇمىغىچە ساڭگىلاپ تۇرىدۇ، بالياتقۇ يۈزىدە تۇخۇمدەك گۆش مۇنەكچىلىرى تارقاق ھالدا تۇرىدۇ. چىقىپ قالغان نەرسە

دەسلەپتە قىزىل بولىدۇ، كېيىن قان ئايلىنىش توسقۇنلۇغى تۈپەيلىدىن تەدرىجى سۆسەن رەڭگە كىرىدۇ. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۇ يەردە قان تۇرۇپ قالىدۇ ۋە سۇلۇق ئىشش پەيدا بولىدۇ، ئەگەر ۋاقىتتا داۋالىمىسا، ئاسانلا جاراھەت پەيدا بولىدۇ ۋە يۇقۇملىنىدۇ، بۇ ھال تەرەققى قىلىپ قان كېتىش ياكى سېپتىسىمىيە كېلىپ چىقىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] سىيرلارنى بوغازلىقنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە مۇۋاپىق ھەركەتلەندۈرۈپ تۇرۇش، بېقىش - باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، تەركىۋىدە مىنېرال ماددىلار ۋە ۋىتامىنلار بولغان ئوزۇق بىلەن بېقىش لازىم. تۇغۇت قوبۇل قىلغاندا ياكى قىيىن تۇغۇتقا ياردەم بەرگەندە، تۆرەلىمنى ئاستا تارتىپ چىقىرىش، ئەشنى تارتىپ ئاجرىتىشقا توغرا كەلگەندە كۈچىمەي تارتىپ ئاجرىتىش لازىم.

(1) بالياتقۇنىڭ ئىچىگە پۈكۈلۈشنى داۋالغاندا، قولى دېزىنفېكسىيە قىلىپ ۋە مايلاپ، تۇغۇت يولىغا كىرگۈزۈپ، ئىچىگە پۈكۈلگەن بالياتقۇ بۇرجىگىنى ئاستا ئىتتىرىپ ئەسلىگە كەلتۈرۈش لازىم. بالياتقۇ ئىچىگە باكتېرىيىسىزلىنىدۇرۇلگەن ئىلمان فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە قويۇپ، ئۇنىڭ بېسىمىدىن پايدىلىنىپ ئورنىغا چۈشۈرۈشكەمۇ بولىدۇ.

(2) بالياتقۇ پۈتۈنلەي چىقىپ قالغاندا ۋاقىتتا تۇتۇش قىلىپ ئەسلىگە كەلتۈرۈش لازىم. كېسەل سىيىرنى ئالدىنى پەس، كەينىنى ئىگىز قىلىپ ئۆرە تۇرغۇزۇپ، ئاۋال بالياتقۇنى

0.1% لىك مارگانسوپ ئېرىتمىسى بىلەن پاكىز يۇيۇپ، چاپلى-
شىپ قالغان قۇم-توپا، ئوت-چۆپ يۇقۇندىلىرىنى ھەمدە ئاج-
رىمىغان ھەمىرىنى ئادالاپ چىقىرىش، توقۇلما چىرىگەن ياكى
قەقەچ پەيدا بولغان بولسا، ئۇنى ئۆتكۈر قوشۇق بىلەن ئاستا
قىرىپ چىقىرىش، ئاندىن 3% لىك زەمچە ياكى 0.2% لىك
مارگانسوپ ئېرىتمىسى بىلەن بالياتقۇنى يۇيۇپ، ئۇنىڭ قىسقى-
رىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئۇنىڭغا يود گلىتسېرىن سۈركەش،
بالياتقۇ شىلىق پەردىسى يىرتىلغان بولسا تىكىپ قويۇش
لازم.

بالياتقۇنى ئورنىغا كەلتۈرۈشتە، بىرەيلەن دېزىنفېكسىيەلى-
گەن داكا بىلەن چىقىپ قالغان بالياتقۇنى جىنسى يول ئاغزى
بىلەن تەڭ ئىگىزلىكتە كۆتىرىپ تۇرىدۇ، يەنە بىرەيلەن مۇشتۇ-
مىغا داكا ئوراپ بالياتقۇ بۇرجىمىنىڭ ئۈچىدىن ئىتتىرىپ تۇرىدۇ
ۋە ئىنەك ئىنجىقلىمىغان چاغدا پەم بىلەن ئىتتىرىپ، چىقىپ
قالغان بالياتقۇنى جىنسى يول ئىچىگە كىرگۈزۈۋېتىدۇ.

ئىككى قول بىلەن جىنسى يولىنىڭ ئىككى يېنىدىن بىر-
بىرلەپ ئىتتىرىپ كىرگۈزۈۋېتىلىشمۇ بولىدۇ، قولى ئالماشتۇرۇپ
تۇرۇشقا توغرا كەلگەندە، ياردەمچى خادىم يېقىندىن ياردەمدە
بولىدۇ، بالياتقۇ جىنسى يول ئىچىگە پۈتۈنلەي كىرگۈزۈلگەن-
دىن كېيىن، ئاندىن قوساق ئىچىگە كىرگۈزۈلىدۇ. ئىنەكنىڭ
ئىنجىقلىشى تۈپەيلىدىن بالياتقۇنى ئورنىغا كىرگۈزۈش توس-
قۇنلۇققا ئۇچرىسا، قاتتىق پەردىنىڭ تاشقى بوشلۇغىدىن ھۆش-

سىزلاندۇرۇلسا بولىدۇ. بالياتقۇ ئورنىغا كىرگۈزۈلۈپ بولغاندىن كېيىن بالياتقۇغا پېنتىسىلىنىدىن 8 تۈمەن بىرلىك، ياكى ئاۋېئومىتسىن كۇمۇلچىدىن 4~5 دانە كىرگۈزۈلىدۇ. ئاندىن ئىنەكنى ئالدىنى پەس، كەينىنى ئىگىز قىلىپ تۇرغۇزۇپ، ئاسراشقا دىققەت قىلىنىدۇ. ئىنەك داۋاملىق ئىنجىقىلسا، بالياتقۇ قايتا چىقىپ كەتمسۇن ئۈچۈن، جىنىسى ئېغىز قىرىدىن چىقىلىشنى پەسەيتىش مەقسىدىدە تىكىپ قويۇپ ياكى قىسىپ توختاتقۇچىنى ۋاقىتلىق قاپلاپ بېكىتىپ قويۇپ، 2~3 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن (ئىنجىقلاش توختىغاندىن كېيىن) ئېلىۋەتسە بولىدۇ.

يۇقۇملىنىپ قالمىسۇن ئۈچۈن، بالياتقۇ ئورنىغا چۈشۈرۈلگەندىن كېيىنلا ئانتىبىيوتىك ياكى سۇلفانىلامىدلىق دورىلار ئۆكۈل قىلىنىدۇ، ئومۇمى بەدەنلىك ئالامەت كۆرۈلگەندە، يۈرەك كۈچەيتكۈچى سۇيۇقلۇق بېرىلىپ، كېسەلنىڭ ئېغىرلىشىپ كېتىشىنى توساشقا توغرا كېلىدۇ.

بالياتقۇ چىقىپ كەتكەندىن كېيىن يېرىلىپ، چىرىپ ياكى كەڭ دائىرىدە زەخمىلىنىپ ئورنىغا كەلتۈرۈش تەس بولغاندا، ئىنەكنى قۇتقۇزۇۋېلىش ئۈچۈن بالياتقۇ كېسىپ ئېلىپ تاشلايدىمۇ بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئاۋال ھىپوفىزىندىن مۇسكۇلغا 8~10 م ل ئۆكۈل قىلىنىدۇ، ئاندىن داكا بوققۇش بىلەن بالياتقۇ بۇرجىگىنىڭ تۈۋىدىن مەھكەم باغلاپ قاننىڭ كۆپ چىقىپ كېتىشىنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ ۋە كېسىلىدىغان ئورۇندىن ئىنقىلىت.

راتلىق ھۇشسىزلاندۇرۇلدى (كېسىش ئالدىدا بالىياتقۇ بۇرچىگە-
نىڭ تۈۋىدىن كىچىك تۆشۈك ئېچىپ، ئىچىگە ئۈچەي كىرىپ
قالغان- قالماغانلىقى تەكشۈرۈلدى). ئۇنىڭدىن كېيىن دىئامېترى
2 م م كېلىدىغان پۇختا يىپ بىلەن بالىياتقۇ بويىندىن 10~15
س م يىراقتىن قوشلاپ بوغۇپ، ئۇنىڭ 5~6 س م ئاستىدىن
بالىياتقۇ كېسىپ تاشلىنىدۇ ۋە دەرھال يود سۈركەپ دېزىنفېك-
سىيە قىلىنىپ ياكى كېسىلگەن ئۇچى كۆيدۈرۈلۈپ، ئاندىن
جىنىسى يولىغا كىرگۈزۈلىدۇ. كېيىن جىنىسى يول ھەر كۈنى
0.1% لىك مارگانسوپ ئېرىتمىسى، ياكى 0.1% لىك رىۋانول
ئېرىتمىسى بىلەن يۇيۇپ تۇرۇلىدۇ. ئىنجىقلاش قاتتىق بولسا،
جىنىسى يول ئېغىزى ۋاقىتلىق تىكىپ قويۇلىدۇ. نورمال ئەھۋال-
دا، تىكىلگەن جاي 14~21 كۈندە ساقىيىپ كېتىدۇ.

تۇغۇت پالىچى

تۇغۇت پالىچى سېغىن سىير تۇققاندىن كېيىن ئۇشتۇمتۇت
كۆرۈلىدىغان ئۆتكۈر، نېرۋا خاراكتىرلىق كېسەللىك بولۇپ،
كىلىنىكىدا ئايلىنىپ كېتىش ۋە پالەچلىنىش بىلەن خاراكتېر-
لىنىدۇ. تولاراق يېڭى تۇققان، سېمىز، سۈتلۈك سىيىرلاردا
كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] كېسەللىك سەۋىيىسى تېخىمۇ ئانچە
ئېنىق ئەمەس. سۈتلۈك سىيىر تۇققاندىن كېيىن كۆپلەپ

سېغىش ئارقىسىدا، سىير تېنىدىكى قان شېكېرى ھەم كالتسىيە ماددىلىرىنىڭ ئازىيىپ كېتىشى بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىنىڭ بىۋاسىتە سەۋەبىدۇر. تۇغۇشتىن ئىلگىرى تولدۇرغان ئاقىل تەركىۋى مول ئوزۇق بىلەن بېقىلىش، سېمىزلىك، ھەركەت ئاز بولۇش قاتارلىقلارمۇ تۇغۇت پالچىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. خان ئامىللاردۇر.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەللىك ئالامەتلىرى كىلىنىكىدا تىپىك ئالامەتلەر ۋە تىپىك بولمىغان ئالامەتلەر دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ.

تىپىك ئالامەتلەر: تولدۇرغان سىير تۇغۇپ 12~72 سائەتتىن كېيىن كۆرۈلىدۇ. كېسەل سىير روھسىزلىنىدۇ، ئىشتىيى ناچار-لايدۇ ياكى پۈتۈنلەي تۇتۇلىدۇ، كۆشىشى توختايدۇ، سۈتى ئازىيىدۇ، ئۆرە تۇرغاندا كەينى ئاياقلىرىنى ئالماشتۇرۇپ دەسسەپ تۇرىدۇ، دەلدەڭشىيدۇ، مۇسكۇلى دىرىلدەيدۇ. بەزى كېسەل سىيرلار باشتا قىسقا مەزگىل قۇتراپ ۋە مۆرەپ، كېيىن قارىغان پىتى تۇرۇپ قالىدۇ، دەلدەڭشىپ ماڭىدۇ، پۈتۈن بەدىنى دىرىلدەيدۇ، ئارقىدىنلا پالەچلىك ھالەتكە كىرىدۇ.

كېسەل سىير ياتسا قوپالمايدۇ، تۆت ئايىغىنى قوسىغى ئاستىغا ئېلىپ، بېشىنى بىر ياق كۆكرىگىگە قويۇپ ياتىدۇ، بېشىنى تارتىپ تۈزلەپ قويۇۋەتسىمۇ يەنە يېنىغا ئېگىۋالىدۇ. بەزى سىيرلار يېنىچە بېشى ھەم پۇتلىرىنى سوزۇپ ياتىدۇ. كۆز قارچۇغى كېڭىيىدۇ، قاپاقنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇشى ئاجىزلايدۇ

ياكى يوقىلىدۇ، تېرىسىگە يىمىگەنە سانچىپ كۆرۈلسە ئىنكاس قايتۇرمايدۇ، نەپەس ئاستىلايدۇ، خورەك ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ، جاۋغىمىدىن شال ئېقىپ تۇرىدۇ، ئۈچەي-قېزىن ھەرىكىتى ئاۋازى يوقىلىدۇ، تۈز ئۈچەيدە تىزەك تۇرۇپ قالىدۇ، سۈتى توختايدۇ، مۈڭگۈزى، ئاياقلىرى، قۇلاق ئۇچى ۋە بەدەن ئۈستى سۈۋۈپ، تەن تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلەپ $35\sim 36^{\circ}\text{C}$ قا چۈشىدۇ.

تىپىك بولمىغان ئالامەتلەر: تولاراق تۇغۇشتىن ئىلگىرى ياكى تۇغۇپ بولۇپ ئۇزاق ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن كۆرۈلىدۇ، روھسىزلىنىش كۆرۈلىدۇ، ئىشتەي پۈتۈنلەي تۇتۇلىدۇ، سىير ئايىغىنى ئالماشتۇرۇپ دەسسەپ تۇرىدۇ، كەينى گەۋدىسىنى ئىغاڭلىتىدۇ، تەسلىكتە ھەركەتلىنىدۇ، ياتقاندا بويۇن قىسمى "S" سىمان ئەگرى تۇرۇقتا تۇرىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] بوغاز سىيرغا تۇغۇشقا 2 ھەپتە قالغاندىن باشلاپ ياكى تۇغۇپ بىر ھەپتە ئۆتكىچە بوغۇز ۋە شىرنىلىق ئوزۇق ئاز بېرىلىدۇ. بوغازلىق مەزگىلدە كالتسىي تۈزلىرى تولۇقلاپ بېرىلىدۇ، كۆپرەك ھەركەتلەندۈرۈلىدۇ ۋە ئاپتاپقا سېلىنىدۇ. تۇغۇشقا بىرنەچچە كۈن قالغاندىن باشلاپ ۋە تۇغۇپ 3~4 كۈن ئۆتكىچە كۆك تومۇرغا كالتسىي گلىكوزىدىن ھەر قېتىمدا 200~300 م ل دىن كۈندە بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. تۇغۇپ بولغاندىن كېيىن كۆپلەپ تۈز سۈيى ئىچكۈ-زۈلىدۇ، 3 كۈنگىچە بەك كۆپ سېغىۋېتىلمەيدۇ.

(1) يىلىنغا يەل بېرىش: ئاۋال سۈتى سېغىۋېتىلىپ، ئاندىن

70% لىك ئىسپىرتلىق پاختا بىلەن ئەمچەك تۆپچىلىرى دېزىنفېك-
سىيە قىلىنىدۇ. يەل بېرىشتە ئەمچەك تۆپچىسىدىن دېزىنفېك-
سىيە قىلىنغان سۈت نەيچىسىنى كىرگۈزۈپ، ئاندىن يەل بەر-
گۈچ ياكى ئىشپىرسى ئارقىلىق بىر-بىرلەپ 4 ئەمچەككە يىغىن
تېرىسى چىڭقالغۇدەك تولىدۇرۇپ يەل بېرىلىدۇ. يەل بېرىپ
بولغاندىن كېيىن، ئەمچەك تۆپچىلىرىنى داكا بىلەن بوغۇپ
قويۇپ، 30~60 مىنۇت ئۆتكەندىن كېيىن يېشىۋېتىلىدۇ. زۆرۈر
تېپىلغاندا يەنە يەل بېرىلىدۇ.

(2) گلىكوزا ۋە كالتسىي تولۇقلاش: كۆك تومۇرغا 10% لىك
كالتسىي گلىكوناتتىن ياكى 20%~10 لىك كالتسىي گلىكوزىدىن
200~300 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(3) ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالاش: يۈرەك ئاجىزلىغاندا
كوففېين ئوكۇل قىلىنىدۇ، چوڭ قېرىن كۆپكەندە يىڭنە ساند-
چىپ يەل قويۇپ بېرىلىدۇ، تۈز ئۈچەيدە تىزەك توختاپ
قالغاندا، ھەمەل قىلىنىدۇ. داۋالاش جەريانىدا سىيرىنى ياتقان
ئورنىدىن پات-پات يۆتكەپ، ئۆرۈپ ياتقۇزۇش ۋە ئاستىغا
تۆشەك چۆپىنى قېلىن سېلىش ئارقىلىق تۆشەك جاراھىتى
بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىنىدۇ.

جىنسى يول ياللۇغى

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئۇرۇقلاندۇرۇش، تۇغۇتقا ياردەم

بېرىش ياكى تەكشۈرۈشتە جىنسى يول شىللىق پەردىسىنىڭ زەخمىلىنىشى ۋە يۇقۇملىنىشى جىنسى يول ياللۇغىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى ئاساسىي سەۋەپ ھىساپلىنىدۇ. خوشنا ئەزالارنىڭ ياللۇغى كېڭىيىپ كەتسىمۇ جىنسى يول ياللۇغى پەيدا بولىدۇ. [كېسەللىك ئالامەتلىرى] سىير دائىم دۈمچىيىپ، قۇيرۇغىنى كۆتىرىپ، ئىنجىقلاپ تۇرىدۇ ۋە سىيگەندەك تۇرۇقتا تۇرىدۇ. جىنسى يولدىن شىلىنىسمان ياكى يىرنىڭ ئارىلاش سۇيۇقلۇق ئېقىپ چىقىپ، كۆپىنچە جىنسى يول ئاغزى ياكى قۇيرۇققا چاپلىشىپ قالىدۇ، ئۇ سېسىق پۇرايدۇ. جىنسى يول شىللىق پەردىسى سۇلۇق ئىشىشىدۇ ۋە قانايىدۇ.

ئېغىر ياللۇغلانغاندا، سىير روھسىزلىنىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى كۆتىرىلىدۇ، سىيگەندە ۋە تىزەكلىگەندە ئىنجىقلايدۇ، ئاغرىقىسىنىدۇ. ياللۇغ سوزۇلمىغا ئايلانغاندا، شىللىق پەردە ئاقىرىپ، قېلىنلاپ، قاتتىقلىشىپ قالىدۇ، ياكى شەلۋەرەيدۇ ۋە يارىلىنىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

ئۇرۇقلاندۇرۇش، تۇغۇتقا ياردەم بېرىش ۋە جىنسى يولىنى تەكشۈرۈش ۋاقتىدا دېزىنېفىكسىيە قاندىلىرىگە قاتتىق ئەمەل قىلىش، جىنسى يولىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويماسلىق كېرەك.

(1) داۋالانغاندا، ئاۋال جىنسى يول سىرتىنى پاكىز يۇيۇپ، قۇيرۇغىنى بىر ياققا تارتىپ باغلاپ قويۇپ تۇرۇپ، 2% لىك ناترىي ھىدروكاربونات ياكى 0.1% لىك رىسۋانول، 0.1% لىك

مارگانسوپ ئېرىتمىلىرى بىلەن جىنسى يول پاكىز چايقاپ پۇيۇ-
لىدۇ. دورا ئېقىپ چىقىپ كەتسۇن ئۈچۈن، جىنسى يول كېڭىيىپ
قويۇلىدۇ.

(2) يارا پەيدا بولغان بولسا، شىللىق پەردە ئۈستىگە يود
گلىتسېرىن ياكى %3~1 لىك جىنتىيان ۋىئولىت سۈركىلىدۇ.

(3) ئومۇمى بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلگەندە، پىنتىسىلىن
ياكى باشقا دورىلار بىلەن ئالامىتىگە قاراپ داۋالىنىدۇ.

بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغى

بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغى سىيرلاردا كۆپ كۆرۈل-
دىغان كېسەللىك ھىساپلىنىدۇ. ئۇ ياللۇغنىڭ خاراكتېرىغا قاراپ،
شىلىمىش ق سۇيۇقلۇقلۇق ياللۇغ ۋە يىرىڭلىق ياللۇغ دەپ ئىككى
خىلغا ئايرىلىدۇ؛ كېسەللىك جەريانىغا ئاساسەن، ئۆتكۈر ياللۇغ
ۋە سوزۇلما ياللۇغ دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ ھەمدە تولاراق
سوزۇلما خاراكتېردا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] سۈنئىي ئۇرۇقلاندۇرۇش ۋە تۇغۇتقا
ياردەم بېرىش ۋاقتىدا دېزىنفېكسىيىنى قاتتىق قىلماسلىق، تۇغۇت-
تىن كېيىن ئوبدان ئاسرىماسلىق تۈپەيلىدىن باكتېرىيىدىن
يۇقۇملىنىش، ياكى تۇغۇت جەريانىدا باكتېرىيىلىك يۇقۇملىنىش
بۇ كېسەلنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى ئاساسىي سەۋەپ ھىساپلىنىدۇ.
ئۇ جىنسى يول ياللۇغى، بالياتقۇ بويىنى ياللۇغى، بالياتقۇنىڭ

بوۋىشى ۋە چىقىپ قېلىشى، ھەمىيى چۈشمەسلىك، بىرۋىتسېللىز قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئۇلىنىپمۇ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى]

(1) بالياتقۇ ئىچكى پەردىسىنىڭ ئۆتكۈر ياللۇغىدا: كېسەل سىيىرنىڭ ئىشتىي تۇتۇلىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ، ئۇ دۈمچىيىپ تۇرىدۇ، كۆپ سىيىدۇ، ئىنجىقلايدۇ، جىنىسى يول-دىن شىلىملىق ياكى يىرىڭلىق سۇيۇقلۇق ئېقىپ تۇرىدۇ. سىيىر ياتقان چاغدا، بۇ خىل سۇيۇقلۇق كۆپلەپ ئاقىدۇ.

تۈز ئۈچەيدىن تەكشۈرگەندە، بالياتقۇ بۇرجىكى يوغىنىپ قالغانلىقى بىلىنىدۇ، سىيىر ئاغرىقسىنىدۇ، بالياتقۇ بۇرجىكى قاتتىق بىلىنىدۇ، بەزىدە مىلىقلايدۇ.

جىنىسى يولدىن تەكشۈرگەندە، بالياتقۇ بويىنىنىڭ تاشقى ئاغزى ئىشىپ، قاناپ، سەل ئېچىلىپ قالغان بولىدۇ، ئۇنىڭغا سېسىق پۇرايدىغان ئاجراتمىلار چاپلىشىپ قالغان بولىدۇ.

(2) بالياتقۇ ئىچكى پەردىسىنىڭ سوزۇلما ياللۇغى:

شىلىملىق سۇيۇقلۇق خاراكتېردىكىسىدە: جىنىسى ھەۋەس دەۋرىيلىكى نورمال بولمايدۇ، بەزىدە نورمال دائىرىدىمۇ بولىدۇ، ئەمما قانچە ئۇرۇقلاندۇرۇلسىمۇ بوغاز بولمايدۇ ياكى بوغاز بولغاندىن كېيىن يوشۇرۇن بالا تاشلايدۇ. جىنىسى يولدىن تەكشۈرگەندە، بالياتقۇ بويىنىنىڭ سەل ئېچىلىپ، ئىشىپ، قاناپ قالغانلىقى ۋە ئۇنىڭدىن پاختىسىمان نەرسىلەر بار سۈزۈك شىلىملىق سۇيۇقلۇق كۆپلەپ چىقىپ تۇرغانلىقى بىلىنىدۇ. تۈز

ئۈچەيدىن تەكشۈرگەندە، بالياتقۇ بۇرجىگى قېلىن، بەزىدە قاتتىق بىلىنىدۇ، ئۇنىڭ قىسقۇرۇشچانلىغىنىڭ ئاجىزلاشقان ياكى يوقالغانلىقى بىلىنىدۇ.

يىرىڭلىق خاراكتېردىكىسىدە: جىنىسى ھەۋەس دەۋرىيىگى نورمال بولىدۇ، كۈيلىمەيدۇ ياكى بوش كۈيلىمەيدۇ، ياكى تىنماي كۈيىلەپ تۇرىدۇ. جىنىسى يولدىن ساغۇچ ئاق قايماقسىمان قويۇق يىرىڭلىق ئاجراتمىلار چىقىپ تۇرىدۇ. جىنىسى يول ئاغزى ئىش-شىيدۇ، تۆۋەن تەرىپى مەينەتلىشىپ قەقەچلىنىپ قالىدۇ. ئومۇمى بەدەنلىك ئالامەتلەر يانداش كەلگەندە، نەپەس ئېلىشى ۋە تومۇر سوقۇشى ئىتتىكىلەيدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ. جىنىسى يولدىن تەكشۈرگەندە، بالياتقۇ بويىنىڭ تاشقى ئاغزى-نىڭ ئېغىر دەرىجىدە قانغانلىقى، ئۇنىڭغا يىرىڭسىمان يېپىشقاق سۇيۇقلۇق يېپىشىپ قالغانلىقى، بەزىدە ئۇنىڭ يارىلانغانلىقى بىلىنىدۇ. تۈز ئۈچەيدىن تەكشۈرگەندە، بالياتقۇنىڭ سۇلۇق ئىشىشىپ، بىر ياكى ئىككى بۇرجىگىنىڭ يوغانلىغى، قىسقى-رىشچانلىغىنىڭ تۆۋەنلىگەنلىكى ياكى يوقالغانلىقى، بالياتقۇ تېمىنىڭ بوشىشىپ قالغانلىقى، قېلىن-ئېپىزلىگىنىڭ تەكشىسىز-لىكى، ئۇنىڭدا تاتۇق ئىزلىرى بارلىقى، تۇخۇمداندا سېرىق تەنچە تۇرۇپ قالغانلىقى، بەزىدە خالتىلىق ئىششىق بارلىقى بىلىنىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] سۈنئىي ئۇرۇقلاندۇرغاندا باكتېرىيىسىز ئىشلەش قائىدىلىرىگە ئەمەل قىلىش لازىم. تۇغۇش

ئالدىدا ۋە تۇتقاندىن كېيىن جىنسى يول ئاغزى ۋە يىلىن، سىيىر ياتىدىغان يەرنى تولۇق دېزىنڧېكسىيە قىلىش لازىم. كۆپەيىش ئەزاسىدىكى كېسەللىكنى ۋاقتىدا داۋالاپ، بالياتقۇ ئىچكى پەردىسىنىڭ يۇقۇملىنىپ ياللۇغلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. (1) بالياتقۇ ئىچكى پەردىسىنىڭ ئۆتكۈر ياكى سوزۇلما خاراكتېرلىق شىلىمشىق ياللۇغلىرىدا: بالياتقۇ $35\sim 41^{\circ}\text{C}$ لۇق 1% لىك تۇز سۈيى بىلەن تەكرار يۇيۇلۇپ، شىلىمشىق سۈيۈق-لۇقلار تولۇق تازىلىنىدۇ. ئاندىن كېيىن پېنىتسىللىن ۋە سترېپتومىتسىندىن 1 مىليون بىرلىكتىن ئېلىپ 20~30 م ل فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىدە ئېرىتىپ بالياتقۇغا كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 2~4 كۈن كىرگۈزۈلىدۇ. 0.1~0.2% لىك ئىلمان رېئانول ئېرىتمىسى، ئىلمان فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە، 1% لىك ئىلمان زەمچە سۈيى بىلەن بالياتقۇنى يۇسۇمۇ بولىدۇ.

(2) بالياتقۇ ئىچكى پەردىسىنىڭ يوشۇرۇن ياللۇغىدا: ئۇرۇقلاندىرۇشتىن 1~2 سائەت ئىلگىرى بالياتقۇ ئىلمان فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە ياكى تۇز ۋە سودانىڭ گلىكوزىلىق ئېرىتمىسى (تۇز 1 گ، سودا 3 گ، گلىكوزا 90 گ، ئىلمان پار سۈيى 1000 م ل) بىلەن يۇيۇلىدۇ.

(3) بالياتقۇ ئىچكى پەردىسىنىڭ يىرىڭلىق ياللۇغىدا: بالياتقۇ يود-تۇز سۈيى (1% لىك تۇز سۈيى 1000 م ل، 2% لىك يود تىنىكتۇرسى 20 م ل) بىلەن يۇيۇلىدۇ. 0.5% لىك فۇراتسىللىن ياكى 0.1% لىك رېئانول ئېرىتمىلىرى بىلەن بال-

يانتقۇ كۈندە بىر قېتىم يۇيۇلسىمۇ بولىدۇ، 7-8 كۈن بىر قارار-
لىق داۋالاش بولىدۇ.

يىلىن ياللۇغى

يىلىن ياللۇغى كۆپ ئۇچرايدىغان يىلىن كېسەللىكى بولۇپ،
سېغىلىۋاتقان سىيرلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. كلىنىكىلىق ئالامىتى:
سۈت بېزىدە ھەر خىل تېپتىكى ياللۇغلار پەيدا بولۇپ، سۈت
بېرىش فۇنكسىيىسى ۋە سۈت مىقدارىغا تەسىر يېتىدۇ، ئېغىر
ياللۇغلانغاندا سۈت بېرىش ئىقتىدارى تامامەن يوقىلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] يىلىن تازىلىغى ياخشى بولماسلىق
سەۋىيىدىن، زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە، ئوزۇمسىمان شارچە
باكتېرىيە، يىرىڭلاتقۇچى تاياقچە باكتېرىيىلەرنىڭ ئەمچەك توپ-
چىسى نەيچىسى ئارقىلىق سۈت قېرىنچىسى، سۈت نەيچىسى،
سۈت بېزى ياپراقچىسىغا كىرىپ يۇقۇملاندۇرۇشى بىلەن،
كۆپىنچە، يىلىن ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ. سۈت ساققاندا
مەشغۇلات قائىدىسىگە رىئايە قىلماسلىق، سايىمانلارنى قاتتىق
دېزىنفېكسىيە قىلماسلىق، سېغىش ئۇسۇلىنى پىششىق
ئىگەللىمەسلىك تۈپەيلىدىنمۇ يىلىن قاتتىق غەدىقلىنىپ
ياللۇغ پەيدا بولىدۇ. بېقىش ئۇسۇلى مۇۋاپىق بولماسلىق،
سىيىرغا تۇغۇشقا يېقىن قالغاندا ئاقسىل تەركىۋى يۇقۇرى يەم-
لەرنى بېرىش، تۇغۇتتىن كېيىن يىلىن سۇلۇق ئىشىشىغان مەز-

گىلدە شىرنىلىق ئوزۇقنى كۆپ بېرىش ئارقىسىدىمۇ ئاسانلا يىلىن ياللۇغى كۆرۈلىدۇ. بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغغا ئوخشاش كۆپىيىش سىستېمىسى كېسەللىكلەرنى پەيدا بولغاندا، كېسەللىك باكتېرىيىلىرىنىڭ بالياتقۇدىن قانغا ئۆتۈپ، قان بىلەن يىلىنغا بېرىپ، يىلىننى يۇقۇملاندۇرۇشىدىنمۇ يىلىن ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ياللۇغ خاراكتېرىغا ئاساسەن بەش تىپقا ئايرىلىدۇ.

(1) شىرنىلىق يىلىن ياللۇغى: بۇ ئۆتكۈر خاراكتېردا ئۆتىدۇ. يىلىننىڭ ئارىلىق ماددىلىرىغا قان چۈشىدۇ، شىرنىلىق سىرغىتىمەلەر ۋە ئاق قان ھۈجەيرىلىرى ياپراقچىلار ئارا بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلارغا كۆپلەپ يىغىلىدۇ. كېسەللەنگەن تەرەپ يوغىناپ، قاتتىقلىشىپ قالىدۇ، قىزىيدۇ ۋە ئاغرىيدۇ، يىلىن تېرىسى قىزدىرىپ چىقىلىپ تۇرىدۇ. يىلىننىڭ كېسەللەنگەن قىسمىنىڭ لىمفا تۈگۈنلىرى يوغىناپ قالىدۇ. كېسەل سىيىر روھسىزلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئىشتىيى تۈتۈلىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ، سۈت مىقدارى كۆرۈنەرلىك ئازلايدۇ. سىيىرنىڭ سۈتىدە باشتا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، ياللۇغ يامراپ يىلىن بېزى پۈۋەكچىلىرىدە گىچە يېتىپ بارغاندا، سۈتى سۇيۇلۇپ قالىدۇ، ئىچىدە پاختىسىمان نەرسىلەر پەيدا بولىدۇ.

(2) كاتارلىق يىلىن ياللۇغى: بەزى پۈۋەكچىسى، سۈت نەپەس چىسى ۋە قېرىنچىسىنىڭ ئۈستىكى تېرىسى ئۆزگىرىپ كېتىدۇ ۋە

چۈشۈپ كېتىدۇ. كېسەللىك ئۆزگىرىشى بولغان جايلاردىن بىر-
غىتىملار ۋە ئاق قان ھۈجەيرىلىرى چىقىدۇ.

سۈت نەيچىسى ۋە قېرىنچىسىنىڭ كاتارلىق ياللۇغى: ئادەتتە
ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەت كۆرۈلمەيدۇ، كېسەل تەككەن ياپراق-
چىدىمۇ ياللۇغ ئىپادىسى كۆرۈلمەيدۇ، پەقەت كېسەللىك پەيدا
بولۇپ بىرنەچچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن، ئەمچەك توپچىسى
تېمىنىڭ قېلىنلاپ قالغانلىقى، توپچىنىڭ تۈۋىدە يۇمشاق، مىلق-
لايدىغان چوڭ-كىچىك تۈگۈرچەكلەر بارلىقى قولغا بىلىنىدۇ.
كېسەللەنگەن ياپراقچىدىن سۈت ئاز چىقىدۇ. دەسلەپ
سېغىلغان سۈت سۇيۇق بولۇپ، تەركىۋىدە پاختىسىمان ماددىلار
ۋە تۈگۈرچەكلەر بولىدۇ، كېيىن سېغىلغان سۈت نورمال بولىدۇ.
بەزى پۈۋەكچىسىنىڭ كاتارلىق ياللۇغى: كېسەللەنگەن جاي
يوغىناپ قالىدۇ، ساققاندىن كېيىنمۇ كىچىكلىمەيدۇ، توپچىنىڭ
تۈۋىدە قاتتىق ياكى مىلقلايدىغان تۈگۈرچەكلەر بولىدۇ. سۈت
بەزىلىرى كەڭ دائىرە كېسەللەنگەندە، جايلىق ئورۇننىڭ تېمى-
راتۇرىسى كۆتىرىلىدۇ ۋە ئاز-تولا ئاغرىش ئالامىتى بولىدۇ.
سۈت تەركىۋىدە پاختىسىمان ماددىلار ۋە تۈگۈرچەكلەر بولىدۇ.
سۈت مىقدارى كۆرۈنەرلىك ئازىيىدۇ. يىلىنىنىڭ پۈتۈن بىر
ياپراقچىسى يۇقۇملانغاندا، چىققان سۈت سۈدەك بولۇپ قالىدۇ،
تىندۇرغاندا، ئۇ سۇ، تىنما ۋە پاختىسىمان ماددىلارغا ئاجرىلىدۇ.
سىيىردا ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەت كۆرۈلمەيدۇ، ئېغىر كېسەل-
لەنگەنلىرىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى بىر ئاز كۆتىرىلىدۇ، ئىش-

تىمىي ناچارلايدۇ.

(3) تالالىق يىلىن ياللۇغى: تالا ماددىلىرى سۈت قېرىنچىسى ۋە نەيچىسىنىڭ شىللىق پەردىسى ئۈستىگە سرغىپ ئۆتدۇ، ياكى توقۇلمىلارنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىغا يېپىشۋالىدۇ. كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ قان ئايلىنىشى قالايمىقانلاشقانلىقتىن، سۈت بەزلىرىدە چىرىش ۋە يىرىڭلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. كېسەللەنگەن ياپراقچە يوغىنايدۇ، قاتتىقلىشىدۇ ۋە قىزىپ ئاغرىيدۇ. قىسىپ كۆرۈلسە غۇچۇرلايدۇ. كېسەللەنگەن جاينىڭ لىمفا بەزلىرى ئىش- شىپ يوغىنايدۇ. كېسەلنىڭ دەسلەۋىدە سۈت مىقدارى كۆرۈنەر- لىك ئازىيىدۇ، 2~3 كۈندىن كېيىن سېغىلسا ئازىغىنا سۈدەك سۈت ياكى يىرىڭلىق سرغىتمىلار چىقىدۇ، بەزىدە قان ئارىلاش سۈت چىقىدۇ. كېسەل سىيرىنىڭ روھى چۈشۈپ كېتىدۇ، ئىش- تىمىي تۇتۇلىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى $40\sim 41^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ.

(4) يىرىڭلىق يىلىن ياللۇغى: بۇ، كېسەللىك جەريانىغا ئاساسەن، يىرىڭلىق-كاتارلىق يىلىن ياللۇغى، يىلىننىڭ يىرىڭ- لىق ئىششىغى ۋە يىلىننىڭ ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغى دىگەن تۈرلەرگە ئايرىلىدۇ.

يىرىڭلىق-كاتارلىق يىلىن ياللۇغى: سۈت قېرىنچىسى ۋە نەيچىسى، بەز پۈۋەكچىلىرى ياللۇغلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كاتارلىق سرغىتما ۋە يىرىڭ ئاجرىلىپ چىقىدۇ. ئۆتكۈر دەۋرىدە كېسەللەنگەن ياپراقچە يوغىنايدۇ، ئۇنىڭغا قان چۈشىدۇ، ئۇ قىزىپ ئاغرىيدۇ، سۈت مىقدارى تىنچىتىش ئازلاپ كېتىدۇ ياكى

سۈت توختايدۇ، سۈت سۈدەك سۈزۈك، قىرغۇچ، قېرىق بولۇپ قالىدۇ، كۆپىنچە يىرىك ئارىلاش چىقىدۇ. كېسەللەنكەن جايىنىڭ لىمفا تۈگۈنى زورىيىپ قالىدۇ. كېسەل سىيىر روھىنى ئىندۇ، ئۇنىڭ ئىشتىيى ناچارلايدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى 41°C قا چىقىدۇ. سوزۇلما دەۋرىدە جايلىق ياللۇغ كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە يەڭگىلەپ، كېسەل تەككەن ياپراقچە ئاغرىمايدىغان، قىزىمايدىغان بولىدۇ، ئۇنىڭ ھەجمى كىچىكلەيدۇ، ئۇ قاتتىقلىق شىپ قالىدۇ، سۈت ناھايىتى ئاز چىقىدۇ، سۇيۇقلىشىپ كېتىدۇ، ساغۇچ بولۇپ قالىدۇ.

يىللىق يىرىكلىق ئىششىقى: يىللىقنىڭ بىرەر ياپراقچىسىدا چوڭ-كىچىك يىرىكلىق ئىششىقلار پەيدا بولىدۇ، كىچىك ئىششىقلار تەدرىجى كېڭىيىپ ۋە بىر بىرىگە قوشۇلۇپ چوڭ ئىششىققا ئايلىنىدۇ. چوڭقۇر جايلارغا تارالغان كىچىك ئىششىقلارنى بىلىگىلى بولمايدۇ. چوڭ ئىششىق كۆرۈلگەن جاي قىزىرىدۇ، ئۇ قولغا ئىسسىق بولىدۇ، ئاغرىيدۇ، بەزىدە مىلقلايدۇ. سۈت مىقدارى ئازلايدۇ، ساققاندا يىرىك ياكى قان چىقىدۇ. كېسەل سىيىر ئۆرە تۇرغاندا يىللىقنىڭ كېسەل تەرىپىدىكى ئايىغىنى يىللىقنىڭ قاپچۇرۇپ تۇرىدۇ، ماڭغاندا قاتتىق قەدەم تاشلايدۇ. ئىششىق كىچىك دائىرىدە بولسا ئومۇمى بەدەن-لىك ئالامەت كۆرۈلمەيدۇ، چوڭ دائىرىدە بولسا ئومۇمى بەدەن-لىك ئالامەتلەر خېلى روشەن كۆرۈلىدۇ.

يىللىقنىڭ ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغى: بۇ، يىللىق تېرە ئاستى

توقۇلمىسى بىلەن ئارىلىق ماددىسىدا پەيدا بولىدىغان يىرىڭلىق ياكى چىرىش خاراكتىرلىق ياللۇغ ھىساپلىنىدۇ، كېسەللەنگەن جاي ئېغىر دەرىجىدە سۇلۇق ئىششىدۇ، قاتتىقلىشىدۇ، خېلى دەرىجىدە قىزىپ ئاغرىيدۇ. ئاق تېرىدىن قىزىل يىمپىسىمان لىمفا تومۇرلىرى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. يىلىنىڭ لىمفا تۈگۈنلىرى يوغاناپ كېتىدۇ. كېسەللەنگەن ياپراقچىنىڭ سۈتى بىردىنلا ئازلايدۇ، ساق ياپراقچىنىڭ سۈتىمۇ كېمىيدۇ، 2~3 كۈندىن كېيىن سۈتى شۇيۇلۇپ، سۈر ئاق سۈدەك بولۇپ قالىدۇ، ئىچىدە پاختىسىمان ماددىلار بولىدۇ. كېسەل سىيرىدا ئومۇمى بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، سىيىر ئاياقلىرىنى سورەپ ئېغىر قەدەم تاشلايدۇ.

(5) قانىغاق يىلىن ياللۇغى: سۈت نەيچىسى، بەز پۈۋەك-چىسى ۋە چوڭقۇر توقۇلمىلاردىن قان چىقىدۇ. ئۇ كۆپىنچە ئۆتكۈر خاراكتىردا ئۆتىدۇ. يىلىنىڭ يېرىمى ياكى ھەممە قىسمى كۆرۈنەرلىك ئىششىيدۇ، تېرىسىدە قىزىل ياكى سۆسەن داغلار پەيدا بولىدۇ، يىلىن قاتتىق ئاغرىيدۇ. يىلىن لىمفا تۈگۈنلىرى يوغاناپ قالىدۇ. سۈتى سۈدەك چىقىدۇ ۋە قان، پاختىسىمان ماددىلار ئارىلاشقان بولىدۇ. سىيىرنىڭ روھى چۈش-كۈن بولىدۇ، ئىشتىيى ناچارلايدۇ ياكى پۈتۈنلەي تۇتۇلىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى 41°C قا چىقىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) سېغىش ئۇسۇلىنى ياخشىلاش: قول بىلەن ساققاندا

بېسىپ سېغىپ، ئەمچەك توپچىسى شىلىق پەردىسى ۋە تېرە-
سىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش لازىم. سۈت
ساققۇ بىلەن سۈت ساققاندا ئۇنىڭ بېسىمى بىلەن تەكرارلىغىنى
ياخشى تەڭشەش، يېڭى تۇققان سىيرىنى يىلىنىڭ سۇلۇق
ئىششىغى يانغاندىن كېيىن سېغىش لازىم. ھەر قېتىملىق
سېغىشنىڭ ئالدى-كەينىدە يىلىنى ئوبدان ئۇۋۇلاش لازىم.

(2) سېغىش تازىلىغىغا ئەھمىيەت بېرىش: سېغىشتىن ئاۋال
ئىلمان پاكىز سۇ بىلەن يىلىنى ۋە ئەمچەك توپچىلىرىنى ئوبدان
يۇيۇش، ئاندىن مەخسۇس لۇڭگە بىلەن سۈرتۈش كېرەك.
ساققۇچىلار تىرناقلىرىنى ياخشى ئېلىشى ۋە قوللىرىنى پاكىز
يۇيۇشى، ھەر بىر سىيرىنى ساققاندا بىر قېتىم قول يۇيۇشى
كېرەك. قوتانلارنى پاكىز، قورغاق تۇتۇش، ئۆشەك چۆپىلەرنى
ۋاقتى-ۋاقتىدا يۆتكەپ تۇرۇش ۋە قەرەللىك دېزىنفېكسىيە
قىلىپ تۇرۇش كېرەك.

(3) بوغاز سىيرىنى ئاسراش ئىشنى كۈچەيتىش: تۇغۇشتىن
ئىلگىرى پىلان بويىچە سېغىشنى ۋاقتىدا توختىتىش، سېغىش
توختىتىلغان مەزگىللەردە يىلىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كۈزىتىپ
مېڭىش، يىلىغا سۈت يېغىلىپ قېلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان
ياللۇغىتىن ساقلىنىش كېرەك. تۇققاندىن كېيىن جىنسى يولىدىن
چىققان سۇيۇقلۇق ياكى ياللۇغلۇق ئاجراتمىلارنى ۋاقتىدا تازى-
لاش، جىنسى يول ئاغزى ھەم قۇيرۇق تۈۋىنى دېزىنفېكسىيە
قىلىش لازىم.

(4) كېسەل سىيىرنى ئايرىش: كېسەل سىيىرنى ۋاقتىدا ساق كالىدىن ئايرىپ چىقىپ چىڭ تۇتۇپ داۋالاش ۋە مەخسۇس كىشى باشقۇرۇش كېرەك. ساققاندا ئاۋال ساقلىرىنى، كېيىن كېسەللىرىنى، ئاۋال ساق ئەمچىگىنى، كېيىن كېسەل ئەمچىگىنى سېغىش كېرەك. كېسەل ئەمچەكتىن سېغىلغان سۈتنى ئىشلەت-كىلى بولمايدۇ، ئۇنى ئايرىم سېغىپ ئېلىپ بىر تەرەپ قىلد-ۋەتكەندىن كېيىن، قاچا-قۇچا ۋە قولى ياخشى دېزىنفېكسىيە قىلىش لازىم. كېسەل كالىنىڭ قىغ، تۆشەك چۆپلىرىنى ئايرىم بىر تەرەپ قىلىش، كېسەل كالا ياتقان جايىنى دېزىنفېكسىيە قىلىش كېرەك.

(5) كالا پادىسىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش: يىلنىڭ جاراھەتلىنىشى ۋە ئۈشۈك يارىسى بولۇشىدىن ساقلىنىش كېرەك. يېڭىدىن تولۇقلىنىدىغان سىيىرلارنى ئايرىپ كۈزىتىش، يىلنى ياللۇغى بولغان سىيىرلارنى ساق سىيىرلارغا قوشماسلىق لازىم. ياش سىيىرلارنى باشقۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىپ، يىلنى قەرەللىك تۈردە تەكشۈرۈپ تۇرۇش، زەخمىلەنگىنى بولسا ۋاقتىدا داۋالاش كېرەك.

(6) داۋالاش:

(1) ئاسراش كۈچەيتىلدۇ: شىرىلىق، كاتارلىق ۋە قانىغاق يىلنى ياللۇغلىرىنىڭ دەسلەۋىدە، يەم ۋە شىرنىلىق ئوزۇق بېرىلمەيدۇ، ئاز سۇغىرىلىدۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا 300~400 گ ماگنىي سۇلفات ئىچكۈزۈلىدۇ. سېغىش قېتىمى كۆپەيتىلىپ،

كۈندۈزى ھەر 2~3 سائەتتە بىر قېتىم، كېچىسى ھەر 5~6 سائەتتە بىر قېتىم سېغىپ تۇرۇلىدۇ. ھەر قېتىم سېغىدىغان ياغدا يىلىن 15~20 مىنۇت ئۇۋۇلاپ بېرىلىدۇ، شىرىقلىق ياللۇغدا يىلىن تۆۋەندىن يۇقۇرىغا، كاتارلىق ۋە يىرىقلىق ياللۇغدا يۇقۇرىدىن تۆۋەنگە ئۇۋۇلاپ بېرىلىدۇ. تالالىق ياللۇغ، يىلىن نىڭ يىرىقلىق ئىششىقى، يىلىننىڭ ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغدا ئۇۋۇلاشقا بولمايدۇ، باشقا ياللۇغلارنىڭ ئۆتكۈر، ئەدەش دەۋرىدىمۇ ئۇۋۇلاشقا بولمايدۇ.

ياللۇغلۇق سرغىتىلارنىڭ شۇمۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن، كېسەللەنگەن ياپراقچىغا باشتا سوغاق نەرسە يېقىلىدۇ، ئارىدىن 2~3 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئىسسىق نەرسە يېقىلىدۇ، ياكى ياللۇغ قايتۇرۇش مەلھىمى سۈركىلىدۇ.

(2) سۈت بېزىگە دورا كىرگۈزۈش: 10~20 تۈمەن بىرلىك پېنتىسىللىنى 100 م ل فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىدە ياكى 0.25% لىك پروكاينى ئېرىتمىسىدە ئېرىتىپ، سۈت كاتىرى ئارقىلىق ئەمچەك توپچىسىدىن ئاستا كىرگۈزۈش، كۈندە 2 قېتىمدىن ئۇدا 2~4 قېتىم شۇنداق قىلىش لازىم. تالالىق، كاتارلىق ۋە يىرىقلىق يىلىن ياللۇغدا ياكى يىلىننىڭ چوڭقۇر قىسمىنىڭ يىرىقلىق ئىششىقىدا، 0.25%-0.1 لىك رىۋانول، 0.02% لىك فۇراتسىللىن، 2% لىك سۇلفانىلامىد ياكى 0.2% لىك مارگانىي سۈپ ئېرىتمىلىرىنى ھەر قېتىمدا 200~250 م ل دىن كۈنگە 1~2 قېتىم يىلىنغا قۇيۇپ، 1~2 سائەت تۇرغۇزغاندىن كېيىن

سېغىپ چىقىرىۋېتىش، ئارقىدىن پېنتىسىللىن قۇيۇش لازىم. دورىنى يىلىنغا قۇيغاندا بېسىم بەك كۈچلۈك بولماسلىقى، دورا تەبىئى ئېقىپ كىرىشى لازىم.

(3) يىلىننى قامال قىلىپ داۋالاش: شىرىلىق، كاتارلىق، كاتارلىق - يىرىڭلىق يىلىن ياللۇغلىرىنىڭ دەسلۇدە ۋە يىلىننىڭ ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغىنىڭ دەسلۇدە، پروكايسىنلىق پېنتىسىللىن ئېرىتمىسى بىلەن يىلىن تۇۋى قامال قىلىنسا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

(4) ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاش: يىلىن ئۈستى يىرىڭلىق ئىششىغان بولسا، يېرىپ يىرىڭنى چىقىرىپ، تاشقى كېسەللىك ئۇسۇلى بويىچە بىر تەرەپ قىلىنسا بولىدۇ. يىلىننىڭ چوڭقۇر قەۋىتى يىرىڭلىق ئىششىغاندا، ئاۋال ئىشپىرىس بىلەن يىرىڭنى چىقىرىۋېتىپ، ئاندىن يىلىن بوشلۇغىغا 20 تۈمەن بىرلىك پېنتىسىللىن قۇيۇلسا بولىدۇ.

(5) ئومۇمىي بەدەنلىك داۋالاش: ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە، ناتىرىي سۇلفاتىئازولنى كالسىنىڭ ھەرىكەت تەن ئېغىرلىغىغا 0.15 گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ 4~6 سائەتتە بىر قېتىمدىن ئۇدا 1~2 كۈن ئىچكۈزسە بولىدۇ، 1-قېتىم ئىچكۈزگەندە $\frac{2}{3}$ ياكى $\frac{3}{4}$ ھەسسە كۆپەيتىپ بېرىلىدۇ، كۆك تومۇرغا 10% لىك ناتىرىي سۇلفاتىئازول ئېرىتمىسىدىن 100~200 مىل ئۆكۈل قىلىنىدۇ، ياكى مۇسكۇلغا پېنتىسىللىندىن 100~200 تۈمەن بىرلىك ئۆكۈل قىلىنىدۇ. ياللۇغلىنىش تېزلىپ، ئاجرات.

مىلار كۆپلەپ چىقىپ تۇرسا، تۆۋەندىكى دورىلار بىلەن داۋالانىدۇ.

رېتسېپ:

ئۇرۇتروپىن 15~20 گ، ناتىرىي سۇلفاتىستازول 15 گ،
كوففېين پاراشوگى 2 گ، فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە
150~200 م ل

بۇلارنى قوشۇپ باكتېرىيىسىزلىنىدۇرۇپ، كۆك تومۇرغا بىر يوللا ئوكۇل قىلىنىدۇ.

6) جۇڭگىي دورىلىرى بىلەن داۋالاش: دەسلەپكى مەزگىلدە ئۆۋەندىكى دورىلار ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

داڭگۇي، ئاچچىق تاۋۇز تالقىنى، پۇراقلىق گۈل يىلتىز-
زى، كۈركۈم، تىرىنغى بەدەن، ئاچچىق تاۋۇز 5
سەردىن

بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قايناق سۇدا ئېرىتىپ، سوۋۇغاندا كۈنىگە بىر بولاقتىن ئۇدا 3~5 بولاق ئىچكۈزۈلىدۇ.

ئەمچەك توپچىسى تۆشۈگىنىڭ تارىيىپ قىلىشى

بۇ، ئەمچەك توپچىسىنىڭ بىر خىل كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكى بولۇپ، بىر ياكى بىرنەچچە توپچىدا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئەمچەك توپچىسىنىڭ زەخمىلىنىشى ياكى سۈت ساققاندا توپچا تۆشۈگىنى زەخمىلەپ قويۇش، سوزۇلما ياللۇغلىنىش، شىللىق پەردە بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلىرىنىڭ ئۆسۈپ قېلىشى ياكى تارتۇقلىشىپ تارتىشىپ قېلىشى تۈپەيلىدىن ئەمچەك توپچا تۆشۈگى تارىيىپ قالىدۇ. بەزىلىرى ئەمچەك توپچىسى ياللۇغغا ئۆلىنىپ كېلىپ چىقىدۇ، بەزى سىيرلارنىڭ تۇغما شۇنداق بولىدۇ.


[كېسەللىك ئالامەتلىرى] سۈت يىمپەك ئىنچىكە چىقىدۇ، بەزىدە زادىلا چىقمايدۇ. ئەمچەك توپچىسى تۆشۈگىنىڭ ئاغزى تار بولسا، ساققان سۈت بىر تەرەپكە جىگىپ چىقىدۇ، ياكى پۈركۈلۈپ چىقىدۇ. ئەمچەك توپچىسىنى تۇتۇپ كۆرگەندە يېشىل ماستەك ھەتتا نۇقۇتتەك قاتتىق تۈگۈن بارلىقى بىلىنىدۇ، بەزىدە ئاغرىغانلىق ئىپادىسى كۆرۈلىدۇ. بەزى سىيرنىڭ ئەمچەك توپچىسى تۆشۈگىنى ئۆسۈپ قالغان شىللىق پەردە پۈتۈنلەي توساپ قالغاچقا، مۇناسىپ تەرەپتىكى سۈت بېزى توقۇلمىلىرى يىگىلەپ كېتىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) ئالامەتلىرى ئانچە ئېغىر بولمىسا، توپچا تۆشۈگىنى يۇمۇلاق-ئۆشكۈسىمان كېڭەيتكۈچ بىلەن كېڭەيتىشە بولىدۇ. سېغىش ئالدىدا، ئەمچەك توپچىسىنىڭ ئۈچىنى ئىسپىرت بىلەن دېزىنفېكسىيە قىلىپ، ئاندىن كېڭەيتكۈچنى دېزىنفېكسىيە قىلىپ ۋە ئۈچىغا مەلەم سۈركەپ، توپچا تۆشۈگىگە تىقىپ يېرىم

سائەتچە توختىتىلىدۇ (ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولمىسۇن). كېڭەيتە-
كۈچ ئىشلەتكەندە، ئاۋال ئىنچىكرەگىنى، كېيىن تومراغىنى
ئىشلىتىش لازىم.

(2) توپچىنىڭ تۆشۈگىدە ئېغىر تارتۇق بولغان ۋە تارتىش
قېلىش ئەھۋالى بولغان بولسا، ئۇنى پىچاق بىلەن تىلىپ،
تارتىشنى بوشىتىشقا توغرا كېلىدۇ. تىلغاندا ساق توقۇلمىنىڭ
زەخمىلىنىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. ئەمچەك تۆشۈگىدە
گۆش ئۈنۈپ قېلىشنى چەكلەش ۋە ئۇنىڭ يېڭىۋاشتىن تېخىمۇ
ئېغىر دەرىجىدە تارىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئۇ
تولۇق ساقايغىچە، ئەمچەك توپچىسىغا بۇرما قالپاقلىق سۈت
كاتىرى، ياكى كېڭەيتكۈچ تىقىپ قويۇش لازىم.



53-رەسىم. ئەمچەك توپچىسى تۆشۈگىنى كېڭەيتكۈچ
54-رەسىم. ئەمچەك توپچىسى تۆشۈگىنى
55-رەسىم. بۇرما قالپاقلىق سۈت
كاتىرى تىلىش پىچىقى

سۈت ئېقىپ تۇرۇش

سۈت ئېقىپ تۇرۇش ئەمچەك توپچىسى تۆشۈگى تولۇق يېپىلماي، سۈت ئۆزلۈگىدىن ئېقىپ تۇرىدىغان بىر خىل كېسەللىك بولۇپ ھىساپلىنىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئەمچەك توپچىسى پۈرمە مۇسكۇلىنىڭ تولۇق يېتىلمەسلىكى، ياكى يىلنى ياللۇغى، ئەمچەك توپچىسى ياللۇغى سەۋىيىسىدىن ئەمچەك توپچىسى پۈرمە مۇسكۇلى سىزىپ كېتىپ ياكى بوشاپ كېتىپ، پالەچلىنىپ، ئەمچەك توپچىسى تۆشۈگىدىن سۈت ئاقىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يىلنىغا سۈت تولغاندا، سۈت ئۆزىچىلا تامچىپ ئېقىپ تۇرىدۇ، بولۇپمۇ سىير ياتقان ۋاقىتتا يىلنى قىسلىغانلىقتىن، سۈت كۆپلەپ ئېقىپ چىقىدۇ. سېغىش ۋاقتى كېچىكتۈرۈلسە، سۈت تېخىمۇ كۆپ ئاقىدۇ. سۈتى ئاقىدۇ-غان ياپراقچە بىر ئاز يوشاپ قالىدۇ، سۈت مىقدارى كۆرۈنەر-لىك ھالدا ئازىيىپ كېتىدۇ. ئادەتتە يامان ئاقىۋەت كېلىپ چىقمايدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) ئۇۋۇلاش ئۇسۇلى: سىيرنى ھەر قېتىم سېغىپ بولۇپ، ئەمچەك توپچىسىنىڭ ئۈچىنى باش بارماق ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن 10~15 مىنۇت ئۇۋۇلاش لازىم. ئۇۋۇلىغاندا، ئىسپىرت،

كامفور بىلىق ئىسپىرت ياكى %12 لىك يۈرەك مەلھىمى سۈركەپ قويۇلسا، تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

(2) كوللوئىدلىق قاپچۇق كىيگۈزۈش ئۇسۇلى: سىيىرنى ھەر قېتىم سېغىپ بولغاندىن كېيىن، ئەمچەك توپچىسىنىڭ ئۈچىنى سۈرتۈپ قۇرۇتقاندىن كېيىن، كوللوئىدنى ئوتقا تۇتۇپ ئەمچەك توپچىسىغا توغرا كەلگۈدەك قاپچۇق ھالىتىگە كەلتۈرۈۋالغاندىن كېيىن ئۇ، ئەمچەك توپچىسىغا كىيگۈزۈپ قويۇلىدۇ. ئىككىنچى قېتىم ساققاندا بۇ نەرسە ئېلىۋېتىلىدۇ. بۇ ئۇسۇل بىلەن سۈتنىڭ ئۆزلۈكىدىن ئېقىپ چىقىشىنى توسغىلى بولىدۇ، شۇنداقلا كوللوئىد قاپچۇق كىيگۈزۈلگەندىن كېيىن قۇرۇپ قاتقانسىرى، ئەمچەك توپچىسىنىڭ پۈرمە مۇسكۇلى قىسقىرىدۇ.

(3) دورا بىلەن داۋالاش: ئەمچەك توپچىسى پۈرمە مۇسكۇلىنىڭ بىر يېقىغا ئازراق پىنتىسىللىن ياكى سىڭمىشچان ناتىرىيى خلورىد ئېرىتمىسى ئۆكۈل قىلىنسا، توقۇلمىلاپ ئۆسۈپ، توپچا تۆشۈكى تارىيىدۇ.



56-رەسىم مېتال ھالقىلىق رېزىنكە چەمبەر

(4) رېزىنكە چەمبەر سېلىش ئۇسۇلى: ئەمچەك توپچىسى پۈرمە مۇسكۇلى بەك بوشىشىپ كەتكەن، ئاسانلىقچە ئوڭشالمايدىغان ئەھۋالدا، سىيىرنى سېغىپ بولۇپ ئەمچەك توپچىسىغا رېزىنكە چەمبەر سېلىپ قويۇش كېرەك. ئەمچەك توپچىسى

چىرىپ قالمىسۇن ئۈچۈن، رېزىنكىكە چەمبەر بەك چىڭ سېلىنماس-
لىغى، ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولماسلىغى كېرەك.

سۈت سوغىلىپ كېتىش ۋە سۈت تارتىلىپ كېتىش

سۈت سوغىلىپ كېتىش ۋە سۈت تارتىلىپ كېتىش سېغىش
مەزگىلىدە سۈت بېزى فۇنكىتسىيىسىنىڭ قالايمىقانلىشىشى تۈپەي-
لىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ تولاراق تۇنجى تۇغۇتلۇق سىيىر ۋە
قېرى سىيىرلاردا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] بوغازلىقنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا قۇرۇق
ئوت، كۆك چۆپ ياكى يەمنى ئاز بېرىش، سېغىش مەزگىلىدە
شىرنىلىق يەم-خەشەكلەرنى ئاز بېرىش، ياكى سېغىشنى ۋاقتىدا
توختاتماسلىق، سۈت بېزى ھۈجەيرىلىرىنىڭ يېڭىلىنىش ۋاقتى
كېچىكىش؛ سۈت ساققاندا پاكىز ساغماسلىق سەۋىيىسىدىن، سۈت
چىقىش رېڭلىكلىكى ۋاقتىلىق تورمۇزلىنىش ئارقىسىدا كېلىپ
چىقىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يىلىن ۋە ئەمچەك توپىچىسى
كېچىكلەپ، يىلىن تېرىسى بوشىشىپ قالىدۇ، بەزى توقۇلمىسى
يۇمشاپ كېتىدۇ. سۈت مىقدارى كۆرۈنەرلىك ئازىيىدۇ، ياكى
سۈت چىقمايدۇ. سۈتنىڭ ئۆزىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) سىپىرنى بوغازلىقنىڭ ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى مەزگىلىدە ئوزۇقلۇق قىممىتى مول يەم-خەشەك بىلەن بېقىش لازىم. سېغىشنى مۇۋاپىق پەيتتە توختىتىش، بەك كېچىكتۈرمەسلىك. مۇۋاپىق سوغۇلدۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، يىلدىن ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يېلىن فۇنكسىيىسىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە ئىمكانىيەت يارىتىش كېرەك.

(2) سىپىرنى ئاقسىل تەركىبى يۇقۇرى بولغان يەم ۋە ۋىتا-مىنلىق كۆك يەم-خەشەك ھەم شىرنىلىق ئوزۇقلار بىلەن بېقىش كېرەك. زۆرۈر تېپىلغاندا كۈندىلىك ئوزۇغىغا ئاز-تولا قارا شېكەر، تۇخۇم قاتارلىق سۈت كەلتۈرىدىغان ئوزۇقلۇق قوشۇپ بېرىش، قانغۇدەك سۇغىرىپ تۇرۇش ياكى پۇرچاق سۈيى بېرىش كېرەك.

(3) دورا بىلەن داۋالاش:

(1) تىببىي دورىلار بىلەن داۋالاش: 150 گ سۈرمە تىرى سۇلغىد، 80 گ ناترىي كاربونات، 300 گ ئارپابىدىيان پارا-شوكى، 250 گ ئاش تۇزىنى تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، كۈندە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 15~30 گ دىن يەمگە قوشۇپ يىگۈزۈلىدۇ.

(2) جۇڭگىي دورىسى بىلەن داۋالاش:

رېتسېپ:

پۇراقلىق يىلتىز 2 سەر، داڭگۈي 2 سەر،

تۇڭساۋ 5 مىسقال، بەيجۇ 2 سەر،

شۈيدۈەن 1 سەر، جىن كېۋىزى 1 سەر،

كەترا 1 سەر، دۇجۇڭ 1 سەر،
 ئېشەك يىلىمى 1 سەر، چېكىلەنگەن
 چۈچۈكبۇيا 5 مىسقال، قارىمۇق 1 سەر
 بۇلارنى سۇس ئوتتا قاينىتىپ قىيام قىلىپ، شامىسىنى ئېلىدۇ.
 ۋېتىپ، 4 سەر ئاق ھاراق بىلەن ئىچكۈزۈلىدۇ.
 رېتسېپ:

داڭگۈي 3.6 سەر، كەترا 2.7 سەر،
 ئاچچىق تاۋۇز تالقىنى 1.8 سەر،
 تۇڭساۋ 1.5 سەر، قارىمۇق 2 سەر،
 جياچۇ 1.5 سەر، چېكىلەنگەن چۈچۈكبۇيا 1.8 سەر
 بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قايناق سۇغا چىلاپ، سوۋۇغاندا
 بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ.

قىسىرلىق

بېقىش - باشقۇرۇش جايىدا بولماسلىق، ئۇرۇقلاندۇرۇش
 پەيتىدە بولماسلىق، ياكى سىيىرنىڭ كۆپىيىش ئەزالىرىدىكى
 كېسەللىك تۈپەيلىدىن، سىيىرنىڭ كۆپىيىش ئىقتىدارىدىن
 ۋاقىتلىق ياكى مەڭگۈلۈك قېلىش قىسىرلىق دەپ ئاتىلىدۇ.
 [كېسەللىك سەۋىۋى]

(1) كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ غەيرى نورمال يېتىلىشى:
 كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ غەيرى نورماللىقى: جىنسى يولىنىڭ
 پۈتۈپ قېلىشى، سۈيدۈك يولىنىڭ زىيادە يېتىلىشى، بالياتقۇ

بوينى قوش بولۇش، بالياتقۇ بوينى بولماسلىق، بالياتقۇ تولۇق يېتىلمەسلىك، بالياتقۇسى بولماسلىق ياكى بىزلا بالياتقۇ بۇرجىمى بولۇش قاتارلىقلار كۆپرەك ئۇچرايدۇ. ئىككى جىنسلىق بولۇش: ئايرىم سىيرلاردا تولۇق يېتىلمىگەن ئىككى جىنسلىق كۆپىيىش ئەزاسى بولىدۇ.

غەيرى جىنسلىق قوشكېزەك: سىيرلارنىڭ قوشكېزەك تۇغۇش نىسبىتى 57% ئۆپچۆرىسىدە بولىدۇ، بىرى ئەركەك، بىرى چىشى تۇغۇلغان قوشكېزەك موزايلارنىڭ چىشىسىنىڭ كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ بەزى جايلىرى يوق بولغان، ياكى تولۇق يېتىلمىگەن بولىدۇ، بۇنداق چىشى موزايلارنىڭ 90% دىن كۆپرەكى چوڭ بولغاندا تۇغماس بولۇپ قالىدۇ.

بالىلىق كېسەللىكى: ئىچكى ئاجراتمىلارنى ئاجرىتىش ئىقتىدارىنىڭ نورمالسىزلىقى تۈپەيلىدىن، سىيرلار جىنسى جەھەتتىن يېتىلگەن چاغدا، كۆپىيىش ئەزاسى تولۇق يېتىلمەي قالىدۇ ياكى تۇغۇش ئىقتىدارىغا ئىگە بولماي قالىدۇ.

(2) كۆپىيىش ئەزالىرىدىكى كېسەللىكلەر: جىنسى يول ياللۇغى، بالياتقۇ بوينى ياللۇغى، بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغى، تۇخۇمدان خالىسى ئىشىشى، تۇخۇمدان قېتىشىش، تۇخۇم نەپچىسى ياللۇغى قاتارلىقلار سەۋىيىسىدىن، كۆپىنچە، قىسرىق كېلىپ چىقىدۇ.

(3) بېقىش-باشقۇرۇش جايىدا بولماسلىق: ئاچ قېلىش، ئورۇقلاپ كېتىش، تۇغۇش ئىقتىدارى ئاجىزلاش ياكى

بۇزۇلۇش؛ سىيىرنى ئۇزاق مەزگىل يەم بىلەنلا بېقىش، ھەركەت كەمچىل بولۇش، زىيادە سېمىزلىك، تۇخۇمداننى ماي قاپلاپ كېتىش قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن قىسىرلىق كېلىپ چىقىدۇ. يەم-خەشەكنى ياخشى تەڭشەپ بەرمەسلىك، ۋىتامىن، مىنېرال ماددا ۋە مىكرو ئېلېمېنتلار كەمچىل بولۇش سەۋىيىسىدىنمۇ قىسىر-لىق كېلىپ چىقىدۇ.

سىيىرلارنى ئۇزاق مەزگىل سوغاق، زەي، دىمىق قوتانددا بېقىش، ئاز ھەركەتلەندۈرۈش، ئېغىر ئىشقا سېلىش، قانغۇدەك سۇغارماسلىق ۋە تويغۇزۇپ باقماسلىق، لايىغدا دەم ئالدۇرماس-لىق، سېغىن سىيىرلارنى ھەددىدىن زىيادە سېغىش، سېغىشنى كېچىكتۈرۈپ توختىتىش قاتارلىقلار سەۋىيىسىدىن سىيىرنىڭ تۇغۇمچانلىغى ناچارلاپ قالىدۇ.

(4) ئۇرۇقلاندۇرۇش پەيتىدە بولماسلىق: سىيىرنى كۈيلىگەن ۋاقىتتا ئۇرۇقلاندۇرماي، پەيتىنى قايتا-قايتا ئۆتكۈزۈۋېتىش سەۋىيىسىدىن، سىيىرنىڭ كۈيلەش، تۇخۇم ئاجرىتىپ چىقىرىش قانۇنىيىتى بۇزۇلىدۇ-دە، بوغاز بولماس بولۇپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ يېتىلىشى نورمال بولماسلىقتىن كۆرۈلىدىغان قىسىرلىقنىڭ ئالاھىدە كىلىنىك ئالامەتلىرى بولمايدۇ، تۈز ئۇچەي ياكى جىنسى يول ئارقىلىق تەكشۈرگەندىلا ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىدىكى غەيرىلىكنى بىلگىلى بولىدۇ. جىنسى يول پۈتۈپ قالغان، سۈيىدۈك يولى زىيادە يېتىلىپ قالغان، قوش بالياتقۇلۇق سىيىرلاردا كۈيلەش

ئىپادىلىرى بولىدۇ. ئىككى جىنسىلىق، غەيرى قوشكېزەك ياكى بالىلىق كېسەللىگى بىلەن ئاغرىغان سىيرلاردىمۇ كۈيلەش بولىدۇ، لېكىن كۈيلەش قانۇنىيەتلىك بولمايدۇ، كۆپىنچىسىدە كۈيلەش روشەن كۆرۈلمەيدۇ ھەتتا زادىلا كۆرۈلمەيدۇ.

بېقىش - باشقۇرۇش مۇۋاپىق بولمىغانلىقتىن تۇغماس بولۇپ قالغان سىيرلارنىڭ سېمىزلىگى نورمال بولمايدۇ، ياكى بەك ئورۇق، ياكى بەك سېمىز بولىدۇ، تۈز ئۆچەيدىن تەكشۈرگەندە تۇخۇمدېنىنىڭ يىگىلەپ ۋە قېتىپ قالغانلىقى بىلىنىدۇ، يېتىلگەن فالىكۇلا بولمايدۇ، بەزىدە ئۇزۇن مەزگىلگىچە سېرىق تەنچە بولىدۇ، ياكى ئارىلاپ ئۇششاق فالىكۇلار بولىدۇ، لېكىن ئاجرىلىپ چىقماي تۇرىدۇ، بەزىدە بالىياتقۇ كىچىكلەپ، يۇمشاپ قالغانلىقىنى بىلىش مۇمكىن.

ئۇرۇقلاندۇرۇش پەيتىدە بولماسلىقتىن قىسىر قالىدىغان سىيرنىڭ ئومۇمەن تېنى ساق بولىدۇ، ئۇلاردا كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمەيدۇ، كۆپىيىش ئەزالىرى ۋە ئۇلارنىڭ فۇنكىتسىيەسى نورمال بولىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش] كۆپىيىش ئەزالىرى كېسەللىكلىرىنى ۋاقىتدا داۋالاشتىن باشقا، ئاساسەن، ھەر تەرەپلىمە تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، قىسىرلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

(1) سىيرلارنى ئۇرۇقلاندۇرۇش پىلانىنى ئەستايىدىللىق بىلەن تۈزۈش ۋە قەتئىي ئىجرا قىلىش، قانداشلىقى بارلىرىنى چېتىلدۈرۈشتىن ساقلىنىپ، تۆرەلىمنىڭ غەيرى نورمال يېتىلىپ

قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. نەسىللىك بۇقلارنى تاللىغاندا ئىنتايىن ئېھتىياتچان بولۇش، ئەجداتلىرى ئىچىدە يامان سۈپەتلىك يوشۇرۇن گېنلىرى بولغانلىرىنى (جىنسى ئەزاسى غەيرى نورمال بولۇشقا ئوخشاش) نەسىللىك بۇقلىققا قالدۇرماسلىق لازىم.

(2) ئۇرۇقلاندۇرۇشنى تەشكىللەش خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، سىيرلارنىڭ كۈيلەش ۋاقتىنى ۋاقتىدا ئىگەللەپ تۇرۇپ، كۈيلەش پەيتىنى قولىدىن بەرمەي ئۇرۇقلاندۇرۇش كېرەك. سىيرلارنىڭ كۈيلەش ۋە ئۇلارنى ئۇرۇقلاندۇرۇش خاتىرىسىنى ياخشى تۇتۇش، ئۇرۇقلاندۇرۇش سۈرئىتىنى قەرەللىك ھالدا تەكشۈرۈش، كالا پادىلىرىنىڭ كۆپىيىش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىپ، ئاسان بوغاز بولمايدىغان سىيرلارنى ئۇرۇقلاندۇرۇش ئىشنى نۇقتىلىق تۇتۇپ ھەل قىلىش لازىم.

(3) بېقىش - باشقۇرۇش ۋە ساقلىقنى ساقلاش خىزمەتلىرىنى كۈچەيتىش كېرەك. كۈندىلىك ئوزۇغىنى مۇۋاپىق تەكشۈپ، تەركىبىنىڭ مول، تازىلىغىنىڭ ياخشى بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، بېقىش - باشقۇرۇش مەشغۇلات قاندىلىرىگە قاتتىق ئەمەل قىلىش لازىم. سىيرنى ئوتلىتىش ۋە ھەركەتلەندۈرۈش ئىشنى ياخشى تۇتۇپ، ئېغىلنىڭ تازىلىغىنى ياخشى ساقلاش كېرەك. سېغىن سىيرلارنى تۇغۇشقا ئىككى ئايچە ۋاقىت قالغاندىن تارتىپ ساغماسلىق، تۇغۇپ 3 ئايدىن كېيىنلا ئۇرۇقلاندۇرۇشنى قولغا كەلتۈرۈش، ئىش ئىنەكلىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش

لازم.

(4) سۈنئى ئۇرۇقلاندۇرۇش مەشغۇلات قائىدىلىرىنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، ئۇرۇق سۈپىتى ۋە سىيىرنىڭ فىزىئولوگىيىلىك ھالىتىنى پات-پات تەكشۈرۈپ تۇرۇش، كۈيىلەش مەزگىلىدە بوغاز بولۇش نىسبىتى تۆۋەن بولۇش مەسىلىسىنى ۋاقىتدا ھەل قىلىپ مېڭىش لازىم.

(5) سىيىرلار بويىچە يۇقۇم تەكشۈرۈش خىزمىتىنى قەرەللىك ئىشلەپ مېڭىپ، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇلارنى داۋالاش خىزمىتىنى ياخشى تۇتۇش، كۆپىيىش ئەزالىرىدىكى كېسەللىكلەر—جىنسى يول ياللۇغى، بالياتقۇ بويىنى ياللۇغى، بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى ياللۇغى، تۇخۇمدان ئىششىغى قاتارلىق كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنى ۋاقىتدا داۋالاش ۋە ئۇلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

7. موزاي كېسەللىكلىرى

يېڭى تۇغۇلغان موزايىنىڭ تۇنجۇقۇپ قېلىشى

يېڭى تۇغۇلغان موزايىنىڭ يۈزىگى بوش سوقۇپ تۇرغان، لېكىن نەپەس ئاجىز بولغان ياكى ۋاقىتسىچە توختىغان ھالەتكە تۇنجۇقۇپ قېلىش دەپ ئاتىلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] سىيىرنىڭ تۇغۇت يولى تار بولۇش، تۆرەلمە بەك يوغىناپ كېتىش، تۆرەلمە ئورنى توغرا بولماسلىق ياكى بالىياتقۇنىڭ قىسقىرىشچانلىقى ئاجىزلاپ كېتىش تۈپەيلىدىن، تۆرەلمە تۇغۇت يولىدا توختاپ قالغاندا، ياكى تۆرەلمە ھەمىيى ئانلىق ھەمىيىدىن بالدۇر ئاجراپ كېتىپ، تۆرەلمىگە ئوكسىگېن يېتىشمەي قالغاندا؛ ئانا تېنىدە كاربون IV ئوكسىدى بەك كۆپ يىغىلىپ قېلىپ، تۆرەلمە ۋاقتى-سائىتى كەلمەيلا نەپەس ئېلىشقا مەجبۇر بولۇپ، باش سۈيىنى شۈمۈرۈۋالغاندا تۇنجۇقۇپ قېلىش كېلىپ چىقىدۇ.

بالىياتقۇنىڭ قاتتىق قىسقىرىشى، ياكى كىندىكنىڭ تۆرەلمە تېنىنىڭ مەلۇم قىسمىغا ئورنىلىپ قېلىشى تۈپەيلىدىن، ھەمىيە-

نىڭ ياكى كىندىكىنىڭ قان ئايلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش بىلەن تۆرەلمە ئوكسىگېن يېتىشمەي قېلىپ تۇنجۇقۇپ قالىدۇ. سىيىرلار تۇغۇشقا ئاز قالغاندا ئېغىر قىزىتمىلىق كېسەللەرگە گىرىپتار بولغان، قاتتىق چارچاپ كەتكەن، كەمقان بولغاندا، قاندىكى ئوكسىگېن ئازىيىپ كېتىش، كاربون IV ئوكسىدى كۆپىيىپ كېتىش بىلەن، تۆرەلمە ئوكسىگېن يېتىشمەي قېلىپ تۇنجۇقۇپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] يېنىك دەرىجىدىكى تۇنجۇقۇشتا، تۆرەلمىنىڭ شىللىق پەردىلىرى كۆكرىدۇ، تىلى ساڭگىلايدۇ، ئېغىز-بۇرۇنغا شىلمىشقى سۇيۇقلۇق ۋە باش سۈيى تولۇپ كېتىدۇ. نەپەس ئاجىز ۋە ئىتتىك بولىدۇ، كۆكرەك تېمى قاتتىق چىڭقىلىدۇ ۋە بۇ ھال خېلى ئۇزاققا داۋام قىلىدۇ. تومۇر تېز ھەم ئاجىز سوقىدۇ. ئاياقلىرىنىڭ ھەركەت ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ، كۆزنىڭ مۈڭگۈز پەردىسىنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇشى ئاجىز بولىدۇ. ئېغىر دەرىجىدىكى تۇنجۇقۇشتا، يېڭى تۇغۇلغان موزايىنىڭ شىللىق پەردىسى ئاقىرىپ كېتىدۇ، پۈتۈن ئەزاى پالەچ بولىدۇ، ئىنكاس قايتۇرۇشتىن قالىدۇ، نەپەس توختايدۇ. تومۇر بەك ئاجىز سوقىچقا، ئاسانلىقچە بىلىنمەيدۇ، يۈرىكى يەك ئاجىز سوقىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) سىيىرلارنى بوغازلىق مەزگىلىدە مۇۋاپىق ھەركەتلىەن- دۈرۈش ۋە ئوتلىتىپ بېقىش لازىم. سىيىر تۇغۇش ئالدىدا

ئۇنىڭغا مەخسۇس كىشى قاراش، تۇغدۇرۇش ئىشىنى ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش، تۇغالمايۋاتقانلىرىغا ۋاقتىدا ياردەم بېرىپ، ئامان-ئېسەن تۇغدۇرۇۋېلىش كېرەك.

(2) يېڭى تۇغۇلغان مۇزايىلاردا تۇنجۇقۇش كۆرۈلگەندە، ئېغىز، بۇرۇن ۋە نەپەس يولىرىدىكى شىلىمىش سۇيۇقلۇق ۋە باش سۈيىنى ئىمكان قەدەر تېز چىقىرىۋېتىش، ئاندىن سۈنى نەپەسلەندۈرۈپ، نەپەس فۇنكىتسىيىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرەك.

شىلىمىش سۇيۇقلۇقنى تازىلاپ چىقىرىپ بولغاندىن كېيىن، موزاينىڭ بېشىنى پەس، كەينى گەۋدىسىنى ئىگىز قىلىپ ئوڭدا ياتقۇزۇپ قويۇپ، بىر كىشى موزاينىڭ ئىككى يان كۆكرەك قەسمىدىن بىر قىسىپ، بىر قويۇۋېتىپ ھەركەتلەندۈرۈپ بېرىشى، يەنە بىر كىشى موزاي كۆكرىگىنىڭ قىسلىش-كېڭىيىشىگە ماسلاشتۇرغان ھالدا موزاينىڭ تىلىنى چىقىرىپ-كىرگۈزۈپ ھەركەتلەندۈرۈش ئارقىلىق نەپەسلەندۈرۈشى كېرەك. موزاي نەپەس ئېلىشقا باشلىغاندىن كېيىنمۇ سۈنى نەپەسلەندۈرۈشنى توختاتماي، قايتا تۇنجۇقۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىش لازىم. موزاي قۇتقۇزۇۋېلىنغاندىن كېيىن، بىرنەچچە سائەتكىچە داۋاملىق كۈزىتىش ۋە ئاسراش لازىم.

(3) قۇتقۇزۇش جەريانىدا، مۇسكۇلغا 2~4 م ل ۋىتا-كامفور، تېرە ئاستىغا 1% لىك لوبىنولىدىن 0.5~1 م ل ئوكۇل قىلىپ، نەپەس مەركىزىنى غىدىقلاش لازىم.

كىندىك يالغۇغى

بۇ — موزايىنىڭ كىندىكى كېسىلگەندىن كېيىن يۇقۇملىنىپ يالغۇغىلىنىدىغان بىر خىل كېسەللىك.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] كىندىك كېسىش ئۇسۇلى مۇۋاپىق بولماسلىق، دېزىنفېكسىيە قاتتىق بولماسلىق، موزايىلارنى كۈندىلىك باشقۇرۇش ئوبدان بولماسلىق، كىندىك كېسىلگەندىن كېيىن بۇلغىنىش، موزايىلار بىر بىرىنىڭ كىندىكىنى يالاپ يۇقۇملاندۇرۇش ئارقىسىدا كىندىك يالغۇغى كېلىپ چىقىدۇ. (كېسەللىك ئالامەتلىرى) كىندىك ئۇچى ياكى ئەتراپى ئىش-شىدۇ، نەملىشىپ تۇرىدۇ، قولغا قىزىق بىلىنىدۇ، ئاغرىيدۇ، بەزىدە قولغا ئاغامچىدەك قاتتىق بىلىنىدۇ. سىققاندا بەزىدە ئازراق قويۇق يىرىك چىقىدۇ. ئېغىر يالغۇغلانغاندا ئىششىق كېڭىيىپ، يىرىكلىق ھۆكۈنەك توقۇلما يالغۇغى ياكى يىرىكلىق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، ياكى توقۇلما چىرىپ يارا پەيدا بولىدۇ، ھەتتا ئاقما يارا پەيدا بولۇپ، يىرىك-سۇ ئۈزۈلمەي چىقىپ تۇرىدۇ، ئۇزاققىچە ساقايمايدۇ.

ئادەتتە ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلەر كۆرۈلمەيدۇ، ئۇنىڭغا ئۇلىنىپ قوساق پەردىسى يالغۇغلانغاندا، موزاي رەسىزلىنىدۇ، ئىشتىيى ناچارلايدۇ، تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەيدۇ، مېڭىشنى خالىمايدۇ.

[ئالدىنقى ئېلىش ۋە داۋالاش] تۇغۇتخانا ۋە موزايخانلارنى پاكىز تۇتۇش كېرەك. يېڭى تۇغۇلغان موزايىلار تۇرىدىغان جايىنى قۇرۇق تۇتۇش، تۆشەك چۆپىنى پات-پات ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش، دېزىنفېكسىيە قىلىپ تۇرۇش كېرەك. موزاي تۇغۇلۇپ كىندىكى كېسىلگەن ھامان، ئۇنى يود سۈركەپ دېزىنفېكسىيە قىلىش لازىم، سرغىتىلار يىغىلىۋېلىپ باكتېرىيىلەرنىڭ كۆپىيىشىگە پۇرسەت تۇغۇلمىسۇن ئۈچۈن، كىندىكى بوغۇپ چۈشۈرۈشكە بولمايدۇ.

(1) كىندىك چۆرىسىدىكى يۇڭلار قىرغىلىپ دېزىنفېكسىيە قىلىنغاندىن كېيىن، %1.1 لىك مارگانىسوپ ياكى %0.1 لىك رېۋانول ئېرىتمىلىرى بىلەن كىندىكىنى يۇيۇپ، ئاندىن كىندىك تۆشۈگىگە %5 لىك يود تىنكىتۇرىسىدىن قۇيۇش، ياكى كۆمۈر پاراشوگى-يودفورم (كۆمۈر پاراشوگى 9 ئۆلۈش، يودفورم 1 ئۆلۈش) سېپىش لازىم.

(2) كىندىك يىرىڭلىغاندا ياكى چىرىگەندە، يىرىڭنى ۋە ئۆلگەن توقۇلمىلارنى كېسىپ چىقىرىۋېتىش لازىم. ئەگەر يارا ياكى ئاقما يارا پەيدا بولغان بولسا، مارگانىسوپ پاراشوگىدىن سېپىپ كۆيىدۈرۈلىدۇ، ياكى داغلىنىدۇ، كېيىن ئادەتتىكى جاراھەت قاتارىدا بىر تەرەپ قىلىنىدۇ.

(3) ئومۇمىي بەدەنلىك رېئاكسىيە كۆرۈلگەندە، سۇلقانلا-مىدلىق ۋە ئانتىبىيوتىك دورىلار بىلەن داۋالىنىدۇ.

موزاي ئىچ ئۆتكۈسى

موزايىلارنىڭ ئىچ ئۆتكۈسى ئۈچەي-قېرىن شىلىق پەردىسىنىڭ يۈزە ھەتتا چوڭقۇر قەۋىتىدە يۈز بېرىدىغان ياللۇغ بولۇپ، تولاراق تۇغۇلغىنىغا 7~42 كۈن بولغان موزايىلاردا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] 28 كۈنلۈكتىن تۆۋەن موزايىلارنىڭ چوڭ قېرىن شىلىق پەردىسى يېتىلمىگەن بولىدۇ، يىگەن ئۇزۇقى 4-قېرىندىلا ھەزىم بولىدۇ، تاشقى شارائىتقا ماسلىشىش-چانلىقى ئاجىزراق بولىدۇ، شۇڭا پايدىسىز تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن ئوڭايلا كېسەللىككە گىرىپتار بولىدۇ. بىۋاسىتە سەۋەپلىرى مۇنداق: بىرىنچى، سۈنئى ئەمگۈزۈلىدىغان سۈتنىڭ تېمپېراتۇرىسى تۆۋەن ياكى يۇقۇرى بولۇش، بېرىلىدىغان سۈتنىڭ مىقدارى ۋە ۋاقتى مۇقىم بولماسلىق، سۈتنى ئوبدان دېزىنېكسىيە قىلماسلىق، ئىمتىشكە ئىشلىتىلىدىغان سايىمانلار ۋە موزايخاننىڭ تازىلىغى ياخشى بولماسلىق سەۋىيىسىدىن، باكتېرىيىلەر موزاي تېنىگە كىرىپ كېسەل پەيدا قىلىدۇ. ئىككىنچى، موزايىنىڭ ياتىدىغان جايى زەي، پاسكىنا بولۇش، ئۇزاققىچە نەم يەردە يېتىپ قوساققا سوغاق ئۆتۈش، ياكى ھاۋانىڭ ئۆستۈمۈت ئۆزگىرىشى، قاتتىق يامغۇردا قېلىش تۈپەيلىدىن، ھەزىم قىلىش فۇنكسىيىسى بۇزۇلىدۇ. ئۈچىنچى،

موزايلا تىزەك تەرىپىدىن بۇلغانغان تۆشەك چۆپنى يالاش سەۋىيىدىن، چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسى، پاراتىق تاياقچە باكتېرىيىسى قاتارلىقلار ئېغىز ئارقىلىق بەدەنگە كىرىپ يۇقۇم پەيدا قىلىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] كېسەلنىڭ دەسلەپكى موزاي روھسىزلىنىدۇ، ئىشتىيى ناچارلايدۇ، ئىچى سۈرىدۇ، دەسلەپتە يېپىشقاق سۇيۇق سۈرىدۇ، كېيىن سۇغا ئوخشاش سۈرىدۇ. بەزىدە تىزىگىدە پاختىسىمان شىلىشىقلار ۋە قان بولىدۇ، تىزىگى سېسىق پۇرايدۇ. قوسىغى ئىچىگە تارتىلىپ كېتىدۇ، كۆپ ياتىدۇ. كېسەلنىڭ ئوتتۇرا مەزگىلىدە ئىچ سۈرۈش ئېغىرلىشىپ، تىزىگى ئۈچەي شىللىق پەردىلىرى ۋە قان ئارىلاش سۈدەك كېلىدۇ، قوسىغى تاراقشىيدۇ ۋە ئاغرىيدۇ. روھى ئىنتايىن ناچارلىشىپ، ئىشتىيى پۈتۈنلەي تۇتۇلىدۇ، ئېغىر دەرىجىدە سۈزىلىنىدۇ، كۆزلىرى ئولتۇرۇشىدۇ، كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىلىرى كۆكىرىدۇ. كېسەلنىڭ كېيىنكى دەۋرىدە موزاي ياتقان ئورنىدىن تۇرماي، بېشىنى بىر يېنىغا قايرىپ ياتىدۇ، ئايىقلىرى مۇزلايدۇ، خارامۇشلىنىدۇ ۋە پۈتۈن بەدىنىدىكى مۇسكۇللار تارتىشىدۇ، تومۇرى ئىنچىكە ۋە ئاجىز سوقىدۇ، نەپەس ئىتتىكىلىيدۇ، ئاخىردا ئاجىزلىشىپ ئۆلىدۇ. [دىئاگنوز قويۇش] بۇنى موزاي پاراتىقىدىن پەرقلىنىدۇ. دۈرۈشكە دىققەت قىلىش لازىم. موزاي پاراتىقىدا دەسلەپتەلا بەدەن تېمپېراتۇرىسى كۆتىرىلىدۇ، ئاۋال قەۋزىيەت، كېيىن

ئىچ سۈرۈش كۆرۈلىدۇ، كۆزنىڭ بىرىكتۈرگۈچى پەردىسى ياللۇغى، بۇرۇن شىللىق پەردىسى ياللۇغى ۋە يۈگۈم ياللۇغى قاتارلىق ئالامەتلەر روشەن كۆرۈلىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش]

(1) يېڭى تۇغۇلغان موزاي 7 كۈنلۈك بولغىچە، بېقىش قائىدىلىرى بويىچە ئوغۇز سۈتى بىلەن بېقىلىدۇ. سۈت ئەمگۈزۈشتە، سۈتنىڭ مىقدارى، بېرىلىش ۋاقتى ۋە ھارارىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاش، ئەمگۈزۈش تازىلىقىنى ھەققى تۈردە ياخشى قىلىش لازىم.

(2) موزايىنى ئوت-چۆپ يېيىشكە ئۈگەتكەندە ئوت-چۆپ تازىلىغىغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. ئوزۇغىنى يەڭگۈشلەشكە توغرا كەلگەندە، موزايىنىڭ ھەزىم قىلىش ئەھۋالىغا قاراپ، مۇۋاپىق ھالدا يەڭگۈشلەش لازىم.

(3) موزايخانا تازا، قۇرغاق، يورۇق بولۇشى، تۆشەك چۆپ ۋاقتى-ۋاقتىدا ئالماشتۇرۇپ تۇرۇلۇشى، موزايخانا پات-پات دېزىنڧىكسىيە قىلىپ تۇرۇلۇشى، موزايغا سوغاق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدى ئېلىنىشى لازىم.

(4) موزايىلارنى دەسلەپتە موزايخانىدىن چىقىرىپ، ئاز-تولا ھەركەتلەندۈرۈپ تۇرۇش ۋە ئاپتاپتا تۇرغۇزۇش پايدىلىق، لېكىن قەھرىستان سوغاق كۈنلىرى سوغاق ئۆتۈپ قېلىشتىن ۋە تومۇز ئىسسىق كۈنلىرى ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش لازىم. موزايخانىنىڭ ئىشك-دەرىزىلىرىنى ھىم ئېتىپ، ئوغرى

شامال كىرىپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم.

(5) قېتىق ۋە قۇرۇق ئوت ياسالمىسى بېرىلىدۇ. قېتىق ئېچىتىش ئۇسۇلى: قايمىغى ئېلىنغان سۈتنى پاستىرلەتسىيە قىلغاندىن كېيىن، 5% لىك ئېچىتقۇ باكتېرىيە ساپ ئۆستۈرۈلمە-سىدىن قوشۇپ (ئېكىپ)، $38\sim 40^{\circ}\text{C}$ لۇق شارائىتتا 5~6 سائەت تۇرغۇزۇلسا قېتىق بولىدۇ. قېتىق موزايغا كۈندە 200~300 م ل دىن بېرىلىدۇ، كېيىن مىقدارىنى تەدرىجى كۆپەيتىپ 500~1000 م ل غا يەتكۈزۈسە بولىدۇ.

قۇرۇق ئوت ياسالمىسىنى ئىشلەش ئۇسۇلى: 1 ك گ ياد-چىلغان ياكى (توغرالغان) قۇرۇق ئوتقا $70\sim 80^{\circ}\text{C}$ لۇق قىزىق سۇدىن 5 ك گ، تۈزدىن 5 گ قوشۇپ 5~6 سائەت دۈملەنسە تەييار بولىدۇ، سۈزگەندىن كېيىن موزايغا ئىچكۈزۈلىدۇ.

(6) ئاسراشنى كۈچەيتىش، بېقىش تازىلىغىنى ياخشىلاش: كېسەل موزايغا بېرىلىدىغان سۈت مىقدارى ئازايتىلىدۇ (نورمال مىقداردىن $\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}$ ھەسسە ئازايتىلىدۇ)، سۈتكە 1~2 ھەسسە سۇ قوشۇپ بېرىلىدۇ. كېسەللى ئېغىرلىرىغا سۈت 1~2 قېتىم كەم بېرىلىدۇ، گۈرۈچ سۈيى، ئىلچان سۇ ئىچكۈزۈلىدۇ، سۈيىگە 0.1% لىك مارگانىسوپ ياكى 1.5~1% لىك ھاك سۈيى قوشۇپ بېرىلسىمۇ بولىدۇ. قېتىق بېرىلسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ئوبدان بولىدۇ. موزايخانا، موزايخانىدىكى جابدۇقلار ۋە ئېمىتىش سايمانلىرى ئوبدان دېزىنفېكسىيە قىلىنىدۇ، تىزەك ۋە تۆشەك چۆپ ئۇدۇللۇق تازىلاپ تۇرۇلىدۇ. موزايخانا تازا،

ھاۋالىق، ئاستى قۇرغاق تۇتۇلىدۇ.

(7) ئۆچەي ياللۇغىنى قايتۇرۇش، قورۇش يۈزىدىن سىنتومىتىن، ئاۋرېۋىمىتىن، خلورومتىن ياكى تېرېمىتىن قاتارلىقلار كۈندە 2~3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 1~2 گ دىن ئىچكۈزۈلىدۇ؛ ياكى سۇلفامىدىن ھەر ك گ تەن ئېغىرلىغىغا 0.1~0.2 گ دىن ھىساپلىنىپ كۈندە 2~3 قېتىم ئىچكۈزۈلىدۇ؛ ياكى يۇقۇرى ئۈنۈملۈك سۇلفامىد (SMP) 2~3 گ دىن كۈندە بىر قېتىم ئىچكۈزۈلىدۇ؛ ياكى فۇراتسىللىن ھەر ك گ تەن ئېغىرلىغىغا 7~10 م ل دىن ھىساپلىنىپ كۈنگە 2~3 قېتىم ئىچكۈزۈلىدۇ؛ ياكى تۆۋەندىكى رېتسېپلار بويىچە داۋالانىدۇ.

رېتسېپ:

پېپسىن 2 گ، كىراخمال 0.5 گ، ۋىسمۇت نىترىت 0.5 گ،

سالور 1 گ، سۇلفامىدىن 2.5 گ

بۇلار ئارىلاشتۇرۇلۇپ بىر يولى ئىچكۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

ۋىسمۇت نىترىت 3 گ، خلورومتىن 2 گ، لاکتاسىن 10 گ

بۇلار ئارىلاشتۇرۇپ بىر يولى ئىچكۈزۈلىدۇ.

ئىچى سۈرۈش ئېغىر بولغاندا، ئەپپۇن تىنىكتۇرسىدىن

2~3 م ل، ياكى كامفورا تىنىكتۇرسىدىن 5~10 م ل

ئىچكۈزۈلىدۇ.

(8) ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالاش: سۇسىزلانغان موزايغا

فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە، 5% لىك گلىكوزىلىق فىزىئولوگىيەلىك لىك ئېرىتمە ياكى مۇرەككەپ ناتىرىي خلورىد ئېرىتمىسى كۆك تومۇرغا 200~300 م ل دىن كۈندە 2~3 قېتىم ئۆكۈل قىلدۇ. يۈرىكى ئاجىزلاپ كەتكەنلىرىگە 0.5% لىك ۋىتاكامفو ئۆكۈلى 5 م ل، ياكى 20% لىك كوففېين ئۆكۈلى 2 م ل تېرە ئاستىغا ياكى مۇسكۇلغا ئۆكۈل قىلىندۇ. كىسلاتادىن زەھەرلىنىش ئەھۋالى كۆرۈلسە، 5% لىك ناتىرىي ھىدروكاربوناتىن كۆك تومۇرغا 50~100 م ل ئۆكۈل قىلىندۇ.

(9) جۇڭىيى دورىلىرى بىلەن داۋالاش: پاقا يوپۇرمىغى چىلانمىسىدىن 25~30 م ل، قالقانگۈلدىن 4 گ، ئاقباش ئوت پاراشوگىدىن 2 گ ئېلىپ يالانما ياساپ، بىر قېتىم يىگۈزۈلىدۇ (پاقا يوپۇرمىغى چىلانمىسى: 500 گ پاقا يوپۇرمىغى 1000 م ل سۇدا 200 م ل قالغىچە قاينىتىلىدۇ).

موزاي ئۆپكە ياللۇغى

موزايىلاردا ئۆپكە ياللۇغى تولاراق كانايچە - ئۆپكە ياللۇغى خاراكتېرىدا كۆرۈلىدۇ، باش ئەتىياز ۋە باش قىشتا كۆپ يۈز بېرىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىۋى] بۇ كېسەل، ئاساسەن، ئۆپكە ياللۇغىنىڭ شارسىمان، زەنجىرسىمان ۋە ئۈزۈمسىمان باكتېرىيەلىرىگە ئوخشاش كېسەللىك قوزغاتقۇچىلار موزايىنىڭ نەپەس

يولغا كىرىپ يۇقۇم پەيدا قىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. بېقىش شارائىتى ناچار، بولۇپمۇ مىنېرال ماددىلار ۋە ۋىتامىنلار كەمچىل بولغاندا، موزاينىڭ تېنى ئاجىزلىشىپ، كېسەلگە قارشى كۈچى تۆۋەنلەپ كېتىپ، ئاسانلا ئۆپكە ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ. ھاۋا تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلىگەن، سوغاق تەككەن، ئېغىل پاسكناھەم زەي تۇرغان، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرمىغان ئەھۋالدىمۇ ئۆپكە ياللۇغى پەيدا بولىدۇ.

بۇ كېسەللىك موزاي تۈبېركۇلىوزى، پاراتىفى، ئىچ ئۆتكۈسى ۋە تارقىلىشچان زۇكام قاتارلىقلارغا ئۇلىنىپمۇ پەيدا بولىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] موزاي روھسىزلىنىدۇ، ئىشتىيى ناچارلايدۇ ياكى ئوزۇق يىمەيدۇ، كۆپ ياتىدۇ، ئورنىدىن ئاسانلىقچە قوزغالمايدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى كۆتىرىلىپ $39.5 \sim 41^{\circ}\text{C}$ قا چىقىدۇ، تولىراق دولقۇنسىمان قىزىتما بولىدۇ، ئاز ساندىكىلىرىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسىدا روشەن ئۆزگىرىش بولمايدۇ. تومۇرى تېز ۋە ئاجىز سوقىدۇ، نەپەس ئىتتىك ۋە يۈزە بولىدۇ، كۆپىنچە بوش يۆتىلىدۇ. بۇرىندىن شىرىلىق، شىلىمشىق ياكى يىرىڭلىق ئاجراتمىلار ئاقىدۇ. ئۆپكە دائىرىسىنى تىڭشاپ كۆرگەندە قۇرۇق ياكى ھۆل خىرىلىدىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. كۆكرەك تېمىنىڭ تۆۋەن قىسمىنى چېكىپ كۆرگەندە چېكىلىك ھالدا يېرىم بوغۇق ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. بەزىدە ئىچى سۈرىدۇ.

{ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش} بوغاز سىيرلارنىڭ بېقىلدى-
شنى كۈچەيتىپ، موزايلىرىنىڭ ساغلاملىغىنى ئۆستۈرۈش لازىم.
قىش-ئەتىيازدىن ئىبارەت كېسەل يۈز بىرىدىغان پەسىللەردە
تازىلىق ۋە ئاسراش خىزمىتىگە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.
ھاۋا ئۆزگىرىپ، موزايخاننىڭ تېمپېراتۇرىسى تېز تۆۋەنلە-
گەندە، موزايغا سوغاق تېگىشتىن ساقلىنىش تەييارلىغىنى ئوبدان
ئىشلەپ، موزايغا زۇكام تېگىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

(1) ياللۇغنى قايتۇرۇش ئۈچۈن، موسكۇلغا پېنتىسىللىندىن
20~40 تۈمەن بىرلىك، سىتېرېتومىتسىندىن 50~100 تۈمەن
بىرلىك ئوكۇل قىلىندۇ (كۈندە 2 قېتىم)؛ ياكى 10% لىك
ناترىي سۇلفاتىئازول ياكى سۇلفادىئازىن ئېرىتمىسىدىن 20~40
م ل غا 25% لىك گلىكوزا ئوكۇلى ياكى 5% لىك گلىكوزىد-
لىق-فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىدىن 100~200 م ل قوشۇپ،
كۆك تومۇرغا كۈندە 1~2 قېتىم ئوكۇل قىلىنسىمۇ بولىدۇ. ئېغىر
كېسەللەنگەنلىرىگە موسكۇلغا پېنتىسىللىن، كۆك تومۇرغا
سۇلفامىدلىق دورىلار بىر ۋاقىتتا ئوكۇل قىلىندۇ؛ ياكى 0.5~1
گ تېتراسىكللىنى 100~300 م ل گلىكوزىلىق تۇز سۈيى
(5% لىك)دە ئېرىتىپ، كۆك تومۇرغا تامغۇزۇپ ئوكۇل
قىلىندۇ.

(2) بەلغەمنى ھەيدەپ، يۆتەلنى توختىتىش ئۈچۈن، 4 گ
ئاممونىي خلورىد، 6 م ل ئۈرۈك مېغىزى سۈيى، 8 م ل
كەرمان تىنىكتۇرىسى قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق مىقداردا سۇ قوشۇپ

ئارىلاشتۇرۇپ، بىر يوللا ئىچكۈزۈلىدۇ.

(3) سرغىتىلارنىڭ سرغىپ چىقىشىنى توساش ئۈچۈن

10% لىك كالتسىي خلورىددىن 40 م ل غا 40% لىك ئۈزۈتۈرۈپ

دىن 20 م ل قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، كۆك تومۇرغا بىر يوللا

ئوكۇل قىلىندۇ.

(4) بەدەن تېمپېراتۇرىسى كۆتىرىلىپ قالسا، قىزىتما

قايتۇرغۇچى دورا — ئانالىگىن ئوكۇلىدىن مۇسكۇلغا 5 م ل

ئوكۇل قىلىندۇ.

(5) يۈرەك ئاجىزلىغاندا، 20% لىك كوففېين ياكى كامفور

مېيى مۇسكۇل ياكى تېرە ئاستىغا 2~4 م ل ئوكۇل قىلىندۇ.

موزاي پاراتىفى

موزاي پاراتىفى يېڭى تۇغۇلغان موزايىلاردا كۆرۈلىدىغان بىر

خىل يۇقۇملۇق كېسەللىك بولۇپ، كىلىنىكىدا تالالىق ياكى

قانغاق ئۈچەي ياللۇغى ۋە ئۆپكە ياللۇغى بولۇش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ ۋە بەزىدە ئۇ بوغۇملارغىمۇ زىيان يەتكۈزىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] بۇ كېسەللىك ئۈچەي ياللۇغىنىڭ

تايلاقچە باكتېرىيىسى ۋە تىنى باكتېرىيىلىرىدىن ئىبارەت ئىككى

بېشى دىققەت، گرام بويىغىدا مەنپى بويىلىدىغان باكتېرىيىدۇر.

لەردىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ خىل باكتېرىيىلەر سۇدا ۋە تۇپراقتا

4 ئايدىن ئوشۇق ۋاقىت ياشايدۇ، 60°C دا 20 مىنۇت ئىچىدە

ئۆلدى. ئادەتتىكى دېزىنڧېكسىيە دورىلىرى ئۇلارنى
ئۆلتۈرەلەيدۇ.

پاراتىن كېسىلى بولغان مال ۋە باكتېرىيە ئېلىپ يۈرگۈچى
ھايۋانلار يۇقۇم مەنبەسى ھىساپلىنىدۇ. تىزەك بىلەن بىللە
ئاجرىلىپ چىققان كېسەللىك باكتېرىيىلىرىنىڭ سۈنى، بېقىش
جابدۇقلىرىنى ۋە يەم-خەشەكلەرنى بۇلغىشى بىلەن تارقىلىدۇ.
ساغلام موزايىلار بۇلغانغان يەم-خەشەك، سۈنى ئىستىمال قىلغان
ياكى بۇلغانغان ئەمچەكنى ئەمگەندىن كېيىن، ھەزم قىلىش
يوللىرى ئارقىلىق يۇقۇملىنىدۇ. ساغلام موزايىلارنىڭ تېنىدىمۇ
بەزىدە بۇ خىل باكتېرىيىلەر ساقلىنىدۇ، شۇڭا بېقىش-باشقۇ-
رۇش ۋە تازىلىق ياخشى بولماسلىق، سۈتتىن بەك بالدۇر
ئايرىۋېتىش، ھاۋا توساتتىن ئۆزگىرىش، سوغاق ۋە نەملىك
قاتارلىق تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدە، بەدەننىڭ كېسەلگە
قارشى كۈچى ئاجىزلىغان چاغدا، كۆپىنچە، ئىچكى جەھەتتىن
يۇقۇملىنىش بىلەن بۇ كېسەل كېلىپ چىقىدۇ. بۇ كېسەل 4
پەسلىنىڭ ھەممىسىدە، خۇسۇسەن ھۆل-يېغىن ئۈزۈلمەيدىغان
پەسىللەردە كۆپ پەيدا بولىدۇ. ئادەتتە 7~28 كۈنلۈك موزايى-
لاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] ئادەتتە يوشۇرۇن مەزگىلى 5~8
كۈن بولىدۇ، كېسەللىك جەريانىغا ئاساسەن ئۆتكۈر تىپ ۋە
سوزۇلما تىپ دەپ ئىككى تىپقا ئايرىلىدۇ.
ئۆتكۈر تىپ: دەسلەپتە موزايىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى تېز

كۆتىرىلىدۇ، 2~3 كۈن ئىچىدىلا 41°C دىن ئېشىپ كېتىدۇ، روھى چۈشىدۇ، ئىشتىيى بۇزۇلىدۇ، خارامۇش پائىدۇر. باشقا قەۋزىيەت كۆرۈلىدۇ، 1~2 كۈن ئۆتكەندە ئىچى سۈرىدۇ (سېرىق سۈرىدۇ). كېسەل ئېغىرلاشقاندا سۈر سېرىق ياكى قارامتۇل كۈل رەڭ تىزەكلەيدۇ، تىزىگى بەك سېسىق پۇرايدۇ، بەزىدە قان ۋە ساختا پەردە ياكى كۆپۈك ئارىلاش كېلىدۇ. كۆز، بۇرۇن، بىرىكتۈرگۈچى پەردىلىرىدە ياللۇغ پەيدا بولىدۇ، ئاخىرىدا ئىشتىيى تامامەن تۇتۇلۇپ، تېز جۈدەپ، ئورنىدىن تۇرالماس بولۇپ قالىدۇ.

سوزۇلما تىپ: دەسلەپتە موزاينىڭ ئىشتىيى ناچارلاشقا باشلايدۇ ۋە ئىچى بوش سۈرىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسىدا كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بىزە قىزىپ قالىدۇ. بەزىدە كۆرگىلى بولىدىغان بوغۇملىرى ئىشىش زورىيىدۇ، بولۇپمۇ بېغىش بوغۇمى بىلەن ئوشۇق بوغۇمى ئىشىشىدۇ، ئارىلاپ ئارىلاپ مۇسكۇل تارتىشش قاتارلىق نېرۋا خاراكتىرلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. كۆپ ھاللاردا ئۆپكە ياللۇغى بىللە كۆرۈلىدىغان بولغاچقا، موزاي يۆتىلىدۇ ۋە بۇرۇندىن ماڭغا ئېقىپ تۇرىدۇ. كېسەللىك جەريانى بىرنەچچە ھەپتىگە سوزۇلىدۇ، موزاي كۈندىن - كۈنگە ئورۇقلايدۇ، ئاسانلىقچە ساقايمايدۇ.

يېرىپ تەكشۈرگەندە مەلۇم بولىدىغان كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى: قوساق پەردىسى، قات قېرىن، دوۋساق، ئىنچىكە ئۆچەي شىللىق پەردىسىدە قانلىق چېكىتلەر بولىدۇ. ئۆچەي بېغىشى

لىمفا تۈگۈنى، دىئافراگما لىمفا تۈگۈنى ئىشىپ قالغان بولىدۇ. تال ئىشىغان، تال قېپىدا قانلىق چېكىت ۋە قان دېغى بولغان بولىدۇ. جىگەر سۈپەت ئۆزگىرىشى ياساپ، يېپىشقاق توپا رەڭگە كىرگەن بولىدۇ. تال ۋە جىگەر يۈزىدە تېرىقتەك سۈر سېرىق، چېگرىسى ئېنىق نېكروز ئوچاقلرى پەيدا بولغان بولىدۇ. ئۈچەي شىللىق پەردىسىدە ساختا پەردە بولىدۇ. كېسەلسەنگەن ئۆپكە ياپراقچىسىدىمۇ تېرىقتەك سۈر سېرىق ياكى سۈر ئاق يىرىقلىق نېكروز ئوچىقى پەيدا بولغان، ئۆپكە كۆپىنچە كۆكرەك پەردىسىگە يېپىشىپ قالغان بولىدۇ. يۈرەك مۇسكۇلى سۈپەت ئۆزگىرىشى ياسىغان، يۈرەكنىڭ ئىچكى-تاشقى پەردىسىگە قان چۈشكەن بولىدۇ. بوغۇم بوشلۇغىدا تالالىق سرغىتىملار بولىدۇ. [ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] ئادەتتىكى چاغلاردا موزاينىڭ تازىلىغىنى كۈچەيتىش؛ سالامەتلىگىنى پات-پات تەكشۈرۈپ، كېسەل موزاينى ۋاقتىدا ئايرىپ چىقىپ داۋالاش؛ بۇلغانغان موزايخانا، سايمانلارنى ئوبدان دېزىنفېكسىيە قىلىش، تۆشەك چۆپلەرنى كۆيدۈرۈش لازىم.

(1) 1 گ تېررامىتسىن ھىدروخلورىد 10~20 م ل ماگنىي خلورىد ئېرىتمىسى (5% لىك) دە ئېرىتىلىپ مۇسكۇلنىڭ قېلىن جايىغا ئوكۇل قىلىندۇ؛ كۈن ئارىلاپ بىر قېتىم، ئۇدا 5 قېتىم سېلىندۇ. مۇسكۇلغا خلورومىتسىن ئوكۇلىدىن 4~6 م ل سال-سىمۇ بولىدۇ (كۈندە 1~2 قېتىم).

(2) ئىچى سۈرگەندە خلورومىتسىن كۈندە 2 قېتىم، ھەر

قېتىمدا 1~2 گ دىن ئۇدا 5~7 كۈن ئىچكىۈزۈلىدۇ، ياكى
فوراكسوننى موزاينىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىقىغا 0.007~0.01
گ دىن ھىساپلاپ ئېلىپ كۈندە ئىككى قېتىمدىن ئۇدا 3~7
كۈن ئىچكىۈزۈشمۇ بولىدۇ.

(3) تۆۋەندىكى جۇڭىي دورىلىرىدىن تاللاپ ئىچكىۈزۈلىدۇ:

رېتسېپ:

ئەينولا 1.5 سەر، ياۋا كەشمىر، جۈلىك گىرىبى، مامۇرا.

نچىن 5 مىسقالدىن

بۇلارنى قوشۇپ سوقۇپ، قايناق سۇغا چىلاپ، سوۋۇغاندا
ئىچكىۈزۈلىدۇ. كۈنگە بىر بولاقىتىن ئۇدا 3~4 كۈن
ئىچكىۈزۈلىدۇ.

رېتسېپ:

قالقانگۈل، خۇاڭجىو قوۋزىغى، ئاقباش ئوت، چۈچۈكبۇيا

1 مىسقالدىن

بۇلارنى قوشۇپ سوققاندىن كېيىن، پاقا يوپۇرمىغى قايناتىمەن.
سىدىن مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇپ يالانما ياساپ، بىر قېتىم
يىگۈزۈلىدۇ. كۈنگە بىر، ئۇدا 5~4 كۈن يىگۈزۈلىدۇ.

(4) ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالاش: موزاينىڭ ئىچ ئۆتكۈ-
سىنى داۋالاش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىلىدۇ.

موزايىلاردا كۆرۈلىدىغان راخت كېسەللىكى

راخت كېسەللىكى كۆپ ئۇچرايدىغان، ماددا ئالمىشىش

توسقۇنلۇغىدىن كېلىپ چىقىدىغان كېسەللىك. موزايلارنىڭ ئۆسۈش ۋە يېتىلىش مەزگىلىدە، ۋىتامىن D يېتىشمەسلىك، كالتسىي، فوسفورنىڭ ئالمىشىپ تۇرۇشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش تۈپەيلىدىن، سۆڭەكنىڭ شەكلى ئۆزگىرىپ كېتىش بۇ كېسەللىكنىڭ كىلىنىكىلىق ئىپادىسىدۇر. بۇ كېسەللىك تولاراق قىشنىڭ ئاخىرى، باش ئەتىيازدا كۆرۈلىدۇ.

[كېسەللىك سەۋىيىسى] ئۇزۇق تەركىۋىدە ۋىتامىن D كەمچىل بولۇش، ئاپتاپ سىندۇرۇپ تۇرماسلىق، ياكى كالتسىي تۈزلىرى كەم بولىدىغان تۈگۈنەك يىلتىزلىق ئۇزۇق، كىچىك، ئارپا ۋە باشاقلىقلار ئائىلىسىدىكى كىسلاتالىق ئۇزۇق بىلەن ئۇزاق مەزگىل بېقىش بۇ كېسەللىكنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەپ بولىدۇ. بوغاز سىيىرلار ياكى موزايلىق سىيىرلارنى كالتسىي تەركىۋى ئاز بولغان ياكى كالتسىي-فوسفور نىسبىتى مۇۋاپىق بولمىغان ئۇزۇق بىلەن ئۇزاق ۋاقىت بېقىش سەۋىيىسىدىن، تۇغۇلغان موزاي ئاسانلا راخت كېسىلىگە گىرىپتار بولىدۇ.

موزايلارنىڭ سوزۇلما خاراكتىرلىق ھەزىم قىلىش ناچار-لىغى، پارازىتلىق كېسەللىكلەر بىلەن ئاغرىشى راخت كېسەللىكىنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەپ بولۇپ قالىدۇ.

[كېسەللىك ئالامەتلىرى] باشتا كېسەللىك ئالامەتلىرى يېنىك بولىدۇ. ئاساسەن، ئۆسۈش ئاستا بولۇش، ھەزىم قىلىش بۇزۇلۇش، غەيرى نەرسىلەرنى يىيىش، ئۇلاق ياكى تامنى يالاش، ئورنىدىن ئاستا تۇرۇش، مېدىرلىغۇسى كەلمەسلىك،

ئۆرە تۇرغاندا ئايقلارنى يۆتكەپ تۇرۇش، ماڭغاندا ئاقساش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. بوغۇملارنى تۇتقاندا ئاغرىقىسىد ندۇ. كېسەلنىڭ ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى مەزگىلىدە، شىراق سۆڭەك يوغىناپ، بوغۇملار بولۇپمۇ بېغىش، ئوشۇق ۋە باقاي بوغۇملىرى روشەن ئىششىپ قالىدۇ. پاچاقلىرى ئېگىلىپ قالىدۇ، بولۇپمۇ ئالدى ئايىغى "O" شەكلىگە كىرىپ قالىدۇ، كەينى ئايىغى "X" شەكلىگە كىرىپ قالىدۇ، سۆڭەك ئاسان سۈنىدىغان بولۇپ قالىدۇ. كۆكرەك قەپسى ئوبدان يېتىلمەيدۇ، يېسا بولۇپ قالىدۇ. كېيىنكى مەزگىلگە كەلگەندە قوۋۇرغا ۋە قوۋۇرغا كۆمۈر- چىگىنىڭ تۇتاشقان يېرىدە تەسۋىسمان تۈگۈنلەر پەيدا بولۇپ قالىدۇ، ئومۇرتقا شەكلى ئۆزگىرىپ قالىدۇ. بەزىدە يۈز سۆڭىكى ئىششىپ قالىدۇ-دە، بۇرۇن سۆڭىكى ئىنچىكىرەپ، نەپەسلىنىش قىيىنلىشىدۇ.

[ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش] بوغاز سىيىرلارنى مۇۋاپىق ھەركەتلەندۈرۈش ۋە ئوتلىتىش، كۆك چۆپ ۋە سۈپەتلىك قۇرۇق ئوت بىلەن بېقىش، ئوزۇقلۇق ماددىلار تەركىبىنىڭ مول بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، بولۇپمۇ ئاقسىل، مىنېرال ماددا ۋە ۋىتامىنلارنىڭ بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، كالتسىي بىلەن فوسفور نىسبىتىنىڭ مۇۋاپىق بولۇشىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىش لازىم. كېسەلنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە سۆڭەك پاراشوگى قوشۇپ بېرىش لازىم. موزايىلارنى كىچىك ۋاقىتىدىن باشلاپلا ئېغىلدىن چىقىرىپ ھەركەتلەندۈرۈپ تۇرۇش، ئاپتاپ سىندۇ-

رۇپ تۇرۇش، شۇنداق قىلىپ ساغلاملىغىنى ئاشۇرۇش لازىم. موزايىنى قۇرۇق ئوت ۋە ئارىلاش يەمگە بالىدۇر ئۈگىتىش كېرەك. يەنىنىڭ تۈرى مۇۋاپىق بولۇشى كېرەك، ئاقسىل تەر- كىۋى يۇقۇرى ئەمما كالتىسى تەركىۋى كەمچىل بولىدىغان پۇر- چاق تۈرىدىكى ئۇزۇق بىلەنلا بېقىشقا بولمايدۇ.

(1) كالتىسى تۈزلىرىنىڭ شۈمۈرۈلۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن، مۇسكۇلغا كالتىسى فروم 4~6 م ل دىن، ياكى كالتىسى فرول ئوكۇلى، ۋىتامىن AD مېيى 2~6 م ل دىن كۈن ئارىلاپ بىر قېتىمدىن ئۇدا 3~5 قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(2) كالتىسى تولۇقلاش ئۈچۈن، 10% لىك كالتىسى گىلىكو- نات سۇيۇقلۇغى ياكى 5% لىك گىلىكوزىلىق كالتىسى خلورىد سۇيۇقلۇغى كۆك تومۇرغا كۈن ئارىلاپ 20~50 م ل ئوكۇل قىلىنىدۇ.

(3) يۈرەك ئاجىزلىغى ياكى ھەزىم قىلىش ناچارلىغى كۆرۈلگەندە، يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلار ياكى ھەزىم قىلىشنى ياخشىلىغۇچى دورىلار ئەھۋالغا قاراپ بېرىلىدۇ.

8. كۆپ ئىشلىنىدىغان تاشقى كېسەللىك ئوپىراتسىيىلىرى

مۈڭگۈز كېسىش

[مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر] بۇ ئۇسۇل غەلىتە شەكىلدە ئەگرى ئۆسكەن مۈڭگۈز ۋە سۈنۈپ جۈل-جۈل بولۇپ كەتكەن مۈڭگۈزنى كېسىش توغرا كەلگەندە قوللىنىلىدۇ.

[جايلىق ئاناتومىيىسى] مۈڭگۈزنىڭ تۈۋى پىشانە سۆڭەكىنىڭ مۈڭگۈز دوقىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ. دوقىنىڭ ئىچى پىشانە كاۋىگىغا تۇتاشقان بولىدۇ. دوقىنىڭ سىرتى سۆڭەك پەردىسى بىلەن چىن پوستلاقتىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. چىن پوست-لاقىنىڭ ئۈستىدە قاتلاقسىمان تومپاق بولىدۇ، ئۇنىڭ سىرتى مۈڭگۈز پەردە بىلەن قاپلىنىپ تۇرىدۇ. مۈڭگۈز پەردە مۈڭگۈز تۈۋىگە يېقىنلاشقان سېرى نېپىزلەپ بارىدۇ. مۈڭگۈز پەردىسىنىڭ ئىچىدىمۇ قاتلاقسىمان تومپاقلار بولىدۇ، ئۇ چىن پوستلاقتا تۇتىشىپ تۇرىدۇ.

مۈڭگۈزدىكى قان تومۇرلار: مۈڭگۈزگە مۈڭگۈز قىزىل تومۇرى قان يەتكۈزۈپ تۇرىدۇ، مۈڭگۈز قىزىل تومۇرى چېكىدۇ.

دىكى يۈزە قىزىل تومۇرنىڭ شىخىدۇر. ئۇ، مۇڭگۈز نېرۋىسى بىلەن پىشانە سۆڭىگىنىڭ تاشقى قىرىغا كەلگىچە بىللە ماڭىدۇ، ئورنى چوڭقۇرراق بولغاچقا، بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلار بىلەن ئورلىپ تۇرىدۇ؛ مۇڭگۈز تۈۋىنىڭ تاشقى قىرىغا يەتكەندە شاخلىنىپ، بىر شېخى مۇڭگۈز تۈۋى ئالدى قىرىدىن مۇڭگۈز دوقسىغا كىرىدۇ، يەنە بىر شېخى مۇڭگۈز تۈۋى تاشقى قىرى ۋە ئارقا قىرىنى ئايلىنىپ چوققىغا بارسىدۇ ۋە مۇڭگۈز تۈۋى ئارقا قىرىنى ئايلىنىپ ئۆتكەندە شاخلاغان بىر شاخچە مۇڭگۈز دوقسىغا كىرىدۇ.

مۇڭگۈزدىكى نېرۋىلار: مۇڭگۈز نېرۋىلىرى ياش بېزى نېرۋىسى (ئۈچ ئاچا نېرۋا) نىڭ يان شېخى ۋە ئىچكى شېخىنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن شەكىللەنگەن بولۇپ، پىشانە سۆڭىگى تاشقى قىرىنىڭ ئوتتۇرىسىغا بارغاندا 6-7 شاخچىغا شاخلىنىدۇ.



57-رەسىم مۇڭگۈز نېرۋىسىدىن
ھۇشسىزلاندۇرۇش ئۇسۇلى

[بېكىتىش ۋە ھۇشسىز-
لاندۇرۇش] ئۆرە تۇرغۇزۇپ
بېكىتىلىدۇ. مۇڭگۈز نېرۋىسى-
دىن ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ.
كۆز چانغى ئۈستىكى تومپىغى
بىلەن مۇڭگۈز تۈۋىنى
تۇتاشتۇرغان سىزىقنىڭ
ئوتتۇرا نۇقتىسى ئۈكۈل
قىلىنىدىغان نۇقتا قىلىنىدۇ.

ئوكۇل يىگىنىسىنى سافىچىپ 1 س م كىرگۈزگەندىن كېيىن
3% لىك پروكاينىن ئېرىتمىسىدىن 10 م ل ئوكۇل قىلىنسا، 10
مىنۇت ئۆتكەندىن كېيىن ھۇشسىزلىنىدۇ.

[كېسىش ئورنى ۋە ئۇسۇلى] غەلىتە شەكىلدە ئەگرى ئۆس-
كەن مۇڭگۈزنى كېسىشتە، مۇڭگۈز ئايلانىمىسىنىڭ 5 س م چە
يۇقۇرىسىدىن كېسىلىدۇ. ئۆسكەك كالىنىڭ مۇڭگۈزى تۈۋىدىنلا
كېسىلىدۇ.

مۇڭگۈزنى كېسىشتىن ئاۋال، مۇڭگۈز تۈۋىدىكى يۇڭلار
قىرىلىدۇ، يود تىنىمىكتۇرىسى سۈرتۈلگەندىن كېيىن 70% لىك
ئىسپىرت سۈرتۈلىدۇ. ئاندىن كۆز چانغى ئۈستىكى تومپىغى
بىلەن مۇڭگۈز تۈۋىنى تۇتاشقۇرغۇچى سىزىقنىڭ ئوتتۇرا نۇقتى-
سىدىن (پىشانە سۆڭىكىنىڭ تاشقى تۈۋەن قىسمىدىن) 2~3 س
م ئۇزۇنلۇقتا كېسىلىپ، مۇڭگۈز قىزىل تومۇرى بوغۇۋېلىنىدۇ،
ئاندىن سۆڭەك كېسەر ئۆتكۈر ھەرە بىلەن مۇڭگۈز ھەرىدەپ
كېسىلىدۇ، ئاخىردا كېسىلگەن جاي تىكىلىدۇ.

مۇڭگۈزنى ھەرىدىگەندە ھەرە كېيىگىنىڭ (سۆڭەكتىن
چۈشكەن) پىشانە كاۋىگىغا كىرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم.
مۇڭگۈزنى كېسىپ بولغاندىن كېيىن، ھەرىدەلگەن ئورۇننى
پاكىز تازىلاپ، ئۇچىغا يودفورم ياكى سۇلفانلامىد پاراشوگىدىن
سېپىپ ۋە داكا ئوراپ، مۇڭگۈزگە تېڭىق سېلىنىدۇ. ھۆل-
يېغىنلىق پەسىللەردە مۇڭگۈز كېسىش توغرا كەلسە، يامغۇر
سۈيى پىشانە كاۋىگىغا كىرىپ كەتمەسۇن ئۈچۈن، تېڭىقنىڭ

ئۈستىگە مەلەم ياكى شام ئېرتىلىپ سۈركەپ قويۇلىدۇ؛ ياكى بولمىسا، مۈڭگۈزنى كېسىپ بولغاندىن كېيىنلا، كېسىلگەن جايىنى داغلاپ قاننى توختىتىپ، ئاندىن تېڭىپ قويسىمۇ بولىدۇ. [ئاسراش] مۈڭگۈز كېسىلگەندىن كېيىن ئاسراشنى كۈچەيتىش، كېسىلگەن جاي ئارقىلىق پىشانە كاۋىگى يۇقۇملىنىپ يىرىڭلاپ قالمىسۇن ئۈچۈن، كېسىلگەن جايىنىڭ سۈركىلىشىدىن ۋە بۇلغىنىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

قىزىل ئۆڭگەچ ئوپىراتسىيىسى

[مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر] بويۇن دائىرىسىدىكى قىزىل ئۆڭگەچكە ئوزۇق ياكى باشقا نەرسىلەر تۈرۈپ قالغاندا، شۇنى ئېلىۋېتىش ئۈچۈن ئوپىراتسىيە قىلىنىدۇ؛ ياكى قىزىل ئۆڭگەچ يانخالتىسىنى بىر ياقلىق قىلىش ئۈچۈنمۇ ئوپىراتسىيە قىلىنىدۇ.

[جايلىق ئاناتومىيىسى] قىزىل ئۆڭگەچ بويۇن دائىرىسىدىكى قىزىل ئۆڭگەچ ۋە تۆش دائىرىسىدىكى قىزىل ئۆڭگەچ دەپ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. تاشقى كېسەللىك ئوپىراتسىيىگە مۇناسىۋەتلىك قىسمى قىزىل ئۆڭگەچنىڭ بويۇن قىسمى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ يۇتقۇنچاقتىن باشلىنىدۇ ۋە كانايىنىڭ كەينى تەرىپىدە تۇرىدۇ. قىزىل ئۆڭگەچ 3-بويۇن ئۇمۇرتقىسىغا كەلگەندە تەدرىجى ھالدا كانايىنىڭ سول ياقى يۇقۇرىسىغا، 6-بويۇن

ئومۇرتقىسىدىن كۆكرەك بوشلۇغىغا كىرگەندە كانايىنىڭ سول تەرىپىگە توغرا كېلىدۇ، بويۇن دائىرىسىدىكى قىزىل ئۆڭگەچ يۇمشاق بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلار بىلەن ئورالغان بولىدۇ. تۆۋەنگە بارغانچە تىك دىئافراگما بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىسىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.

بويۇننىڭ يۇقۇرقى $\frac{1}{3}$ قىسمىدىكى قىزىل ئۆڭگەچنىڭ كەينى تەرىپىگە كىكىرتەك خالتىسى بىلەن بويۇن ئۈستى مۇسكۇلى توغرا كېلىدۇ؛ ئاستى تەرىپىدە كىكىرتەك كۆمۈرچىگى بىلەن كاناي كۆمۈرچەك ھالقىسى تۇرىدۇ؛ ئىككى يېنىدا بولسا ئاداشقان سىمپاتىك نېرۋا غولى، بويۇن باش قىزىل تومۇرى ۋە قايتقان نېرۋىلار بولىدۇ. سول تەرەپ مۇسكۇلى بويۇن تاشقى كۆك تومۇرىنى پاسىل قىلىدۇ، كەينى تەرىپىدە يەلكە-باش مۇسكۇلى، ئاستى تەرىپىدە تۆش-باش مۇسكۇلى بولىدۇ. بويۇن تاشقى كۆك تومۇرى بىلەن تۆش-باش مۇسكۇلىنىڭ ئىچىكى يېنىدا تاغاق-تىل سۆڭەك مۇسكۇلى بولىدۇ.

بويۇننىڭ ئوتتۇرا $\frac{1}{3}$ قىسمىدىكى قىزىل ئۆڭگەچنىڭ كەينى تەرىپىدە بويۇن ئۇزۇن مۇسكۇلى بولىدۇ؛ ئوڭ تەرىپىدە كاناي، سول تەرىپىدە بولسا ئاداشقان سىمپاتىك نېرۋا غولى بىلەن بويۇن باش قىزىل تومۇرى بولىدۇ. سول تەرىپىدىكى مۇسكۇللار بويۇننىڭ يۇقۇرقى $\frac{1}{3}$ قىسمىدىكى مۇسكۇلغا ئاساسەن ئوخشايدۇ، تاشقى تەرىپىدە بويۇن تېرە مۇسكۇلى بولىدۇ.

بويۇننىڭ تۆۋەنكى $\frac{1}{3}$ قىسمىدىكى قىزىل ئۆڭگەچنىڭ كەينى


تەرىپىدە بويۇننىڭ سول ئۇزۇن مۇسكۇلى، ئوڭ تەرىپىدە كاناي بولىدۇ، سول تەرىپىدە بولسا ئاداشقان سىمپاتىك نېرۋا غولى بىلەن بويۇن-باش قىزىل تومۇرى بولىدۇ. سول تەرەپ مۇسكۇلى بويۇننىڭ ئوتتۇرا $\frac{1}{3}$ قىسمىدىكى مۇسكۇلغا ئوخشاپ كېتىدۇ، تاغاق-تىل سۆڭەك مۇسكۇلى بىرلا چاندىردىن ئىبارەت، ئۇنىڭ تېرە مۇسكۇلى بولسا قېلىنراق بولىدۇ.

بويۇن قىزىل تومۇرىنىڭ قىزىل ئۆڭگەچ شاخچىسى قىزىل ئۆڭگەچنى قان بىلەن تەمىنلەيدىغان قىزىل تومۇر ھىساپلىنىدۇ. قىزىل ئۆڭگەچنى تىل-يۇتقۇنچاق نېرۋىسى، ئاداشقان نېرۋا بىلەن سىمپاتىك نېرۋا باشقۇرىدۇ.

[ئوپېراتسىيە ئالدىدىكى تەييارلىق]

(1) قىزىل ئۆڭگەچنىڭ توسىلىشى كۆپىنچە چوڭ قېرىنىنىڭ گازلىق كۆپۈشى بىلەن بىللە كۆرۈلىدۇ، شۇڭا ئوپېراتسىيىدىن ئىلگىرى چوڭ قېرىنغا يىڭنە سانجىپ، ئىچىدىكى گازنى قويۇۋېتىشكە توغرا كېلىدۇ. چوڭ قېرىنىنىڭ يەنە كۆپۈشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، چوڭ قېرىنغا سانجىلغان يىڭنە ئوپېراتسىيە تۈگىگىچە تۇرغۇزۇلىدۇ.

(2) بويۇن كۆك تومۇرىنى چۆرىدىگەن ھالدا يۇڭلار قىرى-قىلىدۇ ياكى چۈشۈرۈلىدۇ، ئاندىن بويۇن چوتكا بىلەن پاكىز يۇيۇلىدۇ. كېسىلىدىغان جاي 3% لىك لىزول سۈيى بىلەن يۇيۇلغاندىن كېيىن يود تىنىكتۇرسى ۋە 70% لىك ئىسپىرت بىلەن دېزىنفېكسىيە قىلىنىدۇ.



58-رەسىم بويۇن ئوتتۇرا قىسمىنىڭ توغرا كەسمىسى

1. تېرە 2. تېرە ئاستى توقۇلمىسى 3. يۈزە سېرىغەت 4. بويۇن تاشقى كۆك تومۇرى 5. يەلكە - باش مۇسكۇلى 6. تۆش - جاغ مۇسكۇلى 7. تۆش ئىمىزىكىسىمان مۇسكۇلى 8. بويۇن ئۇزۇن مۇسكۇلى 9. بويۇن باش قىزىل تومۇرى 10. بويۇن ئىچكى كۆك تومۇرى 11. كاناي 12. قىزىل ئۆڭگەچ 13. تۆش - تىل سۆڭەك مۇسكۇلى 14. تۆش سۆڭىكىنىڭ قالقانسىمان مۇسكۇلى 15. ئاداشقان سىمپاتىك نېرۋا غولى 16. بويۇن 4 - ئۆمۈرتقىسى 17. كاناي ئۈستى ئارىچى 18. چوڭقۇر سېرىغەت 19. بويۇن ئۇزۇن مۇسكۇلى 20. قايتىقان نېرۋا 21. لىمفا تۈگۈنى

(3) ئوپېراتسىيىگە ئىشلىتىلىدىغان پىچاق، قايچا، جۈپتەك، غان توختاتقۇچ، جاراھەت ئىلمىگى ۋە تىكەش سايمانلىرى قاينىتىپ ياكى چىرىتمەيدىغان دورا سۈيىگە چىلاپ دېزىنېفىكسىيە قىلىنىدۇ.

(4) تېڭىقما ئىشلىتىلىدىغان داكا، جايلىق دېزىنېفىكسىيە

دورسى، قان توختاتقۇچ دورا، ھۇشسىزلاندۇرغۇچى دورا ۋە يۈرەكنى كۈچەيتكۈچى، سۇيۇقلۇق تولۇقلىغۇچى دورىلار تولۇق ھازىرلىنىدۇ.

(5) باش ۋە ياردەمچى ئوپىراتسىيە خادىملىرى شۇنىڭدەك كالىنى تۇتۇپ بەرگۈچى كىشىلەر ياخشى تەشكىللىنىدۇ.

[بېكىتىش ۋە ھۇشسىزلاندۇرۇش] ئوڭ تەرىپىگە يېنىنچە ياتقۇزۇپ بېكىتىلىدۇ، ياكى ئۆرە تۇرغۇزۇپ بېكىتىلىدۇ. كالىنىڭ ھەر ك گ تەن ئېغىرلىغىغا 40% لىك ئىسپىرتنى 3 م ل دىن ھىساپلاپ ئېلىپ كۆك تومۇرغا ئوكۇل قىلىپ، يۈزە ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ. جايلىق ئورۇن 3% لىك پروكاين ئېرىتمىسى بىلەن ئىنفىلىتىراتلىق ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ.

[ئوپىراتسىيە ئورنى ۋە ئۇسۇلى] بويۇن تاشقى كۆك تومۇرىنى چېگرا قىلىپ، بويۇن تاشقى كۆك تومۇرى بىلەن يەلكە-باش مۇسكۇلىنىڭ ئارىلىغىدىن قىزىل ئۆڭگەچكە يەتكۈزۈپ كېسىلىدۇ، بۇ، يۇقۇرقى يول دىيىلىدۇ. بويۇن تاشقى كۆك تومۇرى بىلەن تۆش-باش مۇسكۇلى ئارىلىغىدىن قىزىل ئۆڭگەچكە يەتكۈزۈپ كېسىلىدۇ، بۇ، تۆۋەنكى يول دىيىلىدۇ.

ئوپىراتسىيە ئورنى قىزىل ئۆڭگەچكە تۇرۇپ قالغان نەرسە ئورنىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ. كەسكەندە، بويۇن تاشقى كۆك تومۇرىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويماسلىق ئۈچۈن، تېرىنى پۈرمە قىلىپ تۇرۇپ، بويۇن تاشقى كۆك تومۇرى تەكشىلىگە 12~15 س م كېسىلىدۇ. تېرە، تېرە ئاستى سېرىغىتى ۋە تېرە مۇسكۇلى-

لنى كېسىپ ئۆتكەندىن كېيىن، كېسىك ئاغزى جاراھەت ئىلمىگى بىلەن كېرىلىدۇ، ئاندىن كېيىن تاغاق تىل سۆڭەك مۇسكۇلى ھەم چوڭقۇر قەۋەت سېرىغەتتىن تىماقلاپ ئاجرىتىلىپ، قىزىل ئۆڭگەچ تولۇق ئېچىلىدۇ، ئاندىن قىزىل ئۆڭگەچ ئالدى-كەينىدىكى بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلاردىن پەم بىلەن ئاجىرتىلىپ، كېسىك ئاغزىدىن سىرتقا تارتىپ چىقىرىلىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن تىقىلىپ قالغان نەرسىنى ئىككى ئۇچىدىن موچىن بىلەن قىسىپ كۆتىرىپ تۇرۇپ، ئوتتۇرىسىغا ئىلماق فىزىئولوگىيىلىك سۇيۇقلۇققا چىلانغان داكا قاپلاپ قويۇلىدۇ.

قىزىل ئۆڭگەچ بىر يەردىن ئۇزۇنسىغا كېسىلىدۇ، شىللىق پەردىسى بىلەن مۇسكۇللۇق قەۋىتى ئاجرىلىپ كەتمەسۇن ئۈچۈن، قىزىل ئۆڭگەچنىڭ پۈتۈن قەۋىتى بىراقلا كېسىلىدۇ. كېسىكنىڭ چوڭلۇقى تىقىلىپ قالغان نەرسىنى كېسىككە زەخمە يەتكۈزمەي چىقىرىۋالغۇدەك دەرىجىدە بولسا بولىدۇ. كېسىش ئورنى قىزىل ئۆڭگەچ تېمىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشىگە قاراپ بەلگىلىنىدۇ، نېكروز بولغان يېرى بولمىسا، تىككەندىن كېيىن قىزىل ئۆڭگەچتىكى ماددىلار چىقىپ كەتمەسۇن ئۈچۈن ئۈستى تەرىپىدىن؛ نېكروز بولغان يېرى بولسا، يىرىڭى ئېقىپ چىقىشقا ئاسان بولسۇن ئۈچۈن ئاستى تەرىپىدىن كېسىلىدۇ. تۈرۈپ قالغان نەرسە ئېھتىيات بىلەن چىقىرىلغاندىن كېيىن، قىزىل ئۆڭگەچتىكى شال داكاغا شۈمۈرگۈزۈلىدۇ، قىزىل ئۆڭگەچ ئىچى 0.1% لىك رېئانول ياكى 0.1% لىك بروموگېرام سۇيۇقلۇقى

بىلەن يۇيۇلۇپ، ئاندىن باكتېرىيىسىز لەندۈرۈلگەن داكا بىلەن قۇرۇتۇلىدۇ. ئۇزۇلدۈرمەي تىكىش ئۇسۇلى بىلەن، قىزىل ئۆڭگەچنىڭ شىللىق پەردە ۋە مۇسكۇل قەۋىتى ھىم تىكىلىدۇ، كېسەك ئاغزىغا پىنىتسىللىق فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە سۈرتۈلىدۇ، قىزىل ئۆڭگەچ ئاستىغا قويۇلغان موچىن ۋە داكا ئېلىنىدۇ. تىلىنىدۇ، كېسەلگەن ئورۇن ۋە ئوپىراتسىيە قىلغۇچىنىڭ بىلىگى يۇيۇلىدۇ، ئاخىردا مۇسكۇل قەۋىتى بىلەن تاشقى پەردە ئىچىگە قايرىپ تىكىلىدۇ. قىزىل ئۆڭگەچ ئورنىغا قايتۇرۇلىدۇ، كېسەلگەن جايغا ياللۇغ قايتۇرۇش پاراشوگىمدىن ياكى پىنىتسىللىن پاراشوگىمدىن سېپىلىدۇ، ئاندىن مۇسكۇل ۋە تېرە تۈگۈنلەپ تىكىلىدۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا، تىكىلگەن جاينىڭ تۆۋەن بۇرجىگىگە ئېقىتما داكا پىلىگى سېلىنىدۇ. كېسەلگەن جايغا يود تىنكتۇرىسى سۈرتۈلىدۇ، تېڭىق سېلىنىدۇ.

قىزىل ئۆڭگەچ يانفالىتىسى پەيدا بولغاندا، كىچىكرەكلىرى پۇرمە قىلىنىپ، ئىچىگە قايرىپ ئۇزۇلدۈرۈپ تىكىش ئۇسۇلى بىلەن، قىزىل ئۆڭگەچ ئىچىگە مۇقىملاشتۇرۇلىدۇ؛ يوغانراقلىرىنىڭ ئارتۇق يېرى كېسىۋېتىلگەندىن كېيىن، يۇقۇرقىغا ئوخشاش تىكىش ئۇسۇلى بىلەن، قىزىل ئۆڭگەچ، بويۇن مۇسكۇلى ۋە تېرە تىكىلىدۇ.

[ئوپىراتسىيىدىن كېيىنكى ئاسراش] ئوپىراتسىيىدىن كېيىن 1~2 كۈنگىچە ئوزۇق بېرىلمەيدۇ، كېيىن يۇمشاق ئوزۇقلار (كېپەك ئۇمۇچى ياكى تېرىق ئۇمۇچى) بېرىلىدۇ، سۇ خالىغانچە

بېرىلىدۇ. ئوپېراتسىيىدىن كېيىن 10~12 كۈنگىچە ئاشقازان كانىلى ئىشلىتىلمەيدۇ.

ئوزۇق بېرىشكە بولمايدىغان ۋاقىتلاردا، %25 لىك كىلىگوز كۆك تومۇرغا 1000~1500 م ل دىن كۈندە ئىككى قېتىم ئۈگۈل قىلىنىدۇ. كېسك ئاغزى يۇقۇملىنىپ قالسا، يىپ ۋاقتىدا سۈكۈپ ئېلىۋېتىلىپ، ئوچۇق پېتى داۋالىنىدۇ.

چوڭ قېرىن ئوپېراتسىيىسى

[مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر] چوڭ قېرىنغا ئوزۇق تېقىلىش، جاراھەتلىك تورلۇق قېرىن ياللۇغى ۋە توققۇز تور-لۇققا ئوزۇق تېقىلىش ئېغىرلىشىپ قالغاندا قوللىنىلىدۇ.

[جايلىق ئاناتومىيىسى]

(1) قوساق تېمىنىڭ تۈزۈلۈشى: 1-قەۋىتى تېرە. 2-قەۋىتى قوساقنىڭ تېرە مۇسكۇلى، ئۇ ئۇزۇن تالالىرى بىلەن يان قوساق تېمىنى ئوراپ تۇرىدۇ. 3-قەۋىتى يۇمشاق بىرىك-تۈرگۈچى توقۇلما. 4-قەۋىتى قوساقنىڭ سېرىغىتى، ئۇ ئۇزۇنمىسىغا كەتكەن زىچ، سېرىق، ئەۋرىشىم پەردە. 5-قەۋىتى قوساق سىرتى قىيپاش مۇسكۇلى، مۇسكۇل تالالىرى ئالدى يۇقۇرسىدىن كەينى ئاستىدا قوساق ئاستى تېمىغىچە سوزۇلۇپ چاندىرغا ئايلىنىدۇ. 6-قەۋىتى قوساق ئىچى قىيپاش مۇسكۇلى، مۇسكۇل تالالىرى يانپاش دوقىسى ۋە يىرىق تارمۇشلىرىدىن باشلىنىپ تۆۋەنگە

سوزۇلۇپ، قوۋۇرغا يايىسى بىلەن قوساق تۈز مۇسكۇلنىڭ تاشقى قىرىغا بارغاندا چاندىرغا ئايلىنىپ، قوساق سىرتى قىپاش مۇسكۇلنىڭ چاندىرغا قوشۇلۇپ كېتىدۇ. 7-قەۋىتى قوساقنىڭ تۈز مۇسكۇلى، قوساق تېمىنىڭ ئاستى قىسمىغا جايلاشقان، مۇسكۇل تالالىرى تۆش سۆڭىگىدىن دوۋسۇن سۆڭىگىچە سۇزۇلغان بولىدۇ. 8-قەۋىتى قوساقنىڭ كۆندىلەڭ مۇسكۇلى، بۇ ئەڭ قېلىن مۇسكۇل ھىساپلىنىدۇ، ئۇنىڭ تالالىرى توغرىسىغا سوزۇلغان بولىدۇ، بېشى مۇسكۇل توقۇلمىسىدىن باشلىنىپ، ئاخىرى چاندىرغا ئايلىنىدۇ. 9-قەۋىتى قوساق سىرتى مايلىق توقۇلما. 10-قەۋىتى قوساق پەردىسى.

قوساق تېمىنى بەل قىزىل تومۇرى، سۆڭىگەچ ئايلىنىما تىرەن قىزىل تومۇرى، قوۋۇرغا ئارىلىق قىزىل تومۇرى، قوساق ئالدى قىزىل تومۇرى ۋە قوساق كەينى قىزىل تومۇرى قان بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇلارنىڭ ئىچىدە سۆڭىگەچ ئايلىنىما تىرەن قىزىل تومۇرى يۇمشاق ۋە توم بولىدۇ، ئالدى تارمىقى قوساق ئىچى قىپاش مۇسكۇلى بىلەن قوساق كۆندىلەڭ مۇسكۇلنىڭ ئارىلىقىدا بولىدۇ، يانپاش دوقىسىدىن ئالدىغا قاراپ مېڭىپ ئەڭ ئاخىرقى قوۋۇرغىنىڭ تۆۋەن ئۇچىغىچە بارىدۇ، ئوپىراتسىيىدە بۇنىڭغا دىققەت قىلىش لازىم.

قوساقنىڭ يۇمشاق تېمىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان نېرۋىلار ئاخىرقى قوۋۇرغا ئارىلىق نېرۋىسى، سۆڭىگەچ-قوساق ئاستى نېرۋىسى ۋە سۆڭىگەچ-يىرىق نېرۋىسىدىن ئىبارەت.

(2) چوڭ قېرىننىڭ تۈزۈلۈشى: چوڭ قېرىن ناھايىتى چوڭ

خاتىدىن ئىبارەت بولۇپ، پۈتكۈل قوساق بوشلۇقىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، دىئافراگما مۇسكۇلىدىن داس بوشلۇقىغىچە سوزۇلۇپ،

تۇرىدۇ. چوڭ قېرىن ئىككى

ئۇزۇنچاق ئېرىقچىسى تەرىپىدىن ئالدى-ئارقا ئىككى

قىسىمغا ئايرىۋېتىلىدۇ.

كۆندىلەك ئېرىقچىسى

تەرىپىدىن تېخىمۇ كىچىك

بۆلەكلەرگە ئايرىۋېتىلىدۇ.

شىلىق پەردە قەۋىتىنىڭ

ئۇزۇنچاق ئېرىقچە قىسمىدا

سېمىز شىلىق پەردە

قاتلىغى بولىدۇ، ئۇ قېرىننىڭ

ئىچىگە ئۆسۈپ كىرىپ

تۇرىدۇ. شىلىق پەردە

قاتلىغىدا خېلى يوغان

قىزىل تومۇر، كۆك تومۇر

ۋە ئۇلار بىلەن قاتارلىشىپ

تۇرىدىغان نېرۋىلار بولىدۇ.

59-رەسىم قۇساق تېمى مۇسكۇل

قەۋىتىنىڭ كۆرۈنۈشى

1. تېرە 2. قوساق سېرىغىتى 3. قوساق

تاشقى قىيپاش مۇسكۇلى 4. قوساق

ئىچكى قىيپاش مۇسكۇلى 5. قوساق

دىئافراگما مۇسكۇلى 6. قوساق پەردىسى

8. قوساق تۈز مۇسكۇلى

چوڭ تورلۇق پەردە ئۇزۇنچاق ئېرىقچىسىنىڭ تاشقى يۈزىگە

چىڭ چاپلاشقان بولىدۇ، ئارقا خالتا سىرتى قوساق پەردىسى

بىلەن ئورنىلىپ تۇرىدۇ، ئالدى خالىتا تورلۇق پەردە قېپى بىلەن قاپلىنىپ تۇرىدۇ.

چوڭ قېرىنىڭ ئارقا يېنى دىئافراگمىنىڭ ئاستى ۋە بىل مۇسكۇلى بىلەن تۇتىشىپ تۇرىدۇ. ئالدى يېنى قوساق تېمىغا چىڭ چاپلىشىپ، خەنجەرسىمان كۆمۈرچەكتىن دوۋسۇن سۆڭەككىچە سوزۇلۇپ تۇرىدۇ. تاشقى يان تېمى ئاخىرقى بىرنەچچە قوۋۇرغىغا، دىئافراگما مۇسكۇلىغا ۋە قوساقنىڭ يۇمشاق تېمىغا يانداش تۇرىدۇ. ئىچكى يان تېمى قات قېرىن، توققۇز تورلۇق، جىگەر، قېرىن ئاستى بېزى، ئوڭ بۆرەك ۋە ئۆچەي بىلەن خوشنا تۇرىدۇ. چوڭ قېرىننىڭ ئالدى ئارقا-يېنىغا تال چاپلاش-قان بولىدۇ.

قېرىن تېمىدىكى شىللىق پەردىدە نۇرغۇنلىغان خىلمۇ-خىل ئىمىزىكچىلار بولىدۇ. شىللىق پەردىنىڭ ئاستى يۇمشاق شىللىق پەردە قەۋىتىدىن، ئۇنىڭ ئاستى مۇسكۇل قەۋەت بىلەن شىرەلىق قەۋەتتىن ئىبارەت.

چوڭ قېرىننىڭ ئالدى دالىنى قىزىل ئۆڭگەچ ۋە تورلۇق قېرىنغا تۇتۇشىدۇ ۋە قىزىل ئۆڭگەچ ئېرىقچىسى ئارقىلىق توققۇز تورلۇق ھەم قات قېرىنغىمۇ تۇتىشىدۇ.

تورلۇق قېرىن خەنجەرسىمان كۆمۈرچەككە جايلاشقان سوقى-چاق خالىتىدىن ئىبارەت. ئۇنىڭ ئالدى دىئافراگمىغا تۇتىشىدۇ، دىئافراگمىنىڭ كۆكرەك بوشلۇغى يۈزى يۈرەككە يېقىن بارىدۇ. تورلۇق قېرىن شىللىق پەردىسىدە ھۆكۈنەك قاتلاقلار بولىدۇ.

[ئوپىراتسىيە ئالدىدىكى تەييارلىق] ئاددىي تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىدۇ. سول تەرەپ، بولۇپمۇ ئاچ بېقىش ياكى يۇيۇلۇش، يۇڭى چۈشۈرۈلگەندىن كېيىن 3% لىك لىزول بىلەن يۇيۇلۇپ، يود تىنىكتۇرسى سۈركىلىدۇ. ئوپىراتسىيەدىن 2-3 سائەت ئىلگىرى كالىغا ئىلماق سۇ ھەمەل قىلىنىدۇ.

پىچاق، قاچا، قان توختاتقۇ قىسقىچ، جاراھەت كەرسىگۈچ ۋە تىكىش جابدۇقلىرى قاينىتىپ دېزىنفېكسىيە قىلىنىدۇ. دېزىنفېكسىيە دورىلىرى، يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورا، 3% لىك پىرو-كايىن، ئىشپىرس، ئاغامچا، ئوپىراتسىيە داستىخانى، داكا، تېڭىقلار تەييارلىنىدۇ. ئوپىراتسىيە خادىمى، ياردەمچىلىرى ۋە كالىنى بېكىتىپ بەرگۈچىلەر ئوبدان ئۇيۇشتۇرۇلىدۇ.

[بېكىتىش ۋە ھۇشسىزلاندۇرۇش] ئادەتتە داردا ئۆرە تۈر-غۇزۇپ، ياكى ئوڭ يېنىچە ياتقۇزۇپ بېكىتىلىدۇ. بەل يېنىدىن ئۆتكۈزۈپ ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ ياكى توك يىڭىنىسى بىلەن (بەخۇي ۋە بەل يېنىدىكى پەللىلەردىن) ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ، ياكى قاتتىق پەردە تاشقى بوشلۇغىدىن ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ.

بەل يېنىدىن ھۇشسىزلاندۇرۇش: 3%~2 لىك پروكاينىن ئېرىتمىسىدىن 60 م ل ئېلىپ، 20 م ل دىن ئۈچ ئورۇنغا ئۆكۈل قىلىنسا، 15 مىنۇتتا ھۇشسىزلىنىدۇ، ھۇشسىزلىنىش ۋاقتى 1~2 سائەت داۋام قىلىدۇ. بىرىنچى يىڭىنە 1-بەل ئۇمۇرتقا ئۈچىنىڭ ئالدىنقى بۇرجىمىنىڭ ئاستىدىن تىك ساند-چىلىدۇ ۋە بەل ئۇمۇرتقا توغرا ئۆسۈگىنىڭ ئۈستىخىنىغا يەتكۈ-

زۈلەدۇ، ئاندىن يىڭىنى سەل سۇغۇرۇپ تۇرۇپ، ئۇمۇرتقا توغرا ئۆسۈگىنىڭ ئالدى گىرۋىگىنى بويلىتىپ 0.5 س م سانچى-لىدۇ ۋە 3% لىك پروكاين ئېرىتمىسىدىن 10 م ل ماڭدۇرۇلىدۇ، ئاندىن يىڭىنى تېرە ئاستىغا كەلگىچە سۇغىرىپ ئېلىپ، يەنە 10 م ل ماڭدۇرۇپ، ئاخىرقى قوۋۇرغا نېرۋىسى ھۇشسىزلىنىدۇ-رۇلىدۇ. ئىككىنچى يىڭى 2-بەل ئۇمۇرتقا ئارقا قىرىدىن سان-چىلىپ، سۆڭەك-قوساق ئاستى نېرۋىلىرى ھۇشسىزلىنىدۇرۇلىدۇ، ئۈچىنچى يىڭى 4-بەل ئۇمۇرتقا توغرا ئۆسۈگىنىڭ ئالدى قىرىدىن سانچىلىپ، سۆڭەك-يىرىق نېرۋىلىرى ھۇشسىزلىنىدۇرۇ-لىدۇ، ئۆكۈل قىلىش ئۇسۇلى 1-ئورۇنغا ئۆكۈل قىلغانغا ئوخشاش.

بەل-يانىپاش قىسمىدىكى قاتتىق پەردە تاشقى بوشلۇغىدىن ھۇشسىزلىنىدۇرۇش ئورنى ئۇمۇرتقا سۆڭەك بېسىق ئۆسۈگىنىڭ ئوتتۇرا سىزىغى بىلەن ئىككى ياق سۆڭەك دوقىسىنى تۇتاشتۇر-غان سىزىقنىڭ كېسىشكەن جايىدىن 2 ئىلىك كېيىن يەردىن يەنى بەيخۇي پەللىسىدىن ئىبارەت. ئورنى مۇقىملاشتۇرۇلغان-دىن كېيىن، ئۇ يەر يۇڭى قىرغىلىپ دېزىنڧېكسىيە قىلىنىدۇ، ئاۋال 14~16-نومۇرلۇق يىڭى بىلەن تېرە بىر يەردىن تېشى-لىدۇ، ئاندىن ھۇشسىزلىنىدۇرۇش يىڭىسى ھىلىقى تۆشۈكتىن 4~7 س م تىك سانچىلىدۇ، يىڭى ئۇمۇرتقا ئارىلىغىدىكى تارد-مۇشقا يەتكەندە تېز ماڭىدۇ، دورىنى ماڭدۇرغاندىمۇ ئانچە تاقاش-مايلا ماڭىدۇ، مانا بۇ تاللانغان ئورۇننىڭ توغرا بولغىنى. بۇ

يەرگە 2% لىك پروكاينىدىن 40~50 مىل ئۆكۈل قىلىنسا،
 تەخمىنەن 15 مىنۇتتا ھۇشسىزلىنىش باشلىنىدۇ.
 [ئوپىراتسىيە ئورنى ۋە ئۇسۇلى] ئوپىراتسىيە ئورنى دېزىن-
 فېكسىيە قىلىنغاندىن كېيىن ئوپىراتسىيە داستىخاننى يېمىلىدۇ.
 ئاندىن سۆڭەكچ تۈگۈنى بىلەن ئاخىرقى قوۋۇرغا سىزىغىدىن
 بەل ئۇمۇرتقا توغرا ئۆسۈگىنىڭ ئۇچىغا 5 سىم كېلىدىغان جاي-
 دىن پەسكە قارىتىپ 20~25 سىم تىك كېسىلىدۇ. ئاندىن
 قوساق دائىرىسىدىكى يۇمشاق قوشقۇچى توقۇلما، سېرىغەت،
 قوساق تاشقى قىيپاش مۇسكۇلى بىر-بىرلەپ كېسىلىپ، قوساق
 ئىچكى قىيپاش مۇسكۇلى، قوساق توغرا مۇسكۇلى، قوساق
 ئىچكى سېرىغەتتى تىماقلاپ ئاجرىتىلىپ، قوساق تاشقى يۇمشاق
 توقۇلمىلىرى ئېچىلىدۇ. ماي قەۋىتى قېلىن بولسا، بىر قىسمى
 ئېلىۋېتىلىدۇ، ئاخىردا قوساق پەردىسى پۇرۇپ كېسىش ئۇسۇلى
 بىلەن كېسىلىدۇ. كېسىش جەريانىدا، قان توختىتىشقا، چوڭ
 قان تومۇر ھەم نېرۋىلارغا تىغ تېگىپ كەتمەسلىكىگە دىققەت
 قىلىش لازىم. دىمەك، قوساق ئېچىلغاندىن كېيىن چوڭ قېرىن
 چىقىرىلىپ، كېسىكىنىڭ ئىككى يېنىدىكى قوساق پەردىسى
 ئالدىن باكتېرىيىسىزلىنىدۇرۇلۇپ تەييارلانغان ئىككى پارچە
 ئوپىراتسىيە داستىخاننى بىلەن قوشۇپلا چوڭ قېرىننىڭ شىرلىق
 پەردىسى، مۇسكۇل قەۋىتىگە يۆمەپ تىكىپ قويۇلىدۇ. ئاندىن
 چوڭ قېرىننىڭ 4 بۇرجىگى ئەتراپىدىكى مۇسكۇل ۋە تېرىگە
 ئايرىم-ئايرىم تىكىلىدۇ-دە، چوڭ قېرىن تىك تۆت بۆلۈك

شەكلىدە بولىدۇ. داسىنخان بىلەن قوشۇپ تىكىلگەن تىكىك قىرلىرىغا ئىلماق فېزىئولوگىيىلىك ئېرىتمىگە چىلانغان ئۇزۇنچاق داكا بىرنەچچە قەۋەت قىلىپ تىقىپ قويۇلىدۇ ھەمدە كېسىك يۈزىگە داكا يېپىپ قويۇلىدۇ. ئاخىردا ئوپېراتسىيە داسىنخاننى يانلىرىغا تارتىپ تۈزلىنىدۇ ۋە تېرە ياكى بەدەنگە قىستۇرۇپ بېكىتىپ قويۇلىدۇ. قېرىن يۇقۇرىدىن تۆۋەنگە تەخمىنەن 15 سم كېسىلىدۇ. قېرىن تېمىنى كېسىش بىلەن بىللە، كېسىكنىڭ يانلىرى قان توختىتىش قىسقۇچى بىلەن بىر-بىرلەپ قىسىپ كېرىپ قويۇلىدۇ، چوڭراق قان تومۇرلاردىن قان چىققاندا، ئۆز ۋاقتىدا قان توختىتىلىدۇ. قېرىن تېمى كېسىلگەندىن كېيىن، قان توختىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن قولىنى قېرىنغا تىقىپ، ئىچى-دىكى ماددىنىڭ $\frac{1}{3}$ ياكى $\frac{2}{3}$ قىسمى چىقىرىلىدۇ. بۇ جەرياندا كېسىكنىڭ يۇقۇملىنىپ قېلىشىدىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم.

تورلۇق قېرىننىڭ جاراھەتلىك ياللۇغىدا، قولىنى چوڭ قېرىن ئارقىلىق تورلۇق قېرىنغا كىرگۈزۈپ، مېتال قاتارلىق يات نەرسىلەر چىقىرىلىدۇ. قېرىن تېمىغا سانجىلغان نەرسە بولسا، ئۇنى ئېھتىياتلىق بىلەن چىقىرىش لازىم.

توققۇز تورلۇق تىقىلىشىدا، زونت ئارقىلىق توققۇز تورلۇققا فېزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە بىۋاسىتە قۇيۇلۇپ، توققۇز تورلۇق راۋانلاشتۇرۇلىدۇ.

ئوپېراتسىيە تۈگەگەندىن كېيىن، ئاۋال قېرىننىڭ ئىچكى قەۋىتى تىكىلىدۇ، قىسقۇچلار ئېلىنىپ، بىر قۇر يۇيۇلغاندىن

كېيىن، ئۈستىكى قەۋەتلەر يۆمەپ تىكىلىدۇ، ئۈستىگە پېنتىسىل-
 لىن ياكى فېزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە سۈركىگەندىن كېيىن، يېڭى
 بىر يۈرۈش تىكىش سايمانلىرى بىلەن شىرلىق پەردە، مۇسكۇل
 قەۋەتلىرى ھىمىرىپ تىكىلىدۇ ۋە ئۈستى فېزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە
 بىلەن پاكىز يۇيۇلۇپ، ئۈستىگە پېنتىسىللىن ياكى كامفور مېيى
 سۈركىلىدۇ. ئايرىش ۋە بېكىتىش يىمىلىرىنى سۆكۈۋەتكەندىن
 كېيىن، قېرىن قوساق بوشلۇغىغا كىرگۈزۈلىدۇ. قوساق پەردىسى
 بىلەن قوساقنىڭ كۆندىلەڭ مۇسكۇلى يۆمەپ تىكىلىپ، ئۈستىگە
 پېنتىسىللىن ياكى ياللۇغ قايتۇرۇش پاراشوگى سېپىلىدۇ. قوساق-
 نىڭ ئىچكى قىيپاش مۇسكۇلى بىلەن تاشقى قىيپاش مۇسكۇلى
 ئايرىم-ئايرىم ھالدا تۈگۈنلەپ تىكىلىدۇ. تېرە چىڭقىلىشنى
 ئازايتىپ تىكىش ئۇسۇلى بىلەن تىكىلگەندىن كېيىن، يود تىنىك-
 تۇرسى سۈركىلىدۇ ۋە تېڭىق سېلىنىدۇ. ئاخىردا ئوپىراتسىيە
 قىلىنغان جايىنىڭ ئۆلچەملىك 0.25% لىك 50 م ل پروكاينىدا
 سۇيۇلدۇرۇلغان 80 تۈمەن بىرلىك پېنتىسىللىن 4~6 يەرگە
 قاماللاپ ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

[ئوپىراتسىيىدىن كېيىنكى ئاسراش] ئوپىراتسىيىدىن كېيىن
 بىر كۈنگىچە ئوزۇق بېرىلمەيدۇ، سۇ ئىچكۈزۈلسە بولىدۇ. كېيىن
 ئاسان ھەزىم بولىدىغان چۆپ ياكى يۇمشاق ئوزۇقلار ئاز بېرىلسە
 بولىدۇ. چارەھەتنىڭ جايلىق ئۆزگىرىشى ۋە ئورگانىزىمنىڭ
 ئومۇمى ئەھۋالى كۈزىتىپ تۇرۇلۇپ، يۇقۇملىنىپ قېلىشنىڭ
 ئالدى ئېلىنىدۇ. يىرىڭلاش كۆرۈلسە، ئايرىم يىپىلارنى ئېلىۋې-

تىپ، تاشقى كېسەللىكنى داۋالاش ئۇسۇلى بويىچە بىر تەرەپ قىلىندۇ. قوساق پەردە ياللۇغى ۋە يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن پېنىتسىللىن ۋە سۇلفانىلامىدلىق دورىلار ئىشلىتىلدۇ. يۈرەكنىڭ پائالىيىتىگە ھەر ۋاقىت دىققەت قىلىندۇ، زۆرۈر تېپىلغاندا، يۈرەك كۈچەيتكۈچى دورىلار بېرىلدۇ ۋە سۇيۇقلۇق تولۇقلىنىدۇ.

قوساقنى يېرىپ تۇغدۇرۇش

[مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر] قىيىن تۇغۇت كۆرۈلۈپ، تۆرەلمە ئورنىنى ئوڭشاش ياكى تۆرەلمىنى پارچىلاپ ئېلىش مۇمكىن بولمىغاندا، قوساقنى يېرىپ تۇغدۇرۇش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ.

[جايلىق ئاناتومىيىسى] قوساق تېمىنىڭ تۈزۈلۈشى چوڭ قېرىن ئوپېراتسىيىسى دىگەن ماۋزۇچاققا ئېيتىپ ئۆتۈلدى. سىيىرنىڭ بالياتقۇ بۇرجىمى قوش بولىدۇ. كۆپ تۇغمىغان سىيىرنىڭ بالياتقۇ بۇرجىمى داس بوشلۇغىدا تۇرىدۇ. كۆپ تۇققان سىيىرنىڭ بالياتقۇ بۇرجىمى دوۋسۇن سۆڭەك ئالدى قىرىدىن قوساق بوشلۇغىغا چۈشۈپ تۇرىدۇ. بالياتقۇ بۇرجىمى ئەگرى-بۇگرى تۈزۈلگەن بولۇپ، چوڭ ئەگمى بىلەن كىچىك ئەگمى روشەن بولىدۇ. بالياتقۇ كەڭ تارمۇشى كىچىك ئەگمىگە چاپلىشىپ تۇرىدۇ.

باليئاتقۇ شىللىق پەردىسىدە يېرىم ئايسىمان گۆش ئومىغى بولىدۇ.

[ئوپىراتسىيە ئالدىدىكى تەييارلىق] بۇ، چوڭ قېرىن ئوپىراتسىيىگە ئوخشاش. بىر پارچە يوغان داستىخان ياكى داكا تەييارلىنىدۇ.

[بېكىتىش ۋە ھۇشسىزلىنىدۇرۇش] ئادەتتە سول يېنىچە يات-قۇزۇپ بېكىتىلىدۇ. بەل يېنىدىن ۋە قاتتىق پەردە تاشقى بوش-لۇغىدىن ھۇشسىزلىنىدۇرۇلىدۇ ياكى توك يىڭىسى سانچىپ ھۇشسىزلىنىدۇرۇلىدۇ (چوڭ قېرىن ئوپىراتسىيىسىگە قاراڭ).

[ئوپىراتسىيە ئورنى ۋە ئۇسۇلى] ئوپىراتسىيە قەدەم-باس-قۇچلىرى چوڭ قېرىن ئوپىراتسىيىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. ئوپىراتسىيە ئورنى قوساقنىڭ ئوڭ تەرەپتىكى يۇمشاق تېمىنىڭ ئوتتۇرا تۆۋەن قىسمى، قوۋۇرغا ياسىنىڭ 3~5 س م كەينى بولۇپ، قوۋۇرغا ياسى تەكشىلىگىدە تەخمىنەن 30 س م ئۇزۇن-لۇقتا كېسىلىدۇ.

قوساق تېمى كېسىلگەندىن كېيىن، چاۋا ۋە ئۈچەيلەرنى ئالدىغا سۈرۈپ تۇرۇپ، ئىككى قولىن بالىئاتقۇ ئاستىغا كىرگۈزۈپ، تۆرەلمىنى مەلۇم يېرىدىن تۇتۇۋېلىپ، تۆۋەندىن يۇقۇرغا بالىئاتقۇنىڭ چوڭ ئەگمىدىن سىرتقا تارتىسىز. بالىئاتقۇ تېمى بىلەن قوساق تېمى كېسىكلىرىنىڭ ئارىسىغا باكتېرىيىسىزلىنىدۇ-رۈلگەن داكا قىستۇرۇلىدۇ، بالىئاتقۇ بۇرجىمى چوڭ ئەگمىنى بويلىتىپ، ئانىلىق ھەمىيىسىدىن قاچۇرۇپ تۇرۇپ، بالىئاتقۇ

تېمى كېسىلىدۇ. ھەمىيى قول بىلەن يىرتىلىپ، باش سۈيى چىقىرىلغاندىن كېيىن (باش سۈيى قوساق ئىچىگە كىرىپ كەتمە- سۇن)، تۆرەلمە ئالدى ياكى كەينى ئىككى پۇتىدىن تۇتۇۋېلى- نىپ، ئاستا-ئاستا تارتىپ چىقىرىلىدۇ. بالا ھەمىيى ئىمكان بار سويۇۋېتىلىدۇ، بالياتقۇ بوشلۇغى پىنتىسىلىق فىزىئولو- گىيىلىك ئېرىتمە بىلەن يۇيۇلىدۇ.

تۆرەلمە چىقىرىۋېلىنغاندىن كېيىن، بالياتقۇنىڭ كېسىلگەن جايى دەرھال تىكىلىدۇ، 1-قەۋىتى يۆمەپ تىكىلىدۇ، 2-قەۋىتى يۆمەپ ياكى تۈگۈنلەپ تىكىش ئۇسۇلىدا ئىچىگە ھىمىرىپ تىكى- لىدۇ. تىكىلىپ بولغاندىن كېيىن، جاراھەت ئاغزىغا پىنتىسىللىق ياكى كامفورا مېيى سۈرتۈلىدۇ. ئاندىن بالياتقۇ قوساق بوشلۇ- غىغا كىرگۈزۈلىدۇ (قوساق بوشلۇغى باش سۈيى تەرىپىدىن بۇلغانغان بولسا، ئۇنى باكتېرىيىسىز لەندۈرۈلگەن داكا بىلەن شۇمۇرۇپ ئېلىپ ۋە قوساق بوشلۇغىنى فىزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە بىلەن پاكىز يۇيۇپ)، ئاندىن قوساق تېمى تىكىپ قويۇلىدۇ.

[ئوپېراتسىيىدىن كېيىنكى ئاسراش] چوڭ قېرىن ئوپېراتسىي- يىسىدىكىگە ئوخشاش. جىنىسى يولدا بولىدىغان ئۆزگىرىشلەرگە دىققەت قىلىپ، يېرىڭلىق سرغىتىملار چىققان ھالدا، تېز بىر تەرەپ قىلىش لازىم.

ئەمچەك توپچىسى ئوپراتسىيىسى


[مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر] سۈت كۆلچىكىنىڭ ئالاھىدىلىق ئۆسۈمى ۋە ئەمچەكتە تاش پەيدا بولۇش قاتارلىقلاردا قوللىنىلىدۇ.

[جايلىق ئاناتومىيىسى] سىيىرنىڭ يىلنى بىر بىرىگە يېقىن تۇتاشقان 4 قىسمىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، تۈۋى، تېنى ۋە توپچىسىدىن ئىبارەت 3 بۆلەككە بۆلۈنىدۇ.

ئەمچەك توپچىسىدىن ئىچىگە تۇتاشقان ئىنچىكە نەيچە سۈت كانىلى دەپ ئاتىلىدۇ. سۈت كانىلىنىڭ يۇقۇرىسىدىكى چوڭ بوشلۇق سۈت كۆلچىكى دىيىلىدۇ. كۆلچەك تېمىدا نۇرغۇن سۈت نەيچىلىرى ئاغزى بولىدۇ. ئەمچەك توپچىسىنىڭ ئەتراپىغا سىلىقلاشتۇرغۇچى مۇسكۇللار ۋە ئەۋرىشىم توقۇلمىلار جايلاشقان بولىدۇ. سىلىقلاشتۇرغۇچى مۇسكۇللار ئەمچەك توپچىسىنىڭ تۆۋەنكى ئۇچىدا ھالقىسىمان پۈرمە مۇسكۇلنى شەكىللەندۈرگەن بولىدۇ.

ئەمچەك توپچىسىنىڭ تېگىدىكى شىللىق پەردە ئاستىدا ھالقىسىمان قان تومۇرلار توپلىشىپ تۇرىدۇ. ئەمچەك توپچىسىنىڭ تېمىدا ئۇزۇنسىغا كەتكەن قان تومۇرلار بولىدۇ.

يىلنىغا سۆڭەكچە - قوساق ئاستى نېرۋىلىرى، سۆڭەكچە - يىرىق نېرۋىلىرى، ئۇرۇق بېغىشى تاشقى نېرۋىسى ۋە ئارىلىق نېرۋىسى.



60-رەسىم ئەمچەكنىڭ تۈزۈلۈشى

1. تېرە، 2. يىلن بېزى 3. توپچا سۈت
- كۆلچىكى 4. سۈت كانىلى 5. شىللىق پەردە
- قاتلىغى 6. ئاسما تارتمۇش


سىنىڭ شاخلىرى تارقالغان بولىدۇ.

[بېكىتىش ۋە ھۇشسىزلاندۇرۇش] يېنىچە ياتقۇزۇپ بېكىتىلىدۇ. 40% لىك ئىسپىرت كۆك تومۇردىن ئۆكۈل قىلىنىپ (ھەرك گ تەن ئېغىرلىغىغا 3~4 م ل دىن) يۈزە ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ. ئاندىن 2~3% لىك پروكاين بىلەن ئەمچەك توپچىسىنىڭ تۈۋىدىن ئىنقىلىتلىق ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىللە ئەمچەك توپچىسىغا 5% لىك پروكاينىدىن 5 م ل ئۆكۈل قىلىنىدۇ.

[ئوپىراتسىيە ئورنى ۋە ئۇسۇلى] ئوپىراتسىيە قىلىنىدىغان ئورۇن دېزىنڧېكسىيە قىلىنغاندىن كېيىن، توپچا تۆشۈگىدىن

سۈت كانىلىنى كىرگۈزۈپ قويۇپ، توپچا ئوۋىدىن سەل تۆۋەن جايىدىن پۈتۈن قەۋەت كېسىلىپ ۋە قان تولۇق توختىتىلىپ، تالالىق ئۆسمە ياكى تاش ئېلىپ تاشلىنىدۇ. توپچا ئىچى 0.1% لىك رېۋانول ئېرىتمىسى ياكى فېزىئولوگىيىلىك ئېرىتمە بىلەن يۇيۇلىدۇ.

كېسىلگەن جاي قوش ھالقىسىمان قىلىپ تىكىلىدۇ (1) - قەۋىتى شىللىق پەردىنىڭ ئاستىنقى قەۋىتىنى بويلىتىپ، 2 - قەۋىتى تېرە ئاستى قەۋىتىنى بويلىتىپ تىكىلىدۇ. تىكىلىپ بولغاندىن كېيىن، سۈتنىڭ چىقىشىغا ئاسانلىق تۇغدۇرۇش يۈزىسىدىن، سۈت كانىلىدىن سۇلياۋدىن ئىشلەنگەن سۈت كانىلى تىقىپ قويۇلىدۇ، كېسىلگەن جايغا سۇلفانىلامىد مەلھىمى سۈرتۈلدۇ، توپچىغا خالتا كىيگۈزۈپ قويۇلىدۇ.



61 - رەسىم ئەمچەك توپچىسى تۈۋىدىن ئىنقىلىتلىق ھۇسۇزلاندۇرۇش
62 - رەسىم ئۇدۇل قىلىپ قوش ھالقىسىمان تىكىش


[ئوپېراتسىيىدىن كېيىنكى ئاسراش] يىلدىن پات - پات ئۆۋۈ - لاپ تۇرۇلىدۇ، سۈت ۋاقتىدا سېغىلىپ، سۈت يولى راۋانلاشتۇرۇلۇپ تۇرۇلىدۇ، سۈت ۋاقتىدا سېغىلىپ، سۈت يولى راۋانلاشتۇرۇلۇپ تۇرۇلىدۇ.

رۇلىدۇ. يۇقۇملىنىپ قالمىسۇن ئۈچۈن، ئانتىبىيوتىك دورىلار ياكى سۇلفانىلامىدلىق دورىلار بىلەن داۋالىنىدۇ.

پىچىش

[جايلىق ئاناتومىيىسى] پىچىشقا مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارغا ئۇرۇقدان خالىتىسى، ئۇرۇقدان، قوشۇمچە ئۇرۇقدان ۋە ئۇرۇق بېغىشى كىرىدۇ.

ئۇرۇقدان خالىتىسى: ئۇرۇقدان خالىتىسى خالىتىغا ئوخشايدۇ، ئېنىق بويىنى بولىدۇ ۋە سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ تېرە، ئەتلىك پەردە، سېرىغەت ۋە غىلاپلىق پەردىلەردىن تۈزۈلىدۇ. تېرىسى نېپىز ۋە يۇمشاق بولىدۇ، ئۇرۇقدان خالىتىسى قاپ ئوتتۇرىسىدىكى بىر تال چېكى بىلەن ئايرىلىپ تۇرىدۇ. ئەتلىك پەردە ئۇرۇقداننى ئوڭ ۋە سول ئىككى بوشلۇققا ئاجرىتىپ تۇرىدۇ. سېرىغەت خېلى قېلىن بولىدۇ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى باش غىلاپلىق پەردە قوساق توغرا سېرىغىتى بىلەن قوساق پەردىسى تېمى قەۋىتىدىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. باش غىلاپلىق پەردىنىڭ ئىچىدە پۇختا غىلاپلىق پەردە بولىدۇ، ئۇ قوساق پەردە قەۋىتىنىڭ داۋامى ھىساپلىنىدۇ، ئۇرۇقدان، قوشۇمچە ئۇرۇقدان ۋە ئۇرۇق بېغىشىنى قاپلاپ تۇرىدۇ ھەمدە ئۇرۇق بېغىشى پەردىلىرىنى شەكىللەندۈرىدۇ، تۆۋەنكى قېلىن قىسمى غىلاپلىق پەردە نارىمۇشى دىيىلىدۇ.



ئۇرۇقدان ۋە قوشۇمچە
ئۇرۇقدان: ئۇرۇقدان
ئۇزۇن، يۇمۇلاق بولۇپ،
ئۇرۇقدان خالتىسىدا ساڭ-
گىلاپ تۇرىدۇ، قوشۇمچە
ئۇرۇقدان بولسا ئۇرۇقدان-
نىڭ ئارقا گىرۋىگىگە چاپلى-
شىپ تۇرىدۇ.

63-رەسىم ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ

ئىچكى تۈزۈلۈشى

1. تېرە 2. ئەتلىك پەردە 3. خالتا
توسانچىسى 4. ئۇرۇقداننى كۆتەرگۈچى
تاشقى مۇسكۇل 5. باش غىلاپلىق پەردە
6. غىلاپلىق پەردە بوشلۇقى 7. پۇختا
غىلاپلىق پەردە 8. ئۇرۇقدان 9. قوشۇمچە
ئۇرۇق نەيچىسى بولىدۇ. ئۇرۇقدان 10. ئۇرۇق بېغىشى
ئۇرۇق نەيچىسى ئۇرۇق بېغىشىنىڭ ئارقا گىرۋىگىگە جايلاشقان
بولىدۇ.

[بېكىتىش ۋە ھۇشسىزلاندۇرۇش] يېنىچە ياتقۇزۇپ بېكىتىدۇ.
ئادەتتە ھۇشسىزلاندۇرۇلمايدۇ.

[پىچىش ئورنى ۋە ئۇسۇلى] پىچىش ئورنى پىچىش ئۇسۇلىغا
قاراپ بەلگىلىنىدۇ. پىچىش ئۇسۇلى قان چىقارماي پىچىش ۋە
قان چىقىرىپ پىچىشتىن ئىبارەت ئىككى خىل بولىدۇ.
(1) قان چىقارماي (يېپىق) پىچىش: پىچىش ئامبۇرى بىلەن

ئۇرۇق بېغىشىنى قىسىپ، ئىچىدىكى قىزىل تومۇر قان ماڭمايدى-
غان قىلىنىدۇ. دە، ئۇرۇقدان ۋە قوشۇمچە ئۇرۇقدان قاندىن
مەھرۇم بولۇپ، كېرەككە كەلمەس بولىدۇ. بۇ ئۇسۇل تۈركۈم-
لەپ پىچىشقا مۇۋاپىق كېلىدۇ، بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق قاتما، قارا-
سان ۋە يىرىڭلىق يۇقۇملانغانلاردىن ساقلانغىلى بولىدۇ.


پىچىش ئۇسۇلى: سول قولنىڭ باش ۋە كۆرسەتكۈچ بارمىغى
بىلەن ئۇرۇق بېغىشى بىر ياققا ئىتتىرىلىدۇ ۋە پىچىش ئامبۇرى
بىلەن قىسىپ تۇرۇلىدۇ، ئوڭ قول بىلەن ئامبۇرنىڭ بىر سېپىنى
تۇتۇپ تۇرۇپ، يەنە بىر سېپىنى تىزغا قويۇپ تۇرۇپ، تېزلىكتە
سېپىدىن قاتتىق بېسىلىدۇ (باسقاندا پەي ئۈزۈلگەندەك ئاۋاز
چىقىدۇ)، بىرەر مىنۇتچە ئۆتكەندىن كېيىن ئامبۇرنى ئاستا
بوشىتىپ، ئاندىن تۆۋەنگە 2 س م سۈرۈپ، يەنە مۇشۇنداق
ئۇسۇل بىلەن يەنە بىر قېتىم بېسىپ، ئاندىن ئامبۇر چىقىرىۋې-
لىنىدۇ، يەنە بىر ياقىدىكى ئۇرۇق بېغىشىمۇ مۇشۇ ئۇسۇل بويىچە
بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. ئاخىردا قىسىلغان جايغا 5% لىك يود
تىنىكتۇرىسى سۈرتۈلىدۇ.

(2) قان چىقىرىپ (ئوچۇق) پىچىش:

ئۆزۈنسىغا كېسىش: كېسىلىدىغان جاي دېزىنفېكسىيە قىلىن-
غاندىن كېيىن، سول قول بىلەن ئۇرۇقدان خالىتىسنى بويىن-
دىن تۇتۇۋېلىپ، ئۇرۇقدان تۆۋەنگە قىستىلىدۇ، ئاندىن ئۇرۇق-
دان خالىتىسنىڭ ئالدى تەرەپ چەك سىزىغىنىڭ ئىككى يېنىدىن
(2~3 س م كېلىدىغان جايىدىن) خالىتىسنىڭ تېگىگە يەتكۈزۈپ

كېسىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇرۇقدان سىقىپ چىقىرىلىدۇ ۋە غىلاپلىق پەردە تارمۇشلىرى ئۈزۈۋېتىلىدۇ، سول قول بىلەن ئۇرۇقداننى تۇتۇۋېلىپ، ئوڭ قول بارماقلىرى بىلەن ئۇرۇق بېغىشنى قىسىۋېلىپ، ئۇرۇقدان خالتىسى يۇقۇرغا ئىتتىرىلىدۇ، ياردەمچى ئۇرۇق بېغىشنى توم يىپەك يىپ بىلەن بوغىدۇ. بوغۇلغان جايىنىڭ بىر س م چە تۆۋەن يېنىدىن ئۇرۇقداننى كېسىپ ئېلىپ، ئۇرۇق بېغىشنىڭ كېسىلگەن ئۇچىغا يود تىنىك تۈرىسى سۈركەپ قويۇلىدۇ.

توغرىسىغا كېسىش: كېسىلىدىغان جاي دېزىنفېكسىيە قىلىندىغاندىن كېيىن، سول قول بىلەن ئۇرۇقدان خالتىسىنى بوينىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ، ئۇرۇقداننى تۆۋەنگە بېسىپ تۇرۇپ، ئاستىدىن توغرىسىغا كېسىلىدۇ ۋە ئىككى ياق ئۇرۇقدان سىقىپ چىقىرىلىدۇ، غىلاپلىق پەردە تارمۇشلىرى ئۈزۈۋېتىلىپ، ئۇرۇق بېغى-



64-رەسىم ئۇزۇنسىغا كېسىش ۋە توغرىسىغا كېسىش ئۇسۇلى

1. ئۇزۇنسىغا كېسىش 2. توغرىسىغا كېسىش

شىنى بوغۇپ، ئۇرۇقدان كېسىپ تاشلىنىدۇ، ئۇرۇق بېغىشنىڭ كېسىلگەن ئۇچىغا يود تىنىكتۇرىسى سۈركەپ قويۇلىدۇ. [پېچقاندىن كېيىنكى ئاسراش] پېچىپ بولغاندىن كېيىن بېقىش - باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، كېسىلگەن جاينىڭ يۇقۇملىنىپ قېلىشىدىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم.

ئۇرۇق نەيچىسىنى بوغۇۋېتىش

[مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىك] سىناق (پروپىنىك) بۇقەلارنى تەييارلاش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ. [جايلىق ئاناتومىيىسى] "پېچىش" دېگەن ماۋزۇغا قاراڭ. [بېكىتىش ۋە ھۇشسىزلاندۇرۇش] يېنىچە ياتقۇزۇپ بېكىتەلىدۇ. بوغۇلىدىغان ئورۇن ئىنقىلىراتلىق ھۇشسىزلاندۇرۇلىدۇ. [بوغۇش ئورنى ۋە ئۇسۇلى] بوغۇلىدىغان ئورۇن دېزىنفېكسىيە قىلىنغاندىن كېيىن، سول قول بىلەن ئۇرۇقدان خالتىسىنى بويىنىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ، ئۇرۇقدان تۆۋەنگە قىسىلىدۇ - دە، ئاساسەن ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. قوشۇمچە ئۇرۇقدان تۆپەسىدىكى ئۇرۇق بېغىشى يولىدىن 3 س م چە ئۇزۇن كېسىك ئېچىلىپ، تېرە ۋە سېرىغەت كېسىلىدۇ. ئاندىن غىلاپلىق پەردە قاچا بىلەن كېسىلىپ، ئۇرۇق نەيچىسى ئېلىپ چىقىرىلىدۇ ۋە ئۇنى ئۇرۇق بېغىشىغا تۇتاشتۇرغۇچى پەردە ئاجرىتىلىدۇ، ئاندىن تىكىش يېپى بىلەن ئىككى يەردىن بوغۇلىدۇ ۋە بوغۇلغان

جايىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن 1 س م چە كېسىپ ئېلىۋېتىلىدۇ. مۇشۇ
ئۇسۇل بىلەن يەنە بىر ياندىكى ئۇرۇق نەيچىسىمۇ بوغۇلىدۇ.
غىلاپلىق پەردە يۆمەپ تىكىلىدۇ، تېرە تۈگۈنلەپ تىكىلىدۇ.
كېسىلگەن ئورۇنغا يود تىنىكتۇرىسى سۈركەپ قويۇلىدۇ.
[ئۇرۇق نەيچىسى بوغۇلغاندىن كېيىنكى ئاسراش] بېقىش -
باشقۇرۇش كۈچەيتىلىپ، يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

本书根据黑龙江人民出版社 1979 年 3 月第 1 版黑龙江第 1 次印刷版
本翻译出版。

بۇ كىتاپ خېيلۇڭجياڭ خەلق نەشرىياتى تەرىپىدىن
1979 - يىل 3 - ئايدا نەشر قىلىنغان 1 - نەشرى خېيلۇڭجياڭ
1 - باسمىغا ئاساسەن تەرجىمە ۋە نەشر قىلىندى.

كالىلاردا بولىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ
ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش
خېيلۇڭجياڭ ئۆلكىسى شىۋاڭجياڭ يېزا
ئىگىلىك مەكتىۋى تۈزگەن
تەرجىمە قىلغۇچى: ئىسمائىل ئىبراھىم
تەرجىمە مۇھەررىرى: ئەخمەت راخمان
مەسئۇل كوررېكتور: رىشت ۋاھىدى
مىللەتلەر نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىندى
شىنخۇا كىتاپخانىسى تەرىپىدىن تارقىتىلىدۇ
مىللەتلەر باسما زاۋۇدىدا بېسىلدى
1985 - يىل 5 - ئايدا 1 - قېتىم نەشر قىلىندى
1985 - يىل 5 - ئايدا بېيجىڭدا 1 - قېتىم بېسىلدى
باھاسى: 0.75 يۈەن

常见牛病防治

(维吾尔文)

黑龙江省双城农业学校编

司马义依布拉音译

民族出版社出版 民族书店发行

民族印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：14 1/4

1985年5月第1版

1985年5月北京第1次印刷

印数：0001—3,800册 定价：0.75元

书号：M 16049(4) 6

书号 M 16049 (4) 6

定价 0.75元